

5375

F
DIOSCORIDIS
M. MEDICA

5375



p.

Giosconides
m. medica

Red. Dir. ~~1812~~ M^{at}. Medu.

A


2. 1812

1812





Res 5375 5375



0100

1940

VETVS, IDQVE ADEO frequēs malū est, ut qui bonos libros edēdos cu-
 rant, tamen ab aliquibus quidem bene, ab alijs uero male mereantur. Siquidem gratiam inesse
 ab ijs, qui cum rerum cognitione pollent, quidvis nouerunt boni consulere. Inuidiam referūt,
 & mille ronchos ab imperitis, qui pręterquam quod optimis semper obstreput conauius, tū
 in diiudicandis quoq; rebus, non magis valent, q̃ talpę & uespertilionis. Id quod cum iamdu-
 dum persufum habeam, plane conuiniendum mihi putauī aut alumnias, sannaſq; quorundā,
 qui cum toti additi sunt suis ἐλεγεσθῶμενοι, ἀντιβαλλόμενοι (uel si quid etiam aliud habent sepla-
 riariorum, & agytarum picides χυρίσσι scilicet τῶν θῶν) sic in suum Auicennam, Serapionem
 Razemq; & id genus suauissimos autores fura uerūt, ut plane sordent eis ueterū Plinij, Theo-
 phraſtiq; & Dioscorid. cōmentarij. Sic enim qdam eorū palam nūc blasphemant, parū hos me-
 dicos fuisse, uerum grammaticos & literatores, uel quiduis potius aliud, q̃ medicinę peritos.
 Horum itaq; stultissimis, imō pestilētissimis nenijs, tantū Syrenarū perniciosissimis sibilis di-
 simulatis (doctiss. Capito Nicolaē) Dioscoridem nostrum in lucem agimus. Idcō adeo sub tuo
 celeberrimo, & splendidissimo nomine, ut qui autor aliquando nobis tanti consilij fuisti, καὶ ὡς
 τὸν ἔρχου ἔνερθον λαφύει, ut uerbo Homericō utar, tuis etiam auficijs (proſcriptis barbarorum
 delraymentis) in orbem eat, in Medicorum muſeis legatur, inq; manibus habeatur, medicorū
 ἄμφω καὶ κορυφαί. Simul ubi prodiderint huiusmodi ineptissimi gratuli & coccyces se, tu nihil
 omnis longe optimo auctori patronus ut sis, uiuicideſq; ab malignantium iniuria. De auctoris
 pręsentia & laude, non uideo quid publice monere debeam, quem tot nominibus commen-
 dat Galenus pharmacorum simplicium lib. 6. quod unus & solus de simplicibus effectibus be-
 ne scripserit & senserit, quodq; non aliunde mutuatus est sua, neq; ex aliorū narratione concin-
 nauit historiam, id quod barbarorum Herbariorum uulgus hæctenus studuit, uerum pręsentī
 inspektionē, fuisse ipsius oculis omnia contuitus est, suis manibus singula conſpectauit, fuocę
 ore gustauit, neq; unius tantum et alterius regionis herbas, sed magnam orbis partem peragrās
 rebus peruſtigandis, ut reuera nihil eum posset latere. Quod initio operis & ipse pariter testa-
 tur his uerbis. ἡμῶν ἰνq; διὰ τοῦ ἐν ἑπὶ τὴν ἐν πρώτῃ διόκλει, ἀλλὰ πρὸ τῆς ἐπιθυμίας περὶ τὴν ἱπ-
 πονομίαν τὸν ὄψιν, καὶ πολλὰν γὰρ ἐπιθυνοῦμεν. Ἰστέ γάρ ἡμῖν γράττοιον τὸν βίον. συναρῶμεν τὴν πραγματί-
 αν ἐν τῇ βιβλίῳ σου προτιράμενον. &c. Et rursum, παρακαλοῦμαι διελαι καὶ τοὺς ὑπερβορέους τοὺς ἐπιθυμῶ-
 ει, καὶ τὴν ἐν λόγῳ ἡμῶν διάνεμον σκοπεῖν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς πρώτοις μετ' ὑμῶν ἰσχυρίων ἐκαστὴν γὰρ πάλι
 τὴν ἀκριβέστατον δὲ βῶν πάλαι δι' αὐτοῦ ἴσας γινώσκεις, τὰ δ' ἔξ ἱστῶν ἐμφανῶς τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσεις τῶν παρ'
 ἑκάστου ἱπποχρίων ἀκριβοῦσιν, παρασώσεις καὶ τὰ τέχνη διαφῶς χρῆσασθαι, καὶ τὰ γινῆ, καὶ τὰς διὰ τὴν
 ἑκάστου ἀντὶν ἀναγράφειν. Nisi quid de uita eius ab eruditiss dubitāt, nec ferme quicq; competu hā-
 bemus pręter id quod in Suidæ extat cōmentarijs, cuius hæc sunt uerba, διωσκορὸν δὲ ἀναγράφει
 ἱστορίας ἐπιθυμίας φακῶν, διὰ τοῦ ἐν ἑπὶ τὴν ἀντίον, γύραται αὐτὸν βιβλίῳ, καὶ πᾶν τὰ πέντε ἱστορικά περιέχοντα.
 Vtrū autē a Plinio lectus sit, aut post Plinium uixerit, uel uter ab altero mutuatus sit sua, Le-
 oniceni & Pandulphicę disſeptioni cōmitimus, quorū litem dirimere nunc non est cōſilij,
 & epistolari breuitas non ſufficit. Quanq; Plinium Dioscorid. libros non uidisse, uel inde conij-
 ci poteſt: quod multa de plātis, arboribus, lapidibus, metallisq; diſputat Plinius, quorum Dio-
 scorid. ne meminit quidem. Multa ſubinde apud Dioſco. de uenenis, & id genus alijs extāt, quę
 Plinius uel diſſimulauit, uel certe nūq; uidit. Poſtremo ſic ab utriusq; tractata ſunt quædam, ut
 in utroq; alterutriuſq; dicta deſyderentur. Interdum Pliniū Dioscorides multitudine rerum exu-
 perat: ſpeſſissime Dioscoridē Plinius. Breuitē, quod in Cathalago aurorum, nuſq; illius memi-
 nit Plinius, quod tamen facturus erat ſidiffimus alioqui raphodus, ſi ante ſe celebratus auctor fu-
 iſſet. Sed neq; Celfus ulla huius uiri memoriā facit, quod equidem obſeruauim. Hęc de au-
 tore ipſo, quem nihil tam cōmendat, q̃ ſuus ipſius candor, atq; rerum portentoſa quædam ex-
 perientia, immō mundus ipſe quidam rerum omnium cognitu digniſſimarum. De ordine tan-
 tummodo, quo aggregiſi ſingula ſumus, præxiuim opere q̃ obiter ſaltem ut quædam præmonē
 amos. Quando igitur quatuor hodie circumferuntur tralaſiones, ſcilicet, uetus, Hermolai Bar-
 bari, Ruelliana, & nouiſſima M. Vergilij Florentini, nos eam ſelegimus, quę nobis purior, ſua
 uior, atq; familiarior uidebatur. Ea eſt Ruellij, ſi non fallimur, idcō ea fecimus modēſtia, ut inter
 niſi ullam calumniemur aliarum, nec aliorum iudicijſ, quam ipſi magis præferant, quicq; præ-
 ſcribamus. Et quod ſciamus, plarq; tanti negocij eſſe, ut interdum omnia opus habeat, quę

non infelicitate saltem, uelut in hoc autore uersari. Quamobrem et cōmentarios subiecimus duos, eodem nimirum defectu atq; consilio. Vnum Hermolai Barbari, qui Corollaria inscribit: de quibus illud affirmare habemus, nihil eruditius, nihil uberius, nihilq; magis uarium, post unum Plinium, latinæ linguæ editum esse a quoq; mille retro quingentis annis, qui non solum gloriæ suæ, uerum literis etiam, & literatis omnibus tam satis fecerit. Dignus plane qui assidue in manibus teratur ab omnibus studiosis, nedum ab medicis, in quibus sic ut *τὴν μὲν ἰατρικὴν* cernes contractum Theophrastum, Plinium, Paulum, Aetium, Orobasium: ex grāmaticis uero, quæ rerum uocabula descripserunt, Athenæum, Pollucem, Gellium, Suidam, Victruuium: ex Geographis Strabonem & Solinum, ut nihil sit abstrusum in singulis (quantum ad rem græm medicam attinet) quod idem non aperuissime legas in Corollariis. Quæ ob hoc fortasse sic inscripta sit, ut simplicium quidam quasi Colophon existerent. In quibus id solum dolemus, quod in castigatiora ad nos peruenerunt: deinde mutila, et uix in Quintum usq; librum porrecta: quæ si usq; ad Venenorum librum perfecta fuissent, dii boni, præter unum Plinium fortasse, quem situm dicit imitari, quem haberet tamen meliorem thesaurum, seculorum omnium medicos cœtus & Alterum Marcelli Vergilij iunximus, uiri ex æquo docti, & lōge diligentissimi, nec ab eruditis etiam minus probati, qui in sicubi prolixius ea tractabat, quæ uel non admodum necessaria, uel non proxime ad rem facere uidebantur (sic em̄ interdū rhetoricatur & ludit homo, uel lyncæ ipso in dijudicandis rebus perspicaci) data opera decurtauimus: ne & in inensum cresceret uolumen, & rhetoricis magis præstigijs, q̄ utilibus & necessarijs cōmentarijs obturbaremus lectorem. Monuerunt id nos initio ipso operis aliquot studiosi, cum alioqui & ipsum quoq; integrum adscripturi Vergilium fuissēmus. Postremo, ne nostra quoq; opera abesset, sic in utrisq; cōmentarijs sudauimus, ut multo em̄diores, luculentioresq; nunc habeas, q̄ ex ueteri editione erāt. Vterq; siue punctis erat, uterq; siue artificio grāmatico, & ibi desierant periodi, ubi spiritus defecisset lectoris. Ex bonis græcis, mala latine facta tā multa, ut non plures neuos habuerit Thersites. Ex latinis igitur, quæ perperam scripta erant, in ordinem cōegimus, ex græcis quæ manifeste deprauata erant restituiimus. Sicubi hiatus erat, uel scrupulus, quem uel instaurare, uel excutere non ualebamus, * asterisco signauimus, ut et alijs esset ansa diuinandi: eo tamē consilio, ut omnia latinis literis permitteremus, partim ut consuleremus græcæ linguæ ignaris, partim q̄ in priuato Lexico retractamus ad uerbum omnia, no uo opere Pandectarum, longe meliori opera, q̄ si facta tecta, quod dicitur, nunc restaurassemus. Præterea ubi illi ad uerbum ex Theophrasto, Plinioq; & alijs mutauerunt quædam, uel transcripserunt (ut in toto fere opere) notas & capita signauimus. Indicem dictaui, & eum quidem locupletis. I O A N N E S S C H O T T V S ἀρχιμαθητρὰ operis, ut em̄ictæ naris, ita uigilantis. Quæ omnia quanto labore nobis constituerint, quantūq; alias editiones euicerimus, nulli certius æstimabunt, q̄ qui similem aliquando telam nobiscum texuerunt, aut nostram hanc cum Italiæ editionibus contulerint. Planeq; falsum esse cōnuincemus, nullos libros emaculatiores prodire, q̄ qui ex Italia emerferint. Id totum igitur (mi Capito) in tuum effundimus sinū, ubiq; nuncupamus: Tui erit uicissim uetusissimum, & eundem lōge utilissimum autorem nobiscum a barbarorum tyrannide uindicare: ut sicut iam pridem meliores literæ florere cœperunt, ita quoq; uetus & simplex Medicina caput tandē exeret ac regnet. Argent. Anno ab orbere dempto. 1529.

I O. R V E L L I V S S V E S S I O N E N.

Antonio Difomo, Regio Consiliario, utriusq; Linguae
peritissimo, S. D.



V M, S A E P E mecum reputarem, humanissime simul ac eruditissime Antonio Difome, omnium ferme disciplinarum conditionē, illud in primis cum admiratione mihi, tum miseratione dignum occurrat, q̄ saluberrimæ humano generi artes, uel diuinitus nobis datæ, uel mortalium studio adinuentæ, ita affectæ iaceant, ut ad interitum spectare uideantur: quibus olim excolendis, ueteres usq; eo diligentia omnem, & operam impenderunt, ut intentatū nihil, indiscussumq; reliquerint. Etenim per aliquot iam secula, & qui discunt, & qui docent, neglecta uera liberalium scientiarū maiestate, ad echinatas captationū, cauillationumq; argutias diuercentes, disci docti, haberiq; q̄ esse malunt. Quod ut in cæteris ferri, dissimulariq; fas sit, in ea tamen arte nefarium est, quæ ad tuendam salutem hominum, nata, incorrupta semper, augustaq; esse debet. Quæ tamen fere iam inde ab auorū nostrorum memoria, tam turpi ac desidioſo consensu deserta exoleuit, ut uerear, ne flagitiosa fortasse suis professoribus, aut in honesta uideatur, qui principem eius partem, quæ cognitione delectatq; medicamentorū constat, uel rei difficultate deteriti, uel ingenio diffisi, uel iudicio lapsi, a se abdicarunt, rudiq; medicamentariorū ministerio delegarūt: existimantes fortasse dignitati amplitudiniq; suæ non parum detractum iri, suamq; auctoritatē eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinæ sibi iam cognitionem uendicarunt. Cum cæteri artifices ignominiosum sibi esse putent, si imprudentes sui negocij conspiciantur, aut uniuersam instrumentorū suppellectilem nō plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa præstantissima, sine qua natura manca merito ac inutilis esse censetur, præcis temporibus dara & percelebris, literarumq; monumentis diligentissime tradita, posterioribus seculis, adeo a se ipsa degenerauit, ut simulacrum eius tantū, uel potius umbra nomenq; remanserit. Quippe cum olim Hæbarij idem atq; Medici essent, scidit inde se studium; hominumq; inertia simul & incuria factum est, ut ab ijs destituta quorū erat propria, circulatorum, ne dicam impostorū, præda facta fuerit. Cum igitur pluribus scriptorum monumentis admonerer, apud antiquos gloriæ fuisse Simplicium curam, ac memorabiles illos Græcorum duces, hoc illustri studio semper floruisse: huic p̄tati ruinosæ, nutanti, breuiq; casuræ, adhibendam esse manu duxi. Nec aliud occorrebat præsentium auxilium, ut a medijs ignorantie tenebris assereretur, ac errores expiari, innumeraq; monstra domari possent, q̄ ut ea quæ græcis literis hac de re tradita erant, latinis illustrarentur, ac quæ sine graui perniciē disciocari nō poterant, a cæteris medicinæ partibus auulsa, suo corpori resituerentur. Pedacium igitur Dioscoridem, præstantissimū huiusce partis auctorem, tot seculorū suffragijs comprobatum, pro mediocritate nostra, latinitate donauimus, r̄oq; nomini dicamus. Quod te acerrimi iudicij uirum, omnium bonarū literarum, ac utriusq; linguæ studiosissimum cognouimus; nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Simul ut extaret pignus mutue inter nos beneuolentiæ: simul ut mortales officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non paruo sane negotio a nobis elucubratū, ueluti primitias industriæ nostræ & maioris laboris præludium, læta fronte suspicias. De quo id cōstantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturę promptuarium, ex quo res omnes, hærbę, fruges, fructices, arbores, fructus, quibus arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosaq; uestiantur, & uisceribus terræ abdita, in humani generis præsidij deproxi facile possunt, ac deniq; ueluti a quodam rei medicamentariæ seminario, in humanū usum transferri, e quo uita omnis ea haurire queat, quibus humanæ salutis prospiciatur, & morbis omnibus consulatur. Quæ uero meæ partes fuerunt, quoniam am in propria harena, ut dicitur, uersari uidebār, cum sim professione medicus, dedi operam, utinā & præstiterim, uti omnia ex fide responderent, & ut latina oratio, græci auctoris sensum fideliter redderet; ne absurda peregrinitas, medicinam quoquomodo pollueret, etiā res ipsa elegantiam ac nitore non facile admittat. Curauī præterea, ut idem utrobique sensus seruaretur, nulla uocum nouitas, nec trivialia uerba, aut exposita: quibus quærendis, latinos fere omnes euoluimus. Cum uero latina me defecerunt, græcis quidem, & fere iam receptis uti malui, q̄ noua, aut barbara licenter admittere. Sed nihil eque me torſit, q̄ ueterum manuq; exaratorum exemplarium inopia (illud enī tantū nactus sum, quod bibliopolæ typis excusum circumferunt) in quo permulta manifestissime deprauata, ex uaria auctorum lectione, & præsertim in libris Venenorum, ex uetustissimo Pauli Aeginetæ codice, ad pristinam sinceritatem restitui-mus. In quibus studiosos omnes rogatos uelim, ut boni consulant. Vale Parisijs. Calendis Maij. Anno Domini. M. D. XVI.

BEI, in Libroseius, de Medicinali materia,
ad ARIVM Prefatio. IO. RVEL
LIO Sueffionensi interprete.



VANQVAM amicissime Ari, complures non
ueterum modo, sed recentiorum quoq; de medica
mentorū compositione, uiribus, atq; probatione
cōmentati sunt, nobis tamen nec uanum, nec a ra
tione abhorrentem impetum animi ad hoc opus in
cessisse, tibi ostendere tentabimus. Cum eorū nōnulli absolutum nihil
adiderant: alij q̄ plurima quæ auditu percunctando didicere, scriptis tra
diderant. Siquidē Bithynus Iolas, et Heraclides Tarentinus, omīssa pror
sus Hærbarū tractatione, rem sane q̄ paucis perstrinxerūt. Neq; uero o
mnes illi de metallicis quicq; rebus, aut odoramentis memoriæ prodide
runt. Crateuas aut Hærbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligen
tius hac in parte uersati uidētur, radices multas apprime utileis, hærbasq;
haudquaq; adnotatas reliquerūt. Nec sic quoq; prisci laude sua fraudan
di sunt, quos & si pauca ipsi referantur accēpta, magnam tamen impen
disse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum, e quibus Lu
lius Bassus, & Niceratus, & Petronius niger, & Diodorus, Asdepiadæ
omnes, medicinalem materiam uernaculam cognitamq; uulgo, dignam
censuerunt, quæ ab eis literis exacte mandaretur, ut medicamentorum
uīres, probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum esse
ctus colligentes, inani uero reddendarum caussarum studio uerba fun
dentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemq; extule
rūt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Euphorbiū nascent
is in Italia, Chamelææ succum esse contendit: Androsamonq; eandem
hærbam cum Hyperico esse: quinetiam Alōen in Iudæa fossilem nasci,
& pleraq; his similia citra effectuum explicationem exponit, quæ pror
sus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non occula
tā fide, sed narratione potius ab alijs accēpisse. In ordine iīdem ipsi aber
rarunt, partim eorum discrepanteis, nullaq; cognatione coniūctas uīreis
collidentes: alij per elementa literarum scripta in ordinem digerentes,
quo facilius memoriæ mandarentur, genera, & eorū effectus, a sua co
gnatione disiungentes. Nos uero ab ineunte (ut ita dicam) iuuentute, iu
gi desyderio cognoscendæ materiæ allecū, permultos Mundi tractus per
agraumus (neq; enim nescis, nos militem uītam exegisse) tuoq; horta
tu cōmentationē in sex Libros contulimus: quod opus tibi dicamus Ari,
grato nostro animo obsequētes, ob eum quo nos prosequeris affectum.
Etenim natura cum in omneis eruditione excultos, tum uero in eos, quis

cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse
soles, in nos etiam aliquanto peculiarius. Enimuero non paruum præ-
bet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis er-
gate charitas, quam una degentes nouimus, cum mutuam inter uos be-
neuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te
uelim, eosque qui in Commentarios nostros incident, ut ne in uerbis fa-
cultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritiam
curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus,
partim narratione omnibus consona, indagationeque rerum apud sin-
gulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut
differenti ab alijs ordine utentes, genera Medicinarum, uiresque descri-
bamus. Quod autem necessaria sit Medicamentorum ratio, nemo est fer-
me qui ignoret: quæ ea & toti arti coniuncta sit, & ab ea expugnandis mem-
bratim uitijs remedia petantur. Quare per medicamentorum compositi-
ones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incremen-
tum capessere potest, quamplurimum opitulante singulorum medicami-
num cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam com-
plectemur, ut perfecta sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis
curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, &
recondantur. Intempestiue enim decerpta, conditaue, aut nullo, aut eua-
nido munere funguntur. Serena etenim cæli constitutione demetenda
sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squallores, uel im-
bres infesti sint: quemadmodum si loca in quibus prodeunt cliuosa, &
uentis exposita sint, & perflata, frigidaque, & aquis carentia. in his enim
locis uires eorum longe ualidiores intelliguntur. Contra, quæ in cam-
pestribus, riguis & opacis, cæterisque locis a uento silentibus enascuntur,
plærumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non su-
is horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint.
Neque ignorandum, quod sepe præcoci, aut serotina loci natura, aut anni cle-
mentia, maturius, aut celerius adulescunt. Nonnulla propria ui hyeme
florent & folia pariunt, quædam bis anno florifera. Quare cui in animo
est, horum peritiam assequi, necesse est ijs prima germinatione solo e-
mergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti hæ-
ræ dumtaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui ad-
ultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mu-
tatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum, seminumque magnitu-
dinem, nonnulli qui olim has ætatum uarietates non perspexerunt, ma-
gno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus im-
posuit, qui hærbas quasdam, uerbi gratia Gramen, Quinquæfolium, et Tussil-
aginem, emittere florem, fructum & caulē negant. Ergo qui sæpius ad ui-
scendas hærbas & earum loca se contulerit, earum cognitionē maxime conse-

quetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hærbaceis medicaminibus
 Veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis: reli-
 qua a trimatu inutilia. Quæ uero ramis scatent, sicut Stichas, Trixago,
 Polium, Abrotonum, Seriphum, Absinthium, Hyssopum, & alia id ge-
 nus semine pregnantia, demetantur, Flores quoque antea quam sponte
 sua decidant, Fructus autem ut maturi excutiantur necesse est, & semina
 ubi siccari cœperint, priusquam defluant. Herbarum succus, et foliorum
 elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac & lachrymæ excipian-
 tur, inciso per adulescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut
 recondantur eximere conuenit, cum hærbæ suis folijs exuuntur. Siccan-
 tur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ
 luto, aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia quæ iu-
 cundum odorem efflât, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponantur.
 Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, apte inuoluun-
 tur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitreæ, aut cor-
 nea conuenit. Ficilis, etiam si modo rara non sit, accommodat: & li-
 gnea, præsertim e buxo: sed ænea uas liquidis
 oculorum medicamentis, quæ aceto, pice
 liquida, aut cedria componuntur.
 Adipem autem & medul-
 las stagnæis uasis
 recondi con-
 uenit.

T H O, D. Aucuparius, can-
 dido lectori.

Dum uirtus animi, dum mens diuina Deorum
 Ad sacra uel solum scandere templâ sinunt,
 Dotibus his, altâ conscendit Apollinis arcem,
 Sancta Dioscorides atria dignus adit.
 Magnaq; pro meritis aperire sacraria Phœbi
 Dum datur, has medicas arte ministrat opes.
 Ille Dioscorides pater antiquissimus, autor,
 Pœoniæ largas protulit artis opes,
 Rerum uirtutes, rerum cognoscere causas,
 Rerum naturas, historiamq; docet,
 Antidotū morbis, ceruissima pharmaca præstat,
 Et quæ præsentî cætera multa Libro.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. PRIMUS.

IO. RVELLIO interprete.

¶ DE IRI. CAP. I



R I S, ab aliquibus Illyrica, ab alijs Thelpide, ab alijs Vrania, a nonnullis Cathæron, aut Thaumastos, a Romanis Marica radix, a quibusdam Gladiola, ab alijs Cōsecratrix, ab Aegyptijs Nar appellat. A cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert Gladiolę, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores summo caule, alterno situ incurui euarant. Siquidē candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cerulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quędam cœlestis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent geniculatę, durę, odoratę: quę frustatim dissectę, in umbra siccantur, & traictę lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica, & inter has laudatissima quę pumili fere & densa constar radice, frangenti contumax, subrussa colore, gustu amaro, odore perçp̃ suauī ac sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quę dum tunditur, sternutamēta mouet. Secundum locum habet Aphricana, candicans, gustuq; amara. Teredines in uetustate sentiunt. tunc tñ odoratiores reddi solent. Vis omnib. ex calfactoria, extenuans. Contra tussim efficac, humorum qui ægre rejiciuntur crassissimi digerunt. Bilem, crassamq; pituitam, ex hydromelite drachmis septem epotę, purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Eadem potę ex aceto, auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, cōuulsis, a uento refrigeratis aut rigentibus, & quibus genitura effluit. Menses, ex uino potę pellunt. Decoctum earum, fęminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis uenarū spiracula. Ischiadicis infunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditę, partus extrahunt. Quinetiam coctę & illitę, strumas, uetereq; duricias emolliunt. Siccę quoq; ulcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiunt. Dolorib. capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotę cum albo veratro, et duabus mellis partibus, lentigines, & uitia cutis in facie emaculant. Pefsis, Malagmatis, & Acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

HERMOLAI BARBARI

Patrij Veneti, & Aquileiē. Patriarchę

Corollarij Liber Primus,

¶ I R I S Illyrica.



R I S aestate floret. Folio arundinaceo. Caulem habet cubitalem, atq; rectum, similem Asphodelo, sed minore, durioremq;. Sunt qui Hierida appel-

A

ἰρίσ ἰλλυρικὴ
καθάρων
θηκυμαστός

B

D I O S C O R I D I S

C lentunde Consecratrix quocq; dicta fit in latino. E rebus in unguenta uenientibus, nihil in Europa nasci, præter Iridem, autor est Theophrastus. In Illyrio cõmendatissima est parte mediteranea; maximeq; septentrionib; expõsitã, & ut inquit Nicander, & Plinius, in flusibus Drilonis ac Narone. Laudatur Iris radice tantũ, Macedonica candicat. Illyrica duorum generum est. Raphanitis, a similitudine; quẽ & melior. Rizotomos, subrussa. Non improbarur & Pissidica Selgensium. Fossuri, tribus ante mensibus multa aqua circumfusa, hoc ueluti placamen - to terrẽ blandiuntur. Circumscripãt mucrone, gladio uel triplici cõlegerint, protinus in cœlum attollunt: præcipiturq; ante omnia, ut casti petant. Nullos cultus exigit, nisi q; ablaqueatam rescicare solent. Tractatu, pustulas ambu sũ modo facit. Terebinib; non sicca modo, sed in terra quocq; celerrime infestatur. Ostendit nobis Iridem in horto suo felix Sophia Paduẽ. Re presentabat eius flos pruna perq; matura odore, ob quod mire appetitur a formicis. Radicem quocq; uidit russã extra, intus per candidã. Genus unum eius Troglodyticum appellant: quam qui manducauerit, uinum q̃uis copioso eo hausto, non obolet: ut Aphricanus scriptũ reliquit. In Paulo, non troglodytin, sed Astragalitin legas, in passilli compositione Pantolmij uocati. Philinus flores Iridis Lycos uocari tradit: quia labium lupi speciem reddant. Apollonius, Herophili discipulus, Irin ex Elide ac Cilicia pbabat. Est & orbiculor, pastillulose, Iris appellatus, in medicina: s; ex croco, alumine, myrrhaq; conficitur.

M A R C E L L I V E R G I L I I

in Dioscoridem A N N O T A T I O

N E S abbreviata.



P R I M V M in Iride illud animaduertisse oportet, non esse legitimam eius appellatiõnem quod in grecis passim legitur, si *ἰρις ἰδαρυκή*. bonitatis enim laus a regione hæc est. Quæ tanta, et apud omnes tam cõmunis illi fuit, ut perita a medico, millicone, aut angustario in aliquem usum Iride, non nisi ex ea regione probaretur, & pereretur. Nec sine causa. Frigida em, & æquilonia regio est, quo cœli statu & afflatu, materia omnis, in omnes usus meliorescit. Inducant id Theophrastus, Celsus, Colimella, Plinius, omnesque alij.

Illyrida. Non probamus quod Ruellius reddidit, ab aliquibus Illyrica, nec quem Barbarus in Corolla - rio suo titulum illi adseri, sit, Iris Illyrica. Videtur enim alter, bonitatis laudem a regione illi concessam, in - ter appellationes simpliciter numerasse. Alter uero negasse, alibi q̃ in Illyrico Iridem nasci, aut de Illyrica tã - tum hoc capite agiti: tãrẽ Iris ubiq; fere nascitur, & hic de omnibus agat, & in eam censu banc unam cunctis præferat. Meminisse etiam debuerat Ruellius, nihil pro se adiecit, qualiacunq; ea sint, significare, substantia q̃ tantũ inhereret in Iride autem iudicandã substantiam, quæ patronymico illo nomine, ex quo - consensu oim, inter appellationes, laus illa bonitatis referenda erat, nimis obscure & importune indicabãt.

D Erunt forte qui putabunt sic dici Illyricam, ut Veticã, aut Gencianam, aut Lyimaciam: quartũ pri - ma illa a ueronibus in Hispania, due illæ a regibus inuentæ, solo possessio nomine appellatur et celebrant. Thalspide. Thalspidẽ eandẽm dici etiam, nulla nobis eius uocis significatione, nisi forte una tau - tum mutata litera, Thalspide legendum sit, manifesta congruenteq; a uerbo *θάλπω*, quod grecis calefa - cere, & fovere significat, deriuatione, quod primum præcipuumq; habet Iris.

Quod si suspicionibus etiam contra hæc uicia pugnandum sit, non fuerit abs re forsã monuisse, quod Thelpidẽm legitur, Hieridẽm, siue Hieridã legi posse.

Vrania, id est, celestis, ideo dicta ab aliquibus fuit, q̃ celestis arcus specie modo floreat.

Thaumacris, id est, admirabilis, eadẽm illa ratione, quã a Poetis idẽm ille celestis arcus Thaumacris - as dicitur, genus, originemq; banc illi ex admiratione nonne rei, rudi adhuc sæculo, ut primus Plato indicauit, assignantibus antiquis.

Carbaron, id est, purgans, notissimũ participio, *καὶ τοῦ καθάρειν*.

Gladiolus, quia specimen Gladiolæ herbæ præferet, de qua in fra. lib. 4.

Consecratrix. Credimus quidẽm ideo Consecratricẽ dictã, q̃ in sacrificijs, purificationibusq; suis an - tiquitas quondã Iride usa sit: nĩl tamen bastenus compertum de ea re nobis est.

Radix Marica. Quoniã autore Nicandro, probatissima nascitur in ripis Naronis, in Illyrico flumĩ, non Maricam, sed Naronicã legitimũ esse suspitio est. Nicandri uersiculor est *ἰρις ἐν τῷ ποταμῷ ὀνόματι νάρκας*. Relinquimus tamen hoc legendibus arbitrium, satisq; sit, suspensionem banc nostrã alijs indicasse.

Flos in summis caulis. &c. Sic uertimus. cũ in grecis, nec summi, nec singuli caules, flores uel uili sint. Factumq; id a nobis est, non tam, q̃ paulo ante diximus, ut certius totã res pateret, q̃ in antiquis grecis aliquot, non *ἄνθρακι τῶν καυλῶν*, simpliciter legitur, uerum *ἄνθρακι τῶν καυλῶν*, quæ uox singulis caulis singulos distribuit flores.

Quod erat item *παράλλαξ*, ex propria græcæ uocis significatione, rectã, partibusq; in se spacijs in - altum

Lib. 21. cap. 7.

Iris, Ilyrica, due genera.

Theoph. Lib. 9.

capit. 7.

altum surgentes, diximus. Hoc enim, si Euclidi, & græcorum grammaticis credimus, lineis quas Parallelas dicunt, præcipue comperit. Nec alio pertinet ea vox. q̄ ut significetur, nō temere, neq; in latera, aliarum planarum modo, caules Iridis spargi, sed in altum nullo inter se concursu ferri, & flores in bis ita disponi, ne alter alterum impellat, simulque concurrat. Quod totum, ut nobis uidetur, parum sollicitè reddidit Ruellius, dicens alterno situ flores in Iride variari.

Diximus præterea, in arcum flexos, nullo illic arcus uestigio, quoniam floris ea flexura sit, & græca vox Ἰρικαμπή, quæ id exprimit, in arcu frequens reperitur.

Subiecit deinde, & in arcu illo variantes tam multos colores, præsentis temporis participio nsti: quoniam quemadmodum in celesti arcu, colores illi plures ex mathematicorum & speculata docentium ratione, non sunt, sed ex opposita lucis accessu, idem apparent, q̄ refractis lineis uidentur, non dissimili modo & Iris cum luce colores mutet: idem Diofcoridem intellexisse omnes uolunt, cum dixit, ὁραται, id est, uidentur: quia non sunt in arcu illo tam multi colores, sed ratione accedentis lucis uariant & uideantur.

DE ACORO. CAP. II

ACORVM Aliqui Choron Aphrodisias, Romani Veneream, aut radicem nauticam, Galli Piper aqueum uocant. Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis inter ceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, non exesum, odoratum, cuiusmodi colchidicum, & galaticum, quod Aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit. Prodest lateris doloribus, & iocinoris, atq; pectoris. Item torminibus, uulsi, ruptis. Lienem absumit. Urinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur. Ad muliebres infusus Iridis modo utiliter impositur. Oculorum caligines succo discutit. Antidoti radix magno usu commiscetur.

Ἰκαρον
χορον ἀφροδισίας

ἀσπλητον

BARBARI COROLL. Acorus, & Acorum, folijs Iridis, sed pediculo longiore. Radices ei Diofcorides subalbidas, Plinius nigras, minufq; uenofas reddidit. Ipse rubentem intus uidi, foris colore inter nigrum atq; candidum. Raram inuentu, falso tradit Apuleius. Nec nisi cum florem emiserit cognoscibilem. Locis cultis, & hortis, prætisq; nascentem. Legendam Augusto mense. Aphrodisiam, & Sandicem nauticam, & Syngentianam, alio codice Radicem nauticam, & Vnguentianam, & Piperapium uocatam. Ut deprauatum in Diofcoride quis putet, Piperaciū, pro Piperapium. Quandoquidem apes, suspensa in uasis earum herba, nunq; diffugere, idem autor proditum reliquit. Arbitrantur & ea parte mendam esse, qua in Diofcoride, Aspletion appellari legitur. Asplenon uerius existimant, q̄ radix Acori lienem comminuat. Optime Ponticæ, post Galaticæ, mox Creticæ, candidiores Ponticis. Sed primæ in Colchide, iuxta Phasin amnem, & ubicunq; in aquosis. Recentibus uirus maius q̄ uetustis. Siccantur utribus in umbra, digitalibus frustis. Sunt qui radicem Rusci Acoron uocent, proinde ut hanc nonnulli Acorū siluestrem appellare malint. Acoro flores aureos, croceosue attribuunt. Semen spissum, atq; gliscens, non sine odoris gratia. Haberi ferunt in Chio, Hellespontoq; & Euxino mari. Radicem Acori subrubentem, uenis intrinsecus neruosis, prætenuiibus, & candidis, eaq; indigenas Iridis loco uti.

B
Lib. 15. cap. 19.

uocet radicem con-
gna

EX M. VERG. COM.

ACoron, genere neutro. Sunt qui, q̄ herba sit, feminino Acorum dicunt. Aphrodisiadem. Fortasse, quia in modice uenerem excitat.

Piperapium, Solus Apuleius, quicumq; ille fuit, Piperapium dictam fuisse testatus est, quod ea in alueribus suspensa, nunq; falso examine, apes in colonias fugerent: nec tamen causam reddidit, nec inuenta batens a me est.

Idem præterea, Sandicem nauticam, & Syngentianam ait uocari, incerta nobis pariter nomina huiusmodi origine & causa. Quæ ego hoc loco non posuissim, nisi ante nos, in Corollario suo, bas uoces Barbarus inseruisset, pluriq; q̄ æquum erat fecisse eas uidere, & nisi in antiquo latino Diofcoride, in extrema

Capiteis coronide, omnia illa ab Apuleio dicta, tanq̃ legitima proles scriptori huic adiecta fuissent.

Obiter quoq̃ monendum cenſeo, quod in Apuleio legitur, Sandicem nauticam dici Acorum, uideri nobis ex Dioscoride acceptum, & si id sit, corrupte Sandicē, pro radice legi, tanque facili in una litera lapsus, radice in sandicem est, ut id potius iudicio meo, sic legendum in Apuleio fuerit, quam importuna hoc loco uocis usus inferendus.

Subinde, quoniam Iridi similis, et cognata Acorus sit, eadem illa appellatione potuisse quondam uocari. Et ut in Iride radix Marica, Naronica, donec certius aliquid inueniretur emendata nobis est, sic etiam in Acoro, pro radice nautica, Naronicam legi eodem modo posse. Nec est quod miretur aliquis, latinarum uocē tam graves mendas, cum græcarum in latinis, non dissimiles passim uidere liceat.

Primam habet bonitatis existimationem quæ densa, etc. Priuatim illud opinamur, non densam, sed amarā legi quondam potuisse. Monueruntq̃ nos, probatiores in Græcis codices, in quibus una tantum mutata litera, non πικρὸν, quod densum, sed πικρὸν, quod amarum significat, legitur. Quod & Galenus aperte innuit dicens, saporem Acoro acrem, cum amaritudine aliqua esse. Non tamen cōmūnem lectionem damnamus.

DE M E O CAP. III.
ME O N, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimū gignitur, Anetho folijs & caule simile, sed eo crassius.

πικρὸν
ἀνέθου φύλλον

us. Binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguā excalfacientibus. Quæ seruē factæ ex aqua, uel tritæ citra coctionem, præcluserum renum uesciæq̃ fartæ uitia potu leniunt. Vrinæ difficultati medentur. Stomachi inflationes discutiūt. Torminibus, cōmotæ uulua, articulorum doloribus, atq̃ fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in elegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus seruē factæ. Infantibus autem illitæ imo, uentri, urinas mouent, q̃ si plus q̃ deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

ἀνέθου φύλλον
μαρτίου

DME V, græci μέν, producta priore syllaba, non diphthongo, sed uocali longa, ex Galeno. Gēnera eius duo. Nobilius Athamanticum, ita dictum, q̃ ab Athamante inuentum sit. Siue q̃ laudatissimum in Athamante reperiatur. In Italia non nisi a medicis feri solitum. Folijs Anisi, caule interim bipedali. Radicibus multis, & obnigris. Alterū rufius. Est & Geum inter herbas longe distans a Meu, radículas, ut inquit Plinius, tenues, & nigras habens, & beneolentes, pectoris & lateris doloribus quærenda. Cruditatibus quoq̃ discutiendis. Iocundo sapore. Sunt tamē Pliniani codices, in quibus Gethin hæc, nō Geum scribatur. q̃ recte nescio.

Plinius lib. 20.
capite. 22.
Meu, duo genera

EX M. VERG. COMM.

ME O N. Plinius Meu id, non Meon appellat, qua uoce posteriores etiam aliquot usi sunt.

Caule, folijsq̃ Aniso similibus. Variant in figura, & historia eius antiqui Græcorum codices. In aliis quibus enim legitur Aniso, in aliquibus, Anetho folijs similibus esse. Plinius Aniso similia dixit. Nosq̃ in ambiguo, ueluti alterius testis acceſsione, quæ pluribus testimonijs confirmabatur, Anisi lectionem magis probauimus.

Quod Athamanticum uocant. Cur Athamanticum diceretur, Plinius eodem loco exposuit. Nisi forte Athamanticum, subtratio t litera, legendum, docuerit Dioscorides, & in Athamania nasci, cuius regionis gentis autore Byzantio Stephano, aliqui Theſſalia, aliqui Illyrico adſignant. Nec refert, in Macedonia nasci Meon dixisse Dioscoridem: qm̃ non longe distant inter se, Macedonia, et Theſſalia. Suspicio tamen hæc magis, q̃ decretum sit.

DE C Y P I R O.

CYpirus, quem aliqui Erysiceptrum, ut Aspalathum appellant, Romani Iunci radicē, aut Iuncū. Folia fert Porraceis proxima, sed longiora, & exiliora. Caulem odorati Iunci, cubitalem aut maiorem, argulosum. In cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices, quarum

νῆπιον
ἰπυρίων
ἐν ἀνέθου

ces, quarum in medicina est usus, contiguus inter se oleis oblongis rotundisue similes, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis et palustribus nascitur. Optima est grauissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ a Cicladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat. Urinam ciet. Ad calculos, aquamque subtercutem utilissime bibitur. Aduersus scorpionum ictus remedium est. Perfrictionibus uulnæ, & præclusionibus, sotu prodest. Pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascant uorentque, farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, et unguentorum spissamentis adijci solet. Aliud Cypri genus tradit in India nasci Gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit, & illitum præsentem Psilori uim exhibet.

B A R B A R I C O R O L L.

Cypirus Gladioli nomine apud nostros, aliud est quam Cyperus is, quem latini radicem Iunci, ut Dioscorides hoc loco, Columellaque testatur, uel Iuncum quadratum, ut Cornelius. Cypirus pro Gladiolo, ut Theodorus Gaza uertit, a Theophrasto peculiarem habere quandam æqualitatem in caule describitur. Radice tamen inæquali, partim crassa, carnosaque, partim gracili atque furculosa. Hanc & in altum agi. Ideoque contumacem emori atque uelli. Nasci & latere huius radiculam, unde cauliculus erumpat alius. Sunt qui non distinguant, uiciniate nominis fallente, sed discrimine multo separatur. Cyperus, siue Cypirus is, qui latine Gladiolus, & Xiphion a Dioscoride suo loco dicitur, radice bulbosa, Laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, postea Phœnice uisitur. Cretico candor odorque propinquus Nardo, Acrior hic Naxio, ex illis Phœnicio, nullus Aegypto. Nam & ibi puenit. Tradunt, non egredi barbaros domibus, nisi ab hoc suffitu. uegetiores enim, firmioresque sic fieri. Dulcis huic radix, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ut inquit Theophrastus, unde sumpsit Plinius. Ponderosior utique simul subacta. Hoc ipso nomine palustris alter Cypirus, siue Gladiolus ostenditur, quem Iulio mense ad radicem secari præcipiunt. Tertioque die in sole contineri, dum candidus fiat. Quotidie autem ante solem occidentem in rectum refert: quoniam nocturni rores palustribus officiant. Sit palustris hic qui floreat uere cum Viola nigra, sed utique post Anemonem, quæ Timonia uocatur, comitatus Hyacinthis, & Gladiolus appellatus, an, quod magis puto, Xiphion, Theophrastum secutus, querendum & æstimandum relinquo. Est enim uagum & commune multis nomen Gladiolus. Folium simile nomini. At Cyperus, de quo nunc agitur, Iunci trianguli, ut Plinius interpretatur, ut Celsus, quadrati species, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguisque proslit, cuius radicem cum oblonga est, Cyperidem appellat. Laus prima Hammoniaco. Secunda Rhodio. Tertia Thracio, si Plinium sequare. Nouissima Aegypto, qui & confundit intellectum. quoniam et Cypirus ibi nascitur, qui est Gladiolus. Sed & Cyperus pro Iuncodurissima uixque spirans in Aegypto. Cæteris odor ipsam Nardum imitatur. Nonnulli distinctionis gratia Cypiron pro Gladiolo, Cyperon pro Iuncodur triangulari, siue quadrato nominant. Non desunt qui Pseudocypirum uocent Gladiolum: de quo Plinius, semel quod meminim, dixit. Ocyssima omnium Cypirus, & Pseudocypirus frutex. Protinus enim, inquit, floret, semenque profert. Quadratus & angularis, ad differentiam rotundi Iunci, quem Schoenon greci uocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi, quæque diphthongo longam, quæque uocali breuem greci scribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperum a Paulo. Habetur & Cyperus Indica: quam Plinius, Cyperin appellat, etiam si quibusdam exemplaribus Cyperalegitur. Non possum non mirari, quamobrem Laurentius Valla, Cyperum in Herodoto, Siler, conuerterit.

E X M. V E R G. C O M M.

Cyperon. Non poterunt hoc loco facile secerni, Cyperus, Cypirus, & in seminio genere Cyperis, quæ tria, multa nominum similitudine, genere, & ut a toto pars inter se differunt. Cyperus siquidem, de quo nunc agimus, in Iuncorum genere anguloso caule, & odorata radice est. a Celso. lib. 1. cap. 21. quadratus Iuncus, a Plinio lib. 21. cap. 19. triangularis primo, mox angulosus dictus, graui, inter graues auctores, in angulis eius

Celsus Lib. 1.
cap. 21.
Theophrastus
lib. 9. cap. 7.

B

Plinius lib. 21.
cap. 19.

C discordia. Nisi Dioscorides, cum dicens, utriusq; bystoriā confirmasse, & omnem inter eos, veluti litē dī remisse uideatur.

Cyprius autem palustris herba est, Gladiolus quondam, a cultellati folij figurā, ut credimus dictus, multis locis laudatus, & in Aegypto, si Plinio credimus, nullius odoris.

Cyperida postremo, foeminino genere, radicem Cyperi ueteres dixerunt, non omnem, sed eā, quam hic oblongā oliuā similem, praecipui in medicina usus, laudauit. Quae una fuit causa, ut posteriores medici Cyperin, siue Cyperida tantum nouerint. Sic enim Paulus agineta multis locis appellat. Quam uero Plinius eo dem capite dixit, per se Indicam herbam esse, quae Cyperis uocetur, Zingiberis effigie, & commendatam. Craci nūm reddere, diuersae a Dioscoride traditur. Non enim Cyperida, sed Cyperum dicit appellari. quae in India nascatur Zingiberis effigie. Credimusq; nos, ab utroq; idem dici, uarietatemq; uocū, non aliud esse, q̃ quā a poriore parte, & quae sola usum habet, tota quondam etiam dicta fuerit planta. Quod a Romanis itēdem factum est, qui Iunci radicem Cyperum dixerunt, totam plantam, et uiliorem eius partem simul signantes, quae appellatione usus Columella aliquando est.

Sunt qui Erysiceperum uocent. Nulla a nobis deprehensa haecenus appellationis huius origo est, & causas: quando, ut ex utriusq; bystoria patet, nihil simile inter se habent, Cyperus & Aspalathus, & licet aliquas habeant in medicina pares uires, non tamen aucti collōmuntur sunt, id est, aequalia, nec quae bodie sic uocant, quid pro quo. Nisi fortasse multis quoq; plantis commune sit hoc nomen. s. Aspalatho, Cypero, Verbenaci, alijsq;. Ex quo enim per multas uagatur plantas, oportet in eo commune aliquid intelligere, quo se diuersis cōciliet rebus.

Ἐρυσίκεπερον

Ἐρυσίκεπερον

DE CARDAMOMO CAP. V.

Cardamomum optimū est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroc; deuehitur. India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, contractum, quod em huiusmodi non est, intempestiuum iudicatur, & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Ex calcfactoriam uim habet. Potumq; ex aqua, facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad rupta, uulsa, tormina.

D Latas uentris tinea excutit. Ex uino aut potum renibus, difficultati urinae, a scorpione ictus, neq; non omnibus uenenum uiibrantibus auxilio est. Cum cortice radici Lauri epota drachma, calculos comminuit. Partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

Ἰνδιανὴ
καρδάμωμον

Theophrastus
Lib. 9. cap. 7.

Cardamomum Comagene
& Arabia

Plinius lib. 12.
capite. 13.

Gale. 7. simplic.

Cardamomum, Theophrastus refert, alios e Media putare, alios ex India cum Amomo atq; Nardo, et plurimis id genus aduehi. Simile Amomo, frutice toto praedicat, semine oblongo. Quatuor eius genera, uiridissimum, & pingue, acutis angulis, fricant peruinax, quod & maxime laudatur. Proximum rufio candicans. Tertium minutius atq; nigrius. Peius, uariū & friari facile, odorifq; parui. Id quod uerius est, uicinius esse Costo debet. Preciū optimi, ait Plinius, in libras denarij. 2. Recentiores Mauritani, hoc non Cardamomum, sed Cordume nī, et syluestre Caros uocant. Cardamomi uero nomine genus aliud intelligūt, in geminas diuifum species. Alterum lentis amplitudine. Alterum cicris obnigrū, in quo granum albū sic, gustu mordaci. Vtrumq; odoratum. Quid, q̃ officinae Cardamomo utuntur alio, q̃ quod a Mauris, & a Dioscoride perscribitur, duplicis fastigij, minus & maius appellantes, cui simile id semen sit, quod uulgo Meligeta dicitur, praetatum uiribus?

A D D I T I O

Author Pandectarum, nescio quid hic lepidum somniat de Cardomomo & Cardumeni, indicans aliū quid esse corruptum in Dioscoridis textu, & apud Plinium. Mirum, quomodo hic tam lyncus fuit, in alijs tētus talpa. Quare posthac illius nemis imitari, nec eas reprobare, omittimus.

Ἰνδιανὴ
καρδάμωμον

DE NARDO CAP. VI.

Duo Nardi genera, unum Indicū, alterum Syriacū appellatur. Non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo oriatur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriacū gene

re præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perç odoratum, ac Cyperum redolens. breui spica, amaro sapore linguâ siccante, q̃ diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem Nardū quoddam Gangitis uocatur, a fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluent: quod genus ob multam loci in quo prodit uliginem, uiribus infirmius est, atque procerius adolescit, oppletas ferēs spicas, ab radice comatas, unaque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui, odore Cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus inadidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, cædidior caule, Hircorum uirum supra modū redolente: quod improbatur. Madefactum uendi solet. Quod uitium ex eo deprehenditur, q̃ cædida sit spica & squalida, nulloq̃ puluere obsita. Adulteratur* Stalbio cū aqua, aut Palmeo uino, in spissationis ponderisq̃ causā inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radici bus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluēdis manibus utilem. Vim habent ex calfactoriam & exiccantem, Vrinam mouēt. Aluum potu sistunt. Vuluæ profluuia, sanienq̃ apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur. & cardiacis, in flationi, iocineri, regio morbo, renum uitijis. Aquæ autem incoctæ fotu ad infessum, uuluæ inflammationibus medētur. Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad densiorem pilum reducunt. Perfusis humore corporibus insparguntur. Miſcentur antidotis. & in fictili non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

N B A R B A R I C O R O L L.
Nardum, siue Nardus, in Thracia exili odore nascitur, siue ut Theophrastus scripsit, radi culæ potius quædam imitantes odore Nardum, sed leuiter. Quamquam Plinius, inuentam in Thracia nuper herbam dicat, cuius folia nihil ab Indica Nardo specie dissentiant. Principatus in unguentis Nardo apud ueteres stetit. Frutex est graui & crassa radice, sed minuta nigraq̃ ac fragili, quamuis pingui, situm redolente, qualem Cupressi, aspero sapore, folio paruo, densoque. Cacumina in aristis se spargit, Ideo gemina dote Nardi spicas, & folia concelebrant. Alterum genus apud Gangem in totum reijcitur. Adulterat Pseudonardo herba, quæ ubiq̃ nascitur crassiore atque latiore folio, colore languido, in candidum uergente. Sic hæc fortasse quā Dioscorides Samphariticam appellat. Item sua radice permixta, ut Subio ponderis gratia, & Gummi, & Argenti spuma, & Cyperi cortice. Precium spicæ in libras denarij. 90. foliorum uero eius quod maiora hæc habet, Hadrospheron uocatur, denarij. 30. Eius autem quod minima & ob id Microspheron appellatur, laudatissimumq̃ est, denarij. 75. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui in uetera uerit, nigriori melior. Indica, Syriacæ præfertur a Galeno. Nigrior, & ualidior etiā nonnunquam Syriaca. Reliqua genera in mentione gallici Nardi, montanæ dicemus. Sed poscimus identidem, quæ sint illæ nouem species, quas Nardum Indicum representare Plinius existimet. An Gangetis prima, Ozenitis, ab odore uirulento dicta. Secunda, Pseudonardus. Tertia, Syriaca. Quarta, Gallica. Quinta, Cretica, id est Phu. Sexta, Baccharis. Septima, Hirculus. Octaua, Aslaron. Nona, Thracia. Quidā usum Nardi omnē abdicat, ob anapitē ex ea medicinā, propterea q̃ in Nardo quiddā ueneni delibutoriū uice nasci ferat, e quo Pison illud uocatū Indi cōficiant. Exitiale nō poru modo, sed in sudore corporibus appositū, etiā si ab leugulis purgari, & elui curiosissime, moris sit, fortasseq̃ hoc sit aut nō dissimile quod Phario a Dioscoride, ac Plinio, Phariacon ab Athenæo dicitur, gustu Nardi omnino, sed resolutionē faciens neruorū, cū alienatiōe mētis, atq̃ spasmo. Aduersari autē huic ueneno maxime Cydoni-

A
ἐπὶ τῷ χρίστῳ

καρχήσι

καμφαρτίνῃ

*Barbari, σίμημα

καρχήσι

ἐπὶ τῷ χρίστῳ

B
Pli. lib. 12. ed. 12.
Theophr. lib. 9
cap. 7.

Novem species
Nardi.

Nardus in nou
nenum.

Cam, Philarcus prodidit. Notatu dignū, a Dioscoride, ceterisq; ueteribus, Nardū Cyperi odore cōmēdari, a Plinio Cupressi. Malim gdem librarij fuisse culpā. Sed si Plinio tribuēdus error foret, affinitate uerbi lapsum esse dicere, Cyprusin, pro Cyperizin legentē. Neq; dici potest, cōtra deceptū esse Dioscoridem, non Plinium. Quando quidem Cyperum idem ipse Plinius odorē Nardi referre alio loco scribat. Aduertēdum est & illud, omnia Nardi gener a herbas esse, præter Indicū. In hīs probatio una, ne sint fragilia, & arida potius q̃ sicca folia. Hirculus porro, qua uitari Nardum sinceram dicunt, nō grauitate odoris modo, sed similitudinē etiā nonnullam animalis eius nomen accepit. Græci τῆρας uocant. Illud, ne quem fallamus, nō scendū. Syriacam Nardum duplicis esse generis. Vnum in India, sed parte montis in Syriam spectāte, quam Plinius sub Indicę uocabulo complectitur. Alterum in orbe nostro, id est, Syria, Ciliciaque. Hoc aliqui Gallico præponunt. Aliqui contra, Gallicum Syriaco tali præferunt. De Gallico mox dicemus. Calenus Indicam Nardum accipit quōties absolute Stachyn, id est spicam Nardi nominat, quasi spicam cæteræ non habeant, sed herbā dumtaxat, quē admodū & Plinio uidetur. In Gedrosia quoq; Nardum est. Sed sub Indico cōtineri credimus.

EX M. VERG. COM.

Altera Indicū spectat. Credimus, statim in ipsis foribus, perijisse huic capiti alteram regionem, Indicam scilicet. Siquidem incipiens hoc caput Dioscorides, duplicem esse Nardum ait, uocariq; Indicam alterā, alteram uero Syriacam: subiecitq; statim, non ideo Syriacam dici, quia in Syria nascatur, sed quod montis in quo nascitur, altera pars Indiam, altera Syriam spectat: exigebatq; rei, & ditionis sequax necessitas, ut quē admodum dixerat, non ideo Syriacam. &c. sic etiam de Indica aliquid diceretur: nec aliud dici posse uidebatur, ob ea quæ statim sequuntur, q̃ quod de Syriaca dictum fuerat, non ideo scilicet Indicam dici, quia in India nascatur, sed quod. &c. Quam ob causam nos Indicam etiam reddidimus, q̃ si in nullo græcorum inuētur id a nobis fuerit.

Desiderari eodem loco etiam hic potest mōris nomen, & sicut in quo Nardus nasci dicitur, siue in India, siue alibi esset: & si ob ea quæ Plinius libro. 12. rettulit, & hic paulo post de Gange dixit Indię Nardina tales assignandi sint. Lexiora tamen hæc sunt.

D Illud in medio capite grauius, in quo non diuersa tantum, sed contraria penitus omnia leguntur. In pluribus siquidem, sed minus probatis legitur. Auferendum in usu Nardi, si quid luti radicibus eis baserit, cum cribro eximendus puluis. In paucioribus autem, sed probatoris fidei, ut nos reddidimus. Auferenda scilicet in usu eius primum radices. &c. Videturq; prior lectio illa, Nardi radicibus ad medicinam uti, ex quo in eum usum purgari eas iubet: idque Pāulus Aegineta libro sexto etiam confirmat, fuisseq; hanc Serapionis ætate huius loci lectionem.

Prosumt & stomachi erosionibus, quas Græci Cardilogos dicunt. Sciendum illud est, quam Græci ex multo tempore ἀσπιδιον, id est, cor dicunt, antiquissimis in ea gente Peloponesiacis belli tempore, quo Hippocrates, medicinam suam commentatus est, non cor, sed uentriculum & ostium stomachi significasse, eaq; uoce intellexisse antiquissimos Græcos, stomachum & eius ostium tantum, non cor penitus aliud ab eo. Testis significationis eius est Hippocrates grauis autor, & qui pro arculo in hīs merito habendus sit, pluribus locis ea pro stomacho usus est. Hæc multis etiam alijs in commentario suo Vergil.

A D D I. T I O.

Cyperum imitante, id est, angulosum luncum.

Hircum spirante, id est, hircinum, uel Hircorum uirum.

Frutice pumilo. Breui, uel decurtrato. Adulterant statum Sibio. Δυστοί δὲ αὐτὸν ἐμμετῶντι τιμῇ. Est autem Stimmi, ut inquit Plinius lib. 33. cap. 6. lapis spumæ candidæ, nitentisq; non tamen translucentis. Stimmi appellant alij Sibib, alij Alabastrum, alij Larbason. Duo enim genera, mas, & femina. &c.

Abundantias femininarum, id est, uulvæ fluxiones & proflumina.

Novo fittili. cui testorium non sit obductum. ἰν ἀγγεῖο καὶ αὐτὸ ἀνοικτῷ, ἡσέ nono picato.

De NARDO Celtico.

CAP. VII

Celticum Nardum nascitur in Liguria alpibus, Salinca patrio nomine appellatum. Prouenitq; in Istria. Exigue fructicat, & cū radice uellitur. Aligatur manualibus fasciculis, manipulatimque componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florem luteum. Foliorum, ac cauliculorum dumtaxat usus est, & odoris suauitas. Vnde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra, pauito solo atque

ἰσχυρὸν καὶ ἰσχυρὸν
ἰσχυρὸν καὶ ἰσχυρὸν

lo atque humenti subiecta, charta reponere, postridie repurgare. siquidē utile ab acroso, alienoq; propter humoris uim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ Hirculus uocatur, ab odoris grauitate. Sed facilis cognitio. Namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti uerum Nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij decocto bibitur. Item aduersus lienem, renum & uescicæ uitia, & uenenosos ictus ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

B A R B A R I C O R O L L.

Nardum Gallicū, siue ut Græci appellant, Celticū, laudatur in orbe nostro post Syriacum. quippe quod Syriaco sit leuius, neq; multū ab Indico differēs, ut Plinius existimat. Preciū fictio. Hoc & Aliuā uocari, Dioscorides Alpīnis populis tradit. Credo Saliuncā legendū, a uicinitate pro Saliuncæ. Quam nostri foliosam quidē, sed breuem, & quæ neci non possit, describunt. Radici numerosæ coheret herba uerius q̃ flos. Densa, ueluti manu pressa. Breuiterque cespēs sui generis. Pannonia gignit hanc, & Norica, & Alpiū aprica. Vrbium Eporedia tantæ suauitatis, ut metallum esse cœperit. Vestibus interponi eam gratissimū. Seruius hanc uulgo appellari, Orci tunicam putauit. De Hirculo herba, cuius Dioscorides hoc loco meminit, superius mox absoluti.

E X M. V E R G. C O M M.

Celticam Romani Gallicam, Id est, nascit̃ in alpihus Lyguriæ Celtica Nardus, sed ab incolis regionis suæ uocabulo Gallica appellata est. Suspicionemq; coniecturam hanc nostram confirmauit, quod est illic aduerbium ἐπιγίγται, manifesta in Græcis significatione, quasi dicas, regionis modo & nomine, quod totū nos reddidimus, ab incolis græcis suæ nomine appellatā. Nec aliud est quod certū & pro comperto nobis de ea dici possit, & Genuates quidā Herbaria pro celtica Nardo, quæ est spicati floris colore inter ceruleum & purpureum, Lauendulam exhibuerūt, notam passim herbam. Atque sic dicta, quoniam magnum uetrigal generi illi hæc herba est, quotannis in Aphyricam eam ferentibus mercatoribus, ubi lauandis, fouendisq; corporibus in balneis Lybes ea utuntur, nec nisi decocto eius abluti mane domo egrediuntur. Idem, nullam talē herbam bircini odoris nouisse dicebant. Quo fit, ut peritioribus censendum relinquamus, an Celtica Dioscoridi Nardus ea sit, quam Genuates Celticam spicam, & Lauendulam, dicunt. Nobis nō uidetur alteri alterius respondere notæ. Nam Dioscorides suam luteo flore describit, Genuates suam colore inter purpureum & ceruleum ostendūt: ob quas causas suspicantur proprii generis herbam, Gallicam hanc Nardum esse. αλιωνία. Ruellius, Saliunca. Sed omnē, ut uidetur, doctissimorum nostra etate uirorum, pro Saliunca, & Gallica Nardo disceptationē excitauit una Dioscoridis in hoc capite notæ, quæ nec una, nec eadem in antiquis græcis est, sed in aliquibus Saliunca, in aliquibus Aliunca, in aliquibus etiam geminato, ll, Alliuca legitur. Ex qua tam multiplici lectione, oborta nobis suspitio est, uitium in ea uoce esse, ut plerumque fit in his quæ latinā a Græcis, & a latinis græca imperitis alterius linguæ librarijs scribuntur: nec Saliunca illic legendum esse, uerum ex quo sunt in quibus duplex ll est, & in omnibus rotam dictionem finit ea syllaba, Gallica, pro Saliunca legi posse.

Prodest eodem modo & lienī. In aliquibus græcis non prodesse simpliciter scribitur: ut non tantum cui parti, uerum in quo eius partis malo etiam mederetur. intelligeremus.

Demontano N A R D O. C A P. VIII.

Montanum N A R D V M, quod ab aliquibus Thylacitis, & Niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, caule & folijs Eryn-

A

794.10

intipino

κατινὴ τῆς δασ
Lib. 21. cap. 7.
& Lib. 20.

B

Lauendula quæ
re sic dicta est.

ἐρυνὴ τῆς δασ
ἐυλακίτις, νίρις

Cgio similibus, minoribus, minime tamē spinosis, asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu Haſtulæ regiae, ſed lōge graciliorib. & exilioribus. Neq̃ caulem, neq̃ fructum, neq̃ florem proferit. Adeadem quæ Celticū efficax.

N A R D U M B A R B A R I C O R O L L.

Nardus montana, quam & Syriacam. & Ciliciam uocare poſſita: Galeno Pyritis appellata eſt, nec priuatim a Plinio deſcribitur, ſed inter Nardi genera promiſſe reſertur.

E X M. V E R G. C O M M.

AQuibus ſcā Thylacitis, *θύλακας, θύλακον* q̃ masculino, nec minus *θύλακιν* neutro genere, græci vocāt ex animalium corio factum ſacculum, peramq̃ *ἔντερον*: ab his nominibus adieſtina forma *θύλακτις* nox facta eſt, qua ueteres Nardum hanc dicebant. propterea, q̃ ex Cilicia, Syriaq̃, mercatoribus in Græciam ſacculis his clauſa, uenalis afferretur: eratq̃ id nomen quaſi nota gentis, *ἔν* a gente bonitatis in hac herba. Indi eant id meliora grecorum Lexica, in quibus nox *τύλακοφόροι, ἐκπονίται, θύλακας περιφόροντες τὰ ὑρώματα*, quod eſt, ex corio ſacculis circumferentes aromata.

Folia cum Eryngio ſimilia habet. Diſſidet hoc quod mox a fine ſubingit. Non caulem, non florem, non ſemen fert. Quomodo caulem habet, *ἔν* non caulem? Sed quod noxiſſe huic capiti credimus, rerum uocumq̃ ſimilitudo *ἔν* uicinitas eſt. Habent ſiquidem græci *κλάδος καὶ ἄλλος, ἔν καυλόν*, quibus diuerſas in planis germinationes oſtendunt, ut aliquando certius nos etiam docebimus. Factuq̃ facile fuit, ut in priore illa parte qua nunc legitur *καυλός*, id eſt caules, non id, ſed *κλάδος*, aut *κλάδος* quondam legeretur, *ἔν* a partum perito, diligentiq̃ homine, altera pro altera nox accepta fuerit: ideo nos ramulos illic reddidimus. nam in poſteriore illo, caules neceſſario reddēdi erant. In pluribus ſiquidem naturæ ordo hic eſt, ut ad florem *ἔν* ſemen, caulem prius proferri oporteat. Quæ duo in montana Nardo hic negaturus, tertium etiam negare cogebatur. Qui autem ab nobis ramuli in uerbis dicuntur, hi ſunt qui inſtrūti noſto genere, quale Abſinthii, Ruta, Thymi uſ, pluraq̃ alia ſunt conſerti ab uno principio, plureſq̃ oriuntur, *ἔν* eadem altitudine fere inter ſe creſcunt.

DMinora tamen, nec Eryngij modo aſpera. In paucioribus græcis, non *τραχία*, quod aſperum, ſed *παχία*, quod craſſum ſignificat legitur. Nec aliud Serapionis ætate legebatur. Totā in eo res uerſabatur, aſperitas uel ne, an craſſitudinem, Dioſcorides excepiſſe uideatur. Nos quoniam Eryngio aſperitas, *ἔν* aculei a Dioſcoride aſignantur, illud maluiſimus, quod eiſdem ſcriptoris autoritate defendi *ἔν* confirmari poterat.

DE ASA R O C A P. IX

ASARV M, quod & ipſum aliqui ſilueſtre Nardum appellant, Magi Sanguinem Martis, Latini Perpēſam, alij Bacchar, Oſthanes Theſam, Aegyptij Cerea, alij Nardū ruſticū, Galli Bacchar, Aethruſci Succinum. Odorata herba eſt, qua in coronamentis utuntur, Hederae folijs, minoribus multo, rotundioribuſq̃. Floribus Cytini Hyoſcyami, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus ſemen acinoſum. Cauliculoſus habet anguloſos, aſperos, & molles. Radices numeroſas, geniculatas, tenues, obliquoſas, graminī nō diſſimiles, longe tamē graciliores, odoratas, quibus odor ineſt Cinnamon proximus. Aſperum ſiccumq̃ ſolum amat. Eius radix, ruptis, conuulſis, in tuſſi uetere, & ſpirandi difficultate, & ſi urina ægre redditur, opifera eſt. Menſes ciet. Contra ſerpentū iſtus, eam in uino bibere, ſalutare eſt. Folia, ut quæ aſtringant, illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipientibus agiloſipſis, mammis tumentibus a partu, i gñibus ſacris auxilium datur. Odor ſomnum gignit. Cræteus herbarius de eo ita ſcriptū reliquit. Aſarum excaſticatoriam uim habet. Vrinam cit. Hydropicis, & uetuiſto coxendicum dolori prodeſt. Radices ſenis drachmis ex aqua mulſa pote menſes

*ἄσπερον
ἄμα ἄριον
θίον
βάρχαρ
σούμινον
δουανδρον κνιτιν*

*Cræteus betu-
barius.*

mensēs trahūt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vm brosis montibus prouenit, sed plurimum in Ponto. Phrygia, Illyrico, & Italiae Iustiniensi agro.

ABARBARICOROLL.
Saron, præter cæteras differentias, molliora quoq; folia obtinet q̃ Hedera. Radice Galli ci Nardi, Semine, saporis calidi ac uinosi. Bis anno floret, Autumno, & Vere. Optimum in Ponto, proximum in Phrygia; tertium in Illyrio. Effoditur cū mittit folia, situm ocyslime trahens, ac senescens. Error librariorum est in Plinio, qui alicubi iubere uidetur siccandū in sole, alicubi in umbra. Nisi quis posteriorē locum ita legat. Nō q̃ siccandum sit in umbra, sed q̃ si rūt celerime in umbra sentiat. Non ignorandū, Baccarē aliud omnino esse q̃ Afaron, etiā si medicinas, quas Dioscorides Afaro dicauit, Plinius apud nos Baccari magna ex parte acceptas retulit. Nec mirum, cū sit earum natura uiribus & effectū proxima. Cæterum Perpersam, siue Perpersam (nā utrunq; legitur, ut in Baccare latius exposui, non Afaron, ut Dioscorides, sed Baccarē intelligi Secundus noster uoluit. Cōtra quoq; descriptio Asari a Dioscoride facta, cōgruit Baccari multis partibus. Primitū, q̃ odor ei Cinnamomo uicinus redditur, ut Afaro. De inde, q̃ gracili, nec humido solo prouenit, ut Afaron. Alioquin reprehēdūt a Plinio, q̃ Nardum rusticū, radicē Baccaris appellaueret: quia Nardum rusticū proprie sit Afaron. Quod uero Dioscorides Coronamentariā esse dicit herbam Afaron, id Baccari potius q̃ Afaro conuenit. Propterea, q̃ Afaron uocari scribunt, quoniā in coronas atq; fersa nō addatur. Legebatur in Dioscoride, Romanos Afaron Peritresam uocare: nos Perpersam, aut Perpersam ex Plinio correximus. Autor is eandē opinor herbam. 21. libro Perpersam. 25. Perpersam nominat. Cordices etiā sunt, in quibus non Perpersa, sed Sparsa legitur, ut existimo corrupte. Legitur & Afarus, non pro Afaro, sed pro Arifaro mendose. Quid enim incolumē relinquit Medicorum imperitia? De Arifaro agemus suo loco.

EX M. VERG. COMM.

ASaron. Græcis adiectiuum est, significatq; illis idem quod ἀσπερον, id est, quod in ornatum non ueniat, & quo ornari nequeamus. autor Plinius, Cæterum obstat quod sequitur, Corollaria & odorata herba, Afaron est. Respondeo. Non id aduersatur, Possunt enim plantæ earumq; partes, ob præcipuam eius usum causam, coronariæ esse, ut mox dicemus, & nihilominus quia aliquid aliud impediāt, in coronas non addi. Sunt qui rusticam Nardum appellant. Haud dubium, quin ob odoris similitudinem. Cæteræ appellatio nes nobis incognita, idē exequendas post nos alijs relinquimus.

Cogor nō uolens appellare Ruellium: quoniā & ipse, & alij interpretes, intelligunt in Afaro caulicu los asperos & molles, contrario (nisi mutata sit latinarum uocum antiqua estimatio inter se) & ob id simul impossibili babin. Qui enim potest simul aliquid asperum & molle esse? & cur post seminis historiam, qd̃ in his quæ caulescunt, in caulibus, plarimq; absoluit Afari caules, importuna, & parum congrua sermonis serie in Dioscoride descripsim? cū nec molles, sed raras græci omnes illic habēdē, nec caules eo loco, sed cus pides, acuminatq; aliqua, quæ in eo semine se proferunt, hic scriptor descripsit. Video lapsum. Crediderunt illi, nihil aliud græcis, & huic præsertim scriptori, καυλός, καὶ καυλός significare, quam in oleribus, plantisq; alijs, ad florem, & semen in altum surgentes, ueluti uirgas, cum tamē Homerus καυλὸς δέντρος suos dixerit, et omnia eius gentis Lexica indicent, καυλός et eadem ratione καυλόν, præter cōmunem illam in plantis signifi cationem, in extremo bastili ferramento acuminatam summam partem, in quam caua deinde cuspi ferrea inseritur, significare: quia uocis non illa estimatione reddendus, iudicio nostro, fuerat hic locus. Hic enim post totā seminis figuram, quam nucleis acinorum similem, dicebat habere idem semen, ostendit uelut in ecchina totā castaneæ calice, acuminata quedam, nō tamen ut in illo conferta & densa, sed rara, nec mollia, uerū aspe ra, neque angulosa tridem, sed angulorum figura modo et specie. γωνιώδης enim ea appellat, non γωνία, qd̃ ab illis fuerat diligentius obseruandum. Nō enim parui refert in pictura, seu modo uel specie. In illo siquidem manifesti anguli erunt, in hoc quod angulis simile sit. Videatur tamen Plinius hoc aliter indicasse, cum ait, Afaro semen acinosum & uenosum esse, nec extare in eo acuminatū quid, sed per longitudinē uenas extendi.

A D D I T I O.

Svbriles, obliquæ, &c. Quæ ab hoc loco sunt, usque ad id, Asarum exaltfactoriā habet naturam. &c. in Vergilio desideratur, putatq; idē, ab sciolo quopiam fuisse inserta, qui ut Plinj ætate etiam aliqui inue niebantur, Baccarem rusticum Nardum credidit, & appellauit eadem appellatione, deceptus, quod Asaron rusticum, Nardus etiam dicebatur, Asarum et Baccarem simul miscuerit, diuersis alioqui soliorum, radi cum, & in quibus utraq; nascitur locorum uocis a Dioscoride descriptis.

Plinius lib. 12.
capite. 13.

Idem libro. 21
capite. 6.

B

C P H V, quod & aliqui silueftre Nardum appellāt, nascitur in Pon-
to, folio Olufatri, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui,
cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto. Floribus Nar-
cisso proximis, maioribus, teneris, & in albicante purpureis. Radice su-
perius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa, in nigri Vera-
tri, aut lunci odorati modum, capillamentis inuicem contextis, flauescēti-
bus, odoratis, cum quadam odoris grauitate Nardum emulantibus. Ex
calfacit. Vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare
potest. Ad lateris etiā dolorem efficax. Menses ciet. Antidotis inseritur.
Adulteratur radice Rusci ammissa: sed maleficio deprehenditur, qm̄
hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

B A R B A R I C O R O L L.

P H V, Creticum Nardum nonnulli uocant. Radice uillosa, imitantēq; auium pedes. In
Plinij codicibus corrupte Aliphu, pro Phu legitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Q V A M pro Dioscoridis Phu, ætatis nostræ Herbarij ostēdunt, s. Valerianam herbam, longe mi-
nor ea est quæ ab hoc scriptore describitur. Nec omnes omnino utriusq; inuicem sibi respondent
notæ, quæ tamen præcipue a Dioscoride numerantur, conuolutæ glomeris modo, & ut Plinius ait, uillosæ ra-
dices, eorumq; Nardi odor, & albicans in caule purpura, in nostra pariter sentiuntur. Credimusq; nos, ut in
animalibus etiam fit, quæ non eadem mole corporis, ingenijq; sui natura ubiq; nascuntur, in alieno orbe cœ-
li, aut terre beneficio, Phu hanc prociorem nasci. Quoniam & in nostro orbe cubitalis aliqui uisa fuerit.

D De M A L A B A T H R O. CAP. XI

μαλαβάριον

φός
μαλαβάριον
νάρδος

M Alabathrum arbitratur aliqui esse Indici Nardi foliū, falsi qua-
dam odoris cognatione. Per multa enim Nardum olent, quem
admodum Phu, Asarum, Niris: secus autem res se habet. Namq; Mala-
bathrū foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, Lentis palu-
stris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum, statim lino transsu-
itur, & siccatum reconditur. Tradunt, siccatis æstiuo feruore aquis, hu-
mum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidē re-
nasci. Laudatur recens, cum nigredine quadam candicās, integrum, nec
fragile, odore caput feriens, quod diu in suauem odorem permaneat, & Nar-
dum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirum uero & minutum con-
tufum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem Nardo sor-
titur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet, ac sto-
macho magis pdest, Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibus-
q; tritum, & in uino seruefactum, cōmode illinitur. Subditum linguæ,
oris halitum & suauitatem cōmendat. Vestium quoq; odorem interpo-
situm seruat, & ab erosione tuetur.

B A R B A R I C O R O L L.

M Alabathrum Plinius arborem Syriæ affirmat esse, folio cōuoluto, arido colore. Fertili-
us in AEGypto. Laudatus in Indiæ paludibus, sine radice fluitans. Improbant candidū. Ce-
lesterrime situm in nerussate sentit. Odor in uino sufferuefacti antecedit alios. In precio quidem
prodigio simile est, a singulis denarijs ad trecentum peruenire libras, ut idem inquit autor, o-
leum autē ipsum in libras. 60. Sunt codices in quibus non oleum, sed folium scribatur. Si hæc
uera sunt,

Lib. 12. cap. 16.
& de medica
mētis eius Lib.
23. capite. 4.

uera sunt, Malabathri gemina conditio. Alterum palustre, ut Dioscoridi uidetur. Alterum ex arbore. Nunc medici nec primum, nec secundum, sed tertium Malabathri genus nouere, appellatum a Mauritanis suis Tenbul, cuius surculi cum folio, quale Arbusti siue Lauri est, pollicares plerumque ad nos ferantur, & fructus quoque laurinis bacchis simillimus. Omnia tria genera folij appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maxime. Foliatum inde unguentum, quo feminas locupletes oblini Romae solitas, Galenus auctor est. Graeci Phyllon, hoc est, folium uocant. Herbae genus in saxosis montibus repertum. Nostri uulgo Folium syluestre nominant, ut suo loco differemus. Notandum, uariare Dioscoridem a Plinio, quod alter Malabathrum probari scribat, quodam salis gustu, alter nullo.

MALABATHRON. Primum illud nouisse omnes uolumus, hoc ipsum ab antiquis graecis folium simpliciter fuisse dictum. Sic Plutarchus in libello cui titulus est. Quod bruta ratione utuntur, appellat, odoramentis alijs coniungens, simulque numerans Cinnamomum, Nardum, Arabicum Calamum, & folium Malabathrum. hoc. Quae uox ex antiquo & probatioris mihi fidei graeco codice, inistaurata a nobis illic est, ubi legitur, Et nisi id fiat, non nasci folium, quae in cunctis alijs deerat. Ab hac appellatione Malabathrinum unguentum foliatum Marciali, & plerisque alijs, & graecis & latinis scriptoribus dictum est, & ob odoris similitudinem idem Nardino esse credendum aliquando.

Et Niris, quae montana Nardus. &c. Non *νίρις*, quae montana Nardus ab eo dicta est, uerum *νίρις* in aliquibus legitur. Sed nos maluimus, quod ex eodem scriptore seruari poterat. Et si forte utroque loco *νίρις* legi quondam potuerit, non adeo tamen similis odor est, ut mutanda temere ea uox fuerit.

Probatum recens & nigredine albicans. Habet plures Graecorum codices descriptas his uerbis Malabathri notas. *ἢ δὲ καλὸν τὸ πρόσφατον καὶ ὑπόλευκον*, probatur scilicet recens, & quod albidum, non omnino album. id enim *τὸν ὑπόλευκον* significat. Sequitur deinde. *ἢ τὸ μολυσμὶν τὴν ἄτραυσον καὶ ὑπόλευκον*, quae latinis uocibus reddi quidem possunt, sed parum sequaci & congruente sensu. Si enim dicas. in nigrescendo infragile, nec in partes discriptum, quis erit sensus? & quae rei natura? Siquidem nulla in colore caussa est, cur magis, minusque frangatur aliquid, & in suis partibus integrum seruetur. Accedit & illud, quod copula illa *τι*, uerbo subiecta, alterius in sermone membri ueluti principium facit, quippe in lectione Graecorum consueuerunt, facile in alijs obseruare hoc potuerunt. Quod nisi Plinius, aliique omnes, nigricantem colorem Malabathro adsignarent, confidentius & uicium hoc loco testaremur, & ut consueuimus in integrum etiam restitueremus. Vnus igitur tantum inuentus mihi est codex, in quo legitur *ἢ τὸ μολυσμὶν τὴν ἄτραυσον καὶ ὑπόλευκον*, quorum uerborum sit sensus. Et in mollescente infragile, & in suis partibus integrum, ut nihil de colore illic agatur, sed de tenaci lentore: doceatque Dioscorides, probari Malabathrum id, quod recens & albidum sit, quodque cum mollescit lentore admittit, tenaces uires tunc acquirat, fiatque infragile, & in suis partibus integrum seruetur. Quod in multis humor natiuus, & accedens facit, fiunt enim eo firmiora, & ualidiora. Quemadmodum contra arescentia franguntur.

Prodest oculorum inflammationibus. Sunt exemplaria graeca in quibus legitur, *καὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμικά καὶ πρὸς τὰς φλεγμονὰς ἑρμῶσι*. & ad oculorum praeterea lippitudines & inflammationes accomodatam est: ut duo intelligatur mala. Sunt itidem in quibus, *καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμικὰς φλεγμονὰς*, idest, ad oculorum inflammationes, ut unum tantum mali genus intelligatur. Nos posteriorē hanc lectionem, monente Plinio, magis probauimus, qui de unguento Malabathrino legit epiphoris, idest, inflammationibus uino expressum, utilissime imponitur.

C D E C A S I A CAP. XII.

CAsia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam cognitur, crassi corticis sarmento, folijs Piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Coralij aemula, perque angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto seruire astringens, aromatica, uisnoso odore: cuiusmodi est quae ab incolis Achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, Daphnitis. Huic praefertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine: quae Rosam odore imitatur, praecipui in me-

C. dicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico bla-
sto cognomē est. Reliquæ uiles, & quæ Aphemū dicitur, nigra, insuaui,
cortice tenui, ac rimoso: & quæ Darcā & Citton uocāt barbaro nomine.

Οὐδὲν μουσελτικόν
ἀλφύρα καὶ κίττον

Theoph. li. 9.
capite. 4. 5.

Plin. lib. 12.
capite. 20.
Item lib. 13.
capite. 19.

B A R B A R I C O R O L L.

Cassiam Theophrasius fruticem magnitudine Salicis Amerinæ prodidit, sed multis furtu-
losisq; brachiata ramis. Crassiore q; Cinnamomum farmento, præterea nervosissima, & so-
lo cortice commendabilem, qui ei cutis tenuitate obducitur. Neq; aliter detrahitur, q; si præfu-
tas corio bubulo uirgulas bicubitas, enati uermes eroderint, cortice tuto, intactoq; propter a-
maritudinē, odorisq; ærimoniam futuro. Hæc iuxta Cinnamomi cāpos in Ethiopia, Troglo-
dytis permixta connubio, sed in mōtibus nascitur. Dissentit a Dioscoride Plinius, Theophra-
stū (ut arbitror) secutus, q; Dioscorides crassum eius corticē esse scribat. Illi cute uerius, q; corti-
cē uestiri tradant, quem conterī, atq; in Cinnamomo leuari exinaniriq; precium sit. Amplitudo
fruticis cubitorum trium, ut idem Plinius existimat. Color triplex. Cum primum emicat, cādī
dus pedali mēsurā. Deinde rubescit, additio sesquipede. Ultra nigricans: quæ pars inquit maxi-
me laudatur, ac deinde proxima. Damnatur uero candida. Eligendam recentem maxime, &
quæ sit odoris mollissimi, breui tunicarum fistula, & non fragili, quæq; plurima, minimū pon-
deris faciat. Cæteræ notæ congruunt. Lactam uocant talem, barbaro uocabulo. Alia est Bal-
samodes, ab odore dicta, sed amara, ideoq; utilior medicis. Hanc esse, quam Dioscorides Ze-
giri, et Galenus Gizer, Aetius Ozem uocariūt. Haud multum absum quin credam. Nominat
& Mortend Galenus speciem Cassiæ uiribus proximam, appellatæ Gizer. Nigra unguentis
expetebatur. Precia nullis tam diuersa. Optimæ in libras. xl. cæteris. xv. His addidere Mango-
nies, quam Daphnoidem uocant, Ifocināmon cognominatam, preclumq; eius faciūt. ccc. Ad
ulteratū Syracē, & propter similitudinē cortice Lauri furculis tenuissimis. Forteq; Daphno-
ides eadē sit Cassia, quam Daphnitin a mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sunt,
Cassiam, Cinnamomumq; nidis auium decuti plumbatis sagittis, aut circa paludes quasdā col-
ligi, propugnante diro serpente genere, ut Theophrastus ait, uel peritilionumq; ut alij. Sci-
endum, q; ubi nos in Dioscoride conuertimus, quandam haberi Cassiam redolentem hyrcinū
uirus, Mauritanī odorē Porri transfulerunt, prafizusam, nō tragifusam legētes. Vtra lectio sit
uerior, experti iudicent. Nō conuehitur modo Cassia, præter q; rarissima inter Xylocinnamo-
ni fasciculos quandoq; inuenta, nigriciæ argumēto. Cassiam latini correpta priore syllaba pro-
nuntiat, etiam si apud Græcos fere omnes geminata cōsonante scribitur. Vergilius. Nec Ca-
sia liquidi corrumpitur usus oliui.

E X M. V E G R. C O M M.

D. Ab incolis quæ talis est Lada. In cunctis fere legitur. Ab incolis quæ talis est Achy. Et in a-
liquibus non ἄχϥ, uerum ἄδϥ legitur. quæ uox quoniam in aliquas literas eius, quam Plinius
Ladam uocari dicit, incurrit, Lada a nobis restituta est, nulla tamen certa ratione, tam enim no-
bis ἄχϥ nunc barbara uox, quam Plinio tunc erat, & nobis modo Lada est.

Tertia est, quæ rubus Mosyliticus appellatur. Cum in cunctis fere legeretur ῥοσϥϥ, comū-
ni omni germinum appellatione ex melioribus græcis ῥάρον, idest, rubum credidimus. Neq;
(ut credimus) ab re, in fruticoso enim genere Cassia censetur, in quo & rubi numerantur, uerissi-
milesq; est, contractiore hac rubi uoce, magis q; ampliore illa & cōmuniore germinis Cassiæ si-
gnari solitam, præsertim a regione: non aliter q; Lygusticum, Piper agreste, multaq; alia in plā-
tarum genere appellamus.

Mosyliticus. A promontorio & emporio Ethiopiæ Mosylo, unde afferebatur, dictus est.

Vt quæ Aphysemon uocatur nigra. &c. ἀφῆμων in multis legitur, ἀφῆμων in meliori-
bus inuenitur: potuitq; ob eam appellari caussam, quod tenui & disrupto eius cortice sibiariū
& fistularum more insilari non poterat, id enim φασῖν Græci dicunt, & φασῖν τῆς ἀντοῆς, idest, tibi
as uocant, & hic φασῖν τῆς, follium, fistulam, de Cinerula, & bulla in metallicis agens, appellat.

In odorifera Arabia. Ea est, quæ inter Persicū, & Arabicū mare a geographis describitur.

Habet crassi corticis Cassia omnis farmentum. In græcis est, ῥάδων περὶ ῥάδων, quod signifi-
cat uirgam, qualem. s. in uitis, multiq; alijs uidemus. Eam crassi corticis dicit Dioscorides,
pro crassitudine. s. totius materiæ, in qua crassissimus sit cortex, exigua interior medulla. In ali-
quibus hoc loco legitur, ῥάδων ἰσῶς, uoces duæ, nihil, nisi emendentur significantes: credimusq;
ex Theophrasto restitui posse ῥάδων ἰσῶς, ueluti uitis.

Et Piperis folio est. Legitur in aliquibus ῥάδων ἰσῶς, in aliquibus, ῥάδων περὶ ῥάδων, Potiorem illā

lectionem sequutus est Mauritanius Serapio. Nobis in tam multa in plantarum folijs naturæ uarietate, difficilis coniectura & ratio fuit: et licet utraq; lectione dici plura potuissent, tutius tñ uisum est, ex cognatione locorū, uicinitateq; Piperi folio simile potius facere: credimusq; omnē hanc uarietatem ab imperitia librariorum & incognitæ rei dubitatione irrepsisse.

Daphnitim. Si Plinio credimus, a Lauro facta appellatione, quoniam scilicet ob similitudinem Lauri cortice adulteratur, & a Mangonibus Daphnoides dicitur. In quo certe dissidet a Dioscoride. Verū id alijs excutitur. Aut certe sic dicta Daphnoides, a portu Arabiæ, cuius meminit Strabo, lib. 16. qui thūs, myrrham, & alia odoramenta fert.

Odore Porraceo. Mutauimus & hoc, quod in quibusdam habetur *τραγίσσαν*, Nā in melioribus, porraciore odore habetur. Et Mauritanius Serapion quoq; sic legit.

De Pseudocasia CAP. XIII.

Similior huic est Pseudocasia, q̄ ut explicari possit: quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hæretemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, plena, ab alia distans, Damnatur candicans, scabra, hircinū uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, et malagma ta, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Cōtra uiperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas, inflammationes omnes, et renū uitia, pota proficit. Fœminis in solia desidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilationem uulvæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, Cinnamomi uicem supplet. Nā eosdem effectus præbet. Ad plurima perq; utilis.

Pseudocasia

B A R B A R I C O R O L L.

Habetur & Cassia odoratæ genus herbæ, ut in Thymelæa, siue potius Chamelea demonstrabimus. Aliud ferè Mauritanis, quā ætas nostra Cassiam appellat, & cognomento fistulæ. Ab aromatica, ligneæue discriminat, ueteribus ignotā pinde ut fere nobis mō ligneæ, aliogn in nostro quodā orbe feri coëpta, extremiq; impij Rom. margine, qua Renus alluit. Viuere in aluenarijs apum solita. Etiā si color aberat ille corridus sole, atq; ob id simul idē odor. Ceterū scire oportet, si qñ Cassia syringa, hoc ē, fistulā, in antiq; auctorib; legere cōtigerit, nō p ea capiendā esse, quæ nūc Cassia fistula dicatur, colore rubro nigrās, laminis intus carnosiss, quas parietine discludunt, feminibus siliquæ Ceratæ, ad deiciendā bilē usq; mire ualēs, sed, p lignæ, siue aromaticæ, cuius una quoq; species ab ipso Dioscoride platea Syrinx, idest, lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felix, si mō liber eius est, qui circūfertur, appellatiōe Fistulæ, simpliciter Cassia odoratā, siue aromaticā intelligit. Inuenio tñ apud græcos autorē, q Paulū, et Oribasiū ita loquentes induxerit. Cassia Syrinx aduersus flauā bilē pdest: & itē eos, q pter naturā pallefcunt: itē anginas, & lacerū dolores, & peripneumōnicos. Hæc Paulus. At Oribasius. Refrigerari ea inquit iecinoris calores intempatos. Hæc recētiore græci calidā, & humetā abscessu prohibent. Idē ferè Mauritanī. De Cassia qua bilis per aluū detrahitur, & ppter mento Cathartice dici potest. Nam aromatica, siue lignæ exalfacit, atq; siccat abscessu fere terio. Porro Cassia Cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio Iuglādīs. Alexandriē sibi uisam Poticus Facinus retulit, dū ista pderē. Siliquas habet plōgas, ac teretes, utrinq; fastigatas, duo fere pedes pceras, carne intus nigra, gustu p̄dulci, sed plañe medicato, ligneis distinguētib; mēbranis, & olisbus siliquarū intercurfantib; ut p̄dixi. Eligūt ponderosā, collucentē, plenā, & quā si cōculseris, inclusa intus ligna nō sētias. Negociatores in hortis Alexandriē nascentē pferūt. Iam & Asiē cōmunis facta dicitur. Seritur & apud nos, uerū frustra. q̄ nec ad frugē puenit, & celeriter opprimitur. Quid sit Myrrha Cassia Hippocrati, cuius semē laudat uolumie, s̄ minarū morbis dicato, *εμπύον* inquit *καρίας τὸν καρπὸν*, haud scio reddere. Nisi quis, p Smyrri herba cepit, cuius cibo menstrua fœminarū iuuari constat. Strabo Cassiam odoratam e stagnis colligi, non solum ex arboribus in Arabia felice, quosdam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

B

καρπὸν

D I O S C O R I D I S

E X M. V E R G. C O M M.

C Vam hodie nostræ ætatis medici ligneam appellant unguentarij, uirgæque delictis magis quæ medicinæ quondam questus frutex, ideoque ab omnibus Poetis passim celebratus, diuersus omnino ab ea arbore, quæ eadem, nunc Cassia appellatio, siliquas potius quam fistulas fert Cylinthaceas, longitudine fere cubitales, lignosas, colore nigro, & quasi ex sole igniue torridas, intra quas lignosi inidè per interualla orbiculi sunt, & inter orbiculos semina concreta, ceu pulvere nigra inuoluta: cuius tanta in mollienda aluo usus est, tam multus, tamque quotidianus, ut sine ea uix possit nostrorum temporum medicina stare. Quo magis ueterum negligentia, aut fortuna demerari licet, qui aut eam ignorauerint, aut uti noluerint. Neque enim hæcenus de ea quicquam, aut in hoc, aut in cæteris inuentum a nobis est, quod merito miremur, & uix credibile uideatur.

Ei quoque parum recte fistulæ nomē, et ex eo diuersitatis nota adiecta ē. Silique enim magis, quam fistulæ nomē illi cōgruit, propterea, quod undique clausa, aliarum siliquarum in leguminibus, modo semina sua intra se elaudit, medica hæc Cassia, et ad maturitatem perducit.

Cauendum igitur, ne in antiqua medicina, uidelicet, quæ supra Galeni ætatem tractata est, fistulæ Cassiam inuenientes, medicam hanc nostræ ætatis credamus, eandemque credentes, graui periculo ea utamur. Ligneam enim illi semper intelligunt, quæ medicæ & posteriori huic nomē & appellationem suam ex similitudine largiri potuit.

DE CINNAMOMO CAP. XIII.

CINNAMOMON
 CINNAMOMON
 CINNAMOMON

C Innamomi genera plura patrii sibi nomē uendicantia. Præfertur tamen Mosyllū, quod Cassia, cui Mosolyti nomē est, aliquā referat effigiem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, leue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, per se iucunde olens. Optimi fere tempamētū odoris proprietate constat. Inuenitur enim in optimo, quodque seorsum nascitur, odor Cardomomo proximus. Insuper, acere et mordens, & cum calfactioe quadam tenus salsum, quod non cito cōfricanti hirsutum, aut friatū lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab adice furculū. Facilis est huiusmodi probatio. Namque fragmenta, adiecticia quædam sunt. Quæ aut potētius spirant, suo halitu cum nares cōfuluntur, olfactū explorant, deterioris dignotionē impediunt. Est etiam Mōtanū, crassum, pumile, fuluescens admodum. Tertiū a Mosylo, per se suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartū, fungosum, cædicās, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnā habens radicē, Cassia plane representat. Quintū genus, gustu amarum, et cortice fuluque Cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. His quæ Thuris, Cassia, aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, rugosum, leue, lignosum. Radicem autem ut inutilem rejicio.

BARBARICOROLL.

Plin. libro .11.
 capite .19.
 Theophrast.
 lib. 9. cap. 45.

C Innamomum in partes quinque concludunt. Præcipua bonitas tenuissimis ad longitudinem palmi, pauloue amplioribus. Secunda proximi breuiore mensura. Vilissimæ, quæ radicem antecedunt, quoniam ibi minimum corticis, in quo summa gratia. Qua de causa præferuntur cacumina, ubi plurimus cortex. Ipse frutex duorum cubitorum altitudine amplissimus, palmique minimus. Quatuor digitorum crassitudinis. Statim a terra sex digitis furculosus, arido si nullis. Cum uiret, non odoratus. Folio Origani, siccitate gaudens. Sterilior imbre, ceu contraria cæteris natura. Gignitur quidem in planis, sed densissimis in uepribus, rubisque. Difficilis collectus. Verior sententia est, nasci in Aethiopia, Troglodytis cōubio permixta: Non ut Herodorus, quo situ Liber pater educatus esset, ex inuasis rupibus, autisque nidis peti, & priuatim Phœnicis. Neque, ut alij, in Arabia. Igitur mercatores illi a cōterminis uehunt per maria uastaratis sine gubernaculo, sine remis ac uelis, sed hyberno per brumam, curis tamen maxime flantibus, Primus his portus Gebenitarum Ocila, siue Aila ut Strabo, Ptolemeus Ocelis. Produ-

tur

tur uix quinto anno reuerti mercatores, & interire multos. Contra reuehunt uitrea: & aenea, uestes, fibulas, cum armillis, ac monilibus.

E X M. V E R G. C O M M.

Mosylicum. Ita legit & Plinius lib. 6. capite. 29. Quod colore nigro, & cum uino diluitur Cinereo. Duplex in græcis eius partis lectio est, *τρεψιλον*. s. *iv τδ σινω*, quod si uerbum uerbo reddatur, in uino cinerefcens significat. Sunt itidē in quibus una adiecta syllaba τῆν, alius indicetur sensus. *τρεψιλον τδ σινωδεν*, in uinofco colore cine rescens, quasi mixtum describens colorē, & ex eo uarium Cinnamonū, in quo Cinereus, & ex uino rubens color esset, pariterq; ac nigrū probaretur. Quam lectionē secutus est Mauritanus Serapion, priorem uero illam antiqua Dioscoridis tralatio. Cur aut in alteram partem magis inclinauent animus, ea ratio est tota ex sermonis serie. Numerat hic probatoris Mosylici plures notas, laudatq; recens & colore nigrum, cūq; de colore eatinus egisset, nulla interiecta copula, aut diuisionis nota alia, subiicit statim *τρεψιλον τδ σινω*. & c. idest, ut nos reddidimus, & cū uino diluitur cinereo, ut non ad uarium in eo colorem pertineat, sed ad mutatum, cum uino maduerit, qualia multa uidetur quotidie oleo, aceto, humoribusq; alijs cōspersa, ex alio in aliū mutari colorem. Nam si uoluisset uarium, & ex uini cinerisq; colore mixtum Cinnamonū pariter ac nigrum laudare, copula, diuisionisq; alia nota aliqua alterum ab altero secerni oportebat. Cetera in commentario latissime.

Rutæ, Cardamomūue similis odor. Fuisse aliquā huius loci eam lectionem in latinis testatur Serapion, in græcis uero probatissime mihi fidei antiquissimus codex, in quo manifeste nulla mutationis alicuius suspitione adhuc seruatur & legitur, *ἢ δὲ μὴ πικρὸς ἢ καρδαμώμου τρεψιλον*, quasi latine dicas, rutescens, aut Cardamomo equalis odoris. Suspecta mihi præterea eodē loco Cardamomi uox est. Si quidē inoleuit toto hoc opere multis locis idē, frequēsq; uicium, in quo sepius uel uocum uicinitate decepti, parum diligētes græcorum librarij, uel ob uirium similitudinem aliquam, equalia rati ueteres eiusdē gētis medici, Cardamon, quod significat Nasturcium, pro Cardamomo: inuicemq; pro Cardamo, idest, Nasturcio, Cardamomū scripserint. Auxit suspitionem, qd in antiqua tralatione Nasturcij, nō Cardamomi: præterea qd Cardamomum odorem tenet, Cinnamonum autem suauis odoris laudatur.

DE PSEUDOCINNAMOMO. CAP. XV.

Est etiānum genus aliud, cui Pseudocinnamonum cognomen est. Inualidi odoris, solutarūq; uirium. Vocatur etiā Zingiber, cū tñ sit Xizlocinnamonū, præbens quandā Cinnamonomi faciem. Est aut lignosū Cinnamonum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore longe Cinnamonomoinferiore. Sunt qui Xylocinnamonū, a Cinnamonomodifferre dicant, qd a natura eius abhorreat. Cinnamonum omne excalfacit, emollit, et cōcoquit. Urinā ciet. Tam menses q; partus potū, aut ex Myrrha imposiū pellit. Contra bestias quæ uirus eiulantur, uenenaq; cōuenit. Caliginē, pupil lis oculorū obuersantē, discutit. Crassiciem extenuat. Lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitū dergit. Contra tusses, defluxiones, aquā subtercutē fusā, renū uitia, & urinæ difficultatē efficax est. Vnguentis preciosis inferi solet: & in suūa, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbræq; siccatū, quo diutius eduret, reconditur. Est & quoddam Cinnamonum, quod aliqui Pseudocinnamonomon appellant, perq; denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius Cinnamonomoeodore et gustu.

BARBARI COROLL.

Ipsum lignum in fastidio est, propter Origani acrimoniam. Xylocinnamonum uocatur. Preciū in libras. 10. Quidam Cinnami (nam & Cinnamonū dicitur) duo genera tradidere, candidius, nigricansq;. Et quādam præferebatur candidū. Nunc contra, nigrum cōmēdatus, autore Plinio, atq; eadē uariū preferunt candido. Certissimo argumento, si sit scabrum, atq; ut inuicem triū cōrumaciter frietur et in horefcet, Impbatur molle imprimis, aut cui albicat cortex. Ius eius

ψευδοκιννα-
μόμου
ζιγγίβερ

B

C a Gebaſitarū Rege ſolo ꝑficiſcitur. Is ediſto mercatu uēdit. Precia q̄ndā fuere in libras denario rum mille. Auc̄tum id parte dimidia eſt, incēſis (ut ferunt) ſyluis ira barbarorum: aut etiam for te fortuna, quoniam auſuri tam ardētes ibi afflare ſolent, ut æſtanbus ſyluas accendāt. Coronæ ueteribus ſiebant ex Cinnamomo interaſili auro incluſæ. Radicem eius magni ponderis aureę pateræ impoſitam uidiſſe, Plinius meminit, ex qua guttæ ediſc, annis omnibus in grana dura bantur. Pseudocinnamomum, Galenus Cinnamomidem quoq; appellari ſcribit.

DE AMOMO. CAP. XVI.

Amomo

A Momū exigue fruticat, ex ligno ſe cōuoluēs in uuæ modū, flore ceu cādidę Violæ, paruo. Folijs Vitis albę ſimilib. Laudatur q̄ ꝑ maxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno ſubruffo, ualde odo rato. Medicū, qm̄ in cāpeſtrib. et aquoſis enaſcitur, infirmius eſſe cōſtat. Eſt aut magnū, ſubuiride, racū molli, frutice uenoſo, odore Origani. Pō ticū uero ſubruffū, parū, fragile, racemoſū, fructū turgēs, et odore nares feriēs. Deligito recēs, cādidū, uel ſubrubrū. qđ nec aſtriſcū cohęreat, nec cōuoluatur, ſed ſolutū diffūdatur, ſeminis plenū, uuis paruis ſimile, gra ue, odoratū, mō cariē nō cōtraxerit, acre, guſtu mordēs, ſimplici colore, nō euariāte. Vim habet calfaciēdi, aſtringēdi, exiccādi. Somnū allicit, et illitū frōn, doloris ſenſū aufert. Inflammōes & meliceridas cōcoq̄, diſcu titq;. Iuuat q̄s ſcorpūs ꝑcuſſit, ex Ocymo illitū. Et podagricis confert. In flamationes oculorū uicerūq; lenit ex uua paſſa. Ad uuluarū uitia in ꝑſ ſis, aut inſeſſionib. utile ē. Decoſtū iocineri, renibus, podagrę potu cōue nit. Antidotis imiſcetur; & ꝑcioſiſſimis unguētis. Adulteratur herba A momo ſimili, quæ Amomis uocatur, ſed ſine odore, ſine fructu. Naſcitur in Armenia, flore Origani. Quare in huiuſcemodi ꝑbationibus, fragmē ta fugiēda ſūt. Eliſgenda aut quæ ab una radice integros furculos emittit.

Amomo

D Momum quidā ex India, alię ex Media importari narrāt. E uite Indica, quę ſit labruſca, ex iſtimatur naſci, frutice uenoſo, palmi altitudine. Carpitur cū radice. Manipulatim leniter componitur. Protinus fragile laudatur. Punici mali folijs ſimile, nec rugoſis, colore ruſſo. Se cunda bonitas pallido. Herbaceum ꝑeius. Peſſimumq; candidum; quod & uetulae uenit. Precium uuæ in libras ſicli. 70. friato uero Amomo. 48. Naſcitur & in Armeniæ parte, quę uo catur Ocene. Adulteratur mali granati folijs, & gumi liq̄do, ut cohareſcat uuę modo, conuo luatq; ſefe. Eſt & quę uocatur Amomis minus uenoſa, atq; durior, ac minus odorata, quo ap parer aut aliud eſſe, aut colligi imaturū. Nec mirādū, ſiquādo Plinius a Dioſcoride noſtro diſ ſonat, qm̄ ſicut ꝑcia rerū, ita & notę, & experimēta quoq; uariātur. Neq; ulla medicinę pars in c̄rtior, q̄ quę ab alio orbe q̄ noſtro ꝑeditur, id qđ & ratio ꝑſuadet. Amomum q̄le nūc officinę ꝑferunt fabuloſa ſpecie, nec odoris argumēto, nec alia rōne cōgruit cū eo qđ hic deſcribitur.

Amomo

BARB.
Plin. libro. 12.
capite. 19.
Theophrasti.
Lib. 9. cap. 7.

VERG.

O Rigani odore ſentitur. In pluribus Origani, in melioribus aut Rutę legitur, Rutęq; anti quam leſionē fuiſſe ex iunioribus indicat Serapion: licet & de Origano in eo aliquid le gatur. Nos in parum diuerſo odoris duarū plantarum ſenſu, cōmunem in græcis leſionē, & antiquam Dioſcoridis interpretationem ſecuti, Origani odore ſentiri diximus.

DE COSTO. CAP. XVII.

Costo

P Recellit Arabicus, cādidus, leuis, eximia odoris ſua uitate. Secūdū locū ſibi uēdicat Indicus, leuis, plenus, ut ferula niger. Tertius eſt Syriacus, grauis, colore buxeus, et odoe feriēs. Optimus ē recens, albus, abūde plenus, dēſus, a terebinib. nō eroſus, ſine graueolētia, guſtu calidus ac mordēs. Vis ei ex calfac̄toria. Vrinā ciet. Menſes pellit. Vitijs quę uulū male hñt, tā impoſitū, q̄ ſotu auxiliatur. Cōtra uiparū morſus

sextatē bibere pdest. Itē aduersus pectoris dolores, cōuulsa, inflatiōesq̃, A
ex uino & Absynthio. Venerē ex mulso stimulat. Latas uēris tinea ex
aqua pellit. Rigētibus, ex oleo, ante febrīū significatiōes, & neruorū reso-
lutiōib. oblinitur. Vitia cutis ī faciē, cū aqua, uel melle illitus emēdat. Ad-
ditur in antidota & malagmata. Sūt q̃ amīstis Helenij Comageni p̃cedu-
ris radicibus, adulterēt. Qd̃ deprehēsu facile est. Siquidē neq̃ gustu fer-
uet Heleniū, neq̃ ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costus, & Costū dicitur, & per diminutiōē a Strabōne, Costariū. Huius radix ī precio.
Fructus ī utilis. Plinius Indicum dumtaxat uidetur nouisse Costū. Primo statim introi-
tu amnis Indi, ī Patale insula compertum. Duo eius genera faciens, nigrum, & quod melius
eo iudicat, candidum. Preciū, 16. ī libras singulas.

BARB.

Ex aqua et melle. Quē ī grēcis est, cōiunctio ē, nos mutauimus ī x̃p̃, uertimusq̃, ex aqua
& melle, nō ut aliq̃, uel p̃pterea, q̃ Mel molliēdi & extēdi uim per se etiam habet: sic ī
uetusissimis etiā legitur, & ratio etiā nō repugnat. Alperā, & discolorē ceu a sole cutē. Id
enim sic, grāca habent, ἐπὶ ἡλίου, ἡλίου εἰμι illi solem, coniunctaque prepositione, ἐπ' ἡλίου, quasi
ī aduerbio sub sole sit, & ephlidas, multo sole adustas, namq̃ origo & causa a sole fuit.

VERG.

De ODORATO IUNCŌ. CAP. XVIII.

Odoratus Iuncus, ī Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex
Nabatheā. Proximus Arabicus, quem aliqui Babylonīū cogno-
mināt, Alij Teuchitin. Pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens,
floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis. qui manibus confricā-
do Rosā odorem emittit. Ignēq̃ mordacitatis ad linguā. Floris, & arundi-
num, radicisq̃ est usus. Vim urīnē ciundā habet. Menfes pellit. Discutit
inflationes. Caput aggrauat. Modice astringit, cōminuit, excoquit, ac ue-
narum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius ī potu ualīs sanguinē re-
stīcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. Miscetur
antidotis. Radix astringentiōr est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, cō-
uulsis, cum pari pondere Piperis, per diēs aliquot datur. Decoctum uul-
uæ inflammationibus, ad desidentium foras, utile est.

x̃p̃

x̃p̃

B

Iuncū odoratū Schoenon grāci uocāt, & Hippocrates Schoenō myreplicō, & Schoenō He-
dyosmō; & florē eius Schoenū anthos. Cornelius Celsus Iuncū rotundū, ut ab angulari disse-
rat, Cypero a grēcis appellato. Rotundū & ī Cāpānia inueniri tradūt, utq̃ minus pollentē. In
Arabia sane cū Calamo odorato nascit̃, cōuale quā dicemus, nihil aspectu differens a ceteris.
Prouenit & ī Syria, Cœle cognomiātā. Iuncū rotundū uinosā mordacitatis ad gustū sentiri
perhibēt. Preciū ī libras, denarij q̃nq̃. Noscendū uero Babylonīū, & Teuchitin a Dioscoride
pro eodē genere intelligi: nō sic a ceteris, q̃ppe qui Teuchitin, eundēq̃ nobilissimū, qui ē Naba-
thea sit, appellēt. Proximū Babylonīū. Pessimū ex Aphrica, ac sine odore. Dicit̃ et Lēscus ar-
bor siue frutex, a grēcis Schinos, nō Schoenos, ut quidam e pitioribus falsō interpretati sunt.
Vulgaris porro līcus quo ad uiliū nexu utimur, itē rotundus, & odoratus, nō Schinos, sed
Schoenos, unde, funes appellati. Recētiōres līcum odoratū cū funario palustrisq̃ cōfundunt.
Grāci quanquā & palustrē & odoratū Schoenō uocāt. Quoties tamē de odorato intelligi uo-
lunt, Schoenū, i. Iuncū, absolute nomināt. Alterū uero genus Helis, hoc est, Palustris, adiectio-
ne discrimināt. Dicitur & Schoenos mensura quēdā sicut astarus, & parasanga barbarorū.
Schoenon, Grēci cōmuni aliorum Iuncorum uocē x̃p̃, diphtongo, ut a Lentisco arbo-
re differat, quam x̃p̃ n̄d̄m appellant. Priuatim tamen ī hoc tantū genere, seruata hęc uox;
ab illis est. Nam ceteros Iuncos additis communi omniū nomini notis aliquibus, Oxychoe
non, & Oloschoenon dixerunt. Præterea cum ceteros masculino genere plerumq̃ dixē-
runt, hanc foeminino dixerunt. Nos, quia non licebat discriminē hoc uti, docentibus Plinio &
Celfo, ī Iuncorū genere eum constituitimus. Deinde, quoniam non satis id erat, sed oportebat
b iij

BARB.
Plin. libro. 12.
capite. 19.
Theoph. li. 4.
cap. 13. de na-
tura Iuncorū,
& li. 9. cap. 7.

VERG.

Cab alijs ratione aliqua fecerni, eodem Celfo autore rotundum diximus. Neque exlentibus his etiam rem totam, odoratum adiecimus. Locus in eo autore est libro. 3. cap. 21. suntque eius hæc uerba. Iunci quadrati & rotundi semine. Illud Cyperum, hoc schoenon græci dicunt. Pauloq; post. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascitur, sed quæ inter aromata afferuntur significabo. Ex quibus ratiocinari facile est, quia Schoenos a græcis uocetur Iuncus, quia terebintha sit rotundum, quia inter odorata numeretur, odoratum dici oportere.

Capitis grauedines tamen facit. Variat hic antiquiores græci libri. Nam in aliquibus καρι-
καριον, in aliquibus καρωτικόν legitur, neq; sensu in scriptore hoc, neq; eodē in homine periculo. Siquidē prior illa uox, caput aggrauās, simpliciter significat, quod multa possunt, & inter cæ-
tera ebrietas; altera nō dissimilē lethargo somnum indicat. Inexpugnabilis enim somni plura genera sunt; inter ea & καρος est, a lethargo tantum differens, quod in lethargo sequitur, in Caro somnus præcedit. Hunc Plinius semper soporem reddidit. Quæ autem uerior sit, & ex re ma-
gis lectio, nō satis pro cōperto nobis est.

Frangit præterea, maturat & aperit, μαλακτικόν, quod mollire est, in pluribus legitur. Credi-
musq; adiectā forte eam uocē, quoniam maturet hic Iuncus. Quod etiam θρυπτικόν passiuē legi-
tur, i. frangere. Sunt in quibus legatur θρεπτικόν, i. uutrire. Sed parum nobis id probatur, ideoq;
Cum pari Piperis pondere. Videtur pōderis huius mensura hic de- (nihil mutauimus.
esse, nisi forte æstimandam medicis eam reliquit.

Decoctio eius præterea insidētibus. Antiquiores aliqui græci habebāt ἀπόμα, quod deco-
ctum, aliqui ἀπερυμα, quod dilutū autore Plinio significat. Est autem dilutum, aqua humor
ue aliquis, in quo maduerit quippiā. Nos quoniam maiore ui decoctum, q̃ dilutū est. illud
seruauimus quod communius erat.

De CALAMO ODORATO. CAP. XIX.
*καλαμος
ἀρωματικός* **C**alamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus dense, geni-
culatus, & qui assulose frangitur, plena araneorū fistula, albicās,
lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus.

DVrinam potu ciet, quare cum Graminis, aut Apij semine coctus, in aque
subter cutem fusæ morbo, renū uitijis, stillicidio urinæ, ruptisq; cōmode
bibitur. Menses & potu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se,
aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo. Ad muliebres
infectus decoquitur. Et clysteribus imponitur. Suffusionibus, malagma-
tisq; odoris gratia, commiscetur.

B A R B A R I C O R O L L.
Calamus aromaticus, siue ut Hippocrates Myrēpsicos, id est, unguentarius & odoratus,
in Arabia nascens, cōmunis Indiæ, atq; Syriæ est. In qua uincit omnis a nostro mari stadijs, ut
Theophr. inquit. d. Inter Libanū montē, aliūq; ignobilem, nō ut Strabo, & alijs quidā existima-
uere Antilibanū, lacu Gennefaretide, ubi conuallis amplissima, et pulcherrima, quā Aulonem
cognominant, sed in cōualli modica prope stagnū, palustribus per estatē siccatis. In eo tricen-
stadijs Iuncus & Calamus odorati gignūtur. Sed præstantior odore Calamus, statim e longin-
quo inuitat. Mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis. Araneū eius, ut ait Plin. in fistula florē
appellant, magno Domitij errore in quadā Papinij poetæ syluula, non distinguētis harum di-
nem saccharū fundentem, ab odorata. Calamo præciū in libras denarij. u. Reliqua probatio, ut
niger sit. Dānantur aliubi. Nobilior, quo breuior & crassior, lentusq; in frangēdo. Succū eius
Elaterio similem excipiūt. Legi, & in Meotide odoratū nasci Calamū, radice subalbida, & sine
fistulis, plena intus, & amara, specie Acori. De quo & falsi quidā sunt, Acorū eam putantes.
Quanto autē amarior, tanto & calidior est Indico. Vtrūq; tamē genus Acorū odore superat.
Teredinibus ut Acorū incessitur. Omninoq; uicariū pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Her-
culis columnis, prorsusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non
sunt plane, maxima tamen germanitate uisuntur, ut autores pleriq; tradunt.

EX. M. VERG. COMM.

CALAMVS odoratus a Dioscoride appellatur. A Plutarcho in libello cui titulus est.
Quod bruta ratione utuntur, Arabicus dictus est; & quam hic natale solum illi Indiam
assignat,

Plin. lib. 12. ca-
pi. 23. & de a-
lijs generibus
Calamorum.
lib. 16. cap. 36.

assignat, ille Arabia. Quod & Theophr. indicat, et Plinius, qui in Arabia nasci eū confirmat. Cōmūem tñ Indis esse, & Syriæ, nostra ætate etiā adeo notū est, ut nō sit lōgius de eo agendū.

Relinquimus præterea qd' ad amaritudinē p̄nebat, p̄terea, q̄ in meliorib. ea uox nō legitur.

Dubitauimus etiā, legendū ne esset, simul cū gramine, & Ap̄i semine decoctū odoratū cala mū mēderi. &c. an distūgi duo illa oporteret, cū gramine scilicet, aut Ap̄i semine: p̄terea, q̄ utriusque lectiōis certæ essent in antiquis Græcis uoces.

Dubitauimus itē, reddi ne oporteret, cū gramine, aut graminis semine. Neq̄ ab re. cū seminis uox illa utrūq̄ facile cōplecti, & ambobus cōpetere posset. Placuitq̄ nobis in similibus, & quæ easdē uires haberent disiunctiōe uti, relinquereq̄ utentibus electiōem. propterea, q̄ in pluribus disiunctim ea legebantur, & si nō satis alterū utentibus esset in usu, geminanda, & cōiungenda medicis relinquere. Placuit etiā, gramē magis, q̄ graminis semen redde re. propterea, q̄ in decreis, & medicina graminis, hic ipse post docet decoctum eius, urinæ an gustū mēderi.

Assulose fragitur, Plinio, Vistruuioq̄, & plerisq̄ etiā alijs antiqua & honesta uox est: quā primū significant, quæ marmorarij in cædendo marmore fragmenta dispellunt, & quæ in frangendis alijs rebus in longitudinē magis, q̄ in latitudinē fragmenta distīciuntur. Et quoniā Calamus hic in frangēdo assulus huiusmodi ex se mittit, ideo a nobis sic redditus locus est. Id enī significant quos hic græce *εινδαχμοί* appellat.

Decoquitur fœminis ad insidendū. Nullum habetur certum muliebris mali genus, facile tamē est, ex curationis & remēdij ratiōe muliebrī locorū affectiōe aliquā intelligere. Iuniora dolores, eius partis reddiderūt. Nos quoniam nihil a Diosc. certum precipitur de ea re, mediis censendū relinquimus, nō omittentes tamen, uideri nobis ex hīs quæ alibi in similibus obseruauimus, menses, & quod ad menses pertineat magis ea uoce, q̄ dolores significari.

De BALSAMO CAP. XX
Balsamum, arbor albæ Violæ, Lycij, aut Pyracæthæ magnitudine cōspicitur. Folīū Rutæ proximū, longe cādidius, perpetuo uirēs, in Iudæa solū quadā ualle et Aegypto nascēs. Iis differēs modis, scabricia, p̄ceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, Theristū uocat, quasi demessile. Fortassis, quoniā ob gracilitatē facile demetatur.

BARBARI COROLL.

Balsamo aliq̄ Punicæ magnitudinem reddunt. Ramis frequentibus, semine Terebinthi, colore, amplitudine, figura: quod & odoratius quidam lachryma sua prædicant, Casamum, & Carbobalsamum uocantes.

EX M. VEGR. COMM.

Violæ, aut Lycij magnitudine crescit. Cum suspecta nobis fuisset hæc uox quæ est in Græcis *λυκίς*, id est, Violæ, cuius magnitudine Balsamū cōspici Dioscorides hic ait, nihil tamē mutauimus. propterea, q̄ in cunctis Græcis, quos hæcenus uidere licuit, integra et aperta uox illa inuenitur, nullaq̄ diuersæ lectiōis, nec obsoleta quidē uestigia aliubi uidētur: cū tamē parū ue rissimile sit, Dioscoridē arborē frutici plerūq̄ cubitali in magnitudine exquassē. Et quā Plinius Viti, Theophrastus uero Punicæ similē dixerūt, Violæ cōparasse. Nō dico autē Violā florē, sed eius plantā, quæ ramosa, pendētib. ex uno pediculo pluribus aliqñ, & diuersi coloris floribus, in Italia cubitalis, paulo ue altior floret. Nisi, forte cœli terræq̄ bñficio speciosior Viola alibi nascitur, & arborefcit. Sed parū id uerisimile est, nec sine ueterū autoritate credēdū. Caree ratiōe etiā, ad similitudinē tertij alicuius generis, duo alia inæqualia cōiunxisse, dicereq̄ Balsami arborē Violæ, aut Lycij magnitudine uideri. Siquidē Lyciū, siue Pyxacantham, i. buxæ spinā dicere eandē malis tricubitali altitudine hic paulo post esse dicit, quæ tri nullis Violis mensura hæcenus uisa, aut audita est. Ex his, quoniā nec Theophrasto, nec Plinio, nec sibīp̄s cōueniret hoc loco Dioscorides, suspicauimus subesse uicium. Quale autē id sit, & quomodo de instaurandū, nō ausim ego adferre: qm̄ nulla sit uitis, aut Punicæ cū Viola in Græcis appellatiōibus similitudo, nullq̄ cōcurrāt eisdē literę, aut syllabę, ex quibus licuisset sequaci cōiectura uerē lectiōis uestigia odorari. Non tatebimus tamē, quod hoc ipso momento scribētib. in mentē uenit, potuissē ab imperitis librarijs & herbarijs locū misceri. Quodq̄ unū, ac simplex erat *λυκίς*, i. geminari, & qm̄ notior Viola q̄ Lyciū sit, cū Lycio Leucoion etiā scribi, quæ tota Lycij similitudinis ad Balsamū in magnitudine relatio legitima est, & aliorū hystorū respōdet.

A

B

*βάλσαμος
πυρακάνθη*

θυσίστον

Theophr. lib.
9. cap. 6.
Plinius lib. 12.
cap. 25.

C Quod Pixacautha, id est, buxæ spina dicitur. Non dixissem ego hoc loco, *πυξάυθα*, id est, buxæam spinam, non *πυξάυθα*, quæ nulla in plantis est, legendum in Dioscoride esse, nisi interpretes alij voces magis q̄res secuti, numerum illic plantarum auxissent Violæ, aut Lycij, aut Pyracanthæ, &c. tria quæ, duo aliqui erant cōnumerātes. Lycium liquidè & Pyracantha idem sunt, si huic ipsi cum de Lycio agit credēdū est. Quæ enim inter Lycium & Pyracantham distūctūa legitur particula, appellationes Lycij alterat, non distinguē, & numerat plantas.

De OPOBALSAMO. CAP. XXI.

οποβάλσαμον

A Estiuus sub ortu canis ardoribus, arbos unguibus ferreis inciditur, manatq; e plaga succus, quem Opobalsamum uocāt: sed tã exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem q̄ seni, septeniue congij cogantur. Inibiq; pōdus duplo repēditur argēto. Succij probatio est, ut sitrecens, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, pellucidus, leuis, astringēs, ac modice mordēs gustu. Sed uarie uitiat, misto ab alijs quibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani unguento. Itē Susino, Metro pio, Melle, aut cypria Cera. Quod maleficiū facile deprehenditur. Nāq; merus in laneam uestē fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur notā relinqt. Vitiatu autē inhæret, & ut lac instillatus coagulat, qd' adulteratus nō efficit. Quinetiā syncerus in aqua, aut lacte celerrime liquatur, lactescit q; uitiatu uero olei modo innatat, se cōuoluēs, aut in stellę modū diffundēs. Syncerus, senescēs crassescit, deteriorq; redditur. Allucinātur q aqua concretū pessum ire, ad ima sidere arbitrātur, postea dissipatū supnatate.

D **C** **A** **E** **B** **A** **R** **I** **C** **O** **R** **O** **L** **L**.
CAeditur sub cauem, parte quā maxime uideatur esse pregnās, & caudice, & cæcumine. Sudore plaga manat æstate tota. Sarmēta quoq; eius & surculi odore pressatē, amputātur, & uenētū magno, alioquin grandesceret arbuscula, nisi succideretur. Balsamum Syluestre, Theophrastus reperit nūq; testis est. Omnibus odoribus Balsamū præferunt: quōdā in duobus tantum hortis, utroq; regio, altero iugerū, xx. altero pauciorū. Hiericunta nomināt, quanquā & Palmetis constitū, rāto quæstū, ut Iudæis opes ex Opobalsami uetigalibus creuissē, Trogus pdat. Is humili Piceæ, quidā Cyalo Terebinthoq; ut Strabo, quidā Myrto similē dixere. Sed Viti similiorē esse, Plinio cōstat. Maleolis feri cepta. Impletq; colles, uinearū modo, quæ pedatæ nō sunt. Tondetur, nitescitq; raris. Intra tertiu annū a satū fructifera. Folium Tuberis (id genus mali est) a Plinio reddi putant. Sed mendosum in eo locū esse arbitror. Nec tuberis scribēdum, sed Rutæ. nam & exēplaria sunt, in quibus ita legitur, foliū proximū rubet, corrupte, ut plerāq; alia, pro Rutæ. Alioq; Theophrastus, & Dioscorides Rutæ folio, sed exalbido Balsamū describūt. Pausanias nūc Myrto, nunc Sampsuco, a quo nō per b, sed per p, Balsamū pronūciatur. Id ipse in Arabia gigni scribit, arbore uiperis obsessā, quarum morsu nemo extinguitur: quoniā succo eo pastæ, noxiū uirus habere desinunt. Ab Hierosolymis captis serere silcus Balsamū cœpit. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Capillacē, Theristio uocāt. Alterū scabru, incuruū, fruticosum, odoratius, Ostracō. Tertiū Eumeces: quia procerius leui cortice. Huic secūda bonitas. Nouissima Theristo. Semē eius est uino proximū gustu, colore ruffo, nec sine pingui, peius in grano, qd' leuius, atq; uiridius. Ramus cassior Myrto. In cidebatur ante ferreis unguibus, sed qm ferro uitalia lēderētur, trāsijt usus ad uitru, & lapides, ossile sue cultellos. Incidētis manus artificij librametō tēperatur, ne qd ultra corticē desquamet lacessatur. Succus lanis parua colligitur in cornua, ex hjs nouo fistili conditur, crassior similis oleo, & in musto cādibus. Rubescit deinde, simulq; durefcit trāslucidus. Sub Alexan. & Theophr. tēporibus toto die estiuo unā conchā impleri iustū erat: omni uero sēcūditate maiore horum semicōgios bisfenos, e minore binos. At Plinij æuo etiā singulariū arborū largior erat uena. Ter omnibus pcutitur æstatibus. Postea deputatur. Amputatio ipsa & surculus. 800. uenit. Intra qntū demū annum, corticis ad medicamēta precij est etiam ante q̄ ligni. Ex hoc buxo sum est optimū, qd' est odoratissimū, & pōderosissimū, mordēs gustu, feruēs que in ore, Lachryma debet esse pinguis & tenuis modice ruffa, & in fricadō odorata cū austero. Secūdus

ro. Secundus cādidē color, Peior uiridis, crassiusq;. Pessimus niger, q̄ppe ut oleū senesceit. Ex oī
in cīsurā maxime pbatur, qđ ante semel fluxit. Vitiatur semē suo, ut uix possit dephēdi fraus.
Itē & oleo Rosē, Myrti, Resina, Galbano, neq̄ssime gūmi: quoniā ipsum quoq; inaresceit manu
inuerſa, & in aqua hīdet ut Balsamū. Quod Cera & Resina pmutatū est, in carbone nigriori flā
ma detegitur. Nam mentitum melle, contrahit mufcas, Metopio adulteratum, in aqua circu
lo candido cingitur. Nec aliubi Seplassiā maior improbitas. quippe sextarius, qui mille dena
rijs uendente silco emebatur, mox 300. tantum denarijs constabat.

E X M. V E R G. C O M M.

SEcta ferreis unguibus. &c. Credimus nos unguēs ferreos a ueteribus Græcis Ferramenta
dicta fuisse, quæ humani unguis figura cōuexa acie essent: qualia quodidie in fabrica uidentur
adhuc multa, quæ dimidiato orbe lunata ab eius partis similitudine, nomen inuenisse potue
runt. Sed quid, quod Plinius ferri adhibitionem omnino damnauit, in Balsamo colligendo?
Rependitur, quo loco nascitur, duplo ad pondus eius argento. Ideo scilicet, quod nullū
in eo adulterium committitur, id quod in alijs gūmis, oleis, & unguētis sit. Author Theophr.
lib. 9. qui inter cætera testatur, uendi purum & sine admixtione aliqua, duplo ad pondus eius
argento. Quod monuisse legētes placuit, ne cui frigidum id & sine ratione dictum uideretur.
Idq; etiam Plinius significasse uidetur.

Qui cūssime penetret. In Græcis habetur *ὑδαίνω*, quam uocem nouissimus Interpres, pel
lucidam interpretatus est, ex Plinio ut uidetur eam auguratus, qui Balsami lachrymam, inter
cætera dixit translucidam esse. Antiquus Dioscoridis interpres, serenam, nulla, ut nobis uide
tur, in Balsami notis significatione. Serapion, uelocis resolutionis, quasi *ὑδαίνω* tunc legere
tur. Nobis in eadem Græcorum lectione, nihil mutare placuit, sed bona fide, nec absurdo sen
su reddere ut legitur, qui cūssime penetret. quando græcis uerbū notissimum est *δαίνω*, quo
δαίτρυμι & *δαίνωμι*, ab altero extremo p. mediū aliqđ ad alterū transire, & absolui, moueriue
aliquid significēt, quod tenuitate sua potest Balsami liquor, qui a Plinio etiā tenuis laudatur.

Lactis modo albesceat, *γαλακταῖται* uertimus, lactis modo albesceat. ne si lactescit simpliciter di
xissemus, incertum legentibus esset, quæ nam ex tam multis lactis qualitatibus, sapore, f. can
dore, substantia, liquore, & hoc aut fluído, aut coagulato intelligenda esset. candorēq; elegi
mus: quoniam lac omne, semper, et in cunctis animantibus candido colore sit, deeatq; & tū
us sit, ex eo magis, quod inseparabile, præcipuū, necessariū, & sine quo nullū id erit, qđ ex cun
ctis alijs ostendi & indicari aliquid. Sic enim lacti candor competit, & inest, ut terræ pondor &
cessatio. Nec est qđ credat aliquis, posse eo uerbo significari fluído lactis liquore, deullesq; a
nobis reddi, lactis mō liqueſcit: qm̄ id etiā indicarat Dioscorides, celerrime dislingi, disſicq;.

DE XYLOBALSAMO. CAP. XXII

ELigni genere, quod Xylobalsamum uocāt, probatur recēs, tenue,
fuluū, odoratum, quadam tenus Opobalsamum spirās. Necessari
us etiā seminis erumpit usus. Quare eligatur flauum, plenū, grande, pō
derosum, mordens gustu, seruens in ore, modice Opobalsamum olens.
Adulteratur semine Hyperico simili, quod a Petra oppido defertur. Sed
coarguitur magnitudine, inanitate, uirū ignauia, sapore Piperis. Efficā
cissima uis inest succo, & qđ maxime calfaciens. Abstergit, quæ tenebras
oculorum pupillis offundunt. Medetur perfrictionibus uulue, cum ro
ſaceo cærato appositus. Mēses quoq;, secundas, & partus extrahit. Rigo
res illitu discutiit. Vlcera fordida expurgat, & cruda concoquit. Vrinam
potu ciet. Aegre spirantibus prodest. Datur in lacte contra aconitum
haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & anti
dotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima
ligno. Semen commode potui datur doloribus lateris, pulmonum ui
tīs, tussi, ischiadicis, comitalibus, uertiginosis, orthopnoicis, uri
næ difficultati, torminibus, ac serpentum morſibus. Ad muliebrēs sus

ξύλοβαλσαμον

C fitus perquam utile est. Vuluam aperit in defectionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum eadem habet vires, aliquanto minores. Ex aqua porum cruditatibus, torminosis, uulsiis, uenenatorum ictibus opitulatur. Urinam cit. Ad capitis uulnera cum sicca Iri conuenit. Squamas ossium extrahit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

X B A R B A R I C O R O L L.

Xylbalsamo precium in libras sex. Romæ in triumpho Imperatoris Vespasiani arbusculâ ostendere. Plærque in Aegypto nasci perhibent, regione quæ nunc Solis oculus, siue fons dicatur, quondam Heliopolis. Incidi autumno ad liquorem, qui & oleum Balsaminum uocatur. Strabo et in Syria Coele nasci prodidit, ualle illa fertili quæ Libanum & Antilibanum interiacet iuxta lacum Gennesarijtin. In Arabia quoque Sabæorum tractu maritimo. Admonendi sumus, Dioscoridem in huius mentionis calce dicere, Xylbalsami decoctum cum Iride sicca mederi capitis uulneribus. *Ἐν ἡγύῃ Ἰλνὸς λινθιδας*, nos squamas detrahre conuertimus, ut uel porriginem intelligas. Est enim porrigo, ut Celsus ait, ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, quæ a cute resoluuntur, modo sine ulcere, modo exulcerato loco. Vel quemadmodum recentiores, de squamis fractorum ossium. Sed & caruncula quæ inter uiuam & mortuam ossis ad usi partem subit expletura quod abscessit, quasi testa tenuis & angusta, ut idem Cornelius testatur, squama, id est, lepis, a Græcis appellata est. Liberum estimaturis esto.

De ASPALATHO. CAP. XXIII.

Aspalathus, quem alij Erysisceptron, alij Phasganon, Syri Diaxylon uocant, frutex est furculosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad unguentorum spissamenta pigmentarii utuntur. Optimus est grauis, detractio cortice rubens,

D aut in purpura uergens, odore, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum astrictione obtinet. Vnde decoctum cum uino ad oris ulcera coluenda conuenit. Ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur. Subiectum in pecto partum extrahit. Aluum sistit eius decoctum. Et sanguinis reiectionem potu cohibet. Urinæ difficultatem inflatione scilicet discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Aspalathus in Aegypto quoque nascitur. spina syluestris, magnitudine arboris modicæ, cædida flore rosæ: cuius radix unguentis expetitur. Idem frutex humilior in Syria, & Nisyro, Rhodiorumque insulis prouenit: quam alij Sceptrum Elisei, alij Adipsatheon, alij Dipsacon, alij Diacheron, ut Plinius, uel Diaxydon, ut Dioscorides, uocant. Nascitur & pluribus locis, sed non perinde odoratus. Tradunt in quocunque frutice, sed in Aspalatho amplius, cælesti arcu in eum innixio suauitatem odoris inenarrabilem fieri. Laudatur colore rufus, uel igneus, et odore Castorei. Permutatur in libras quindecim. Sane per Hispanias multæ & ad odores, & inter unguenta utuntur spina, quam uocant Aspalathum. Sed ea uulgaris est, ex qua fullonibus implentur urnæ. Radicisq; usus tantum habetur: nec dum comperi, si idem uulgaris spina, & topiaria, de qua in Acantho diximus. Radicem nigram Hippocrates cum uocat, radicem Galeo significat Aspalathi, crasse Phocidis agro commendatissimam.

E X M. V E R G. C O M M.

Aspalathon. Admodum proliuius est hic lapsus in Asphaltum, quod monemus propter indiligentes librarios. Asphaltus bitum est, Aspalathon inter odoratos frutices, & spinas censetur.

Sunt qui Phasganon appellant & Sphagnon. Quorum prior dictio Gladium indicat, altera autem ab iugulando, quod *εργάζην* greci dicunt, potuisse fieri uidetur. Credimusque non sic dictum Aspalathum ab aliquibus, quod aculeatus frutex gladii modo aculeis suis pungat et uulneret. Quod in Theocriti bucolicis pastor, a spina in pede percussus, ab alio monebatur, ne discalciatus per montem ingrederetur, qui Rhamnis & Aspalathis fronderet.

*Ἐν ἡγύῃ Ἰλνὸς λινθιδας
Ἰπποκράτης
Ἰπποκράτης
Ἰπποκράτης*

*Theophr. lib. 9.
cap. 7.
Plin. lib. 13. cap. 24.*

Syri, Dyaxilon. Eadem dicēdi forma, qua nos in Plinio eius florē Diaporphyron dici monuimus. Neq; hoc loco Diaxylo aliud significat, q̄ mediolignū. ex eo, q̄a lignosior est frutex.

Et contrarium ozenas. Ozenas nos adiecimus, quoniā & Plinius ita legit, Sanatoris uel cera, & ozenas, ut in pluribus græcorum adhuc legitur.

DE MUSCO CAP. XXIII

BRyon, id est, Muscus, a quibusdam Splachnon appellatur. In Cedro arbore, Populo alba, & Quercu inuenitur. Optimū est Cedrinum. Proximum Populneum. In quo genere cādidum & odoratius præstat, nigricans improbat, Astringendi uim habet. Decoctum insidentium uuluis utile. Vnguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur. Thymiamatum, acoporumq; compositionibus cōueniens.

BARBARICOROLL.

BRyon, hoc est, Muscus, uerbum ex uerbo. Dicitur & Ipnon. In Cyrenaica prouincia maxime probatur. Secūdum locum obtinet Cyprium, ab eo Phœnicium. Fertur & in Aegypto nasci, quin & in Gallia: nec dubitatur. Sunt & hoc nomine panni arētes muscoso uillo, quales & glādiseris sola fere, quæ uocatur Aegylops, fert, non in cortice modo, uerū e ramis dependētes cubitali magnitudine, sed odore præstantes. Candidissimis, atq; altissimis prima dignatio, proxima rutilis, nulla nigricans, & in insulis petrisc; nati damnātur, omnesq; quibus Palmariū, atq; non suus odor est. Ex Bryo & balanino oleo expeditissimū, primūq; unguētum fuisse uerteribus tradunt. Differentia hæc: q̄ Bryon aliarū arborum canī quidam sunt, ut dixi, Brion uero Populi candidæ uua circa Gnidum optima, aut Cariam, insidentibus, aspersiq;. Secūda in Lycia Cedro pertinentem ad unguentum prædicat, Paulus & in Picea uel Larice Bryon nasci prodidit a Galeno priore scriptum. Est & Bryon *βαλάνιον*, hoc est, marinū, ut suo dicitur loco, Paulus, preciofissimum odoris genus est, & quod Muscus uulgo nominatur ab Aetio, iteq; Paulo, sed & a Phocione grāmatico. Recentior Mosehus odoratus capræ, seu quod idem est, dorcadis peregrinæ fanies ē ex umbilico eius, aut uomica, Gazellā uocant animal id barbari, ut uerba Hieronymi ad Demetriadem, hoc nonnullis significant. Muscus inquit, & Oenāthe ex peregrini muris pellicula. Sed Muscus Hieronymo aliud non est q̄ Bryon, de quo hic agitur. Nam & Plinius eadem fere mentione de Bryo & Oenanthe disputat. Quis autē sit peregrinus mus, odorata celebratur pellicula, non uideo, nisi quis animal hoc intelligat, ex quo Zibetū, siue ut recentiores græci uocant Zapetion excipitur: quanquam & compositionis quoddā genus est Zapetion ex animalis Musco, Agalocho, & orientali succino. Hæc ipsa cōpositio etiā Neruocari solet a græcis quibusdā. Sed uox est Arabica. Inuenio & Muscilion dici quandam herbam, ab odore Musci, ut conijcio, quam & Dorcida uocant, naribus uitiōsis & fortentibus accommodatā: ut Aetius existimat. nisi quis pro Diētano accipiat, qd̄ & Dorcidū appellat.

EX M. VEGR. COMM.

Splachnon. Ex qua ratione, nullam nobis habet manifestam rationē. Siquidem græci, *σπλάχνον*, quæ latinis exta sunt, appellauerūt, nec ē q̄ animatiū extis: & Musco arborum cōueniat. Cedro. Illud animaduertēdum, quas hic Cedros dicit, Aeginetā Pinos dicere, sed uiciū subesse credimus, quoniam statim Dioscoridi subscribens, omnibus alijs cedrinum Muscum, & ipse antefert.

Populo alba. Non uidetur & uicio carere. Cedri tantum meminit, & albę Populi, desideratur enim Quercus. Nisi legētib; damnatam uoluerit esse, quam tacitus arborem præterisset.

Habet adstringendi uim. Ne hic etiam conuenit Dioscorides cum Paulo, quoniam hic adstringere, ille discutere, & medicoriter mollire dixit. paruo, ut uidetur, discrimine: quod peritioribus censendum relinquimus.

DE AGALLOCHO CAP. XXV

AGallochum, lignum est, quod ex India atq; Arabia deportatur, Thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cū quadam amaritudine. Cute uestitur aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halitus gratia. Sudores arcecto

A

Bryon

σπλάχνον

Plin. lib. 12.
capite. 29.

B

Agallochon
Thuiæ

Cto corpori insparsum. Pro Thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmę unius pondere, humida stomachi uitia, et imbecillitatē, seruo rēq; mulcet. Si lateris, iocinerisue dolor ex cruciat, si dysenterię, aut tormina infestāt, ex aqua bibere pdest.

BARB.

A Galochon Aetius & medicorum vulgus Xylaloen idest, lignum Aloes appellāt: a nonnulla similitudine coloris Aloes, ut arbitror. Nō animadueto ubi de hoc genere loquitur Galenus. Recentiores gręci tradūt sub terra condi solitū Agalochon, nō alias odoratū futurum, q̄ ubi teredinibus computruit. Fastigia eius summa quatuor. Indictū, Sapphicum, ex urbe Sappho, Speon, & Hygron, idest, humidum, quod ipsum deinde in species quatuor conciditur. Arabes nonnulli semen huius arboris esse uolunt, id quod Haormiam ipsi uocāt, similitudine Piperis minuti, colore subrubēs, quapropter & Piperellam dixerunt. Agalochon Aetius in thymiamate myreplico idē esse, quod & Tarum putat. De Taro Plinius. Ex Caffia inquit, et Cinnami cōfinio Cancamum, & Tarum inuehitur per Nabathos, Troglodytasq; ijs uicinis.

VERG.

Quod, scribente & commentante hac Dioscoride, barbara appellatione Agalochon dicebatur, secuta Gręcorum ætas Xylaloen, facta ab amaritudine nomine, quasi Aloes lignum appellauit. Tradideruntq; id posteriores Gręci, quibus quantum credendū sit, ex huius scriptoris historia & notis facile erit nouisse. Paulus Aegineta, nihil non idē, Dioscoridi de eo tradit, etiam usq; ad uerbum: in hoc uero tantū diuersus, quod non *παιρῶς πόνοισ*, ut Dioscorides, lateris doloribus, uerum *παιρῶς πόνοισ*, idest, laterali dolori opitulari eam ait, quæ quantum differant, alibi diximus.

Thyis ligno simile. Quæ sit hæc arbor, non facile nobis fuit coniungere, Theophrastus eam libro primo, inter siluestres arbores, quæ perpetuo frondent, numerat, nec Cupressō dissimilem alibi descripsit. Credideruntq; aliqui, eam esse, quam Homerus quinta Odissę rhapsodia, a Circe ad odorē sumi & lucē incendi dixit. Et quā Plin. lib. 13. Trogerem, ab alijs uocari ait. Licet non iisdem literis in Homero, & Theophrasto utraq; scribatur, liceatq; ob id, non esse in utroq; eundem suspicari. Variantq; antiquiores gręci etiam ad hoc loco. Suntq; in quibus non Thyiæ, sed Sorbo simile Agolochō legatur: quod more nostro, ne quid. s. relinquatur, dictis hætenus a nobis adscribitur.

¶ De Narcaphtho. CAP. XXVI.

D

*νάρκαφθον
νάρκαφθον*

Narcaphthum ex India desertur, corticosum, simile Sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus uulua suffitus prodest.

BARBARI COROLL.

Narcaphthon prætermisum a Plinio arbitror consulto, q̄a incerta esset natura eius. ut aliorū quoq; plurimū: quæ ille orbi nostro tantū nominib. cognita esse tradit, ut sericatū, gabaliumq;. Paulus & Lacaphthō nominat, inter ea, quæ a quibsdā in Cyphiheliaci adduntur: et corticē Picceæ, uel alterius arboris existimat. Ego Lacaphthon idē esse cū Narcaphtho ratus sum.

EX M. VERG. COMM.

In antiquissimo quodam codice sublatū erat hoc caput, nec deprehendi aliquod eius uestigium potuit, sed ne Plinius quoq; meminit: quod equidem sciam hoc loco. Suntq; in quibus id confirmaret, qui habet fere omnia, quę hic dicuntur.

Quod torminibus subuenit. Variant ab impresso duobus locis hoc capite antiquiores gręci. In aliquibus enim legitur, *ἡ νάρκαφθον ἔρχεται*, idest, quod torminibus subuenit, nullo eius remedijs antiqui alicuius scriptoris testimonio. Siquidem nec Paulus Aegineta in Narcaphtho meminit, neq; antiqua Dioscoridis translatio, ideo nos id negleximus.

Astictis foeminarum locis. Sūt in quibus *ἡ νάρκαφθον*, & in quibus *ἡ νάρκαφθον* legitur: significatq; altera uox, quod angustum præclusumq; sit, altera quod astrictū, nec humores remittens: qualia sunt in ulla uitio curta, aut rimosa fistilia, primumq; illud angustiatū & præclusionis uitium, quod gręci *σπῆμον* dicunt, in ostio muliebrium locorum, ex præcedente exulceratione, aut durata illic inflammatione sit. Alterū ad suppressos menses, et eius partis fluores pertinet. Nos in ambiguo id malimus, qđ ab antiquo medicę, autore Pau. Aegineta cōfirmabatur.

¶ De Cancamo. CAP. XXVII.

*κάνκαμον
κάνκαμον*

Cancamum Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodammodo similis, olidi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes

eo ex Styraçe & Myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto, aliquot dies ebibatur. Lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis. Menfes cum aqua mulsâ pellit. Oculorum cicatrices confestim emendat. Vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. Aduersus gingiuas humore pregnanteis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

B A R B A R I C O R O L L.
Cancamum ex collimitio Casiæ, Cinnamici per Nabathæos, Troglodytasq; confines aduehitur. Qui consedere ex Nabathæis, nomine solo compertum Plinio. Nec sum nescius Laccam a barbaris hoc genus uocari aliam, q; quæ de Purpurarum floccis conficitur tinctoribus. Est & gummi quoddam arboris Lacca dictum, & tinctoris utile. Nec an ea Cancamum sit hoc de quo agitur, satis habeo comptum. Democritus certe, si modo eius liber est qui de tingenda Purpura circumfertur, Lacchan nominat inter colores hoc, et florem Achaicum appellat: idē autor, sicut florē Syriacū, quod Rhiziō priuatim uocari tradit ad eundē usū. Sit autē hos Achaicus, aut Syriacus id quod nos modo Cremes dicimus, an diuersum, nō cōstat. Paulus odoratum esse Cancamum prodidit. Differt Cancamum a Cancano, q; Cancanus herba est a Galeo dicta, a Dioscoride Calalia. Nam Caucalis alia est, ut post dicitur. In quo foedissime neoterici diffiluuant, Græci lignum quoq; aridum Cancanon appellant.

Plin. libro .12.
capite. 20.

E X M. V E R G. C O M M.
Laxandi uices ultra odoris usum Cancamo Aegineta tribuit. Nec relinquiti etiam, quod hic ait, potu eius ad gracilitatem obesos contrahi.

Cicatricem oculorum exterit. Cicatricem uocat Galenus, cum in nigra oculi parte ex profunda ulceratione crassior oculo membrana superuenit, & candido colore conspicitur.

DE CYPHI. CAP. XXVIII.
Cyphi, thymiamatis compositio est, dicata Dijs, qua abūde Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet. Suspiriosis datur in potu. Permultæ cōponendi rationes, quarū una hæc est. Sumitur Cyperi dimidiū sextariū, cū pari Iuniperi adultæ modo. Vuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim. Resinæ repurgatæ minas quinq; Calami, & Iunci odoratorum, & Aspalathi, singulorum minam. Myrrhæ duodecim. Vini ueteris sextarios nouem, cum duabus Mellis minis. Vuā detractis uinaceis tufam, cū uino & Myrrha subigito, cætera tufa & cribrata adijcito, die uno humorem conbibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem. eliquatam Resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

B A R B A R I C O R O L L.
Cyphi urebantur uestiginis omnibus Aegyptij, Matutinis Resina, Meridianis myrrha. Ea erat miscella, ut Plutarchus inquit, sexdecim literis sacris contenta, ex melle, uino, uua passa, cypero, resina, seseli, aspalatho, myrrha, bitumine, iunco, bryo, calamo, utroq; iunipero, cardamomo, lapatho. Quamquam Lacaphtho forte, nō Lapatho scribendum sit in Plutarcho, ut ex his quæ in Nascaphtho diximus comprehendere potest. Confundebantur hæc nō temere, aut fortuito, sed præuentibus de scripto, qui rationem & ordinem præcinerent, quo quicq; loco, tempore, mensura, cōficiendū esset. Placuit uero numerus sexdecim, q; is e quadrato quadratus existeret. Talis. n. linea circumcurrens per oras, æqualem cum area sua mensum habet. De quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis autoribus de Iside & Osiride condidimus. Sunt & aliæ thymiamatis huius, & pro arbitrio cuiusq; rationes, sed duæ in medicina cognominis insignibus, Heliacon & Seleniacum, hoc est, solarium & lunare.

E X M. V E R G. C O M M.
Erant Cyphæos huius confectiões uariæ, quod hic a principio statim testatur. Videturq;
c ij

C hoc loco ea describi, quæ in frequentiori medicinæ usu, forte & notior omnibus erat. Nā quæ a Plutarcho describitur, amplior est. Hæc decem, illa sexdecim rebus constat, ad explendum quadratum numerum. Non tacendum etiam hoc loco, quod suspicati sæpe sumus, non esse Dioscoridis legitimum hoc caput, quod in antiquissimo omnium mihi & probatissimo codice non legitur, nec eius meminerit Paulus Aegineta, cum medicam omnem materiam lib. 6. p. curreret, quod agendum nō erat hominī, qui in curandis morbis, usus eo sepe numero fuisset. Quodque in eam suspicionem nos magis traxit, illud est: quod parum uerisimile est, simplicem medicam materiam docentē hominem, compositam illi miscuisse. Nec est quod miretur aliquis, in græcorum scriptorum codicibus, tam multas & tam grauēs labe. Quo em̄ malo facto latīna res iam pridē perijt, eodē & Græcā collabefacta est, et qđ adhiēdi cōtinue antiquo r̄ū decrēdis aliqd, uiciū nunc oēs tenet, idē antigores tenuit: dū uolumus oēs aut sapientiores uideri, aut ocio consulentes, parata & exposita eodē loco omnia habere. Suspicio tñ, non decretum hoc sit. Neq; enim nos rem damnamus, nec legētibz inutile fuerit, rā multa de Aegyptiorum Sacerdotum & medicorum Cyphi narrata a nobis, & ex antiquitate repetita fuisse.

DE CROCO. CAP. XXIX.

C Rocum ab aliquibus Castor, ab alijs Cynomorphos, a magis Herculis sãguis appellatur. Optimū in medēdi usu Corycēū, recēs, et boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreo lo, oblōgū, oibus suis partibus cōstās, nō fragile, plenū, a quo detractū ē nihil, qđ madefactas manus inficit, nec sitū redolet, aut carie sentit, subacre. Sin huius generis nō ē, aut uetus, aut humore pfusum creditur. Secūdus locus datur Coryceo, e tractu Lycij cōtermio. Tertius Lycio, e mōte Olympo. Dein ex Aegibus Aero liē. Cyrenaicū e Centoriā, inter sicilica oīa uiribus p̄stat. Omnīū ad obsonia usus. Itali tñ ob succi copīā, et coloris uenustatē, ad Thuīē infectus uisurparūt. qbus de causis magno uēditur. Vtilissimū in medicina qđ ante descripsimus. Adulteratur imisto Crocomagmate tuso, atq; etiā Sapē sublitu cōtrita, q̄ pōdus adijciatur, simul argēti spuma, aut Plumbagine. Sed maleficiū declarat infidēs puluis, p̄ferēti si Sapā oleat. Thessalus ipm̄ tñ odoratū esse uoluit. Alij exitiosū, trib. drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquēdi, emolliēdi, atq; substringēdi habet. Vrinā cit. Elegātē colore p̄stat. Qui ex Passō biberint, crapulā nō scēt. Oculorū fluxiōes, illitū cū humano lacte, cohibet. Additur in potiōes, quę interaneorū causa tempantur. Ad uulū etiā, sedisq; cataplasmata comode pmiscetur. Venerē stimulat. Vergentes ad ignem sacrum inflāmationes mulcet. Auricularijs collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido fictili sole siccatū oportet, celeriterq; uersari. Vrinam mouet radix ex Passō pota.

BARBARI COROLL.

C Rocum folio angusto, adusq; capillamenti exilitatem, germine ac flore serotino, per autumnum occasu uergiliarum: qui paucissimis diebus marcescat. Cum folio florē expellit obiter, quin & prius uidetur. Subest radix multa, carnosā, peruiçax. Calcatum melius surgit, & quasi pereundo lætius prouenit: semitas eo fontesq; amat. Seritur radix Bulbo. Duo genera eius, montanum, & satiuū. Prius hebes, posterius odoratū, utrunq; primis imbribus. Emicat autumnō, ut dixi, post Aphacen. Modori duo genera, candidum, ac spinosum. Viret bruma, & colligitur, siccatq; in sole. Sed in umbra melius est Hyberna. Crocū syluestre optimū. Sere re in Italia nō expedit, ad scrupula usq; singula areis decoquentibus. Satiū maius, nitidiusq; sed leui momēto degenerat. Omnino infœcundū natura ubiq; uel Cyrenis, ubi laudatissima oīa. Quidā Phlegro Croco scđm locū adfiscūt. Probatio, synceri, ut manu imposita crepet, ueluti

Plin. lib. 21.
capite. 6.

ueluti fragile: dilutum et humidū sedet. Altera probatio, si manu plata ad os, leniter facie, oculi-
 osq; mordeat. Esse inquit Plinius, & per se genus satui blandissimum, uulgo cum sit medio sui
 candidū Dialacon uocatū. Cyrenaico uitiū, q̄ omni Croco nigrius, & q̄ celerrime corrū-
 pitur. Laudatur breuib; capillis in Lycia. Año septimo, uel octauo transfertur in locū suba-
 ctū: atq; ita degenerans reuocatur. Vfus eius in coronis nultq; ppter angustia folij, nisi quē ad
 mulcendā ebrietatē fieri a quibsdam soleāt. Vno mire congruit, p̄cipue dulci, quo & aqua
 facillime soluitur, nulloq; alio dulci. Tritū ad theatra replenda, utq; hoc non ulli apud Diosco-
 ridem intelligant, cum *στίνικ* dicit, errore librariorum *στίνικ* pro *στίνικ* scribentū. Sed nos inuita
 re lectionem antiquam, ausi non sumus. Ideo q̄, mortarijs diligendis, conuerimus. p̄sertim cū
 de mortarijs atq; Croco mentionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Afferuatur pixi-
 decula e cornu. Acerima Croco uis tribuitur: ut illarū manus palmę, cōtinuo pueniat ad cor.

EX M. VEGR. C O M M.

Croci appellatio nulla est a nobis certa ratio, quę plures etiam, quam in impresso Dio-
 scoride, in antiquis alijs gręcis leguntur. nihil igitur de his agemus.

Integer, friabilis. In aliquot gręcis legitur, *ἄσπερος*, quod est fragile, & tenaci lentore durū.
 In aliquot uero, *ὑθρανος*, quod friabile significat, contrario penitus sensu: prioremq; illam lecti-
 onem, secuti sunt iuniores omnes. Plinius alteram his uerbis cōfirmat. Probatio synceri impo-
 sita manu, crepat ueluti fragile, nosq; in ambiguo hanc magis probauimus, non tam Plinij au-
 thoritate, q̄ necessitate & usu eius admoniti. friato em̄ Croco plerumq; in medicinis utimur.

Et sine unguine plenus: &c. Sequitur eam mox uocem alia, quę penitus corrupta est, *ἀνι-
 λνός*, s. cum *ἀνιλεῖν* legi oporteat, idest, qui nullo unguine uuecat, non cui nihil deficit: idq; meli-
 ores gręci adhuc habent. Nec obstat quod Plinius decreuit, optimū ubicunq; quod pingui-
 simum. Crassitudinem enim, non unguem eā uoce significauit.

Et cum malefcit, manus inficiens. Obseruauimus, non eodem modo in cunctis legi *ἐμ-
 πνῶν* in *ἀνιλεῖν* τὸ *χίρμα*. Sed in alijs, ut modo scripsimus, manifesta significatione, infici at-
 tritu Croci manus: In alijs, *ἀνιλεῖν*, idest, cum humore diluitur: quod quoniā uni
 uerso Croco cōmune est, minus ideo nobis placuit.

Resistimus idemdem non multo post, uocem quę in cunctis alijs, pręterq; in eo qui mi-
 hi omnium codex probatissimus est, perierat, illic, s. ubi hic ait. Qui enim talis non fuerit, &c.
 Deerat enim, *ἄσπερος*, quod nos in tempestiue lectum diximus, manifesta eius uocis iactura, & ne
 cessaria instauratione. Incertus ab hoc loco, nec sequax sermonis cursus est: non tñ in intellectum
 adeo confundit, ut non facile dissimulari, aut ex Plinio in integrum restitui non poterit.

Et ex Olympo Lyciæ monte affertur. *Αντίον δὲ ὁ ἐν τῷ πρὸς Λυκίαν κυρίῳ, καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ Λυκίαν
 ὀλύμπε*. Articulus prępositiuus, & Coricij in genitiuo casu, illic accurrentes, legitimam sermo-
 nis seriem miscent. Ideoq; nos secundę bonitatis, a Coricio, ex Cilicio esse diximus, eum qui
 ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte afferatur, nullā earum uocem perire nobis utilē
 patientes. Cum alioqui licuisset ex Plinio, breuius & certius totam absoluerē rem. Siquidem il-
 le etiam sic decreuit. Prima nobilitas Cilicio Croco, & ibi in Corico monte, dein Lycio monte
 Olympo. Sed nos qualē nostra habet ætas, Dioscoridē in terpretamur, nō Pliniū exscribimus.

Gravius in Cyrenaico Croco. A librarijs peccatum est. nihil enim illi redditur. Verum sta-
 tim ad eos qui in Sicilia nascuntur translatus sermo est, tam incerto intellectu, ut nos hiatum
 illic reliquerimus, qui a doctioribus aliquando expleatur. Credimusq; nos, uitiū aliquod in
 Cyrenaico significasse Dioscoridem, quod tamen nunc non legitur, quale Plinius in eo nigre-
 dinem damnauit. Mox de Siculis egisse, omniumq; in ea insula nascentium Centuripinū igna-
 uissimum, satiosq; omnes hos esse, ideoq; ignauiores. Quoniā autem Plinio, optimū sil-
 uestre sit. In antiquorib; gręcis aliquot, certissimo sēsu & intellectu hic locus adhuc inuenitur.

Miscetur pręterea, &c. Desyderatur hic certi morbi genus, quod facile conijcitur.

De Crocomagmate. C A P. XXX

Itetiā exp̄ssis unguenti crocini odoramētis, qđ Crocomagma uo-
 cāt. Optimū ē odoratū, modice Myrrhā olēs, graue, nigrū, ligni ex
 pers, leue, subamarū, qđ madefactū Croci colorē reddit, gustatūq; uehe-
 mētē dētes ac linguā inficit: multis durās ańis. Quale ē qđ a Syria defer-
 tur. Habet suas uires ad delēda quę caliginē oculis obuerfant. Vrinā cit,
 c. iij.

A

Διαλέκων

B

κροκομαγμα

C Calfacit, concoquit, & emollit, Vires Croci proportionem representat, quandoquidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

B A R B A R I C O R O L L.
C Crocomagma uerbū ex uerbo *seph* olei Crocini est, nam *seph* unguetorum *Magma* græci appellat, & consperionem, siue massam quæ subacta sit, *Ecmagma*, quo nomine inquit *Galenus*, ipsum quoque Crocomagma significamus.

E X M. V E R G. C O M M.
S Vnt græcis *Magma*, quæ expressa materia aliqua, supsunt, crassa, feculenta, & lignosa. Verbi causa. Si tusa *Plataginis* folia in usū aliquem manib. aut p̄lo exp̄serit medicus, quod supest terrestre, lignosūq; id *Magma* dici posset. Sed qm̄ nullus similitum usus ē, ideo in nullo huiuscemōi id nomē inuenit: seruati tñ id est tñ in *ijs*, q̄rū et humoris, et exp̄sse substantiæ alicuius usus est: ut in *Rosacio*, alijsq; huiuscemodini multis. Ex hoc genere *Crocomagma* est.

Fit aut̄ sic. Oleū primū in spissatur, idq; aliquibus aromatis. mox *Crocus* infunditur. post ali quōt dies oleum colatur, expresso oleo. quod superest, *Crocomagma* dicitur. Vnde fiunt *passilli*. *Celsus* lib. 5. uocat *Recrementum*. *Plinius*, *Vnguenti* *sephem*.

Et mediocriter *myrrhatum* est. *μύρρον κατά σμύρνον*, id est, nōn odore solum, sed tota *Myrrhe* substantia mediocriter *myrrhatum*.

Dēterq; et linguā ad aliquo thoras inficit. Nō significat qd̄ statū seq̄tur, *ἡμικρινετι ενχυδα ὄρωρ* qd̄ ex *Gallia* interps̄ dixit, multis añis perennare *Crocomagma*. Non em̄ quas hic ὄρωρ dicit, *Poetarū* more años significat, sed de colore eius agit *Dioscorides*, quē testatur, cū linguā et dētes semel infecerit, aliq̄t continuis horis p̄manere, cū aliq̄n cōtinua oris pituita dilui deberet.

De Helenio . C A P. XXXI.
H Eleniū, qd̄ *Symphitō* aliq̄ uocat, alijs *Persicā*, alijs *Medicā*, alijs *Ore* *stū*, alijs *Nectariō*, alijs *Cleoniā*, alijs *Ideā* *Barō*, aut *flomū*. Latini *Terminaliū*, aut *Enulā* cāpanā, *Aegyptij* *Lenē*. Folia habet *Verbasci*, an gustioris folij, asperiora, oblōga. Caulē q̄busdā in locis nō emittit. Radice subalbā, interdum subruſſam, odoratā, acrē, uegetam, magnam, ex qua agnatæ appendices *Liliorum*, aut *Ari* modo seruntur. Montibus in umbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimq; dissecta siccatur. Potum radice decoctum, menses & urinas ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle, pdestussis, orthopnœæ, ruptis, cōuulsis, inflatiōib. et serpentiū morſib. In sumā, excalfaciēs. Folia ex uino cocta utiliter ischiadicis illinūtur. *Heleniū* stomacho utile, i passō cōditū. siq̄dē *salgamarij* paululū siccata radice, mox decocta, & frigida aqua madefactā, in *Sapā* cōijciunt, et ad usum recōdūt. Trita, potaq; ad cruentas excreatiōes efficacis est.

B A R B A R I C O R O L L.
H Eleniū, *Enula*, siue *Inula*, sed duplici natura, folio *Serpilli*: de qua statū post diceſ. Altera folio *Verbasci* exilioris, de qua nūc agitur. Breuior hęc q̄ *Pastinaca* ē, sed torosior, amariorq; et nisi tēpetur liq̄do dulci, stomacho inimicissima. Sed plurib. modis austeritate uicta, gratiā inuenit. Nā & *Vuis* passis, & defruto, & melle subigis in pollinē tusa: et pinguib. quoq; *Caryotis*, iam *Cotoneis*, *Malis*, *Sorbis*, et *Prunis*, aliquando *Pipere* atq; *Thymo* illustrata, maxime *Iulij* augusti quotidianō cibo. Superuacū eius semen, qm̄, ut *Dioscorides* meminit, *paginibus* seritur, modo quo *harundines*, magnisq; interuallis, neq; ullo minus quaternorū pedū: quoniam spaciōse fruticat.

E X M. V E R G. C O M M.
E Lenion. Siue a lachrymis *Helenis*, siue ut alijs dixerunt, quoniam contra serpētes ex eo primum a muliere illa remedium inuentum est.

Symphyton. Inuenisse id nomen uidetur, ex sobole adnatissq; illis, quæ in radicibus *Liliorum* modo

rum modo *ευφρόνται*, idest, connascentur, & herent.

Sūt q̃ medicā & Nectārē. Scilicet factō a regiōe noīe, et a dulcedine. Sic Persicam, sic Cleonīā dictā etiā cōijcere licet. Etsi in probatissimo mihi codice, non simpliciter *κλεονιον* legitur, sed *εὐφροσιν κλεονιον*, idest, Buglossum Cleonium.

Apuleius etiā Chironion Panacen dicit uocari. Vt in alterutro uitium sit; adiectumque hoc a nobis est, ne quid obseruatum & inuentum haftenus relinquere.

Orestium. Caullam ignoramus. Nisi forte Orestis & Helenæ propinquitās, communem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit.

Sunt qui Rubum Idæum. Verbascum Idæum, ex sola similitudine (ut toto hoc opere insinuat alia) factæ sunt. Et quoniam copiosum in mōte Ida nasceretur, ideo loci, & regionis discrimine, a proprie dictis, de Rubo & Verbasco, discretum est.

Terminaliū. Vnde Romani sic dixerint, modo integra ea uox est, nihil cōpertū habemus.

Inulam campanam. Inulam dici antiq̃ omnes testantur, nullibi tamē ex Campania magis, q̃ aliūdē ab illis laudatur. Suspīcamurq; nos, multas in scriptore hoc, nō legīmas esse appellationes, deincepsq; tēpora inseras, aliena & pegrina admiratibus cūctis, eoq; magis in Romangrētis fortuna et impio, hāc grēcis miscere p̃p̃rijs placuisse, & ex p̃pinq̃ urbi regione laudauisse.

Folia habet angustiora folio Verbasco. &c. Id ex Verbasci historia parebit. Qd̃ utinā in caule pariter liceret, quoniā hic ait, aliquibus locis in Inula nō proferri, nulla eorū locorū certa indicatione, quā merito omnes desiderēt, multoq; magis ubi caulescat hoc olus, & caulis, & floris, & semini certam rationem & historiam, quam iuniores aliqui non ex se, sed ab hoc scriptore acceptā redderūt. Quod enim in impresso, cunctisq; alijs fere grēcis nō legitur, in antiquissimo & probatissimo mihi codice adhuc seruat, describiturq; in eo caulis appellatione, quod in Inula crescit, his uerbis. Caulem ex se mittit Heleniū crassum, hirsutū, cubitalē, & aliq̃ maiorē, angulosumq; flores luteos, et in hīs semē Verbasco simile, tactū pruritū faciens. Licetq; hæc, ut diximus, tam aperte in Græcorum aliquo legatur, nō ideo tamē ceteros omnino dānamus. Obseruauimus enim, diuersitati huic caullam dedisse, mediam quandā in Inula crescentium naturam, quæ nec in caulium genere, nec fruticum ramulorū censi penitus possent. Siquidē caules plerūq; in singulis plantis, singulares sunt, nec nisi appertente flore & semine surgūt, ut in Lactucis, ac Betis, alijsq; oleribus huiuscemodi sit. In ula autē raro, & a principio statim fruticatur. p̃dit. Ramuli cōtra, fruticesue copiosiores & graciliores, q̃ in Inula sūt. quales in Ruta, Serpillo, alijsq; multis uidetur. Columella frutices, qd̃ in Inula extollit, dixit lib. 12.

B

Radicem habet intrus albescentem, foris rubescentem. Sic ex melioribus græcis legendū est.

Radicem habet odoratam, grandē, acrem. Sunt in quibus *ινφον*, quod est speciosam & crassam, & in quibus *ινκρη*, quod nos facili lentore mollem reddidimus, *ινμαλκτον* enim, τὸ *ινκρη* si gnificat. Probauimusq; hanc ratione magis, quod ad ostendendā eius quantitātē satis erat, qd̃ hic *μαλκτον*, id est, grandem dixerat. Liberum tamen hoc legentibus relinquatur.

Suspensum est nobis, quod in græcis omnibus legitur, cruentis spūis utilem esse Inulam. Non tam quia meliores græci nihil huiusmodi habent, quam quia non legitimo loco, se id ostendit. Debuerat enim in medicina, nō in extremo capite post eam tractari, a quo loco distantum, additum magis & aduentitium, quam natium & antiquum Dioscoridi uidetur; relinquimusq; petitionibus de eo censendum.

DE ALTERO HELENIO. CAP. XXXII.

Alterū Helenij genus in AEgypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpilli modo per humum repentibus. Folijs Lenticulæ, sed longioribus, crebrisq; Radice pallida, digiti minoris crassitudine, p̃ma tenui, sup̃ne crassa. Cortice nigro. Nasctur in maritimis, collibusq; Radix una in uino epota, cōtra serpētū iētus auxiliatur.

Helenium hoc posterius, nostris Inulam appellari posse, non uideo. Theophrastus interim Velenion, Aristoteles Belenion scribere: si modo liber eius est, qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Belenium inquit, delibutorū in Perside uenenum erat, & in AEgyptum & Palestinam translatum, sine periculo mandī cōpit. Hæc commentatio Græcis perierat. Habebatur in arabico, demū cōuersa est in græcum sermonem a quodā, ut ferūt, Maximo.

C propterea quædam in eo libro barbara fruticū & radicū leguntur nomina, ut sunt, Benteli, Nenuphar, Opinais, & aliquot huiusmodi. Nenuphar pro Nympha quidē capitur Arabiæ: sed Benteli, & Opinais quid sit, parum liquet. Nisi quis Opinais pro Silphio intelligat: quoniam succum ex eo manare lentiusculum dicat, quem priuatim uocamus Opon. Benteos autem initio spicata esse traditur, mox in arborem grandescere. Sed redeamus ad Helenium, Plinius hoc Helenæ lachrymis enatū refert, dum gubernatorem Canopum, Hæmorrii serpentis ictu exanimatum fleuisset, hilaritatem, Hippocratis testimonio facit. Prædulcis in eo cremor. Radix cōtrita, mures necat, Cādida intus est, & dulcis, Dioscoridi uero pallida. Laudatissimū in Helena insula. Huius rami dodrātales a Plinio, cubitales a Dioscoride feruntur. Addebatur in coronamenta folium.

E X M A R. V E R G. C O M M.

C Redimus etiam in AEGYPTIA Inula corruptam esse illic uocem, quo loco in extrema totius capitis coronide, hic ait, uires illi esse, ut cū uino pota radix eius ua, serpētū moribus subueniat. Cur enim una magis, q̄ duabus, tribusue: & si quantitas in ea uoce decernenda fuerat, pondere potius q̄ numero, quod alioquin inæquale est, constitui debuerat. Id nos, una & altera litera mutatis, quod erat *uia*, id est, una, *uia* quod tritum significat, legendum esse arbitrati, tritam cum uino potam Inulæ radicem, remedio esse diximus.

Dioscoridi

O De OMPHACINO OLEO. CA. XXXIII.
Leum quod ex immaturis Oliuis exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accommodatissimū, Omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguetorū compositionibus idoneū intelligitur. Stomacho utile est, q̄ astringat. Gingiuas contrahit. Dentes firmat, si contineatur in ore. Sudores cohibet. Et quo uetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et ut reliqua in comune dicātur, omne oleum calfacit. Emollit uentrem. A perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̄ promptius ad obeūda munera reddit. Aluū leuigat. Vlcerationū medicamentū uires permittū hebetat. Cōtra uenena datur, assidue potum, redditumq̄ uomitionibus. Soluit aluum hemine mēfura, cum pari Pisanæ succo, aut aqua potum. Ad tormina, calidum si mul decocta Ruta tribus sextarijs in potu datur. Ventris animalia pellit. Idem maxime Ileii intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit, & uehementius discutit. Oculorū claritati sublitum cōfert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 17. ca. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. de omni oleo, Gale. 6. simp. pharma. capi. 19. 20. Ad Paternianum. cap. 199.

O Leum Omphacinū fit duobus modis, Olea adhuc alba expressa. Cādium deterius ex Druppa (ita enim uocatur a græcis, latinisq̄, priusquā tenera esui sit) iam tū luteola, coloremq̄ demutans. Hoc uiride Carō appellat, atq̄ utilius est. Est & Omphacinum siue Omphaciū e uite, de quo post Galenus Oleum nō Omphacinū, sed dulce fieri ex Druppa scribit. Alterū uero genus, qd̄ ex immaturis, albisq̄ premitur, & Omphacinū, & Omotribes appellari tradit, unguētis utilissimum e Phaulia, ut Theophrasto placet. Simile Omphacino sit Oleum, si olea ramus in condituram adiciatur. Quibusdam natura soli, nō conficiēdi ratio astrictiorum uim, qualis in Omphacino sentitur, dat, ut Hispaniensi nominato. Omphacinum, ab Omphace deducitur, unde acor ex uuis, græce appellatur Omphacium, & acerba uua Omphax, & acerbum mel Omphacomelei, ab eodem omnia uocabulo.

Galen. 6. sim. cap. 19. 20.

Oleum ex Druppa fieri dulcissimum, Galenus testis est, utiq̄ si ex maxime Druppa fiat, nō si ex Druppa tantū. Olei probi notæ apud Galenū sunt, ut sit q̄ dulcissimū, tenuissimū, purissimum, translucentum, quodq̄ modico eius cuti superfuso plurimū sese fundat, & facile combibatur. Cuiusmodi est, inquit, quod Sabina bacca premitur. Oleū cum aqua mixtū Hydrleon uocatur, & Chydon: quanquā posterius hoc Homero lustrationem fere significat. In Bastris iuxta

iuxta flumen Ochum, effossa terra fons manauit olei, quod quidem traditum ab his qui Alexā-
drires scripserunt; & Strabo credidit.

A

EX M. VERG. COMM.

Oleum Omphacinum, ὀμφακίνιον κρήνην, ὀμᾶ enim cruda significat, & ὀμφακί-
onniū plantarum acerbos adhuc fructus græci appellant.

Datur contra localia uenena. &c. Id est, cōtra Cicutani, Nigellam, herbā Apollinarē, Mā-
dragonā, Elateriū, &c. Nam his mixtum oleum hebetat operationem & maliciam eorum.

Cyathorum sex pondere. In cunctis, excepto probatissimo mihi codice, corylarū sex pon-
dus legitur. In illo Cyathorū: fuisseq; & ueterem lectionem, & antiquam mēsuram, testatur Plī-
nius lib. 27. dicēs tormina pellere oleum calidū, potū cyathis sex, magisq; Ruta simul decocta.

De OLEO siluestris Oliuæ. CAP. XXXIII.

Oleum quod siluestres Oliuæ fundunt, uehementer astringit, &
ad sanorum usus secundū sibi locū uendicat. In doloribus capitis
utiliter pro Rosaceo substituitur. Sudores arcet. Desfluētes capillos inhi-
bet. Furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit. Tardie
us caniciem sentiunt, qui eo quotidie perungūtur. Candidū oleum
fit hoc modo. Album colore, nec anniculo uetustius, in nouū fictile oris
patuli funditur, centū heminarū mensura, & sub solem mediā quaq; die
cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictuq; agi-
tatum respumet. Octaua die Foenū græcū mūdum quinquaginta drach-
marū pondere, calida aqua madefactū, donec emollecat, in supradictum
oleū deijcitur, ita ne exstillet aqua. Postea rede prapinguis Piceæ, affusa
tim cæse, æquale pōdus adijcitur, & trāfactis octo diebus, oleū cōcha mo-
uetur. Si intentū finem assequatur, in uas nouum uetere uino affusum re-
condi debet, substratis fertulæ Campanę corollis drachmas undecim pen-
dentibus, cum pari Iridis pondere. Sin minus, rursus soli mandandū, &
idem munus obeundum, usq; dum inalbescat.

ὀλεον ἐν τῷ
ὑγίει ὀλεον

ὀλεον ὑγίει

B

BARBARI COROLL.

Oleum ex Oliua siluestri, tenue, multoq; amariū q̄ ex satia. Vtile hoc ad medicamenta
fere tantū. de quo alio quoq; Dioscorides in ratione Oleastri & Oliuarum cōmemorat. Ari-
dissimū hoc Galenus inter olea describit; post hoc Histricū; mox Hispanū. Pinguissimū, Liby-
cum, & Cilicium. In pingui uero tenue Sabinū. Inter hæc media fere natura eorum, quæ Græ-
cia, & Asia, & Cyclades mittunt. Pausanias Tithoreum & Phocide cōmendat, Hispaniensis præ-
tulit & Histrico. Pingue lenticia, tenue, perspicuitas, & puritas consequuntur.

Gale. 6. simp.
cap. 19. 10.

Oleum cādidum aliud spēte, ut quod ex Oliua adhuc alba exprimitur, Omoribes uoca-
tum. Aliud factitium, ut de quo nunc agimus.

EX M. VERG. COMM.

Estillud ex Columella, alijsq; rei rusticę scriptoribus sciendum, plures antiquis fuisse oliui-
tates. Primam, in qua acerbum oleū exprimebatur, quod estiuū a tempore etiam dicebatur. Se-
cundā, quæ ante decembris Calend. fieret in qua uinde oleū a colore, quod ex uiridi adhuc
bacca exprimeretur, uocabant. Tertiam decembri mēse, quam mediā Colomella dixit, & in
qua maturum oleum exprimebatur. Quartam ianuario mēse. Erantq; singularum bonitatis
& usus laudes aliq̄. In uiridi autē id maxime laudabatur, quod satis fluere, & precio dupli-
cari domini redditum. Credimus q̄ nos, ob hanc causā album exigī a Diosco. oleum, ut a
uiridi ea coloris nota distingueretur, quoniam a natia uiriditate non facile ad candorem mu-
tari id posset, & ad contrahendam olei Sycionij naturam, minus aptum esset.

Super iniecto ex pinguis Picea. &c. Vt parum cognitum nobis est, quid hoc sibi ue-
lita uehementer suspectum; dubitamus autē deesse aliquid, aut quæ sequuntur non sine uī

D I O S C O R I D I S

Cio esse, Est enim illic nō πίνω substantiue, id est, Picee arboris, uerū adiectiue πίνω id est, qđ ex arbore aliquid significet, Verbi causa, frondē Refinam, Onicā, aut huiusmodi quippiam. Secus sōge author Pandectarū, qui album dici existimat, quod est uetus, quoniam quo antitiquius, eo quoq; albius appareat, quod subinde quoq; lotum a Myrepticis est.

De OLEO SICYONIO. CAP. XXXV.

σικωνίου ἔλαιον

Sicyonij componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati stanno inducū, funditur olei albi, quod crudæ Oliuæ reddiderūt, cōgius unus, aquæ congius semis. leui id igne coquitur, leniter mouēdo. At ubi bis efferbuit, & frustra igne refrixit, innatans oleum concha tollitur. & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quēdam usq; modum uim habet. Febri ac neruorum uitijis prodest. Fœminæ, ad commendandum faciei nitorem, eo utuntur.

EX MAR. VERG. COMM.

Dealbatum oleū Sicyonium, ideo facere Diosco. docuit, quod medicis & fœminis quondam multus esset usus eius, illis in aliquot malorū curatione, his in lenocinio formæ passim eo utentibus. A Sicyone antiquissima Peloponēsi urbe prope Corinthum, gentile sibi nomē inuenit, incertumq; medici ne prius, an fœminæ eius confectionem docuerint, uoluptas ne, an necessitas. Vtebatur eo passim in aliquot malis antiquitas. Sæpeq; Paulus Aegineta aliquid eo curari præcepit. Etsi libro sexto Samium magis, non Sicyonium in usu medicinæ cōmendet.

De Strigmentis balnearum. CAP. XXXVI

στρίγματα ἐκ λανίου
ῥυπον ἐν τῇ πα-
λάστρᾳ
ῥυπον γυμνασίου

Strigmenta a balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt. Ad sedis rimas & condilomata illinuntur. Illa uero quæ ex Palæstris puluerem sibi ascuerunt, in sordis speciem redacta, articulorū nodos imposita adiuuāt. Ischiadicis in foris, aut malagmatis locum, calida commode sufficiuntur. Derasæ Gymnasiorum parietibus, simulacrisq; sordes calfaciunt. Tuberacula, quæ ægre ad coctionem perducuntur, dissipant, Desquamatis, & ulceribus senum profunt.

BARBARI COROLL.

Strigmenta
balnearū.

Strigmenta, hoc sunt, quod Græci Rhypon, & Glocon appellant. Id quod ex Celfo, Plinio que colligimus. Aurium certe fordeculas, Græci uocāt Cypselas. Rhypon Iulius Pollux pro cæra quoq; sigillari, acceptum quandoq; tradit ab authoribus. Nisi quis Typon, non Rhypon in Polluce leuiter. Sed & apud Ciceronē in epistolis ad Atticum, Rhypos scriptū est pro ceris, siue formis, unde sigilla fingebantur, fortasse a situ uetustatis, appellatas: ut Plinianum quoq; illud, & expressi cæra uultus, singulis disponebātur armarijs, ut essent imagines quæ comitarietur Gentilicia funera. defuncto em aliquo totus aderat familiæ eius, quinquā fuerat, populus.

Strigmenta
Palæstrarū.

Strigmenta, hoc genus aliud non sunt, qđ puluis, qui luctantum corporibus inspergitur: et oleo superueit. Hæc pulueris inspersio, a græcis ῥῥῖ dicebatur, pulvis ipse, conis. Cū ipso te, inquit Plautus, puluisculo conuertam. Et geometricū est Puluisculus. Palæstris quidem, optimum e Nilo Sabulum, tenuissimum sui parte. Oleum quo luctaturi perfundebantur, Cerosma dicitur, & Patos. Quanquā Patos proprie cernū est, atq; lutum cerosmati permixtū: cui si sudor accesserit, Conisalon uocari, ab ijs qui nimis Attici uideri uolunt, auctor est Galenus. Locus in Xystis huic operi dicatus priuatim, Conisterium appellatur Vistruuius.

Strigmenta
Gymnasiorū.

Strigmenta a Parietinis, & a Palæstra significare Plinium existimo, cū ita loquitur. Vsum olei in luxuriam uertere Græci, uitiorū omnium genitores, in gymnasijs publicādo. Notū inquit, est magistratus honoris eius octogenis sestertijs Strigmenta olei uendidisse. Item. Quin & sordes inquit, hominis, in magnis fecere remedijs, quæ suorum gymnasia Græcorum: quippe, ea Strigmenta molliunt, calfaciunt, complent sudore & oleo, medicinam facientibus. Item alibi. Et in gymnasijs inquit, olei cōditur odoribus, sed uilissimis. At Strigmēta statuis gymnastiorum

fiore detracta: in quibus Galeno autore, multū olei cōburebatur: quia puluere ingere carerent. A
& cum erugine permista colligerentur, acrioris naturæ quæ fringmenta cætera noscuntur.

EX M. VERG. COMM.

Trigmetā dicitur, quæ oleo illitis capitibus post sudorē, una cū sudore, reliquæ humani corporis cōcreta, & in balneo rū pauimentis relicta, in eos usus quos hic docet Diosc. seruabatur.

De ELAEOMELITE. CAP. XXXVII.

IN Palmyris Syriæ, quod Elæomeli uocant, ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditateque detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato. Sed qui sumpsere, torpescunt, & uiribus deficiunt: quod minime uereri oportet, uerum crebro excitare, ne ueterno pressi, somnos capient. Fit & oleum e pinguitudine furculorum Oleæ. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. Lepras, neruorumque dolores, illitum emendat.

BARBARI COROLL.

Elæomeli fuit ex ipsis Oleis in Syria, tenuius Resina, sapore Mellis: unde nomen. Nō sine nausea emollit aluū. Pugnatores certaturi, præsumunt ex eo cyathum. Plinius in maritimis Syriæ nasci prodit, cū tamē Palmyra longe a mari absit. Forte non maritimis, sed Palmyris legendum, nisi quis locum, unde id excerptit, non Palmyris, sed Almyris legisse Plinium existimet: quod in tanto uiro dubitare, nullo modo possum. Elæomeli medicinæ tantum gignitur. fit hoc idem quod & Aeromeli dicitur, quasi mel æthereum ac cœlestē, quod sacræ literæ Manna uocent: ut nō plane cōtendo, ita certe ppenissimus sum, ut credam. Sed ita tamen, ut intelligatur aliquod discrimen esse inter id quod mandī potuerit, & id quod medicinæ tantū nascitur. De cerpi hoc Amyntas scribit, una cū ipsis quibus hēsit frondibus. Et in offas, pastillosue, aut etiā orbiculos conuolui, ut eū usus postulat, in lignea pocilla, quæ Tabairas in Asia cognominant, aliquo humore diluatur. Plane ab exortu fideris uisusque, sed nobilium maxime, ut Plinius existimat, aut cœlestis arcus, si nō sequantur imbres, sed ros tepefcit solis radīs, Medicamēta potius quæ mella gignuntur oculis, ulceribus, internisque uisceribus dona cœlestia. Quod si seruetur inquit hoc, Siro exoriente, casuque congruat in eundem diem, ut sape Velleris, aut louis, Mercurij ue exortus, non alia fauauitatis ususque uis mortalium malis a morte reuocandis, quæ diuini necatis fiat: nisi hoc ut alia fraus hominum perniciē conrumperet.

EX M. VERG. COMM.

Non sunt Plinio, & huic de Oleomelle omnia eadē. Plin. in maritimis, hic in Palmyris Syriæ spōte sua manare, nō leui diuersitate, dicit. Nō multi tū faciēdū id est. Illud grauius, quod hic arborē ex qua manet, ignorare uidetur: Plinius Oleas eius regionis esse testatur: et hic spōte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici docet, Plinius per se tū duobus locis manare ait. Nō uidetur hic ipse etiā sibi cōuenire. Primo enim ex quodā trunco fluere, tanquā cuius arboris hic trūcus esset ignoraret, mox humano opere cōfici etiā dixit, *ἐκ τῆς κορυφῆς*, qua si olearū furculos indicaret, id em præter cōmunē in plācis nouorū germinū significationē, priuatim ea uox Atheniēsisibus quondā significauit: auditaque *τῆς κορυφῆς* uoce, Oleæ ramulos adhuc plerūque intelligimus, & si eius uocis maior sit ambitus, significetque, ut diximus, nouas aliarum etiā plātārū germinatiōes. Nō facile ideo est, præsertim in re tēporibus nostris ignota, unde asserat, quod Oleomel hoc sit indicare. Eā ob causā, nō dissimulatis, uerū præteritis quæ a Plinio dicuntur, Dioscoridē latinū fecimus. Et ut primis respōderēt ultima, nō magis Oleæ, quæ alterius arboris furculos, et germina indicare uoluimus. Verum quæcunque ea arbor sit in Syria, ex eius etiā furculis Olei cōfici diximus, eodēque in loco naturā rei magis, quæ quod legebatur secuti, quod erat *ἀπὸ τοῦ*, quæ uox græcis unguē oī indicat, *ἀπὸ τοῦ*, una tū mutata litera, quod cortice significat, mutauimus: neque, ut credimus ab re. quā ubi ex trūco arboris humor per se fluit, expressus eiusdem corticibus fluere etiā poterit. Perfluatque id præcipue, quod cōficere uerbū, eā hominis operā indicat, quæ quod nondū efficitur. Vngue autē per se propius ad olei naturā & habitū accedit. Nec rōne caret, ut quod in ima arboris præ se fluit, in summo lateat, nec nisi uī, et humāo ope extra hi et colligi possit: præter ex corticibus, quod copiosiore quæ interiores partes in pluribus humore abundat.

Veruntamen quasi Veter- (dant. Nō tamē hoc adeo decernimus, ut illud damnemus, nosi torpent. Est in ea rescindendum, in cæteris scriptoribus, et in communi eius uocis æstimatione, *τὸν χρόνον* tardum, pigrum, hebesque Græcis significare, dicitur ad iter *τὸν χρόνον*

Plin. libro 25.
capite. 4.

B

C ad agendum, intelligendum, vigiliam, motumque omnem alium, somno, pigritia, & languore marcentem. In medicina autem, ad capitis malum, grauemque, & profundiorē somnum contracta est eius uocis significatio. Estque *ὑαῖρ* quātum in expugnabilis fomni genus: quod ex humida materia fit. Nunc satis signasse fit, quos nam hic *ὑαῖρ* dicit, & nos ueteri torpore diximus.

De Manna.

Melligo.

Non probamus quod aliqui suspicari se dixerunt, esse Oleomel hoc quod antiquiores græci *ἡρῶν*, idest, aerium mel uocauerunt: id scilicet quod ab Hebræorum sacris literis acceptū ueteres Man, nunc uero passim medici Maña appellāt, qđ ex huius scriptoris historia nō facile conficitur. Siquidem ab oleo statim de eo agitur, & quasi cōgener oleo subijcitur: in censu mellis alioqui constituendum, si mellis magis qđ olei naturam referret. Nec dixisset hic, ex trunco arboris manare, &c. cum aerium illud mel non ex trunco manet, sed in arborum folijs inueniatur. Sunt præterea in medicina, quæ aerei mellis euentibus parum conueniant. Nec nobis pro cōperto est, quod antiquioribus quibusdam aerium mel fuit, quod nostra grās Man appellat, sed Melliginem (sic enim nūc uoco) sub Lucanis temporibus, in arborū folijs concretum, rosidum sapore mellis humorem, quem deinde legentes apes, mel in aluearibus suis coaceruant. Nec ramen negamus, quod nunc Manna uocant, ex eadem, uel simili substantia esse, uerum nihil, ut nobis uidetur, ad Oleomel hoc. Aerium omne id mel facit, quod incensū, et nomē mellis sola saporis dulcedine adscitum est, cum tñ præcipua olei uis in eo intelligatur.

De Cicino Oleo. CAP. XXXVIII.

Plinius lib. 15.

Cicinū oleum hoc modo tēperatur. Maturi Ricini qua uoles quātitate torrido sole flaccescunt, & instrati tantisper insolantur, dū uestient cortex fractus decadat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. Postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat demittitur, subiectoque igni feruescunt. Et ubi insitū prorsus humorem reddiderunt, subito ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & recōditur. Sed in AEgypto, ubi largior increbuit usus, longe secus fieri solet. Nam repurgatos Ricinos molæ mandāt, & accurate molitos per sportulam organo exprimunt. Tū quidem ematuruerunt Ricini, cum continētibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manātia ualet. Prodest inflammationibus, uuluis conuersis atque præclusis. Item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. Emplastta efficaciora reddit additum. Potu aquam aluo extrahit. Ventris animalia pellit.

cap. 7. li. 23. ca. pite. 4.

B A R B A R I C O R O L L.

Oleum Cicinū, e Cici arbore fit, in AEgypto copiosa: ubi sine igni & aqua sale aspersum exprimitur, cibis foedū, luminibus lucernarū, propter nimiam pinguitudinem, ineptū & obscurū.

E X M. V E R G. C O M M.

Cici quondam fruticem aliqui dixerunt, quem plures græci Crotona, & Romani Ricinū, a figura feminis appellauerunt. Rura autem nostra, & omnis fere Thuscia nunc Romanū Phaselum uocat. Illi a notissimi insecti, nos a leguminis similitudine, eandem rem indicantes. Fruticem hic tantum non arborefcit, feriturque in hortis nostra ætate, ad spectaculum magis, qđ utilitatem, altitudine, ut hic in historia eius humilis Fici, Platani folio, & si Plinius uitigineo, nullo discrimine tamen indicat, quando Platanus uitigineo folio a cunctis describitur. Ricinium Plinius sua ætate uocari dixit, a foedissimi insecti similitudine, quod græci *κρότων* appellant. Sunt quæ latinis Ricini, & græcis *κρότων* insecta, quæ animalibus alijs, canibusque præsertim inhaerent. sine motu, cum semel inhaerint, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discretis membris, in globum continue crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies, sponte sua decidunt. Ideoque nos, autore Plinio, fruticem, eiusque semen, & ex eo confectum oleum, Ricini appellatione indicauimus. Et nisi Plinium libro. 15. sine igne & aqua in AEgypto exprimi Ricinum oleum, suspicaremur, nec sine ratione, non esse hoc loco integrum Dioscoridē, qui in prima illa huius olei confectione, auxilio aquæ ideo uteretur, quod ob Ricinorum ariditatem aliter

aliter exprimi nequiret, mox autem in Aegypto confici, sine humore aliquo testaretur. Oportet itaque duobus, si idemque grauissimis authoribus, in eadem re idem testantibus, constituere uidiore in Aegypto Ricinos quam Italia nasci, eaque unguinis sui copia, nullo etiam adperso humore exprimi posse.

A

De Amygdalino oleo. CAP. XXXIX

Amygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquae quae ferbuerit sextarius adijcitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quam antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis haesit, concha excipitur. Prefsis nucibus rursum hemina aquae inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est. Vitijs renum, calculosis, difficili urinae, suspiriosis, lienosisque proficit. Dolores capitis, grauitate auditus, sonos incertos, tinitusque discutit. Maculas tollit in facie, et cutem erugat cum melle, radice Lilij, & cypria Cera, aut rosaceo Cerato. Et oculorum hebetudines emendat. Vlcerata capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

Σαμυάδων
ἐλαιον
μαστόπιον

BARBARI COROLL.

Oleum ex Amygdalis, Neopum uocari legitur in Plinio. Puto corruptam esse lectionem, & aut Neopum, ut Hippocrates, aut Metopium, ut Dioscorides legendum. Adde, quod unguentum Aegypto familiare quod Metopium appellatur: ipsum quoque de nucibus amaris conditur, ut post liquebit. Paulus Amygdalinum inquit, Metopium quoque dicitur, propter Galbanum, quod Metopium in Aegypto nominatur, & in oleum hoc adijcitur. Acrius oleum hoc etiam Halinum uocari tradit, ab amaritudine, ut opinor.

Pli. lib. 23. capit. 4.

EX M. VERG. COMM.

Metopium quidam dicunt. Siue a Galbano, quod Aegyptij Metopion uocant, & huic oleo miscbatur: siue ab Aegyptiorum proprio unguento, quod amaris Amygdalis conficiebatur.

B

Feruentes aquae heminis duabus. Variant hic antiquiores graeci in mensura. In aliquibus enim, ut nos reddidimus, hemine, in aliquibus, cyathi, leguntur. Fecitque hoc, ut credimus, notum in utraque hac mensura similitudo. In eo nihil nos decernimus, monemus tamen, quoniam facilis & lubricus in poderibus lapsus fuerit, coniectura, sensusque etiam uti oportere. Nobis inclinatus, modum quidam cyathi magis, quam hemine mensuram congruere, et si contra redditus a nobis locus fuerit.

Cypriaeque Cerae. Non Cypriam a regione uoluit dicere, sed Ceroma, siue Ceratum, quod Ligustrino unguento maceratum & subactum esset.

De Balanino oleo. CAP. XL.

Simili modo fit Balaninum oleum: quod repurgat maculas, lentigines, suaros, et cicatrices nigras. Aluum soluit. Stomacho aduersatur. Contra aurium dolorem, sonos, & tinitus auxilio est cum anserino adipe instillatum. Similis Sesamini ratio. Fit etiam e nucis Iuglandis oleum, quod Caryinum uocant. Eandem uim habet quam Balaninum.

Βαλανίνον ἐλαιον

BARBARI COROLL.

Balaninum oleum et glade fit Aegyptia: quae Myrobalanus quoque dicitur. Simplex huius compositio diu fuit, deinde Resina quoque mixta.

Oleum Sesaminum Indis refertur acceptum, qui et Castaneis quoque atque Oryza conficiant. Oleum e iuglandibus iners, & graue corpori est, sapore ingrato. Etenim quid in nucleo conputruit, totus modus deperit. Nunc nota fere, Liguria Insubriaque promiscuum & cibis & luminari, haud magnopere molestum.

Pli. li. 23. ca. 4.

D I O S C O R I D I S

E X M A R. V E R G. C O M M.

C P Aandectarum Rhapsodum interpretatur, Balaninū, idest, de Ben: cui id studiū fuisse uideri potest, nō q̄ utile confueret Rhapsodium, sed quam locuples, & ingens.

Videtur & repugnare his quæ dicuntur hic ab Dioscoride. Quæ Theophrasto dicuntur lib. 4. capite. 2. Glans a fructu nomen accepit. Folium ei simile Myrto; oblongius tamen. Illæsa magnaq̄ arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine confuso. Vnguentarij uti solent, est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis. Aut igitur in re nunc notissima dicendū est, conficiendi modum tantum demonstrasse Dioscoridem, aut aliā unguenti ab oleo confectio- nem fuisse, & in altero cornicis, in altero fructus usum fuisse.

¶ De Hyosciamino oleo. CAP. XLI.

H Yosciaminum sic fit. Semen candidum, recens ac siccum tundi-
ntr. & calida aspergitur aqua, ut in Amygdalino diximus. dum-
q̄ insolatur, siccatae partes madidis permisceantur: hoc autem fieri opor-
ter, dū nigrescat & grauiter oleat. Mox pressum atq̄ excolatum recondi-
tur. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. Ad emolliendum utile.

BARBARI COROLL.

De Hyoscia-
mo herba Pl.
lib. 25. cap. 9.

H Yosciaminum oleū ex seminibus Apollinaris herbae conficitur, quam Hyosciamon græ-
ci uocant. Cauendum in potu, quoniam cerebri motus faciat.

E X M. V E R G. C O M M.

D E eo oleo illud tacuisse inhumanum & iniustum fuerit, quod potum, cerebri motus fa-
cit, & inter lctalia semen eius in cibo sumptum numeratur.

¶ De Oleo e grano Cnidio. CAP. XLII.

F it & e grano Cnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu.

BARBARI COROLL.

C Nidium oleum ex Cnidio grano, idest Cnidio Cocco fingitur.

E X M. V E R G. C O M M.

D C Hamælec, quā Cneoron Theophrastus uocat, granum, Cnidium, semen est. In histo-
ria plantæ lib. 4. plenius de eo agitur.

¶ De Cnicino. CAP. XLIII.

N On secus Cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem est
quæ factō e Cnidio grano, uerum inualidior.

BARBARI COROLL.

Plinius lib. 25.
capite. 15.

O leum Cnicinum, ex Cnico herba, quam celebrant Aegyptij, oleo tantum, non cibo gra-
tam. Italiae ignota Plinij temporibus.

E X M. V E R G. C O M M.

C Arthamum nostræ ætatis medici, Græcorum Cnicon uocant. Rura autem nostra, Cro-
cum Saracenum. De eo plenius libro quarto.

¶ De Rhaphanino. CAP. XLIII.

R haphaninum e Rhaphani semine fieri solet cæterorum more.
Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. Scabricias cutis in
facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 23. ca. 4.

R aphaninum oleum, ex radice latini appellata. Aegyptij Rhaphanum maxime cupiebāt
serere, modo licuisset: quia & quæstus maior q̄ e frumento radibat, & minus tribui pendeba-
tur, nullumq̄ copiosius erat oleum.

V E R G.

C ontra oēs pediculos Raphanino oleo utitur Paulus. Plinius q̄q̄ addit, Scorpionibus ac
Ceraftis aduersari, posteq̄ impune tractari, si quis uel semine, uel oleo perunctus sit.

D E M E L A N T H I N O. CAP. XLV.

M elanthinum idem quod Rhaphaninum potest.

Plinius lib. 25. ca. 4.

BARBARI COROLL.

Melanthinum oleum, nomē habet Melanthio, quod est Git, quasi Nigellā uerbum e uerbo dicas. Nam Melanthemō, Anthemis est, quam modo Chamaemilon uocari frequentius animaduerto, quā Plinius utrūq; Melanthiō appellat, nisi lectio deprauata ē, qđ & crediderim.

Nigella qualis sit, et quo colore et ordine, in purpuraceis uasculis conspiciatur eius semen, certius in historia ostenditur.

De Sinapino. CAP. XLVI.

Tritum Sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. Trāsfert humores qui in aliqua parte concreuerunt.

De Sinapī natura & medicinis Plinius libro. 20. cap. uicesimo secūdo, & 19. capite octauo.

Variant antiquiores græci hoc capite. Alij enim calida, alij frigida aqua Sinapim aspergunt. Nos ad molliendam, soluendamq; seminū duriciem, aptiorem calorem existimamus. Plinius in eadem confectioe, etiam Dioscoridī idem nō est, & aliter conficit. In medicina etiā plunibus morbis quam hic, mederi dicit, locus est lib. 20. cap. 22.

De Myrteo. CAP. XLVII.

Myrtei faciendi ratio hæc est. E Myrto nigra, siluestri, aut satiaua, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares Omphacini olei portiones adijciuntur. subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed longe facilior hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant. Alij prius oleum inspissant Malicorio, Cupresso, Cypiro & Iunco odorato. Efficacius est amarū gustu & oleosum, uiride, translucens, & olens Myrtum. Astringit, & indurat. Ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & popularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores, & ad omnia quæ astrictionem inspissationemq; desyderant.

BARBARI COROLL.

Myrteum oleum, & hoc e latifolia nigra, siluestriq; Prestantius, quam Oxymyrsinem, alij Chamemyrsinam uocant. Aliqui Acoron, a similitudine. Est enim breuis, & fruticosa, minore semine. ut docebimus. Fieri et aliter oleum Myrteum solet. Tunduntur Bacce asperse calida aqua, dein coquuntur. Myrtas Cato baccas huius arboris appellat. Interest, uinū, an oleū facias. Ad uinū Bacce in ariditate siccant, ad oleū nō siccantur. Inest huic oleo uinū qđ sapor, si mulq; pinguis liquor, præcipua uī ad corrigenda uina faccis ante perfulis. Reinet q̄ppe siccē, nec præter purum liquore transire patitur: datq; se liquatis cōmendatione mira quasi comitē.

De Laurino. CAP. XLVIII.

Laurinum fit hoc modo. Maturæ Lauri bacce in aqua coquuntur. siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt: quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij Omphacinum prius oleum Cypiro, Iunco odorato, & Calamo inspissant. deinde mollia Lauri folia concoquunt. Alij etiā Baccas, donec oleū odore cōtraxerit. Alij Stryacē,

A
Pli. lib. 20. ca.
17. & 22. ca. 21.

ἐλαιον σινάπινον

μυρτίανον ἐλαιον

B

Pli. li. 23. ca. 4.
& alias de
Myrto lib. 15.
cap. 29. & 25.
cap. 9.

λάδιον λαύρον

D I O S C O R I D I S

Cet Myrtū addūt. Optima Laurus ad id latifolia, et mōtana. Oleum Lauri nū utilius q̄ recētius, q̄q̄ uiridius colore, amarissimū, et acre. Vis ei ex cal-
factoria, emolliens. Venarū spiracula laxat. Lassitudines discutit. Oibus
neruorū uitijs, horrorib. destillatiōibus, aurīū doloribus, malis renū fri-
gore contractis, illitū non aliud iuuantiū. Attū potum, nauseam parit.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 25. ca-
pite. 4. de ipsa
arbore lib. 15.
capite. 30.

Oleum Laurinum e Druppis inquit insinuitur. Nam Druppa nō olearum modo, sed ali-
as quoq̄ Baccas uocamus, grēcos imitati, *Δρυις* appellantes. Quidam folium & corticem
Baccarum adhibent. Laudatur siluestris & nigra baccis. Ex Delphica uero ad acopum & ce-
rata utilissimum.

EX M. VERG. COMM.

Aliam huius Olei confectionem tradit Palladius lib. 2. Nempe talem. Lauri Baccas quā-
plurimas & maturitate turgētes, in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei qd̄ ex
se dimiserint, super natantis undam pennis leuiter cogentibus, in uasa transfundes. Sunt aut-
em Druppae in Olea & Lauro.

Parum deinde sequax sermo est in græcis, ubi nos diximus, quam manibus in conchulam
exprimentes colligunt. Quod enim est illic participium *Διαιτῶν*, nullum habet sensum; i-
deoq̄ nos rem magis quam uocem secuti, sic reddidimus. Volumus tamen id tam diu legenti
bus placere, quousq̄ ex minus corrupto codice, certior confectionis huius ratio cognoscatur.
Suspiciamur & illic uerbum esse ubi legitur. Miscent aliqui Styracem, & Myrthum. Credimusq̄
pro Myrtho frutice, Myrtham legi oportere. Styraci enim Myrtha aptius copulatur, quam
Myrthus, & in spissando oleo maiorem uim, & frequentiore usum habet. Facilis ab altera in
alteram uocem in græcis lapsus fuit. Et antiquus latinus Dioscorides, Myrtham adhuc habet,
potestq̄ una tñ mutata litera, in hunc sensum trahi. Cuiq̄ tñ suum iudicium sit, & arbitrium.

De Lentiscino.

CAP. XLIX.

Similis Lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis pri-
us spissamentis, ut in Laurino diximus. Hoc scabiem iumentorū, ca-
numq̄ sanat. Utilissimum pessis, acopis, et leprarū medicamētis. Sudo-
res cohibet. Nec secus Terebinthinū fieri solet, qd̄ refrigerat et astringit.

ΧΙΥΙΟΥ ΛΑΥΡΟΥ

ΧΙΥΙΟΥ ΧΙΥΙΟΥ
Plin. li. 15. ca. 7.
lib. 24. ca. 7. li.
15. cap. 20.

Lentiscinum oleum, e Lentisco fit, Græci schinon uocant. Nam schœnos luncus est: de qua
uicinitate nominum sæpius scule decipimur. Durius hoc paulo q̄ Rosaceum, cæterū eiusdem
effectus. Nec mihi plane certum est, an hic luncinum potius, q̄ Lentiscinum interpretari debe-
am. Quandoquidem & luncinum Rosaceo simillimū esse prædicant. Duobus quoq̄ locis Plin-
ius hac similitudine Rosacei, altero Lentiscinum describit, altero luncinum; alioquin falsum,
aut lapsum affinitate, autorem illum diligentissimum, qui putem præsertim cum fieri possit, ut
Rosaceo sit utrunq̄ nata proximum. Nam & Therminum, quod ex Lupinis cōstat, proprie-
tatem Rosaceo sororiam habere Plinius idem restatus est.

EX M. VERG. COMM.

Libet hoc loco addere, Lentiscini olei diuersam ex Palladio confectionem lib. 2. his uerbis
ab eo traditam. Grana matura Lentisci, quam plurima colliges, & una die ac nocte supra se a-
ceruata esse patieris. Deinde sporam granis hsdem plenam, cuiq̄ uaculo superpones: tunc ex
eo humore qui defluerit, supernatans oleum Lentiscinum, sicut Laurinum colligetur. Me-
mento autem, ne frigore possit adstringi, aquam calidam sæpe suffundere.

ΜΑΣΤΙΧΙΝΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Mastichinum e trita fit Mastiche, quod contra omnia uulnē ma-
la efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer-
sus prominentes stomahi duricias, coeliacorum, dysentericorumque cru-
ciatus, utile. Faciem emaculat, & colorem nitidum facit. Optimū in Chio

De Mastichino oleo. CAP. L.

insula componitur.

BARBARI COROLL.
Mastichinum oleum e Mastiche, cuius species multæ suo loco numerabuntur. Resinam Lentiscinam Dioscorides appellat.

EX M. VERG. COMM.
Miscetur idem ceratis, quæ stomacho, celiciacis, & intestinorum torminibus imponuntur. Græce πῶς τὰ πρὶ τὸν στόμαχον ἐπιτίπτομενα ἐκαστῶματα, &c. Qui dicendi modus, nec rei, nec scriptori huic legitimus, aut honestus est, non enim stomacho superponuntur duricies. Cum autem decerneret ille stomachi, alui, intestinorum, & iccoris inflammationibus accommodatam esse Mastichen, facile opinati sumus, ex rei & sermonis ductu, quod erat ἐκαστῶματα, quæ uox omnium generum duricies, in humano corpore significat, κερῶματα, idest, Cerata, siue Ceromata legendum esse; decreuissq; hunc scriptorem subactam Mastichino oleo, ceram partibus illis imponi, contra earum partium mala, ad quæ ex uiribus suis Mastiche faceret. Indicat Paulus Aegineta his uerbis. Mastiche præsertim ex Chio insula, in secundo calefacit, & siccatur: mixtas habet uires, adstringit enim simul & mollior: ideoq; stomachi, alui, & intestinorum & iccoris inflammationibus accommodata est, Aegyptia quadam tenus nigro colore, siccatur magis et discutit, minus autem adstringit, discutiendis strumis ideo accommodata. Quæ longius cōmentarijs his nostris adiecit, ut ratio mutæ uocis a nobis intelligatur: obiterq; illud testemur, confirmari ab eo, quod in hoc scriptore suspectum forte uideretur, cum ait, Mastichē adstringere simul & mollior: quod aduerbium non temere, sed ex melioribus græcis additum illa nobis, in quibus legebatur εἶπεν ὁμοίως καὶ μαλακτεον.

De Vnguentorum ratione. CAP. LI.

DE ratione Vnguentorum consequenter tractandum existimaui: mus. quandoquidem ea in nonnullis corporum uitjs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in quibusdam plane obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia, ut in Amaracino, & Crocino, Telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

BARBARI COROLL.
Vnguenta græci myra uocant, a Myrthā, siue quasi mora, ut Chrysippus inquit, q̄ infatua ti uino & crapula fere uti soleant unguentis. Etenim cum bellarijs & corollis Vnguenta secundis mensis inferebantur. quod & Socrates apud Xenophontem, ut meretricium accusat, ut uestem ita odorem, alium pudicas, alium impudicas decere prædicās. Lacedemonij certe unguentarios ejiciebant urbe, quasi corrumpentes Oleum, quemadmodum & infectores: ut qui candorem uellerum accersitis medicamentis inquinare uiderentur. Prohibuit & Solon, ne quis unguenta uenderet. Proinde Sophocles et Callimachus Veneri speculum & unguenta tribuunt, oleum Mineræ, q̄ illa uoluptati, hoc uirtuti natum esset. Primus omnium Archilochus usurpauit unguenti nomen, hoc est, Myron: & si res Homero quoq; nota fuerit, oleum, non myron appellanti. Vnguenta sane, quæ non de floribus, sed de aromatis conficiebantur, Thyomata uocabant: quod & Homerus nouit: cum Thethyomenon, hoc est, delibutum eo genere Iunoni corpus fuisse cecinit. Dicuntur & Myromata, non myrisomata. Hippocrates odoramenta, hoc est, aromata & suffitus appellauit, Nomen & a patria unguentis est quibuscum: ut Panathenaicon, Athenis factitari solitum, & Babylone Babylonici. Quæq; Apollonius auroritatem & præstantiam unguentorum non locis, aut regionibus, sed peritiæ artificum, & in doliustæ acceptam retulit. Nam Ephesina quondam in precio habebantur: nunc exoleuere. Habebantur & Alexandrina, propter duas Reginas, opibus & luxu diffuentes, Berenicem, & Arsinoem. In Coryna quoq; diu laudatum est Rosaceum, Berenices maioris temporibus, Cœnāthinum A dramyti modice cōmendabatur: postea ob Stratonicem, primum Eumenis nomen obijuit. Syriacis, præsertimq; Telino summa fuit olim autoritas, sicut & Asiaticis e Pergamo. Vnguentarij occasione Libanotion e Thure cōmendandis: quod antea nuscq; fuisset. Vnguen

A

De Mastiche
Pli. lib. 12. ca.
pice. 17.

*

E

Cum poro preciosum innatat infusum uili, contra mel probum, uitioso melli additum fider. Nec omnia sane unguenta omnibus placebant. Quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata, ut in Baccari monstrauimus. Infames huius luxuria Lydi sunt, a quo Sardonium mun-
dum, Poetæ pro unguentis capiunt. In mentione sunt & Bredhyon ex Lydio, pro crasso & pro Anthino quoque acceptum. Et Sagda, siue Plagdan; etiam si Nicander in uerbo Sagdano non un-
guentum, sed homines effeminatos & profligatos moribus intelligit; alij uero suffimenti ge-
nus. Helæi celebrant, ab inuentore dictum Plagoninon. Athenis unguenti hemina quinque po-
do argenti uenibat. Aliqui decem produnt. Unguentum frequens, ut inquit Aristoteles, cani-
ciem oblinentibus siccitatis uitio conciliat. Icesius, qui de odoribus scripsit, unguentorum duo
facit discrimina. Deliciarum; quod & Chrima, siue Chrima dicitur. Et uulgare ac promiscuum,
& fere palestris dicatum, quod Alima cognominatur, et Aloemon, & Epalelima. De quo uerbo
Festus quoque apud nos: unde Aliptes, & Exaliptes, quos nostri unctores, & reuictores uocant. A
græcis frequenter Coniatæ christæ, ac Pædotoribæ nominatur: ut quæ a limo dictum Epalelima, ob uili-
tatem scripserunt, errauerint, etiam si mediastrini, non medicorum ipsi medici reungerent. Ha-
bentur & quæ sicca unguenta, hoc est, Ceromata dicuntur; ut liquida, quæ Hygromyza, for-
minarum auribus expetita. Sunt & Moschata, quæ alij Moschomyza, Paulus Moschelea uoca-
uit. In quæ sicut in Arabica quoque unguenta, genus illud quod Arnabone Paulus & Aetius
appellant, quaeritur. Sed quid sit Arnabo, nondum comperimus. De Moscho, siue Musco
diximus alibi. In multa odora menta uenit & Camphora; quam Aetius Caphura nominauit;
in eo unguento quod Salca dicitur, axillis & auribus foeminarum dicato. Nam & suffimentum
Moscharum in eodem Aetio legas: in quod & sandala, & Nuces Indicæ desiderantur, comitan-
te orientali succino. Est autem Nux Indica, fructus ut Mauri putant, Palmæ cuiusdam Indicæ
præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Sandalorum ue-
ro tria genera, candidum, rubrum, luteum. Camphoræ quaternaria; arboris ea gummi est. In qui-
busdam locis medulla non aliter prouentu magno, quæ si terremotus & tonitrua multa fuerint.
Initio maculis rubentibus, post uel calore solis tosta, uel ignium candescit. Inuenio & Alua, et
Sarua, & Scylmaris folia, siue Scymatis odores suffumigando domibus idoneos. Primum in eo
thyimamate quod Cyria Romuli ascribitur. Sequens in eo, quod ad Embolarchum referunt
autorem. Tertium in eo, quod Myrpsicon uocatur. Scylma certe hoc etiam ad Calliblepharon
probat Aetio. Nominatur inter suffitis & Masucha, siue Masuaphion a Paulo. Sed ea com-
positio est, non facultas simplex aliqua. Unguenta sane quæ ceram, uel resinam, uel aliquid hu-
iusmodi recipiunt, non Myra simpliciter, sed Myracopa dicuntur: quoniam similia sint acopis.
Talía sunt Amaracinum, & Decamyron, a decem rebus unde constat appellatum; sicut a quin-
que Pentamyron.

D

De Rosaceo.

CAP.

LII.

pēdēuon dāuon

Rosaceum oleum sic fit. Iunci odorati quinque libras et bessē tun-
dito, & subactas aqua in duabus olei libris & quincunce sub-
inde mouendo coquito. Dumque percolaueris, in olei libras uiginti & quin-
cuncem adijcito Rosas non madefactas numero mille, & manibus melle
perunctis identidem moueto, sensim premens. Sinito nocte tota macera-
ri, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in cra-
terem melle illitum recondito. Cæterum Rosas quæ antea pressæ fuerint,
in labellum demittito, & affusus octo libris & quadrante spissati olei, ite-
rum premito: eritque secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasue
perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, &
quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent.
Si uero secundam adiectionem instituere libet, in expressum oleum, nu-
mero pari recentes Rosas nullo humore imbutas iniijcito. manibus melle
præmadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto, simili modo
exprimens facito. totiesque recēteis Rosas detractis unguibus immittito. si
et enim

et enim ita oleū multo ualidius. Nā septies oleū Rosarū infusionē admittit, nec amplius. Prælū melle perungatur. Oleū a suceo diligenter secerni oportet. nā si minimū quid relinquat, unguentū corrūpēt. Alij autem de tractis unguibus, Rosas tantū oleo macerāt in sole hoc modo. Rosae quae selibram pōdere aequant, in sextario olei diebus octo madescūt, & usque tertiā perfusione quādraginta diebus insolanī, & sic oleū recōditur. Alij Calamo, aut Aspalatho prius olei spissamēta faciunt. Alij coloris caussa Anchusam admiscēt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomētis & cataplasmatibus utile. Pōtum soluit aluū. Stomachi odorem restinguit. Vlcera caua replet, & mulcet, quae Cacōethe uocantur. Vlcerebus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. Caput dolens eo perfunditur. Dētes inter initia doloris colui prodest. Ad genarum duricias illitum efficax est. Ad laceffita interanea & cōcitas uulnus utilissime subijcitur.

BARBARI CROLL.

Vnguentum Rosaceū, id est, Rhodin on Phaseli, maxime diu placuit. Commendabatur & Neapolitanū, & quod in Seplassia Capuæ diuendebatur: ut inquit Apollonius. A quibusdam addi salem, & anchusam, & rosaceum, & Dioscorides & Plinius autores sunt. Disunctim hoc fortasse capieudum est, cum ea sit unguenti facienda regula, quibus anchusa adiecta est, sal uti ne addatur. Simplicissima eius mixtura diu fuit, additis Omphacio, flore Rosae, Crocino, Cinabari, Calamo, melle, Iunco, salis flore, aut anchusa, uino. Huic cādidus color erat. Qui mācerant in sole Rosas oleo conditas, uitreis uti praeipiuntur. Vnguentū Cyrenis, e Rosa preciosissimum Theophrastus predicat: quoniam Rosa ibi odoratissima sit. Inuentum est, & Rhodomi facere, hoc est mel, Rosaceum: & aquam Hydrosatā appellatam recentioribus græcorū.

Plin. libro. 21.
cap. 14.

EX M. VERG. COMM.

Quod statim in ipsis foribus uitium se nobis obtulit, huiuscemodi est. Iuber hic in Rosacei confectione ad olei spissamentum sumenda esse, rotundi odorati Iunci pōdo quinque, & uncias octo: statimque subijcitur, sumenda pariter olei pondo duo & quincuncem: nec male, incertoue sensu haecenus, si odoratus ille rotundus Iuncus spissando huic oleo satis esset: & nisi quod sequitur participium *et*, male rei responderet. Et prae ter hoc alterum illud participium *quod* nulla ratione oleo competere posset. Qui enim tundi oleum, & macerari aqua potest: quod duo illa participia significant. alterū enim in duris & aridis tantum fit, alterum in his solum dicitur, quorum arescit alterum, liquescit uero alterum. ut cum dicitur Tranquillus, lutum sanguine maceratum, & quotidie auditur aqua macerari farinam. Accedit, quod iniusto pondere, & mala rerum inaequalitate, in spissando humore praecipitur, maiori copia summi quod spisset, minore autem quod spissatur. Spissatur enim oleum, spissant uero aromata, quae si copia abundant, non spissare dicuntur, sed oleo dilui. Cogerunt postremo nos, non suspicari iam, sed pro comperto uitium hoc loco habere, quae plura in antiquioribus aliquot græcis in spissando Rosaceo numerantur. Elenium, quam nos Inulam, angulosum odoratum Iuncum, & odoratum itidem Calamum. Credimusque, quod oleum statim a rotundo odorato Iunco legitur, non oleum, quod græci *λαιον*, sed *ιαιον* Inulam, antiquam lectionem fuisse, deesseque alia deinceps, quae prius aqua macerata, in oleo coquenda essent. tum per column traiecto oleo, uiginti sic spissati olei pondo, & uncis quinque inqciendas esse Rosas numero mille. &c. Quae omnia coniectura tantum nostra dicuntur, quam alijs etiam relinquentes, nihil mutauimus, suspensiones, suspitionumque causas diligentioribus ostendisse contenti.

Et quia toto hoc opere passim pōderum metio est, testari semel id uolumus, si quid maius, minusue, pro rei natura & necessitate dici forte uidebitur, non ideo damnandū esse laborē hūc nostrū. Lubricis enim in antiquis ponderū, & mensurarū notis, ad uitii lapsus est. Multa etiā in antiquis græcis uarietas, & nos codicū fidem, nō experientiam sequimur, quā medicis relinquitur, quibus licebit semper, ex aliorū decretis, aut iterū facto rei periculo, in melius conuertere.

C tere, quod ex hoc scriptore parū apposite dictum a nobis fuerit.

ἐλατίνιον ὀλίγον

F De ELATINO. CAP. LIII.
Racta Elatē, tusa, & scarificata in labellum deijcitur. Omphacinū oleū triduo infundit, mox p̄ sportulā exprimit. Verū pares esse debent utriusq; portiones. dein mūdo uase ad usum recōditur. Viribus Rosaceo proportione respondet. Aluum tamen non mollit.

E BARBARI CORROL.
Latium e Palma fit Elata; quam nostri Palmam Abietem uocāt. Dicēda per se, in loco. Lachrymam eius in unguentis misceri tradūt, ad oleū domandū, id est, Stygmatis uice: huius & furculos, & lachrymam uocauimus. Abietē certe græci arborē ipsam Elatē & Spathen nominant: lachrymam fere Spathen. In Theophrasto nomen huius unguento, Phoenix.

A EX M. VERG. COMM.
Columella Elate lib. xij. Cortex Palmæ appellatur.

ἐλαίου μέλιον

M De M E L I N O. CAP. LIIII.
Elinum oleū hoc modo temperatur. Olei congius, decē aquæ sextarijs amisce. Adijcitur Spathæ fractę quadrans, & lunci odorati uncia, quæ die uno macerata coquuntur, mox in uas oris patuli oleū excolatur, & indita harūdinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inibi residēt, dum malorum uires ad se oleū alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt: ut cōtineatur odor, nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimūtur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratorem & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet. Exulceratis uuluis infunditur. Citatam urinam sistit inditum. Sudores cohibet. Contra cantharidas, buprestin, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod Cotonea mala olet.

Plin. libro. 27. cap. 6.

M BARBARI CORROL.
Elinum prælatum in Coo, cotoneis malis, & struteis fit. Quidam genus hoc, tum demū in unguentum trāsire perhibent, admixtis cyprino, sesamino, balsamo, casia, abrotono. Quæritur, uti ne in humidis nata sit, quæ in hoc parentur: Ideo utilissima esse quæ in Sicilia nascantur. Minus probari Strutea, quamuis cognata.

οὐρανθίνιον ὀλίγον

O De Oenanthini compositione. CAP. LV.
Enāthe e labrusca, optime olēs postquā emarcuit, deiecta in Omphacinum oleum mouetur, uoluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur: oleum reconditur. Astringit, proximum Rosaceo effectum præbēs, sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

Pli. lib. 27. ca. 1. & 27. ca. 4.

O BARBARI CORROL.
Oenanthinum in Cypro, deinde in Aegypto, prepositum est ex Adramyto. De Oenanthē in loco agetur. Sit hoc unguentum idem cum Anthino, ab Hippocrate uocato, muliebribus malis utile, an diuersum, & Anethinum potius, non liquet. Alioquin uidetur Anthinum dici posse unguentum omne, quod ex floribus componitur lilio, narcisso, rosa, iride. Cuiusmodi maxime in Boeotica Cheronea fingebantur, cōmēdata Pausaniæ. Vinum porro Anthine, siue Anthinon, aliud est q̄ uinum Oenanthinum: ut in uua Oenanthē diximus. Vn-
guentum

guentum Oenanthion, etiam Oenantharion dici posse, testis est Paulus, qui nō eo nominatū putat, q̄ accipiat Oenanthem, cum sepe fiat sine ea, sed a uino, & floribus Lilij. Vtebatur, inquit, hoc ueteres a balneis, spargebant eo mensas, & nares lineabant, & contra pestilentiam ualere iudicabatur: præsertim Possidonianum, cognomento Mesopotamites.

A

De Telini componendiratione. CAP. LVII.

Teleni græci libræ quinque, Calami libra una, Cypiri libræ duæ, olei libris nouem: septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur. Aliqui pro Calamo, Cardamomum substituant, & Cypiri loco, Xilobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Fœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc Telenū ab scæssus emollit, & concoquit. Omnibus uuluarum duricijs magnopere cōuenit. Fœminis difficile parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerūt. Sedis inflāmationes lenit. Tenesmo subditum prodest. Ulcera capitis manantia, fursuresq̄ expurgat. Ambustis & pernionibus addita cæra proficit. Vitia cutis in facie emēdat. Pigmentis ad conciliandū faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer Fœnigræci odorem præseferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimū iudicatur.

Tελινος Τελινος

BARBARI COROLL.

Telinum e Sicilia, id est, Fœnogræco nomen rationemq̄ habet. Addebant huic & mel, & sertam campanicam, & cypirum, & mellum, & maron, & amaracū. In Telo insula etiam Menandri græte celeberrimum. Quid sit Mellum Plinio, quod & in uina fictigia, & in Suisinum addi meminit, haud ita dum inueni. Forte non Mellum, sed mel in his locis scribendum sit. Nam Amellum, de quo & Virgilius, & Columella, frutices fert apibus gratissimos, aureo ac luteo colore: ab imo foliosos: floribus purpureis, aspero gustu: cuius radices succus egroto examināt cum Amineo uino dari præcipitur. Dicitur uero Amellum, q̄ passiores cum curua legant, prope flumina Mellæ: is Galliæ annis est. Quædammodum a Lemano lacu, Alemanni, ut Seruius existimat. Est & Amilla flos apud græcos autores quosdam, gallico uocabulo: herba ea quæ uocatur Anthesis: siue Chamemilon: ut forte Amilla, uel idem, uel similis sit Amello, nihil asseueramus, sed in medium posuisse nihil officit.

Plin. 13. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Id qd' in extrema Capitis huius coronide est in græcis, *ἐν τῇ κεφαλῇ*, id est, manus absterges, eodē modo in cunctis eius gentis codicibus legitur, nec nisi manus ea uoce intelliguntur. Oborta tamē suspitio nobis est, nō *ἐν τῇ κεφαλῇ*. i. manus, uerū *ἐν τῇ κεφαλῇ*. i. capillos legi oportere. Suspitio nis huius causam nobis fecit, qd' in Fœnogræci historia, & medicina, quæ secūdo uolumine tractabitur, idē hic scriptor ait, *ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ καὶ τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ καὶ τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ καὶ τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ*, quod est, abstergere Fœnogræco decoctū, capillū, fursures & capitis manantia ulcera, omnia eius partis uitia, ideoq̄ deinceps numerata, quibus uersimile est, nō debuisse misceri manus. Ex eadēq̄ uel credimus, hunc nō manus, sed capillū Fœnogræco unguento abstergi præcepisse. Nisi quod in unguento est bene, quod autem in Fœnogræco male legatur, sitq̄ illic, non hic uitium. Nobis capillum legi magis placet. Non enim uidemus, cur, solam manus cutem abstergere hoc possit, reliqui uero corporis consimilem illi nequeat. Suum tamen cuiq̄ iudicium sit.

ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ

De SAMPVSCHINO. CAP. LVIII.

Serpilli, Casia, Abrotoni, florum Sisymbrij, frondium Myrti, Sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus singulorum cōiecta tione, una tunduntur. atque is Omphacini olei modus adijcitur, qui mamentium uires non euincat. Hæc post quatruduuni exprimuntur. denuo alia, simili mensura & æquali tempore macerata premuntur, ita enim ualidius

C lidius reddi solet. Eligi oportet Sampsuchum colore nigrū, plurimū redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem. Aduersus uuluae praelusiones, conuersionesq; efficax est. Menfes & secundos partus extrahit. Vuluae strangulatus recreat. Lumborum, inguinumq; dolores lenit. Sed cum melle uti eo præstat: quādoquidem uehementi astrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit. in opisthonicorum, uulforumq; cataplasmata utilissime additur.

Sampsuchino Calamus accessit. In Cypro, & Mitylenis optimum, ubi plurima Sampsuchus. Differt hoc Dioscoridi ab Amaracino: q; alia res in Sampsuchinū, alię in Amaracinum quærentur. Dubitationem Pliniana uerba faciunt. E Sampsucho inquit, oleū fit, quod Sampsuchinum uocatur, aut Amaracinum.

VERG.
Pli. 22. cap. 22.
& 11.

Nota omnibus in quotidiano sanitatis usu Amaracus est. Eam cōmuni appellatione græci Samsuchū neutro genere uocā: nec certe differunt, nisi diuersarum gētiū nominibus. ut in historia eius in tertio uolumine certius patebit.

Eligito Samsuchū, qui colore nigro in uiridi sit. In cunctis fere græcis legitur. *μυρδύχρον*. Nos meliorū codicū fidē secuti, atq; naturam rei & sensum, *μυρδύχρον*, qd' nihil significat aliud, q̃ cōiunctos miscosq; simul colores duos. q̃ a nobis, ut legi, in uiridi nigro colore, redditi sunt. Et fortus. Adieciimus eadem fide, & fortus. quoniam menfes & secūdas trahere dicit.

¶ De Ocimini compositione. CAP. LVIII.

ἀνθιστίνον

Ociminum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia detrahens librarum undecim & beffis pondo, die noctuq; uiginti olei libris macerato, premito, colato. Cumq; exhausieris quallum, rursus parē olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium. nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens Ocimum æquali pondere, ut in Rosaceo diximus, maceratur: & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit, ter, aut quater madefacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex Omphacino confici, sed illo modo melius. Idē qd' Sampsuchinū potest, sed inefficacius.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod hic a principio statim dixit, confici Ociminū oleum Ligustrino, similiter ad spissamentū & odorem olei pertinet, id est, præparationem illā, de qua longius non multo ante egimus, breuitatisq; causa ad alterius unguenti rationem olei spissamentū, in hoc Dioscorides reiecit: patetq; id quod nullis in hoc aromatis oleū præparat, quod aliqui cōmune omnibus fere est. Indicatq; id aperte, qd' in capitis extremo calce additū est, posse & ex acerbo oleo Ociminum fieri: quali dicat, non posse simplici oleo Ociminum fieri, sed aut spissato Ligustrini modo, aut ex maturis oliuis expresso faciendum esse. Qualis autem Ligustrini spissatio & confectio quondam fuerit, certius non multo post patebit.

ἀνθιστίνον

¶ De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

Olei Cyprini odorib. imbuti libris nouē et quincūce, foliorū Abrotoni libras octo, die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleū uelis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit. Ad uuluae duricias, praelusionesq; efficax est. Menstrua & secundas pellit.

¶ De Anethini compositione. CAP. LX.

ἀνθιστίνον

Olei libris octo & dodrante, florū Anethi libras undecim & beffis sem maceratas, manibus premito, & recondito. Quod si iterum perfundere

perfundere uelis, recentes Anethi flores consimiliter madefacito. Vulua **A**
rum duricias emollit. Venarum spiracula laxat. Contrarigores febrium
circumitu redeuntes auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit.
Prodest articulorum doloribus.

E X M. V E R G. C O M M.
ACerbum, in aliquibus græcis in unguento hoc quæri oleum, præcipitur. Sed an cōfectio
nis eius antiqua hæc ratio esset, incertum nobis. Id genus olei certe quōdam laudatissimū fuit,
& inter unguenta facile receptū. Paulus Aegineta utitur eo cōtra uigilias ad somnū. Et in ad-
stricta cure corporis, iubet eo inungi, præsertimq; ex uiridi Anetho cōfecto.

De Susini compositione. C A P. L X I.
Susinum, quod alij Lilinum appellant, sic temperatur. Olei librę no
uem cum quincunce, Calami librę quinque & quadrans, Myrrhæ
uncie quinque, permixto odorifero uino decoquuntur, & colato oleo,
Cardamomi tusi & celesti aqua madefacti librę tres & semis macerātur,
premunturque. Tres librę cum semisse spissati olei assumūtur. Mille Li-
lia decerptis folijs in latum labellum demittūtur. Iniectum oleum, manis
bus melle punctis agitur. die noctuque cōquiescunt, & in pixidem ma-
tutinis exprimuntur. Oleum protinus ab aqua, quæ simul expressa fue-
rat, colo incerni oportet. Non enim ut Rosaceum moram tolerat. Nam
concalfactum feruet, & computrescit. Quare sepius decapulandum. Va-
sa melle illinenda. Tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis fauci-
bus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis, ex quasillo in label-
lum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuti, quod primum pon-
dus æquet, & Cardamomi tusi drachmæ decem coniiciuntur. Hæc ma-
nibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur. Quod profluit re **B**
purgatur, tertio eadem infunduntur, adiecto Cardamomo & sale, & ma-
nibus melle madefactis. Longe optimum erit quod prius exprimitur.
Proximum quod sequitur. Tertium locum sibi uendicat, quod nouissi-
mum prodijt. Denuo in mille Lilia euulsis folijs, expressum primo ole-
um infunditur. Tum porro prosequendum, eademque facienda ut pri-
us, addito Cardamomo, dein expresso. Et quo frequentius recentia Li-
lia maceraueris, eo ualidius unguentum efficies. Deniq; cum factum abs-
unde uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit Myrrhæ q̃
optimæ duas & septuaginta drachmas, & Croci decem, Cardamomi
quinque & septuaginta. Croci uero & Cinamomi pares portiones tun-
duntur, & cribratę in labellū cū aqua demittuntur. Expressumq; primo un-
guetum infunditur, & paulopost excipiuntur, uasculis siccis Myrrha, aut
gumi antea perfusis, & Croco, melle & aqua madefactis. Eadē sunt in al-
tera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex Balanino, alioque oleo, et Li-
lijs componunt. Optimū esse cōstat in Phcenice, mox Aegypto factum.
Sed cū primis laudatur qd' Lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ præ-
clusiones laxat, & collectiones aperit. Vtilissimum ad muliebria mala.

Vlcera

D I O S C O R I D I S

C Ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fursuresq; emendat. Vibices, cicatricesq; celerrime ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa, extenuat. Potum bilem per aluum extrahit. Vrinam ciet. Sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Plin. lib. 13. ca
pite. 11.

B A R B A R I C O R O L L.

S Vsinum omnium tenuissimum est. Hoc & Phyllinon, & Lilion, & Lilinum & Lirium, & Lirium (ut Galenus inquit) & Syrium quoq; uocabatur: & Cinnomyron. Vnguinosum erat hoc, & e Lilio quoq; sub diuo, sole, luna, pruina maceratū, fiebat. Ipse quoq; succus floris Lirium dicebatur, atq; mel. Lilia purpurea, oleo faciendo, maxime præferuntur, quæ in Syria & Pisidia Pamphiliæ Dioscorides cōmemorat. Hinc Syrium appellatū crediderim. Nūc omnes fere succi, unde Syrupi uulgo. nam Syrupa Olsuæ condendæ genus est Columelæ. Sufinum porro dicitur, a Suso, quod Liliū significat. Vnde Susa Persarū regia, ut inquit Athenæus, ob amoenitatem uocata fertur. Theophrastus Liliū Aegineticum, & e Cilicia cōmendat.

E X M. V E R G. C O M M.

S Vsinum. Testantur Græcorum Lexica, ex Lilijs factum unguentum, Sufinum dici, nullā tamen eius nominis causā & originem docent.

Sunt qui Crinon, Manifestum hoc habet intellectum. Crina enim Lilia uocant.

Excolatoq; oleo Cardamomi tusi, &c. Græce, *ὡς ἀπὸ καρδίας φιλίων ἀποχυμὰ καρδαμῶν*. Nos deflexo in certiore sensum, rerū & uocum ordine reddidimus. Nulla tamē melioris co dicis fide adiuti, sed sola usus, necessitasq; in ea coniectura: quæ quam uera sit, peritorum cen suræ æstimandum relinquamus. Nobis, ut aliquam rationē harum reddamus, uisum est, his diuersa spissatione iubere Dioscoridem, ad Liliū unguentum præparari oleū. In prima. odo rato Calamo, & Myrrha, quæ uino prius macerata, in oleo coquenda sunt. absolutaque co. ctura, & excolato ab illis oleo. In secunda Cardamomum iniici præcepisse, & cum aliquādiu in illo oleo maduerit, exprimi, &c.

D Post hæc translati in labrum ex fiscelli expressis aromatis, &c. Non satis certū habet ex uer borum ordine sensum, facilis tamen rei cōiectura est. Iubet enim Dioscorides, iudicio nostro, ut minore sumptu, maior olei copia spissetur, expressis semel aromatis illis superinfundi rur sus oleum, sic iterum, tertium, & quartum faciendum esse. Credimnsq; participium quod illic est *ἀρωματισμῶν*, quod aromatis odoratum significat, abundare, aut pro præterito futurum le gendum esse *ἀρωματισμῶν*, scilicet, quod odoratum significabit, unaq; hac uoce tantum muta ta, facilis sequaxq; totius rei deinceps intellectus erit: quod signasse satis sit.

Reliquimus præterea ab hoc loco statim, quod instaurari, impleriq; a nobis nō potuit, nec debuit. Priuationis enim nulla est mensura, periculosaq; temeritate, quod sic deest expletur, fa cillimumq; omnibus erit ex græcorum codicum lectione uitium deprehendere. Numero enim plurali inceptū mēbrū, singularis numerus excipit, miscetq; adeo sensum & incerta reddit quæ sequūtur, ut nihil nobis eo loco cōmodius uisum fuerit, quā relictō hiatu aliq; legētes uitium mo nuisse, ut aut cognitū nō fallat, aut instaurādo eo felicius posthac laborare aliquis cogitet.

uerguuntur

¶ De Narcissini compositione. C A P. LXII.

N Arcissini olei spissamenta ita fiunt. Sex libræ Aspalathi cum se x tante tunduntur. Olei eloti libræ septuaginta cū uncijs quinq; assumuntur. Aspalathus aqua madefactus, in tertia Olei parte coquitur, quo exempto, Calamus quinque libris & besse, cum Myrrhæ gleba con tunditur: cribratusq; ac uino ueteri odorato immistus decoquitur: simul ac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum Oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, Flores Narcissi q̄ plurimi coniiciūtur, qui bidui spacio, ut in Susino dictum est, permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum. siquidem celerrime putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas uulnæ duricias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

De Crocini

BARBARI COROLL.

Narcissinum ex Narcissi flore componi, desijt Plinij ætate. Id de unguento eius dictum accipio. Nam de oleo Narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

EX M. VERG. COMM.

Variant Græcorum antiquissimi codices, quo loco hic ait, *κρόκος καὶ ἐρίων ὀδόντι τῷ τρίτῳ τῆ ἡμέρας*. Indicant enim alij sensum, qui sit, Aspalathum coquendum esse in tertia olei parte: quod sine causa dictum uidetur. Cur enim. 70. pondus olei hic accipi iussisset, si tertia tantum partis futurus erat usus? Alij concinniores ostendunt sensum, qui sit, ad olei tertias sumendam esse aquam, in aqua Aspalathus maceretur. Quæ lectione rei magis congruente nos secuti sumus.

Non habet deinde certum pondus, quod nos diximus, Myrrhæ grumum. Intelligenda tñ in eo, ea quantitas est, quæ exigua potius quam grandis sit. Siquidem græci *χένδρος*, dicunt in sale exigua frustra, & quasi quantum fumini cōtractis in unum digitis capere aliquis possit. Tota res in conjectura unguentarij posita erit.

Credimus præterea deesse olei pondus, quo loco ait. Sumito postremo ex oleo. &c. Non enim decernit quantum olei sumi oporteat. Nisi forte & hoc in eiusdē coniectura relictū fuit.

Erant & alia de Narcissi flore dicenda. Sed omnia quarto volumine in hystoria eius copiosius dicentur.

De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.

Cvm Crocinum cōponere uoles, prius olei, ut in Suisi diximus, *κρόκινον* spissamenta facies, eisdem ponderibus & mensuris. cuius olei, libras treis & semissem, Croci unciam unam assumes, identidem in die moueto. & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleum a Croco colis incernito. Eidem Croco parem olei modū adijcito. Moue triduo. Dein contusa Myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitans recōdito. Aliqui parem Cyprini portionem oleo aromatibus ad Crocinum imbuto adijciunt. Optimum est quod abunde Crocum spissat, in medendi usu expetitur. Proximum, quod Myrrham refert. Calfacit. Somnū allicit. Quare per sæpe phreniticis subuenit, aut perfusum, aut naribus admotum, aut illitum. Pus mouet. Vlcera purgat. Contra uulvæ duricias atq; præclusiones, & ulcera quæ cacœthæ uocantur prodest, cum croco, cera, medulla, duplicato olei pōdere. Concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. Ad oculorum glauitates ex aqua illinitur. Huic autem simile est Butyrinum, Onychinum, & Styracinum: quæ & si nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

BARBARI COROLL.

Crocinum, in solis Ciliciæ diu laudatum: mox Rhodi. Additū huic & Cinnabari, et Anchusa, & uinum. Theophrastus & ex Aegina cōmendauit.

EX M. VERG. COMM.

Inclinat animus nobis, quod in omnibus græcis pariter legitur, eidemq; Croco par olei pondus superinfundito, non sic, sed contra legi oportere: mutataq; in uicem a libtarijs, aut imperitis Medicis, oleum & Crocum fuisse, nullam enim id causam habet, rationemue, cur sic faciendum. Si quis autem multo rerum ordine legat, eidemq; oleo, par Croci pondus superinfundito, cōmunē alijs confectionibus causam & rationē ostendet, ut geminata scilicet Croci quantitate, maiores continue & efficaciores uires Crocinum acquirat unguentum.

Considentius non multo post literas mutauimus aliquas, quo loco hic ait, *ἴσως δὲ τὸ πρῶτον κρόκινον*, quod significat, sunt etiam, qui par Cyprinum oleum, &c. Instauratusq; a nobis certo re sensu sic locus est, *ἴσως δὲ τὸ πρῶτον τὸ κρόκινον*. Quod est, sunt etiam qui ad Ligustrinum unguetum aromatis, &c. Neq; enim aliter intelligi res potest. Quemadmodum Paulo ante etiam quod erat, *καὶ αὖτε ἐν ἄλλῳ χροκίμῳ*, quod est, in pila, seu mortario misceto, non pilam, mortariumue

A
Pli. 21. cap. 19.

κρόκινον

B

C diximus, utrum in oleo, quod uerisimile erat, cogitantes, pro *ἐλαιον, ἔλαιον* factum esse. Qui enim sensus potest esse, & quis rei usus, si quis tulam et excussum cribro myrrham in mortario misceat: Quod enim mortario erat tulum, iam et cribro excussum erat, nec bene sumi, et in mortario misceri præcipiebatur, in quo non recte misceri aliquid dicitur. In tundendo enim, non in miscendo mortarii usus est. Miscetur autem oleo bene, quod tulum iam est. Nec aliter, si quis locum bene odoretur, intelligi res poterit. Barbarus in cunctis his communem lectionem secutus, qualia se illa ostendebant, talia etiam uertit.

Styracinum, idest, ex Styrace.

Butyrinum, ex butyro, quod ut apparet olim pro oleo adijciebatur, miscebaturque his quæ suppurationes adiuuabant.

Onychinum, ob Onyche in testaceo genere pisce, cuius adeps pro eodem oleo in usu erat. Indicauitque id Plinius lib. 22. cap. 6.

O De Cyprini spissamento & olei compositione. CAP. LXIII
ἀσπιρίν Lei Omphacini cloti pars una, aquæ cœlestis dimidium, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis amiscetur. dein assumptis Aspalathi libris quinq; & semisse, Calami libris sex & semisse, Myrrhæ libra una, Cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouē & uncijis quinq;. Aspalathus tulus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec efferuescat. Myrrha autem uino uetere odorifero subacta, cōtususc; Calamus digeruntur in offulas, quæ exempto Aspalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato ahæno, oleum percolatur. Cardamomū tulum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitatur, nulla dum refrixerit interpellatione. Post hæc colato oleo, in uigintioctio libras olei, floris Ligustri, quod Cyprum uocant, sex et quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ, per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem florum pondus iniectum simili modo prematur, & iterum, aut tertio si quis uelit madefacere, poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitæ nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt, Calfacit. Emollit. Venarum spiracula laxat. Vulgæ, neruorūque uitij cōuenit. Pleuriticis, fractisq; p se, uel Cerato imistum. Malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur. Item acopis.

C YPRINUM, in Cypro cōmendatissimū: deinde in Aegypto. Huic et Abrotonum quidam adijciebant. Alij Panacem. Oprimū postea Phœnicion, e Sidone fuit, mox Aegypto. Si non addatur Sefaminum oleum, durat quadriennio. Excitatur Cynamomo. Viris dicebatur Cyprinum & Rosaceum. Colos Cyprino candidus Theophrasto, uiridis Plinio. Precium in libras quinq;. E Cypro Canopia, in ripis Nili nata, laudatissimū. Ascalonem, Iudææ proximū. In Cypro tertium. Ita mutatur saepe autoritas, Vnguentum ipsum a Theophrasto, non Cyprinum, sed Cyprus quoque dicitur. Nam Cyperinon, e Cypero, quæ Cyclades fuerunt insulæ, cōponitur, Euetricon, a Theophrasto nominatum.

E X M. V E R G. C O M M.

D Esyderatur in hoc capite certum temporis spacium, quo dimittendo in oleo flores illi essent. Idque non minus, quæ cetera monuisse oportebat. In antiquo sane Dioscoride latino, notum & diem adhuc legi, quod tempus, implendis oleo floribus, miscendisq; simul uiribus, satis fore uidetur. Sed nescimus, quanta illi fides habenda sit. Qui id agent, sagaci coniectura utentur, obseruabuntque, ne breuiore tempore, abortiuum fiat unguentum, longiore uero referueant, & uidentur humentes & succosi flores.

Quod si

Quod si copiosius facere uolueris. &c. Non caret suspicionem hic locus. Credimusque com-
paratum nomen *πλῆθος* quod illic est, aut aliud quiddam fuisse; quod non copiam, sed effica-
ciam, & uires significaret, aut uocē aliquam deesse, quæ illi coniungeretur. Verbi causa, *δύνα-
μις*, ut esset sensus, quod si maiores uires illi addere uolueris. &c. Eo enim, non ad copiam per-
tinent quæ sequuntur, ad quas augendas uires, nō his tantum, sed et flores addi etiam iubet:
causamque ipse adfert, efficacius ea ratione fieri dicens. Nihil tamē his quæ passim leguntur ad-
didimus, commentatione hac nostra, quod desiderari potuit, expletes.

De Irini spissamento. CAP. LXV.
Spathæ quam minutissime contusæ sex libras cum besse, in tribus &
septuaginta libris & quincunce olei, æreo uase, additis decem aquæ
heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in craterē melle ob-
litum colato, ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur,
macerata Iride, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septu-
aginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictū est contusi, libras quin-
que & sextantem excoquito. Postea detracto Xylobalsamo nouem li-
bras & dextantem adijcito, & Myrrhæ glebam uetere uino odorato per-
fusam, & in olei odoribus imbuti quatuordecim libris tantumdem tusæ
Iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue et uchemēter distrin-
gito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio maceratum
exprimito. Longe opimum est, quod solam Irin olet: quale est in Perge,
in Pamphilia, & Elide Achaiæ natum. Vim habet calfactoriam, atque e-
mollientem. Crustas adimit. Sordida ulcera & putrida purgat. Confert
sceminis uulue affectionibus obnoxijis. Item inflammationibus eiusdem
atque præclusionibus. Partus ejicit. Hæmorrhoidas laxat. Contrā auri-
um sonitus ex aceto, Ruta, et amaris nucibus, prodest. Diuturnis destilla-
tionibus naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas oze-
nas uocant, auxiliatur. Aluum purgat cyathus epotus. Facit ad llei cruci-
atus. Vrinam mouet. Difficileis uomitiones adiuuat, peruncis eo digi-
tis, & immixtis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum induuntur. Anginæ etiā
illinitur, aut ex aqua mulsa, gargarisatur. Item contra faucium scabrici-
am. Datur ijs qui Cicutam, Coriandrum, aut uenena Fungorum hau-
serunt.

BARBARI COROLL.

Irium Corinthi, postea Cyzici placuit ipsa quoque per se Iris illyrica nobile unguentum fa-
cit. Sunt qui unguentum hoc, Catirion quoque uocent.

Pli. li. 3. ca. 2.

EX. M. VERG. COMM.

Quam hic Achaiæ Elidem dicit, Arcadiæ credimus legendum esse. Illi enim, non Acha-
iæ, altera a geographis Elis assignatur. Quæ uero Medici uiserunt, græci *χρῆμα* nomi-
nant, reliquas ab igne carbonis modo & colore crustas.

Nec sunt paulo post, Ruta & Amygdalæ a nobis instillari dictæ, nisi etiam succo & oleo in-
stelligendæ. Sic enim hic docere multa consuevit, medicis necessitatem usus in tractatione cogno-
scendam, relinquens.

De Gleucini cōpositione. CAP. LXVI.
Gleucinum absolute constat Omphacino, Iunco, Calamo, celtis
co Nardo, Spatha, Aspalatho, Sertula campana, Costo, & Mus

γλῶσσο

Csto, circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata uinum & oleum cōceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur. postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus, & neruorum, uuluaq; uitijs auxiliatur: omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Pli. li. 23. ca. 4.
Colu. lib. 12
cap. 51

GLEUCINUM dictum est, quia ex musto conditur: ab alijs Mustum incoquitur, uapore lento. Alij permittunt, sine igne consumatur oleo mustum; alioquin non Sampfuchum tantum admiscet, sed preciosiora quoq; odoramenta.

E X M. V E R G. C O M M.
ALteram, diuersamq; ab hac fuisse quondam Gleucini confectiōē, hic ipse indicat. Et Columella libro. 12. capite. 51. copiosiorē eius confectiōem indicat. Postremo Plinius, qui libro 23. capite. 4. de Gleucino agens cōtra Dioscoridis decreta, astringere Gleucinum et refrigerare dixit, aut manifeste errore, quod in re tam manifesta non facile credendum est, aut de altero Gleucino eas uires testatur. Ea nulla hactenus in græcis inuenta a nobis est. Desyderauimus etiam Musci olei, aromatūq; illorum mensuras & pondera: poterit tamen qui id nouisse cupiat, ex Columella eodem capite uestigia eorum aliqua odorari.

De Amaracino. CAP. LXVII.

Amphacino

Amaracinum longe optimū in Cyfico fieri solet ex Omphacino & Balanino, spissamentis e Xylobalsamo, Iunco odorato, & Calamo factis, ascitaque suauitate Costi, Amomi, Nardi, Casiæ, Carpobalsami, & Myrrhæ odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, Cinamomum addunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporem mouet. Venarum spiracula laxat. Emollit. Feruorē excitat. Vrinam cit. Putridis ulceribus ac fistulis perquam utile, necnon humētib; hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit. Crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit. Difficili urinae illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur. Hæmorrhoidas illitu soluit. Vuluæ subditum menstruos cursus euocat. Duricias, ac uulua tumores, discutit. Veneratis neruis, lacertisq; confert, leniter astringentibus madefactum & impositum.

Pli. li. 21. ca. 12

B A R B A R I C O R O L L.
AMaracinum duplex, uulgare, & quod priuatim componebatur in Co: cui & nomen peculiare inditum Hedychrū: ideoq; seorsum agitur de utroq; quanq; non distinguat Plinius. Laudabatur & e Melo insula, ut scribit Apollonius. Hedychrū a colore dictum uideri potest, quoniam Theophrastus infici hoc tradidit radice Syria, quā Chroma uocant: unde Chromasius forte color nomen uulgo traxit. Quamuis & aliā originem dicemus in Saxifraga. Meminit & herbæ cuiusdam Syriæ uocatæ Aristoteles, quam Theodorus Suriam cōuertit. In Columella radix Syria, genus quoddā, ut nonnulli tradunt, Rhaphani significat. Et in carmine Assyriam radicem uocauit, quam Zythum commendari cum Lupino macerata cecinit. Ipsius quoq; Amaraci Cyzicena succo preciosum unguentum fiebat. Paucarum, ut ait Plinius, accessione specierum, melle, salis flore, omphacio, agni folio, uel ut quidam legunt, agnō, polea, panace. Plinius & alij Amaracum hac parte pro Sampfuchū uolunt intelligi, ex quo Amaracina unguenta nominentur. Seruius grammaticus, Puer fuit inquit unguentarius Amarcus, qui casu lapsus, maiorem ex confusione odorem creauit: unde optima inquit unguenta dicuntur Amaracina. Alioquin Amarcus proprie Galeno & Paulo, est herba illa quæ a Dioscoride Parthenion uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.
VNum idemq; olus Amarcus, & Sampfuchum est, non eadem tamen ubique bonitas, & unguent

unguenti ex eo confectio. Neq; idem omnibus locis nomen. Omnis fere græcia Samfuchum, Cyziceni, hoc ipso autore in eius historia, Siciliaq; & ut in uicino fit, Sicilia propinqua Italia, Amaracum uocant. In Cyzico & Cypro laudatissimum, probatissimumque nascitur. Et Plinius Cyprium tantum laudauerit, communiterque tota Græcia, sed minus probatum preciosumq; ut supra traditum.

Quotidianum eius unguenti usum in delicijs fuisse, Lucretius indicat cum canit. Aut Amaracini blandum, Staeteq; liquorem. Et in plebe notissimum proverbium. Quid cum Amaracino fui? Multum & ubiq; notum hoc olus est. Rura nostra Persam, reliqua omnis fere Italia Maioranam appellat, quæ appellatio in Græciam aliquando perlata, historiæq; huius scriptoris, pro romano nomine inserta, uera esse ostendit, quæ a principio de appellationibus his dicta a nobis fuerunt. Creuisse scilicet, per tempora earum numerû, adijciendis continue medicis, herbarijsque codicibus suorum temporum, suæque gentis, & alienas appellationes. Notum enim Italia id nomen est, ideoque historiæ Samfuci, non a Dioscoride, sed a posterioribus additum est.

De Megalino. CAP. LXVIII.

Factitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiae complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum Amaracino eadem erat, sed Resina exuperabat, excelebatq;. Quare leuiter emolliebat. Resina unguentis, neq; tutelæ, neq; uoluptatis gratia adijciebatur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquebatur, dum desineret olere. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de Resina differemus.

μεγαλινον

Megalium propter gloriam appellatum ferunt, q; excusserit Telinum, ante se cantatissimum. Alij, ut a Megalio inuentore, qui Siculus, siue Atheniensis fuerit, existimant. In qua sententia & Aristophanes, & Pherecrates, & Stratis, comici Poetæ sunt. Huic nonnulli & Cassiam ascribebant. Huius proprietates, ut uentiletur in coquendo, donec olere desinat. Rursus refrigeratum, odorem suû capio. Iulius Pollux & Metallicon, a Metallio Siculo inuentore celebrat. Nisi quis mendose, pro Megalio, scriptum Metallicon existimet.

B
Pli. li. ii. ca. 1.

EX M. VERG. COMM.

Ab honore, qui unguento huic ob feliciorum eius usum a ueteribus datus est, ci uocauerunt. Nec aliud Plinius indicauit dicēs, propter gloriam sic appellatum fuisse. Idem. Excepta, inquit, resina, Amaracino erat quondam primæ bonitatis æstimatum, mōx damnatum, meliore, & apriore Amaracini confectioe inuenta, qualem hic pauloante duobus capitibus tractauit.

De Hedychroo. CAP. LXIX.

Quod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus Amaracinum, sed suauius spirat.

ἡδύχρονον

BARBARI COROLL.

Hedychrum, & Hedychroon, a coloris hilaritate dictum, ut præfati sumus. Idem uidetur esse cum Amaracino, nisi q; nomen hoc proprie habet in Co, ubi nobilissimum. Hinc proverbio locus. Nihil cum Amaracino fui, ut est apud Gelium. Inuenio & in Theriacen, requiri Hedychroon: quanquam diuersa eius compositio probatur. Andaracoron, peruerse appellant Arabes. Ingrediuntur in Hedychrum, ut græcos sequamur, asarû, amaracus, aspalathus, carium semē, calamus odoratus, iunci flos, xylobalsamum, opobalsamum, phu ponticum, ci namomum, costum, myrrha troglodytica, feniculum, spica nardi, amomum, mastyche, uinû uetus odoratum.

EX M. VERG. COMM.

Nobilissimum in Co unguentum hoc quondam siebat. Incertum tamen, quam nam hic

Co dicant Hypoeratis patriā, & Cariam quondā, autore Stephano appellatam; an in AEgypto ciuitatem eodem nomine, cuius idem meminit auctor, et quam antiquiores aliquot græci, maluisse uidentur, in quibus adhuc legitur, *ἐλευθερίου δι' ἃ καὶ ἐκρίπτεται*. Quod sequentis capitis principium quadam tenus confirmare etiam uidetur, in quo uelut in continua rerū historia hic ait, *ἐλευθερίου δι' ἃ καὶ ἐκρίπτεται*, quod est, conficitur in Aegypto etiam; cum tamen nec superiore capite, nec ab eo altero Aegypti Dioscorides meminerit.

A coloris nitore & hilaritate Hedychroon factum huic unguento nomen est, neq; in ratio ne nominis dubitandum. Illud potius querendum, an sic uocaretur, quia haberet ipsum, an magis, quia in alijs coloris eam hilaritatem faceret. Si cōfectio eius, & quæ id aromata, semina, multaq; alia ingrediebantur a græcis tradita, diligentius expendatur, nihil erit quod ab egregia coloris bonitate laudari possit, misistq; tam multis colore dissimilibus, gratum oculis & hilare expectari possit. Inclinat ob eam causam animus, quoniam his, qui eo inungerentur, coloris bonitatem & nitorem adderet, sic quondam ueteres id nominasse, rarumq; aut nullū eius in medicina usum fuisse, historiæ breuitas, & capitis decurtatio ostendit. Nec facilis nūc coniectura est, docuerit ne tam breuiter de eo Dioscorides, an posteriores medici, quia sanādis morbis exiguas haberet uires, quotidianosq; alios usus, ad eam breuitatem contraxerint. Galenus certe his uerbis rem absoluit in sua Isagoge. Quæcunq; autem ad meliorem uultus speciem inunguntur, qualia sunt quæ Sandice, & Hedychroo constāt, non medicina, sed fucatoria, & mangonici lenocinij propria sunt. Quibus manifeste ostenditur, facere in homine, non habere in se coloris hilaritatem Hedychroon.

Capite de oculorum medicamentis.

De Metopio. CAP. LXX.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Fit in AEgypto unguētum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbanū mistionem. Nam lignum in quo Galbanū enascitur, Metopion uocant. Cōstat amaris nucibus, Omphacino oleo, Cardamomo, odorato Iunco, Calamo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & Resina. Probatur pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham quā Galbanum respiciat. Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit. Ora uenarum aperit. Vlcera purgat. Ad præcisos neruos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Caratis & malagmatis inseritur. Rigoribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & rectorum cōtracta est, utile habetur. Sudores ciet. Vuluæ spiracula laxat, & eiusdem duriciæ discutit. In summa, molliendi naturam habet.

Metopium in AEgypto, præferebatur quondam Cyprino, abstulit deinde gloriā Phoenice, hoc e uilisissimis erat.

EX. M. VERG. COMM.

Non ferulam in Syria nascentem, ex qua Galbanum sūillet, Metopium in historia eius hic ait appellari, sed liquorem, siue lachrymam eius. Credimusq; ideo, non *ἴσθαι* hoc loco, quod lignum, & materiam, uerum *ἐκρίναι*, quod liquorem significat, legendum esse. Nisi forte in historia, non hic uitium sit.

Sequitur mox, quod in cunctis græcis legitur, ex amaris Amygdalis, confici unguentum hoc. Quod non sic intelligendum est, ut Amygdalarum carnem credat aliquis illi misceri, uerum oleo ex illis expresso, confici hunc docere. Indicatque id, quod hic idem, in Amygdalino oleo dixit Metopium dici, quoniam scilicet priuatim in hoc unguento usus eius esset, eamque ob causam, nos certius rem indicantes, ex nucibus illis expresso oleo fieri diximus. Itēq; acerbo oleo, ut alterutrum eligi oporteat.

Non uidetur nobis deinde integer locus, ubi diximus, Emplastris additum, quas græci ab excedendo,

exedendo, septas uocant. Nec uolumus id pro certo legendibus accipi. neque enim sequax rei & sermonis ductus est. Nec accipiendi sunt hoc capite rigores in scapulas, ut non alijs etiam rigoribus hoc ipsum remedium uide sit: alijs enim rigoribus pariter proderit. Nos autem quod in Dioscoride legitur, qua debemus fide reddidimus.

MENDESIO. CAP. LXXI.

Mendesium cōstat Balanino oleo, Myrrha, Casia, & Resina. Alii mendisium qui tamen post singulorum pondera, Cinamomi exiguum addunt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fiere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

BARBARI COROLL.

Mendesio colos niger: a loco ubi Mendes, hoc est, caper colitur. Veteribus inter laudatissima, & post Deliaum in Aegypto, prælatum quandoque uel Cyprino. Celebratur & Mendesium uinum ex Aegypto. Item Mendæuum, ex Thracia Hippocrati, contra renum uisita.

Plin. lib. 13.
cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

In Aegypto fieri cōsueuiffe Mendesium unguentum, & in ea Aegypti parte in qua Caper, qui Mendesium genti illi appellatur, coleretur, nomen indicat. Eiusq; rei testis Plutarchus est in libro quem scripsit, quod bruta ratione utuntur. Plinius Metopium & Mendesium, propria fuisse Aegyptiorum unguenta ostendit.

Nobis in hoc capite suspectum est, quod hic ait *μὴ τὸν κατὰ φύσιν*. significat enim singulorum per sua pondera adiectionem: cum tamen hic mox dicat, non communicare uires, quæ non fuerint simul decocta. Quibus colligere ratiocinariq; facile est, de coctura aromaticis in oleo, aliquid egisse Dioscoridem, & quod ponderis illic significationem habet, cocturæ notam & rationem habiturum fuisse.

DE STACTE. CAP. LXXII.

Stacte, uocatur pinguitudo recentis Myrrhæ cum exiguâ aqua tuscæ, stactē & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac preciosa est. atque unguentum per se facit, Stacte nominatum. Maxime probatur, quæ nullam olei mitionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim Myrrhæ calidis unguentis correspondentem habet.

BARBARI COROLL.

Stacte dictum, quoniam e stillatitia dūtaxat Myrrha fiat: colore pallido, suauitate mira, sed amaritudine præcipua. Constabat & Myrrha unguentum regibus Persicis dictum, quod illi capite, seu diadematis uice impositum gestabant. Sed addebatur Myrrhæ, Labyzos appellata, quam multo preciosiorem, q̃ Myrrham esse, Dioscorid. scribit. Appellatione unguenti Aegyptij, Stacten uenire, auctor est Athenæus. Hippocrates, pro eo, q̃ ex Acanthes uocatæ floribus conficitur, & Pæderos ab alijs uocatur. Olei uero Aegyptij uocabulo, idem Hippocrates Cinum significat. Vbi uero adijcitur, candidum Aegyptium, pro Libino capitur, ut Galenus placet.

EX M. VERG. COMM.

Non uidetur Theophrasto, Theophrastumq; secutis scriptoribus, & Dioscoridi huic nostro, eadē Stacte esse, nisi forte, quod in Theophrasto legitur *τὴν ἐκ πίπτοντος ὁμοῦ* *ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ* *ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ*, non ad genera eius, sed ad partes & usus referendum sit: diuiseritq; Theophrastus, nō Myrrhæ genera, sed docuerit in expressa Myrrha primam destillationem, ad unguentum Stacten, reliquam uero Plasten, quasi ficticiam, eo q̃ conformaretur, appellari. Hic enim, & hoc capite, & mox in Myrrhæ historia, Stacten indicat, primam cum exprimitur, Myrrhæ destillationē esse, significareque hanc uocem, simplex ex ea factum, qua ratione præmonstratum est unguentum. Neque enim aliter intelligi potest eo loco, qua expressa Stacte excipitur, & mox, quæ etiam multam Stacten dat: omnia, si diligentius res expendatur, non ad Myrrham simpliciter, sed ad bonitatem, usumque eius pertinentia.

A destillando, quod greci *ἀπὸ τοῦ* dicunt, Stacte dicta est, significariq; ea uoce non simpliciter Myrrham, uerū ex expressa Myrrha pinguiissima eius destillationē indicat Lucretius, dicens,

c. iij

C Aut Amaracini blandū Staetq; liquorem. Odoramento, & unguento eam coniungens. Meminit Columella etiā in carmine suo, cum cecinit. Et melior Staete, ponatur Achaica Myrrha,

Quin etiam antiquorum græcorum lexica, non Myrrham, sed τὸ ἀπὸ τῆς ἐμύρης γινόμενον μύρεν, Staeten diffiniunt. Ob quæ inclinatur animus, & in hoc, & alijs scriptoribus non Myrrhæ aliquod genus, sed quod optimū et pinguissimū ex ea destillet primū, hanc Staeten esse, quæ per se nullo alio aromate adiecto, unguentum sit. Neq; obstat quod Plinius ait. Sudāt autem sponte prius, quam incendantur Staeten dictam. Et paulo post, Precia ex occasione ementiū uaria. Staete a sex ad quinquaginta. Ponit enim Myrrhæ genus unū, eadem hac uoce a de stillādo factō significari. Quemadmodū idem Plinius lib. 17. cap. 11. de Resina agens ait. Hanc mares dumtaxat ferunt, & eam græci Staeten uocant, odoris grauiissimi. Ex quo facilis cōiectura est, non Myrrhæ tantum propriam uocem Staeten esse, sed aliorū etiam liquorū lachrymarumq; ex arborum truncis destillatū. Quæ autem dicta a nobis hoc capite sunt, ad unguentū, non ad Myrrhæ genus: ut certius adhuc in Myrrha ostendemus.

¶ De CINNAMOMINO. CAP. LXXIII.

Cinnamominum e Balanino oleo, & Xylobalsami, Calami, lunci odorati spissamentis, atq; Cinnamomi, & seminis Balsamini sua uitate, quadruplaq; Myrrhæ ad Cinnamomum portione cōstat. Mel ad cogēda omnia adiicitur. Laudatur acre, molli odore, plane Myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non a Resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit. Resina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarā, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit. Calfacit, discutit, dissipat. Hu-

Dmores & spiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra uulua uitia cum duplo oleo, cæra, & medulla efficax est. Ita enim fere acrimonia exolefcit, & quædam emolliendi uis contrahitur. Alioqui adurit, & præ cæteris unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas, & ulcera quæ putredinis uitium senserunt. Item ad hernias humidiores, carbunculos, febriū rigores, tremores, gangrænasq; cum Cardamomo. Aduersus serpentis um morsus, illinitur. Scorpionum & phalangiorum icibus cum tritis grossis imponitur.

BARBARI COROLL.

Plin. lib. 13. capi. 11.

Cinnamominū, quod mel accipit, odoratum sit, a nōnullis quaeritur. Precia eius prodigio sa a denarijs, 35. ad. 310.

EX M. V E R G. C O M M.

Caret certo intellectu, quod in omnibus græcis legitur hoc capite, δόναμον δὲ ἔχει σφόδρα ἀπὸ μίαν καὶ θυμαρτικὴν καὶ πικρὴν, a nobis contra communem τοῦ πικροῦ. i. amari significationē his uerbis. Acerrimas habet uires, calefacit, maturatq;. Nec absurdo, ut nos credimus, in mutatione eius uocis consilio, & rei sensu. Paulo enim ante de amaritudine eius hic egerat. Incontinuumq; est, si quis dicat, amaras alicuius rei uires esse, præsertim, cū de calore, acrimonia, aperiendi discutiendiq; ui, & potestate agitur, quæ in diuerso penitus genere a saporibus sunt.

Eam ob causam, ex historia Cinnamomi πεπτικὴν δόναμον. i. maturandi uim, pro illo πικρὴν, id est, amaram, in hoc caput transfulimus: quod q; bene, et ex re factum sit, aliorum censuræ relinquimus, quibus licebit semper cum libuerit ad amaritudinem redire.

¶ De Nardini unguento. CAP. LXXIII

vāpōlūv

Ratio Nardini faciendi euariet. Nam aut Malabathrino folio, aut sine eo fit. Complurimum autem Balanino oleo, aut Omphacino.

phacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur, sicuti propter odoris suauitatem Costus, Amomum, Nardum, Myrrha, Balsamum. Laudatur tenue, non acre, Nardi aut Amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi Resinam recipiat. Fit etiam simplex ex Omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo, & Nardo.

NARDINUM, Galenus spicatum Romæ dici solitum, & fœminis, præcipue diuinitibus familiatè, prodidit. Nardus uero Pistica, siue unguentum, de quo mentionem literæ sacræ faciunt, probam & fidelem, & quæ adulterata non sit, Nardum significat Hieronymo. Quidam a loco, non men id fuisse putant. Nardinum e Tarso Ciliciæ commendatissimum. Unguenti nomen est & Nardus Cyzicena, in quod tamen Nardum quandoque non queritur, nisi Gallicum. Ingressi & Arnabo. Iulius Pollux, & Babylonicum Nardum, pro unguento uidetur accepisse.

Galen. lib. 11.
cap. 11.

PROBATUR in Nardini unguenti confectione. &c. Græce, ἡ δὲ χηρὴ ἡ λαρύ. In fœminino genere rem indicauit, quæ ad unguentum, nulla ratione referri potest: oportetque ad aliquid referri, quod fœminino genere non longe inueniatur. Nihil autem aptius nobis uisum est, quam ad Nardum, quæ nomen unguento dedit, referre: monuitque in eo nos omnium probatissimus mihi codex, in quo non λαρύ, sed λαρὶ legitur, quasi ignaua, & uulgaris Nardus, in unguenti confectione probetur. Quam certius adhuc describēs, acrimoniā illi abstulit, & siccæ Nardi, & ob id minus olētis, aut Amomi odore pbauit. Qualia autem hæc fuisse quondam conicimus, talia etiam docemus, quod sæpe alias testati sumus, liberā legētibz pbadi, & impbadi nostra hæc relinquētes.

Quod autem Dioscorides ait, uariam Nardini unguenti confectionem esse, eo pertinet, ut ostendat Nardinum ideo dici, quod non uera Nardo tantum conficeretur, sed alijs etiam, quæ odore Nardo similia essent: quale Malobathrum est, quod Folium quondam dictum fuisse testati sumus: ideoque factum fuisse, ut Nardinum aliquando Foliatum diceretur, credereturque a multis idem esse: cum tamen diuersa materia confectum, alterum ab altero manifesta uarietate differat.

Quod etiam in Euangelio legitur Spicatum, eandem causam habet, ut ex spica Nardi confectum, ab alijs discernatur: Indicauitque id Pau. Aeginetā, quo loco de aurii uicij & remedijs agit, inter quæ foliatum & spicatum diuersa numerat unguenta: uerissimèque est, ex omnibus quæ odore Nardi essent potuisse fieri, ideoque hunc dixisse, multifariam confici Nardinum unguentum.

MALABATHRINUM spissamenta Nardini habet. Insuper Myrrha additur, qua de causa calfacit, Crocino, aut Amaracino, uiribus correspondens.

μελαδολινον

MALABATHRINUM succo folij eius, nullo præterea coniecto, nobile unguentum, precium in libras. 60. Foliatum quoque appellari diximus. Quanquam dicat aliquis, Nardum quoque Foliatum uocari posse: quia folium Malabathri quandoque accipiat, quod & Dioscorides in Nardino meminit. Paulus quandoque Foliatinum, pro Foliato appellat. Idem Foliatum, Spicatum, Moschaleon, & Commagerium, fœminis ad odorem tantum queri affirmat.

Plin. lib. 23
cap. 47

FOLIATUM proprie unguentum hoc dicitur. Succo enim folij, quod idem Malobathro est, conficitur. Cætera eadem illi, & Nardino sunt.

APUD Persas fit, quod lasminum cognominatur, ex albis floribus Violæ, quorum sextans, in italicum sextarium Sesamini olei demittitur, Violis ut in Lilino diximus, uicissim permutatis. Apud Persas in-

ιδεοιου

Cter epulandum usurpatur odoris caussa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus quæ calfactionem, laxationemq; desyderant. Grauius enim spirat, q̃ ut libenter a plerisq; recipiatur.

BARBARI COROLL.

Iasme si quis interpretetur, Violaceū significat: quanquā Violaceum illud quod triuiale est Iaton potius appellant græci. Theophrastus Leucoion, ut ipsam quoq; Violam. Aliud hoc q̃ quod Regale nominatur, a Persis conditum atq; Parthis, ij fortentis animæ uirus, multitudine ciborum & ebrietate natum, acerbis odorū cōmmedatione summouet. Vnguentū hoc & Iasminum, & Iasmeleon, & Iasme dicitur. Quæ uox admonet me, ut ex ea fere Viola cōpositum intelligam, quæ uulgo Iesiminum uocatur, distinctiones & harundineos parietes in hortis opere topiario cōuestiens, flore candido, præcipuæ suauitatis, folium in uiridi nigricās, ob longum, fastigiatum, mucrone languido, magnitudine Rosacei, sed angustum. Hoc Violę nus Persicum, & Particum, & omnino peregrinum uocauerim, ab alba Viola, nostrate longo intervallo distās, uteribus (ut arbitror) incognitū, saltē Italiae. Recentiores tria Iasmes siue Iesimini genera cōstituunt, albam colore, ceruleam, & in Aegypto luteam, qualem & in Venetiā nasci modo cerimus.

EX M. VERG. COMM.

Florem quem omnes Iesiminum dicimus, colore candido, Violis figura non dissimilem, Violam antiqui uocabant, ignotum diu Italiae, ut uidetur, nunc autem plæbis hortos etiā grato odore commendantem, tam notum omnibus, ut nulla descriptione nostra indigeat. Credimusq; nos de eo egisse hunc scriptorem, cum cōmunis Violarū historia tertio uolumine ab eo tractatur. Numeratis enim albis, luteis, seu purpureis Violis, quę cōmunes & notæ omnibus sunt, quartū genus colore ceruleo addidit, quæ nullæ in Violarum genere nūc cognoscitur, necesseq; est ad Iesimini huius florem referri ceruleum colorem illum. Posteriores enim & inter eos Serapion, tria Iesimini, ex colore discrimina, & genera fecerunt, Cādidum, Luteū, quem ille Citrinum, & Ceruleum, quem celestis coloris uocat, omnes quōdam peregrinos, & Italiae ignotos, nūc omnibus cōmunes: uidetq; Italia & habetiam non candidos tantum, sed luteos etiam Iesiminos. Nec in alio Violarum genere Iasme hæc, & Iasmini unguentum intelligēdum est. Nam quod Palladius Violaceum docet, a græcis ἰάτρων dictum, ex Violis proprie nūc dictis, conficiebatur. Violasq; nos græcorum more dicimus eas, quæ primę uerū ciantes, plures uno ramulo florent, paucis & exiguis folijs, colore triplici, candido, luteo, & purpureo, præcipui in medicina usus. Quam enim Theophrastus nigram dicit, in alio genere ab antiquis numerata est, de qua suo loco dicemus. Videntur postremo nobis male sibi inuicem respondere, in Iesimini huius cōfectione, olei sextarium, & flores uncie duæ. Credimusq; in florū pondere uitium esse, nec tam exiguo flore, tantā olei mensuram satis posse odorari.

De MYRRHA. CAP. LXXVII.

μύρρα

πιδυάριον

γαστήριον

εργαστήριον

MYrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nō dissimilis, e cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua Pediasimos, præpinguis, qua expressa Staete emittitur. Alia Gabirea, pinguißima, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat Stacten. Omniū prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ Troglodyticæ secunda est, Bdelij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia Caucalis cognominatur, scabra præter modum, nigra, & retorrída. Omnium deterrißima, quæ Ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi

gummi imaginem uergens, & uiribus eius proxima. Improbatur Amminea cognomine. Ex his pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e siccioribus haud quaquam pingues, & inodorati. Minus uiribus pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua Myrrha maduerit. Eligenda est recēs, squallore obsita, leuis, undiq; concolor, quæ contracta internatos quasi ungues, cādidos & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua & inutilis est grauis, coloris Piceī. Calfacit, cohibet. Soporem gignit. Siccatur, astringit. Vuluam emollit, & præclufam laxat. Menfes & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorū cremore, uel succo Rutæ admota. Tuberculo fabæ deuorat in uetere tussis, orthopnoea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuiio, & dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua. Subdita linguæ, liquataq; scabriciem arteriæ expolit. Et densam uocem expedit. Ventris tinea enecat. Contra grauem oris halitū manditur. Et aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilit, colluto cum uino & oleo oris. Vulnere capitis illitu glutinat. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus, inflammatisq; cū meconio, castorio, & glaucio. Ad uaros autem cum casia & mel leillini. Impetigines ex aceto purgat. Defluētes capillos cum Laudano, & uino myrteo illita, firmat. Diuturnas distillationes lenis, illitis pinna naribus. Oculorum ulcera complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Scabriciem leuigat. Fit e Myrrha perinde atque Thure fuligo, & ut post ea ostendemus, ad eadem conueniens.

BARBARI COROLL.

MYrrha græce *εμψυκ* dicitur, & Zmyrna; ob id & notis duabus, zz, scribi solet a Medicis. Hanc & Myram uocat Hippocrates. Minor altitudine, sed fruticosior est Thure. Ad. v. tamen cubita crescere arborem Plinius meminit, caudice duro, intortoq; & crassiore q; hominis sura, & ab radice etiam q; reliqua sui parte, corticem leuem, proximumque Vnedoni, Andrachnæae, Folium Olusatri, quidam Oliuæ tradunt. uerum crassius, aculeatum, extremitate ut lignēū, Theophrastus Vlmæo simile. Nisi quod suspicor, libraniorum menda sit, pteleas, pro aleas contrarie scribentium. Scabrum alijs, spinosumq; dixere. cætera similem Terebintho, aut Iunipero, etiā gustatu. Foliū etiamnum rotundius. Vetus odoratio lachryma est, ut in Vite. Prima eius partitio, ut aliam Stactem, hoc est, stillaticiam, aliam Plasten, hoc est, ficticiam a Theophrasto nominatā sciamus. Permixtam arboribus Thuris nasci tradit. Alij separatim. Sed & alijs Arabie locis proueniunt. E siluis quoq; laudata, quam a Troglodytis Sabæi transitu maris petunt. Satiua siluestri præfertur. Gaudet rastrois & ablaqueationibus. Melior, radice nuda, refrigerataq;. Falsum est, e Thuris arbore utraq; gigni. Inciditur bis, iisdēq; cū Thure temporibus, sed a radice usq; ad ramos, q; ualeat. Sudat spore antequā incidat, Stactē uocatā; cui nulla præfertur. Post hanc satiua, & in siluestri quoq; melior æstiuā. Regi Gebenitarū quartas partes Myrrhæ pendent. Deo nō dant, quia & apud alios nascatur. Coemptā passim, ac pluribus locis in folles confarciunt, ipsiq; unguetarij probitates digerūt odoris & pinguitudinis argumētis. Aliiter nomina generū tradidit Plinius q; Dioscorides, hoc ordine. Prima Stactē, cui precium a. 11. ad. 70. Secunda satiua, cui precium summum ad. 21. Tertia siluestris. Siluestrium genera complura. Primumque inter eas locus Troglodyticæ; cuius nucleo precii ad. 16.

Plin. lib. 12. capite. 15.
Theophrast. lib. 9. cap. 15.

Myrrha optima dicitur
quæ sponte emanat
ex silice Carthagine
non crebrius perungitur
incidatur.

C probatur pinguedine, aspectu aridiusculo, sordida, et plane barbara, acrior cæteris. Proximus Erythrææ, quam intelligi Arabicam uolunt, Mineam uocant alij, præciumq; eius ad. 16. Huius species quatuor, Staîtea, Aramitica, Gebenitica, Ausiritis. In quibusdam exemplaribus non habetur Staîtea, Tertius Dianitidi, Quartus Collaticia. Quintus Sembracenæ, a ciuitate regni Sabæorum, mari proximæ. Hæc hilaritate insignis est, sed uiribus infirma. Sextus Drusitidi, Est & candida uno tantum loco: quæ in Messalum oppidum confertur. Diuersa sita prædictis, Odoraria cognomine atq; Sea, quoniâ plærq; sextam in Plinio, nō Seam legunt, haud constat: cui præcium redditur ad. 14. In plenum probatio Myrrhæ, glebis exilibus, nec rocorundis in concretu, albicantis succi, & tabescentis. Secunda bonitas, intus uaria. Pessima, quæ intus nigra. Peius, si sit etiam foris. Adulteratur Lentisci glebis, & Cucumeris succo, amaritudinis causâ, sicut ponderis, Spuma argenti. Reliqua uitia deprehenduntur, sapore gummi dense lentescens. Fallacissime autem Indica Myrrha, quæ ibidem quadam e spina colligitur, multo deterior: atq; hoc solum peius affert India. Nascitur & in Gedrosia, ut inquit Strabo. Argilosa uero terra, crustosaq; puenit in Arabia. Describitur a Dioscoride, & uocata Caulalis, colore atro, retorrída, *ὑπερπυρρὴ*, conuerti, maturitate insignis. Quemadmodū & exoleta dicimus, quæ græci *ὑγρορ*, & *ὑγρορ*. Quidam corruptum locum putant & *ὑπερπυρρὴ* legendum arbitrantur, hoc est, prædurum atq; scabrum: quod & barbara illa Mauritanij Serapionis interpretatio secuta est. Quanquā & *τὸ ὑπερπυρρὸν*, etiam hilaris, speciosaq; transferri potest: qualem Sembracenam fuisse diximus ex Plinij sententia. Hæc inquit, ante alias hilaris est, sed uiribus tenuis. Seorsum indicabitur & herbæ genus apud nos Myrrhis & Myrrha nominatū. Itemq; apud græcos. Quanquam pro aromate illi quidem propriè non Myrrham, sed Smyrniam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus non multo ante, cum de Staîte unguento ageremus, uideri nobis Staîte, pinguiorem, melioremq; expressæ Myrrhæ partem, huic scriptori esse, cum tamē Plinius Staîte, Myrrhæ genus manifeste faciat. Et Theophrastus libro. 9. idem testari credatur: quod tam certum hoc capite nobis sit, ut nō aliter intelligi a quoquam, Staîte in medicina possit, q̃ expressæ Myrrhæ prima distillatio, et quasi pinguis flos. Aliter enim, alijsq; Appellationibus a Plinio hic Myrrhæ genera numerat, numeratq; duobus, Pediafma scilicet, & Gabirea, quas pinguisimas appellat, ex utraq; expressa, copiosam reddi Staîte dicit. Quo ductu sermonis, quarumq; uocum significatione, nihil certius audiri potest. Nec alius colligi, quam esse huic Staîte pinguisimam, & primam expressæ Myrrhæ distillationem, cuius in unguentis & medicina, præcipuus & laudatissimus esset usus. Nec obstat quod Plinius ait, Sudat autem sponte, priusquam incidatur, Staîte dictam. Id enim plenius, ut in Resina lib. 7. forte appellauit, a distillando facta appellatione, & quoniam intelligeret, ut in expressa Myrrha Staîte reliquis partibus antefertur. Sic in fluxu eius ex arbore, probari magis sponte sua, q̃ inciso arboris cortice distillatam. In multis enim naturæ hic ordo, & quasi lex est, ut quæ prima, & sponte sua fluxerūt, meliora & minus sæculenta excipiantur. Quodq; & Theophrastus ait. *τὸ δὲ ἐκ πρώτης ἢ μὲν σαυτῆς ἢ διὰ πλάστης*, id est, in Myrrha alia Staîte, id est, stillaticia, alia Plaste, i. siucticia, non satis pro comperto nobis est, ad genera ne eius, an ad artificiosam expressionem referendum sit. *πλάστην* enim, artificium & opus humanum habet. Siue enim fingere, siue conformare dicas, utrumq; hominis est. Confirmareq; hoc uidetur non multo post Dioscorides cum ait, fieri ex Myrrha expressiones, ex pingui odoratas & pingues. Mox ignauā, & inefficacem esse expressam, quia oleum eius *τὴν ἀνδραγαθίαν*, id est, in confirmationem nō admiserit. Eodem uerbo usus, quo et Theophrastus in diuisione illa usus est. Quæ omnia longius a nobis dicta fuerūt, ut qd' Dioscoridi & Plinio idem non est, certius a legentibus agnosceretur: scirentq; omnes, huic scriptori, Staîte primam expressæ Myrrhæ distillationem tantum esse, neq; in medicina uocem illam aliud significari.

Non sunt præterea Plinio & huic eadem generū nomina. Hic in primo ordine Pediafmon, id est, campestre numerat, Theophrastum ut uidetur, secutus, qui de Thure & Myrrha longiorem historiam sic incepit.

Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores, aliæ in monte, aliæ ad radices montis, in priuatis agris. Ideoq; aliæ coluntur, aliæ cultura carent. Feruntq; montis excelsum altitudinem esse, siue stretem habitum, & niuib; conspergi, ex quo in planiciem profliunt flumina, quæ quoniam a græcis *πεδίων* dicitur, hic Pediafmon, quasi in campestri solo natam Myrrham appellauit, ut ea appellatione, a montana distingueretur.

Cæteræ generū in Dioscoride appellationes, quæ admodū & suæ, Plinio incertæ nūc sunt. Irrespsit

*Myrrha Staîte.
id est, stillaticia.*

Inrepsit inter hæc genera uitium etiam. Nam quod hic ait, *συνέχεται διὰ τὴν καὶ λεπτήν κατὰ τὴν γυμναστικὴν ἀριθμῶνται*, &c. non *λεπτόν*, idest, tenuis, uerum, *λευκόν*, idest, candido colore legendum est. Sic quoque nos reddidimus; Plinio & alijs autoribus accedentes, qui inter illa candidū numerant; idque palam testatus est dicens. Est & candido uno tantum loco. Nec nos in eo rati, cum ueterum autoritas mouit, quam quod tenuitas, parum Myrrhæ competere uidebatur, quæ glebosa, & in offas conuoluta, longe ab ea forma abest: & quod frequentissimum toto hoc opere hic error est, ut ubi *λευκόν*; quod cādidū est legi oporteat, illic *λεπτόν*, quod tenue legatur.

Quod deinde *παύρως*, & nos uertimus, eorum modo quæ exoleuerunt arefcens. Non a deo difficilem habet intellectum, ut dubitandum est opere, in Corollario suo, de uocis eius significatione Hermolao fuerit, qui maturitate insignem conuertens, parum proprie rem significauit. Inter cætera enim, quæ græcis *ῥα* significat, & speciosus habitus est, & quasi *ἐκκαμ* dicuntur *ῥαῖα*, quæ nec citius, nec serius in usum ueniunt, Sic Plinius Horemū mel uocauit, alterū eius genus, quod præcipua tempestate conficere ntr.

Variant antiquiores greci in ea quam erga simon dicūt, quam alij gummi, uiribus & asperatū, alij uiribus & odore referre testantur. Nos quod in pluribus legebatur, illud reddidimus.

Coniungitur huic parti statim quod omnino uitiosum est, & in quo male sequax & incertus sensus occurrit, a neutro in comunē genus traiectus. Idque huiuscemodi est, *καὶ πύρματι δὲ ἐξ ἁντῶν νόβιται ἀπὸ μὲν τῶν λεπτῶν ὑπόδου καὶ λεπρῶ, ἀπὸ δὲ τῶν ξερῶν ὑλοπύ καὶ ὑλοῦ δου*; Quod totum a nobis sic redditū est. Exprimuntur omnes, quodque ex pinguibus expressum fuerit, Quod totum pingueque est, quod uero ex squalentibus & aridis, nec pingue, nec odoratum. His tam aperte & tam certo sensu dispositis, nulla foeminini generis intercedente uoce, succedunt hæc statim, *ἄνθρωπος δὲ καὶ μὴ προσκυλινθῆναι ἔχουσιν τὴν ἀνὰ πλάσιν*. Quod si uelitalis, ut res habet, latum facere, non aliud aptius, quam si a masculino, uel foeminino nomine incipiens (comune enim illic genus est) dicat:

Infirmā, quod oleum in conformatione non acceperit, &c. Quæ uoces superioribus coniungit, nullum indicat legitimum sensum. Nec suspicari, sed pro comperito habere uitium illic esse, oportet. Videtur autem nobis, potuisse quondam hic sensus & rei series esse, ut quoniam in Myrrha sint crassiores atque parteis, doceret hoc loco Dioscorides, faciendā ex omni Myrrha Staeten, idest, exprimendā, adfusa aqua, myrrham, ut in Staete uiguento præmonstratum est, seruandumque, & in passillos conformandum quod expressum de illa esset: & quoniam in Myrrha bonitas odoris, & ad sanitatem in morbis uires essent, sic expressam Myrrham alteram odoris. s. commendationem & usum amittere, fierique *ἄνθρωπον*, infirmam & ignauam; non in uiribus ad sanitatem, sed in odore ad uoluptates, & delicias uitæ. Indicatque id, quæ subiecta statim causā est, quod oleo careat, quo, experientia docuit, diutissime seruari odores, & facile et uilissime perituros, nisi unguine & humore eius contineantur. Testantur id Plinius, Plutarchus, mille alij, ne longiores simus. Ex hac itaque causā, facilis coniectura fuit, de infirmitate odoris agere illic Dioscoridem, neque *ἄνθρωπον* forte antiquam, ueram fuisse lectionem, *ἄνθρωπον*, idest, sine odore legendum esse, ut una uoce infirmitatem & rem indicaret. Conijcimus tamen hoc, non decernimus.

Quo loco deinde legitur, contra alarum dolores, cum liquido alumine pari uiliter inungitur, iniectus mihi scrupulus, non dolores forte, sed uirosū & hircinum odorem illum qui ea parte sentiat, legendum esse. Suspitioni huic nostræ causam dedit, quod hic ipse in metallis, de omni alumine agens contra ingratos alarum, & uirosos odores inungi eo præcepit, quoniam illi astringendi, & repurgandi uis sit: nunc autem Myrrha illi adiecta; non tantum uidetur ea præcipere, ut ablit malus odor, quam simul etiam nouo & meliori odore qualis in Myrrha est, tetrū & hircinum ille delere.

B De Boeotica Myrrha. CAP. LXXVIII.
Boeotica Myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Boeotia nascantis. Melior est quæ Myrrham odore representat. Vis ei calfactoria inest. Emollit, discutitque. Suffimentis commodissime inseritur.

S De Styracē. CAP. LXXIX.
Styrax lachryma est arboris malo Cotoneæ similis. Præfertur fordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, quam plurimum in

A

B

ἐν τῇ κατὰ τὴν γυμναστικὴν ἀριθμῶνται

τίγλι

C sua odoris gratia permanens. qui dum mollitur, melleum liquorem reddit: qualis e Castabala urbe, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surfurosus, canoq; situ obductus. Cæterū lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & Myrrhæ æmula. Verum per pauca marnat. Adulteratur ligni Scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & Iridis crassamento, & quibusdam alijs. Alij ceram, aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantque. Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, Scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbāt: non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem aceret admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit. Medetur tussī, destillationibus, raucedini, grauedini, & retusæ uoci. Vuluæ præclusæ, duriciæ laboranti conuenit. Cit menses potū, appositūque. Aluum leuiter mollit, si exiguum cum Resina terebinthina bibatur. Miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisque Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo ueluti ex thure fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria Styracinum oleum componitur: quod calfacit uehementer, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. capi.
17. 25. libro. 24.
capite. 6.

D Styracem Syria supra Phœnicem gignit, ad Gabala, siue ut Dioscorides scribit, Catabala & Maracubra, & Cassium Seleuciæ Pieriæ cognominatæ montem. Arbor & lachryma eodem nomine est. Hæc illi ex austero iucundior. Intus arbori similitudo harundinis, succo prægnas. In eam fere per Canis ortum aduolant pennari uermiculi erodentes, ob id in Scobe sordescit. Laudatur & e Sidone, Cypri, e Creta uero minime. Ex Amano Syriæ medicis, sed unguentarijs magis. Placet maxime purus. Improbatur colos cano situ obductus. Adulteratur Cedri Resina, uel gummi, aut amygdalis amaris: omniaq; ea gustu coarguuntur. Exit & in Pamphilia, aut Pissidia prope Selgam Lacedæmoniorum in eo tractu coloniam. Sed acrior, minusque succosus, ut Helianus autor est post Strabonem. Ibi siluam eius ligni fertilem fuisse tradunt, e quo missilia corneis similia conficeretur. Vnde ortum, ut Tonsille præpilatæ, quas greci alio nomine Vroscos uocāt, Styraces appellari consueuerint. Ibi caudicem uermiculus, rametq; congerit ad radicem, deinde fluit humor, & scobi se ad radicem collectæ miscent. Pars quæ non leprosa modo, sed terrosa quoq; est, odoratio, ut inquit Strabo, est. In Aethiopia quoq; Styracem provenire scribunt. Precium optimo. 19. Qualitatem eius non unam esse, argumentum hoc est (ut puto) candicans. Chrymariam Arabes interpretantur eum, qui rarus inuenitur, & gummi similis describitur. Iidem Calamitin, quanquam harundine sua mixtus, ipso nomine significatur. Pro liquido tamen accipiūt, & fastigia Styracis duo faciunt, siccum, & liquidum, confusione magna: q; aliquando liquidum Styracem pro Myrrha Stactæ sumunt: aliquando ex eadem arbore colligi utuntq; putant, liquidum, atq; siccum. Aiunt Arabes Styracem e Syria perferentes, in pellibus hircinis urere, ut odorum suorum Thuris & Mynhæ satietatem acrimonia peregrini ligni redimant, Iidem petunt Elimæos arborem brutam Cupressio Susæ simile, ex albidis ramis, iucundi odoris accensam, & miraculo, utingit Plinius. Historijs Claudij Cæsaris celebratā, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore Cedri. Fumum eius contra ligna alia remedio esse prædicant. Nascitur ultra Phasim, Tignimq; in sinibus eppidi Scinæ; in monte Scanthro. Sunt autem Elymaei Assyria gens, Susianæ Persiæ contermina, Petunt & in Carmanos arborem Strobum, quam uitio Palmeo persusam urunt, suffiuntq; testā. Nidor a lacu naribus

naribus ad solū iocundus reciprocatur, q̄ citra dolorē caput aggrauet, & somnū ægris cōciliat. **A**

BONitate in eo excellit, qui rufus & pinguis. &c. Non ut in impresso sic in cæteris *juniper*, quod pingue significat, quod sordidum est legitur, sed una tantū & altera mutatis literis.

¶ De Bdellio. CAP. LXXX.

BDellium, alij Bolchōn appellant, alij Madelcon. Lachryma est saracenice arboris. Probaturn gustu amarum, transfluidum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum Bdellij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, Aspalathi odore, ex India aduectum. Deseritur etiam a petra oppido siccum, resinofum, liuefcens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit. Duricias, & turgentia guttura, humida sc̄p̄ hernias discutit, cū ieiuna salua inpositum. Vuluæ spiracula laxat appositu & suffitu. Et partus, humiditatesq̄ omnes extrahit. Calculos potu comminuit. Vriam mouet. Tussientibus, a serpente percussis utilissime datur. Valet ad rupta, uulsa, intentas laterum membranas, & discursantes spiritus. Malazgmatis inseritur, quæ contra duricias & neruorum nodos profunt. Conuulsu resoluuntur affuso uiuo, aut aqua calida.

Calidus

BARBARI COROLL.

BDellium, in nomine est, ut Galenus inquit, Scythicum & Arabicum, Scythicum nigrius, resinofusq̄, Arabicum trāslucidius et siccius. Vbi nos Sambracenice cōuertimus, in Dioscoride, saracenice legebatur. Sed nos Plinium secuti sumus: quanquam de Myrrha commentantem. Cæterum optionem do, utrū probent, qui hæc cognoscunt: ut obiter criticos effugiā.

B
Pli. li. ii. ca. 9.

ANTIQUæ & communes Plinio Bdellij appellationes, omnes hæ sunt, barbaræ tamen, ideo q̄ nec græcis, nec latinis, ex ui noninis certum aliquid indicantes. Solum adrobolum, a glēbarum consuetudine, nominis certam habet in græcis rationem, idemq̄ est, quod Plinius ait, in offas conuolutum.

Non est deinde scriptori huic legitima uox, Saracenice arboris lachrymā Bdellium esse. Quo enim tempore, hæc ille commentabatur, nullum erat Saracenorum nomen, nec nisi post multum tempus, mutata appellatione, Lybes ad AEthiopiam Saraceni disti sunt.

Non placet item, quod Barbarus mutauit Sembracenice. Licet enim inter Myrrhæ genera Sembracenam Plinius numerauit, non ideo tamen sola nominis uicinirate mutanda uox erat, sed numerantibus laudantibusq̄ Scythicum & Arabicum Bdellium Galeno & Paulo Aegine ta, ex altera duarum regionum, gentile instaurandum illic nomen fuerat, Scythicæque, aut Arabicæ arboris lachrymam dicendum. Quod nos tamen facere ausi non sumus, cōtenti hætenus, legentes monuisse. Inclinat enim animus, utraq̄ legi oportere, fuisseq̄ antiquam lectionem, *εὐδικαὶ ὅς, ἑραβικαὶ*, coaluisseq̄ simul librariorum uitio, & medicorum negligentia, ut toto hoc opere multa alia, duarum gentium nomina. Vtorq̄ ad eam opinionem argumēto, quod hic in medicina utriusq̄ uires, nullo gentium discrimine numerat, quod alij. Aeginetæq̄ in primis post egerunt. Cuius lib. 6. de Bdellio hæc uerba sunt. Molliendi uires, quæ durata fuerint, habet Scythicum & Arabicum Bdellion, præcipueq̄ recens, Arabicum hoc amplius, ut urinam pellat, calculos frangat, & concoctiones adiuet. quorum priora illa duo, ab hoc scriptore pariter docentur.

Quod etiam non multo post corrupte legebatur, *παλαῖος*, antiquo latino Dioscoride monente, in quo ueræ lectionis aliqua uestigia nonnunquam deprehenduntur, confidentius mutauimus, diximusq̄, Aspalathi odore, *καλαῖος*. Sed hoc mihi cum alijs commune sit, tam facile inuentu fuit.

C **T**hus in ea gignitur Arabia, quę thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculum, Stagonias appellatum, suapte natura rotundum. Tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uero fuluescit, & colore liuet. Sed rotundum industria facitant. Nam in quadrangulares formas dissectū dolijs uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smylo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud cui Amymitę cognomen est, alioqui candidum, quod dum mollitur, Mastiches more digitis cedit. Adulteratur Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest. siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, Thus uero statim ardet. Idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. Oculorum caliginem discutit. Caua ulcera complet. Et ad cicatricem perducit. Cruenta uulnera glutinat. In frenatque sanguinis eruptiones, etiam si cerebri membra nis effluat. Vlcera quę Cacoethe uocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum. Formicantes uerrucas inter initia, isthpetigenesque, ex aceto & pice illitum tollit. Ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manantia cum Nitro; si infricetur, sanat. Paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. Inflammata a partu mammae cum Cimolia, & Rosaceo magna utilitate perunguntur. Additur ad arterię, uiscerumque medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda ualitudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mudo Thus crematur flagrante glebula succensum a lucerna, donec exuratur. Post perfectam uestionem operire oportet, usque dum restinguitur: sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam aeneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem: ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in furnum indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut uaporem emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est.

D

T B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 24.

Thuris arboris altitudo, ad quina fere cubita, ramis frequētibz, foliis Piri, sed multo minore, coloris herbacei, modo Rutę, leui cortice, ut Lauro. Alij foliis Lauri, leueque piderit. Alij Lētisco similē, enā fructu, folio subrutilo. Nonnulli proximam Terebintho faciunt. Alij Terebinthū esse. Et hoc trisum Antigono regi, allato frutice. Sūt qui ex eadē arbore Thus, & Myrrhā manare putēt. Diodorus paruā, Aegyptię spinę albę, similē foliis Salicis, flore aureo. Placet Theophrasto & Plinio sententia eorū, qui Lauro similē tradūt: quā talis arbor fuerit Sardibus studio, Regum Asię delubro quodā fata, Iuba Rex contorti esse caudicis, siue ut placet So

lino, uiminis scribit, ramis Aceris, maxime Ponti: succum Amygdalæ modo emittere, talesq; in Carmania apparere, atq; Aegypto, cura Ptolomeorum regnantium confitas. E uirgis certe ad nos commetibus, credi potest, matrē quoq; teretem, & enodi fructicare trunco. Thus collectum, & Myrrha quoq; Sabotam camelis conuehitur, porta una ad id patente, in delubrum Solis, quē Sabin uocant, armatis ibi custodibus, tabella sup̄ struem posita, descripto, quemadmodum attulerint, quantiq; indident: mercatores tabellis perfectis, precium Thure sublatō, deponunt: idq; absentibus dominis fit. Sacerdotes partem pecunie tertiam Deo reponunt, reliquum dominis redeuntibus numerāt: autore Theophrasto. Thus Spontinum pr̄ter Arabiā, nullis, ac ne Arabiæ quidem uniuersæ. Commendatissimum, quod spectat ad Persas, ut Straboni placet. Cæterum in medio fere eius Atramyte sunt pago Sabæorum, qui caput regni est. In Sabota mōre arduo, ab hoc mansionibus octo distat regio eorum thurifera, Sabaq; appellatur. Solum id rubrum, e lacteo traditur. Siluarum longitudo passus. C. millia, siue ut alij passus. V. & L. millia. Terra ibi argillosa, crustaceaq; raris fontibus acnitrosis, p̄ Mimeos, proximum pagum euehitur, tramite uel singulis angusto. Hinc & Thus Minieum uocatur. Ius in Thura .300. esse familiarum dicunt: quæ ob id sacre dicunt: & cum arborem uulnerant, nec fœminarum congressu, nec funerum pollui. Quidam promiscuum ius his populis esse perhibent in siluis. Alij per uices annorum diuidi. Duplex eius uindemia. Prior canis ortu cortice, qui pregnans & tenuissimus tenditur. Laxato, plaga non adempto, quod hæsit in arbore ferro depectitur. Ideo Corticosum. Tāta inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Contra Alexandriæ, ubi Thus rude interpolatur, renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legitur, ex partu æstiuo. Hoc purissimum, & candidum, Carphiatum uocant. Sequens uindemia uerna, incilis per hyemen arboribus. Ruffum hoc exit, nec comparādum priori, Dathiatham appellant. Nouellæ arboris candidius, ueteris odoratius. In insulis melius, in Arabia fauius: quanq; in insulis nasci, negatur a Iuba Rege. Masculum Thus a specie testium uocari, sunt qui credāt. Præcipua gratia mañoso, cum hærente lachryma priore consecuta. Alia miscuit se. Singula hæc manum implebant, cum tardius depecteretur. Hoc modo Stagoniam, & Atomum Thus uocabāt. Minores guttas Orobiam appellant. Inueniuntur tamen etiamnum guttæ quę denariorum. 33. pōdus sequent. Conuehentibus Thura, capitale est digredi uia. Decimas Deo mensura, non pondere sacerdotēs Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impense publicæ tolerantur. Nam et benigne certo dierum numero, Deus hospites pascit. Euchī nō potest, nisi per Gebanitas. Horum Regi penditur uestigal. Caput eorum Thomā, abest a Gaza, nostri litoris Iudææ oppido. 80. 33. millia passuū, quod diuiditur in māssiones Camelorum. 62. Thure q conuehunt commutant. Si quid in itinere opus est, queri in singulos camelos sumptus. Denarium. 688. ad nostrum litus colligit: precium optimi, siclorum. 6. secundo. 12. tertio. 14. Resina Picæ, nō quacumq; adulteratur. Sed gemma ea quæ interuenit ei, tam similis Thuri, ut mixta uisu discerni non queat, & inde fraus. Laudatur in Thure candor, amplitudo, fragilitas. neudentem recipiat, potiusq; in micis frangatur. Omnia hæc cum Theophrasti, tum Plinij temporibus. Thus aut a uerbo græco, deos, aut sacrificiū significante, flectitur: aut certe a tulsis glie his, ut tunc latine scribi debeat. Porro cum dicat in fastis Ouidius, Thura nec Euphrates, nec miserat India Costum, uideri potest aliūde, q̄ ex Arabia in urbem comportari solitum. forte quoniam in Carmania quoq; nascebatur, unde ad nos inuehi non poterat: nisi transmissio amne illo: aut certe quia Chara oppidum Arabiæ nundinarium, haud procul Euphrate situm erat sinu Persico.

N Vllas, qd̄ huiuscemodi est sectiones habet. Græce, ἡ δὲ τοιοῦτος ἔρμος, manifesta significatione uocis eius, in cunctis quæ secari nequeāt, aut nunq; secta fuerint. Estq; Dioscoridi sensus. Thus, qd̄ natuiam habet guttæ rotunditatem, carere sectionibus. Diciq; ob id atomum, et testiculorum figura masculum appellari, primq; bonitatis esse, qm̄ qd uoluntatione, aut, ut Theophrastus ait, sectione in rotunditatem conformatum fuerit, in tāto bonitatis honore nō sit, & alijs ab illo differat notis. Prima em̄ Thuris laus est in eo, qd sponte sua, rupto arboris cortice fluxit, & stillicidi rotunda forma, in arbore pependit. Quapropter & Stagonias. i. stillidiane dictū est, σπυγνίας enim græci aquarum stillicidia dicunt. Eoq; tota res pertinet, ut ostendat Dioscorides, quod huiuscemodi fuerit Thus, nullo artificio hominis, sed spōte sua ea forma factum uideri. Quod etiam tale non erit, adulterinum habendum.

Vocantq; id Stageron, aut Entomon. &c. ἔντομος ἢ στάγρων καλοῦμενος. Apertum uitium est. Qui em̄ potest hoc loco atomum Thus dici, qd in alio genere paulo ante decretū est. Aut quod

A

Theoph. lib.
9. cap. 4.

B

C sectionibus conformatum non dicitur: quod hic testatur in quadrangula figura secari, coniectumque in fidele, usque dum rotundetur, uoluntari. Videor igitur consistere posse, non ἀτεμος, sed contraria significatio ne ἔντρομον legendum esse, ut rei conueniat nomen.

Et quoniam hic ait, in quadrangula fragmenta secari, sectionis etiam in nomine significatio sit. Indicaui tamen nobis Theop. etiam, quod de hac ipsa re agens, eandem uoce usus est, dicens, ἐπὶ τῶν ἑν ἑξ ἑκὼνται πέντε ἑντρομῶν.

Varie præterea legitur, quæ in græcis aliquot huic coniuncta uox est. εὐαγρος, in alijs, hisque melioribus, si ageros inuenta, habetque prima illa a Syagro Arabie promontorio, secunda a destillando rationem. Nobis in ancipiti, potior uisa quæ a destillando facta est. Videtur enim hic duo Thuris genera contrarijs appellationibus, aut diuersis saltem inter se discreuisse, cum prius illud Stagoniam & Atomum, secundum uero hoc, Entomum & Stageron uocari dixit. Differt autem Atomon, & Entomon, manifesta contrarij habitus significatione. Stagonia uero, a Stagero, quo a stillatio stillicidium. Optionem tamen in Stagero legentibus reliquimus, hoc ne malint, an ab Arabie promontorio Syagron, ita tamen, ut non Syagron, sed Syagrium gentilis nominis adiectiua forma legendum esse id sciant.

Quod sequitur deinde, in secundo bonitatis ordine, Orobias dictum, a quantitate nomen inuenit, & quod minoribus guttis concreascit erui, semen non excedentibus, sic appellatum est.

Quod autem illic coniunctum est, ὁξ, ὁ ἐν σπύδιω, ut fere in omnibus, siue ut in melioribus, ὁξ, ὁ μύδιος legatur, diuersam coloris, aut loci in quo nascitur rationem habet. Nobis inclinat animus, ut a colore sic dictum fuisse putemus: quando hic statim subiicit, quantitate minimum esse hoc Thus, & ὑψίστερον, id est, ruffo colore, quarum uocum altera Orobias, altera melino, id est, luteo colori respondere uidetur, cui idem esse credimus, quod hic melioton.

Quid Copiscus significet, incertum nobis est. Nisi adulterinū ea uoce indicauerit Dioscorides. κατ' ἑνὶν enim græcis ψεύδεται, id est, mentiri significat.

Contra incipientes formicas, & impetigines cum aceto & picis iungitur. &c. In plerisque græcorum cum Rosaceo inuenitur, tria que deinceps numerata sunt, acetum, rosaceum, & pix. Et si Paulus ægineta capite de formicis, his aceto tantum utatur.

D Coacti sumus non multo post, negationem illic restituere, ubi de cremando Thure hic ait. In quo nunquam satis admirari alios interpretes possum, qui non senserint, cum præcipiat Dioscorides, incensum & ardens operculari, usque dum extingatur, ideo id iubere, ne cinefiat Thus, sed crematum integrum permaneat: ut in carbonibus ad ignem seruandis, quotidie fieri uidemus, qui igniti terra operiuntur, non enim cinerem, sed crematum Thus querit hic scriptor, cuius consumpta pinguitudine, reliquum medicinae uisibus seruiat. Eum etiam sensum probatissimum mihi codex habet, οὐτως γὰρ οὐκ ἐντροπύεται, quod est, sic enim non cinefit.

Credimus etiam in extremo capite male legi, ἐπὶ τῶν αὐτῶν μὴ κατακινῶνται. rei enim non respondet sensus. Non enim facile ob lentorem, & pinguitudinem suam, friatur non crematum Thus, ut indicant uoces illæ, sed quod igne omne id unguen amiserit, & coctura aridius factum fuerit, id facillime friatur, & perfectam cocturam Dioscorides hic ostendere uoluit.

Ἐπὶ τῶν αὐτῶν

P De Cortice Thuris. CAP. LXXXII.
Præfertur Thuris Cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto Pini; aut nucis eius cortice: sed horum index ignis est. Si quidem reliqui cortices suffiti nequaquam inceduntur, sed sine odore fumum eructant. Thuris uero cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiacularur. Thuris modo uritur. Et uis eadem quæ Thuri, sed ualidior, astringentiorque. Quare cruentis excreationibus, uuluis fluctione laborantibus, in pello confert. Ad caua oculorum ulcera, cicatrices, fordesque efficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

C B A R B A R I C O R O L L.
Cortex Thuris, Plinius medicinas, nec Myrrhæ priuatim exegitur: cum tamen Syracis & peregrinarum rerum multarum describat. Credo, quod usus horum uagus & amplior esse uidebat, quod ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa Libanos, & Dendrolibanos, lachryma uero Libanotis a Galeno dicit. Interim, confundi usum eum cōperias, Sophocles, ut Gale-
nus,

nus, Euripides cōtra Libanū pro lachryma, Libanaton p arborē Thuris accipit, a suuene Assyrio, cui nomē esset Libanos, in hūc fructū cōuerso, dictā grēci fabulant, quē, Deos studiosissimē colētē, inuidi occiderit, hūc nihil esse Dñs Thure grātius. In Sabēis, & Larimñi odoris, ut inqt Strabo, prēstātissimū genus oritur: nec quale id sit demonstrat: quemadmodū, nec herbā illam in ora litorali eiusdem tractus nascentem, suauissimū odoris, sed qui celerrimē uanescat.

E X M. V E R G. C O M M.

Non male Thuris Corticem, corticosum Thus, dixerit aliquis. Quod enim in eo laudat, & medicinæ inseruit Thus est, quo nisi turgat cortex, inutilis erit: non ideo tamen sic intelligēda res, ut ex quacumq; parte arboris corticem hic laudet, sed ex ea tantum, in quam interioris lachrymæ impetus ingruerit, ruptoq; cortice destillauerit: quo loco omne quod in arbore hēsit, ferramentoq; auulsū, corticis aliquam crustam secum detulit, thuris Cortex dictus est, qui multo humiore, a Thure non magnopere differt, ideoq; medicinæ utilis est. Ea crusta lachrymæ coniuncta, simulq; allata a medicis, in proprios quos hic docet usus, a Thure separabatur, priuatimq; aliquid magis, minusue poterat, quemadmodum eiusdem Thuris manna.

Triā enim hæc simul plerumq; in officinis & earum acerris inueniuntur, Thus, Cortex, & concussū elisæ Thuris micæ, quas latini ueteres aliquando Manna, aliquando Pollinem thuris dixerunt: substantia idem, aut non penitus diuersum, aspectu autē, & rei enentū diuersa.

De Manna Thuris. CAP. LXXXIII.

Manna Thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & Thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini resina, ac Polline, aut cortice Thuris contusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æque sufficit aërium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suauē olentia odoris uis habet.

B A R B A R I C O R O L L.

Manna Thuris, est Hypoissimā: quod Plinius, micæ concussū elisæ interpretatus est. Vbi deprauata ditione, Manimas, non Manna uulgo legitur. Id autē sit, gēlarum atterentibus se glebis, ut inquit Aëtius. Differt a Thure Manna, q; plus astringit, propter corticis fragmenta quæ remanent. Nam quod Thuris Chiondros a grēcis dicitur, nos Thuris granum interpretemur, secuti Plautum in Penulo, Qui nullum inquit Thuris granum sacrificant. Est & genus Mannæ recentioribus dictum, & a sacris quoq; literis acceptum. De quo superius in Elaeome lite. Manes certe, uasis nomen est, & in Cottabō pars extantior ac prōminula: quam Sophocles aheneum caput uocauit. Erat autē Cottabus, siue Cottabis uasarium, iocularis in conuiuio iactus conceptaculum, propositis uictori præmijs, quæ Cottabica uocabant: id quod et iaculabantur, liquida erat materia, hoc est, id quod in poculo reliquum obmanserat, Latagæ, itemq; Latæ appellatum. In eo uasē pars, quæ sonitum reddebat percussa casu Lataginis, Plāstinx nominabatur. Sinistro cubito innixos, dextra molliter, & per gyrum facere legitimum erat. Cottabi mentionem in Plauto quoq; habes. Medici, Cottabum ex imperitia uocabuli, ut Athenus inquit, portionem a balneis, siue ut Phocion, uomitionem ante balneis uocabant, nō pridem inuentam, & sanitatis usu detestabilem, & ab Erasistrato uehementē damnatam.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus superiore capite, omnem Thuris substantiam, in antiqua medicina trisariam diuidi, in Thus, Corticem Thuris, & eiusdem Māna. Nec aliud est, quod nunc dicimus, quā uoce hac in Thuris puluere tantum ueteres usos fuisse. Satis rem Plinius indicauit, cum ait, esse concussū elisæ Thuris micæ, quæ attritu glebarum, in acerris subdiderent. A concussū etiā grēci ὑπερσικα dixerūt, nihilq; illi simile cōmuneue est cū aërio mellē. Quod posteriores a sacris Hebræorū literis accepta similitudine, Mannam dicūt, in alio genere, & diuersa potestate rem. Illi enim soluēdi, hūc adstringēdi uis est. In quo cauendum, ne similitudine nominis decipiat aliquis, in antiquis, quibus in Thure semper, in aërio autē melle nunquā usus eius uocis fuit.

De Fuligine Thuris. CAP. LXXXIII.

Fuliginem Thuris sic facito. Forcipicula, lucernis accensas singulatim Thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauā imponito.

Manna Thuris

B

*

Fuliginem Thuris

C & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter forde, obtegito. Aliā admoueto, in altero aut utroq; labro, subiectus quaternū digitorum altitu dine lapillis, quo facilius perfpicī queat, si urantur. Et qua locus capax fu erit, glebular alias supponito. & antea quam prorsus prior gleba restin = guatur, aliam imponito. donec sufficientem fuliginem uidearis aggregaf se. Continuo tamen externæ æramenti partes spongia aqua frigida made facta, abstergantur. Ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhæ = rebit. Quæ alioqui per leuitatem decidua, Thuris cineribus admiscetur. Derafa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris seorsum substrahendus est. Idem opus quo ad satisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum in = flammationes mitigat. Fluctiones suspēdit. Vlcerā purgat. Caua explet. Carcinomata sistit.

B A R B A R I C O R O L L.
Fuligo Thuris græce Lignys, & Aethalon, & Ethal nominata. Nam Lychnis herbæ coro namentariæ genus est, ut liquebit. Et alio modo scribitur dici Aetalida. Et Rubiginem satorū lego, & Achymistis quoq; uideo Aethalon uocari diuinum laticem, unde philosophicū illud pharmacū, siue lapis cōsistat, a quibusdā Etesios, & Androdamas quoq; dictos, & aurū potu lentū, & alijs nominibus inumeris, ut Mazys, & p diminutionē Mazygion, & Chalcyriō. Ali oq; Maza q̄s ipm ludæis significat, lidē fuligines Hemisomata, hoc est, semi corpora appellāt.

E X M. V E R G. C O M M.
Plutibus, ut obseruasse facile fuit, fumos & harētes ex eo parietibus & tectis fuligines græ ci appellationibus discreuerūt. καπνὸν ῥηθάλμυ λυγνὸν καὶ ῥηθάλμυ dicentes. Nos fumi, & fuliginis tantum appellationibus, omnia indicamus, eamq; ob causam non licuit alia, quam fuliginis uoce Dioscoridis ῥηθάλμυ uertere. Quæ eo differt ἀπὸ τοῦ καπνοῦ. i. fumo, quod fumus crassior nigriorque, & ex materia nondum fulgens flamma, aut ea desinente surgit : ῥηθάλμυ uero hæc tenuior, leuiorq; nihil aliud est, quam ignis & flammæ impetus, qui quoniā fumi modo ni = gra, contactu suo reddit quæcunq; lambit, fumus etiā dicitur, eodem modo & fuligo a no = bis dicitur. Tam quæ a græcis ῥηθάλμυ a fumo facta est, quā quæ λυγνὸς a flamma alicubi concre fcens eo colore materia aliqua. Ideo in græcis etiā, quorū est ditior lingua, promiscue p fu = mo, fuligineq; omni, uoces illæ in usu sunt. Apollonius in Argonauticis suis, appellauit λυγνὸν fumum, qui ex attritu lignorum inter se fieret.

De Fuliginis compositione. CAP. LXXXV.
Simili modo e Myrrha, Resina, Styrace, reliquisq; lachrymis fuligo excipit, ad eadem conueniens.

B A R B A R I C O R O L L.
Fuligo Myrrhæ, Styrcis, Resinæ lachrymarum omnium.

De Pinu & Picea. CAP. LXXXVI.
Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitat spe = cierum distinctionem. Arbores uulgo cognitæ. Quorum cortex astringit. Prodest tritus et illitus intertrigini, ulceribus summū corpus oc cupātibus, ambustisq; cū spuma argēti, & māna. Vlcerā delicatulorū acri moniā recusantiū cærato myrrino exceptus, ad cicatricem perducit. Tri = tus cū sutorio atramento, serpētia cohibet. Suffitu partus & secūdas ei = cit. Potus aluū sistit. Vrinam mouet. Folia corū trita & illita inflammatio nes leniunt. Vulnera ab inflammatione uindictant. Trita autem & de = cocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis utilia

utilia sunt, drachmę pōdere in aqua, aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex, A
& folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta, si in aceto coquat,
& decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit Spatha acopo-
rum, pefforumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum cremata-
rum fuligo, ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitio-
nibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornāt, coloremq; men-
tiuntur, calliblephara græci uocant. Arrosis oculorum angulis, callosis
glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur
Pinorum, Piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriā ha-
bent, & aliquantum excalcfacientem. Tussi, & pectoris uitij auxiliantur,
per se, aut ex melle sumpti.

BARBARI COROLL.

Picea ueteribus est, quam græci *πίτυς* fere uocant. Huius speciem Theophrastus, & Plinius
Phthitropœon, hoc est, pediferam, tinea samq; appellant, quia toris paniculis, non prima tan-
tum in parte, ut abietes, nucleos & minores & nigros habeat, sed ipsas quoq; paniculas mino-
res gracilioresq;. Sunt autem Paniculæ, nucamenta quædam, quæ e ramis arborum, Resinam
fundentium, callo squammatim compactili dependent in Larice. Negant aliqui florere Pi-
ceam, sed uice floris esse nucamenta illa, quæ *κίτλαρες* græci uocant, grossis præciduis, scilicet pro-
portione respondentia. Hæc compressiora maribus sunt, ac minus Resina madet, q; foeminis.
Præuenit germinatio huius, florem Abietis. quia paulo ante solsticiū erumpit, diebus fere
15. & ad proportionem fructificat post uergilias. Dissert a Pinu Picea, q; pinguior ac tenuior
folio est, q; minus alta, minusq; recta, q; Pinus assurgit, Præterea, conū minorē, & magis al-
gentē, nucleos quoq; Resina pfsos, obtinet. Vtriq; foliū capillamenti modo, prætenue, ac bre-
uifolia uillosum. Vtraq; crassior, duraq; ceu Cupressus. Materies cādida, & Abieti similior, Pi-
nus ufitis radicibus, nō repullulat, Picea repullulat, ut in Lesbo accidit, Theophr. scribit, in cē-
so Pyrræi mōtis nemore, qd' Piceis scatebat. In quo scire oportet, Pliniū Larici tribuere, quod
Theophrastus de *πίτυς*, hoc est, de Pinu prodit. Decacuminatio, quā græci *τεννυκύν* appellāt,
Piceæ, Pino, Abieti, Palmæ, aliqui addūt & Cupresso, & Cedro, perniciem afferre phibetur.
Picea nauigis expetitur. In Cypro præstantior etiam, q; Pinus. Eadem & ad fabricas ceteras,
malloes grandiores, scādulas, cupas, & alia secamēta utilis; celerius tamē q; Abies, corrumpi-
tur. Vfus & in carbone metallis argenti. Montes amat & frigora. Feralis arbor, & funebri in-
dicio, ad fores posita, ac rogis uirēs. Iam tamē & in domos recepta, tonsili facilitate, rami pene
statim ab radice modici, uelut brachia lateribus inhærent. Hæc plurimā Resinam fundit, inter
ueniēte cādida gēma, tam simili Thuri, ut discerni uisu nequeat: & inde Seplasiariorū adulte-
ria, ut in Thure diximus. In Hispania & Piceastri sunt, ex qbus Resina, unde Pix coquat, colligi-
gunt. Pinus procera est. Hæc uetē sollicitatā, octo cubitis lōgiore effici, Theophr. affirmauit,
ac ne sic qdem solida radice, sed abrupta. Germinatio cœpta in Pinu, sicut in robore, Abiete q;
intermittitur: ideoq; turget ter, & terna edit germina: quod genus arbores *τριχλόπων* appellan-
tur, qui ter inchoatum opus intermissumq; repetāt. Theodorus gaza, ter squamosas, interpre-
tatus est. Credo eum *τριχλόπων*, non *τριχλόπων* legissē. Germinatio prima Februarii ineunte:
q; in mōte Ida serius, ac fere idibus. Secūda, mēse Martio, qua & omnis Galla gignitur. Apri-
li tertia, paucioribus interiectis diebus q; inter primam secūdamq; fuerant. q; tempora hæc
ad rationē latinam translata nō cōgruunt, ut in Galla de robore disputauimus. Ceditur uere:
ubi cortex tantum detrahēdus est, ad operū rotūda. Nā ad quadrata, ubi germinatio deserit,
& si ualidior queratur, etiā ubi fructum excoxerit. Sed tū uermiculi quidā sub cortice nascun-
tur, q; summotenus caudicem nō erodāt, sed uelut inscribāt, unde quibusdā sigilla. Hoc nō
in Pino, uel Larice tantum euenit, sed in omnibus, quæ post fructus maturitatem cēdūt. Et
illa cōmunis omnibus quæ cēduntur in arte, fabricaue distinctio, ut aliæ quadrifidos uenarū
cursus habeāt, bipartitos aliæ, uel omnino simplices, hoc est, ut Theophrastus inquit *τετραπλέ-
ων*, quæ Gaza meus quadruiuas, & binuiuas, & uniuuas conuerit. errore manifesto, q; *τε-
τραπλέων* *διπλόων* *μονόων* legisit. Nos in ea re Plinium, & Victrunium autores habuimus.
Ex Pino nauigiorum rotunda fiunt, & onerarijs carinæ: quanquam nec ex queru negligunt,

Plin. lib. 16, ca-
pite. 10.
Theophr. li-
bro. 3. cap. 10.

Theophr. lib.
5. cap. 2. & lib.
9. cap. 1. 2.

B

*

9

C Sed illa triremibus idonea magis est, ut diximus. Aescullos carbonem Pini querno praeferrunt: non quia uiribus parem, sed quod ad flatu commodius respondeat, nec ut quernus marcescat. Resina huius a germinatu tollitur, detracta prius tecta. Ex omnibus resinam ferentibus, scadulus et Pino firmissimas esse constat, ex ceteris faciles omnino, sed imbecilles. Folium Pino, Pinaestroque aculeatum mucrone, praelongum, exile. Pinus fert minimam Resinam, interdum ex ipsius nuchibus, uix ut ascribatur generi. Pinafer nihil aliud est quam Pinus siluestris, mira altitudine, et a medio ramosa, sicut Pinus in uertice. Copiosiores dat haec Resina. Gignitur et in planis eodem modo, Peuce dicta. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas Stibulos uocari Plinius existimat. Ego Strobilos legendum arbitror, e natali cognatio ne ita dictas: sed graciles, subcinctioresque, et enodes. Liburnicarum ad usus pene, sine Resina, cura degenerant. Florem Abietis, Taxique praeueniunt diebus circiter, u. ab occasu uergiliarum. Eadem proportionem fructus suos afferunt. Aliqui genera duo faciunt. In Troade montanum siue Idaeum, recta, celsa, crassa materie, nucibus oblongis, uiridibus, sero dehiscuntibus, utpote siluestris, pice copiosa. Maritimum folio tenuiore, infirmioreque, cortice leuiore, et coris uiliore quam Idaei. Nuce rotunda, breuique aperienda, ualida, et robusta materie. Alij, ut Macedones, marem intelligunt sterilem, breuiorem, folio duriore. Foemina proceram, et folijs pinguius mollibus, et simplicibus, atque non rigentibus. Lignum maribus retorridum, praecinctum medulla, durum, et ad fabrorum opera cotortum. Nigrior radix foeminae, mollius, et omnino tractabile securibus. Pinus foeminam habet, quam graeci uocant aegida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalis, nullisque fissilem rimis, proximam medullae, cor Pinus a Theophrasto nominatur: quae in Abiete Lusitan appellatur. Nascitur haec in foemina distaxat, ut quae minus redacea sit quam mas, leuigatior quoque, ac prior cursu meatus. Ficem uocant Idaei tedarij, cum gradum arborum medullae securis adigitur. Quibus profraetis partes caedique ambientesque coputruerint, colore uehementer abiectionis, et neruo praeueniunt. Nam id quod in Pinu rubidius Peda nascitur, mares potius habet quam foeminae: hoc maribus tantum accidit, et odore grauissimo est: neque tamen redolens, nec ardens, sed ab igni resiliens, Syce, non Stradete dicta, ut in Plinio corremus. Pini morbus est, ut tecta fiat, tam parte caudicis externa, quam corde, id quod abundante succi, et ubertate larga luxuriantis naturae, puenit. Mares hanc tantum ferunt. In quo noscentur, superiora, quae de Pino Theophrastum secuti diximus, omnia fere ascripta esse Larici a Plinio, ut premonuimus. Nec mirum, quando et ppetua fronde uiuent omnes, et in Macedonia, et Arcadia. Circa Elin permutat nomina: nec constat autoribus, quod cuique generi attribuatur. Larici ergo situs idem qui Piceae in montibus, eademque facies. Mareria praestatio longae, incorrupta uis, emori cotumax, rubens, odore acrior: nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis uel consumitur quam lapides: cum caetera quae piceae et resinam fundunt, immodice accensa, carbonem expuant, cum eruptionis crepitu, eiaculanturque longe. Plusculum huic melleo colore, atque lentiore nunquam durascentis. Tecta uero proprie dicta et a graecis *σδο xδs*, *σδαδιον* uocata. Sed et sui generis arbor in Illyrico est, redudantior humore quam reliqua, parciore, liquidiorque, quam Picea, flammis, et luminis sacrorum quoque grata. Improprie uero, tecta appellamus, tum clia quoque ligna, quae flamma olei uel picis illitu coepta, faculae modo luceant, tum piceae fatuae partes imas, qualem in Nucleorum pineorum capite monstrauiimus. Ex his quae dicta sunt, constat in Europa sex haberi genera cognatarum arborum, quae resinam ferant. Pinum, Pinastrum, Piceam, Abietem, Laricem. Tedam. Addi potest et septimum, Piceaster in Hispania. Pinum uoco, piceas nuces ferentem:

D ** Pityda fructu Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus inquit, Plinius et Pinastro nuceis ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.*

** Pityda fructu Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus inquit, Plinius et Pinastro nuceis ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.*

** Pityda fructu Piceae, Dioscorides uocari scribit, itemque Pini: sed improprie, ut Galenus inquit, Plinius et Pinastro nuceis ita nominat. Hippocrates Pityda, pro resina e Pinu, siue Picea potius intelligit, ut eidem Galeno placuit.*

Theophr. li. 9.
apite. 1. 2.

E X M. V E R G. C O M M.

A Rborum quae mafichem, resinamque, et pices destillant, tanta est in destillado similitudo, et tam multa in natalibus, earumque appellationibus mixtura, ut nihil in Theophrasto, Plinioque, et alijs incertius legatur, alijs temporibus eiusdem rei, non eiusdem appellationibus utentibus, et inuicem eas commutantes. Nos diligenter obseruatione eorum, quae Theophrastus, et post eum Plinius, ambobusque pluribus locis tradiderunt, graecam Pityna tuto, et communi omnium in ea uoce consensu. Piceam

etiam uertimus. & πινυλν tedam: eo, præter multa alia argumento usi, quod hic ipse scriptor, non multo post hæc de liquida pice dixerit, συνήκει μὲν ἡ τῶν λιπαρωτάτων ἑλίων, πίνκη καὶ πίνυλν, quod est, collige præcipue picem, ex pinguislimis lignis peuces & pityos. Quod totum Plinius pariter indicauit, copiosiotem resinam, & liquidam Picem fieri ex teda & picea testatur. Poterat & multis alijs argumentis id confirmari, sed nos his quæ in Theophrasto, Plinioq; & grecis, latinisq; alijs legi possunt, Cōmentationes has nostras, impudenti alienarū opum cōacervatione augere nolumus. Poterunt uolentes lib. 16. cap. 11. Plinium, & Theophrastū, omnibus fere libris, de Plantarum historia uisere, omniaq; cognatarum arborū discrimina, in tam grauibz scriptoribus certius cognoscere, & cognita grauius censere.

Quod deinde Dioscorides ait, Piceæ Tedæq; corticem, in teneris corporibus ulcera ad cicatricem perducere, τριφυροχρότων, non ad genus uitæ tantum, ut Ruellius uerit, sed ad illud & sexum & ætatem referendum etiam est, pueros inquam, & in delicijs et umbrâ agētes, quales fœminæ sunt, eorumq; corpora. Sic enim antiquiores grecorū medicī usi ea uoce sunt, ἡπαρὰ καρκινὰ καὶ σαλμάρια, id est, teneræ & duræ carnis, ex ætate sexuq; & delicijs appellantes. Sic Paulus Aegineta capite, de uulneratis neruis, uocibus illis usus est.

Diu post hæc nos torfit, qđ in grecis omnibus legitur, σάδην δὲ τῆ αὐτῶν γίνεται εἰς ἀνόπην θανάσιον καὶ πινυλν ἐπιτοδίου. Et nos uertimus. Quinetiam densandis in cōfectione acopis, pessulisq; eadem omnia materia apte utuntur, concinniore sensu, qđ si rude, quæ ad subigendum liquida, notissimum instrumentum est, ex his arboribus facta, subigi in cōfectione ea dixissimus: pro quo sensu, non σάδην fœminino genere, sed neutro σάδηνμα legendum illic erit. Est autem σάδηνμα, ut grecorum lexicæ indicant, πύνωμα, id est, dēfatio: facta: ea uox est, quod quæ telarum modo texuntur cellulata, huiuscemodi spathe percussuntur, percussaq; densantur. ex qua similitudine hic ait, harum arborum materia densari acopa & pessulos. Non tamen dāna mus aliam illam lectionem. Potuit enim antiquitas, in his quæ ad acopa & pessulos coquerentur, rude ex his arboribus facta, uti: sed illa aptior uisā sententiā est.

De Pineis nucibus. CAP. LXXXVII.

N Vces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut Cumeris semine bibuntur, urinam ciēt. Acrimonias in renibus, aut uesica hebetant. Stomachi rōsiones leniunt, datæ cum Portulacæ succo. Virium infirmitatem roborant. Corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces recenter arboribus decortæ, in passo franguntur, & decoctæ, uetustæ tussi ac tabitudini conferunt, si quotidiē ex eo liquore terni cyathi bibantur.

BARBARI COROLL.

N V dei Pinei, græce Strobili dicuntur. Quāquam Strobilos, & tripudij genus est, siue salutationis, apud Iulium pollucem. Galenus etiam Cocallos uocat, nucleos eos in Hippocrate. Sunt qui Cocallos, non pro nucleis Pineis, ut cæteri, sed pro Cocco gnidio accipiāt, ut idē Galenus ex alterius Dioscoridis sententiā testatur. Arbor ipsa Conos &, quandoq; Strobilos. Cū decocti melle sunt in taurinis, Aquiceli nominātur. Dulciari quoq; genus quoddam ex uua passa, Nucleus pineus, ex amygdalis una tostis, Conos, appellatur apud eundem Iulium Pollucem. Nuces ergo Pineæ, grandissimæ, altissimæq; a terra suspensæ, hinc exiles nucleos, lacunatis toris, ferruginea tunica uestitos, contegunt. Nuclei Pineæ quaternaria genera. Durissim, qđ & uulgare. Tenerū, & putamine digitis fragile. Ideoq; auius expositū, Tarentinam uocant. Tertiū & Picea satiuā, nucleorū cute mollissimum, adeo ut simul mādatur: qđ autore Plinio Sapiū uocetur, & Nucleis. quanq; uerbū Nucleis in eo melius fortasse pro nucibus Sapi-neis, qđ pro arbore ipsa capitur. 16. uolumine. Pliniani certē codices, libro quinto decimo, non Sapium, sed Apium habēt. Nos Apium, & Indicis, & inscripitionis, & exemplariū, quæ manu scripta sunt argumento, legimus, & Columellæ, apud quem nux Sapinea legitur. Quidam Apinas, a uilitate dictas arbitrarē, literam, s, dictioni ueræ detrahunt. Imas arboris huius partes, ut idē inq; Plinius, tedas appellamus. Omninoq; nihil aliud, qđ Picea est, feriat paulū mitigata satu. Nā Sapius, siue Sapinea, Fusternæ pars est Abietis inferior: nō ut Seruius scribit, species Abietis apta nauibus. Nā supnā eius arboris, a duricia nodorū, Fusternæ simpliciter ap

B

σρόβιλος

Theophr. lib.
3. cap. 10.
Pli. li. 23. ca. 9:
et lib. 16. ca. 26

C pellatur. Vtriusq; meminerūt, & Plin. & ceteri. Mouit hominē grāmaticū, Varronis credo auctoritas parū intellecta: qui dixerit in mōtanis plixiores uenire Abietes, et Sapinos, firmioresq; propter frigus. Quartum Pityides: quas proxime descripsimus. E nucibus quoq; Pincis non nihil Resinæ colligitur.

De LENTISCO. CAP. LXXXVIII.
Lentiscus nota arbor est, cui uis inest astringendi. Semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt uires. Liquamentū autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta sunt, folia abijciuntur. Aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dore, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item cōtra eruptionem sanguinis e uulua, & eiusdem, aut sedis procidentia. In torum acacie & hypocyttidis uice representat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctū fotu caua explet. Et fracta ossa ferruminat. Vuluæ fluctiones sistit. Non mas arceat. Vrinam pellit. Motus dentium collutione stabilit. Virentes furculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit e semine oleum, quod prodest cum quid astringi opus est.

BARBARICOROLL.
Lentiscus, *εὐκρίς* a græcis uocata, Resinam ubiq; sudat. Mastiche uero dicta in Chio tantū in uula. Lētisci fructum, Hippocrates Schinida nominauit etiam, si tamen (librariorum culpa) non Schinides, sed Schoenides legendum esse, sicut & Cechrides pro Cedrides. Lētisci folia, quibus modo pelles excoctarij cōficiunt apud nos, iudaico Iunco, plurima ex Illyrio conuecta, & uulgo Folia dicuntur. Plinius Lentiscum Italicam dicendo, uidetur præter Chiam alia quoq; genera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit: qui & Sabuci specie, in racemis deperdet, folio Pistacij, sed minore, per extremitatem rubente. In summo siliquæ Pisorum, sed corniculī modo intortæ: in quibus Resina odoris iucundi continetur. Romę demonstratur in rudibus. monumentisq; Lentiscus, folliculis inanibus & deformibus. His contractis, culices euolant frequentes.

EX M. VERG. COMM.
Potior quam nunc sit, quondam Lentiscus fuit. Et si, testante id Plinio, Ciceroni credendū est, rustici plebi necessaria, quæ cœli, et in eo syderum imperita, arandi suorum operum auspicia ex propinqua arbore certius cognoscere posset, nihil enim nobis occultum natura, in disciplina ruris esse uoluit. Ciceronis uersiculi hī sunt.
Iam uero semper uiridi, semperq; grauata
Lentiscus, triplici solita est grandescere foetu,
Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.
Exprimitur succus e radice, &c. Non in omnibus legitur refrigeratis, sed obiectis tantum. Nos autem illud adiecimus, in probatissimo omnium codice inuentum, in quo legebatur. μετὰ τὸ ὑψῆσαι καὶ ἀγνῆσαι τὸν φύλλον ἰσχυμένωι.

μασίχη ροτίνα
σχινίνα

De Resina Lentiscina. CAP. LXXXIX.
Lentiscus resinam gignit, quæ Lentiscina cognominatur, & ab alijs quibus Mastiche. Pota utilis est sanguinem reiiciēbus, & tussi ueteri. Stomacho auxiliatur, sed ruscum mouet. Additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cutis conciliandum. Palpebras oculis incōmodas replicat. Manducata halitum oris commendat. Gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Præfertur Nitedulæ modo resplendescens, & candore Tyrrhennicæ Cerae similis, aduſta, friabilis,

bilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur A
Thuris, Resinæq; mistura.

BARBARI COROLL.

Resina Lentiscina, in Chiō Mastiche est. Importatur & ex India, quadā ē spina Mastiche. Item ex Arabia, Lamā uocāt. Sed ex Asia et Græcia uerē q̄ simillima Exixme herba; quā The odoros gaza Chamæleonem album intelligit, & Carduum Pineam appellat; id autem q̄ re-
cte, diximus inter herbas. Ex Lentisco Chia, gummi modo nascitur, nigra, & candida. Preciū
candidæ in libras. 10. nigræ. 12. Ex Ponto quoq; uenit mastiche, bitumini similior atq; nigra, ui
no cōdendo. Cæterum laudatissima inter omnes, Chia, candida. Adulteratur ut thura, resina,
ut Plinius ait. Sed ut Dioscorides, Thure et Resina. Galenus in duo genera colligit. Nigram, et
Candidam. Nigram Aegyptiam, Candidam Chiam, uocari prodens. Ex Aegyp̄ia unguentū
aut oleum fieri solere negat. Non arbitror quenq; monendum, q̄ longe a uero sint, qui Masti-
chem a Silphio non separant.

Pli. li. 12. ca. 17.

*

EX M. VERG. COMM.

Cassa, friabilis & odorata. Græce sic, ἀσπρά, καὶ πυρά, καὶ ἰσχυρίαι, καὶ ἰσώδιαι. Vitiosum no-
bis uidetur, credimusq; secundam illam uocem πυρά, aut aliam quandam fuisse. Aduersatur
enim superioribus, nec potest aliquid simul candidum; quo colore hic Mastichem, & alij oēs
laudauerūt, & πύρον, idest, rufum, coloreq; ignis esse. Quam ob causam nos eā expunximus,
non inuenientes, quam similem illi aliam uocem substitueremus: ibidemq; monstrante id re
ipsa, in fraude & adulterio Mastiches, resinā Pineam adiecimus, sic in melioribus græcis legen-
tes, disiuinximusq; Thus, & Pineam resinam, eadem ueterum codicum fide admoniti, quoniā
alterū satis esset, nec omnis resina id præstare possit, sed Pineæ tantum, quæ colore candido in
concolore Mastiche facilius falleret.

Quam diximus præterea acum harundineam, nihil intelleximus aliud, quam in purgan-
dis a cibo dentibus, acuminatam harundinis festucam, pro qua ex Lentisco facta, usi ueteres
sunt, & nostra ætate adhuc elegantioris uitæ homines utuntur. Nam καλὴν ἰσώδιαν græci, proprie
dixerunt acus ex harundine factas, quibus mulieres cincinnos & uelamēta capitis firmaret,
quo d nunc æreis, aut argenteis fit.

B

De Terebintho. CAP. XC.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astrin-
gunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conueniūt, simili parata mo-
do, sumpraq;. Fructus eius aptus est, sed stomacho aduersatur. Ex calfa-
cit. Vrinam mouet. Venerem excitat. Contra phalāgiorum morsus con-
uenienter in uino bibitur. Resina eius ex Petra Arabiæ oppido defertur.
Prouenit etiā in Iudæa, Syria, Cipro, Aphrica, et Cicladibus insulis. Sed
præualeat candida, perlucida, uitreo colore. & in cæruleum uergente, odo-
rata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omneis antecedit. pro-
xima Lentiscina, & e Pinu, & Abiete. Has sequitur e Picea & Pineis nu-
cibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare.
Tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitia pectoris
expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquunt. Ventrem emolliunt. Pal-
pebras commodissime replicant. Lepras tollunt, cum erugine ac futorio
atramento, nitroq;. Auribus saniem emanantibus, item in pruritu geni-
tium utiles. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus il-
litu, aut appositu auxilio sunt.

τρίμυθος

BARBARI COROLL.

Terebinthus, τρίμυθος græce dicta. Messibus tritici, aut Paulo serius fructificat. Mas sterilis.
Femina distinguuntur. Aliæ fructum prodius rubentem, magnitudine Lentis edunt; qui con-
coqui non potest. Aliæ uiridem, pallidumue primo, demum rubentem, nouissime cum uua

C maturefcentem & nigrefcentem, qui & odore iucundior, amplitudine fabę. Interim maiorem, & refinofum tactu, fulphurofumq;. In Troade, circa Idam, et Macedonia, brevis, et fruticofa, & contorta. Damafco Syrię in fignis, copiofa, decore afpectu, ubi mons Terebintho, nec alia filua fcata. Materies admodum lenta, radicibus ualidis, actiq; in profundum, fidelis ad uertitatem. Flös racemofus, oliuę modo, fed rubens. Folium numerofum, ab eodem pediculo. Figura Lauri, digefio in uerfus, ut Sorbo. Vnicum ad cacumen exit, & numerum parem cõturbat; minus tamę angulata funt q; Sorbo, & fimiliora per ambitu Laurinis uidentur. Oleo fa quoq;, ut fructus. Fert & nucumenta quadam cauā, ceu folliculos, Vlmi exemplo. In qui bus animalia quaficulices erũpuit. Et refinofus lentor, qualis e ligno, unde fit refina. Fructus q; diu maturus non eft, in aqua fere fupernat. Niger fidit. Vulneribus pfundis, ut Abies, & quę refinā tedamq; ingerunt. Secundior efficitur contra quam cæteræ arbores. Materia uehementer nigra, fpiffa, fplendida. Præcipue in Syria tantum, ut Hebenum quoq; prouocet. Culrellis ex ea capulos, & calices Thericleos detornant, tam felicit, ut a Figlinis in ternofci nequeant. Thericlei porro calices Athenis clari habebantur. Nomen ab inuentore datum, qui Aristophanis ætate fuerit: five, ut alij putant, a detornatis in eo beluarum pellibus, facrũ Bacccho poculum facere. Cæterum falfo quidam extimauerunt idem efle quod Carchefum, cum hoc confiter antiquiffimum pateræ genus fuiffe. Nam poculum, quod Alcmenæ Iupiter, in faciem uerfus Amphitronis eius coniugis dono dediffe fertur, Carchefum uocatum perhibet, multis poft feculis Lacedæmone feruaturn. Terebinthus ad refinam tollendam poftq; germi nauerit, inciditur: id quod in omnibus refinam fundentibus cuftodiendum eft.

E X M. V E R G. C O M M.

Quia extremæ iniufticiæ eft, fua gloria aliquem defraudare, nec magis in homine lau dandum conftantia animi, & reddendi ut cuique quod fuum eft, non pigebit, The ophrafti manibus & nomini habentes, ex quo cuncta diuerfis locis de Terebin tho ab eo tradita, præterito eius nomine, Barbarus pro fuis in Corollarij commentationibus edidit, græcam eius fcriptoris de Terebintho, mox latinam omnem hiftoriam huic capiti adij cere: ut poffint uolētēs (quod teftati paulo ante fumus) aperte cognofcere, obiterq; intelligere græcarum literarum peritiores, in uertendis græcis, hominis nescio celeritatem, an negligenti am potius dicam, qui Plinium & Theophrastum fimul mifcens, *ῥωδία* fup, ex Plinio iucundi orem, ex Theophrasto, fulphurofum uertit, non animaduertens ab utroq; idem dici.

In quo parum caute egit, ratus *ῥῖον*, quod græcis fulphur fignificat, idem efle quod *ῥωδία*, & *ῥωδία* græci idem dixerunt, quęcunq;. f. in facrificijs et aris ad fuffitus & uapores incenderent.

Quod tam manifefte pater, ut probari non oporteat, uideturq; Gazam, Theophrasti inter pretem, in ea refecutum efle.

Idem etiam, quod erat *ῥῖον*, uertit, qui concoqui non poffit, cum tamen de coctura ci bi quæ in ftomacho fit, Theophrastus eo loco non agat, fed de maturitate quæ calore fit, & fi milis cocturæ ftomachi eft: parum memor, *ῥῖον* utrunq; fignificare, & Theophrasto in hijs quæ maturantur peculiarem hanc uocem efle. Nam & in medicina *ῥῖον* etiam dicuntur, quæ abfcelfus, & collectiones maturant.

Poffemus & multa alia hijs adijcere, fed hæc fatis nobis efle uolumus: ut hoc quafi guftu meminerint legentes, & ubiq; fciant, nihil non alienũ in eo efle. Nec morte præuentum potuiff e extremam & falutarem illam manum his quę conceperat appofuille, oportereq; eos, qui in tegram rem nouiffe uelint, primos eius auctores confulere, nec nouis fcriptoribus tm defer re, ut ueterum obliiti, quemadmodum in cantu & mufica fieri Homerus dixit, nouiffe quę tan tum amemus & admiremur.

Terebinthum pofteriores grani uiridis arborem dixerunt, facto illi nomine ab eo eius ge nre, quod fructus fuos in uiridi pallidos fert: quod Theophrastus *ῥῖον* dixit, quafi herba ceum. Ex ea Terebinthina defillat refina, omnibus notiffima, in quotidianõ medicinę ufu, de qua cum femel agere Dioscorides cepiffet, de reliquis etiam egit, cognata congeneribus fuis coniungens. Noſq; ut in melioribus græcis adhuc legitur, continuata hiftoria, uno tm titulo et capite omnia complexi fumus Refinæ genera, inter quæ Larignam ex Larice collectam hic nu merat, a Victruuiõ præcipue in architectura, & medicina laudata. Qui librõ. iii. de materia a gens, Laricem his uerbis commendauit.

Larix uero, qui non eft notus, niſi in his municipalibus, qui funt ad ripam fluminis Padi, & littora maris Adriatici, folijs eft Pini fimilibus, habetq; refinam liquidam mellis Artici colo re, quæ etiam phificis medetur. Credimufq; nos, eam nunc efle, quam Venetijs deflexa a La-

D Nos breuitati cõfulētēs, da ta opa eũ locũ abbreviaui mus: ne & in tmẽũ creſce ret cõmentari us, & q; ne ad eruditionem quoq; nobis aliquid facere uidebatur.

rice appellatione, Larga, officinae & uulgus appellant. Si quis autem uelit totam Laricis historiam naturamque nosse, Vitruium libro illo, & Plinium pluribus locis lib. 16. & 24. Palladiumque in Nouembri mense legat. Sunt enim scriptoribus his, & huic, omnia fere communia.

Quod in coctura Picis passim legitur, *ἀπὸ αἰ χέας ὀμῆς ἰδαρε ἰμβάλλοντες ἢ ἀγγύων*, ex meliorum codicum lectione, *ἢ ἡλκύν*, idest, ahenum uertimus, praesertim ostendente id Plinio, qui libro. 16. hoc modo coqui praecipit. Verba eius sunt. Alij utilius putant, sine aqua coquerelento igne tota die, utriusque uase aeris albi.

¶ Deliquida Resina e Pinu & Picea. CAP. XCI.

Liquida Resina e Pinu & Picea, a Gallia & Hetruria conuehi solet, atque olim a Colophone petebatur, hinc Colophoniae sibi cognomentum uendicauit. A Galatia quoque Alpibus contermina, quam uernaculo nomine Laricem appellant incolae. Ea in linctu magnopere praestest tussi ueteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut Larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quae ad eadem pollet. Quae uero spissarum generi ascribuntur, quaedam ex Pineis nucibus, aliae Abiete, aliae Picea & Pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucens, non ruffa, nec humida, quandam cerae faciem praebens, & friabilis. E Picea et Abiete resinae, caeteras antecedunt, odoratae enim sunt, atque Thus odore imitantur. Praestantiores a Pytiusa insula deferuntur, quae secundum Hispaniam sita est. Sed quae e Picea, nucibus Pineis & Cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Verumtamen eorundem gratia ut illae sumi solent. Lentiscina Terebinthinae correspondet. Vritur Resina omnis liquida in uase quadruplae capacitatis ad hauiorem, qui infunditur. Itaque Resinae congius, in duobus aquae pluuiiae coquitur, subiectis leuibus prunis, Resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & stridula reddatur, ac digitis cedat. Caeterum ubi refriguit, infictile non picatum, quod Aconitum uocant, idest, non illitum, recoditur. Fiet etiam eximij candoris, si Resina omnis eliquata praeoletur, quo facta culcita sordes excernatur. Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne, & ubi coire ceperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, usque dum suum odoris uirus exuerint. mox ut dictum est, reponuntur. Spissam unius diei spacio decoxisse satis est. Vnde odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E Resina perinde atque Thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colore mētiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit amentum scriptorium.

B A R B A R I C O R O L L.

Resinae, multis arboribus leguntur, omnibus incisis a germinatu. Sed uarie. De Pinu, teditum demum detracta, de Abiete, ac Picea, ligno pregestato: de Terebinthio, radicibus, ramis & caudice uulneratis. Sed melior, quae defluxit in caudice. Optima Terebinthina est spissitudine, leuitate, odore. Secunda bonitas Abietinae, ac Piceae. Copiosissima, ponderosissima, Picique proxima, e Pinu est. Portatur utribus liquida. Tum sponte crescit, autore Theophrasto. Nam Plinius

Cnius, minimum Resinę de Pinu colligi scribit. Credo, quia Pinus Theophrasto Larix est, ut diximus. Resinam piceam, quę sicca sit, aridissimam inter omnes prædicat Aetius: eamq; Pitynon Physma, priuatim dici meminit.

Resinam gręci *ρίνιν*, *ρίνιν* quandoq; Paulus uocauit. Hanc ex Pinu & Picea siccam esse, Plinius intelligit. Dioscorides ex hisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult. Item, liquidas e Terebintho, Larice, Lentisco, Cupressu. Nam & eę ferunt in Asia, Syria q;. Falluntur uero, qui eandem esse putant, e Picea atq; Larice. Picea pinguem, & Thuris modo succosam fundit, Larix gracilem, colore mellis Attici, ac mellei etiam liquoris uirus redolentem. Illud notauimus, tam arborem ipsam, q̃ eius Resinam uocari Laricem. Potest & Larigna ut Illigna dici: nam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditū, Viēruuius Larignum appellauit. Oribasius, atq; Paulus Resinę genus Italię nā nascentis, *ρυάδιν*, hoc est, lignosam commendat in Dropace. Fortasse hanc inrelligentes quā Dioscorides Tyrreniā, siue Gallicam uocauit, uel Corticatam Columella. Resina laudatur, nationū Cypria, Syriaca. Vtraq; mellis Attici colore. Sed Cypria camosior sicciorq;, antecedens omnes. In sicco genere candida. In omni montana & capessin, præfertur Aquilonia. Terebinthi tenuissima est. Cupressi acerrima sapore, crassior Cedri, & faciendis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore, difficilis coquendi, Iudaica collosior. In Asia, quę fiat ex Picea, admodum, ut Plinius inq̃, candida Sphagos, siue ut legi maluimus, Epargos, a candore dicitur. Liquida, raro utuntur medici, et in ouo fere. Nec Pineae magnopere in usu. Ceteris, nō nisi decoctis. Resina oleo dissoluitur: q; ad malagmata, ususq; uulnerū. Quidā & creta siglinarum hoc fieri arbitrantur, in potiones amaris amygdalis. Colophonia, præter ceteras fulua. Si teratur, alba fit, grauior odore: & ob id ab unguentarijs neglecta. Abieti resina, ut Larici teda, uitiū est. Exiguū Abies fudat, aliquando contactu solis. Inuenio & Acemam resinam, hoc est, Zygiā, in cōpositione, cui non men est Baion. Est em̃ Zygia tertiū genus Aceris, rubens, ligno fissili, cortice liuido et scabro: qd alij Carpinū uocare maluerunt, ut Viēruuius, a iugis, quę bobus ex hac arbore fieri solēt.

D Resina Picea, si cum aqua leuius decoquatur, coleturq;, lentescit, colore ruffo, Stillaticiaq; dicitur. Eliguntur autem in id fere uitia resinę, corticesq;. Picea uase aris albi, Terebinthina in sartagine referenti coquitur. Est & illa temperies ad crapulam. Flos crudus Resinę cum multa assula tenui, breuiq; auulsus conciditur ad cribrum minuta. Deinde feruenti aqua, donec coquatur, perfundit. Huius expressum pingue præcipua Resina fit atq; rara: nec nisi paucis in locis subalpinę Italię, conueniens medicis Resina: quę coquenda sit candidissima, requiritur. Porro sciendum est, aliud esse resinam comburi, aliud coqui. Si p̃prie loquaris, uritur ad fuliginem: coquitur uero, q̃a crudę usus in medicina fere nullus, nec extra q̃ in ouo, teste Plinio.

De Piceliquida.

C A P. XCII.

πίκρ, κώνιν

Pix liquida, quam alij Conum uocant, e pinguiissimis Pinī Piceaq; lignis congregatur. Optima est splens, sincera, leuis. Contra uenena, phthisin, purulētam excreationē tussim, suspiria, et pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cū melle dato. Tonsillarum, & uuxę inflammationes, anginaq; utiliter perunguntur. Purulentis auribus infunditur cum Rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium morsibus. Adiecta uero pari cæra, scabros ungues extricat. Tubercula uuluxę, & duricias sedis, discutit. Cum farinaq; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quę serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Cæterum cum thuris manna & cærato subductos ulcerum sinus conglutinat. Rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. Vlcerā replet, & cum melle purgat. Quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginant. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

B A R B.

PBARBARI COROLL.

Pix, nihil aliud est q̄ fluxus combustæ in teda sua Resinæ. De Pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit. Quamquam in Syria Terebinthi quoq̄ picem ferunt: quia desint ibi Pinus. E Picea quoque, Cedro, Palma colligitur. Pix hyeme frigida, dererior, minus copiosa, decolor. Vbiq̄ optima, ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior, uiriusque præferens. Ex Idæa & montana Pinu largior, coloratior, dulcior, odore gratior, utiq̄ cruda: quoniam decocta multum deperdit: propter serum, quod in ea continetur abundanter. E Paralia, hoc est, maritima, flauentior & crassior, q̄diu Resina est, uidelicet q̄diu cruda: sed decoctio ex ea, prius absumit. Idæa Tedosior, e pari modo tedæ. Imbribus admissis, q̄ squaloribus, pix abundantior & liquidiore excipit. Hæc Idæi, priore Macedones. In Ida Pinus aperitur parte solari, ablato p uulnus cortice, binis, ternisue a terra cubitis, cum plurimum, singulis cum minimum. Postea confluit e tota pix, in ulcus, non sine teda, cum manare humor desijt. Simili modo ex alia parte cedit, ac deinde alia & sequenti semper anno teda locum implet. Extenuata per hæc arbor, facillime subuertitur uento: quod cū fit, tota succiditur: & cor. Id est, medulla eius, urit. In qua, & in radice plurimum tedæ semper est. Explantur uero in Pinu caua uulnerum, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit, sed resina, seu pice, anno maxime ab incisu proximo, si pinus frugi sit: aut secundo aut tertio, si pessima. Probæ uices multas perferunt. Vitiøsæ, nisi q̄s modice inaniant, prouentumq̄ dispenſet, detractiōnem quartam non tolerant. Pinus nouellæ, fructificant. Veteres teda, nō fructu sunt fertiles. Plinius hæc de Pinu a Theophrasto dicta, transulit ad Laricē, partim ad Piceā, cuius assulas terræ proximæ laudat. Altiores amaritudinē afferre scribit. In Syria Terebintho quoq̄ ad picē, detrahunt cortices, e ramisq̄ etiam, ac radice uindemiātur, cum resina tū damnetur ijs partibus. In Hispania e Piceastro quoq̄ fit, minime laudata. q̄n resina eius arida, uirosa, & amara sentiat. Pix conficitur hoc modo. Pauit area canali præparato, per quem humor in medium confluat. Tum lignū in hastulas cōcisum, locatur struis congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur, terra undiq̄ circumdata: ne flamma erumpat, perit enim pix, si hoc eueniat. Quod si fumus se parte aliqua extulerit, scilicet pinus admotis, locum terra sepiunt, lutoq̄ obstruunt, ne euolet. Canalis subiectus Picē fluentem corriuat in scrobes,

quingenis cubitis, centenis & octuagenis alta patet p ambitū. Sunt q̄ per utrumq̄ mēſū, aut bitos centenos agant. Humor qui fluit, obiter frigeſcit contactu. Vritur fere biduum. Opis pfectū signum, si rogos decumbat, subſidatq̄, & quasi latus det. Summa hoc illi diligentia, & religione peragunt, ceu feriantes, & cum appreciatione præſentiū ſolenni, ut Pix ea tum copiosa, tum pba euadat. Ac primus quidē sudor, q̄ aquæ modo fluxit in canali, Cedriū uocat, utiq̄ in Syria: ubi Pinus non sunt: quo in Aegypto corpora defunctorum perfusa custodiunt. Sequēs liquor, Picem fundit, quæ in cortinas æreas cōiecta, aceto spissatur, & coagulata, Bruticō cognomen accipit, dolijs dumtaxat utilis, lentore ab alia pice differens, item colore rutilāte, et q̄d pinuior est. Autore Plinio, Brutam a brutijs dici constat, ubi nascitur, ad oppidum Mamertium feraci inemore, ut Strabo inquit. Nec Brutianam silam, quam obrem uocari eam Picem dicat comperi. Non enim silatum uinum, pro picato significari crediderim, etiam si Plinius quodam loco spissarum utilissimam medicinæ Brutiam, & ad uasa quoq̄ in Italia condendo uino, tradidit, quoniam pinguisſima & resinosisſima utraq̄ præberet utilitatem. Hinc ex mascula arbore meliorem esse adiſciunt. Id quod intelligi non posse, Plinius exiſtimat. Theophrastus certe, uri Pinum in Macedonia, non omnem, sed marem scripsit, Picis gratia. Nec feminae tamen radices negligi, q̄ ea tantum pars in femina tedam habeat, ex qua omnia illa fiunt. In Asia Syria non detrahunt tedam, sed machinamento quodam in arbore ipsa Picem urunt. Fit Pix e resina quoq̄, sola piceq̄ feruentibus cocta lapidibus in alueis ualidi roboris: aut si aluei non sint, congesta strue, ut in carbonis faciendi ratione. Hæc in uinum additur, farinæ modo tusa, colore nigrior, ut ait Plinius. Vita Picis acor, aut odor fumidus, aut Picis austius. Expimētum, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescat, acore iucundo. Asia picem Indicam maxime probat. Græcia e Macedonia Ptericam, Virgilius Narintiam, condendis uinis. Columella et Nemeturicā commendat: quæ in Liguria conficitur. Et Allobrogicam, quæ corticata dicitur. Siccata hæc uetustate in puluere resoluitur, cribraturque. Idem autor Picis quoddam genus crudæ, Tasm uocari tradit, in defrutum Neapolitanum addi solitam. Sunt qui Rheiticam, Palladius Coracinam picem nominat, contra formicas arborum. Sed mendosa lectio est, & Coracinum piscem legendum: id quod ex græcis rei rusticæ scriptoribus elicias.

g iij

A

Theoph. li. 9.
capite. 1. 2.
Pli. lib. 14. ca.
20. Item li. 26.
capite. 12.

B

CR^Efinis coniunxit natura Pices, ideoq; legitimo historiae ordine, post eas Dioscorides de omni Pice docuit. Quod enim ex uiuentibus plantis resinae nomine destillat, id incensa in furnis eadem materia, appellatione Picis, fluit, simplex a principio, & liquida tantum, mox ea de cocta, sicca etiam, non dissimili penitus potestate: & hoc tantum diuersae, ut testatur est Paulus Aegineta, quod sicca in secundo ordine, desiccatur, minusq; quam liquida calefacit: contra uero liquida. Habentq; ambae, quod purget, maturet, discutiat, & acre sit. Ad omnia tamen liquida efficacior, sicca uero glutinandis uulneribus aptior. Ob quas uires, hic mox dicit, uulnerum remedijs utiliter siccam misceri.

Conon a quibusdam uocari liquidam Picem hic Dioscorides ait, quae uox, & rei in ea estimatio, q̄ uetusta, & uera sit, non ausim ego affirmare. Id certe pro comperto est, græcis κωνιν dici Pineam nucem, & ab ea forma mathematicis, terræ umbram, Conum dici, & Coni forma describi, & ab eo fructu, Pinum arborem, etiam Conum dictam posterioribus græcis fuisse, posseq; hoc loco, quoniam ex cognatis Pino arboribus Pix fiat eius appellatione censer: alioqui nihil habet ea uox quod ad picem referri possit. Dubitamusque nos, non κωνιν prima producta, sed κωνιν prima correpta, legi quōdam potuisse, & ex usu Pici id nomē accreuisse, quasi scilicet in uindemia, dolia, & in alijs uitæ nostræ usibus fictilia pice ex interiore parte linirent, ideoq; picata passim dicerentur, & non picata. Qua uoce hic sepius utitur, ut in superiore capite cum ait, in uase non picato seruandam Resinam, &c. Quod totum græci κωνιν uocant, qd est, illinire: licetq; κωνιν proprie puluerem græci dixerint, nihilominus cinerem, calcem, & quaecumq; alia dicebant, quibus leuigari asperitas, & obstrui raritas posset, quod in doljs uini, fictilibusq; alijs, quondam passim fiebat, & nunc uitro etiam fit: ideoq; græci κωνιν, calce, glutinoq; & maltha aliqua illinire adhuc dicunt, & aconita fictilia cuncta illa, quæ picata non fuerint, & aliquo huiusmodi obstruata leuigataq;: Nec nos mouet, q̄ in hac significatione prima producta κωνιν aliquando, & κωνισαι inuenitur, facili enim eiusdem fontis litera, ad uitium in scribendo lapsus est.

D Quod deinde impresso codici deerat post λιπρὴν ὄνυχας, id est, scabros ungues, instaurauimus, καὶ λιχάνας, id est, impetigines.

Nec multo post dubitauimus qd legitur, ῥοῦκτα τὴν ὀρίαν καὶ σκληρίαν ἀκτιλὴν ἀπορῶν, quæ uoces si sic legantur, significant, uulnæ abscessus, & sedis duricies discutit, non sic forte legendum esse, sed mutatis locis, aut malis uulnæ duricies, & sedis abscessus legi potius oportere, quando communius malum sedis abscessus quam duricies sit. Non tamen mutare rem ausi sumus, satisq; fore credidimus, signasse locum.

De Picino oleo. C A P. XCIII.

πισσιναίου

Pice fit quod Pisselaon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lactis. Nam expansa quamdiu Pix coquitur supra cortinam uellera madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas Pix liquida, præbet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida Pix medetur. Iumentorum ulcera, scabiemq; emendat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 4.

Oleum picinum, græci πισσιναίου uocant. Probatur maxime e Brutia, ut quæ resinosissima, & pinguisima sit. Color oleo fuluus.

E X M. V E R G. C O M M.

Confundit intellectum, quod ultimū feminini generis participium, in græcis claudithoc caput, contra quadrupedum ulcera, & scabiem utiliter inuncta. Non enim certum est, Picemne, an Picinum oleum præstare id Dioscorides decernat: nec nos audemus de ea re censere, cū Picino oleo id Plinius tribuat lib. 23. capite. 4. dicens Picino oleo uulnū passim esse ad quadrupedum scabiem. Et Columella lib. 8. cap. 1. idem testatur, quo loco liquamen Picis oleum hoc nominat. Maro autem Pici id adsignat, cum in Georgicis suis cecinit, Id easq; Pices, &c. Et Columella lib. 8. cap. 30. etiam confirmet, bitumen, sulphur, & pleraq; alia, liquida Pici in hunc usum miscenda præcipiens. Nos communem, & fere omnium lectionem secuti, Pici id tribuimus nihil, quod eiusdem uices Pix, & Pici oleum habent, in ea re periculi dimentes: potuitq;

Dioscorides

Dioscorides forte, quod in Pice a se relictum fuerat, hoc loco restituere uoluisset.

A

¶ De Fuligine liquidæ Picis. CAP. XCIII.

FIt hoc modo e liquidâ Pice fuligo. In lucerna noua quæ ellychni-
um habeat, nonnihil Picis incendio, lucernamque fictili uase in
clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius
perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito, consumproque
liquore nouum infundito, quoad sufficiētem usui fuliginem collegeris.
Vis ei astringens, acrisq;. Vtui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt
& uenustant, & ad circumlitiones, item ubi glabris genis pilos restitui o-
porteret, ad imbecilles, lachrymososq; oculos. Insuper ad eorundem ulce-
ra non inutilis est.

λυγίτις τῆς
ὑγρᾶς πίττης

BARBARI COROLL.

Fuligo Picis, cremata Pice fit; quod quidem aliud est, q̃ Picis cocta, ut in fuligine resinarum
diximus.

EX M. VERG. COMM.

Facile est, græci clibanī, quem nos furnum uertimus, ex descriptione, picturaq; hac Dioσκο-
ridis formam non dissimilem his intelligere, quas nostra ætas Campanas dicit, & quibus offi-
cinæ passim utuntur, ex floribus, herbisq; subiecto igne, exsudatum humorem colligentes.

¶ De sicca Pice.

CAP. XCV.

Liquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui Palimpis-
sam, quo in genere quædam uisci modo lentescit. Boscas cogno-
minata. Altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resi-
nosa. Calfactoriam uim habet. Dura emollit. Pus mouet. Tubercula, pa-
nosq; discutit. Vlcera replet. Vulnerarijs medicaminibus commode per-
miscetur.

παλίμπισσα καὶ
ξηρὰ πίττη καὶ
βουκάρα

B

BARBARI COROLL.

Palimpissa, nihil aliud est, q̃ cocta bis Resina. Nam prima decoctione Pix fit. secunda bis
pix, hoc est, παλίμπισσα.

EX M. VERG. COMM.

Quod moneamus hoc capite unum tantū est, adiecisse nos illi scilicet, & instaurasse amif-
sas, incuria librariorum uoces illas, Talis Lycia est, & Brutia, cōiuncta simul picis et resi-
næ natura, quæ in aliquot melioribus græcis his uerbis adhuc leguntur, καὶ ἄτα δὲ
ἔστιν ἡ λυκαυγία καὶ βρυτινὰ διὰ φέρων ἔχονταί πίττης ἅμα καὶ ῥατίνῃ. Accessitq; nostro huic consilio
& Plinius libro. 24. capite. 7. dicens. Spissarum utilissima medicina est Brutia, quoniam pin-
guissima, & resiniosissima, utraq; præbet utilitates. Idem fere Dioscorides testatus.

¶ De ZOPISSA.

CAP. XCVI

ZOpissam aliqui aiunt de rasam nauibus resinam cum cera, quā
aliq; Apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet. quoniā
marino sale macerata sit. Alij Pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

ζώπισσα
ἐπὶ ἔχυμα

BARBARI COROLL.

ZOpissa, efficacior omni Resina & Pice traditur. Ad omnia; quibus illæ, profunt, uidelicet
ad lecto salis emari callo. Optima hæc, a tyrociniū nauium.

Plin. lib. 16.
cap. 12.

EX MAR. VERG. COMM.

Quod Zopissæ adijcit nomen, Apochyma, a Paulo AEginea Hypochyma aptiore nomi-
nis cōpositione dicitur; nulla tamen nobis in ea uocē certa rei significatio est.

C

De Bitumine.

CAP. XC VII.

πιδοςφελτος

Bitumen Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque graue, ac ualidum odorem uibret. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur Pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agrigentino Siciliae, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. Namque liquidum Bituminis genus esse constat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 35. ca. 15.
Herodotus
lib. 1.

Iustinus lib. 1.

Bitumen, græci *πιδοςφελτος* dicunt. Vnde lacus Iudææ, ubi nascitur, Asphaltites uocatur, quo Iordanis amnis, & Tiberiadē lacu altero profectus, influit lacum Asphaltitem. Galenus in Syria Cœle, salsum, & propterea Mare mortuum uocari prodidit. Viétruius sub Babylone (inquit) lacus amplissima magnitudine, Asphaltides appellatur. Habet supranatans bitumen liquidum, quo Semyramis sit usa, cum Babylonem circumdedit muro. Itē Ioppe. In Syria, Arabiaque lacus, inquit, sunt, immani magnitudine, qui emittunt Bituminis maximas moles. Ex Iudæa bitumen oritur, certo anni tempore supernatans, nec potest ibi tunc euelli, ad omnem contactum sequax atque lentum, præterquam filo, quod menstruum mulieris infecerit. Bitumen, alibi limus, ut in Iudæa, alibi terra est, ut in Syria, circa Sidonem oppidum marinum. Spissantur hæc, addensanturq. Liquida sunt Zacynthium & Babyloniu: cui detracto, subest sal: & ad lucernas utuntur. Bitumen nigrum & candidum gignitur: ubi & siccum fonte quodam, ut inquit Eratosthenes, Euphrati proximo. Liquidum est, & in Apolloniatarum agro inuentum: etiam si coire in glebas a Dioscoride dicatur. Fortasse deferitur hoc a montibus liquidum: post concreuit. Siculum ex Agrigentino lacu pingue, liquorisque oleacei est. Incolæ harundinum paniculis id colligunt, ocyslime ita adhærescens. Bitumen illitur æramenti, murisq. ea contra uim ignis. Statuas ex eo inungi solitas ferunt. Placet in ferarjs fabrorum officinis, tingendo ferro, clauorumque capitibus. Nam calcis usu, cōstructos eo Babylonios muros, nouimus. Bitumen ex fulmine oriri dicitur. Vnde iuxta Babylonem redundant eo lacus, q̃ frequentia ibi cadunt fulmina, ut Seruius grammaticus existimauit. Haud procul, Susi puteum haberi scribit Herodotus, unde Bitumē, sal, & oleum extrahitur: id oleum Persas appellare, R hadinacem.

D

Herodatus li
bro. 6. Erato.

V E X M. V E R G. C O M M.

Vitruius libro octauo architecturæ suæ, cum de medicamentosis aquis agit, ait, bituminosas aquas interioris corporis uitia potionibus purgādo sanare. Licetq. uitiorū certum genus ille non dixerit, ex uitibus tamen & potestate bituminis, coniiciendum id est, Iudaicumq. hoc Bitumen ideo a Dioscoride omnibus alijs præferri.

De Pissasphalto.

CAP. XCVIII.

πιδοςφελτος, id
est, Pici bitu
men.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidamnium, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in littus expuitur, illic coacta in glebas. Mistam bitumini picem redolet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pissasphalton, aliud naturale, ut Apolloniaticum, Babylonium, Zacynthium & quodam lacu: Nam græci omnia ea modo Asphalton, modo Pissasphalton nominant, quandoq. resinam. Naturale optimum. Ex eo, quod cum feruet, innatat. Aliud factitium, mixta Pice bitumini. Hoc genus bituminis in Apolloniatarum agro inuentū, picem fossilem a Theopompo dictam auguror.

V E X M. V E R G. C O M M.

Plinius Pici bitumen hoc, aliquādo Fossilem picem appellat, parum certi rei indicatione, & in qua sibispi parum conuenit. neq. enim potest simul aliqd fossile, & liquidū esse. Quod enim liquidū ex terra in lucem protrahitur, haurit. Testantur autē, Paulus Aegineta, Epyrici incolæ omnes, & res ipsa, concreta substantia pici bitumen hoc esse, quod nostra ætate adhuc picandis

picandis nauigijs, illic in usu est, ex quo uestigal ea gens non negligendum sibi fecerit. Nascitur autem ad Apolloniam antiquam ciuitatem, quam Strabo Epyroticam nominauit. Stephanus ἡλυπίας dixit esse, κατὰ ἑπιδάμνον, ut ab alijs, quæ quondam eodem nomine, uigin tiquatuor diuersis locis fuerunt, ea regionis nota distingueret. Fuit autem mos antiquis scriptoribus, homonyma locorum, regionis adiectione certius indicare. Quo fit, ut passim legitur, ἡ ἐπιδάμνιος τῇ ἐν ἑπιδάμνῳ, non sic, sed aut, τῇ ἐν ἡπύρῳ, legendū sit, ut Strabo ait: aut qd' Paulus Aegineta, τῇ πρὸς ἑπιδάμνον, aut quod Stephanus τῇ κατὰ ἑπιδάμνον, id est, in Apollonia, quæ est apud Epidamnū, eiusdem Epyri aut Illyrijs significatione, in qua & Epidānus ciuitas antiquissima fuit, de qua Thucydides, Paulus, pluresq; alij longius tradiderunt.

A
Strabo. lib. 16.

N De Naphtha. CAP. XCIX.
Aphtham uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum. Inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflammatione tutetur. Vuluarum procidentias, strangulationesque, olfactu, suffitu impotui, emendat. Comittales morbos suffitu deprehendit. Gagatis lapidis more. Purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit. Tussim ueterem, & anhelitum adiuuat. Serpentium morsibus, coxedicum, laterumq; doloribus auxiliatur. Datur celiacis in catapodio deuorandū. Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum pti sana liquatum infunditur. Distillationibus suffitione medetur. Mitigat dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos, siccum replicat. specillo impositum. Concoctum autem & cum farina hordeacea nitro & cera illitum, podagris, articulorū doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest.

régle

B

BARBARI COROLL.

Naphthen, Erathosthenes generi Bituminis liquidi ascribit. Sed ardēs eius uis, ignium nature cognata. Procul abest ab omni usu. Ita appellatur circa Babyloniam & Susidem & in Austagenis Parthiæ, profluens Bituminis modo liquor. Crematam ea, pellicem Creontis filiam a Medea ferunt, ad axas accedētem, corona igne correpta. Etiam si radicis cuiusdam uis, a Circe doctam, incendium id creasse Diodorus meminerit. Similis est naturæ limus, in Commagene urbe Samosata, stagno emergens, Maltham uocant. Flagrat ea protinus, & cum quid attingit solidi, adhærēt, & sequitur fugientes. Ita defendere muros suos municipes, oppugnare Lucullo, flagrabat miles armis suis. Aqua magis accenditur, utique nō admodum copiosa: pulueris tantum, & luti iactu restringitur. Itemq; aceto, uisco, sulphure. Possidonius in Babylone fontes Naphthæ geminos esse tradit. Alterū candidi, quod & liquidū sulphur sit, ignes in se cōtrahens. Alterum nigri, quod liquidum sit Bitumen, & olei uice ad lucernas utile. In Mutinensi certe agro Italiæ similis Bituminis, seu Naphthæ potius liquor. Nascitur, & candidus, & rufus: quem circulatores ad præstigias suas utlem circūferunt. In terra Moena Pannoniæ iūcta, inquit Solinus, parte qua pontum attingit, herba nascitur, qua cum inficitur oleum, quod uocant medicum; diræ naturæ, aqua enim exardescere, terra extingui.

Plinius lib. 2.
cap. 107. & lib.
35. cap. 10.
Idem. lib. 2. ca.
pi. 104.
Plutar. in uita
Alexandri.

Solinus de mirabilib. mundi.

De CVPRESSO. CAP. C.

Cvpessus refrigerat & astringit. Cuius folia ex Passō & exigua Myrrha uesticæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino tusæ in dysenteria, alui fluctione, tussi, & orto

non desinit

Cpncea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibuntur. Earum decoctum eisdem præbet effectus. Tusæ cum Fico duricias omolliunt. Nariumque polypo medentur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, scabros ungues ejiciunt. Hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & imposita, uulnera conglutinant. Sanguinem supprimunt. Capillum ex aceto tingunt. Illinuntur per se; aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus. Admota cum cærato, stomachum corroborant.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. libro. 16.
cap. 33.

Cupressus, longa, subrecta caudice attollitur, cætero quidem orbe, sat, hoc est, semine suo nascitur. In Creta etiam trunco, præsertim in montuosis Tirasensium, ubi cædua est, & cæsa regerminat; modo ab terra, modo a parte media, modo summa, raro ab radicibus. Semē ei perexiguum. Non enim galbuli, qui nascuntur, ut Theophrastus refert & Varro mutuatur, tanquam pilæ parui, cortice cupressini, dictæ Coni, sed ipsæ intus primigenia semina dedit natura, Laricis proxima, perquam minuta. Hæc pilula dehiscens, illa cum maturefcit, difflantur & euolant. Neque facillime colliguntur, præterquam a peritis. Aduena Italiæ quondam, & natu morosa, baccis torua, folio amara, odore uiolento, materie rara, ac pene fructico si generis. Diti sacra, funeribus indicandis, ante domos poni solita. Sterilis femina dicitur, sed metæ aspectu, quæ in fastigio ei conuoluta est, grata, distinguendis Pinorum ordinibus, facilem se tonsili cultura præbens, historiales picturas, tenui follo, breuiq; & uirente superuestiens. Contra mas, spargit extra se ramos, deputaturque, & accipit uitem. Vterque sexus, in perticæ, asseresq; admittitur, amputatione ramorum; qui teriodesimo anno, singulis denarijs ueneunt. Proinde filiarum dotem Plantaria, ueteres appellauerunt. Tarentinam Caro nominat, quoniam, ut Plinius arbitrat, primum in Creta uenerit Tarentum Cupressus. In AEnaria quoque succissa regerminat. In Creta quocunque loco quis mouerit solum, nisi seratur alia, hæc sponte gignitur. In Idæis albisq; montibus etiam non appellata ea, profilit, ibiq; summis iugis, ubi niues nunquam absunt, plurima. Alibi non nisi in tēpore prouenit, magno altitricis fastidio ac labore. Commendari maxime Cupressum Melisiam inuenio. Fructum Cupressi, Galbulos, & Nuces Cupressi recte uocaueris. Nam Galbæ, ut ait Suetonius, animalia sunt exilia, quæ in æsculis nascuntur. Cupressos a partu ramulorum parillum uocatas græci uolunt ἀπό κώπης παράγου τοῦ ἀπρίμου α. Easde & Charites appellari solitas, Ereoclis fuisse filias adnarrant; quæ dum tripudio Dearum subsiliunt, in puteum ceciderint.

Sueton. lib. 7.
in Galba.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ in Cupressu pilulæ, autore Plinio, dictæ a nobis fuerunt, Galbuli, nuces, & coni, eiusdem rei appellatione, ab alijs etiam dici poterunt, omnibus in ea arbore nouissimæ, in quibus exigua semina sunt, dehiscensibus ipsæ euolantia magis, q̃ decidencia. His, folijsq; cæteri omnes in medicina addiderunt *βασαν*, id est, summa germina, & fummos coliculos. Nescimusq; nos, an desiderari hoc in Dioscoride debeat. Paulus certe AEGINETA, huius arboris coma in aliquibus utitur, hic tantum in fugandis culicibus usus est, licetque in uniuersum de totis folijs hoc loco agatur, possunt tamen summa illæ parteis, teneritudine sua diuersa a folijs natura esse; quæ omnia peritioribus censenda relinquimus, ut interim quod commensationis huius nostræ cursum in foribus ipsis remoratum est, breuiter signemus. Decernit hic pota in passo, adiecta exigua Myrrha Cupressi folia succurrere, *κώπης πύματις* (quæ nō, *ἀνέχεται*, si uerbum de uerbo uertatur, in uesicam destillationibus, & urinæ angustijs: quorum ultimum hoc manifestam habet significationem, prius illud ex ui græci uerbi, quod est *πύματις* *αὐτοῦ*, fluxum mali & noxi alicuius humoris in eam partem significat; quemadmodum in podagris fit, in quibus græci dicunt, articulos *πύματις* *αὐτοῦ*, i. fluxu humoris in eā partē tentari. Quibus sic se habentibus, dubitatur a nobis, ex uiribus Cupressi, q̃ adstringere, & refrigerare hic tm. Gale. autē & Pau. præter hæc siccare etiā dixerūt, si in uesicā destillationib. siccādo adstringēdoue cōserūt, quomodo

quomodo urinæ angustijs, quibus contraria ratione succurrendum est, conferre poterunt.

Accedit suspicioni huic nostræ, etiâ quod Plini. lib. 24. cap. 7. de his agens ait, Cupressi radicem & folia, uesicæ & stranguriæ pota mederi: quasi, quod hic in uesicâ defillationes dixerit, id Plinius ad urinæ stillicidium transfulerit. Non tamen in medicinæ decretis, Plinium anti- quis græcorum medicis comparamus, sed in re parâ certa, suspicioni nostræ, ex eo autore fidē aliquam adijcere uolumus.

Aur igitur constituendum, in uesicam defillationes illas, pro uesicæ & urinæ stillicidio intelligendas esse, ut cognata simul urinæ duo mala, hic coniunxerit, stillicidii scilicet, & difficultatem. Quod nos non probamus, quoniam quod paulo ante diximus, significat græcis *ῥιζὸς*, au tangustias illas urinæ, i. *ὑδρὸς*, nō pro his quæ uere & ex difficili urina urinæ angustia sunt, sed pro labe, & noxa aliqua alia, quæ ex defillatione humoris in eam partē urinæ accedat. Quod ex aliorum sententiâ erit. Nam & Serapion sic uertit, & Cupressi uiribus magis conuenit, quæ ut diximus, in siccando, adstringendo, refrigerandoq; sunt.

Quo loco etiam legitur, tritas Cupressi pilulas cum uino potas, &c. in antiquioribus græcis, non pilulæ tantum sunt, sed folia etiam, legiturq; pilulæ & folia, & si Plinius pilulis tantum id tribuat. Nos græcos secuti utrunq; diximus.

Dubitauimus præterea non procul a totius capitis sine, coniungendū ne in denigrado capillo, an in sistendo sanguine acetū Cupressi folijs esset, alijs græcorum codicibus id, alijs aliud in dicantibus. Neq; ab re penitus, quoniam sistendo sanguini acetū in usu est. In ambiguo tamē, accedente Plinio, qui eodem libro & capite ait, capillum denigrant ex aceto, ad capilli denigrationem & nos contraximus.

De Iunipero parua.

CAP. CI.

B

Iuniperum paruam græci, Arceuthyda, aliqui Mnesitheū, alijs Acatalidem, Aegyptij Libium, Galli lupicellum, Romani Iuniperū uocant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraq; acris est. Excal facit, & urinam mouet. Accēsa serpētes fugat. Baccarū nonnullæ, nucis iuglandijs magnitudine nonnūquam grādescere, aliæ nucem ponticā æqua re inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ Archeutidis etiam nomē, id est, Iuniperi retinuerunt. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles. Contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina & serpentum ictus efficacissime bibuntur. Vrinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & uulua strangulatu subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa, q̃ eorum succum ex uino contra uiperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuorata, interficiunt.

BARBARI COROLL.

Iuniperi, duo genera quidem constituunt, Vnum, quod floreat, nec fructificet. Alterum qd fructificet, nec floreat. Solam fere arborum, prorogare fructus suos in biennium, qui ne maturi rescant quidem, sed decerpantur, & aliquandiu conditi seruentur. Etsi in arbore relinquatur, marcescant. Materia fabricis conueniens, tam futuris sub diō, q̃ terra obruendis. Plinius hac descriptione Cedrum maiorem, non Iuniperum demonstrauit, ut indicabimus in Cedro.

EX M. VERG. COMM.

Non leuiter in instaurado hoc capitelaboratū nobis est, tam uarie corrupteq; in antiquioribus græcis totum hoc caput legebatur, alijs in prima parte statim maioris, minorisq; Iuniperi diuisionē & appellationes describētib; alijs alterā ab altero separantibus, & quæ ad minorem pertinerēt in principio, quæ uero ad maiorem in extremo calce docētib; cunctis uero in reliquo capite parū sibi ipsis cōueniētib; . Sed nos meliorem ordinē, latinorumq; autoritatē & fidē secuti, qua nunc legi formā instaurauimus, ita tñ, ut nihil additi, subtractiue a nobis fuerit, nihil ab impresso mutarū, quod non in reliquis omnibus, aut in pluribus saltē legere.

ἄρνυθλο μιν
μνησθεῖς
ἐκκατάδρα
καὶ ῥιζὸς

Plin. lib. 16. ca
pite. 25.

C Credimusq; in Gallia minoris Iuniperi appellatione, ex obsoletis incertisq; notis, & uestigijs quibuldam, quæ in antiqua lectione adhuc apparent, non Lucipellus, quod caret sensu, sed Iuniperellus legendum esse. Notamen hoc multifaciendum.

Illud in Iuniperi fructus historia grauius & diligentius curandum, quod in antiquis ab impresso codice diuerse legitur. Hic enim ait, alterius fructum nucis magnitudine prouenire, nullo nucis genere adiecto, quod merito desiderandū est: alterius nucis Ponticę, i. auellanae quantitate. At in antiquioribus, hisq; melioribus, in primo nucis Ponticę legitur, in secundo fabæ: quæ lectionem etiam Serapion secutus est. Quo fit, monente id re ipsa, ut etiam primo Ponticę nucis magnitudinem, secundo fabæ adsignauerimus. Lapsus hic librarij fuit in exscribendo, in *ter κύμων & καρπὸν* errantis.

Susplicamur & illic uitium esse, quo loco hic ait, Vrinā idem etiam trahit, quapropter conuulsis, ruptis, &c. Non enim uidemus, cur hic inferat, ex eo quod ciendę urinae prodest Iuniperi fructus, ob eam causam conuulsis ruptisq; prodesse debeat, potest quidem omnia illa, autore Plinio, qui hoc ipsum agens, ait urinam ciere, illiniri & oculis in epiphoris, & dari conuulsis, ruptis, uuluis, &c. Verum nos id non damnamus, sed suspectam nobis sermonis seriem dicimus esse, desideramusq; illic aliquid, a quo certius fieret illud.

Pli. li. 24. ca. 9.

Quæ deinde in morbis & medicina pectoris uitia dicta a nobis sunt, a Plinio, Serapioneq; ad dolores eius partis contrahuntur.

ἄρκυνθις μεγάλη
μνησθῆναι
ἀκνίτην

De Iunipero magna. CAP. CII.

Iuniperus magna, quam aliqui siluestrem Cupressum appellāt, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperū, uulgo cognita est. Cupresso assimilis. Asperis, maritimisq; locis plæruncq; nascitur, easdem quas supradicta uires habens.

BARBARI COROLL.

Iunipero uirtute similem, Capidam a Catone dictam inuenio, ad lotium mouendum: nec quid sit, dicere coniectura possum.

De hærbæ Sabina. CAP. CIII.

βράθυον
βάρυτον
βαρόν

Dracis Brathy, alijs Baryton, alijs Baron, Romanis hærbæ Sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs Cupresso similis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera Tamaricæ folio similis est. Vtriusq; folia nomas sistunt. Collectiones illitu mitigant. Et cū melle nigricias sordescq; repurgant. Carbunculos cum uino pota rumpunt. Sanguinem per urinam eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et suffitu idem præstant. Vnguētis calfacientibus immiscentur, & priuatim gleucino.

Pli. lib. 17. capi
te. 13. & lib. 24.
cap. 11.

Herbæ Sabing, aut etiam Sauinae genus id, quod simile Cupressi folio est, Cupressum Creticam nonnulli uocauerunt. Notum est contra gallinacei generis pituitas remedium, ut cubet in fimo qui ex herba Sabina fiat. Dioscorides hoc loco Baryton uocari etiam tradit a nonnullis. Ut fortasse de hac intelligant scriptores, præsertimq; Diodorus, cum in Arabia nasci dicunt, Boraton, Iuniperū, Cedrumq; quasi Boraton p Baryto, uel cōtra exemplariorū uitio legatur.

EX M. V E R G. C O M M.

Non est, quod in Sabinae herbæ, tam græcis q̄ latinis appellationibus legentes moneamus, nisi forte, quod a Diodoro in Arabia nasci dicitur Borathon. Sabina herba est, quā hic Barython, & Barathon uocari a quibusdam dixerit. Quod suspicari penitus ab re non est, eo quod genatæ enim plantæ, & ab hoc deinceps descriptæ Iuniperus & Cedrus illi coniunguntur. Sed non omnino literis Diodoro, & huic scribuntur; hic Barython, ille Barathon uocant.

Sic

Sic dicta est a regione qua multa nascitur. Et herba dicitur, quoniam non arborefcit, sed in latera caulium modo se explicat.

In curandis morbis, nō bene in græcis legi suspicamus, καὶ ἀνθρακας περιβύπτειν οἶνον πρὸς τὴν καὶ αἵμα διόσπον ἄντι, quod paucis mutatis uersum a nobis est, carbuncolorum crustas ex uino imposita exterunt, & cum urina sanguinem ducunt. ad exterēdas enim carbuncolorum crustas, foris magis quam intus remedia afferunt, & ad ducendum cum urina sanguinem, aprius aliquid bibitur.

De Cedro. C A P. CIII.

Cedrus arbor magna est, ex qua Picem colligunt, quæ Cedria uocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum Myrti magnitudi-
ne, rotundas.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Cedro autores uariant. Theophrastus alteram Phœniciam, alteram Lyciam appellat, similes Iunipero, nisi q̄ folium Cedro acutiū, spinosum & durum, Iunipero simplicius ac mollius. Excelior & hæc quam Cedrus. Alij utraq; Cedrum, inquit, nominant, sed quæ proprie sit Cedrus, acutam Cedrum uocare malunt, idest, Oxycedrum. Nodosæ ambæ, alis frequentibus, ligno contorto. Sed in Iunipero, spissiore, putrescenteque, Cedro æterna materies. Vtri q̄ medulla rubens. Sed odorata in Cedro, sicut & fructus: qui & flauus, & magnitudine baccarum Myrti cernitur, esculentus, hilaris. Iunipero niger, acerbus, ingustabilis, durans æuū, prius non decidens q̄ subnascatur alius. Arcades fructus in ea temos eodem haberi tempore confirmant. Satyrus utraq; sibi allatam sine flore, Cupressō similes, scabriore tantum cortice. Radices solutæ summa cute ambabus hērent. Saxosā loca & argentia sequuntur. Plinius longe aliter: quippe qui notas Iuniperi, Cedricq; confundat. Fortasse uerius, q̄ priores. Cedri summa genera duo facit, maius, & minus. Maioris iterum duo: quæ floret, fructum non fert: quæ fructifera est, non florēt, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupressō simile. Quidam Cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima. Minoris quoq; species binæ. Lycia, & Phœnicia, Iuniperi similitudine. Differunt folio. Nam quæ acutum, durum, spinosumq; habet, Oxicedros (inquit) appellatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum eæ ferunt, Myrti amplitudine, dulcem sapore. Dioscorides fructus Myrti similitudine Cedro maiori, ex qua pix fiat, nō minori tribuit. Crassiuscula Cedri resina est: & ad faciendas pices comodissima. E Cedro simulacra, Dijs p̄cipue, sicut in Cupressō, Loto, Buxo, atq; etiā nū oleaginis radicibus minora. Optima nauigis, Syriæ, Pyœniciaq; . Nā Syriacæ, in mōtibus natæ, tanta crassitudo fert, ut homines terni caudicē amplecti nequeāt. Solēt Cedri humore quendā reddere, ut simulacra etiā Deorum quandoq; sudent. Similis in Arcadia est arbor, Cedris nomine. Frutex in Phrygia pusillus, frōndis æternæ, arborefcensq; nunq; , a Theodoro Gaza uocatus Cedrus. Hæc & Cedria a Theophrasto dici puto, quatenus arbor est, nō quatenus frutex. tunc enim Cedris sit, non Cedria. Cedria Theophrastus inquit, differt a Cedro. Arbor folio pungēte mucronibus perinde ut Cedrus. Hippocrates Cedrin ereticam, & Hederam ereticam foeminarum in commodis auxiliari scribit in uino lacteo, idest, tepido, sic enim διόσπον interpretantur nonnulli.

E X M. V E R G. C O M M.

Excellsa quædam Iuniperus, Cedrus est: ob quam caussam, alternatis quondam nomini-
bus descriptæ ab aliquibus sunt.

Omitterem libenter, quæ Plinius diuersis locis miscuit, quæ Iunipero debebātur Cedro, & quæ Cedro Iunipero tribuens. Omitteremus & quæ ab Theophrasto dicuntur lib. 6. quæ si quis diligentius expendat, facile intelliget caussam, quare olim confusæ, mixtæque fuerint hæ plantæ.

De Cedria. C A P. CV.

Cedria optima est crassa, perlucida, ualidi odoris, quæ dum effunditur, guttatim, nō dissipata coit. Cui ea uis inest, ut defuncta corpora cōseruet, & uiuentia corrumpat. Qua ex causa, mortuorum uitam

καὶ πρὸς καὶ πρὸς

De arboribus
odoriferis,
Theophrast.
lib. 4. cap. 6.
& de Cedro
amplius ca. 12
& lib. 5. ca. 9.

Pli. li. 13, ca. 15.

B

Theoph. li. 3.

καὶ πρὸς

C aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta usus. Quippe illita oculis claritatem affert. Albugines, cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, uermes aurium necat. Cum Hyssopi decocto infusa, sonitus, sibilosque sedat. Causis dentium indita, eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cum aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitum genitali, abortiuum fieri constat. Anginae ea perunguntur. Tonsillarum inflammationibus auxilio est. Lendes, pediculosque illitu enecat. Cerae stae moribus cum sale imposita subuenit. Contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta auxiliatur. In elephantia, aut linctu, aut perunctio one proficit. Pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Tineas, & caetera uentris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit & oleum, a Cedria separatum dum coquitur, uelleribus supra halitum eius expassis, ut in Pice. Eiusdem ad omnia usus. Priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum. boumque persanat. Inhaerentes ricinos enecat. Ulcera quae ex tonsura accepterunt, ad cicatrices perducit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 16. ca. 11.

D Cedria modo Cedri Pix, modo Cedri Resina uocatur, e Cedro magna, quae Cedrelate dictur, nihilque aliud est, si proprie loquendum sit, quam cruda Cedri lachryma. Cedrium uero, succus Cedri est, e teda eius, concisa furnis, quam primus aquae modo fluxerit in canali. Nam sequens liquor, Pix iam, non Cedrium est. Sed confundunt autores, nunc per Resina, nunc per sudore redactum, nunc per Pice, Cedria & Cedrium uocantes. Interim per oleo cedrino, quod Cedrelcon, ex malis Cedri, ut ait Plinius, appellatur. omnibus enim his, quamque diuersis, eadem tamen natura inest. Columella, cedrinum liquorem uocauit. Libri Cedrio inuncti, a tinea et carie uindicantur. Damnat usum Plinius, propter asperitatem eius, proprietatem, uiuentia perimendi, perempta custodiendi. Cuius tamen ratio praecclare a Galeno redditur: quia tamen adurat, ita ut ordine quarto calfacientium censeri meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quae graeci Septica, & Sepras cognominant, infirmissimum esse cogeret. Proinde uiuentibus appositum, uitali calore adiuncto sumit uires, & quasi accendit, atque ita iugulat. Sed defunctis additum, putredinem tamen & uitiosos humores exterit & absument: quibus detractis, incorrupta seruatur. Galenus & Paulus non cedria, sed Cedream uocabant.

in diphtheria

De Cedride. CAP. CVI.

Cedrides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguariae. Menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum leporem marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem quo modo ex Pice, congeri oportet, quae eandem quam Picea fuligo uim praebet.

B A R B A R I C O R O L L.

Cedrides fructus Cedri sunt: ut Daphnides Lauri. Minus urunt, quam Cedrus gustantis os: ut mandi quoque possint. Soporifera tamen uis. Si copiosius edantur: caput tentant, inflammantque. Interanea quoque torquent. Galenus autor.

Ad quid

De Lauro. CAP. CVII.

LAurus quaedam tenui folio constat. Altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Unde decoctum earum

in muliebres inſeſſus additum, uulua & ueſicæ uitijſ conuenit. Virentia A
folia ſenſim ſubſtringunt. Illita quoq; ueſparum, apiumq; icſibus opitu-
lantur. Eadem cum polenta, ut pane illita, inflammationem omnem miti-
gant. Sed pota ſtomachum effundunt, & uomitiones mouent.

BARBARI COROLL.

LAurus, cortice tenui deſcribit. Degenerat ut Quercus & Myrtus pertinaciter, adeo, ut in
Antandro, fructus e rubro niger eueniat; quod & in Myrto ibi accidit. Fert & uiam ſuam Lau-
rus, tam ſœcunda q̃ ſterilis: nec tamen ſœcunda omnis. Copioſius ſterilis, quam marem apel-
lamus. Genera Lauri præter ea quæ in ratione Daphnoidis & Alexandrinæ monſtrabimus,
Delphica, ex albo uiridior, maximis baccis, atq; e uiridi rubentibus. Diſta, q̃ uiſtores Delphis
coronarentur ea, ut triumphantes Romæ: unde & triumphalem uocabant, ad Cæſaris Augu-
ſti tēpora, ut mox dicemus. Delphicā, Helianus e Theſſalia tranſlatā Delphos, ab ipſis Tempe
ſcribit: tum cum Pythius Apollo, draconē ſagittis interfecit. Hanc Lactantius gramaticus etiā
Tripodem uocari dicit, quoniam radices, inquit, ternas habeat. Apollini dicata, ppter uim tri-
plicē diuinationis, pteritorum, futurorū, præſentium. Cypria folio breui, nigro, per margines
imbricato, criſpa: quam Laurum ſilueſtrē aliqui intelligunt. Nonnulli ſui generis arborem, q̃
baccæ ei cerulea ſit, Muſtax, folio maximo, albicāte, flaccido appellatā, q̃ Muſtaceis ſubijcereſ.
Muſtacea quid ſint, & qua ratione ſiāt, Catonem conſule. Diximus & in Amylo, Regia, quæ &
Auguſta dici cœperit, ampliffima folio, baccis, arbore, guſtatu quoq; nō aſpo. Aliq ab Augu-
ſta Regiā diſſeſcunt, longioribus folijs, latioribusq; q̃ anguſta. Baccaliam uero dicunt hanc,
quæ uulgaſſima eſt, baccisq; ſeriliſſima. Sterile earū triumphalē, q̃ ea putant triumphantes
uſos a Cæſare Auguſto, reiecta Delphica. Sterilem & Laurū eam eſſe phibēt, quæ miſſa ſit e cœ-
lo eidē Cæſari, altitudine minimā, folio criſpo ac breui, rara inuentu. Eſt & quæ Taxa dicit, To-
piarij generis, excreſcente in medio folio, paruula uelut lacinia folij. Habet & Spadonia opa-
citatis patientiſſima. Itaq; quantalibet ſub umbra ſolum implet. Extra Herculis columnas, in
mari naſcit frutex, folio Laureæ: q̃ eiectus, in pumicē tranſfiguratur, in Heroo ſinu pare aquis
extante lapide eſt, ſimilis tñ uirenti. Magnitudo fruticis bipedalis. In mari quoq; Rubro uiuere
aſſumant eā, ſed ſimile Ariæ. Ariæ ſilueſtris arbor eſt, hyemis initio fructificans, materie durif-
ſima, ut neceſſe ſit, anteq̃ terebretur, macerari eā prius aqua. Quod & in Robore, Carpinoq;
ſeruāt. Honos ei ad carbones argentarijs officinis, ut Robori, Vne doni, Picæ, utiq; ad coctio-
nem primi. Eſt & Ariæ, ſue Agriæ, quā p llice aquifolia Dōres habēt, ut in Fago diximus. Ex
ea Lauro quæ in mari rubro naſcit, inſtrumentū muſicū Pandura factum a Troglodytis legi-
mus. In Corſica Laurus diu nulla fuit, nunc ibi ſatu prouenit. Ramo Laurum ſeri poſſe, con-
ſtat, q̃ uod ueteres dubitauer. Manu ſatarum receptarumq; in domos, fulmine ſola nō ſcitur.
Ignes abdicat, ſalis modo, crepitu. Interaneorum etiā uitia, & neruorum, ligno torquente.
Folium eius Lauream uocamus, et Cato Loream. Vna arborum, latina lingua nomen impo-
nit uiris. Nam Tullius Ciceronis libertus Laureā nominabatur: qui Ciceronianas aquas epi-
grammate cèlebrauit. Laureolos quoſdā ueteribus dictos, Iuuenalis & Martialis poetæ ſatis in
dicant. Sunt qui Lora hinc dicta exiſtiment, quæ antiqui Laura nuncupabāt, a Laureā triūpho-
rum: ſub qua ſolerent captiuos uincire, ducendos in pompam. Vri lignum eius pphanis uſi-
bus: ſed ne aras quoq; ipſas accendi eo ſas erat: ut quidam mirētur. Vnde Horatius, et Papini
us Laurum ipſam, non ſolum Imperatoribus, ſed Varibus dicatā cecinerint. Cum Hedera Po-
etarū, Laurus Ducum fuiſſe legeretur. Quidam ſeniles baculos, e Lauro quoq; faciūt. Cæſarū
Pontificumq; domos, militum arma, falces Impatorum ornare quodam ſolita. Pacis ut Olea,
ſic uictoriarum Laurus ſemp index. In lauro uetere Spartani libū et bellaria iacentes rodebant
poſt cœnā, ob id folia eius, Camaridas ἀρό τοῦ κέντη, quod eſt, rodere uocabant, & placentas
ipſas Camarata, ſiue Pleſta, hoc eſt, polentā, oleo conſperſam: quarū loco nobilioribus, Epēcla,
ſiue quod idem eſt, Matyæ dabant, ceu ſportulæ quēdā maiores precioſioresq; ut turdi, palum
bi, meruſc, turtures, et anſeres, & alia iſs ſimilia. Poſt obtinuit, ut omne paulo ſuauius atq; lau-
tius edulium, Matyā daretur: ſiue ab eo uerbo, qd̃ pinſere, unde Magides, & Maze quoque
ſint appellatæ: ſiue ab eo, qd̃ mandere ſignificat, unde Maſtiche dicat. Hæ quia in poſtremo cœ-
narum dabantur, ab alijs Epidorpiſmata, & Epidiphnides appellari ſolent. Hinc iuris cuiuſdā
p̃cioſi genera Magis et Capis appellant, in Plauti poetæ Pſeudulo. Nam & uſis genus eſt Ma-
gis, quod tamen Varro a magnitudine deducit, ut Capis quoq; nō capitis legi poſſit. Fuit em̃

Plin. li. 15. ca.
30. & alibi paſ-
ſim.

Theoph. li. 3.
capite. 12.

B

C hoc moris ueteribus, Iurulēta ipsa nominibus uasorū appellare: ut Paropside, et Tribliō. Sed & Tragematīs uice Laurum in secundas mensas inferri solitā, Callias & Diocles, ut Atheneus inq̃t, autores sunt. Ramus Lauri, aut etiam Oliuæ, a quibusdam uocatur Arfacus. Quanc̃ & aurcula Erythacus, hoc ipso nomine appellari solet. Est aut̃ Erythacus, a Theodoro dictus, Turbecula. Est & Tuberra quēdam uolucris ab eodem, confic̃to nomine, quam Aristoteles Batin uocauit.

Vide Cēlium
lib. 3. cap. 7.

E X M. V E R G. C O M M.

Primum id legentes monemus, nescire nos, quanta sit eius loci integritas, & fides, ubi in omnibus græcis pariter legitur, *πολιτα δι πρῶτον τὸν σῶμαρον καὶ λυτὰς κινύ*, quarum uocum manifestus est sensus. Non tamen antiquiores latini, Serapion scilicet, & antiquus interpres, quicunc̃ ille fuerit, sic quondam legebant. In omnibus enim est, Stomachum subuertunt, & nauſeas, uel uomitiones faciunt, non diuerso tamen, sed contrario penitus sensu. Ex quo obortanobis suspicio est, potuisse quondam illic *πρῶτον* legi, quod lenire et mitigare est. Non em̃ quod lenit uomitiones facit, sed aliud similiter definens, aut non ideo dissimile uerbum, qualia sunt *πραχύν*, *παχύν* uel, aut *ὑαχύν*, uel his simile aliquod aliud, quod subuertendi, miscendi, & exasperandi uim haberet.

Illud etiam ex melioribus uetustioribusq̃ græcis instaurauimus, quod in impresso multisq̃ alijs deerat, ob id ex melle, passoꝝ concisæ. &c. Deest enim in pluribus *λίαν*, quod est concisæ, & cum melle aut passo subactæ.

Eadem fide etiam aurium duobus malis grauitati scilicet, & dolori tertium addidimus, qđ incertos uocum sonos, indiscreta significatione ad aures peruenientes pertinet. *ὑαχύν* enim est, καὶ *διυαχύν*, καὶ *ὑαχύν* quos ueteres incertos, & indiscreta significatione sonos inter aurium uicia dixerunt, de quibus alibi certius dicemus.

D

ἀγρίδιον

De Baccis Lauri. C A P. C V I I I.

LAuri Baccæ magis q̃ folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle, uel passo profunt tibi, ortopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. Vitiliginēs emaculant. Succus Baccarum utilissime aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere & Rosaceo. In medicamenta autem adiſciuntur quę neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant, & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit. Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

D A P H N I D E S, & D A P H N O C O C C I, Baccæ Lauri sunt, Daphnoides uero frutex.

πλάτανος

De Platano. C A P. C I X.

TEnerrima Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in uino potæ, serpentium morsibus auxiliantur. Exceptæ aut̃ adipe igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumq̃ lanugo, oculos & aures defendit.

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. lib.

4. capite. 7.

Pli. li. 12. ca. 2.

Herodo. li. 7.

Platano in quantam uis altitudinem radicandi se natura, modo nihil obſtet, & aquæ superpetat. Qualis in Lycio Athenis fuisse traditur: quæ iuxta aqueductum, nouella adhuc, in do-drantes fere centum progressa est. In Creta insula, ad Coryniam, Platanus stetit dicitur, ad fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua loui compressam Europen indigenæ fabulantur. Itemque in Cypro una, simili esse natura, uisam aliquando. Platanum in aëro tripode nasci credit Theophrastus. Vnā hac maxime tolerat securim, & subuersa statu ab radicibus, reponi potest: ut Salix & Populus alba. Ideoq̃ actionem dabat Labeo arborum fur-sim cæsarum, contra eos, qui prostratas uel subcidissent, uel asportassent. quoniam nomine arborum

arborum continerentur quæ possent resurgere. Hæc Italiæ aduena, diuq; in ea, Theophrasto etiamnum prodente, rarissima; per mare Ionium, in Diomedis insulam primum inuenta. Communicata quoq; barbaris occidentis, & ad Morinos usq; imperij Romani terminos perducta. In Lycia unius specu, Plinij ætate, octuaginta, atq; unius pedum cauo, prædicata. Huius umbra delectatum Xerxes, in terra Lydia reperi, qui diem integrum cum exercitu consumpsit sub ea; atq; ut capti amore solent, multis donauit arborem muneribus: quodq; ridiculo proximum est, custodem ei tanq; pellici, Meledonium quendam reliquit, autor Helianus. Nutritum vero Platanus infuso radicibus. Commendatio eius summa. Solem æstatibus arcere, per hyemes admittere. Platanus fatæ, ut Plinius inquit, regenerauere uitium. Sunt & Platanus pumilæ, Chamæ Platanus uocatæ. Id & genere ferendi & recidendi fit. Ratione inuenta, sub Augusto Cæsare, quemadmodum nemora tonderetur. A Platanus foliorum amplitudine Platanifolios græci uocant, loca spaciosa, lateq; patentia, ut Photoni credamus. Platanionem uero Hippocrates saxum mari extans leuigatumq;. At Platanos uasis genus est, e quo popana fingebant. Platanum Italia modo rarum habet, Romæ uisum, & in Venetia, puincia Bassiano agro, in uiculo cui Sogia nomen sit. Theophrastus e Platano Aegypti unguentum fieri folium scribit commendatum uestibus, non per se, sed additum in alia, presertimq; Irinum.

EX M. VERG. COMM.

A Mabilis & expedita omnibus quondam hæc arbor fuit. Peregrinâ primum Italiæ, mox omnibus in ea locis, & hortis uisens. Iterum neglecta, paulominus q; ad antiquam gratiam ætate nostra restituta est, uiretq; & in delitijs in Aethiopia etiam habetur, magno ipsorum & hominum argumento, quibus uoluptas & uitæ otia, aut contra sollicitudo, & utilitas in precio & honore fuerint. De ea qui plurâ nosse uelit, Plinium consulat lib. 24. cap. 8. nos ea, breuitat consulescentes, relinquimus.

De Fraxino. CAP. CX.

Fraxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemq; potu, perniciem asferre traduntur.

BARBARI COROLL.

Fraxinum, Mileam, & Meliam quoq; græci uocant: Trinodemque cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habet pregrandes, ordinatos, paresq; numero: quod genus arborum, græci ἱερίσχοι καὶ ὀφύων, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellat, copiosissima, proceræ, teres. Fructificat ætate. Quanc; in duo genera diducitur. Excelsum, procerumq; ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi. Alterum humilius, scabriore, duriore, fusciore, sed folio Laurus, Latifolia acutiore, leuiterq; per ambitione serrato, et ut Theodoros inquit, subfidenti, quia legisset ἱππυαδὸς ὄντι, nos ἱππυαδὸς ὄντι, hoc est, non sine quodam marginis, uel cacuminis aculeo. Ramulum totum, eeu folio singulari credas consistere. quoniam ab pediculo unio, folia simul cuncta erumpunt, & per ampla uersuum interualla, tanq; per genicula continentur, ordineq; pendeant, perinde ut in Sorbo, unde Pennata dicitur a Plinio. Internodia latiora candida, coniugationeq; plures, & folia longiuscula. & magis angusta, coloris herbaei. Cortex leuis, spissus & tenuis, rubro colore. Radices crebræ, sublimes & crassæ. Carere hanc flore ac fructu, in Troadis Ida, credunt falso. Etenim fructum fert minutum in siliquis, nucosum, qualem Amygdalæ, gustu subfalsum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscæ, & alia quædam asfrictiora gustu, circinnataq; ut pilulæ Platanus. Hæc partim cum fructu emergunt. partim multo post nascuntur ei, et quæ Plecta, hoc est, plicameta, siue, inuolutra dicuntur. Leuis exire amat cauis, madentibusq; locis, scabra sitientibus & saxosis. In Macedonia Bumeliam appellant, raro corpore, minusq; crispo, amplissimam & lentissimâ. Fraxinus, Pirus, Pirastra solæ in planis, & materia & fructu commendantur. Oportuna cædi autumnus est. Materies ad plurima utilis. In Ida Troadis, intantū similis Cedro, cortice ablato, ut Plinius, Taxo, Theophrastus ementes uti fallat. Quidam situ diuifere Fraxinum. Campefrem crispam, Montanâ spissam. Folia earum iumentis mortifera. Cæteris ruminantium innocua, idque in Græcia. Nihil iumentis nocent in Italia. Ethoc de Taxo, Theophrastus interpretatur, nō de Fraxino. Fortasse nōminum uicinitas sefellit prodentes, Græcis Fraxinum Mileam, Taxum Milon uocantibus. Maturinas occidentesq; umbras eius, quæ sint longissimæ, nulla serpens attingit. Expertum se Plinius dicit, Si fronde ea, gyro claudat ignis, et serpens, in igne potius, q; in Fra-

A

Meminit &
Celsus lib. 13.
cap. 31.

iudic

B

Plin. li. 16. ca.
13. lib. 24. ca. 8.

C xinuth fugere serpentem. Fraxinus, anteq̃ serpentes prodeant, floret, nec ante conditas folia dimittit. A Fraxini foliorū similitudine, Fraxinula, siue Fraxinago herba dicit, ueteribus nufquam dicta, quod equidem sciam. Mauritania, uel hanc, uel similem Fraxinulę, Secaculim appellat: in compositiones ad uenerem excitandam quęstas, adhibitam, radice candida, & nodosa, flore uiolaceo, fere inter candidum & ceruleum, semine rotundo, ut Iuniperi. Folio inter Pisum, atq̃ Fraxinum. Non desunt tamen qui Secaculim, ex India tantum inuehi putent, notis quas modo exposui. quandoquidem Fraxinago hæc, quę in nostris habetur manibus, inefficax & infirma sentiatur ad medicinam.

¶ De Populo alba. C A P. CXI.

Potus albę Populi cortex uncie unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilulę quę primo foliorum partu exiliunt, illitę cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albę Populi particulatim cæsum, & fulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 14. ca. 9.
Theoph. lib.
5. cap. 14.
Columel. lib.
5. cap. 5.

Populus duplex, alba, & nigra. Alba *λευκή*, nigra, *κρίσις* gręcis appellata. Vtriusq̃ folia ut Crotonis, in iuuenta circinata rotunditatis sunt, uetustiora in angulos exeunt. Ecotario, Hęderę angulosa rotundantur. Propterea meminit Theophrastus, putare quosdam, mutari candidam, ut Croton & Helix, in Hęderam uetustate, quemadmodum & Pirus in Pirastrum. Habet candida cum quibusdam perpauis proprietatem illam, ut ab æstiuo solstitio circumagatur, hoc est, partes supinas foliorum conuertat. sicut Olea, Salix, Vlmus, & Tilia. quod quidem sideris confecti, rusticis argumentum est. Vtrunq̃ genus erectum, sed nigra procerior & leuior. Folium simile ligno. Intus utriq̃ par candor. Neutra uidetur florere. Populorum folijs grandissima lanugo, gręci *χρίσις* appellat. Euolat candida, ut Iulus. Nostri tria genera Populi fecerūt. Albę: quę uuas, Bryon uocas, ferat unguentis, folio numerosiore, bicolore, superne candido, inferiore parte uiridi. Nigrę: quam Arcades sterilem putauere. Sed in Creta fructificat in ipso Idę specus aditu, & ad fontem quoq̃ Sauri, duo decim ab eo loco stadijs. In Cindrio quoq̃, proximo ab Ida monte, & circa Tirasiam, parte montuosa. Tertium genus Libycę, folio minimo ac nigerrimę, fungisq̃ enascētibz laudatissimę. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes ppolim suam faciunt. Inter nigras efficacissima Populus est, quę in Creta nascit. Aristoteles autor est, Acheroin uocari nigram Populum. Pausanias, candidam ita nominatam, q̃ Hercules in descensu ab inferis, apud Acherontem uidisset eam, ramumq̃ extulisset. Proindeq̃ non alio ligno, cremari uictimas in Elide, Ioui olympio. Aristoteles omne satum siluosum, arborosumq̃, Acherusion dici, prodidit. Ad quod forte alludens poeta festiuissimus, Vlmorum Acheruntem dixerit in Amphitrione. Resina Populo exigua est, humor e cauis huius effluit, medicinę utilis. Oleum fit & e Populo nigra, semine. Populeū uulgo, Aegirinon, a gręcis appellatum. Verno id conficitur, cum plurimum grauis est, prægnansq̃ resina. Nam unguentum Populeum ex uua Populi, quę Bryon est, conficitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Exposita omnibus in Theophrasto, Plinioq̃, & plerisq̃ alijs, utriusq̃ Populi albę scilicet, & nigrę, de qua mox dicemus, omnis historia est. Poteruntq̃ uolentes ab illis certiora & plura audire, q̃ excerpta ex eis, et excerpta ab aliquibus nostra fuerint.

¶ De Macere. C A P. CXII.

Macera

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perq̃ astringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

M A B R B A R I C O R O L L.

MAcir, græce Macer, & Xylomacer, cortex est rubēs, radicis magnę, nomine arboris suę. Conuehitur ex India. Gustu acerbo, & cum quadam acrimonia, iocūde odorato, ut Galenus inquit. Qualis ea sit, incompertum habet Plinius. Recentiores, non radicis, sed nucis odoratę corticem, ac folliculum esse affirmant; idq; uero propius est, & plane ita modo cernitur. Hanc nucem græci modo Cariō myrsiticon appellant, hoc est, nucem unguentariam; quę sane diuersa est a glande unguentaria, ut post constabit.

E X M A R. V E R G. C O M M.

Multa sunt, quę inuentum hoc loco Macer, peregrinitatis in hoc scriptore, & alienę elocutionis arguant. Siquidem, quod in aromatum cęsu, & ordine est, nasciturq; in India procul a nostro orbe, inter uiliores, & nostrę orbis arbores, tractari non debuit, nec certam habere neris historiam, si quod in India nascitur, apud Barbaros nasci dicatur. Græcis enim Germani etiam Barbari sunt, quibus in frigido cœlo nihil huiuscemodi nascitur. Neq; Dioscoridis græce consueuerant ad orientem, & meridiem mundi partes Barbariam nominare. Quo fit, ut credamus, a proprijs sedibus, quę illi inter aromata erant, in alienum locum temere translātū fuisse Macer hoc, & quod legitur *in tō capēpr, in tō indūar* legendum, aut intelligendū saltem esse. Deligni cortice Galenus multa, & post eum Paulus Aegineta, pluresq; alij.

Nostra ætas ex India aduectum aromatatis appellatione nouit, non ligni corticem, sed odoratę nucis, corticosum operimentū, et quasi uillosum folliculū, qualis in Ponticis nondū penitus maturis nucibus uidetur. Qui si idē cū hoc, & eo quod Galenus Xylomacer uocat, sit, peritorū ludicio relinquimus. Nobis, ut a primo diximus, in scriptore hoc, suspecta omnia facit, loci breuitas, incōcinna elocutio, & quod in pbatissimo mihi codice, nusquā Macer hoc legitur. Ceteri tamen omnes de eo tradiderunt. Nosq; eorū fidē & autoritatē secuti, hæcenus de eo egimus.

De V L M O. C A P. CXIII.

Vlmi & folia, & cortex, & rami uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinūtur. Vulnera glutināt, sed multo magis corticis Tilia, si fascię loco intorqueat. Nam lorū more flecti potest. Crassior cortex in uino aut aqua unciatim potus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescūt, si decocto foliorū corticis aut radicis foueātur. Humor in folliculis enascēs prima germinis erūptiōe, cuti illitus nitorē inducit, faciēq; splēdidiorē pręstat. Qui dū siccat, in animalia abit, quę culi cū formā gerūt. Folia cū tenerescūt, olerū more ad obsonia usurpantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vlmi *ἡδύλα* græci uocant, utiq; campestrem, quę & fruticosior. Alterū genus montanę, Oripteleam nominant. Folium indiuisum, leuiter per oram serratum, oblongius q̃ Piro, februm. Arbor grandis & celsa, irriguis amica, ligno flauo, neruoso, robusto, ut quę tota cor sit. Vtūtur eo ad fores lautiores, ad cardines, assamenta portarum, & torcularia, sonitum caueas, & ad carpentarium quandoque opus. Viridis facile cæditur, sicca difficile. Sterilis habetur arbor. Cradæ Vlmo, ut Fico, Robori, Platanoque gignantur. Vuam fert, & in petiolis lachrymę modo gummi, & bestiolas culicibus caprifisci similes, in folliculis & autumno Cachryes uocatas, cōplures, minutas, atq; negras, ut Theophr. scribit. Italici quatuor Vlmi sunt genera. Nostrates densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore. Gallicū, Siluestre. Quarum Attinias uocant. Excelsissimas, & in ijs Sicanas illis præferūt: quę nō sunt riguę. Steriles Attinię. Ideo plantis seruntur, autumno uitibus, & Maris appellamus. Reliquę proueniūt, Samara, siue Amara, ut Columellę placet (ita nominat Vlmi semen) colligitur circa martias Kalendas, cū flauescere incipit, priusq; folio uestiantur Vlmi. Columella Vlmoreū duo tantum genera putauit, Gallicū, & Vernaculū: illud Attiniam, hoc Nostratem uocari: qui & Tremellium scropham reprehēdit, q̃ Attiniam Vlmi nō ferētem Amaram falso sit opīnatus: Nam rariorem, inquit, sine dubio creat: & idcirco plerisque sterilis uidetur, seminibus inter frondem primę germinationis latētibz, Itaq; nemo inserit ex Amara, sed ex sobolibus. Est au

li iij

A
Plin. lib. 12. ca.
p. 1.
Galen. lib. 7.
simpliciū far.
capite. 39.

Theophr.

B

*

Theophr. lib.
1. cap. 14.
Plin. lib. 24. ca.
p. 3. & lib. 17.
cap. 11.
Columella li-
bro. 5. cap. 5.

C tem Atinia lōge lētiōr & procerior noſtrate, frōdemq; iucūdiorem bubus præbet. Amara, ut dixi, dicif ſemen eius latina uoce. Nā græce, ἀμάρα nō hoc ſignificat, ſed rituulū & in cile rigan- dis hortis, ita dictū, quia marceſcere phibeat: ſed & auritū cauernæ, dicuntur a græcis Amaræ.

T E X M. V E R G. C O M M.
Theophrastus & Plinius longiſſime de hac arbore tractauerūt, ideoq; nec a nobis deſyde- randa. Illud tātum monemus, uoluiſſe nos Tiliam corticis illic dicere, quo loco legitur, Cor- tex pro uinculo & faſciola uulneri. &c. Qua rei deſcriptione Plinius antea uſus fuerat, ne Ti- liā arborem Vlmo miſcuiffſe nos aliquis dubitaret. Scimus enim & nos, a Tilia arbore, cuius materia lenta & tractabilis eſt, quōdam Lētiſcos, faſciolaſq; in coronis ex ea arbore pendētes.

Non omitemus præterea, in deſcenda aluo, Plinium frigida aqua tantū uti, nec pituitā ſo- lum, ſed etiā aquā deſcere: quæ neſcio an Dioſcoridi deeſſe poſſint, & abundare uinū, quo hic in eadem purgatione utitur.

Et cum nihil oſſeum in Dioſcoride illic legeretur, ubi dictū a nobis eſt, ſolidiſcunt celerri- me oſſea ſuccedente cicatrice. &c. non ſine cauſſa ad fracta oſſa contrahendam eſſe rem cogita- uimus: cum illic πωρὶ uerbum eſſet, quod id tantum ſignificat, ut paulo ante teſtati ſumus, & præter id κέταγμα, quod in fractis tantum oſſibus, ab antiquis medicis receptum eſt.

Quas deinde beſtiolas culicibus ſimiles in Vlmi folliculis naſci Dioſcorides ait, a Theo- phraſto Cinipes dicūtur, quēadmodum ex Caprificis euolātes. Similes his, alię beſtiæ Plenes ab eodem uocantur.

ἀπὸ τῶν παλαι-
ῶν καὶ πρῶτων
καπρία.

I Ncidens caudicibus ligniſque ueteribus caries congeritur, quæ ſari- næ modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Serpētia co- hibet, ſi cum pari anifo & uino ſubacta, linteisq; impoſita, illinatur.

B A R B A R I C O R O L L.
C Ariem lignorum, καπρίνικα græci uocant, & Embion poeta.

D C Redidiſſem ego facile, de Vlmi carie tantū a Dioſconide agi hoc loco, niſi Paulus AEgi- neta his uerbis ſubſcripſiſſet. Lignorum caries, eorūq; præcipue, quæ mediocrem adſtringen- di uim habent, qualis Vlmuſ eſt, humentia purgat ulcera, & explet.

ἀγυρῶν

P Opuli nigræ folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis do- loribus illinūtur. Reſinam Populus fundit, quæ in malagmata ad- ditur. Semen potum ex aceto comitialibus utile eſt. Lachrymam comme- morant, quæ in Padum amnem deſluat, durari, ac coire in ſuccinū, quod Electrum uocant, aliȝ Chryſophoron. Id attritu iucundum odorem ſpi- rat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; ſtomachi uentriſque flu- ctiones ſiſtit.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophras-
li-
bro. 1. cap. 14.

Opulus nigræ, qualis ea ſit, indicatum eſt in candida. De ipſo autem Electro, ſunt qui tria eius genera conſtituant. Ex arborum ſucco primum, quod inde Succinum dicatur: ut non hoc ſit quod Homerus nouerit. Secundum naturale, quinta parte argenti, ut in canaliſſi au- ro. Tertium cura ſit, ex tribus auri partibus, & una argenti: quamquam quod quintam par- tem argenti excedit, in cudiſus non reſiſtat. Errare Plinius exiſtimat, qui melius eſſe putant naturale. Cuius probatio, ut ueneno accepto, & ſt ridorem emittat, & uarios quaſi arcus cœ- leſtis in diſſimilitudinem reddat colores. Narratur & hæc ad lucernarum lumina clari- us arg- gento ſplendere. Electrum inquit Strabo, purgamentum ipſum auri eſt, coctura prima qd ex ſulphuroſa cuiuſdā cretæ comitatu ſit. Argentū aurūq; in ſe cōplexū, chymiſtæ Phaetonem uocant. Diuerſum ab hoc uidet genus eſſe qd Ambra, ſiue Ampar caninū dicif. Actus Am- bar, nos Succinum oriētale primi nominauimus: in cōpeatum ueteribus ut arbitror, multis lo- cis ſcaturiens, bitūminis & ſulphuris modo. Diſcrimen eius triplex, Ruſſum, & pingue præſe- runt.

runt. Selachiciū, a municipio quodam Indiæ uocatum, ubi nascitur. Subalbidū ex Arabia se-
lici. Minus probatur e maritimo quodā oppido, cui Sechra nomen est. Determū nigrescit,
quod pisces deuorauere. De hoc tamen aliq̄ aliter. Nos græcam fidem sequimur.

E X M. V E R G. C O M M.

V Erisimile est, debuisse in scriptore hoc etiam coniungi Populū albam, & nigram, & neu-
tram abiq̄ altera tractari. Nos tamē, quoniā locis omnibus in antiquissimis græcis reperiri
tur, eas relinamus, nō ausi mutare, qđ antiquorū omniū codicū fide immutabile esse debuit.

De Succino, quod Electrū ueteres, nostri Ambram dicunt, qui nosse uelit plura, apud Plin-
ium legat libro ultimo, cap. 3. & 4.

Nos etiā illud adiicimus, credere nos, nō ex utraq̄ Populo succinū fluere, sed ex nigra tan-
tum; ideoq̄ non iſ *ἑνός* numero multitudinis, sed iſ *ἑνός* numero singulari legēdum esse lo-
cum. Nihil tamē restantibus omnibus græcis, mutatū a nobis est, cognoscendumq̄ id diligen-
tioribus relinquimus.

De Harundine.

CAP. CXVI.

IN Harundinum genere quædam Nastos uocatur, ex qua sagittæ fa-
ctari solent. Alia foemina, qua tibiærum ligulas efficiūt. Alia quod
fistulis addicta sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geni-
culis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua,
apud amnes nascens, quæ a quibusdam Cypria, ab alijs Donax appella-
tur. Alia Phragmites, seu Valltoria, gracilis, candicans, uulgo cognita:
cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq̄ corpo-
re extrahit. Luxata, lumborumq̄ dolores, cum aceto mulcet. Virentia fo-
lia rufa, & imposita ignibus sacris medētur, & ceteris inflammationibus.
Corticis cinere perūctę cū aceto alopecię sanant. Paniculę lanugo si aures
intrauerit, exsurdatur. Eundē effectū implet Harūdo quę Cypria dicitur.

B A R B A R I C O R O L.

H Arundo uocatur a græcis dicit, a Phœnicibus Gingros, ob Adonin, quem Gingrem uo-
cant, & lugent. Radices eius uiuaces, geniculatæ, ac fere in solæ, similes iſs partibus, quæ supra
terrā eminet. Huius duo summa genera. Tibiariū. i. Auleticon. Vulgare posterius. Hoc in Cha-
raciam, hoc est, Vallarem, crassam & ualidā, quæ Græcanica quoq̄ uulgo dicit, & a Vitruuio
Cerdone græca. Et in Plotiā, siue Plocimon, diducitur, hoc est, flutam, uel nexilem, graciliore
& imbecilliorē priore, utraq̄ Orchomeniū circa lacū. Superior, in ripis expaciātis stagni, et in
Comitibus (sic enim Harundinetū prædensum & farctū appellāt) sequēs subtilis, in insulis flui-
tantibus, quas græci Ploadas uocāt, in immēsum prælatis iſs, quos Cephisus amnis abluisset,
ut cecinit Pindarus. Interim cū Auletico nascit Characias, sed longior cæteris, & uermibus ob-
noxia. Tibialem hyeme legūt, uere tunicas eximūt, æstate per internodia cedunt. Optima fieri
armamēta e medio geniculo, mollissima e supioribus, durissima ex imis asserunt. Persuasunt
erat, & ligulā ex sua quanq̄ tantū harūdinis parte cōgruere: & eam: quæ radicem antecesserit,
lquo Tibiariū lateri cōuenire, quæ cacumē, dextero cæterū internodio, in duas partes dissecto,
utriusq̄ ligulæ os incisuræ cōmittebat; alias negatur congruere: Theophrastus autor. Plinius
magno nominū ambitu, Calamos numerat: Ægyptios chartis seruatos: probatiores tamen
Gnidios: & qui in Asia circa Aneticū amnē nascatur. Nostratibus fungosior natura, bibulos,
cauo intus corpore, tenui superne ligno fissiles, præacuta semper acie geniculatos. Gracilitas
nodis distincta, lqui fastigio tenuat in cacumina, crassiore paniculæ coma, qua pro pluma im-
plentur strata cauponarum. Et hæc ad nauium commissuras in Belgis, glutino quocunque si-
delior rimis explendis, Bononienses e Rheno amne, quibus plurima inest medulla, pondus-
que uolucres. Contra flatus quoque peritica libra, ut nullus sagittis aptior sit calamus. Post
hos Cretici & Belgici laudantur. Creticus carnosissimus, lōgissimus internodijs, lentissimus
si calsiat, Toxicus; id est, sagittarius, ob excellentem eius usum, a Theophra. dictus. Nunc scri-
priorius, ex ea insula præcipuus, nec aliūde fere expetit. Omnibus præferitur Indi, ut q̄ hastarū
quoq̄ uicē præpila, hoc ē, cuspidibus additis, præbeāt. Iis amplitudo arborea est: nec dubitat.

Theophrast.
lib. 4. cap. 11.
Plin. lib. 16. ca-
pi. 36. Lib. 24.
ca. 11. lib. 17. ca-
pite. 10. & 28.

C Equarū radicibus, ut Solino placet, succus exprimit ad suauitatē mellis, quasi Saccharum interpretari possis. Longitudo subrectarū, 30. fere passus, humi uero serpentū, 50. crassitudo cubito rū ternū, interim sentū; quæ tamē Strabo nō credidit. Diodorus in australi quadā insula, æquo Ætiali plaga scribit harūdines haberi plurimas, fructū candidum, Eruo similē ferētes, e quo sua uisissimus panis cōficiit. AEquē fabulosum atq; illud, q̄ in eadē insula, duas nasci tradit herbas, supra quas iacētes, placidissimō somno moriant. In Æthiopia certe populi, radicibus Harundinum in farina tritis, uiscitant, & ob id Rhizophagi nominantur. Spissius mari corpus Inditradūt. Fœminæ capacios. Nauigiorū etiam loco, singulis eorū internodijs circa Acesinem maxime amnem, ternos homines capiēte alueo. Syringias, totus concauus, ita dictus, quia fistulis utilissimus, quoniam nihil sit ei carnlaginis atq; carnis, ut Plinius existimat. Dioscorides crassa cum carne descripsit. Tibialis, Orchomenius, idēq; Auleticus, cōtinuo foramine paruius est. Fruticosissimus Donax, nō nisi in aquaticis natus, latine Cannā. ᾗ Cannā apud nos, ut inq̄ Columella, gracilē & degenerē significat harundinē. Apud gr̄cos fiscellē genus Cāna dicit, ut est apud Pollucē. Præfert aquaticis, ficcus. Læconicus foliū uariū, & ab ima parte densi tū, tunicis longioribus: quales circa stagna, dissimiles amnicis. Est & obliqua Harūdo, nō ex-celsa, sed iuxta terrā fruticis modo se spargēs. Suauissima in teneritate, pecori. Ab aliquibus uocatur Elegia. Zeugitæ, calami dicunt, Armamentarijs Theodorus interpretatur, cū in ampli-rudinē aucupatoriā adolescūt. Auleticī, lacu Orchomenio, influente Cephiso amne, pmanen- tēq; anno, celerius autē recedēt. Graciliores, Bombycinæ appellabantur. Horū generū fœmi- næ, Spadones et Eunuchiz uocari solitē, folio latiore, candidiore, nulla, uel modica lanugine. hinc erāt armamēta ad cātus inclusos, quē gr̄ci Iugamēta, siue Paria, hoc ē Zeuge, ad dextrā & sinistrā tibiā uocabāt: qđ ita essent cōiunctæ, ut altera eiusdē carminis incentiua, altera succētiua foret, ad Bacteriā a Theoph. (nisi fallor) appellatos. De Bacteriā meminit & Plutar- & Pollux, gestamēq; id theatraliū psonarū demonstrant esse, ut Scipionē Plautus, rectū insigni- bus, curuū ignobilibus. In sacris certe literis Bacteria dicitur inuocatio ea, quæ post præceptio- nem addi solet. Quid si q̄s in Theophrasto, nō ad βακτηρία, sed ιουδαία legendū putet? Erat au- tem hoc & loci nomē, ut inq̄ Pollux, & theatralis cuiusdā operē cātionisue genus, statariū, & circa saltationē, ac tripudiū: quo Lacedæmonios & Arcades uti solitos incinēte modulos & fre- quentamēta quædā simplicia tibicine Athenens cōmemorat: qđ & Enoplion uocauerint: etiā Embasim, hoc est, ingressiōnē incessionēq; ut ē apud Gellii. Ob id indusos cātus a Plinio di- ctos inrelligo, q̄bus antiquitas in theatro cōtēta erat, simplici adhuc musica, hoc est, ut Theō- phrastus inq̄, Aplatō, cōprimētibus se tibiārū ligulis, quia tempestiue cæderētur, ideoq; ad uarietates, flexusq; sonorū inutilibus. ad hoc exēpli, τὰς ἀκρόβαςις uocabāt: cuius inuētor Ari- stonicus fuisse dicitur, ut Athenens meminit. Illos autē, quibus operosa ratio canēdi placuit, Camptaulos, a uocū inflexione appellauerūt: quod nomē in Carini Cæsaris uita deprauatum, correximus. Correxit hoc luxuria, & per solsticia cēdi placuit, ut in trimatu demū utiles fierēt apertioribus earū ligulis, ad flectēdos sonos. Armamēta sane, Plinio est, ubi p Iugamētis uine arū, Pedamētis uē accepit. Tibicines gr̄ci, et Monaulos, & Calamaulas, et Rhapsaulos quoq; dicūt. Habēt & illa distinctio. Tibiārū aliæ uirginales & puellares. Aliæ uiriles: quas & pfectas & plusq; pfectas cognomināt. Sūt & citharisticæ quædā Tibiæ: itē quē Dausticæ uocātur, & quē Lyliodicæ, & Tragicæ. Lyliodi uero dicebātur, q̄ mimos qđdā sub psonis muliebribus age- bant, ut uirilibus Magodi. Nā Elimi tibiæ apud Sophodē in Niobe, nihil aliud uident esse, q̄ Phrygiæ: quas & Scytaleas, ob crassitudinē appellāt, et obliquas, ut inq̄ Varro, siue impares, quæadmodū Serranas, quæ pares essent & æqualibus cauernis, cū in Phrygijs dextera unū ha- beret foramē, sinistra duo: quarū inuētor Midas. Nominant & Diopi, hoc est, biforæ, q̄bus & nos uimur, sed e buxo, aliaue materia, hæ corniculorū tubarūq; sūt, & semp fiores comites. Hebebātur olim & Hemioipi, hoc est, semiforæ: quas & minores, & impfectas, & puellares uo- cabant, atq; terrenas, hoc est Moluculas, epulis adhiberi solitas. Vt hoc uideat Plautus intelle- xisse, cū semifonarios artifices quosdā nominat. Itē Mesocope, & Hypotretæ, qđ alterē in me- dio forat, alterē ad imū prorsū forēt. Tityrina quoq; tibiā eadē est quæ harūdinea. Nā Magadis & Palæomagadis ea est, quæ acutū grauēq; sonū reddit, genus citharisticæ tibiæ: q̄q; Magadis & Pfalteriū nomē est idē cū Sabuca & Pectide, ut multis placet, nec tū omnibus. Alias quoq; Tibias in arbore Loto diximus. Singularē tibiā Monocalamō, & Monaulū uocat: sicut multū plicē Polycalamō. Priorē Marfias Celænis, aut Mercurius inuenit. Alij Seuthen, & Rhonacen Medos homines inuenisse quidē, sed Marfiā uinxisse cera putāt. Alteas Silenus, siue Marfias, quorū Poetæ gr̄ci, tibiā plærūq; Lebyn uocāt, ab inuētoris patriā, ut Duris scriptū reliq̄. Var- ro Præcentiuas

Vide Cēliū li-
bro, 5. cap. 16.

ro Præcētius & Succētius cōnumerat; quarū sit usus ad puluinaria præcinendi subcēdēdīq; a quo & Præcētōres & Subcētōres appellant. Item Vascas, foraminibus q̄ præcētūz pluribus, Lydias porro, easdemq; Turarias uocabant, q̄ inter Tura adhiberentur. Gingrinæ, tenuiorem sonū edebāt, q̄ Vascæ. Clarissimū Aegyptiæ, Garrulū Arabicæ. Ob id græci nugācem hominem, Arabicū tonariū, prouerbio factō nomināt. Acutissimæ Gingrinæ habebantur & Corinthiæ, ut inquit Solinus. Gingrinas, ab anserina uoce dictas putāt. Nam & græci, *χινδύριον* pro eo quod est, tibia sonare, dicunt. Ego a Ginge, qui sit Adonis, ut huius capitis initio monstrauimus. Erant & suæ funerū tibiæ, siue rubæ, ut inquit Gellius, quarū peritos, Siticinas uocabāt, non quasi ficcinistas, a genere tripudij, sed q̄ ad sitos, hoc est, uitā functos, & terra cōditos sonarent. Erant & Tonaria, quibus uti Gracchus solebat, ad cōponendā in cōcōne uocē eburneis. Nora est historia. Est & in Italia nascēs, ex qua sit Adarcha nomine, de qua post dicemus. Aucupatoria sūnt harundo, a Panormio laudatissima legīt, & Panorito, Piscatoria abari tana ex Africa. Musicæ harūdines, ex insula Sicilię, Thermitano agro sita laudātur, ut Solinus ait. Sunt & aliæ sine nominibus harūdines, proceritate, breuitate, crassitudine, exilitate similibusq; distinctæ; adeo, ut. 29. earū genera demonstrasse Plinius se dixerit. Harūdo omnis, ex una stirpe numerosa, atq; etiā recisa, deustaq; fœcūdior. Folia Indici tantū breuiā. Omnibus a nodo cōplexus initiū est membranīs per ambitum tenuibus, raroq; non a medio genu procumbentibus. Latere in rotūditate bina, sup̄ nodos alterno semper inguine, hoc a dextra, illo ab leua, superiore per uices. Inde exeūnt aliquādo rami, qui sunt calamī tenues. Mira huius & Folicis discordia. Vtriusq; radix cōtrita & imposita, sitēp alterius eicit infixū corpori. Ad hūc usum, ex Harundinis radice medicamentū Hippocrates, Epipastron Orchomeniū, uidet qui buscūla appellasse. Magna cū altero genere concordia. siquidē ut Cato præcipit, optime corrūda feritur, ubi sūnt harūdines. Harūdini bus septentrio, domos suas operit; duratq; ita in altitudine regulū earum. In reliquo orbe camēras leuissime suspendunt. Harundinis Italiæ usus ad uineas quoq; ut Arpino agro. Paniculæ florē illū, auribus infestū, Anthemlem græci appellāt.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vos cum radice Harūdinis bulbos diximus, oculos eius intelligimus, quo nomine etiā ueteres in radice Harūdinis eā partē dixerūt, unde noua eius soboles quorūānis nascit.

De P A P Y R O.

C A P. CXVII.

Papyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina utilitatis ad laxandas fistulas. Madefacta lino inuoluitur usque dum inaruerit. Constricta enim atque immissa in hiarum completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expunt. Iplis radicibus pro ligno utuntur. Crematæ Papyri cinis depāscētia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime cohibent. Verum melius id combusta Charta præstat.

B A R B A R I C O R O L L.

Papyrus, et Papyrū, latine dicit. In palustribus Aegypti, aut q̄scēntibus Nili aquis nascit; quę regio, Delta, & inferior pars uocat. Item Syrię, circa quē odoratus ille Calamus lacū nascitur, & in Euphrate circa Babylonē. In Aegypto, nō excedēte bina cubita gurgitū altitudine, uolari hominis robustū, brachialiq; radicis crassitudine. Obliqua hæc, atq; densa, nō amplius q̄ cubito rū decē longitudine. Triangulis Papyrorū lateribus, qui a terra multis partibus tolluntur, pedibus, ut inquit Strabo, decem, uel ut alij, cubitis quaternis. In gracilitate fastigiati, sustinentes comata, ac Thyrsi modo, cacumē includentes exile. Ad nihil utile, præterea nullo semine, aut usu eius alio, q̄ floris ad Deos coronādos. Radicibus incolę utunt, nec ignis tñ gratia, sed ad alia quoq; utēsilia uasorū; ut q̄. pba & alta materie sint. Ex ipso quidē Papyro nauigia texunt. E libro uela, tegētēq; necnō & uestis genus, & stragula & funes. Mādunt crudū elixī, succo deuorato, corpus expuentes. Scitur & usus ex eo ad chartas ueteribus. Nūc alia earum officinis inuēta ratio est. Habet & in Aethiopia & Italia Papyrus uel pmiscue, Ciminio lacu plurimum, sed alterius forte generis, nec ad chartas utile, quandoquidem Aegypto propria tribuitur, & Biblos appellatur. Alioquin Strabo, in India quoque nasci Biblum scribit. Idem autor, in parte Nili, quæ dicitur inferior, abundare tradit eam; quoniam ibi præcipue collatur.

A

Arabicus tonariū. Pro- uerbium. Gell. li. 10. capite. 2.

B

πάρυριον

Plinius. lib. 19. cap. 11. 12.

C & duorum esse generum: deteriorem, & meliorem: quæ Hieratica dicitur: unde & nomē Char-
tæ Plinio, Herodotus ueteri consuetudine pelles quoq; hircinas, & ouillas, Biblos uocari tra-
dit, q; hīs in penuria chartarum uteretur uice.

Myrica

De MYRYCA. CAP. CXVIII.
MYrica, seu Tamarix arbor, uulgo cognita est, cum apud pigras
& stagnātes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens com-
page muscosum. AEGYPTUS, SYRIAQUE alteram gignunt mitiorem, silue-
stri cætera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter, aspe-
rum gustu, quo conuenienter utimur uice Gallæ in medicaminibus ocu-
lorum orisque. Datur cruentæ excreationi in potu, & coeliacis, & con-
tra profluuiā scēminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus.
Illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum fo-
liorum cum uino potum, lienem absumit. Ad dolorem dentium in collu-
tionibus salutare, & mulieribus fluxioni uulvæ oportunū in deflessioni-
bus. Phthiriasi, lendibusque circumfufum prodest. Abundantiam scē-
minarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis
moliuntur, quo datus in his potus proficiat.

Plin. lib. 13.
cap. 11.

D

BARBARI COROLL.
MYricen, Tamaricem uocant Corinthi. Et in Achaia quoq; est, & Bria dicitur: & cum
plus iusto adoleuit, Promala utrique poetis, siluestris, & sterilis forte, quia fructus ei bryodes,
hoc est, muscosus. Nam satiuræ similis Gallæ provenit: quæ in Syria, & in AEGYPTO copiosa
etiam est. Hanc & Tamaricem nonnulli appellant: similem scopis amerinis prodentes. Neq; ta-
men omnibus eandem esse Tamaricem & Amaricem placet. Myrices certe infelicia ligna uul-
go nominantur: quoniam nihil ferat præter flosculum, de quo diximus, muscosum: nec ferat
unquam. Huius cum uno uiscerum liene tanta dissidentia est, ut affirmet, a Democrito lumen
tes, si ex ea alueis canalibusue factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini splenetico,
cibū potumq; dant in uasis ex ea fabricatis. Illud obiter indicādum est Columellæ studiosis,
ut locum in octauo eius libro corrigant, ita scriptum. Succurritur, inquit, si fabricentur Cana-
les Tamaricis & Rusco. Legendum est, Tamaricis e trunco, author Dioscorides. Nec illud nō
docendū, qui uitro soluendo firmandoq; accurrāt, ex hac arbore potissimum igni suo escā
ministrāt, Cuius radicem officinæ Casiam uocare solēt: & quæ palam imperitiā medicorū est,
pro Casia odorata utuntur. Folium Miricæ sunt qui Sabinæ herbæ nō nihil simile pñcient.

E X M. V E R G. C O M M.

QUam cæteri græcorum appellatione Myricen, potius q; Tamaricen dixerūt, nos autho-
re Columella, plantarum & Romani sermonis grauissimo teste, Tamaricen libere &
intrepide diximus. Is enim de suillo pecore, eiusq; morbis lib. octauo agens, Solere ait sues ui-
tiosi splenis dolore infestari, accidereq; id malum magnis siccitatibus, quo tempore stratis pas-
sim sub arbore pomis, sues dulcedinē pabuli cōsecrantes, splenis incremento laborāt: succurriq;
huic malo dixit, si e trunco Tamaricis fabricentur canales, impleanturq; aqua, deinde sitiendū
bus admoueantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus, intestinum lienis tumorem com-
pescit. Quo uno testimonio satis fore nobis credidimus, ut quæ græcis *μυρίκη* est, latinis Tama-
rix quondam fuerit, & adhuc sit, eodem in duobus autoribus eiusdem mali conueniēte reme-
dio. Sterilem Tamaricen in Theriacis suis Nicander esse testatus est, speciosumq; eius fruticē:
ideo *μυρίκη*, i. uatem uocari, quoniam iusserit Apollo uates Tamaricis ramulū, manutenen-
tes uaticinari. Versiculi eius sunt.

ἡδὲ μύρικη δάξω νῖον πανακίερτα θάμνον,
μύρτιν ἐν ῥόσιον χερσίν ἢ ἐν ἀπόλλων,
μάντιόν τ' αὖ καρπίατος ἰδύμετο καὶ θύμιν ἀνδρῶν.

Quæ sic facile uertat aliquis. Sumito præterea Myrices fruticem, uatem inter uiuentes ho-
noratum. In qua Apollo Corypæus uaticinia posuit, & iura mortalium. Ob quam causam,
ex historia

ut ex historia collegimus, Magi & Scythæ ad uaticinia sua Myrice utebantur. Quod genus diuinationis ab alijs gentibus etiam seruatum est. Herodotus siquidem sepe in diuersis gentibus Myriceis ramulis uaticinia fieri testatur. Ob quam causam & Apollo Myriceus quondam dictus est. Quoniam ex eadem arbore in pompa Iouis coronari solitos in Aegypto sacerdotes, & in Media Magos, ex antiquioribus scriptoribus plures retulerunt.

A

De Erica. CAP. CXIX.

Erica fruticosa arbor Myricæ similis, longe minor, cuius flore apes Ipsas reprobum mel efficiunt. Tam flos, quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

BARBARI COROLL.

Ericem, colore tradunt Roris marini, ac pene folio. Propterea Theophrastus uberrimam Libanotide Ericæ nasci refert. Mel quod e flore huius, apes faciunt, Ericum uocatur, simile arenoso, siluestre, improbūq;. Conuehitur post primos autumnii imbres, cum Erica. Sola floret in siluis. Aliæ, Græciæque fruticibus ascribitur. Athenienses hanc, ut ait Plinius, Tetradicem, Eubœa Sifarum, siue ut Varro Sifaram, undeliquidum mel fiat, putantque apibus esse gratissimam. Fortassis, quia tunc nulla alia sit copia. Theophrastus, Tetralicem, non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat, in genere fruticum aculeatam, & germinantem æstate. De hac Ericæ intelligat, nec ne, haud scio. Quia tamen bis anno floret Ericæ, prima uidelicet & ultima siluestrium, nec inter acculeatas ponitur, fieri potest, ut alia sit Tetrax sua Theophrasto, alia quæ pro Ericæ Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem uocari malit. Meminit & Tetragoniam uocatæ Theophrastus, sed inter arbores quæ tardissime germinant, ut Thyia, Taxusq;. Theodorus Quadratoriâ interpretatus est, melius si Quadrangulâ. Columella Ericem intelligit, cum amaricum, siue amaricem, & amaricinos flores commemorat. Quancq; & ibi lectio corrupta in eo fertur. Nam & amaranthini, pro amaricinis, & tamaricem pro amarice, scriptum fere inuenias. Cum sit Tamarice, nō Erica, sed Myrica. Confundit hoc Palladius: qui tertiam mellationem, Tamarisci floribus (ita enim uocat ipse Tamaricem) cōstat re tradidit: cū Ericæ, idest, Amaricis ea, non Tamaricis pabulo fiat, autōre Plinio. Nisi quis Tamaricis appellatione, ueteres & Ericem, & Myricem significare uoluisset dixerit. Plinius Ericem Ilici similem descripsit. Credo Myricem, non Ilicem legendum, cum Dioscoridis auctoritate, tum quod ita modo cernitur in Patuinis montibus: non quidem folio, quod ei Roris marini simile tribuitur, sed musco, quem floris uicē habet, ut Myrica. Quod autem Ericæ uideatur etiā uocata Siderites, libro Plinij undecimo, nos eum locum in castigatione Pliniana, deprauatum ostendimus.

Pli. li. ii. ca. 16.

B

EX M. VERG. COMM.

Vitilibus plerisque. Qualis Salices, Vitex & Genistæ sunt: ueluti congenerem illis plantam libro uicesimoquarto Plinius Ericem adnumerat. Omnes Tamarici similem tradiderunt, floreque eius, qui solus extremo autumnio ab apibus inueniatur, ultimam mellis uindemiam fieri.

Theophrastus Libanotidi, quam Rosmarinū Romani dicunt, similem fecisse uidetur. Ex quibus omnibus, non fuit difficile notas has omnes diligenter obseruantibus, quæ nam ea nunc sit ostendere. Nobis inclinat animus, in Genistarum genere, siluestrem a nobis dictam Ericem hanc esse. Vidimus enim aliquando septembri & octobri mense, utriusque Genistæ flores. Non tamen quotannis, & ubiq; apud nos eo tempore florent. Quod cœli maiore beneficio alijs potest competere locis.

Ericæ in Aegypto quondam fuit, grata Iliidi arbor, quæ tempestate eicctum Osyridem excerpisset, subitoq; incremento intra se clausum operuisse. testis et autor Plutarchus libro de Iside et Osyride. Paulus Aegineta dicit discutiendi uires siue erosionē habere, foliaque & flores in usu præcipue esse.

De Acacalide. CAP. CXX.

Acalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis Myricæ anacalide quadā tenuis similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria ad-

C datur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

A C A L I N . **B** A R B A R I C O R O L L .
 Acacalın, Paulus Atallida nominat. Galenus ubi meminerit, nondum comperi. Nomē fructu, a nympha datum crediderim Acacali, quæ ab Apolline compressa, Phylacidē & Phylandrum ediderit in Creta, miraculo ab Elyæis insulæ populis conficito: nutritos a capra eos fuisse: cuius rei monumentum in Apollinis quoq; delphici delubro monstrabatur, autor Paulus sanias, Apollonius poeta, in Argonauticō, Acacalın Minois regis filiam, ab Apolline quidem uitiatam cecinit: sed quæ in Aphricam relegata, filium ediderit nomine Amphithoon, qui & Garamas quoq; uocaretur, Nasamonis & Caphauri pater, ex nympha Trionide.

R H A M N U M . **C** A P . C X X I .
 Hamnum alij Persephonion uocant, alij Leucacantham, Romani Spinam albam, aut Cerualem, Aphri Atadim. Rhamnus fruticatus in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modū, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertiū nigrioribus, latioribusque folijs constat, & quadam tenus rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusque. Fructum ædit latum, candidum, tenuem ueluti folliculum, Hastulæ regię similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Fama est, ramos huius ualuis, fenestrisue impositos, ueneficia depellere.

D E **B** A R B A R I C O R O L L .
 Plin. li. 24. cap. 14.
 Theoph. lib. 8. cap. 17.
 Rhamnum, ignarijs utilem ferunt, præsertim conceptaculo et craticulæ. In duo genera diuiditur, nigrum, & candidum. Virg; fructus parentum colore. Nigrum folliculos fert, siluestreque habetur. Huius radice decocta in aqua, fit medicamentū, quod uocatur Lycium. Rhānos inter Ruborum genera describitur. Hæc Theophrastum Pliniumque secuti, diximus. Aliter a Dioscoride monstratur. Photion Rhamnum, a quibusdam Agnon, a uirtutis similitudine uocatam scribit, quæ uenerem corceat, ut Vitex. Rhamnum Dioscorides, a nostris Spinam, ceruale dicit appellari. Quo argumento uideri potest, haud dissimile huic genus esse quod hodie uulgo Spinam ceruinam uocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id uel ad colorem eum pingentibus idoneo. Cortex arbori subniger, & nitidus, quasi Ceraso, intus uires, post luteus, lignum extra candidum, interior medulla rubet.

E X M . V E R G . C O M M .

Spinam antiquiores græci Rhamnum, posteriores alterius spinæ nomine, ob candoris similitudinem, Leucacantham, Romani modo hac, modo illa appellatione indicauerunt, quæ alteri us erant, alteri etiam tribuentes. Quod Plinius, ut nobis uideatur, fecit: qui amuletum contra ueneficia Rhamno fuit a græcis adsignatum, Aquifoliæ spinosæ pariter arbori adsignauit, libro suæ historiæ. 24. testatus, Aquifoliam arborem in domo, aut uilla satam, ueneficia arcere. Nisi forte eadem uis Aquifoliæ quondam inesse etiam credita fuerit. Naso certo in Fastis suis, græcam fidem secutus, spinam albam Rhamnum dixit, ex re ipsa, & altera in græcis Rubi huius appellatione rem ostendens. Locus non longe à principio sexti libri est.

H A L I M U M . **C** A P . C X X I I .
 Halimum alij Damasonium uocant, alij Erymon, alij Brettanicam, alij Rhabdion, alij Basilion, Magi Mercurij basim, aut Osyridis diadema, alij Elystephanon, aut sacrum caulē, Pythagoras Anthenoron, Aegyptij Afontiri, alij Asphen, alij Asealuri, alij Asariphen, Latini Albutium, aut Ampeluciam. Halimū frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, folijs Oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-

uulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota. A
Eadem lactis ubertatem facit.

BARBARI COROLL.

Halimon, nostri, ut ait Plinius, Aureonem uocāt, Conuoluit se ut Hedera. Locis falsis nascitur, falsilagineq; præfert. Sic hæc, de qua Dioscorides, & Plinius, a quibusdam Asphodelon, siue Albucum existimatum perhibent, an alia, mihi parum constat. Reperio autem in autoribus, modo asilata, modo nude scriptam primam literam. Placet aspiratio, quoniam maritimum olus credatur, & Almytis etiam a falsilagine dicatur ab Aetio. Asphodelon appellari Halimon ab Hesiodo, quidam falso interpretantur: qui tamen error a græcis ortus, peruenit & ad latinos. De Halimo discrepant sententiæ. Alij fruticem esse uolunt, densum, candidū, sine spina, folijs Oleæ mollioribus, latoribus, quæ cibo coquantur. Addunt in maritimis natum. Alij separant, maritimum olus dicentes Halimon, & falsum: unde nomen folijs, in rotunditate longis, quod & mandatur, condiaturq;. Duorum prætereæ generum, siluestre, & mitius. Folium siluestri tenuius, maioris effectus. Crateias tertium genus facit, longioribus folijs, & pilosioribus, odore Cupressi, nascens sub Hedera. Galenus Halimum in Cilicia prouenire copiosam, ibique folia recentis in cibos recipi, & in usum condita seruari, scribit. Solinus Alimon in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu: quod aduersa ea, fames interdum nulla sentiat, ut nomen inde impostum ei sit, quasi famem arceat, proptereaq; nec aspirationem prima litera recipiat.

Pli. li. 22. ca. 22

EX M. VERG. COMM.

Nasci maritimis locis Halimū, quem Plinius Aureonem nominat, hic ipse testatur. Salso autem sapore esse, & inter olera quondam in usu fuisse, præter Dioscoridem idem Plinius indicauit, falsum olus a quibusdam dici affirmans, & Plinio, Dioscoridique subscribens Paulus Aegineta libro primo. Theophrastus libro quarto de historia, & libro quinto de caussis, enecandi ppinquas, & adnatas plantas uim illi adsignauit; quales multæ in natura sunt, quæ sub tracto alimento, alias perimant arbores. quales Hedera, & Cytisus est.

B

Fecit in sanitatis usu, & medicina Halimi quondam usus, ut in multo ambitu nominum et appellationū, antiquis græcis fuerit hæc planta; quæ omnes appellationes, aut supersitiosæ, aut ab illis excogitatæ sunt, aut a similibus factæ.

Credimus nos (quod Plinius, 22. ait) existimasse quosdam Asphodelon ab Hesiodo Halimon uocari; ideo factum esse, quod in sepibus nasceretur: et Hesiodus in cibis etiam Asphodelum laudauerit, cum ait, nescire iniuste ageres, quanta in Asphodelo & Malua utilitas sit. Qua opinione semel illata, facile factum est, ut Halimus non aliter, q̃ Asphodelus Albucus diceretur. Albucum enim, si Plinius credimus, antiqui Asphodeli radicem dixerunt.

Quod deinde passim & in cunctis Ampeluciā dici etiam Halimon, ab alba uite, quam græci in sepibus nascentem uitem albam nominant, factum fuisse credimus. Quæ tamen omnia coniecturam, non decreta uolumus esse.

DE PALIVRO. CAP. CXXIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos comminuit. Serpentiū ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam uim habent. Quorum decoctum potu aluum sistit. Urinam trahit. Contra uenena & serpentiū morsus auxiliatur. Radix recentia tumorecula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

παλιούρος

BARBARI COROLL.

Paliurus, ut in fruticum genere collocetur, in magnitudinem arboris assurgit. Ab occasu uergiliarum fructificat. Fert in siliquis terna & quaterna semina, lentorem quandam pinguem emittentia, ut lini semen confusa. Amat nasci aridis, quemadmodum & Rubi, nec minus dilutis. Folium excidium sicut Rhamno. Cyrenis laudatissima; ubi Loro quoq; præferunt, eodem folio, sed fructu diuerso, ut qui non latus, sed rotundus, ruberq; sit nucleo, qui non simul mādatur, ut in Punicis. Magnitudo ei quæ fructibus Cedri, pauloue amplior. Nominatur ab Afris Zura, iocundus per se, atq; suauior etiam uino affusus; contra quoq; uina succo suo com-

Pli. li. 24. ca. 14
Theoph. li. 3. cap. 17.
& lib. 4. ca. 4.

Conmendans, Paliurus, spinosa ramis, ut Rubus. Agathocles Paliurum ab Alexandrinis Connarum uocari tradit, enatam scribens isto fulmine sepulchro. Vlmi atq; Pinus amplitudine, ramis frequentibus, prælongis, subaculeatis. Folio uiridi, rotundo, molli, Biseram. Nam & uere & autumnno fructum parit Oliuæ, Phauliæ uocatæ magnitudine: cui & nucleo & carne similibus est, sapore uincens. Crudus uirensq; manditur. Vbi exoleuit, farinam ex eo fieri, atq; ita estari, nec subactam, nec conspersam aqua. Ichthyophagi, piscium carnes semine Paliuri conditas inueterant. Troglodytæ, succo Paliuri pro uino utuntur uulgo. Nam proceres florem quandam expriment, cuius liquor nostrati Musto similis aspiditur.

E X M. V E R G. C O M M.

Paliuro nulla certa est nota, propter multiplicem eius crescentiam. Nam in aliquibus locis arborefcit, in aliquibus fruticis naturam non excedit. Ideo diuersa eius historia legitur. Numeralessem et ego aliquas eius notas, nisi copiose ab alijs de eo collecta et tradita omnia fuissent. Illud tantum adijcimus, nostratam Paliurum, non ideo dissimilem Canis sentibus esse, quos greci Cynosbatos dicunt, cognataq; et ueluti congeneres plantas esse Rhamnum, Paliurum, Oxycanthum, & Canis sentem: ideoq; a Dioscoride deinceps tractatas, aculeatas omnes & munientis sepius aptas, & ob id tantum priuatim descriptas. quoniam proprie singularium notæ aliquæ essent: quod in Oxycantho mox etiam dicemus.

De Acuta spina. C A P. CXXIII.

δξ υάκκινθα
· πύρινθ
πύρινθιν

Acuta spina, quam Pyrinam, aut Pityanthen aliqui uocant, arbor est Piraistro similis, spinosa, & minor. Baccas profert Myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum. Radicem multifidam, alte descendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam sceminarum sistunt. Radix illita, aculeos & spicula extrahit. Abortum fieri tradunt, si ter radice uenter, aut sensim feriatur, aut perungatur.

D B A R B A R I C O R O L L.

De spinarū ge
neribus plura
Theophrast.
lib. 4. cap. 3.

OXycāthos quæ sit, in Plinio non comperi. Medicinas certe, quas Dioscorides ei tribuit, Paliuro Plinius dicit. Dicitur hæc et Oxycantha, Olympo mōte plurima, siluestrium arborum, frondis æternæ, ab occasu uergiliarum, fructifera, flore coronario, fructu Cedri atq; Myrti. Rura modo hanc Crispinam, quasi acrem spinam uocant, ut multis placet: ex cuius acinis uinum etiam conficitur, Crispinum uocatum, eodem fere usu quo uinum ex malo Punico. Singulares in acinis quibusq; nuclei sunt. Acini oblongi, & racemosi, congesti, folia quoq; oblonga. Diuersum genus est quod uuam fert, Crispinam uulgo dictam, ueteribus præterita, acinis candidis, & in maturitate dulcibus, aculeato frutice, folio apñ fere, in hortis frequens. Habetur & alter frutex, æque spinis horridus, sed topiarius magis, & uitis pusillæ, folio rubentis uuæ fertilis: nec in Italia modo, sed in Germania quoq; mihi uisus.

E X M. V E R G. C O M M.

Facilis cognita & inuentu Oxycantha hæc, tunc certæ eius notæ sunt, & tam multis locis nascitur. Ab agrestu Piro diminuta appellatione rura uostrā eam uocant. Florem fert muscosum, & post florem racemosum fructum, nō dissimilem Ligustro. Non fuit latinis cura, quod hæcenus inuenerim, illi nomen dare, nec Plinius, quod meminerim, sub hac uoce eius meminisse. Græci a spinarum acuminatis cuspidibus, Oxycantham dixerunt: meminisse quoque eius pluribus locis Theophrastus, aculeatis spinis infestam, & post uergiliarum occasum, hyeme fructus suos maturantem.

Quæ mox adiectæ illi sunt appellationes Pyrine, & Pyrianthe, a græca, aut a latina appellatione fieri potuerunt. Si a latina, a Piro id erit: ut quemadmodum nos Pirastrum agrestem Pirum dicimus aliquando, sic græci etiam latinam uocem more suo diminuentes, πύρινν dixerint. Si a græca, tunc a nucleis, quos plures intra se fructus claudit, nominis ratio erit. In Pomis enim græci πυρῖνος dixerunt nucleos omnes, quibus exterior et ambiens caro subsistit: ut in Cerasis, & Prunis.

Quod legebatur deinde in impresso, pluribusq; alijs, ἡ δὲ δεικνύσθαι ἔμα, ex melioribus mutuatum a nobis est, in δεικνύσθαι ἔμα. Neq; ab re, quando hic ait, agresti Piro similem Oxycantham, minorem tantum & spinosior.

Quo loco etiam in græcis legitur, *Αἰθέραις ἰσχυρὸν καὶ ποῦν γυναικῶν*, in aliquibus, non tamen melioribus hoc amplius inueniebatur, *ὅπου τὴν ἄγαν καὶ θανάσιμον καὶ θυμωδινὰν συντί*, idest, uirum etiam trahit, uenenisq; & uenenatorum moribus succurrit: ea nos facile negleximus, ad stringendi uires Oxyacanthum habere inuenientes. Et quod Paulus ægînetæ agrestis similem, si gura & uiribus exequatur, quàm nihil eorum posse, neq; hic testati sunt.

A

¶ De Rubo canis. CAP. CXXV.

Rutex est arboris instar, Rubo longe maior. Folia fert multo latiora Myrto. firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo Oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit. Feruefacti enim ij in uino, mox poti, arteriam infestant.

κνύρβατος

B A R B A R I C O R O L L.

Cynosbatus, Caninus uulgo rubus. A Théodoro, Canirubus. Colúmella Sêtem canis. fructu malo granato simili, subrubido, media inter arborē, fruticemq; natura, & proxima Punice. Folium Salicis amerinæ, Theophrasto Agni. Quancq; legendum puto in *ij. vii.*, hoc est, ut uestigio humano simile dicatur, q; Plinius ita uertit. Et sane uisam a se Rubum, quidam testantur, in siluis, hac specie, ut quasi solea esse uideretur. Flatu auerso fructum huius legedum precipiunt, alioquin periclitantur oculi. Plinius hanc ab alijs Cynosbaston, ab alijs Neurospastum uocari scribit. Vnam fert nigram: in cuius acino neruus sit; unde Neruus passus, dicat. Idem sit hoc, nec ne cum eo quod Dioscorides, itemq; Theophrastus deliniant, considerandū peritoribus existimo. Rubus certe, qui similitudinem Rosæ fert, et Castanæ similem pilulam, Cynosbatus a Plinio dicta est. Alia uidetur esse Cynorhodon, de qua diximus inter Rosas. Nec illud constat, nunquid Rubi huius sit Rosa, quæ Coroneola uocatur, maunus autumnī, odore iucundo, sed exili, an potius Cynorhodi appellata. Nec illud omittere constitui, Cynorhodon a Cynosbato, non flore roseo, quem fert utrumq; sed spongiolis distingui, quas Cynorhodon habent, Cynosbatus non habent. Parit & tuam nigram Cynosbatus, ut prædiximus ex Plinij sententia. Quod quidem nemo, præter eum (q; sciam) confirmat. Hoc si error est, fortasse natus inde sit, quoniam Hedera Cilicia, hoc est, Similax aspera, Labruscæ modo ferēs uuas, Cynosbatus a quibusdam uocari soleat, ut Dioscorides testatur.

Pli. li. 13. ca. 23.
Theoph lib. 3.
ca. 17. & 18.

*

*

B

E X M. V E R G. C O M M.

Satis docuit Columella libro duodecimo. qualis Cynosbatus hic esset uastissimis spinis, Paluro, Rubisque eam coniungens, cum in conferenda sepe præciperet, semina uastissimarum spinarum solo credenda esse: cuius generis etiam sunt Cynosbati, quos sua ætas Sentem canis appellauit.

Idem Cynorhoda, idest, Canis rosa quondam dictus est. quoniam flos eius roseus sit, & rabidi canis moribus medeatur, si Plinio credimus, quod sua ætate admonente Deo inuentum sit. Rura nostra passim eum nouerūt, maximum inter Rubos omnes, & qualem in cunctis hic descripsit.

¶ De Ligustro. CAP. CXXVI.

Ligustrum arbor est Oliuæ, folijs circum ramos latioribus, mollioribus, & uirentioribus. Flore candido, muscoso, odorato, semine Sambuci, nigro. Optimū nascitur in Canope et Ascalone. Folia astrictionem uim habent. Quare commanducata ulceribus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; prosunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant trita folia, quæ in radiculae succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinū oleum, quod ex eo fit, excalfacit, emollitque neruos: quoniam mista quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

λίγιστρον

B A R B A R I C O R O L L.

CYprum, quidam, ut Plinius inquit, esse dicunt arborē, quæ in Italia Ligustrū uocat, semina

i ij.

Cne Coriandri, folio Ziziphi. Prefetur Canopica, post Ascalonica, ultimus locus Cypriæ. Seruius grammaticus, Ligustrum florem scribit esse candidissimum, ac uilissimū. Fortasse hunc intelligens, qui e Conuoluulo herba nascitur, nam & hic barbæ, ac uulgo dicitur Ligustrū, ut in Clematide secūda monui, Cyprus & Hemicyprus, uasis & mensuræ genus est, coquis, ut placet Iulio Polluci, cognitum.

E X M. V E R G. C O M M.

Quos Maro cecinit, a pastoribus negligi, & inuulter perire Ligustri flores, medicinæ, & unguentariorum officij libenter exceperūt: quanq̃ tamen nostra ætate, nulla eius, aut exigua ratio est, cum alioqui uulgaris, & ubiq̃ paratus frutex hic sit. Notum omnibus Ligustrum. Cisalpina Gallia omnis adhuc sic uocat. Æthiuria autē corrupta, deflexaq̃ penitus ab antiqua appellatione Ruuisticum dicit, sine labore cognoscendum in sepibus maio mense, cum floret, autumno autem, cū maturis baccis nigrescit. Paulus Aegineta, ultra ea quæ a Plinio tradūtur, dicit etiam lieni plurimum conferre.

D E T I L I A. C A P. C X X V I I.

Plin. lib. 18. 28.

Tilia arbor est Ligustri magnitudine. Folijs Oleæ, nigrioribus & latioribus. Fructu Lentisci, nigro, subdulci, racematim cohærente. Asperis nascitur. Huius folia astringunt. Ad eadem utilia ad quæ Oleaster, cum astringitione est opus; maxime ad infantium ulcera in ore, comamanducata, aut si decocto colluantur. Pota urinam ac menses cient.

B A R B A R I C O R O L L.

lib. 16. ca. 14.
lib. 21. cap. 8.
Theoph. li. 3.
cap. 4.

Tiliam, græci Phelyream, nostri quoq̃ Phelyream, & Philyram. Sed tunicas ex ea tenuissimas appellant. coronarum lemniscis celebres ueteribus, inter corticem & lignum membra-na multiplici contentas, e quibus uincula Tiliæ uocantur. Materies mari fenticosa, dura, nodo-sa, rufior & odorator. Cortex crassior, ac detractus statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Crassior fœminæ arbor, & materies candida est, atq̃ præcellens, e qua Tilia, Philyræq̃ uirtutes; quas diximus. Arbor hæc serotina, folijs dulcibus, esculentisq̃ pecori, sed fructu animalibus omnibus ingustabil'. Teredinem non sentit, præcitate perq̃ modica, uerum utilis, & operibus in testinis uel obedientissimar; etiam si Abies, ut Theophrastus inquit, pulcherrima delenditur. E cortice, fœminarum & cunæ fiunt, atq̃ cistæ, nauium longarum asseres, & arculæ, mensurarumq̃ nonnulla genera e ligno. Probatur & igniarijs. Medulla exigua est, nec magnopere cætero corpore mollior. Est enim materia eius tota mollis, ut inter carnosas mollissima, calidissimaq̃ dicatur. quoniam ciuissime retundat ascias, tincturam earum, caloris sui ui resoluens. Cæditur autumno. Cinesias poeta flagitiosissimus, in quem Lysia oratoris plena conuictorū & stomachi legitur oratio, tam gracilis fuisse dicitur, ut Tinaeis asseribus corpori circūdatis, imbecillitatem suam fulciret, ut Philetas alter poeta, plumbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne uento subuerteret. Theophrastus quādoq̃ nominat & Philycam. Siluestris, inq̃t, arbor est Philyca, fronde perpetua, Olympo monte, fructum suum ab occasu uergiliarū edit. Celsastri modo cādida. Theodorus Philycam hanc a Tilia, siue Philyra differre censuit. Vtranq̃ tamen & candidam, & alendo pecori uilem demonstratam. Legebat & serotinā. Celsæst porro siluestris arbor perpetuo uiuens. Fructum sero perficit, atq̃ hyemis superuentu perdit, ut quidam putāt. Cacuminibus montium gelidissimis nascitur: cura deterior efficitur. Vfus ad baculos senibus. Plinius odoratiorem Tiliæ mari corticem q̃ fœminæ, Theophrastus contra, fœminæ quā mari tribuit. Flos calicula ceus, pediculo quisq̃ suo annexus, uiridi, q̃diu Alabastro includitur. Dehiscentes ñ flauescunt. Flores pariter cū mītibus & urbanis. Fructus oblongus, & ad fæbæ magnitudinem rotundus, similis acino Hederæ, maiusculus, angulis quinis, ceu nervis quibusdam in acutum depresso extuberat. Partitionem hanc exiliior indigēsta: & omnino confusio rem habet, maior si scabitur. Semina emitit pusilla & prætenuia, ut uideri possint Atriplicis. Foliūm Hederæ, nisi q̃ se in acutiorem angulum rotundat, incuruum. Quæ pediculo innæditur e medio sui prodit in acumen, crispum per orbem molliter ac ferratum. Laurentius Valla in Herodoto, conuertit Tiliam falso, q̃ autor ille Iteam uocauit, quæ Salix est, non Tilia.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ in Corollario Barbari Tiliæ adiiciuntur, ex Plinio, Theophrastoq̃ ñsdem uerbis

exscripta, nihil præter compendium laboris habent, multa sane, sed tam noua, & affectata elocutione a græcis uersa, ut græcarum literarum imperiti non facile intelligant, quid sibi tinetur ferri eo loco sit: quasi Plinius, quem ille tantum amauit, ut totum iterum in Corollario suo exscripserit, non temperaturam ut celaturam dixerit, & quia græci *βασίς* dicant, ideo tinetur dicere nos oporteat, plurisq; faciendum sit quomodo aliquid fiat, quâ quod & quale fuerit factum dixisse. Illud ego magis ostendi operosum, sit ne nostrati Tiliæ, antiqua illa eadem. Dico autem nostratam, quæ in Æthiopia nunc ab omnibus Tilia nominatur, ex qua secandis coriis eius paratam ubiq; tabulam habent, in nullam partem rectis pectinibus, sed quacuncq; parte ferramentum agatur, sequacem & cedetem. Ideoq; Tiliam, ut credimus, dictam, q; quæ proprie quondam Tilia dicebatur, per longitudinē rectis pectinibus, tractabilis & fissilis sit, & ob id, ut inquit Theophrastus, texendis cistis & corbibus idonea. Plura Theophrastus lib. 3.

DE CISTO. CAP. GXXVIII

Cistus, quem aliqui Citharon, aut Cissaron uocāt, ramulos frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens. Folij rotundis, acerbis, hirsutis. Flos masculo ut mali punici, fœminæ albet. Vis asstringens. Vnde flores in uino austero bis in die poti, prosunt dysenteriacis. Et nomas illiti cohibent. Vetus tati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur.

BARBARI COROLL.

Cistos, & Cissaros, a Cisso differt, q; Cissus Hædera tantum est, Cistos sui generis frutex. Quæ uicinitas, nisi quis aduerterat, facile confunderet intellectum. Describitur maior Thymo, folijs Ocimi. Et sane inter Hæderas mentio eius a Plinio habita est. Præterea Hæderæ speciem uidentur auctores existimasse, qui Ladanum capris depecti tradant: quæ florem Hæderæ pauerrint: cum conser ex Dioscoride fruticem, unde id fiat, Ciston uocari, speciem alteram Cisti huius, de quo nunc agimus, ut in cōmentationē post Hypocistidem proxima explicabitur.

EX M. VERG. COMM.

Certarūt olim doctis, uiri Nicolaus Leoniceus, & Herm. Barb. de Cisso, qd tādē esset. Verū extat de ea re inscriptū de erroribus medicorū opusculū, unde nos plura dicere omittimus.

Quod uero in textu legitur, sed in fœminino, colore cādido, hoc membrum sequaci sermo nis serie certo carebit sensu. Nisi intelligatur, Ciston diuississe antea Dioscoridem in marem & fœminam, mariq; alium, fœminæ uero aliū adsignasse floris colorem, desyderariq; in omnibus græcis, totam eā diuisionē, cuius ultima tantū pars seruata sit, quod iam necessario, ex his quæ sequuntur, constituendum legentibus est: ut tantū non ego eam restituerim diuisionem, præsertim indicāte Plinio lib. 24. cap. 10. Cuius hæc uerba sunt. Ciston appellāt fruticem maiorē Thymo, folijs. Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosaceus, fœminæ albet. Quasi ex hoc scriptore uerterit, *ἐν τῷ θύμῳ λευκά*, quod debuerant alij interpretes, hiatū saltem aliquo illic relicto legentibus indicare, ne credētes integrū esse locū, inutiliter in eo laborarent.

DE Hypocistide. CAP. CXXIX.

Hypocistis Robethron, aut Cytinus a nonnullis cognominata, iuxta Cisti radices nascitur, floris Punici similitudine. Quædam flaua. Altera uirens. Tertia candida. Liquatur Acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio prosequuntur. Vires Acaciæ habet. Verum aliquanto magis siccāt, & asstringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Fœminarum profluuij & pota & indita.

BARBARI COROLL.

Hypocistis, & Hypocisto, triplex huius ratio a Dioscoride proditur. Alij ruffa & candida sunt contenti, ut Plinius. In montibus Patauinis Hypocistin uidere licet, et Ciston, sub qua nascitur Ocimi folio, ut prædiximus. Flore candido quasi Rosæ siluestris. Radice lignosa & prædura: cuius fere medio Hypocistis uelut infixæ pullulat.

κίσσον
κίσσaron
κίσσaron

Plin. lib. 24. ca
pire. 10.

11

B

ὑποκίστις
ὑποκίστον
κύνισος

C Quid Cisto adnascitur Cyrtinos, aut ueluti Cyrtinos, Paulus ægineta appellauit, Hypocistidem uero ex his expressum succum. Hic contra Hypocistidem, quod adnascitur, et Cyrtinos etiam uocari dixit. Hic naturam rem, ille humano opere ex eadem expressum in medicina usum remedium appellans: non multifacienda diuersitate, si quis utriusque consilium et propositum diligentius animaduertat. Quid autem græcis, & in natura Cyrtini sint, in Punica certius cognoscetur.

Non prætereundum & hoc, quod dicit hic eius genera esse, rufum, uiride, & candidum, Plinius uero rufum, & candidum colorem illi tantum tribuit. Quo fit, ut aut in alijs uiridis ille color desit, aut in hoc abüderet: & quam Oröbethrum hic ait appellari, nescimus nos, an corrupta uox sit, & Erythranum, ut in Plinio legitur, uocari eam oporteat.

E De LADANO. CAP. CXXX
St & alterum Cisti genus, Ledö a nonnullis appellatum, frutex si-
mili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ uerno
tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atque
effectus Cisti præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur. Siquidem cum
Cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspiciue bar-
ba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentem reportant: quæ
depeccantes incolæ, colantesque, cogunt in ossas, & ita recondunt. Alij
uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, con-
glomerantque in Ladanum. Maxime probatur odoratum, sub uiride, fa-
cile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore oblitum
est, resinosum: quale in Cypro gignit, Arabicum uero, Lybicumque uili-
us. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi. Laxat ora uenarum. Ca-
pillum fluenter continet, addito uino myrrha, aut myrteo oleo. Cica-
tricibus decorem reddit cum uino illitum. Medetur aurium doloribus
cum hydromelite, aut rosaceo infusum. Suffitu secundas eijcit. Pessis in-
mistum, uulnæ duriciem sanat. In medicamenta quæ dolorem tussimque
finiunt et malagmata utiliter inseritur. Aluum sistit cum uino uetere po-
tum. Et urinam ciet.

C Isthos, siue Ledon, & Lada, sed Ladanum in Arabia Nabathæis tantum nascitur, qui fun-
ter contermini Syriæ. Iniuria illa qua diximus caprarum: sed non e Lada herba, uerum ex omni
silua. Hoc genus Strobon uocari placuit. Est & genus aliud in Syriâ & Africa, Toxicon dictum:
quia neruos in arcu lana circumdatos trahunt per siluas, adhærescentem rosida lanugine. Sed ue-
rum Ladanum Cypri in insula sit, quod Celyphum, hircorum in pascendo genibus atque bar-
bis hæsit, hæderæ, ut Plinius inquit, flore derafo, pastibus matutinis cum est rorulæta Cyprus,
siue funibus tractis, quo dictum est modo. Non omittendum, Hæderam quidem putari Cif-
thon a Plinio, de cuius flore colligatur Ladanum. Non quod Cisthos aliud non sit quæ Hædera, quæ
Cissos a græcis appellata, sed quod species eius una etiam sit, a nostrate multum diuersa. Quan-
doquidem & Paulus Aegineta scribit Ladanum ex Hædera Ladone cognominata fieri. Et Dio-
scorides Cisthon a quibusdam, Cissaron quoque dici tradit: quasi Hederaculâ interpreteris,
aut Hederaginê. In Carmania & super Aegyptum fruticem esse narrant, per Ptolomeos trans-
latis plâtis, ex quâ Ladanum fiat. Sunt qui Ladanum gumi modo ex arbore laxati corticis uulnere, ut
Tura colligi, & caprinis pellib. excipi commemorent. Adulterant Myrrin Baccis, & animalium sordi-
bus. Sinceri odor debet esse ferus, & solitudinem redolens, ipsum accessum fulgere, odoremque iucun-
dum reddere. Myrrata in igne crepitant. Placet, cui e rupibus calculi potius, quæ pulvis inheret.
Precia laudatissimo in libras, asses, 40. Aetius Cisthon, e qua Ladanum sit, eandem esse cum Ci-
stho nostrate, sub qua Hypocisthis nascitur, affirmat: sed calidioris nature, ob qualitatē soli.

Toram colligendi Ladani historiam, omnesq; eius in medicina vires, breuissime complexus est Paulus Aegineta, testatus ex Cistho Cyprio frutice fieri, quem Ladona dicit, quem capræ pascentes, barbis femoribusque suis, quod pingue & lentiori simile in eo est, secum auferunt, idq; collectum Ladanum esse.

Neq; ut in Corollario suo Barbarus retulit, ex Hedera Ladone Ladanum fieri dixit, sed ex Cistho Cyprio frutice, qui Ladon uocetur. Verba eius libro sexto hæc sunt, *ἡ δὲ λαδὼν ἀπὸ τοῦ κισθοῦ κυπρίου γίνεται ὑπὸ τῶν καπρῶν*. Quod nescio ego, an Plinio fauēs, sic uertere magis ille a-mauerit, an quæ Plinium Hederam & Cisthum simul miscere coegerat uocum similitudo in eo, quoniam ille Aeginetam forte habuit, pro Cistho Cisson fecerit. Lubrico ab altera in alteram uocem lapsu, præsertim in imperiis & parum diligentibus librarijs, qui incognitam, neq; ubiq; nascentem Cisthum, una tantum mutata litera ad Hederam transfulerint, quæ Cisson greci passim dicunt. Nec esse Cisthon Hederam notæ, omnisque eius historia satis ostendunt. Cypriamq; hanc a priore illa diuersam Dioscorides descripsit foliorum longitudine, nigredine, & pingui lentore: quoniam folia eius priuatim sibi inhærent, ad Ladani confirmationem per uer ostendant. Fecitq; coloris nigredo, quæ folijs huius a Dioscoride tribuitur, ut in priore illa, quod erat *σπυρνά μελανα* dixerimus, testantibus id aliquot ex antiquioribus grecis, in quibus *μελανα*, i. nigra, non *σπυρνά*, i. acerbis saporis adhuc legitur. Et quod hic ait, in altera hac Cistho, longiora, & nigriora folia esse: quam comparandi uim & rationem si quis diligentius animaduertit, facile intelliget, cõgenera esse oportere, quæ inuicem cõparant nigro colore folia esse.

Addidimus præterea, mellis modo per colum liquant. Sic in antiquioribus grecis legētes, *ἢν ἀραιωθῇτις ὁς μελιδουλίονος*, non ob aliam ut nos credimus causam, nisi ut qui caprarum & hircorum pili in Ladano erant fecernerentur.

Quomodo autem per se Saligneum qualum castratis alueis liquetur, purgeturq; mel, undecimo libro satis Columella ostendit, & ab eo liquandi purgandiq; Ladani similis ratio potest cognosci. Quam deinde adstringendi uim, Ladano Dioscorides tribuit, Paulus Aegineta ad capilli defluuia tantum contrahit.

De Hebeno.

CAP. CXXXI.

Hebenus optima habetur Ethiopica, & nigra, nullo habens uer-
narum discursus, factitij Cornus leuitate. Cum frangitur, defusa ap-
parêt, mordens gustu, atque astringens. Sufficit iucundo odore supra car-
bones sine fumi tedio. Recens autem ad ignem prolata ob pinguitudi-
nem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica internatis se-
gmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. Cæ-
terum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea li-
gna Hebeni uice ueneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt,
& in purpureas affulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec re-
dolentia in suffitu præferentia. Caliginem oculorum abstergit. Ad uete-
res distillationes, pustulasque mirum in modum pollet. Si quisquam fa-
cta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medi-
camenta efficax est, si scobes, ramentaue uino Chio die noctuque mace-
rata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ramenta excolant, reli-
quaue eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vri-
tur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo,
& ita siccis lippitudinibus conducit.

BARBARI

COROLL.

Ebenus, siue Ebum, spissitudine ligni & pondere, in aqua non innatat, sed mergitur tan-
tum, non tota ut Buxus, cui similis esse dicit, sed pars eius medullacea. Decorticato summani

C gricies. Ebenus cœsa durefcit in lapidē, ut iam uideat hodie quoq; partū saxū, partū lignū, ceu inchoato opere, non perfectio. Duo genera eius. Rarū id, quod melius, arboreum, trunco eno di. Alterum fruticosum, Cytisi modo, tota India disperfum, Ebenus Ethiopica, nō alia, q̃ Palmarum generis esse traditur. Lignū Ebeni, Galenus, si quis aqua infusa terat, in succū inquit re soluitur, ut nonnulli quoq; lapides. Magnus Pompeius in triūphum Mithridatico bello duxit Ebenum. Pausanias a Cyprio quodam medico accepisse tradit, Ebenū radicem tantum esse ter ra conditam, nec folia, nec fructus ullos edere, propterea nec omnibus inuentu facilem, sed in Ethiopia quosdam esse huius operis artifices, hoc est, Ebeni scrutandi gnaros.

M E X M A R. V E R G. C O M M.
M Aro Indiam tantum ferre eā arborē cecinit. Vnus Pausanias in Atticis nec folia, nec fructus ferre prodidit, neq; a sole conspici, sed sub terra tantum radices esse, quas fodiant Ethiopes, sintq; in ea gente eruscandæ Ebeni peritissimi aliqui.

Hanc Theophrastus, arborem cortice Buxo similem testatus est, decorticatā deinde nigro colore fieri.

Interim legentes monemus, suspicari nos, nec leui argumento in cunctis græcis uitū illic, ubi nos uertimus, pro Ebno uendi a quibusdam, Spinæ Indicæ, & mori materiam. Quo loco, Spinæ Indicæ addidimus, & pro Sesamino ligno, mori mutauimus. Sping enim nihil ad iectum legebatur, nec legentibus licebat ex tam multis spinis, quæ diuersæ toto orbe nascunt, quam hic diceret intelligere. Idq; autore Plinio fecimus lib. 11. dicente ibi, Et Spinæ similis est, sed deprehensa uel lucemis igne protinus transiliente, quod uera Ebno fieri hic apte testat.

Præterea quod erat, *ενοςδμιννα*, a Sesamo in frugum genera adiectiuo nomine *ενοςδμιννα* legendum esse arbitraui, mori materiam uertimus. Quid enī frugi simile cū arbore aut qd potest Sesamum lignū in telligi? Fuit autē facilis in tanta uocū similitudine ab altera in alterum lapsus.

R Osa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recenti bus folijs exprimitur, defectis forfice unguibus, sic appellantur **D** cādida foliorum partes, reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumfliciones recondi. Siccantur eti amnum folia Rosarum, continuo uersata, ne muceant, ueue situs in ijs in sideas, Aridis Rosis & in uino decoctis, expressus liquor, faciat ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulua, pina illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflam mationibus, humidis stomachi uitijs, igni sacro illini prodest. Siccis ac tri tis femina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atq; compositionibus quas Antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in medijs Rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergiuntur. Capita pota citam aluū, & cruentas reiectiones sistunt.

R E A R B A R I C O R O L L.
Rosam, græci Rhodon, & Poetæ Brhodon, sed plantam eius Rhodoniam, ut nos Rosariū appellant. Est & condimentū preciosi genus Rhodonia, quam & Rhoduniam Patellam uocat, ex cerebellis aurii & porcorū, in multa Rosa coctis, infuso garo, oleo, uino, pipere, ouorum luteis. Differt a Patella Rhodonia, quæ Rhodiaca olla dicitur. Figline genus hoc. Permixtis, ut inquit Aristot. myrha, iuncti flore, croco, balsamo, cinamomo, amomo, coquit ad arcendam ebrietatem, si excallactis ijs uinum infundatur. Origo huius e Copto prima, ut inquit Athenæus: unde Coptica fidelia. Sed redeo ad propositum. Rosam, Timachidas, qui de cœnis scripsit, in Arcadia Eumphalon, ab odoris præstantia uocari tradidit. Ergo Rosam aculeatam ramos nemo ignorat. Folia interna, quæ admodum exigua sunt. Item ex maioribus, externa minus odorata. Inter amplas odore præstant, quibus imapars scabra & corticia est. Vtra re cisa, translata sit melior. Siluestres ex toto asperiores, odore, colore, magnitudine superantur, Rosa ut nouissima erumpit inter omnes flores, ita prima desinit. Satiua excepta. Rose uira

Plin. li. 11. ca-
pite. 4.
Theophr. lib.
6. cap. 6. & 7.

uita quinquenniū, non incisæ, nec aduſte. Illo enim modo iuuenefcit. Flos ſenſcētis deterior. Capita foliorum eius, partēq; candide, Vngues uocant. In flore aliud Semē, aliud Capillus. In capite, aliud Cortex, aliud Calix. Coronas e Roſa, quæ paſtilibus & ſutilibus ſuccellerūt, Roſalia dixere ueteres. Nec erat iſis gratia, niſi folio ſolo nexis. Recens a longinquo olet. Sicca propius. Serenis diebus læta odorator. Iſe ſiccis, ruderatis, gracilibus. Omnis Roſa germinat granoſo primū incluſa cortice; quo mox intumeſcēte, & in uirides alabaſtros figurato, ſenſim adrubefcit & panditur. In medio calicis lutea ſtamina, ſub quibus ſemen inſidet. quæ proprie flores dicuntur. Deſitum eſt ſeri ſemine, cum alioquin pſilit. quoniam ſero ita nalcatur. Genera eius prope nimia. Celeberrimum Prænēſtinæ, quæ nouiſſime deſicit. Campanæ, quæ præquox eſt. Mileſiæ, cuius color ardentiffimus. Seroſtinæ, duodecim folia nō excedentis. Proximam fecere Trachiniam minus rubentem. Mox Alabandicam uiliore, albicanſibus folijs. Viſiſſimam pluribus, ſed minutiffimis, Spermoniam. Malo Pliniū ſic legi, q̄ ſpinolam, aut ſpinoſam. Ita enim, ſicq; minutiffimo folio, ſitæ q̄ uiliſſima ſit omniū, rectiffime uidet appellari. Sunt qui Sycioniam legendū putent. Nulli ſolia quinis pauciora. Campaniæ Cētifolia tribuitur. Et Philippiſ in græcia, a Panſgeo monte uicino tranſilaticia, numeroſis folijs ac paruis. Nec tamen talis odoratiſſima, nec cui latiſſimū, maximūq; folium. Ideo nec coronas intrat Centiſolia, niſi extremos uelut ad margines. De Lichny Quinquefolia, quæ inter Roſas quoq; numerari ſolet, & græca, ſeu græcula uocatis, ſuo loco dicet Quinquefolia. Eſt & alia Græcula appellata, conuolutis foliorū paniculis, nec dehiſcens, niſi manu coacta, ſemperq; naſcenti ſimilis, latiſſimo folio. Alia funditur e caule Maluaceo, folia oleacea habens, Muſceton (eſt ubi acceton legatur, & Moſceuton, a propagine, Viſtradiceue, quā græci Moſceuma dicūt) uocata. At que inter has media magnitudine, autūnalis Roſa, quā Coroneolam uocamus, in Rubo natā, iocundi odoris, ſed anguſti, ut in Cynoſbato monſtrauiſmus. Reliquæ ſine odore, hoc eſt, Maluacea, et duæ græculæ. Semen Roſæ in ipſo cortice eſt ſub flore, optum lanugine. Præcox Roſa emergit, ſi pedali ſcrobe ab radice facta, calidam inſuderis, germinare incipiēte calice. In Hiſpania Chartagini, præcox Roſa, hyeme tota uiſitur. Vnū genus inferitur pallidæ, ſpinofæ, longiſſimis furculis Quinquefoliæ, quæ Græcula altera eſt. Niſi quis hoc quoq; loco, ſpermonię, nō ſpinofæ legerit in Plinio. Satis ambigo, Coroneola ſit Cynoſbati, an Cynorhodi flos. Quam Cynoſbati magis puto. Cynorhoda porro, ſilueſtres Roſæ ſunt, ſpongioſis penicilliſue inter medias eius ſpinas naſcentibus, unico aduerſus expauſcentes aquā, a morſu canū, reme dio, nec ſere ante Plinium comperto; unde nouatū ei nomen crediderim. Quanquā Ariſtoteles hanc uidetur appellafſe Cynacandī, hoc eſt, Caninam ſenticem, Cantaridū teracē, ut dice mus ſecundo libro, in mentione Cantaridum. Eſt & Cynorhodos alia, ſed Liſiū, ut monſtrabi mus. Niſi dubito, Cynorhodon aliud eſſe, q̄ Rhododaphnē. Eſſe aliquos flores, Roſis colore ſimiles, arboribus in externo mari natis, autor eſt Theophr. Columella punica Roſam uocando, aut rubentē, aut ex Africa tranſlatā ſignificat. Roſam triplex comitatur fabula. Nō niſi candidā per initia fuiſſe. Mox uulnerato Venēris pede, dū Adōnidi, quē Mars zelotypus, interfecerat, opē latura, ſcipiti curſu per dumeta rapi, adrubuiſſe. Alij ſanguine Cupidinis, ut Auſonius, alij nectare affuſo, ala Cupidinis, in Deorū conuiuiu laſcipientis, illiſa poculis.

E X M. V E R G. C O M M.

Genera Roſarū multa Theophrasto primū, mox Plinio fuerūt, ex foliorū numero p̄cipue diſcreta. Poſt que nō male aliq; forte credat, alia etiā extitiſſe, et noſtra ætate adhuc quoq; eſſe: tantopere diuerſis locis per ſe, & humano ope coacta, uarias natura ſuas opes.

In aſciis ſere græcis a principio ſtatim deerat, *ῥόδον φέρει ῥόδον*, tā dī *ῥοδά μῆλλον ῥόδον*, cū tū ex melioribus legi oporteret, *ναρὰ φέρει ῥόδον*, ut ſit ſenſus. In roſis refrigerare, & adſtringere recetēs; ſiccās uero amiſſa refrigeradi poteſtate ſolū & efficacius adſtringere. Indicat id, præ antiquorū fidē, res ipſa, & ſermonis ordo, in q̄ altera pars p̄ contrariā diuiſionē illata, cōtrariā ſibi alterā exigit: cūq; in poſtiori de ſiccis ageret, oporteſbat in priore de recetibus actū fuiſſe.

Sequitur deinde non multo poſt, quod penitus corruptum ſit, & cilem cōiecturam habet. Docet enim Dioſcorides, deſectis foliorum Roſæ unguibus, terendum in mortario reliquum corpus, exprimendumq; & in umbra habendum ſuccum donec denſetur. Sed non poteſt, ex his quæ nunc leguntur hic ſenſus colligi. Nos quoniam illic, mortarium, & umbra eſt, & do nec denſetur, eo ſenſu qui legitur, Serapionis ope reddidimus. Quod donec certius aliquid ab alijs inueniatur, a legendis accipi uolumus.

Quod deinde erat, *ῥοδά δὲ λῖα παρὰ μῆλον περιπαύεται*, nullo ſenſu ex antiquorum & meliorum codicum fide inſtauratum eſt, *παρὰ μῆλον περιπαύεται*, id eſt, ſemorū intertriginibus.

De Roſeola

C De Roseis pastillis. CAP. CXXXIII.

ῥοδίδας

Pastilli quos Rhodides uocāt, hac ratioe cōficiūtur. Rosarū uiridi um, quę nullo antea humore madefactę exaruerit, drachmę. xxx. Indicę Nardi drachmę. x. Myrrhę drachmę. vi. tritę digerūt in pastillos, q obolorū pondus æquent. Siccaticę in umbra, in fictili non picato, atq; obturatō reconduntur. Alij adijciunt Costi drachmas duas, Iridis illyriacę totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. Tritis etiam uruntur ad illitiones, & diapasmata quę fiunt ad sudores coercendos, ita ut a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Similem, non tamē eandē Dioscoridi Rhodiorū confectiōē Pau. Aegin. lib. c. docet, neq; eodē genere eā appellat: hic fœminino Rhodias, ille neutro *ῥοδιδας* uocat, iubetque recētibus Rosis et eodē pōdere ipse etiā cōfici. Latini, qd' eodē inuenerim, de his nihil tradiderūt, Romana grauitate blāditias amorum, & uoluptatū illecebras docuisse, indignum existimantes.

De LYCIO. CAP. CXXXIII.

λύνιον

πυξάκων

Lycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs Buxi, densis, fructu Piperis, nigro, leui, amaro, densocq; cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascit plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur rami cum radiculis tusi, & ante per aliquot dies macerati, tū abiectis lignis denuo liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lyci

Dum adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. In natans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamētis additur. Reliquo ad alia utitur. Simili modo fit Lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit. Caliginem oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, ueteresq; fluxiones sanat. Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum. Coeliacis, dysentericis, potum inditumq; conuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua. Contrarabiosi canis morbus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Paronychijs, ulceribus quę serpunt aut putrent, medetur. Fœminarum profluuia appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex frutice Lōchitide appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, Rubo crassiores, a radice numerosos. Fructus cortex rubescit. Folia Oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammctionibus, & regio morbo mederi. Et fœminarum

λύνιον

fœminarum purgationes elicere. Affeuerant etiam crudam in potu, eodẽdem effectus præstare. Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoq; auxilio esse.

BARBARI COROLL.

Lycij, tum spina ipsa, tum succus ex ea, dicitur Pyxanthos. Chironias in Græcia uocatur. Frutex, unde Lycium fit, adulteratur asphodeli radice. Item spina, in Pelio monte nata, Medicinæ apissimum intelligitur, quod est spumofum. Indi Camelorum, aut Rhinocerotum (hi boues Aegyptij sunt) ut Festus inquit, utribus condunt. Lycium foris nigrum, intus rufum, cito nigrescens cum freris, opimum ex indico frutice. Aliter Dioscoridis Lycium, ex radicibus quoq; syluestribus Rhamni coctis conficitur. Nomen Lycio inuentum puto, quoniam e Lycia inueheretur, præcipuum urbe Patara, quanq; Indicum omnibus præfertur.

Plin., lib. 34.
cap. 14.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a Plinio lib. 12. & 24. longius dicta sunt, parata & exposita omnibus relinquimus. Lycium ideo dictũ est, quod probatissimũ, & quotidie ex Lycia ad alios importaret.

Quod in impresso legebatur, *ῥίζας δὲ πολλὰς πλείους*, radices numerosas & obliquas, una tantum mutata litera, *πλείους*, idest, latas uertimus.

Expunximus deinde aliqua. bis enim idem importune repetebatur, in quo iterum contra rabidi canis morsus sumi Lycium Dioscorides iubet. Et quoniam in uetustioribus aliquibus, pro melle eo loco lac legebatur. Ex Plinio remedium aliud illic instaurauimus, dicentes *sistere* Lycium fœminarum profluua appositum, aut cum lacte potum. Locus est libro uicesimo-quarto, cap. 14.

Susplicamur præterea ab eo loco quo ait, fertur Indicum fieri Lycium, sequentia parum esse legitima, qui cum semel in India nasci buxeam spinam dixisset, idq; pro comperto docuisset, ad famam & aliorum fidem transferre rem non debuerat, nec quod semel a se decretum fuerat, ex aliorum dictis infringere. Suspicionem nostram auget, quod plures illic uoces sunt parum proprię, & huic scriptori insolitę, potuitq; ab antiquiore aliquo medico ex alicuius historia, omnis ea pars Dioscoridi accreuisse, et paulatim in unum corpus coagulasse.

De Acacia.

CAP. CXXXV.

Acacia in Aegypto nascitur instar arboris, frutice spinoso, non se in rectum attollente. Florem habet candidum, & semen Lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subruffus ex uiridi. Eligatur modice ruffus & odoratus. Alii qui folia cum semine exprimunt. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis. Valet ad ignem sacrum, ulcera quę serpunt, perniones, pterygia, et oris ulcera. Procidentes oculos reprimat. Mensium abundantiam sistit. Prociduam uuluam cohibet. Citam aluum supprimit, aut potus, aut inditus. Capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in fictili nouo fornacibus, torreturq; in carbonum halitu perflata. Spinę decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinę gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & uirĩ modo perluceat, ligni expers. Proximum est candidum. Sordidum uero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit. Et medicamento rum quibus ammiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ouo illitũ pustulas non patitur erumpere.

B
ἄκακία

Pli. li. 24. ca. 12

C Acaciam fundentem, idem uideo accipisse autores, cum spina ægyptia. Testis Oribasius, & Aetius. Nisi q̄ acacia, etiam aliubi q̄ in Aegypto nascitur. Hæc & syria quoq; spina dicitur. In Aegypto, alba, nigra, & uiridi arbore conspicitur. Arbor tota horret aculeis, excepto caudice. Præterdit eos & germinibus & folijs, ligno in duodena sæpe cubita procero. Cedit tectis & nigra, nauum costis, incorrupta, etiam in aquis ui. Candida facile putrescit. Semen in Siligs ad coria perficienda, Gallæ usu. Flos & coronis addi blandus, & medicamentis petitus. Marnat & gummi ex ea, cum sponte, tum plaga, non e cortice, sed e uase. Præcipua utilitas, q̄ cæsa, anno tertio refurgit. Numerosa omnino arbor: ingenti sylua eius Thebaica præfectura: ubi & olea, & quercus, & textilis persica. Prouenit & in Galatia, teneritudinis summæ, spinosior arbore. Colligitur autumnum semen: quoniam collectum maturius, nimis uehemens. Spissatur succus ex folliculis, aqua pluuiæ, maceratis mox in pila tufis exprimitur. Tum densatur in sole mortarijs in pastillos. Acacia uocatur, arboris uidelicet suæ nomine. Fit & e folijs per se, minus efficax. Galatiæ Acaciæ nigerrimus improbatur. Itē qui ualde rufus. Placet purpura, aut leucophea, & quæ facillime diluitur. Nunc Acaciam ex syluestri Pruno colligit officinarū definitia. Illud meminerimus, semē ægypticæ, a Dioscoride lupino simile reddi ponticæ, seu quod idē puto, galatiæ lenticulæ. Plinius nihil distinguit, sed utrunq; semen, lenticulæ par existimatur, minore tantum grano & folliculo. Demetrius adserit in Aegypto spinā, quæ sit arbor, ramos coronarum specie natiua effundere, in quibus semen rotundum sit, flore subobscurō. Ex hac Tindicæ, & Abylas coronas in ægypto fieri, docuimus in Myrto. Spinam porro ægyptiam, sunt qui & arabicam uocant, ut Dioscorides, & Galenus. Non est superfluum, ut spinarum hoc loco genera subiiciam, quæ nominis cōmune græci, legentibus dubitationem afferunt. Acanthos, siue q̄d idem est, spina uulgaris, ut quidam coniectantur, acantha, pyxantha, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce, tragacantha, acantha arabica, uel ægyptia, acantha indica, acantha ariana, acantha babylonica siue regia. Adduntur a latinis, spina litiens, spina pennata in ægypto, spina appendix, spina bunia. Diuersa omnia, decem & septem numero. Accedat ijs Galatica, siue Pontica, siue Cappadocica: de qua proximo capite disseritur. nam syluestris quæcunq; spina, Calabrix uidetur esse nominata.

E X M. V E R G. C O M M.

D Cōiunximus istā Acacia, ueterum græcorum fidem secuti, quæ male in duas secesserant parteis, unoq; capite, ut res ipsa etiam exigebat, fecimus de omni Acacia a Dioscoride doceri. De qua non eodem modo, Oribasius, Aetius, Pliniusq; & alij docuerunt, sed non facilius nostra ætate commentatio est.

De Acacia altera. C A P. CXXXVI.

A Lterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoq; prouenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum uallo munitur, folia habens Rutæ. Semen lenticula minus fert autumnū, in loculis ternum quaternumq; seminum capacibus. Succus eius adstringit, uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 12

A C A C I A hæc, a Plinio Galatiæ tribuitur.

De Amurca. C A P. CXXXVII.

Amurca

A Murca expressæ Oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis, adstringit, cæteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & uulneribus, cum aceto, uino aut melle, commode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, & uulvæ exulcerationi. Si uero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. lumentorum scabiem cū decocto lupini & chameleonte illita sanat. Cruda & recenti amurca po-

dagras, articularioſq; dolores foueri utiliſſimum. Peruncta in uilloſa pel-
le, & hydropicis impoſita, tumoris molem reprimi.

BARBARI COROLL.

Inter inumeras Amurcæ laudes, agricolarum uſibus a Catone prædicatas, illa maxime me-
morabilis, q; ligna macerata liquore eo, nullius ſumi tedio ardent. Græci ἀμύργην uocant, etiā
fecem quādoq; uini. Item genus herbe purpureæ, qua uestes tingantur, Amorgine a græcis ap-
pellatæ. Sed & tenuiſſima pars harundinæ paniculæ, dicitur Amorgis, autorem habeo Pho-
tionem grammaticum.

Pli. li. 15. ca. 8.

EX M. VERG. COMM.

COCTuram Amurcæ, certius primo ruſticarum rerum libro docuit Mar. Varro, quam
condi in domeſticos uſus iuſſit. Si quis præterea Amurcæ laudes alias, & multiplices uſus no-
uiſſe uelit, poterit autoribus Mar. Catone, & Plinio diuerſis locis quod cupit inueniſſe: eritq;
illud homini ſaltem laboris huius opere precium, ut naturam diſcat, nihil tam ſordidum eſſe,
& ingratum genuiſſe, quod in hominis uſum beneficio aliquo non inſtruxerit.

De Vitice. CAP. CXXXVIII.

AGnon aliqui Agynon, alij Lygon uocant, alij Amictomiænon,
alij Tridactylon, magi Semnon, alij Hæma ideos. Aegyptij Sū,
Romani Salicem marinam, alij Piper agreſte, alij Lecrifiſciū. Vitex, ſeu
caſtus frutex eſt, in arborem aſurgens. Naſcitur in fluminum ripis, aſpe-
riſq; locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit prælongos, fractu peruica-
ces, folia Oliuæ, ſed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florē
mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, et ſemen ut piper. Excal-
factorias uires habet, & alſtrictorias. Semen eius potū, uſu natis icibus.
aqua quæ cutē ſubiſt, lienoliſq; auxiliatur. Lac euocat. Menſes ciet, dra-
chmæ pondere in uino potum, Genituram exoluit. Caput tentat, & ſo-
porem affert. Decoctū herbæ & ſeminis in deſeſſione, mulieribus uul-
uæ malo oportunis opitulatur. Item in inflammationibus. Purgationes mo-
uet ſemen cum Pulegio potum, etiā ſuffitu, uel appoſitu. Capitis dolo-
rem diſſoluit illitum. Inſtillatur cū aceto & oleo capiti in letargo & phre-
nide. Folia ſuffitu, aut ſubſtrato fugant uenenata. Illita quoq; ſerpen-
tium morſibus auxiliatur. Teſtium duricias cum butyro et folijs uitium
emolliunt. Rimas ſedis ſemen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs me-
deæ luxatis, uulneribuſq;. Virgā qui manu teneat dū iter facit, negat inter-
triginē ſentire. Agnū, quaſi dicas purū, uocat Græci. qm matronę in theſ-
mophorijs Athenienſium caſtitem cuſtodientes, folijs cubitus ſibi ſter-
nunt; et Lygon, quaſi uimen, propter inuictā fere ramorum flexilitatem.

ἀγνος ἄγνως
λύγος
ἀμικτομίαινος
τριδάκτυλος
εἰμένος
αἶμα ἰδίων

BARBARI COROLL.

AGnos, ſiue ut Hippocrates appellat, Agne, dicitur latine Vitex. Non habeo tñ plane cō-
pertū, an ſalix amerina, idem qd Agnos Vitexq; ſit, & ſi Dioſcorides hoc affirmat. Eriſpe ita
cenſeo. Vitex, non multum a Salice uulgarī diſtat, uſu uinculorum, foliorum q; aſpectu, ni-
ſi odore gratioꝝ eſſet. Semen potum, uini quendā ſaporem habet. Duo genera eius. Maior in ar-
bore Salicis mō aſurgit, flore candido, unde Candida quoq; dicitur. Minor ramoſa, folijs al-
bioribus, lanuginoliſ, purpureo flore, Nigra nuncupata. Naſcuntur in paluſtribus capis. Se-
men uiticis, Galenus mandī cum bellarijs ſolere ſcribit, uſu tragematis. Ita em minus offici-
capiti. Lygon, Lygeanq; græci uocat & arborem, & quoddam herbe genus, qd, ut inquit A-
theneus, in nidos ſuos parituri cygni ferant. Nec tñ ſatis habeo compertū, hanc, quam cygni
petant herbam; aliud genus oportere intelligi q; uiticem. Inuenio & ſcopas amerinas, ſpartis

B.

C similes describi, folio tamen minore, sed lenticia uirgularum maiore, quas, sunt qui genistilla amerinam uocitent, hoc tempore. Corolla e Lygo usos esse ueteres, Anacreonti poetę credimus; cuius originem Samij, Caresq; dederint, diuersis causis. Nam & Lacedęmones arundine certis sacris, ut autor est Sosibius, coronabantur. Aristophanes quoq; autor est, coronas ex arundine factitari solitas Athenis: quas & dioscuris, hoc est, Castori et Polluci dicatas fuisse cōstat, ut frugales atq; simplices. Lygō & Aegylin qñq; dici lego. Itē Mosyn, & Oesyan, et Oesō, et Oesocarpon, ut Polluci & Phodoni uidet. Vñ Gerra oesyma, hoc est, quadrata quēdā tugiola ex huius salicis uiminibus: quę Ligella q; nominant a Plauto in Aulularia, forte a Lygo. i. uitice, aut a ligādo. Adijciendū illud uidet, q; hic a Dioscoride scriptū ē, Viticę a quibdā Lecristicum uocari, putare me in eo uerbo mendā esse. Nec lecristicū, sed a similitudine saporis & acrimonię Ligusticū legendum. Nam & piper āgreffe dici uiticem, idem autor affirmat.

E X M. V E R G. C O M M.

Vocatur Agonos, non alia ratione, quam quod semen genitale diminuit.

In Amictomiae uoce, & si non sint integra omnia, antiquę tamen integritatis, et significationis aliqua adhuc supersunt uestigia, ex quibus facile coniectura est, fuisse eius uocis compositionem, quę ad uenerem misceri cum mare prohiberet.

λύγος quoq; i. flexilis, καὶ τοῦ λυγίστου. A rubore uirgarū sanguis dictus est. Itē Semnos, id est, uenerandus, qđ in continentia arceat. Ligusticum, a similitudine saporis. Piper āgreffe, qđ piperis naturam explet.

Amerinam salicem a Romanis gręcorum Agnum dici, aperte Dioscorides testat. Sed uerum id sit, in Plinij & Columellę lectione diligentiores facile cognoscent. Nobis inclinatum, ut negemus gręcorum ἄγνον, Romanorum salicem esse, suspicamusq; adiectam ab imperitis latinarum rerum gręcorum medicis eam Dioscoridi appellationem accreuisse. Tam em Viticis, quam Amerinę salicis uocem nouisse quōdam Dioscoridem, uerisimile est: & ex quo Plinius aperte docet, Viticem latinis esse, quę gręcis Lygos & Agnos, nec multum a salice utilitū usu distare, non credendum, in ea appellatione deceptum diligentissimum alioquin & ex professo hęc agentem hominem.

Theophrastus, quod Oleę folia habet, composito nomine λαιόφυον uocauit.

De Salice. C A P. CXXXIX.

D
irix

Salix uulgo nota est, cuius semē, folia, cortex, & succus spissandi uim habent. Trita folia cum exiguo Pipere & uino pota, ileosis subueniunt. Sumpta cum aqua, pręstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen, in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdē prębet effectus. Corticis cinis admisto aceto illitus, clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus, cum rosaceo in calice punici calfactus, auritū dolorib. auxiliat. Decocto eorū podagras foueri utilissimum. Furfures purgat in corpore. Excipit succus q; manat ex ea cū floret, exciso cortice. In plaga enim cōcretus humor inuenit, q; ad purgandā quę obstat oculis, suā uim prębet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 9.
li. 17. ca. 20. li.
105. cap. 37.

Breuiter fere & cōorto caudice arbor, & ut nouimus, aquatica, ἱρίαν gręci uocāt, Asia tribus generibus hęc diuidit. Prima nigro cortice, aut puniceo, nigra nominatur. Secunda candido, candida uocata. Tertiam coactę breuitatis, & sponte uaturę, pumilā, fœcundo, ut qđā putat fructū, Helicę appellāt Arcades. Virgas ad nexum, e nigra cōmodiores & pulchriores, e cādida spissiores, & agriculturali utēsilibus aptiores esse. Plinius apud nos quoq; tria Salicis esse nomina commemorat. Viminalē, eandēq; purpureā. Vitellinā, a colore luteo, graciliore priore. Gallicā, quę sit tenuissima. L. Columella Gręcā, Gallicā, Sabināq; reddit; gręcā flauī coloris; gallicā obsoletī, purpureę, tenuissimiq; uiminis; sabinā gracilibus uirgis atq; rutilis, quā plurimū uocāt, inq; t, amerinā. Plinius gręcā rubentē, amerinā candidiorem asserit. Porro quam dixi Vitellinā, in exēplaribus nicellinā, & itellinā corrupte legimus. Inuenit & alia distinctio. Proce rē, uineis iugadis pticales uocatę, balteo corticis uincula p̄bentes. Alię p̄tenuēs, a uiminibus, appellatę uiminiales. Alię uirgas, sequacis ad uinctum lenticę ferētes. Alię corbibus et supellectili uillicę firmiores cādidioreq; detractō cortice, leuicę tractatu; mollioribus inde uasis, q;

e corio & cathedarum delictis aptissima. Fructum Salix fert, abeuntem in araneam, anteq̃ o-
mnino maturitatem sentiat. Ob id, ante maturitatem colligitur, dicta Homero ὀλισίκαρος;
hoc est, frugi perda. Vna tñ prodiit, ad maturitatem proferre solita, in Creta insula, ipso de-
scensu Iouis speluncę, toruum ligneumq̃, magnitudine ciceris. Succus Salici triplex. Vnum
arbor ipsa, guini modo fudat. Alter cortice triū digitorū magnitudine ablato manat. Tertius
detruncatiōe ramorū, a falce distillans. Salix fertilior & densior recisione fit, ac tonsura ex bre-
ui pugno, uerius q̃ ramo puentu certissimo. Tertium locum in æstimatione ruris, Cato ei tri-
buit. Salictum non hoc tantum. Seruio grammatico significat q̃d oliuetum, arbutum, uine-
tum, sed & uirgulti quoddam genus, dictum ita, q̃ saliat surgatq̃ cito: ut Lupum fortasse sali-
ctarium intelligat, de quo suis locis egimus.

EX M. VERG. COMM.

Gratissima huic arbori inuidiā Homerus p̃p̃modū fecit, q̃d ὀλισίκαρον hęc uocauit, frugi
perdam. De hac, omniq̃ eius medicinę usu aliter magis q̃ alia Plin. lib. 24. pleraq̃ tradit, quę
in medio posita omnibus relinquimus.

De Syluestri Olea. CAP. CXL.

Syluestris Olea, quam aliqui Oleastrum appellāt, alij æthiopicam
Oliuam. Folia adstringūt. Trita autē & imposita ignem sacrum, ul-
cera quę serpunt, epinyctidas, carbūnculos, paronychia, nomasq̃ cohi-
bent. Crustas emarginant cū melle illita. Quinetiā sordida repurgant. In-
flāmationes, panosq̃, cū melle imposita discutiant. Cutē a capite uulsa
conglutinant. Oris ulceribus commanducata medentur. Succus & de-
coctum, eosdem habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebre pro-
fluuium, admotus succus inhibet. Vuę oculorum, pustulisque pro-
dest. Vlcera, & ueteres defluctiones sistit. Quapropter in collyria addit,
ad genarū erosiones perq̃ utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso ui-
no ex aqua, siccatusq̃ sole in pastillos digeritur. Sed longe ualidior ad re-
condendū succus habetur, qui cum uino q̃ cum aqua expressus est. Au-
ribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter celi-
acis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, ut spo-
dij uicem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, usq̃ dum figlinum
percoquatur, restinctaq̃ uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur.
Postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cine-
rem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. Sed eisdem
uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuę olea eadem uis
intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamentis ob-
suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uiuenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum
medetur furfuribus, & ulceribus quę depascunt uorantque. Quod autē
em intra nucleum est ex adipe & farina, scabros ungues excutit.

BARBARI COROLL.

Oleaster, grece νόστινος appellatur. Syluestris Olea fecundior satiuæ, q̃ fere syluestres ha-
bent, ceu cura fertilitatē minuere. Manifeste hanc tractatu, de cillis circa tales, aut omnino
translatione mitem fieri, uix potest adduci Theophrastus, ut credat. Sola hęc arborū cū Olea,
teredinem sentire nō dicat. Ex Oleastro marculos breuiiores, & terebris uaginas, sicut ex buxo,
ulmo, fraxino, aquisolia, scitatas produnt. Est & in Appennino frutex, uocatus Cōti-
nos; ad liniamenta modo conchilij colore insignis. Sed hoc ego nō Oleastrū esse puto, sed Ole-

k iij

Α
ολισίκαρος, μακρά
τ' ἄγχι τοῦ χρο-
νίου ὀλισί-
καρος.

ἄγχι τοῦ

B

Plin. li. 17. ca.
12. Lib. 12. ca.
17. Li. 17. cap. 1

Castellum, & Oleam cilibracam, a Columella nominatam: cuius & ipse Dioscorides in Chamaelea meminit. Photion, Oleastrum quandoq; dici Phauliam existimat, Certe Phaulia Oliuæ genus est Columellæ, Plinio, græcis omnibus.

Plin. li. 15. ca.

2.3.4.5.

Olea medulla tam incerta, ut non in medio haberi, sed p totum lignum sparsa uideat, radice parua, uelut lacinia ex medio tendente, cæteris grandibus & cancerorū similitudine contortis. Proprium ei malum Congros, etiam si deriuatur in alias quoq; id nomen. Sunt q affectum tū Premnō, Crotonē alij cognominent. Supina foliorum huius contra q̄ ceterarum, candicant magis q̄ prona, minutq; sunt leuia: qd & cum hedera cōmune est oleū. In Syria, & aliubi, congestum quasi uux modo fructum ferunt, ubertate foli. Oleam utiliter & probe desloruisse dicimus, cum flores eius caduci, uelut perforati reperiuntur. Nascitur modis omnibus extra, q̄ furculo. Ex huius nucleis, quos Sansas uocamus, syluestrem oleam prouenire Theophrastus scriptum reliquit. Sansam, sunt qui & Nautum dici uelint. Vnde uerbum nauci facere. Quandoquidem & fullones, ob utilitatem artis, Nacæ dicebantur, ut nunc mesitas et proxenetas, sanfarios & ossarios uocamus. Quidam pro nugis, nautum. Alij omnia fere opera ex lana, græce *νύκας* dici uolunt. Ipsum quoq; nucis, sed & omnium rerum putant. Alij nucleum malunt iuglandis. Alij mediū illud uelut dissepimentū. Glossematorū scriptores fabæ grani, q̄ hæret i fabulo. Quidā ex græco *λευέ* hominē in eo uerbo significare putauer. In mari rubro uiuit Olea, quæ uocatur arabica, baccis fere nostratibus, fungos, cum largi ceciderunt, imbres educans, quāta tū sole in pumicem durant. Ex qua manat lachryma, inhibendo uulnere san guini expetita medicis. In sinu heroo lapidis specie, ut thynum & laurus, cubitorū trium magnitudine. Ignē olea, quamuis optime subditum excipiat, q̄ spissa & pingui natura sit, igniari is tū ineptissima est. Vna maxime omniū Olea regerminat in opere. Vitam oleæ Theophrast. 200. aīos longissimā esse tradidit. Si olea consitū in confinio quercetū habuerit, nō solū nō feret, sed etiam fugiet, introforatq; se in fundum abijciat. Vt cradē fico, ita thaleæ tribuuntur huic arbori, utiq; apud nos. Græci, ut inqt Pollux, Thalos non oleagineos solum, sed utigineos quoq; ramos nomināt interdum. Præcidunt, Varro inqt, eam de tēnero ramo æquabiliter, ex utraq; parte circiter pedalem. Sunt qui sclauolas nōminent. Erektionē porro Athenis, siue Iresin uocabant, plantam oleagineā, uelleribus & corollis inuolutā. Vnde & nomen cōtra pestilentiam foribus imponi solitum, ut est apud Aristophanē. Hanc & Corythalion dicebant. Etiam si pro laureo quidā ramo capiunt, in eundem suffrationis usum. Credo huius quoq; ritus apud Romanos uestigium fuisse, cum ita legamus apud Festum. Planta oleaginea uirga, inquit, foliata est ex olea deplātata. Nam & februa quoq; lanæ sunt & arborum rami apud nos, quibus redimitti sacerdotēs expiabant domos. Quod deinde nomen ad oīa purgamina translatum est. Autor Ouidius. Morbus & ille proprius, præter uermiculatiōem, Elos uocatus, hoc est, clauus. Ab alijs Mices, atq; Lopas, hoc est, fungus & patella: ceu quædam solis inusio. Quanc̄ Patella in sicu morbum significat, qui nimios propter imbres radici contrahitur in olea. Et Arachnion uocatur affectio, hoc est, aranea, fructus absumens uermis: sub corio prouentū adimit, in uicemq; adiuvat, si nascatur ad nucleum. Nulla post ficum arbor uredini magis obnoxia est. Carpe appellant in oleis uermiculi, statib. austrinis creati, ut in uitibus. Est et impetigo, peculiaris ei morbus, ut scabies fico, & uitib. fluor. Oleā græci, *ωλεάν* uocāt: nostri qnq; Termite. Quāq; ita & ligni uermes dñr. Optā erat Olea ueterib. lacinia, siue liciāna. Paulsia. 2. oleo. Efq; orchas. Varro, grādis inqt, Olea uocat orchitis, a similitudine, ut credo, restiū: antiquus archemora. Minus ijs grātē sunt regiē, et radij uocatē. Sūt et alia earū gñā, quæ ambitu osū sit pseq. cū et. 6. uolumine Colum. et Plin. 15. naturalis historiē, nihil fere indicitū relinquit. Hæc arborē nōnulli existimāt ultra. 60. a mari, aut nō uiuere, aut nō esse feracē. Sed in q̄busdā locis recte puenit. Oleā Mineræ sacrā, ut Aristoph. & Iulius Pollux inqt, græci Moriā uocabāt, in academia satā, ut in Olympia nascētē Oleastrū calistephanō: q̄a olympicē uictores ea coronarent, ut ait Pausanias. Nā Secos, fructiferā oleā in poetis significat Photiō. Dicē & Calliē Iga, quā nos satiaū, ut ab oleastro differat, quā uocat Agriēlā. Celebrat & cognominata Strepte, ab intorta specie. Sed ea loci nomen ē, circa Epidaurū, adiecta fabula, euenisse ita ei circūdatu manus, Hercule illac meante. Nā & clauā eius ex oleastro uolūt reuerfo ex Hypboreis fuisse, ignotio prius græciē: quæ mox spōte recessit apud Troezenios, aut certe ad Alpheti amnē: si Pausaniæ credendū est, hōi qdē satis docto, sed superstitioso, diui Adriani & Antonini, utri usq; tēpibus. In eadē gēte Streptos, Rhachos uocat, locū oleastris frequentē, uersus mare: q̄ eorum consuetudine, quicquid ex olea relinquitur in utile, Rhachos appellabatur. In Arcadia spectari solitam, Pausanias affixat arborem, e cuius radice una, Ilex & Olea nasceretur in

D

quodam fano. Syraculis, ut Diodorus auctor est, in frondibus olearum scriptis optimatum nominibus, discessione facta, irrogabatur quinquennale ciuibus exilium: de quo argumento, genus id mulctæ, Petalifinus appellabatur, ut Athenis Ostracifinus.

E X M. V E R G. C O M M.

Fuit uniuersæ Græciæ quondam in maiore honore Oleaster quam Olea. Hanc ipsam arborē Cotinon Dioscorides uocari ait, communi & recepto ab omnibus græcis nomine. Olea autem enim græci Cotini appellatione intelligunt, & ex similitudine æthiopica Oleam, quæ propriæ generis in ea regione arbor, nullum inuenit ob similitudinem aptius cui compararetur in Græcia nomen & genus. Maro noster folijs amaris Oleastrum esse dixit. Nec falso, si sensui & uiribus ejus in medicina credendum sit.

De Colymbadibus Oliuis. C A P. C X L I.

Colymbades tritæ, & ambustis illitæ, pustulas gigni prohibent. Sordida ulcera purgant. Muria succos collutas gingiuas contrahit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recens, stomacho utilior est, uentri difficilis. Nigra autem & matura, corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur. Oculis non conuenit. Capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depascentia ulcera fistit. Et carbunculos emarginat.

B A R B A R I C O R O L L.

Oliuæ, Colymbades ideo uocantur, quoniam oleo suo puræ, hoc est, sine accersita cōmendatione innatant, & quasi urinabundæ fluitant. Halmades autem dicuntur, quæ mutia seruantur, etiam si quidam Græci confudere nomina. Sunt & Netrindes appellatæ, quia natent, apud Iulium Pollucem. Idem auctor & Cotinadas nominat, quas & Phaulias, & Trambelos dici tradit. Medicinæ, quæ a Dioscoride subruissis redduntur, tributæ candidis a Plinio uidentur. Castigandi sunt in auctoribus loci, Columbares, pro eo, quod Colymbades, imperitia librariorum scribentes. Genus alterum oliuæ cibariæ, Græci Thlastas, & Pyrenas, & Pityrum, siue Pityridas, hoc est, nucleos, & fresas, & fursuraceas appellant. In hunc usum stringuntur ante quæ præmaturæ sint. Epityra falso dicta, cum sit Epityrum, ut Varro inquit, siculum edulium: de quo dictum est alibi plenissime.

Fuit quondam multiplex Oliuarum conditura, accersitæque aliorum saporum cōmendatione placebat, quod aliogn ingratum habuisset in cibis usum. Inter eas Colymbades a Græcis dictæ fuerunt, quæ cōmuniore & certiore uocabulo Halmades idem dicebantur. Hæc nomen a sale inuenerant, Halas enim Græci, saltem dicunt. Illæ ab eo, quod in conditura sua natarent sic appellatæ fuerunt. *κλυμαδω* enim urinare est. Dico autem urinare, in natando sub aqua esse. Si quis rem uelit exactius nosse, facile illi erit ex Plinio lib. 15. capi. 3. Palladio lib. 15. cap. 20. Columella, præterea lib. 13. cap. 47. infinitas pene Oliuarum discere condituras.

De Oleo syluestris Oliuæ. C A P. C X L I I.

Oleum syluestris oliuæ humidis gingiuarum uitijis colluitur. Dentium mobilitates stabilis. Calfacti fots, gingiuus fluctione laborantibus utilis est. Lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuus admouere, donec albæ spectentur.

B A R B A R I C O R O L L.

De oleo syluestris oleæ dictum est superius.

E X M. V E R G. C O M M.

Paulus affirmat spissandi simul & adstringendi uim habere, aridiusque & squallidius omni alio oleo esse. Locus est eo capite, in quo de erosionibus gingiuarum, earumque excrecentijs & pladis agit. Sic enim ille uocat, quæ hic *ινλα πικιδωρα* dicit. Quod uitium facile, & quale sit intelligitur, si nouerimus quid in alijs *πικιδωρον* græcis significet, non humens simpliciter, sed quod cum humore flaccescit: quale erit, quod natura sua durans rigensque admissio humore lauit, & paulominus quam dilabitur, oportetque in τὸ πικιδωρον duo hæc intelligere, humorem, & ex humore infirmitatem, idque est, quod hic ait, gingiuas *πικιδωρας*, & nos uertimus flaccidas, & cum infirmitate humentes.

A

κλυμαδωρα

Pli. ll. 15. ca. 3.

B

V E R G.

Plin. ut supra de oleis.

C

¶ De Lachryma Aethiopicæ Oleæ. CAP. CXLIII.

ἀλκυρον τῆς αἰ-
θιοπικῆς ὀλεῖας

Lachryma, quam Aethiopica Olea stillat, Scamonizæ similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, seu peruacua est. Nostrates Oleæ, Oleastricq; similem lachrymam sudant, quæ cōmode ad oculorum habetudines illinitur. Cicarices, albuginesq; illitu emendat. Vrinam & menses ciet. Cavis dentium impressa, ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur. Partus pellit. Lepras & impetiginēs sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

B A R B A R I C O R O L L.

Oleæ Aethiopicæ lachryma in precio est. Si hæc Arabica; quæ & ipsa dotatur lachryma, nondum constat mihi. Quamq; puto eandem esse, quoniā in Arabici sinus desertis, tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur. Vt cumq; in Arabia stillat eam olea, quæ medicamentū conficitur, Enhæmon appellatū, singulari effectu contrahendis uulnere cicatricibus. Sunt qui hoc esse putent gummi genus, illud quod recentiores Elemi, quasi Enhæmi appellant, ad ossa etiā fracta caluæ conglutinanda cantatissimum. Porro uerbum Enhæmon, non huic modo rationi conuenit, sed emplastris omnibus, quæ cruentis protinus iniiciuntur uulneribus, ad reprimendas inflammationes, & inhibendum sanguinem: quod genus & Alipenon, & Catagmaticon, & Collecticon uocatur. quoniā medicamentis minime pinguibus constat. Oleæ autē hæc in Arabia nascuntur, in maritimis, & fluctibus, æstuq; operiūt rubro mari, ut in olea demonstratum est. Nec bæcæ nocetur, cum constet & in folijs salem relinqui, Oleastrum quoq; ipm, ueteres Oleam uocabant Aethiopicam, testis est Dioscorides.

E X M I C U S V E R G E C O M M.

Ex Aethiopia usq; ut Comicus ait, Aethiopicæ oleæ lachryma quondam Græciæ importabatur. Neq; a nobis igitur desiderabit quispiam, quæ in tam longinquo, & inaccessio orbe nascentia cognosci ætate nostra non possunt.

D

ἀγρῆς

¶ De Quercu.

CAP. CXLIIII.

Omnis Quercus adstrictoriam uim habet, præsertim liber, qui cortici, & ligno intercedit. Quinetiā tunica putaminis glâdis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis, cæliacis, sanguinē excrementibus. Tria in pello, sceminis fluctione uulua laborantibus subijcitur.

B A R B A R I C O R O L L.

De glâdiferis
arboribus &
glandibus, &
gallis, uide Plin-
ium lib. 16.

Ed. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Plinius glandiferas arbores, una uoce comprehendī posse negat latino sermone, quemadmodum græco potest ἀγρῆς, & antiqua uoce Saronos, a qua Saroniacus sinus, & Saron, in Arcadia nemus, trans Ladonem fluuium. Quibusdam, ut Theodoro gazæ, Roboris appellatione cōtineri posse omnia ea genera uidentur. Sane Græci Dryos uocabulo, etiā omne lignum significant. Vnde Gerandryon, pro ueteri & ambusta quacūq; arbore accipitur, quasi uetus ramale. Persius. Ergo roboris quaterna genera, Quercus, Robur, Aesculus, Cerrus: quæ Græcis illis respondent: Hemeridi, Aegylopi, Haliphloe, Platyphyllo: ut sit quercus Hemeris, Platyphyllos Aesculus, Aegylops Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos robur significet, non habeo compertū. Theophrastus certē Agriamdryn appellat, quæ nostri robur interpretatur, ut in Galla differuimus. Nec minor hic, q̄ in pinu difficultas, quæ quibus græcis latina congruat. Nos, utroq; loco tantū laborauimus, quātū uix ipsi qui p̄didere. Quidā quatuor su prædictis duas addidere spēs, Phagū, & Illicē. Sed toto gñe distat, ut cognate potius, q̄ congeneres hūc sint. Hemeris, sane Homero, non quercū, sed uitē significat. ut Photion testatū esse uoluit. Sibari, qui nūc Sibari thurij dicunt, quercus fuisse tradit, in oppidi cōspectu, fronte p̄petua, Varrōis & Theophrasti testimonio, q̄ nec germinare cū alijs, sed ab ortu caniculæ solita sit. Rarū est, qn sata quercus deterior eueniat. Dulcissima glās Hemeridi post Phagū. In orbem hæc comat, torqueturq; in alas, crebro ramorum sinu caua, materies ualida. Macedones, quæ glandem dulcem perducant, ἑνυμδρῆν, hoc est, quasi ueri quercum appellant. Nasci Quer-

A
 eus in rubro mari glandiferas tradūt. Nasci & in nostro, propiores terræ, super lapides atq; te-
 stas, sine radicibus, sed patellarū modo adhærescentes, folio carnosio, crasso, atq; oblongo, my-
 ricæ simili, accedētis ad purpuræ coloris. Magnitudo arboris tora, paulo amplior sesquipedæ.
 Hac tingi mulieribus lanas. Ramis earū adhærent conchæ quædam, & caulibus parte ima, ubi
 & bestiolæ populantur. Naufragis & urinātib; comperta hæc. In Lusitania profundo mari
 Quercus glandiferas innasci, unde Thūni uescātur, auctor est Polybius. Ob id Thūnos, qui di-
 cat marinos esse porcos, minime discesserit a uero: ut inquit Athenæus. Carinas nauibus quer-
 nas subijci præcipiūt, maxime uirētib; . Abietī, aut pino larici uocatæ, ferruminari quercus
 nō potest. In sociabili natura, q; hæc spissa corpore sit, illæ textu raro. In septentrione haud pcul
 Caucas, circa duos p̄cipue lacus, littora ipsa obtinēt quercus, tāta magnitudine, ut suffollæ flu-
 ōtib; , aut flatibus propulsæ, uastas cōplexu radicū insulas afferāt. Itaq; libramētō eo stantes,
 nauigāt. Ramorum ingentiū armamētis sæpe territa Romanorū classe, noctu & prælio contra
 arbores quoq; inito. De Herciniæ syluæ miraculis, nihil attinet dicere, nisi q; magnitudine insi-
 gni robora ibi crescere concupiūt. E glandiferis ciuicas coronas necī mos erat: quæ omnibus
 anteferrentur. Ciuica iligna primo fuit. Postea placuit ex æsculo Ioui sacra. Variatūq; hoc
 cum quercu est, ac data quæ ubiq; fuit. Non puto prætereundū Alexandri Macedonis inuē-
 tū, seruandæ niuis, in scrobes ubi ea sit, coniectis & quercu ramis. Saronicus in Peloponēso, Pli-
 nius inquit, sinus est, olim quernō nemore redimītus: unde ei nomē, ita Græcia antiqua appel-
 lante quercū. Pausanias ab Saronē, qui post Althipū regnauit, sinū eum dici uoluit.

EX M. VERG. COMM.

C
 Oniunximus, unoq; eodē clausimus capite, quæ natura primū in eodem genere, mox
 in historia hic scriptor, postremo meliores græcorū codices coniuncta esse uoluerunt.

Emēdauius præterea, addidimusq; pauciora quædam, quæ græca cum nostris conferen-
 tibus nouisse facile erit, præsertim in communi & nota omnibus re. Nullibi enim non nascitur
 Quercus aliqua, Fagus, Ilex, Castaneæq; , quam hic Sardianam glandem, a Sardibus appellat:
 quemadmodū a Castanō Magnesiæ oppido, uel ut Stephanus docuit, in Apulia non procul
 a Tarēto, Castaneam Latini & Græci appellauerunt, glandiū gēneri ab hōc scriptore, & ab alijs
 adsignatæ, & Iouis glandē dictam. Et si posteriores regijs nucibus eum honore tribuerint.

Eandem legimus in ueterum Græcorum lēxicis Lopinam, & Euboicam dictam fuisse:
 hanc a regione, illam a cortice, quod λπος Græci dicunt, & λπῶν decoctitæ.

Laudauit contra uenena quædam præcipue Nicander, Castaneam, Nucemq; , ut postea
 Maro fecit, appellauit. Versiculus eius est. κατανύ καρὺν παχυφλόισι κάλυμμα. Etrōpulo post,
 δουλιπὸς καρὺν τοῦ κατανύς ἔρπειν ἔτα. Quod non parū miretur aliquis, cum manifeste inter glan-
 des, potius q; inter nuces, Castanea numeranda sit. Magnis autoribus defendi utrunq; potest,
 nec nos aliud in ea re monemus, quam fuisse quondam in ea glandis & nucis nomen, latiusq;
 glandis, quam nucis claruisse.

De Glande.

CAP. CXLV.

G
 Landes eosdem effectus exhibent. Vrinam ciunt. Capitis dolor
 rem, & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistunt esitæte uene-
 natorum ictibus. Decoctum corticis, cum lacte uaccino potum, prodest
 contra toxica. Intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt. Ad duricias,
 quas cacoethæ uocant, & malefica ulcera cum salſa axungia conueniunt.
 Iligneæ glandes uiribus querrias præstant.

B A R B A R I C O R O L L.

GLans græce βάλανος, ut Varroni placet. Præfertur omnibus Hiberica, sago dulcissima.
 post Hemeridi. Tum Platyphylo, deinde Haliphiloeo. πλατύφυλλος, hoc est, latifolia, post cer-
 rum excellissimam & rectissimam. Sed post haliphiloeon, usu ædificiorū deterriora, nec utilis car-
 bone. Macedones latifoliam intelligunt amaræ glandis: quam Aesculum quidā interpretati
 tur. Aesculū porro ab esu dictā miremur, cum diphthongum æ requirat. In qua uermiculi na-
 scentes, priuatim albæ nominantur. Ab æsculo æsculetum, ut a quercu querquetū. Vtrunq;
 locus Romæ fuit. Vnde Querquetulana quoq; porta, q̄ a uiminali, & canilaria nō discrepat.
 Et si ab auihus Querquetulans, quas M. Varro & Columella, Cercidas uocari græce dicūt,

C uideri potest appellata. Haliphloeos falsicortex a Theodoro dicta. Potest & recticortex, quia nonnulli apud Græcos, euthyphloeon eā uocent. Crassissimus huic codex, & plerūq; fungosus & cauius. Pessima carboni, & materiz. Nec putrescit alia etiā cum uiuit. Quin & fulmine ictus sæpissime, tamen si altitudine nō excellat. Ideo lignū eius, ne ad sacrificia quiddē uri fas erat apud Aeoles, Sphagnon, siue Splachnon, siue Phascon appellant, itemq; Bryon, pannū quendam mucosum, pendentē ex ea quasi uillos, ut in Cerro, sed nigriore breuioremq;. Vtūtur arbore Macedones, ad axes, & id genus utensilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus, præterq; fuillo generi, ut Plinius existimat, ac ne sui quiddē, si pabulū aliud habuerit. Quod quiddē Theophrastus Aspidri, hoc est, Macedonice cerro tribuit. Est autē Aspris, rara & improba glande sterilis, quæ caput tenet mandentiu, ut iligna. Cerrus, *κέρως* a Græcis uocat, glande omnī a marissima. Rarissime nascitur in cultis. Pannū quem dixi phascon, longitudine cubitali, brachiarū similitudine, mucosum, uillosumq; ferens. Nascitur e cortice, non e surculo, unde glās, nec ex gēma, sed e supernis nodorū si a latere. Lignum rectissimū, excelssimum, leuissimum, per longitudinemq; robustissimū. Aedificijs ineptū aspidris, si dedoletur. Ideoq; rudi duntaxat utuntur. Damnatum & carbone, quoniā exiliat, scintillascq; edat. Aeriorum tantū officij his compendiu: quia statu desinente, protinus emoriens, sæpenumero uratur.

De Fago & Illice.

C A P. CXLVI.

φάγος καὶ πρίνος

F agus & Ilex, quercus generi assignantur, & consimile munus ob eunt. Ilignæ radicis cortex cum aqua coctus, dum eliquescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia oīm tusa et trita, tumoribus p̄sunt. Et imbecillas mēbrorū partes corroborāt.

B A R B A R I C O R O L L.

Plini. lib. 16.
cap. 6. n. 19.
lib. 24. cap. 5.
Theophrast.
lib. 3. cap. 9.

F agus ea, ut quidam scripserunt, quæ in tenuissimas secatur laminas, glandifera non est. Id eoque duo genera, siue nomina Fagi sunt glandem ferentis. Materie scabra, quam Græci φάγος appellant, ut fructū quoq; Hippocrates. Et alterius quam Græci Oxyam, Lydi, Myson, Olympo eorum monte copiosam. Vnde Mysi populi, ut Strabo inquit, & Eustathius. Nostri Scissimam appellant, scdilem in laminas, similemq; abietū. Syluestrem, nunq; ut Macedones arbitrantur, florentem, e ectam, leuem, enodem, ligno colorato, robusto, neruofo, folio crasso, bifido, longiore q; pini, extremitate aculeato, radicibus nec multis, nec altis. Fructus glandis effigie leuis. Includit cauliculo echinato quiddē, sed blādo, nec hispido, ut in castanea, cui tū similis est dulcedine ac succo. Nascitur eadē candida, sed in montibus. Vtilis ad carpenta, lectos, subsellia, mensas, nauigia. Campestris nigra, & ad hæc minus petita. Fructus utriq; similis. In aqua durat æuis, ut robur, atq; ita firmior quoq; redditur. Humidissima hæc, & fraxinus. Quāobrem e duabus his lectuli, qui fierent, incuruant cedentes ponderi. Minoribus Scissima nauibus commendat ad carinas. Itē ad testudinem plaustrorū quoq; uectabulorūq; uilem fabricā, specie uisenda prouenire in agro latino solita, auctor est Theophrastus, tanta longitudine, ut nauibus Etruscis, pro carina satisficeret. Sunt qui Oxyam interpretant̄ Ornū. Ilex uero, Prinos græce dicta, post occasum uergiliarū fructificat, & anno proficit, ut putāt Arcades. Simul em̄ antecedenē fructum, nouus occupat, proptereaq; a nonnullis inter biferas descripta. Radix Illici multiplex, & ut syluestri altissima, folio roboris minore, aculeato, leuiore cortice. Arbor de amplissimis, ut rōbur, materie spissa & robusta, sed quæ frangat ac dissiliat sponte sua. Ob id Pericles Beocios Illicibus dixit esse similes, ut est apud Aristotelē, qm̄ ipsi se conficerēt intestinis discordijs. Glās exigua, & p̄ter glandē puniceum granū sunt hæc. Hyphear, & uiscū in ramis, ut alia nā sustinet, a septetrione uiscū, a meridie hyphear. Hanc & Aquifoliā, uel Aquifoliū uocari putat, siue paulo ab ea differentē, Theodorus Aquifoliā appellat, quā Theophrastus Ariā, siue Agriā, siue Narycan syluestre, & cui folia nunq; decidāt. Ita em̄ Dores uocāt, inq; quā Arcades Phellodryn, sempiternæ frondis arbore, mediāq; inter Robur & Illicē. Sunt qui Phellodryn aliud negent esse q; Illicem fœminā: ut Ilex ubi desit, utant̄ hac in carpentarijs præcipue fabricis, quod & Lacedæmone faciūt & Elide. Lignū intusq; Illici candidius, sed fuluius q; robori, Materia quoq; durior, sed q; Illici solutior in opere: foliū simile, sed iligno maius, & querno minus. Speciosior medulla q; Illicis: fructus minimis glandibus. Aequalis Acylon uocatur, quæadmodum & iligneus. Nam Balanos, siue glans robori propria tribuit. Acylon certe Lydi genitale ipm̄ uocant: quæadmodū & Balanos, pro glande Colis dicitur: Plinius contra q; Theophrastus, Phellodryn uidetur eadē existimasse cum subere, quod & Phellos dicatur, in fœminarū

✍

calciatus utilem hyberno tempore, ob id mulieres, facete a græcis, arborum cortices uocari. Est autem Suber, arbor procera, sine multis ramis, ligno robusto, cortice præcrasso & aspero in senectute, qui ut in Picea rūpatur, sed maioribus fragmentis, folio Fraxini crassiore longioreq; ac perpetuo. Glans Aquifoliæ. Corticem detrahare oportet, ne deterior fiat arbor: qui trienio post subnascit. Simulachra e Subere dñs facitata. Sed successit in eius locū palma. Hæc Theophrastus. At Plinius hæc, Suber inquit est arbor, glans pessima, rara, cortex tantū in fructu præcrassus, ac renascēs, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus. Vñs eius anchoralibus maxime nauū piscantiumq; tragulis, & cadortū obturamentis. Familiaris hæc arbor Theophrasti temporibus Pyrenicæ. Nec in Italia tota nascitur, aut in Gallia omnino. Sed & illinc nascitur confusio, q̃ Smilacē uocari legimus, quē dicatur Ilex in Italia, & in prouincijs Aquifoliæ: cum Smilacem Sestius eadem esse eum Taxo prodiderit. Recentiores sunt qui Smilacem cum Phellodrye faciunt eandem: haud ferendo errore: etiam si Smilax Ilici describitur a Theophrasto si milis. Dictū est de Aquifolia & in Cræteogono. Vt cumq; sit, Ilici inquit Plinius, duo genera, ex ijs in Italia folio non multū ab oleis distantes, a quibusdam græcis Smilaces dicitur, in prouincijs Aquifoliæ: masculas Ilices negāt ferre. Ilici honos, ad axes in plaustris simplicibus, hoc est, monostrophis. Item ad iuga lyrarum, psalteriorumq; Igniaria quoq; . Ciuiam ex Ilice primam fuisse diximus: cui ex æsculo successerit, dicāt Ioui. Lignum ex Aquifolia contractum ac discissum, Teda modo uritur, & a græcis in hoc usu Garbion uocari solet. Hoc & e quercu fit, & alio nomine Panos & Phanos appellatur, uulgo quoq; , quemadmodum e uirgineo libro, factæ lampades, Lophiæ dicuntur, & ex arundinibus Elanæ.

De Castaneis.

CAP. CXLVII.

Sardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, aut Lopima, aut Glandes Louis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent. Præfertur tunica, quæ carnem & corticem media intercursat, Caro his qui ephemærum biberunt conueniens est.

σαρδικαν
βάλανος
λόπιμα ἢ
κάρνα
λως βάλανος

Castanea, uergiliarū obitu fructificat. græce λως βάλανος, hoc est, Iouis glans, uocat. Cum tamen Iuglandis appellatio, nucibus tantū Regijs dicata sit a nostris. Noces uocamus & Castaneas, quanc̃ propiores glandium generi. Ideo apud Græcos appellantur balani sardianæ: quoniam sardibus prouenire primū. Euboidas quoq; a Græcis dici, quas nos Castaneas uocamus, lego. Sed & Castaneas primo dictas scribit Phocion, q̃ ab oppido Magnesiæ, quod Castanon dicitur, aduectæ sint. Vt forte Diodorus; noces Castanaicas inde nominarit. Quid si a castitate, cum Plinius ieiunijs fere dicatas eas innuat? Ex ijs, Græci Pogonias appellāt, quæ barbudas quasdam habent; nisi quis lanatas earum intelligat. Sunt enim aliquæ pilis hirsutæ. Tiberius Cæsar, balanum nomen imposuit satiuis, cura multo excellentioribus. Plura earum genera. Tarentinæ faciles, nec operoso cibo, figura planæ. Balanitides rotundiores, purgabiles maxime, ac sponte profusientes. Salarianæ, puræ ac planæ. Nam Tarentinæ, minus ijs tractabiles sunt, & Corellianæ laudatiores, & Meteranæ ex Corellianis factæ, rubenti cortice. Triangulæ, & populares nigrae: quæ uocantur coctiug, minima laude, patriæ commedatissimæ Tarentum, & in Campania Neapolis. Cæteræ suum pabulo nascuntur, scrupulose corticis. Intra nucleos quoq; ruminatiore. Armatum Castaneis echinato calice munimentum, quod inchoatum glandibus, trini quibusdam partus ex uno calice. Cortex lentus. Proxima corpori membrana, & in ijs, & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat. Torrere has in cibis gratius. Molitura etiam præstant, ieiunio fœminarum, ut ait Plinius, quandam imaginem panis, & ubicunq; fruges aliæ deficiunt, ut in Bergomatīs, Agri montanis.

B
Plin. lib. 17.
cap. 20. & lib.
15, cap. 25.

De Galla.

CAP. CXLVIII.

Galla fructus est Quercus. Aliqua Omphacitis appellatur, parua quidem, sed torosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana leuis, perforata. Eligi debet Omphacitis, quæ efficacior est. Vt utriusq; uis uehementer adstringere. Tritæ excrecentia in carne, fluctuosæ gingiuarum & uuæ, atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus, dens.

κνήσις ὀμφακίτις

C tium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagrent & uino aut aceto, aut acida muria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit efficax est. Et contra uulvas procidentes, fluctionesq;. Capillos denigrant aceto, aut aqua maceratæ, Dysentericis coeliacisq; cum uino aut aqua tritæ, conuenienter illinuntur, aut bibuntur. Obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua non nihil excoquendum est, quod ipsis conferat. In summa, his utendum ad adstringenda quæ opus sunt.

G A L L A R B A R I C O R O L L.

Plini. libro 16.
cap. 7. Theophrast. lib. 1.
cap. 6. 9. 9.

GALLA, a græcis *κακίδες* dicuntur, ad coria utiles. Hemeridis, Cerri, Platyphyllicæ, hoc est, latifoliæ, nullius fere usus. Quanquã similes hemeridi, tantum leuiores. Genera faciunt, medicinæ utilia, solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minorem. Galenus Onocidas, hoc est, quasi asininas, a rusticis uocari Gallas eas scribit: quæ fungosæ, flauæ, atq; magnæ sint, minus efficaces. Vis omnium similis. Optima comagena. Nasctur autē Galla, sole de geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa. Crescit uno die candidior, & si excepta est æstu. arefcit protinus; neq; ad iustum modum grandescit, hoc est, ut nucleo magnitudinem fabæ impleat. Nigra, eademq; resinacea, diutius uiret, interdum mali amplitudine. Deterrima ex robore. Signum eius, q; cauernæ translucent. Galla nigra, sine oleo flagrat. Robur Gallam fert minorem; & alteram, ut dixi, resinofam atq; nigram. Quæ glandem ferunt, omnes & Gallæ. Hemeris, id est, quercus, optimâ, & corijs, ut dixi, perficiendis aptissimam. Fert & nigram, tingendis utiliore. De Robore, quâ Theophrastus, agriamdryn appellat, discrepant sententiæ, Alijs semine, Alijs etiâ radice, quanq; sero, Alijs trunco nasci contendentibus. Item alij florere eam putant, alij negant, sed muscum floris loco edi credunt. Fructificat post Autumnû, circa occidentes uergilias. Ramos habet inconditos, crassum corticem, atq; scabrum, in senectâ maxime. Ac reliquæ quidem arbores, ut cæpere, continenter germinant, solæ Robur, Abies atq;

D Larix, germinatione terna parturiunt, corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt. Ob id Trislepri, siue Trislepi uocatæ, ut in Pinu diximus, hoc est, intermissariæ, aut trisquamig. Robori & Cachrys dicta, quam nonnulli Amentum appellant, innascitur, durans hyeme, de qua in Abiete monstrauius. Tardissime Robur cæditur, hyeme ineunte. Ante computrescit. Tempestiue cæsum, durat eius spissatum, ut cornu. Non desunt tamen, qui tempestiuu putent uere, cum amentum, hoc est, cachryn suam gerit. Medullam huius inter spissa commemorant, Melandryon uocatam. Aeterna in aquis materia, sed dulcibus. Mari putrescit: contraq; magna pars arborum. Hoc tamen & mari utile. Sed nauibus & ædificijs quoq; cæteris, quæ terra obruantur. Carbones e robore annofo & nouello damnant. Media ætas in precio est, quanq; utuncq; anteferantur, ex ariâ, arbuto, picea, præsertim metallis argenti.

E X M. V E R G. C O M M.

P Rimus lib. 1. de plantis Theophrastus multa eius genera tradidit, quem secutus Plinius eisdem uerbis omnia latinis reddidit, Quæ omnia ad duo tantum genera a Dioscoride contracta sunt. Credimusq; nos, quam hic *καρδωλίδιον* uocat, & nos articulorum in digitis magnitudine uertimus, eam esse, quam ille dixit magnitudinem fabæ habere, quoniam ad iustam magnitudinem non creuisset.

Dicendum breuiter, hoc loco etiâ, quam nos diminuta a columna uoce oris Columellam diximus, eam, quam græci *σαφύλη* etiam, latini uero uuam dixerunt, ea crassior facta & in flammata remedijs huiuscemodi indiget.

Quam deinde nos exhalmeni diximus, Plinius aliquando, ut credimus falsum acetum dixit. Sed maluius nunc græca uoce uti: quoniam de ea Plinius cum de exhalme ex professo egit, usus est. Interim satis sit ex nominis compositione, quoniam aceto & muria constaret, sic græcis dictam intellexisse.

De Rhoe.

- C A P. CXLIX.

R Hus, quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Erythros appellata, semen est coriarij fruticis. Ita uocari solet, quoniam coriorum in

fectores ea utantur ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascēs, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicantibus, in ambitu ferratis, acino uuarum gracilium, denso, magnitudine Therebinthi, quadamtenus lato. Cuius corticosa tunica per se utilis est. Folia uim habēt adstringendi, & Acaciae effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum infessuq; adijcitur. Infusillatur aurius purulentis. Gangrænas & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquamētum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem ut Lycium conueniens. Semē eisdem effectus exhibet. Cœliacorum, dysentericorumq; obsonijs inspergitur. Fracta, desquamata, liuida q; illitum ex aqua, ab inflammatione uindictant. Linguae asperitates cum melle abstergit. Candida sceminarum profluuiā sistit. Hemorrhoidas sanat, cum quærno carbone intrito admotum. Latex in quo semen machuit decoctus, cogitur, coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

BARBARI COROLL.

RHUS, siue ut Hippocrates, Roon, a Theodoro, fluida uocatur. Sterilis scemina est. Mas fructificat. Virgas, ut inquit Theophrastus atq; Plinius, fundit Rhus, breues & graciles, folijs Ulmi, longiore paulo, subhirsutoq; dispositio per uersus, ita, ut in nouellis ramorum, contrarijs int se pediculis, germina respondeat. Iis candidas pelles conficiunt. Flos in racemis albus, a quo semē collectum, lentis & terrebinthi similitudine, rubescēs, cum uua, qd uocatur Rhus: medicamenti necessarium, in eoq; osseum. Radix simplex pro summa cespitum coherens, ut facile possit uniuersa flecti. Nascitur ubiq; sed argillo sis potissimum, utiq; in Syria. quanq; habeo unde mihi hoc Rhus syriacum, siue ut Columella & Palladius appellant Ros Syriacus, parum distare uideatur ab hoc nostrate, qui frutex coriarius, & rhus erythris, a colore subrutulo uocatur, Dioscoridi & Plinio: quem Columella rorem futorium semel dixerit, qm Rhus scytopediscos & brisopediscos dicatur, cuius aridis folijs pelles, cuius malicorio perficiantur, crassitudine digitali, altitudine bicubitali. Quanq; Plinius, nisi librariorum ea sit incuria, cubitali prodidit. Duo faciunt omnino græci genera. Magiricon, quod additur in obsonia, idest, cum Syriaco, ut opinor. Alterum quod *supradictum*, idest, excoriarium. quandoquidem utrunq; in passillum, ex carnibus ceruinis compositum, & in pantolmium quoq; dictum requirunt, diuersis ponderibus, contra dysentericos & cruenta reijciētes. Habetur & syluestris herba, folijs myrti, colliculis breuib;: quæ tinea & uenena pellit, Rhus uocata, porro specie, quam Theophrastus supra reddidit. Contemplati sumus Rhum ex Umbria perlatum.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam huic frutici in Græcia duplex honor, & quod coquing, conficiendiq; pelli bus inseruit. Duplex etiam nominis indicatio. Latini, qui sale potius in obsonijs quam semine eius uti uoluerunt, ab altera utilitate nomen illi tantum fecerunt, futorum Rhum dicentes.

Posterior medicina, quæ barbaris uocibus plerumq; utitur, Sumach appellat, quæ uox contrarijs communis etiam in aliquibus locis est, non aliunde, ut credimus, quam quia folijs fruticis huius cōfecta fuerint, uocantq; eā passim coriario rum officinæ Sumach. Theophrastus in fruticose genere, et a spina alba paliuroq; & rubo statim eam descripsit.

De Palma. CAP. CL

PALMA in AEGYPTO gignitur. Ea medio autumnū uigore decerpitur, arabi Myrobalani similis, Pomatis cognomine, colore uiridi, & odore mali cotonei: quod si ematurescens sole percoquatur, Phcenicobalanus fiet. Palma acerba est, & adstringens. Contra alui sceminarumq; profluuiā, in uino austero bibitur. Hemorrhoidas sistit, Vulnura

Theoph. li. 3.
Col. li. 10. ca.
13. Pl. li. 13.
ca. 6. li. 24. ca.
pite. u.

B

Φεινξ πωμα
φεινικεδανος.

C glutinat illitu. Phœnico balani plus siccis adstringunt. Capitis dolorem afferunt. Copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo. Illinuntur cum cotoneo & carato cenanthino uesciæ uitij. Cariotæ præsertim faucium asperitati essu medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 5.
Lib. 13. cap. 4.
Theoph. li. 1.
ca. 2. li. 3. ca. 5.

Palmæ teneritas, processu lignescit. Vita in sicco æque ut in humore. Sabulosis salisq; gaudet, adeo ut in Syria Cœle, tribus dumtaxat locis, ubi arenæ sint, pueniat. Alibi putrescit, etiam si recentes earum palmulæ suaves gustu sint, nouellæ fructu nullo intus ligno edunt potest cum ligno. Paucos fere Palma ramos habet, scabro cortice, præcipue cum senescit. Medulla omnino nulla. Mari tantum flores, feminis statim fructus. E femine suo nascitur, ut coniferæ omnes, præterq; Babylone, ubi & uirga feritur. Tanto ibi unius eius usu, ut extare carmina scribant, quæ utilitates ex ipsa numero dierum anni pares esse prædicant. Simulacra ex hac fieri solita ueteribus, sed prius tamen e subere, ut diximus aliubi. Palma uictoriæ symbolus est, quod ut Aristoteles & Plutarchus inquirunt, non credit oneri quilibet ingenti. Nec intra flectit pandi turle, sed cõtra pòdus resurgit. Ideoq; in coronarij certaminibus fere aliud præmium q; Palma non dabatur, ut inquit Pausanias. Et id si Græcia quatuor tantum locis, oleastro, pinu, lauro, & apio coronare uictores mallet. Palma fumo infestat cremata, de quo & Cheremonis poetæ uersum Theophrastus prætexuit. Parit arborum sola fructu ceu in spica: qd ei siccitatis causa, & proprietatē quadam naturæ contingit. Fit & in alto Palma, fruticum generis, fronde corioli, breui taudice, uirgis testis: parte ima non in orbem, sed in latitudinem sigillatim ambientibus, cõtinenti serie aliqui tñ interrupta. Color totius plantæ puniceus. Surculis eius natura foliorum acanthinorum, qualia soncus, & cetera id genus. Sed recti tñ sunt hi, nō ut illis recurui. Palma porro ægyptia, quam Dioscorides hic describit, Myrobalanon appellatā fert, nullo intus ligno: quæ & Adipso, & Poma nominat. Phœnicobalanus niger est, quia maturefcere per mittitur Myrobalanus uindis. Habetur & Myrobalanus unguentaria cognominata, sed generis alterius, suo loco indicanda. Quid autem sit Chrysobalanus apud Asclepiadem, ad ardorem stomachi singulisq; adhibita, non comperi. Ægyptia uero, ut Solinus inquit, sitim sedat, utiq; ante maturitatē decerpita. Maturā sensum, gressum, linguam retardat & inebriat Phœnix appellatæ græce Palma, unde fructus dependent Spathæ. Palmulas e mari Plenes, e femina Balianos appellat, ut Iulius Pollux tradit; qui sumpsit ab Herodoto. Est & Phœnix herba, ut post constabit. Itēq; musicū instrumentū, ab inuente ita dictū: siue, ut alijs placet, quia primū ex Deliaca palma cubiti eius facti fuerint. Ipsos palmarū cū fructu termites, Baia & Spadices græci, præsertim Dorici, appellat: a q̄ & color eqno generi, spadix, aut spadiceus & phœniceus, hoc est, palmeus: unde uulgo q̄q; Balus, aliq; Phœniceus, pprie is ē, q̄ uermiculus et puniceus uocat, ab Eusebio siue Hieronymo in chronicis: nomē hñs a Phœnice illo, q̄ literas inuenerit. Reperio & Parium & Balias colores equis attributos. Sed pro uario Euripidem, est Balias. Scio & Achillis equum Balias uocatum, & equos Balias, pro celeribus quoq; acceptos a Poetis. Nam murinus color, a mure dictus in equino genere, is est quē græci psaron, quasi a sturno appellat. Cerebrū palmæ Galenus Encephalō, Dioscorides Encardiō, hoc est, medullā uocant, quod & esculentum est. Palmarum plantam Cephalonem uocari, Palladius autor est.

D

Lib. 13. cap. 4.

P A L M V L A E Caryotæ, celebrantur cibo. Sed & succus earum uberrimus est, ex quibus præcipua Orienti uina, capiti iniqua, unde Pomo nomen. Ex his & acetum & mella fiunt, & farina Babylone. Nuclei pro carbone sunt. Et pabulo quoq; iumentorum aqua macerati. Laudatissimæ in Iudæa: nec tota, sed Ierice maxime. Quanquam & Archelaidæ in precio & Phaselidæ, & Lybiadæ, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua, succo pingui lactentibus: quodamq; uini gustu, in melle prædulseibus. Tria Caryotidum, siue Caryotarum genera. Nicolai, sicciores, amplitudinis uasæ, ut quæ cubitorū quaternum longitudinem cõpleant: ab Augusto ita primo nominata, in honorem Nicolai peripatetici Philosophi, crebro eas ad se missitantis, ut inquit Athenæus. Alterum genus minus speciosæ, sed sapore Caryotarum proximo sorores, unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rumpente se pomo in parente ipsa quoq; calcato simile, ob id Pateion appellatum. Aristoteles in libro de stirpibus, Eunuchos appellari scribit, quoddam genus Palmulæ, quod alijs Enorchos uocent, quasi testiculares ac spadonias.

E *ἢ ἀφ' ἑσθ' πταίνουσας*, &c. nullo sensu, si sic legatur apparebit. Neq̃ em̃ de coctura Palmę hoc loco agitur, sed quod Plinius uertit, Quod relinquitur Phenicobalanus uocatur: ideo q̃ nos diximus, eadē si usq̃ ad maturitatem in arbore relicta fuerit, mutato colore & nomine Phenicobalanus dicit̃. &c. quasi non *ἀφ' ἑσθ'*, sed *ἀφ' ἡσθ'* legendum sit. sensus enim est, Aegyptiā palmulam ante totam maturitatem lectā, uiridi colore esse, & appellari *πῶμα*. Si uero in arbore relicta, penitus maturuerit, tunc mutato colore Phœnicobalanum, idest, puniceam palmulam dici, monet res ipsa: quia nullus erat sensus, si *ἀφ' ἑσθ'*, idest, decocta fuerit, legeretur.

¶ De Thebaicis Palmis.

CAP. CLI

T Hebaicarum decoctum potu, æstuationem sedat. Vires recreat cum hydromelite ueteri sumptum. Cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniēs. Decoctum potu & gargarisatione magno p̃pere adstringit, & cohibet. Nuclei Palmarum cæterorum more cremati in crudo fictili, et uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt. Misceturq̃ in calliblephara. Quod si non iustam uersionem acciperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum uuam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum Nardo effectum præbent. Corporis excrescentias reprimunt. Vlceras ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus ægyptiæ.

Θόνιξ θηβαϊκή

BARBARICOROLL.

P Almulæ thebaides, in totum arentes sunt, quemadmodum & arabicę, macro corpore, exiles & torridę, crusta obductę uerius q̃ cure, iudaicis, ut inquit Strabo, suauiores, etiā si duri ores, nec alio tractu Aegypto tota nobiles. In ipsa quidē Aethiopia friguit hæc, tanta est siccitas, & farinę modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice, ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore q̃ mali amplitudine, Cyces uocant. Triennio maturescunt. Semperq̃ frutici pomum adest, subnascente alio. Hanc palmām Chamezelon uocatam a Diō scorde, quam nos pumillam interpretati sumus; Aliud ab ea genus est, quam Theophrastus Chæeriphem appellat, hoc est, abiectam & repentem humi palmam, folio latiore atq̃ molli, ad uitalia utilissimum, de qua in Taxo dictum est, copiosam in Creta, sed magis in Sicilia. Thebaidis fructus extemplo in cados conditur: ni ita fiat exanimatur, marcescitq̃ non retroitus furinis. Ebenus Aethiopica palmarum generibus fere ascribitur, ut diximus. Syluestris Palmę fructus existimantur a recentioribus, quos officinæ Tamārindos modo nominant: & qdam a saporis acrimonia, Oxyphœnicas, algentis naturę contra bilem flauam pollutis. Sunt qui folia ei salicis describant similia. Non inuenio e ueteribus, qui de hoc genere quicq̃ prodiderit.

Pli. li. ij. ca. 4.

B

¶ De Palma Elate.

CAP. CLII.

P Alma, quam aliqui Elaten, aut Spatham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, tegumētum est, calyxq̃, quo in spissa menta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria. Sistit ulcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmat̃is & malagma tis. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmat̃is. Eius decoctum subinde deersum, capillos denigrat. Datur bibendum congrue renum uesicæ, & uiscerum uitij̃s. Vuluæ ac uentris fluctiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elate etiā uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathæ effectus præ-

*Θόνιξ ἑλάτη
αἰνία*

Cstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

Pli. M. 12. ca. 22

PALMA Elate laudatur, Hammoniaca maxime. Tum Aegyptia, demū Syriaca, dumtaxat in locis siccantibus, odorata, pingui lachryma: quæ in unguenta additur. Elatem, Galenus tenellum palmæ germen intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum. Alibi genus est, ut in unguento Elatino diximus. Non ignorauit hoc Secundus noster, cum inquit, palmam Elatem conferre medicinæ, germina, folia, corticem. Caro Palmam hanc intelligere mihi uisus est, cum dixit, odoratum uinum fieri e Palma: quam habent Vnguentarij. Abies ergo duplex est. Vnguentaria, & materiaría, uulgo nota: unde abiegnæ trabes dicuntur, & Abietarij negotiatores, atq; fabri, pro eo q̄ est lignarij. Abies quia in cœlum abeat, a proceritate uidetur appellata.

VEXM. VERG. COMM.
Idetur Plinius lib. 25. cap. 6. Elatem, siue Spatham hanc, de qua Dioscorides hoc loco ait, in censu, & historia Palmarum, proprium habere genus credidisse, quæ medicinæ conferret, germina, folia, & corticem: cum tamen ceteri omnes non palmam, sed palmæ partem indicent, & multifariam appellent. Verum de hoc alias.

M De Malo punico. CAP. CLIII
Alum punicum omne boni succi est, stomacho utile, nullum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur. Sed aliquantulum in eo calorem gignunt. Inflationes pariunt. Vnde in febri abdicantur. Acida adstringunt. Aestuanti stomacho auxiliantur. Et multo magis contrahunt, ac urinā cient. Ora, gingiuasq; lædunt. Vinosa uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachum q̄ sistunt. Cœlesti aqua madescunt, bibunturq; comode sanguinem excreantibus. Ad defessus dysentericorum, foeminarumq; fluxione uulug laborantium utiles sunt. Expressus nuclei succus coquitur cum melle ad oris, uirilutatis, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore exuberant, aurium dolores, & narium uitia, præsertim acidi.

Pli. li. 15. ca. 19.
lib. 5. cap. 17.

PUNICA, contorto & breui trunco, flore contra q̄ reliquis arborum puniceo. Excipiunt a mygdalarum quoddam genus, quæ subrubicundum florem sustineat. De acida planta uel semine, uinolenta dulciscq; in Aegypto exit in Cilicia, circa Solos, ad Pinarum amnem, ubi contra Darium pugnatum est, ut Theophrastus inquit. Omnes sine nucleo proueniunt. Sola hæc, & Vitis, & Ficus, & Malus, caudice fisso non emoritur. Aculeos gerit in ramis, ut Paliurus & Rubi. Punicum malum Chartagine laudatissimum, indeq; cognomen, Malum punicum. Et Romæ locus erat in regione sexta, ut inquit Suetonius, quæ alta quoq; semita dicebatur, ut est apud Martialem poetam, ubi nunc uidelicet Dioclitiani thermæ sunt. Genera summa duo. Alteri nudus adest lignosus, Sclerococœon ob id uocatum. Alteri nō adest, aut certe minimus, quod ex argumento Apyrenon dicitur, penultima producta, licet correpta Martiali. Archestratus certe anguillā, ut spinis & ossibus carētē, solā piscium Apyrenō esse cecinit hoc uersu.

ἡ χίλις ἢ πέντε ἔσθ' ἀπὸ πέντος μόνος ἰχθὺς

Quæ autem sit Paulo æginetæ radix Apyrani, ex qua recentū discussorum cataplasma diapyranu, contra collectiones fingitur, ignoro. Natura sunt candidiore Apyrena, & blandioribus acinis, qui minus amari sint, distinctiq; membranis. Est & alia structura eorum communis, tanq̄ in fauo nucleos habentium, quinq; species, dulcia, acria, mixta, acida, uinosa, Samia & aegyptia. Distinguunt erythromis, & leuocomis. Ita nouē genera colligunt omniū. Dulcia sæpe intelliguntur, cū apytena dicimus. Vinolēta nucleū fere paruum habēt. Vnam in ijs, ac ne mustum quidem, sed uinum protinus aperuit natura, Apyrenis & uinosis, cortex asperi-

or. Ex acerbo siue medicamentum Stomatice uocatum. Sicut ex Mori quoque succo, Panchristos cognominata. Acinos, granatis totidem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uariet, modo ex eadem arbore legantur. Satam primum in Cypro Malum punicam a Venere, testantur fabule grecorum. Beteri, malum punicam ibidem, ut est apud Callimachum, & Sidem Hippocrates, alia grecia Rhoan & Rhoean, pomum quoque Rhoeas & Rhoidia & Rhoe dia uocare solent. Inuenio & Rhoadrion uocari a Paulo in quodam cataplasmate, cui nomen Aphroditario est. In quod & rus, & amylum, & squama aeris, & cerussa queritur. Nani Aloida rion ex aloë medicina est. Sidem porro & Boetia terra dicitur; a qua et arbori nomen datum. Quo argumento Athenienses ab Epaminunda in Side regionis quaestione uicti niemorantur. Legitur & Theophrasto Side frutex quidam, ut Athenæus interpretatur, punitice malo similis; Orchomeno lacu nascens. Theodorus gaze non punitice, sed papaueris similitudine descripsit, quia Rhoas, & punicam, & papaueris genus unum significet. Quamquam discrimen illud, quod pro arbore primæ declinationis nomen est, & rhoea, non rhoas dicitur, pro papauere in tertiam referretur, Rhoas, Rhœdis. Theophrastus certe non Rhoeadia similem, sed Rhoæ dixit. Vt utique sit de Sida, Theodorus ex Theophrasto ita scribit. Sida papaueris, ingit, habet similitudinem, capite ad portionem maiorem, ut quid magnitudinem mali referat, nec nudum id est, sed membranis candidis obducitur, superque eas folia rosæ cum suis continentur caliculis quaternis herbacea, de hiscens uero grana rubra, exigua, orbiculata ostendit; nec magnopere maiora quam milium, sapore tritici diluto, crassescit æstate paruo pediculo: flos callicibus rosarum similis, quamquam duplo fere grandior; hunc & folium super aquas manere, sed ubi defloruit, inclinari magis in uadum: donec attingat terram, atque ita fructum fundere: folia pecudibus, germina uulgo generi, semen hominibus manditi. Cognominem huic haberi & in Nilo scribit idem Theophrastus herbam, sed radicibus carentem. In tumulo Menœcei, Creontis filij, ad Boetias Thebas punica nasci traditur Pausaniæ, cuius poma intus sanguineum colorem præferant.

N O T I O R Q U A M ut tractari longius a nobis debeat, Punicorum omnium historia & usus est. Illud tantum animaduertendum, quod uno excepto, in cunctis legitur grecis, τὸ δὲ ἴδιον τὸ πυρὶν ὑπαρθεῖν ἐν ἡλίῳ. &c. & a nobis contra communem significationem conuersum est: Acidorum uero acini in sole siccari. πυρρινος enim greci nucleos pomorum, quales in cerasis, prunis, & uuis sunt appellant, πυρρινος uero acinos; nihilominus tamen πυρρινος acinos, non nucleos uertimus. Primum, quod in probatiss. non πυρρινος erat, sed πορρ, quod liquore significat, quasi ad cohibendam aluum, & in stomachum destillationes, non acinis, nec nucleis hic uti iuberet, sed ex acinis expresso liquore, eoque in sole siccato. quod sensus forte ab similibus uero non est.

Certius quod sequitur idem ostendit, τοῦ πυρρῶν δὲ τὸ ἀπόδιδμα τῶν πυρρῶν, quod est utilissimum, & quod ex nucleis expressum fuerit, decoctum & melle mixtum.

Quod enim exprimitur, uulda acinorum caro est, non duri & arentes nuclei: idque Plinius libro. 24. cap. 7. quoque confirmat.

H De Cytino, idest, flore Punici. **C A P. CLIII.**
H V I V S F L O R E S Cytini uocantur, qui adstringunt, sic cant, cohibent. Sanguinolenta glutinant. Quas Punicum præstant utilitates. Humida gingiuarum uitia, mobilesque dentes decocto colluuntur. Hernia pro lapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memorie tradunt, qui tres quæminimos Cytinos deuorauerit, nullâ eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidi exemplo.

C Y T I N U S aliter ab alijs exponitur. Dioscorides & Galenus florem satius punitice ita uocant, Balaustium Syluestris. Plinius pomum ipsum immaturum, & primum partum eius florere incipientis, Cytinum appellat. Flores ipsi Balaustia, in ipso erumpentes Cytino uestibus tingendis; quarum color nomen inde acceperit. Cytinum Dioscorides cognominat ipsum quoque Apollinaris herbe florem. Ceterum non proprie, sed per translationem. At Cicum, M. Varoni dicitur membranula prætenuis, in malo punico discrimen. Vnde Cicures animantes, quæ non sunt feræ, atque agresles, a quo Veturij quoque nobiles cognominati Cicurij, Etenim Sifen

Pli. li. 25. ca. 6.

Cna, Terabite, syluestri arbusio posuit. Partim inq; Terabite, partim Lauro atq; Pinu abundat.

¶ De Malicorio. CAP. CLV.

Αλικάριος

Malicorium asperum est, mali Punici putamen, quod aliqui Sidi non appellant. Id spissandi uim habet, & quos Cytini, præbet usus. Decoctum radicis potu latas uentris tineas pellit. Et easdem euocat.

BARBARI COROLL.

Malicorium, græci Sidion appellant, ex acerbis prælatum, ad perficienda coria. Nam & arbor ipsa, ut prædixi, a Boetis Sida uocabatur.

¶ De Balaustio. CAP. CLVI.

Βαλαύστιον

Balaustium syluestris Punici flos est, Cytino similis. Cuius com = plura genera reperiuntur, candidum, fuluum, rosaceum. Lique = mentum ex eo fit, hypocistidis modo. Cui adstrictoria uis inest, eadem faciens hypocistis & cytinus.

BARBARI COROLL.

Pil. II. 13. ca. 19.

Balaustium, græce quid esset, dictum est in Cytino. Quidam caducum appellare modo uolunt, a græco detorquentes. Mihi appellatio antiqua perplacet, Nec tantum græca fastidio, ut latina deteriora probem. Ausonius Baulaustum, siue Balaustum, non Balaustium in carmine pronunciat. Item Columella. EX M. VERG. COMM.

De Balaustiorum nominis causa & origine, nihil pro cōperto nobis est. De uiribus hoc breuissime Aegineta tradit, efficacissima in adstringendo esse, sicca frigidaq; naturā habere.

¶ De Myrto. CAP. CLVII.

μύρτιον

MYrtus satiuā, nigra, utilior est medicinæ q̃ cādida. Sed hac multo magis mōtana. Semen tñ imbecillius parit. Vis & Myrti & seminis adstringit. Semen uiride aut aridum in cibo datur sanguinē excreantibus, & uescē erosioib. Succus uirentibus baccis exp̃ssus, eosdē effectus exhibet. Stomacho utilis. Urinā cit. Prodest cōtra phalāgij morsum, & scorpionis ictus in mero. Seminis decoctū capillū tingit. Ius decocti in uino ulcera ī extremitatib. sanat. Oculorū inflammatiōes illitū cū polline polēte, lenit. Cōtra ægilopas illinūt. Crapulā arcet p̃sumptū uinū, qđ feruē factio semine exprimatur: alias enim acorem contraheret. Præstat uinū seminis effectus. Vtile procidentiae uuluarum in deflectionibus, sedis uitij, & fœminis fluctuone uulug laborantibus. Purgat fures, ulcera capitis manantia, atq; eruptiones papularum. Fluentes capillos continet. Additur quoq; in medicamento qđ liparas uocant, uti oleū qđ ex folijs eius factū est. Decoctū foliorū ad deflectiones balnearū cōuenit. Et cōtra laxatos artus, & male solidescētes. Eo fracta ferruminatiōi repugnātia utilissime fouentur. Vitiliginē emēdat. Purulētis auribus infundit. Et capillos denigrat. Succus eadē efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulcerib. & mēbris omnib. fluctiōe laborātib. coeliacisq; p̃sūt. Et admisto omphacino oleo, aut exiguō rosaceo cū uino ad ulcera serpētia, ignē sacrum, testium inflammatiōes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētū foliorū farina utilitē inspargit paronychij, pterygijs, & cōtra alarū feminūq; p̃fusiōes. Cardiacorū sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cęrato, ābustis, paronychijs,

pterygijſq; medent. Exprimiſſ folijs ſuccus aduſo uetere uino aut aqua A
ceceſti, cuius recētis uſus ē. Nā exiccātus plane carīe ſetit, & uires amittit.

Myrus, græce *μύριον* dicitur. Item Myrſinos, & Myrſine. Item Phibaleos, ab Antipha-
ſe. Sed & Myrton, ab Archilocho. Degenerat in frutiſcē, niſi crebro repurgeſ. Vita ei ut
quibuſdā animalibus ambigua, hoc eſt, terra & aqua. Precipuus odor Myrſis Aegypti; ubi cæ-
tera omnia hebeſcunt. Semen apud Menandrum Synariſtuſin manditur. Myrtum & Myrta di-
citur a Catone, maſculino & ſceminino ſexu, græcorū (ut arbitror) imitatione, Item Murra
Varroni, unde Murtaſi, ſiue Murtaſulū, genus ſarciminis, q̄ ea large ſarcireſ in teſtinū craſſius.
Vſus bacce antiq; plibo fuit, ante q̄ piper habereſ. Gñolum inde obſoniū, cognōmine Myr-
taſi. Cōmēdant Myrſiſq; iura, p̄ſertim aprorū. Peregrina Italiæ arbor, atq; etiā Europæ quorū
dam. Pacifera Romę habita, uice cuius uerbena nūc, laurus & olea prætendi inter armatos ho-
ſtes quietis indicīū fuerit. Purificatōibus quoq; ſuffimētisq; adhibita. Ob id & in coronis utē
bant ea theſmothetæ Athenis. Præſt Venus arbori, quippe q̄ litioribus maxime pueniāt: Ve-
nus autē mari dicī orta. Hinc & arbor ſacra coniugio. Græci arborē Minervæ, ut Olēa dicant
cōmenti fabulā, q̄ Myrſine Athenienſis puella fuerit, pulchritudine ac robore inſignis, amica
Palladi, quā iuuenis, ab ea curſu & palæſtra ſuperatus, interemerit. Catonis faſtigia ſunt candi-
dī, nigri, coniugulī. Alia diſtinctō eſt, ſatiuæ, ac ſylueſtris: & in utraq; latifoliæ. De ſylueſtri age-
tur in Oxymyrline. Satiuarū gñā ropiarū faciunt. Tarentinā, folio minuto: noſtratē, patulo:
forenſem, hoc eſt, exoticā, p̄denſo, uerſibus foliorū ſenis. Hæc non eſt in uſu. Vtraq; alia ramo-
ſa. Coniugulā, quæ & Coniugalis uocaſ, noſtratē dici exiſtimāt. Ouantes myrtea corona uſos
quādoq; tradunt, ut triūphantes Lauro. Celebris eſt Hippolyti & Phædræ amoribus Troeze-
niā, cuius folia, ut inq̄ Pausanias, prope Veneris delubrū ſatæ pſorata naſcebātur, iniuriā ui-
delicet ſerentia ſcuiuentis unguibus, & calamitriſ ſcœnizæ. Myrtæ ſunt, ipſæ Myrſi bacculæ.
Controuerſum fuit apud Græcos, quod nam coronæ genus eſſet Anacreonti, Naucratites ap-
pellata. Etpluribus uiſum eſt, non aliud eſſe, q̄ ex Myrto, roſis comitantibus. Alij papyrū co-
ronariſ: quā Aegyptiū Biblon ſephanoridā cognomināt, interpretantur Alij e ſampſucho
ſertum, q̄ in Aegypto copioſiſſima ſit ſampſuchus.

Quia porro de coronis inſcit ſermo, inutile nō arbitror quædā huc tranſferre, q̄ alio à no-
bis opere dicenda ſeruabātur. Ergo Leſbiū, ut inq̄ Athenæus, Myrſi ramulos Hypothymidas
uocāt. Iſis ſe coronāt implexis floribus. Alij p̄ ſcōrales coronas: quibus & ceruices quoq; redi-
mibāt, Hypothymiadas, Hypothymidasq; dicebāt. Habeſ & Hypoglotis, ex Hypogloſſo her-
ba, quæ poſt dicēſ. Item Iſthimion, quā plariq; Iſthimiacā appellant. Pyleones uero ſerta ſunt,
quæ lunoni circundabātur, utiq; apud Spartanos. Sicyonj celebrāt Iachachas, ex Iacha flore
quodā odoris cōmēdaſſimi. E Myrto conſtāt & Hællorides uocatæ ambitus ingentis, cubi-
torū uicentū: ab Europa dictæ; quā Elloridā Corinthj appellāt, q̄ eius oſſa in Myrto condita ſe-
rātur. Quidā Eloridā & Minervā dictā uolunt. E Palma Piſilimi ſunt, quas Lacedæmonj Thy-
reados uocāt, a loco ubi caſtra hoſtiū cœpere. E ſerta Campanica Melirotini, quanq; ex omni
gñe coronamētā muliebriā in eo uocabulo Græci fere intelligūt. E Loto Aegyptia ſit Antino-
ſos, utiq; non omni, ſed ex ea quæ colore roſæ naſcīt. Ex ea uero quæ ceruleū eum habet, Loti-
rios tantū dicēſ. E roſa cyliftoſ maxie, quas & Eclyſtiſtas cognomināt. E Struthio Struthiū. E
Potho, Pothos. Eſt autē Pothos duplex. Alterū genus Hyacinthi flore. Alterū ſine colore can-
didū, quo ſepulchra coronabāt, a quo & nomē quaſi deſyderatis eſſet dicatū. Theodoros deſy-
deratū cōuertit. Floret æſtate. Diuturnius eſt candidū. Habeſ & Aegydon coronę genus Eubū-
ſo, aut ex Anagalide, ut arbitror, quā nōnulli Aegylin uocabāt. Aut e Lygo. nā Lygos Aegy-
liſ a quibuſdā uocaſ. E Lygo autē coronas fieri ſolitas antiq; in Vitice docuimus. Aut grami-
ne, quippe q̄d ab aliquibus Aegriōn uocēſ. Nam Fauni arundine ſerulaq; uinciebātur. A tillia
Phyllirinos, Synthematicos, Ariſtophanes cū dixit, coronas uidēſ promptuarias & parabiles
intellexiſſe, nō multū a triualibus & promiſcuis diuerſas, quæ a Græcis Chydeæ, quaſi conſu-
ſanæ uocātur. Choronos, Ap̄pion grāmaticus, apud Philetam, a choro dictos putauit. Vnde
apud nos coronæ ſint uocæſ. Sitr & Acinj, corollæ genus ex Acide, ita dicī ſlos & ſarū quod
dam, ut Athenæus & Pliniū ſcribunt. Sunt & Eliēt ex Helice, familiares Alexandriæ, nec
non alijs quoque floribus plicatiles. Nam Tindizæ, Abydæ, ab oppidis Aegypti, ex ſpina
ſunt Aegyptia, nemore ibi ſacro Apollini ſemper florentē, multis cōmitatē fabulis, quas re-
ſerre, ut non piget, ita certe parū intereſt. De ijs & in Aegyptia ſpina diximus, ex Demetrij ſen-
tentia. Coronamētū nomen uidēſ, & cuius mentionē ſecit Grauius, Coſmofandallos uocātū.

B A R B:
Plin. 15. ca. 29.
lib. 23. cap. 91.

**Coronarum
genera,
B**

Cuius inuentores Lacedæmonios fuisse Clearchus auctor est. Ariadnēs coronā e flore Theleo dicto perhibent fuisse. Id sātū radice describit amara, ut Theophrasto placet, de quo Timachidas poëta græcus cecinit. Intuenias & Apragmosyn uocatū, coronariū quoddā fatum, apud Aristophanem poëtā, ut grāmaticus Aristophanes interpretat, Athenis in academia nasci solitū. Anethinis quoq; sertis ufos ueteres, & Alcæus, & Sappho testes sunt. Coronas in Græcia faciūtas, a Stephano primō dicunt, ob id & nomen sertis datū, ut Stephani uocarentur. Austorem & inuentorem coronæ lantum biforēm fuisse græci affirmant. Hybernas corollas nō stri Corneas uocabant, q̃ e cornu fierent, in florū defectu. Sicut ex omni florum genere, Pancarpias. Dictum est & in Vitice de coronis alijs. Itemq; in Elichryso.

E X M. V E R G. C O M M.

Myrus differt a Rusco, quod minor & quod Græci dicunt *ῥυσπος*. Ruscus uero cuspidatis folijs, uulnerās magis quā pungens, asperior & indomita est. Qualis autē sit Ruscus, cum de Nigra Myrtū ueteres dixerunt, quæ candida comparata nigresceret, & candidam quæ nigra comparata albesceret, Præfertur in omni bus in medicina nigra, teste Columella lib. 13, cap. 38.

De Myrtidano.

C A P. CLVIII.

Myrtidano

Myrtdanum dicitur incrementum inæquabile, uerrucosum & concolor. Quod perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Magis q̃ Myrtus adstringit. Tustum addito austero uino reponitur, coactumq; in pastillos siccat in umbra, multo efficacius, & folio & semine, cærato, pessis, infessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23, ca. 9.

DMyrtidano, a Galeno Myrtada nominatur, uirgultum & soboles Myrti: qualis fortasse in Ficu quoq; fructificat, exiens ab radice, Myrtidano certe Plinius pro uino accipit, quod ex syluestris Myrti baccis sit conditum, libra in tribus musti congijs deferuescēt, donec duo supersint. Hippocrates Martidanum uidetur appellasse hunc fruticem. Myrtidanū uero ipsum piper, ut post dicemus.

De Cerasijs.

C A P. CLIX.

nigra

Cerasia uentri utilia sunt, si uiridia sumantur. Eadem siccata aluum sistunt. Gummi quod Cerasi refudarūt, cum uino diluto tussi uetustæ medetur, Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex uino potum calculosis auxilio est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 15, ca. 25;

li. 23, ca. 7. lib.

16. ca. 18. Theo

phr. li. 3, ca. 17.

Cerasus, in quatuor & uiginti sæpe cubita erigit, crassa, dodrantibus quatuor ab radice. Folij Mespili durū, & latius corticis leuore, colore, crassitudine. Similis Tiliæ, ob id apta cistis, ut Tilia. Hæc meatu flexo, nec girū complente, abducit arbori ab infernis sursum uersus in angustias colligendo sese, qualis in fronde ipsa quoq; descriptio est. In eundem modū, & desquamatio euadit. alioquin præcindit potius q̃ filo eodē auferri possit. Per crassitudinē secto tenuitas folij detrahīt, nec arbor emorīt, q̃ si totū deglubas, qui reliquus sit, tunc humor elabit. Tunica porro exteriore adempta, nigricat. Interior pituita quādā mucosa, & uice illius secundo anno tenuior, altera subnascit. Nerui ligno contorti cōuolutiq; in anfractus, ut cortex uirgis contūo q̃ nascunt idem most: rami dum adolescunt, aliq; subinde pereunt, ut qui ab imo sunt, aliq; cōtinue crescūt, ut supni. Prorsus arbor de rāōsis nō est, minus etiā aliquāto q̃ Populus. Radix multijuga, & summa telluris cute nec crassa. Contortio eadē radicis & corticis, radice tegētis, flo re albo, piri uel mespili, e racemis fauaceo. Fructus ruber diospyri figura, magnitudine fabæ. Quæ acinus diospyro p̃durus, ceraso mollis, ut Theophrastus inquit apud quē diospyros, hoc significat, qd lithospymon Dioscoridi & Plinio, ut arbitror. Nec Theodorū satis p̃bo: q diospyron, Iouis flāmam interpretatus est: cū Iouis triticū in terptari debuisset: quādo & uulgaris quoq; sermo granū solis appellare consuevit. Nascitur Cerasus ubi amnes & uigna, oīnoq; ubi Tilia. Italia Cerasum Lucullus intulit. Nunc trās Oceanū, & in Britanniam quoq; uēctā. In Aegypto

nulla cura eualuit, ut prouenire posset. Genera nominantur Aproniana, quæ maxime rubeant, Actia nigerrima, rotunda Ceciliana, Iunianis gratus sapor tantum, sub arbore adeo teneris, ut gestatu marcescant. Principatus Duracinis, quæ Campania Pliniana appellat, in Belgica Lusitanis. In ripis etiã Rheni. Tertius hys colos e nigro ac rubenti, uiridique, similisque maturefcentibus semper. Sunt & laurea Cerasa in Lauro primũ insita, non in grate amaritudinis. Hinc Amarasia dicitur uulgo, quasi amara Cerasia. Et enim pomũ ipsum non cerasum, sed Cerasiũ uocari, Seruius precipit: cuius & illa quoque uerba sunt. Cerasiũ inquit, & anteq̃ e Ceraso urbe Lucillus adueheret, erat in Italia, sed durum, & cornu appellabatur: quod postea mixto nomine Cornocerasiũ est uocati. Sint aut̃ Cornocerasia idem cũ Duracinis genus, an uero Seruius credendũ, qui Cornũ in Italia Cerasium fuisse prodar, cũ alia res sit Cornus, alia Cerasus omni no, satis ambigimus. Cerasiorũ porro discrimen alterũ, quod Romæ Visulũ appellat, frequentissimũ in Germania, & Gallia. Sed in Scythia fere supra modum, ubi & Viscina Barbari cognominat, ut Pomponius Lætus, qui ea loca modo inuisit, constanter affirmat. Sunt Macedonia, parua arboris, raroque tria cubita excedentis, Chamæcerasi uocatæ. Pomũ hoc, primã colon o fere gratiam uerentis anni refert. Primo candidum, mox rubescit, deinde nigræ septentrione frigidisque gaudens, siccatur sole, conditurque ut Oliua cadis. Medium Cerasis genus, inter acinos atque baccas, sine ossẽ. Quemadmodũ nascantur, Græci & Latini monstrauere. Fatigatur canicularum aestu Cerasus. Defendit hoc incommodũ, ut inquit Palladius, herba Symphoniaca, trunco arboris eius circũdata: nec qualis herba ea sit, offendit. Quemadmodũ neque Græci Polypremnon appellatam, cuius succo ægrotas arbores oblinere præcipiunt. Nisi quis Apuleio credat, Symphoniacã tradenti, eãdem esse cum Hyoscyamo. Plinius Symphoniã herbam describit alternis uiridibus, roseisque per caulem folijs, in posca sanguinẽ resicientibus mederi. Hanc aliqui Cremphenã scribunt, aliqui Symphonã, alij Comphenã, aut Somphenam. Quod si pro Hyoscyamo sumi posset, non folijs alternis uiridibus, roseisque, sed floribus legendum erit. Quandoquidẽ Dioscorides ita dicat, *παρά δὲ τὸν καὶ τὸν ὀφείλει περιφρασεῖσθαι ἀνθρώπων γούναρ*. Accedit, quod eruptiones sanguinis Hyoscyamus quoque laudatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Aliter de Cerasijs docet lib. 6. Paulus Aegineta. Saporẽ enim tribuit, quod hic ex siccitate, contrariocque habitu eorũ decernit. Si quidẽ monet, quod dulcia sunt, citissime dilabi, austera stomacho utiliora esse, Acidã uero, ob incidendi uim, habent pituitosis, & excrementosis stomachis. Seruiabitur a nobis id posthac multa fide, ut ubi *ὑπόλιον* sit, bonam (chis prodesse. alium semper, ubi *λίον*, solutam, ubi *μαλακόν*, mollem, ubi *ἰσχυρόν*, delectam, aut soluere, mollisire aut deiscere dicamus.

De Siliquis.

CAP. CLX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur. Alium soluunt. Eadem siccata sistunt, stomachoque utiliores fiunt. Urinam ciunt, sed præcipue quæ uinaceis condiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Siliquã arborem Ficũ Aegyptiã uocari, & in Ionia Ceroniã, Theophrastus auctor est, quæ & Ceratia dicat. Galenus arborem Ceratoniã, fructum Ceratia nominari scribit, a corniculi similitudine. Lucius Columella, Siliquã græcã, credo, ut a sceno græco distingueret, quod absolute siliquã rustici cognominat. Recentiores Græci Xylocerata. Sed alia est Ficus Aegyptia omni no, ut Plinius notauit, & nos paulo post monstrabimus. Quãdoquidẽ in Aegypto nulla nascitur. Sed in Syria, Ioniaque, & circa Gnidũ, atque Rhodũ, folijs semper comãtibus, flore candido, cũ uehementia odoris: pomo siliquæ, & ob id nomen: radice sublimi, sed non multũ, plantigerã, imis partibus, superficiele flauescens inarescensque, succũ auferente sobole. Pomo antecedentis anni detracto, post canis ortũ, statim concipit, uterque præfert, & mollem quandã uinaculo in formem indifcreatque primo edit: quæ postque adoleuit, per arcturum & æquinũ octiũ florem emittit. Hyeme foetus enutritur, qui usque ad canis ortũ in parente durat, ut prædidimus. Tum metitur. Non puto quenquẽ nescire, Siliquas prædulces esse, earumque mandi corticem, digitorum hominis longitudine, interim falcata pollicari latitudine. Seritur & hæc apud nos semine, sed parũ feliciter. Quãdoquidẽ nec fructũ fert, & breuit̃ emoritur. Galenus usum eius cibo dãnã uit, ut mali succi, & lignosi, nec facile conficiendi. Posteritas cõmendat ad stomachum fulciendum, utique post cenã, & ad uentris profluuiã, si quis præsumpserit. Subter hanc arbore flami-

κισπρία

Plin. 15. capit.
29. lib. 17. ca.
8. lib. 23. ca. 8.

Gellius lib. 9.
cap. 15.

C

nis Dialis capillū, & ungues p̄fectos terra operiri mos & religio erat, ut est apud Geliū. Quāq̄ non Siliqua, sed filica mendose in eo legit̄. Nisi quis non siliquā, aut ilicem, aut salicem putet le gendum. Ego ut ingenuæ ueritatis homo, quid sequendū in eo potissimū sit, non diffitebor ne scire. In mediū, ut plerāq̄ alia relinquo. Est & nomen herbæ Plinio Ceratia, uno folio, radice nodosa & magna, coeliacis & dysentericis in cibo danti. Idem auctor coniūgit huic Peraticā: septem ei caules reddendo, qui uelut rosæ capita sustineant. Quāq̄ in codicibus quibusdam non Peratica, sed Statica scriptum legas, quoniā sistat alium.

E X M. V E R G. C O M M.

E Adem Græcis & Latinis in hac arbore fructuq̄ eius ratio nominis est. Illi κεράτιον, qua uoce in frugibus & leguminibus aliquot longiores Siliquas dicunt, factō a cornu nomine appellauerunt. Latini cōmuni, & alijs Siliquis appellatione indicauerunt, & ut ab alijs distinguere tur, aliquid quod rem ad proprium genus contraheret, adiecerunt, nunc dulcem, nunc græcā Siliquā appellantes. Nota satis arbor, notus & fructus, felici descriptione a Plinio lib. 15. indicatus. Quorū arborem, paulo a Ceratijs deflexā uoce, Paulus ægineta Ceratoniā uocat. Græci aliquot itidem factō ex lignosa soliditate cornuq̄ longitudine, & flexura nomine, Xylocerata appellauerunt. Damnauit in cibo Siliquæ huius usum Galenus.

Carere quoq̄ intellectu nobis uidetur quod dicit, *μάλιστ' αὐτὰ ἐν τῶν σιμφύλλων συντιβίμω*. quæ sic uerbum de uerbo uertat aliquis. Maximeq̄ ea quæ ex uinaceis componuntur. Nulla cum superioribus serie & rei sensu. Quid enim Siliquis his cum uinaceis? Corruptus nobis omino locus uidetur. Suspiciamurq̄, ex quo *σιμφύλλον* duplici λ legitur, contra q̄ id in uinaceis scribatur id nomen, potuisse aliquid de folijs arboris eo loco decerni. Quod uetustissimus, qui apud nos est, Longabardus, literis scriptus latinis Dioscorides indicat, in quo legitur, maxime quæ ex folijs componūt̄. Aut si uinaceorū illic futurū nomen est, de conditura aliqua Siliquarū, qua uuarū modo in uinaceis seruarentur. Sed obstat huic sententiæ præpositio *ἐν*. Non enim ex uinaceis, sed in uinaceis seruantur, quemadmodū priorī illi *σιμφύλλον* uox.

Potuit forte etiā Dioscorides, corticem huius *σιμφύλον* dicere, quemadmodū in uis Græci appellant, dotereq̄ urinam præcipue ciere, quæ ex Siliquarū huiusmodi corticibus confecta essent, confectionis genus aliquod indicans ea ætate notum, sed nobis incognitum.

D

¶ De Malo.

CAP. CLXI.

mala

Folia, flores, & germina cum omnis Mali, tum maxime Cotonæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest. Maturis uero longe secus. Ex ijs uerna bilem gignunt. Nervos lædunt. Inflationes pariunt.

Pli. li. 15. ca. 14.
li. 12. ca. 3. lib.
16. cap. 37.

B A R B A R I C O R O L L.

Malus corticis leuore nitet. Peculiares habet nodos, belluata facie, ut Theophrastus scribit, sed prægrandi uno, alijs circa eum pusillis compluribus. Fructificat primis frigoribus. Virena intelliguntur mala, quæ adulto uere matureseunt. Inter Mala tuberes correpta priore syllaba dicūt̄, baccis similiores q̄ Malis. Post Armeniaca, & omnino inter primas florent arbores. Insuper solent Cydonio, piro, pruno, & calabrici, & malis omnibus, ut inquit Palladius, quamq̄ Plinius syluestrem spinam, calabricem uocari dixit. Genera duo Tuberum, candidum, & a colore, Sericum uocatū, Papinius Tuberes, & Zizipha, hæc ex Africa, illa e Syria nouissimis Augusti temporibus inuexit, in castris sata, & aggenibus præcipue decora. Græci quemadmodū ipsas Tuberes appellant, haud possum coniicere. Nisi quis Syrica, siue, ut in quibusdā exemplaribus habetur, Serica eas uocare putet, parui fuscæ poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia, ut inquit Paulus, Oribasius, Aetius. Præferuntur e Ziziphis Aedestina uocata, ut quidam putauere, q̄ grandissima, calore, ac humore tēperata, medicis monstrantur. Columella duplex Ziziphi genus habet, rutilū, & candidū. Inuenio apud Græcos, qui Dinzipha pro Ziziphis appellant. Pene uero Tubera peregrina sunt in uno Italiæ agro Vero nensi nascentia, quæ peculiari noīe lanata Plinius apparī dicit, obducta lanugine, ut Struthia & Persicis fere plurimis, nulla tamen alia cōmendatione insignia, ab inuentoribus nuncupantur. Matiana ex uico Aquileiensis sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagonæ urbe nascentia, nunc Hispaniæ uernaculo uocabulo Matiana in commune sunt mala oīa. Sunt & a Manlio Manliana, Claudianis color rubens, Appianis odor & magnitudo.

dō cotoneorū, inſito cotoneo. Sceptiana rotūditate inſignia. Cato addijcī Quiriana, & Con-
 diua, quæ dolijſ condantur. Et Scantiana, Scandianaq;. In nomine ſunt & Geſtiana, ſiue Se-
 xiana, ſiue, ut Græci ſcribunt, Caſtiana: quoniam & Ceſtomela uocantur ab Actio. Quan-
 tūq; ridiçule a ceſto, id eſt, loro dicta quidam interpretes exiſtimant, cui ſimilia ſunt cordee.
 Hæc ipſa & Pezomela uulgo dicunt, & auſtera prædicant. Auſtera e dulciſ ſunt Aphratomela:
 odorata hæc, & pulpam habent aſperam, & ſqualentē, ut cidonia. Sunt & parua quædā, ſa-
 poris grauiſſimi Petiſia. Habētur & Peluſiana, & Proſiua, & Veriana, ſiue Tiburneniana & Si-
 rutia. Sunt & Phaulia, & quæ Delphica Græci uocant, & Platania, & Mordiana orbiculatiſ ſi-
 milia, ex Apolloniæ agro, qui Mordius cognominabaſ, & Camerina, ſiue ut Columella uo-
 luit, Amerina, & Græcula. Itē Gemella, nunq; in ſortu ſingula. Sicut Belgemela, ſiue Melgeme-
 la, q; folium unū aliquādo geminū erumpit latere medio. A colore Serica, ut neſciā Tuberum
 hæc generis, an diuerſi putē. A gentilitate Melappia, a celeritate miteſcendi Muſtea; de quibus
 in Melimeliſ loco ſuo dicitur. A māmaram effigie Orthomaſtica. A conditione caſtrati ſemi-
 niſ, Spadonia. A corrugationiſ celeritate Pānucea. Ab importuno & ſtolido tumore, Pulmo-
 nea. Sunt quibus color ſanguineus, origine ex mori inſitu tracta. Sunt & parua grauiſ ſaporis,
 atq; etiā acutiora, odore ſylueſtria peculiari. acerbitatiſ, improbitatiſq; cōiutio. de quib; proxi-
 me diſſerēmius. Itē Dacia, ſerme uiliſſima, Quantūq; aduētū prima: decerpitq; properantia. Græci
 Corinthiaca, e Sidunte uico celebrāt. Nominātur & Laconica, & Herina, a uere dicta, ſicut ala
 hugine Chnodia. Lanatiſ ſupra dictiſ forte nō plane diſſimilia. Seruant poma tabulatiſ, lo-
 co frigido, ſeptentrionalib; ſeneſtriſ, quæ ſereno die lucē accipiāt parētē. Auſtri ſpecularib; ſer-
 uendi. Aquiloniſ affluat marceſcunt in rugaſ. Colligunt poſt æquinoctiū autumni, nec ante
 ſextamdecimā lunam, neq; ante primā lunam. Cadiua ſeparanda. Minutiū Melimela durant.
 Pluriſimū Camerina: quæ ut Scantiana quoq; ſerotiua ſunt, & gelu matureſcunt, ad hyemē uſq;
 pendētia in parente. Vini Malo. pprietas æque ut Piro. Malū a Græciſ Meloni, arbor Melea di-
 citur. At Pomū nomen generaliuſ eſt, ut complectat quicqd apud Græcoſ Opora continet, in
 quo ſignificari eſt, cum dicitur a medicis, omne Pomū refrigerandi & humificandi uſum Habe-
 re, parū alere, mali ſucci eſſe, autumno pluſ officere. Inde Oporotheca, ubi cuſtodiuſ. Pomū
 Varro dictū autumat, quia potu ſiccitatiſ indigeat. Diſſert tamen Opora ab iſ; quæ Acro-
 drya Græci uocāt. Q; Opora eſt, quicquid nihil habet exteriuſ lignoſum, Acrodrya uero con-
 tra, ut inaliſ pūnicū, piſtacia, caſtanea, nuceſ, ſimiliaq;. Vtrūq; genus Salgami nomine cōple-
 ctuntur Latini: a quo Salgamanuſ. Dubitatū eſt, & in iure apud Ceſeliū, an nux pinca pomū eſ-
 ſet, quia Nuceſ eſſent quicqd foriſ duro regitur, Malū quicquid id quod eſuſ eſt foriſ habet,
 Pomo utruſq; contineretur: quod fere probamus. Seruiſ Nuceſ ſunt omnia corio duriore te-
 ſta, molliore uero Poma. Feruntur & alia Mali genera, ſuiſ mentionibuſ prodenda. Galenuſ
 omnia inquit Mala breuiſ fugiunt, atq; aceſcunt, utpote frigida, & excrementitiſ ſucco redun-
 dantia: ideoq; niſi melle condita ſeruando, ſeruari nō poſſunt. Excipiuntur Cotonea inquit,
 & Struthæa. Malorum enim appellatione ueniunt & Coronea, & Granata, & Perſica, & Piri
 genuſ, unum Librale nuncupatū, ab amplitudine ac pondere.

*poma quomodo
ſeruanda.*

B

C De Cotoneo malo. CAP. CLXII.
 Otonea ſtomacho utilia. Vrinam cient. Verum toſta accommo-
 datiora habētur. Proſunt coeliaciſ, dyſentericiſ, purulenta extuſ-
 ſientibuſ, cholericiſ, præſertim cruda. Maceratorum liquor, comode in
 ſtomachi, aut uentriſ fluctionibuſ potui datur. Succuſ crudoruſ aſſum-
 ptuſ orthopnoiciſ ſalutaris eſt. Decocto fouentur uuluæ, & ſedeſ ſi pro-
 cidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent. Mel autem ſi
 bi conſtringentem illam uim, & inſpiſſantem adſciſcit. Quæ cum melle
 coquuntur, ſtomacho atq; ori gratioſa ſunt, ſed minus inſpiſſant. Cru-
 da cataplaſmatiſ adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut ſi ſtomachuſ
 æſtuet, aut in uomitioneſ effundatur, ad māmaram inflammationeſ,
 præduroſ lieneſ, & condylomata. Fit uinum ex ipſiſ tuſiſ, expreſſiſq;. *Excerptum*
 Sed quo perduret, quindecim ſextarijſ ſucci unus mellis adiungitur;

exdoris

C alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleū ex ijs, quod Melinum uocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, rotunda, parua, & odorata. Quæ uero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quæ adstrictionem desyderant. Inflammationibus oculorum, reiectionibusq; sanguinis, contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 17. ca. 11.
17. li. 23. cap. 6.

Cotoneis, ut primus Cato nominauit, amplitudo Pinearum nucum. Interim maioribus incuruatos trahunt ramos, prohibentq; parentem crescere. Cydonea Græci appellant, quoniam ex Creta primum illata fuerint. Genera eorum, Chrysomela, hoc est, aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Nostratia candidiora, odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uibrantia, prouentu ferotino, quæ Struthia nuncupentur, sicut quæ celeriter mitescunt & præcocia sunt Mustea. Aetius Struthæ inquit dicuntur, quæ magna sunt, & suauiora, minusq; acerba. Cotonæo Struthis insito, mulusana cognominantur: quæ sola ex ijs, uel cruda uescendo sunt. Habentur & syluestria parua, e Struthis odoratissima, in sepibus nata: Omniacq; iam & uirosum saluatorijs cubilibus inclusa, simulachriq; noctium conscjs imposita, ut Plinius queritur, insigni taxatione sculi muliebriter mollis. Cotonæum, & Codymalon, siue Cydomalon uocari quidam scripserunt: uerum Polemon, floris genus esse id existimat. Cotonæi genus præter hæc inuenio, Phaulion uocatum. Quo nomine, Mali quoq; genus unum dici meminimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod in græcis dicitur, *ἡμυμνία*, quæ uox purulentas excreations significat, in antiquioribus & melioribus græcis, non *ἡμυμνία*, uerum *ἡμυμνία*, id est, sanguinem expuentibus & melioribus mali genere, & quod in his qui ad tabem seruntur purulentas excreations antecedit, si Hippocrati credimus. Ideoq; nos maluimus dicere, sanguinem expuentibus, auctore, & confirmante id Plinio lib. 23. cap. 7. de Cotonæis malis, cuius uerba sunt, Matura inquit, profunt sanguinem excreantibus, &c.

Non uideo, cur relicta hic uoce græca Barbarus uerterit, aetlima, quasi ex hoc nomine priuatim aliquod genus indicaret. Nullibi enim inuentum id a nobis est, nec ipse inuenisse se testatur. Nos uera reddidimus. Nec aliud inter Coronea uera, & Struthia discrimen hic esse ostendit, quam ex forma, magnitudine, & odore.

De Malis dulcibus. C A P. CLXIII.

μυμνία

Melimela uentrē molliunt, & animalia expellūt. Stomacho negocium exhibent. Aestuosa. Ea a multis, dulcia mala uocantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Melimela dicitur a sapore melleo. Eadem & a celeritate mitescendi, Mustea, ut inquit Varro, uocabantur. Minimū durant hæc, ut inter Mala diximus. Mustea sane ueteres appellabant id quod nos præcocia. Vnde Cotonæa quoq; certo genere Mustea dici solita reddidimus. Item Pira, quod recens est, Mustum, & Musteum dici solet. Athenis Melimella nominabatur, malo in syluestrem Pirum, Cydoniumue insito, ut scribit Diophanes.

E X M. V E R G. C O M M.

ὅρπια ἡμυμνία, uidetur non carere mendo, tamen & nos quoque reddiderimus, uentris animalia pellit. Dulcia enim hæc mala sunt, mellisq; sapore, a quo nomen inuenerunt, non uidentur posse uentris animalia facile pellere: nisi forte deiectam hoc cibo aluum, ea etiam sequitur, & quæ alioquin hæssissent, impetu excrementorū, quasi in torrente pisces, qui largiore per æstatē imbre abundauerit rapiūt, aut propria naturæ suæ potestate, qualia multa passim uident, id ea mala possint. Habet quidem parū certam, non tamē absurdā id rationem.

De Orbiculatis Malis. C A P. CLXIII.

ἡμυμνία

Epirotica mala, quæ latine Orbiculata dicuntur, stomacho utilia. Siftunt aluū, Vrinæ euocant. Malis tamen Cotonæis inualidiora.

Epirotica, ex

BARBARICOROLL.

Epirotica, ex Epiro inuenta primum. Argumento est cognomen. Orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in rotunditatem circumacti.

EX M. VERG. COMM.

Facile nobis indicatur, posse hæc mala esse quæ rura nostrâ a colore rosea appellant. Mala rotunda & orbiculata, quæ toto anno seruari possunt.

De Syluestribus Malis. CAP. CLXV.

Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt. Sane in hunc usum immatura opus sunt.

BARBARICOROLL.

Syluestria, odore acutiora, sed improba & acerba: ob id & conuictio dicata. His tanta uis, ut aciem gladiorum perstringant. Aliud genus sunt, quæ Poma syluestria dicuntur, a rei rusticæ scriptoribus, ut albæ spinæ, græcæ siliquæ, uiniperus, lotos, pampinus, cornus, arbutus, prunus, & paliurus, atq; sachrades piri. Quid porro sit in Columella (sunt enim hæc Columellæ uerba) Pâpinus, & an corrupta sit lectio, pro eo quod est Carpinus, aut Pinus, relinquo discendum peritis.

EX M. VERG. COMM.

Syluestria sunt, quæ Theocritus in Bucolicis suis ὄρεμαλάς, idest, montana appellat. In quibus illud animaduertendum, nō de his tantum præcipere Dioscoridæ, ad adstringendum imaturis opus esse, quod ex Plinio Barbarus uertit, sed in uniuersum omnibus acerbis in adstringendo uti oportere.

Verba eius hæc sunt. Αὐτὸ δὲ πρὸς τὰ σύμφορα χρὴσθαι ἀκατέριστος ἀπασιν χρῆσθαι. Id est, Oportet autem ad ea quæ ad adstringenda sunt, intempestiuus, idest, imaturis omnibus uti. Omnibus id tribuitur, non priuatim syluestribus.

De Persicis Malis. CAP. CLXVI.

Persica a poma matura, tam stomacho, quæ uentri utilia sunt. Acerba alium cohibent, sed sicca uehementius. Decoctum e siccis, alui stomachicq; fluctiones sistit.

BARBARICOROLL.

Persica, ex Perside aduecta, ut ipso nomine apparet, Theophrasti temporibus in Aegypto tantum, & uicinis locis ferebat. In Rhodo ad florem usq; perueniens: quod primum ab Aegypto uenienti hospitium fuit. Inde Rhodacina fortasse uernaculo græcorum sermone dicta. Nisi quis inuersum nomen putet, quasi Doracina. sic enim Persica ipsa nominantur a græcis recentioribus, Paulo, & Aëdo, quasi Duracina: de quibus post agetur. Notant autores, nusquam minus odoris poma, plus succi, qui tamen sitim stimulet. Falsum est, uenenata cum cruciatu in Persis ea nasci, & pœnarum causa a Regibus translata in Aegyptum, ubi coelo proprietatem mutauerint. Id enim de Persea diligentiores tradunt, quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma Duracinis. Nationum habent nomen Gallica, & Asiatica. Post Autumnum maturescunt, sicut æstate Præcocia: quæ Plinius intra .30. annos inuenta prodente se testatur, & primo denarij singula uenundata. Supernatia e Sabinis sunt. Popularia ubiq; Pomum innocuum uel ægris. Precium singulis triceniquondâ fuisse numi, nullius maiore quod miremur: quia non aliud fugacius. longissima namq; decerpto bidui mora est, cogitq; se uenundari. Persica in prouentum alium Autumno conduntur, ut uix cadis. Mollis cam nucem sunt qui Persicum interpretati falso fuerint, ut in luglande cōmonebimus. Persica sine suis ossibus, & inscripta quem admodum nascantur, docebit Palladius. Idem tria genera enumerat, Armenia, Duracina, Persica. Sint hæc Armenia, quæ Prunorum generis esse quidam uolunt, an diuersa, studiosi salgarum diiudicent: mihi eadem uideri placet.

EX M. VERG. COMM.

Notum Persicorum genus omne & forma, nondum tamen in antiquis satis patet, an huius pomi arbor ea sit, quæ paulo post hic, pluresq; alij Persea dicunt, in Aethiopia scilicet, in Aegypto aut salubre, de qua in Hortulo notissimos uersus cecinit Columella, an quæ malus Persica ubiq; nunc nascitur. Sed eandem esse Persicam malum, & Persea, ex Nicandri cōmentatore probabimus. Eius uerba sunt eo loci quo de Phalangijs ait, Sciendum est, Socrate in Cōmentario de

A

αγρίεμαλα

περιελά

B

Pli. lib. ii. ca. 9
lib. 23. cap. 7.

Creptilibus & serpentibus, testari Persicam, quam Rhodacineam dicunt. Hac uoce autem græci Persica nūc etiam appellant. Ex Aegypto in Aethiopsiā translata fuisse testat, et Rhodus Lemo crigeus in cōmentario de his quæ ἀντινάβη, & οὐμνάβη dicuntur, Persas ait lactalem arborem habentes, in Aegyptum misisse, credentes perituros ab ea multos. Sed utilem contrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissimā pomā, qualia nunc uidentur. Et hæc interpretis eo loco.

Ex quibus manifeste patet, quam alij *πικελαν* arborem dicunt poetice, a Nicandro, interpretisque eius *πικελαν* uocari. Quod a Barbaro relictum, addere placuit. In hanc enim partem inclinauimus, Et si Plinius id negauerit, & aliorum multorum auctoritas obstat.

De Præcociibus.

CAP. CLXVII.

ἄρμενιά

ARmeniaca, quæ a latinis Præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

BARBARI COROLL.

ARmeniaca, siue Armenia, Prunorum generis sunt, peregrina & ipsa, ut ex nomine cognoscitur. Sola e Prunis odore cōmendantur. Armeniaca uocari desita, & Præcocia, siue præcoca tantum dici, testis est Galenus. Palladio Præcoca differunt ab Armenijs. Græci non præcocia, sed Berioccia fere pronunciant.

μαδύνα

MEDICA mala, aut Cedromela, quæ latini Citrea uocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet Pyri. Id in uinorum uenenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus. Vestiarijs impositum, ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

νίκεαν

BARBARI COROLL.

Pli. li. ii. ca. 7.
Theoph. li. 4.
Athenē. 1. di.
prosofistæ.

MALUS medica, flores duobus modis procreat. Alios qui uelut erectam in medio colū habeant, fecundiores existimati. Alios qui careant ea, infecundos. Sunt qui & Assyriā, & Persicam malum uocent. Item Citrum, Citream. Græci & Hesperida, & malum eius Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatum id in Græciam, & aureum malū uocatum scripsit. ut Virgilius de ijs intellexisse uideatur, cum dixit, Aurea mala decē. Nuptiale pomū intelligi hoc uolunt, qui ædificum a tellure fabulantur, nunciato Iouis & Iunonis cōnubio. Foliū ei Adrachnes, Vnedonisque spinis intercurrentibus, ut in pyro & oxyacathā, sed leuibus infestis mucrone, ualidis. Nō mandebat pomum Theophrasti ætate, sed ne Plinij quoque (ut arbitror) magnopere tū odore cōmendato. Plutarchi certe auorum memoria, gustabat nemo, ut Athenęus inquit. Nunc a Palladij fere temporibus promiscuum, expetimus cōenis. qui & medullas eius acres, dulcibus mutare docuit. Quancūq; Apuleius negauit eandem esse malū assyriam, siue medicā, quæ Citrus: quæ Citrus exiguum esset genus arboris, Medica uero, ut Maro scribit, ingens. Pamphylus Citrum, Critum a Romanis eam dici, parum peritus homo scripsit. Vt quæ arbor hæc scribitur, uere partibus cultissimis semine quarto die aut quinto rigatur. Maiuscula transferretur etiam uere in solum molle, udumque, nec admodum gracile. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, alijs ruentibus, alijs subnascentibus, alijs maturescentibus. Senit & fistilibus, dato radicibus spiramento, per cavernas ut Palmæ: qualiter oīa transitura longius haberi conueniunt. Semen eius solum id quod in colo quadam e medio prorumpit, secundum existimatur a Theophrasto. Sed hæc olim fuisse. Nunc traslatida & triualis fere arbor, ut pluribus generibus Citrata Ligurię, Campanię, Benaco lacu, Italia fere tota germinet feliciter, quamcunq; libeat imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt, Citromela proprie dicuntur ab aliquibus. Quancūq; uero Medica malus dicatur, ipsum tamen pomum Galenus malum medicum uocari negat, sed Citrinum dumtaxat. Theophrastus etiam malum Medicum & Persicū est ubi appeller, cum huius fere unius mali semen imperpicuum esse dixit, secundo uolumine de stirpibus, ut Athenęus interpretatur. Diphylus auctor est, Citria, quandoque Pruna persica uocari solita. Aristophanes grammaticus, a Lacædemonijs Oxymala persica nuncupari pro-

didit, quibus & Deos coronent. Menfes illas ueteribus & Plinio decantatas, præfertimq; Ciceronianam, non ex hac fuisse Citro, sed ex alio cirri genere coniecio, pluribus argumentis: sed illo possitimum, q; arbores ex quibus fierent, Cupressò semine syluestri similes folio, odore, cau dice, a Plinio produntur, Anchorano monte, ceterioris Mauritanie, sed iam tum exhausto. Itē Atlante, cuius imas radices densis altisq; repletas syluis, incognito genere arborum Suetoni- us Paulinus, a Plinio citatus, asserit spectabili proceritate, enodi nitore, frondibus Cupressi, præterq; grauitate odoris, has tenui lanugine obduci, quibus addita arte possint quales bombyce uestes confici. Idem autor paulo superius, efficacissima inquit luxuriæ uis sentitur, cum Ebori Cedroq; syluæ exquirantur. Præterea quis potest negare, arborē ex quā tam celebres mensæ cōstent, Togerem, & Thyian, & Thyon a Theophrasto & Strabone dictam esse. Idq; Plinius ex- ploratissimum nobis fecit: de Thya uero Theophrastus. Perpetuo, inquit, uiuet, arbor proce- ra, inter syluestres serotina, ut nulla fere tardius germinet, argentiis locis, & cacuminibus montium gaudens, circa Hammonis delubrum præcipua nascens, & in inferiore Cyrenaię par- te, atq; ubi ipsa tunc esset, ramis, caudice, frondibus, syluestri Cupressò similis, ex ea ueterum templorum contignationes fuisse, immortali post Cupressum in tecta materie. Nihil radice cris- pius. nec aliunde preciosiora opéra. Siccitatem mari, duriciē & maturitate incorrupta spillari tra- dunt, nec ullo modo uehementius. Homero quoq; notam fuisse, inter odores uiri solita a Cir- ce, magnò errore eorum, qui odoramenta in eo uocabulo accipiunt. Cum præsertim eodē uer- su, Cedrum & Laricem nominet, ut manifestum sit de arboribus tantum loquutum. Nam & Calypsus, & Helens thalamos, & Thya cōditos, idē poeta cecinit. Quid habet Citrus nostras cōmune cum Cupressò, frondis Cupressò, Iuniperi sabine, Cedri, Citro, Lauri, Adrachines, Arbuti? Quid tam diuersum. q; Galbulus, & Citreum: Omittō alias notas. Quibus perspicuo liquere potest uolentibus, decipi gramaticos, quicumq; mensas citreas ex hac Citro, quæ nunc habetur, facilitas arbitrauitur. Dion certe historicus, Neronis uita, non citreas, sed cedrinās mensas appellauit, siue cedro potius q; Citro similes esse uiderentur arbores, siue q; in exempla ri uitium est. Erit ergo Thya, siue quod idem est, Trogetes, et Citrus duorum omnino generū, ut constat. Vnum Cedri eius, ex qua mensæ dolabantur. Alterum Citreus, ex qua malum medicum. Plinius, alia inquit est arbor eodem nomine malum ferens execratum, aliquibus o- dore & amaritudine, alijs expetum, domos etiam decorans. Quod & sensisse Macrobius ui- detur. Hodieq; Mauritania malum medicam, & pomum eius Atrogi uocant, a Trogete uoca- bulo parum deflexo. Alioquin Trogetem, non quia mandī posset, sed catantiphrasin, qā man- dinon possit, appellatam censuerim: quando quidem, ut dixi, ueteribus esculentū non erat. In summa, non nego Malum quoq; Medicam in Mauritania fuisse, cum plena sint Poetarum omnia fere uolumina, sed ex qua mensæ illę celebres existerent, malum medicam fuisse, hoc ne- go, & pernego; Nec dissimulandum tamen est, Phaniām Eressū quinto uolumine de plātis ce- drum appellasse, ac malum cedrium, pro eo quod nos citrū & citrium uocamus, & Dioscori dem secuti Cedromelon. Varro quoq; libycam Citrum nominat.

EX M. VERG. COMM.

DE Medicis, quæ Persica etiam hic uocari ait, quoniam nostro orbi, & Græcia diu peregrini- gnerint, & ex Perside in nostrum orbem transierint, illud primum testabimur, in appellatio- nibus eorum, non Cedromela forte, sed Citromala, quasi Citria mala legendam esse uocem. Nihil enim Citro cum Cedro, & a Romanis Citria hæc uocari iam pridem receptum est. Nih- il tamen mutamus, in cunctis enim græcis pariter legitur.

Quæ autem in Barbari Corollario longius narrantur, omnia ex quarto Theophrasti uolu- mine, & Athenęsi dipernosophistę excerpta sunt. Qui etiam quod uno aduerbio ab hoc *ἡνελ- λικω* dictum est, pluribus conuertit. Nobis una superfectionis uoce indicare id placuit.

Sequitur deinde quod anceps in hoc scriptore sit, quo loco statim a descriptione seminis le- git, *ἡνελικω* & *ἡνελικω* in diuisiōe *ἡνελικω* & *ἡνελικω*, tribuendū ne id sit semini, an pomo, utrūq; enī neutri generis. Sed qd ad pomū p̄tinet lōgius in sermonis textura abest: qd uero ad semen, p̄pius, et quasi cōiūgit. Plinius et semini, et pomo id tribuit, uerba eius hæc sūt. Citria cōtra ue- nena in uino bibunt, uel ipsa, uel semē. Ceteri, inē quos Theoph. pomo eā uim tm assignarūt.

De Pyro. CAP. CLXIX.

PYrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt. Addun- tur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e siccis,

A

Theo. li. 4. &
3. cap. 5.

*

B

Macrobius li
bro. 3. cap. 19.

C & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata ledunt.

Pli. li. 15. ca. 15.

Pirum, greci edomitam, siue urbanam Apion & Adipion appellant, de quorū prouentu, Peloponnesus quoq; ipsa quandoc; dicebatur Apia. Licet quidā ab Apia Phoronei filia, terram eam ita nominatam putent. Poetæ sunt, qui Pirum Ochren uocent, syluestrem Achrada, ut mox dicemus. Apios & Raphani genus est. Turbinata Pirs omnibus figura, multis generibus. Alia parua ocyllimaq; & odoratissima, nominant Superba; in his crustumina, quæ gratissima, & ex parte rubent. Et proxima his Talerna, ceu largo succo habundantia: hæc Lactea uocantur. In hisq; alia colore nigro donant Syriæ. Post hæc Decumiana, & ex his tracta origine Pseudodecumiana. Dobelliana longitudine pedali. Pomponiana, cognomine maiosa. Liceriana feueriana, & quæ ex his nata sunt, Tyraniana petioli longitudine distantia. Fauoniana rubra, paulo Supbis maiora. Lateriana, siue laterisiana, ut Columella uocat et Macrobius. Anitiana, & autumnalia accidulo sapore grata, & quæ maxime Tiberio principi placuerit Tiberiana. Colorantur hæc magis sole, grandescuntq; alioquin eadem essent quæ Liceriana. Accedunt his Neuiana, Turanianaq; Atq; hæc auctorum suorum nomen habent, præter Supba, & Phaleria. Patrias nobilitauere quæ sequitur. Serissima omnium Amerina, Placēdina, Numanina, Alexandrina, Numidiana, Græcula, & his Tarentina. Signina, quæ alij a colore Testacea appellant: sicut Onychina, ut quoddā pruni genus, Purpurea. Ab odore Myrapiā, Nardina, Laureā. Ordearia, siue ordeacea, a comitatu frugis eius. A colo Anpullacea & Corolliana, & brutæ gentilitatis Cucurbitiana. Acidula a succo, a melle Mulsa. Incertū omnium ratio. Barbaricis & Venerijs, quæ colorata nuncupant. Itē Regijs, quæ minimo pediculō quasi sessilia sunt. Iā patriijs uocanturq; uiridibus & oblongis. Dixit & Volema Virgilius a Catone supra. Volemitū, uocat Macrobius, qui & ceritium, & cerusitū, & calculosū, & lollianū, & Lauiniū, & Milesiū & Myrteum, & Orbiculanū, & Precianū, & Rubile, Tullanū, Ticianūq; itē Mespilaceum, et Valerianū indicauit. Cloatiū secutus. Idē Cato & Semētina, & Mustea quoq; nominat. Ampullacea, græca, Laureā, ad hyemē usq; in parente pēdent. Serotina, et gelu maturescētia. Nam quæ Aristotelē. Apē, Bloadas nomināt, insitij generis intelligunt. Vini pprietas & Piro. Cōdunt hæc totidē qbus uua modis, non alit, q̄ in cados. Vino & aqua coquant in escā ægris, dāturq; pulmētarij uice, quod nō alia præterq; Coronea. In conuiujs græcorū Pira secūdis mensis inferebant aqua mersa, ut minissima, quæq; legi possent. Pira sunt & quæ Libralia uocātur. Sed sola tamen e Pirs Mala dici consueuerunt. Liqueamen de Pirs fieri solitum, ad ieiunia foeminarum. Inuenio quod Castimoniale dicebatur. Pirorum quæ maturissima sint, carnis integro sale calcatis & resolutis, atq; ita fidilibus picatis cuppis uē conditis.

Macrobius li. 1. cap. 19.

D

VERG.

Pirorum infinita pene genera, quæ ab antiquioribus rei Rusticæ scriptoribus tradita sunt. Quod solū defyderari in hoc capite poterat, longissime in Corollario suo Barbarus profectus est; nos ideo nihil ultra de his agemus.

ἀχράς

De Pyraastro. CAP. CLXX.

Achras Pyrastris genus est, quod tardissime maturescit. Vim Pyra adstringentiorē habet. Et ad eadem conuenit. Stringūt etiā eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strāgulāt. Aīūt fungos si syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

B A R B A R I C O R O L L.

Achudō Pirum syluaticam, hoc est, Achrada, & apud quosdā, ut apud nos, et Pirastrū, feruliosiorē urbana prædicant. Hyeme fructificat sere, Autumno ei genus eius unū, ut Theophrastus inquit, materia ei apprimē dura. Ideoque discos, tabellasc; lutorias, & Piro syluestri faciunt. qm̄ ut in molli retundit, ita in duro ferrū acuitur. Aculeatos hæc habet ramos, ut Punica. Quid autem Achyrades Heliantho sint, quas in cibo primum Tirythios habuisse memorat, non comperi. Nisi quis nō Achyradas, sed Achradas, hoc est, Pira syluestria in eo legat. Nam ut idem autor ingt, ante panis usum, Argiuos elisasse Pira meminit, ut Athenienses ficos, Glādem Arcades, Indi Arundinem, Carmani palmulas, Miltum Sarmatæ, Terebinthum nasturtiumq; Persæ. Achyra certe paleam significat; nec uideo, q̄ sit uerisimile paleis quēq; uesci potuisse, quasi ueterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum, & arborum folijs recentibus ante glandis saginæ usum a Pelago traditū; uisitatū crediderit.

Vicus antiq; rū frugaliss.

De Mespilis. CAP. CLXXI.

Mespilus, quæ a nonnullis Aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. Fert pomum suaue, exiguum, tribus intus offi-
culis. Quæ ex causâ id nonnulli Tricoccon appellauere. Tarde maturef-
cit. Esu adstringit. Stomacho gratum est. Aluumq; supprimit.

BARBARI COROLL.

Mespilorum tria genera, Setanium, Anthobon & Anteheboides, quam et Gallicâ intelli-
gunt. Setanio fructus grandior, candidior, solutior, Acini molliore ligno, reliquis minor, sed
pstantior odore, & alstringentior gustu. Quo fit, ut diutius q; durât. Lignū his flāmius, & spissi-
us. Flores oib; Amygdalæ, nō tñ rubētes, sed, p̄p̄modū herbacei. Arbor int̄ amplissimas, co-
mosa In girū, folio scillo, extremitatēq; Apio simili, sed maiorib; diuisuris, p̄missō, rigētī, ner-
uoso, tenuiore & longiore q; Apii, lōgo & gracili pediculo. Radice alta, numerosaq;. Ideo lō-
geuā ē arbor, a terrāq; inextricabilis. Lignū densū, incorruptū, solidū. Semine et auulsiōe serit.
Foliū anteq; decidat, uehementē adrubescit. Infestat et hęc uermibus in senecta, q; p̄grādes ei di-
uerſi q; ceteris cōtingūt. Nō fuit hęc arbor in Italia Catōis æuo. Hęc Theoph. & Plin. Verū a-
lia hęc Mespili distinctio ē, q; a Dioscoride rep̄terata ē. Et sane dubitari solet, an Mespilū ueteres
cū Sorbi arbore cōfuderint. Quādoq; dē altissimis cōnumerat, q; certe Sorbo q; Mespilo nūc
uocat, magis cōueniūt. Nisi q; nostratū Mespilū, nō tā Mespilū, q; Chatemespilū appellandū
fortasse cēseat, quæ nascitur, ut inq; Dioscorides, Italię uocata Epimelis, de qua sequenti capi-
te differitur. Certe Iulius Pollux, Mespila inquit, & Sorba quoque appellantur.

Quam genere neutro Mespilū arborem fecit, Theophrast. lib. 3. foeminino g̃ne descripsit.
Longius idem de tota hac arbore pomōq; eius eodem loco egit, quæ omnia a Barbaro
in Corollarium suum translata a nobis relinquuntur.

Illud tñ notādū, ubi de semine huius pomi agit, nō dicere Theophrastū claudere in se hoc
pomū acinos molliore ligno, ut Barbarus uerūt; sed πυρνιας μαλακώτερον, quod est, nucleos
habere molliores. Toto enim genere differunt inter se acini, & nuclei. Et si in antiquioribus i-
dem utriusq; fuerit nomen, ut in Punica non multo ante dictum est.

Sciendū & illud, quam primū hic describit Mespilū arborem peregrinam & incognitam Ita-
lię nobis uideri, & sui generis arbore spinosam, & ut hic ait, Trigraniam, quæ nostrates Mespili
non habent, quinq; intus nucleis fartæ, & nullis spinis armatæ. Nostratem uero Epimelidem
ideo, ut nos credimus, a græcis dici, quod felicissime in Malo inseritur, & quasi ἐπὶ τῷ μῆλῳ,
idest, in malo adoptata creuerit, foeminino genere & diuturna forma, πικρὺς dicta a græcis est.

Quod aut̄ diximus, esse nostratē Mespilū latiore umbilico, quodq; Barbarus, fundo in lati-
tudinem resimō, nō facile intelliget aliq;: nescio qd in pomis πικρὺν .i. si uerbū de uerbo uer-
tas, fundus, significet, quæ uoce ueteres græci, qd in fumo pomo umbilici descendit iudicaue-
runt, p̄sertim in malis, piris, sorbis, mespilis, alijsq; pene infinitis, in qbus cauum, & uelut la-
cuna descendens, lanugines in ea, floccosq;, & floris postquā defloruit inutiles reliqas ostēdit.

Et quoniam descendit, & quasi in doliolo fundum facit, idest, πυθμῆνα, & quod humani um-
bilici modo cauum est ὀμφαλόν etiam græci uocauerunt, nos umbilicum igitur uertimus.

Quod aut̄a Barbaro dictū est Resimo, in Diosc. nō legit̄, est ēa est umbilici i Mespilo figura.

De Setanijs. CAP. CLXXII.

Alterū Mespili genus in Italia nascit̄, qd aliq; Setaniū, aliq; Epimeli-
da uocat. Arbor folijs Mali, sed minoribus. Pomū fert rotundū,
esui aptum, ima parte latius. Quod adstringit, serocq; maturefci.

Mespilum Setaniū a Theophrasto nominatam, Dioscorides Epimelida uocari scribit. Hip-
poc. Amamelida. Galenus Mespilum, cōmuni uocabulo Tricocci, quasi Triossum, aut
Trigraniam ab aliq;bus appellatam meminit: quoniam tria intus grana, siue ligna, fructus
habeat loco seminis. Quid autem sit Epimelis Galeno, differendum putauimus in Arbuto.

De Loto arbore, seu Faba græca. CAP. CLXXIII.

Lotus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maio-
rem, dulcem, graui odore, stomacho facilem. Aluum sistit baccis.

A

μῆλον

Theo. li. 3. ca.

12. Plin. li. 15.

ca. 20. li. 23. c. 7

VERG.

B

BARB.

Λωτός

C Rametorum ligni decoctum, siue potu, siue infusione dysentericis, ac fec-
minis fluxione uulug laborantibus, auxilio est. Ruffat capillos. Citam al-
uum cohibet.

B A R B A R I C O R O L L.

Theo. lib. 4.
cap. 10. Plin.
lib. 16. cap. 31.

Lotus arbor (nam & herbae sunt hoc nomine complures) in latino Celtis uocatur, itemq;
Faba graeca. Seruius Fabam Syriacam, Nympha in arborem sui nominis conuersa, quam Pri-
apus fugientem comprimere quæssit. Anacacabeam uulgo apud graecos dici, autor est Ae-
tius, ut fructum eius Anacacabon, licet quidam peruerse, Alicacabon scribere graeci, Piri ma-
gnitudine, aut paulo infra. Incisura folio crebriores, alioquin llicis uiderentur: spissa, nigra,
enodi materie. Differentiae generum plures, exq; maxime fructibus constant. Amplitudo Fa-
bae pomo. Color Croci, sed ante maturitatem ut in uuis alius atq; alius. Nascitur in ramis den-
sum myrti modo inter sese aduersum, non ut in Italia Cerasi. Manditur inter Lorophagos in-
nocua dulcedine, sua uitaeq; nec uentris sentire morbum ferunt qui uestantur. Iucundus me-
liusq; sine interiore nucleo, qui in alterutro genere osseus uidetur. Vinum exprimitur huic si-
mile mulsio: quod ultra denos dies negat durare Polybius. Sicut qui biduo triduo ue acere id
scribant. Baccas eius contusas cum nucleo & callo suo, dolis ad cibos condunt. Vnde uulgo
Romae, puls Tyriaca uocat arbor illa modo. Nam Padi accole, baccam syriacam appellant. Tanta
uero fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli, Carthaginem petentis, in com-
meatum defectu paueat. Numerosa in Phariide insula Lorophagorum. Plurima et in Aphri-
ca nos spectante. Familiaris & Italiae: sed natura coli terraeq; mutata, & succos oblita priores.
Praecipua est circa Syrtis, atq; Nasamones. Sunt qui breuem tradant arborem, ut Polybius,
qui & uidisse testatur spinis asperam, folio uirenti, quale rhaino, tantum profundiore la-
tiorq; fructu myrti candida per insula, processu puniceo, magnitudine oliuae, sed rotundo:
eum cibo familiae tundi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditum. Eundem nucle-
um herilibus mensis eximi. Saporis fici & phoenicolobani esse pomo, sed praestare odore.
Vinum & aceti inde fieri. Lignum cere ad tibiarum cantus expeditur, e radice culstellis capu-
los & subscudes, ac breues alios usus excogitant. Hesperidum Lotos, ab ea quae Lorophagis
nascitur distat: ut qua ligni uice utantur ad urendum. Non desunt, qui fructum eius post
putamen esse, nec carnosum foris, sed cuticulaceum prodiderint, nec tam cibo dulcem, q; gu-
stu alias iucundum: ut hinc fortasse Dioscorides maiorem Pipere descriperit. Ac fructus qui-
dem lorophagis dulcissimus, sed materia Cyrenicae praefertur. Radici nigricia maior q; ligno:
sed densitas minor, q; in Loto post Buxum & Hebenum summa redditur. Virilias quoq; radi-
ci latior. Particulatim Lotus fructificat, non ab utroq; sui germinis: quod & in bulbi & tichy-
mali quodam genere notatum est. Ludicerae Tibiae fieri coeptae sunt e Loto, quas Alexandri-
ni Phoringas appellant. Sicut ex aluminis quoq; ossibus, & argento eburi quoq; ceptum per-
tundi. Vnde Tibiae elephantinae dicantur, reiectis propter nimiam difficultatem harundini-
bus. Propterea Cenomani, Lotum arborem hodieq; appellant Calamum. Spectatur Parauis
antiqua Lotos, in quadam Anoniani templi xylo. Est quando Hippocrates Luron pro Lu-
to nominat. Circa Memphim, nemus a Theophrasto describitur, fuisse tam uastis arboribus,
ut excederet trium hominum amplexum, utiles operibus, colore densitateq; persimiles Lo-
to, nam Faba, siue arbor pontica, genus diuersum est a Faba graeca, idest, Loto, magnitudi-
ne Fici, fructu fabae, succo uestibus expresso, quem Achy uocat: niger autem crassusq; est. Aut
perselugentes, aut mixto lecta uicitant. Nascitur in Scythia.

E X M. V E R G. C O M M.

VAgum est per herbas & arbores aliquot Loti nomen, ut libro. 4. docebimus: ob eam caus-
sam, nos capituli huius titulo arborem adieciimus. Monente id scriptore hoc, qui Loton arbo-
rem ait, plantam esse, &c.

Multiplex, longaq; est arboris huius in Theophrasto & Plinio historia. Nos eam relinqui-
mus in scriptoribus illis, & Corollario Barbari uolentibus legendam.

gavissu Ad xg. rixes, ruffat capillum, ut nos reddidimus, cum tamen uetus lectio aliud
habeat, si ex eo caput lauetur, capillorum casum prohibere: nec ego detulissim huic lectioni
aliquid, nisi Plinius lib. uicesimo quarto, cap. 2. idem his uerbis docuisset, Ramenta ligni de-
cocta, &c. cohibent & capillum. Suspiciamus itaq; uitium esse in uerbo illo, *gavissu*. Commu-
nem tamen lectionem secuti, nihil mutauimus.

De Corno.

CAP. CLXXIII.

A

nparia

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primū uirent, dein per maturitatē rubescunt, aut cæaræ colorē re presentant. In cibo adstringūt. Profluuiū alui, atq; dysenteriaē salutare, si ue in edulio, siue in cibis exhibeantur. Muria ut oliuæ coniungunt. Sanies quā uirentia folia torrendo resudarūt, impetigini cōuenienter illinitur.

BARBARI COROLL.

Cornus Craniās a Theophrasto dicit. Sexus in ea duplex. Fœminā, Græci Thelycraniā uocant. Fructus syluestris maturiores, suauioresq; q̃ urbānæ; quod in hac & Sorbo peculiare ferre est. Cornus altera præcox, solstitio fructificans; altera post autumnū, cui & fructus ingustabilis, lignum infimū, hianq; ac fungosum, quæ fœmina intelligitur. Contra masculæ firmissimum. Fœmina uisculas paruas a lateribus emittit, amerinæ modo Salicis, in totiq; fructuosior est, mollis & medullacea, uenabulis damnata. Materies masculæ robusta, solida, excorsq; tota, hoc est, sine medulla, & cornu instar, prædensa & ossæ. Nodos Cornus ois habet per interualla geminos, & inuicē respondētes, ut in Viti. Foliū Amygdalæ, sed pinguis & crassius, cortice neruoso ac tenui, caudice nō admodū crasso. Mas duodecim fere cubita excedit: quā altitudinē Sarissæ Macēdonū amplissimæ habent. In Ida mas sterilis, fœmina fructifera. Fructū apud Macedones ambæ ferūt, sed fœminæ (ut diximus) qui mandī nō possit. Radices ut Amērina, firmas & contumaces emori. Humidis locis auulsione, semineq; prouenit. Est & in India arbor, ferens fructus similes Cornis, quæ merito Cornus Indica nominari possūt.

Diximus fructum & speciosam arborem Cornum esse: sic certius indicantes, quod in græcis ἰσχυρὸν est, quibus ea uox τὸ ἰσχυρὸν, id est, pingue & feliciter nutritum, ex eoq; cum decore ualidum & forte, qualis Corni materia, & ob id uenabulis apta.

Plin. lib. 15. ca. 26. 28. 48.
Theoph. lib. 5. cap. 12.

VERG.

De Sorbis.

CAP. CLXXV.

B

zra

Sorba colorem malorū referentiā, priusq; maturescat, dissecta, & fole siccata manduntur, ut aluū sistant. Eadem est functio molitorū farina, si polenta loco sumatur. Quod & decoctū eorū in potu præstat.

BARBARI COROLL.

Sorbo syluaticæ, præstātor q̃ urbanæ fructus, qd in hac & Corno præcipuū Theophrastus notauit. Arborē Græci Oen, & Oeien, fructus Oa & Va uocāt. Fœmina fructificat sola. Discrimen in fructu, q̃ aliæ figura orbis, aliæ oui ferunt. Itē in succo. Aliæ odoratorē dulciorēq; ut orbiculati fere oēs. Aliæ acidū peiusq; olentē, ut ouales. Vtriq; folia pediculo singulari prolixo, neruacea, condita in uersus, alæ modo a lateribus emicantia, tanq; ex oibus unū fiant, lacinij pennatim, ut in filice, ad neruū usq; diductis, ampliusculoq; diuisis interuallo. Atq; hæc non paulatim ut cæteris, sed uniuersa collabunt. Omnibus ramulis in extremo pediculi foliū prominēt, cuius accessione impar numerus efficit. Figura his lauri, tenui folio, præterq; q̃ serrata per ambitū, breuioraq; sunt, neq; cacuminibus mucronatis, sed in rotunditatē reuersis. Flos racematim coactus ex pluribus candidis ac minutis, petiolo unico dependet. Fructus cum large proueniūt, uix modo, sarcti congestiq; uisunt, ex uno petiolo faui spēm p̃bentes. Exest eos uermiculus etiānum crudos acerbissimosq;. Ipsa quoq; arbor in senectā uermibus obnoxia, rufis, hirsutis, sui gñis. A trimatu fert. Autūno folijs subinde amissis Cachryn suā fundit, eduratū hyeme; ut in Roborē. Aculeos Sorbus non habet, ut mespilus. Nouella, cortice leui, pinguisculo. Flauer e candido, añofa scabro, atroq;. Arbor ipsa de grandibus & subrectis, coma concinna; & nisi qd impedit, uerticē nucis Pineæ representās. Materies solida, colorata, firma, cōpactilis; radicibus neq; multis, neq; in altū defixis, ualidis tamen & crassis, auelliq; difficillimis. Nasceitur femine, radice, auulsione, solo aliofo, humecto, interimq; montibus. Conduñt sapa Caronis p̃cepto. Nostri differentias in Sorbo quatuor nouere: alijs rotunditatē mali reddūt; alijs turbinē piri, utriq; sapore uini gñoissimū, cui circa pediculos folia; alijs ouata specie, odore acri, nec p̃inde iucūda suauitate. Quartū genus Torminale appellāt, ualens cōtra tormina: hoc assiduū prouenit est, minimūq; pomo, arbore dissimili, folijs fere platani.

Longa est arboris huius & pomi in Theophrasto historia. Nec breuiter Plinius de eadem legit. Res etiā ipsa de quotidiano spectaculo satis nota est.

Theophrast. lib. 15. cap. 12.
Plin. lib. 15. ca. 26.

VERG.

C Quo fit, ut magis Barbarū demiremur, tā incerta de pomo, arboreq; hac in Corollario suo docente. Optandū profecto hoc loco erat, græca nouisse oēs, ut collatis cū Theophrasto ab eo dictis, imperfectā hoīs interpretationē cognoscerent: in qua nescio, credendū ne magis sit, qd obiter ea uerterit, an potius, q; morte præuētus, fartā testāq; rem ostendere nō potuerit.

De Prunis.

CAP. CLXXVI.

πικρὴν μήλην

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur. Sed stomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca Pruna, & præcipue quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. Aluum adstringunt, Folia Pruni in uino decocta, gargarizatu uam, gingiuas, & tonsillas fluctione laboranteis reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum baccæ, post maturitatem exiccata. Cum sapa uero decocta stomacho utiliores redduntur. Aluumq; magis adstringunt. Gummi Prunorum agglutinat. Potum in uino calculos comminuit. Ex aceto quoq; illitum, impetigines infantium sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 11. ca. 11.
lib. 11. cap. 1.
Theoph. li. 1.
cap. 16.

Prunus, Cocomelea, & Cocomelos græce dicta. Pomū ipm neutro gñe. Arborē masculi no media comœdia pnunciat. Folio Arbuti describit, si Theodorus audiat. Et inter paruas, ut peculiare in ea Theophrastus reddiderit, fructū in lanuginē solui, quæ dicat Pappus: qd nulli alij arbori eueniat. Sed hoc Plinius, Theophrastū secutus, non pruno, sed coggigryæ uocatae tribuit. Decepit hominē uel corrupta lectio, uel nominū affinitas: forte q; cocomeliā, non cocomelcam scribendū erat. nā & Vnedo, cui similis est Coggigrya, neliæ nomē apud Theophrastū habet. Prunū syluestre Virgilius Spinū uocauit, eo uersu. Spinus iā Pruna ferētes. Genera Prunū ppe inexplicabilia. Versicoloria, nigra, candida: quæ a cōitatu frugis eius hordeacia dicuntur. Alia eodē colore, seriora, maioraq; Asinina cognosciata ob uilitatē. Sūt & Onychina Columellæ, nigris laudatiora. Sūt Cerina, siue Cereola, atq; Purpurea, necnō Armeniaca, de quibus dictū. Habent & insita Nucipruna, q; in facie parentis succū adoptionis pferunt, Nucipruna q; uocant. Hęc & Cerina & syluestria ubiq; nata, ut uuæ autūno cadis usq; ad alia nascentia condunt. Reliquorū uelocitas transuolat cito marcescentiū. Non pridē, ingt Plinius, in Betica malina appellari cœperūt malis insita, & Amygdalis, intus in ligno nucleus amygdalæ, nec aliud pomū ingeniosius germinatū est. Damascena, e Damasco Syriæ, iā pridē ante statē Plinij, in Italia nascebatur, grandiore q; ligno, & carne exiliore: nec unq; in rugas siccata, quādo soles sui defunt. Populares hīs Myxæ, de quibus in Aegypto & uina fiunt. Familiares & ipsæ Italiq; uel Sorbis insitæ. Amariora prunis Myxæ, ui similia Paulus existimat. Nā myxæ Græci uocāt, nos myxas. Quibus similis est Persicus ægyptia, nisi q; poma ægyptiæ rubescūt. Pruna oia post Catonē in Italia cœpisse manifestū est. In syluestribus, satuiisq; Prunis limus est arborū quē Licheni Græci uocāt. Est & sua Prunus Aegypto, magnitudine insigni, nō dissimilis Spinæ Syriæ, pmo mespili, ligno intus grādi ac rotūdo, Florere incipit mēse sere Iulio: maturefcit bruma, nec folia dimittit. Corpus ipsum pomi natura, copiatq; pro messibus est incolis. Siccatū purgatūq; fundit, seruātq; eius ossas qui Thebis habitāt. Mirat Galenus Dioscoridē, q; Pruna Damascena sicca aluū sistere pderit, cū perspicuo soluāt. Qz q; minus ingt, q; Hiberica uocata: qm prius ex Hispania uenerūt, ut ingt Aetius, succi dulcioris. Cæterū Damascena intelligit, q; Theocritus Brabyta uocauit, quæ & Madrya, & Badrya dicunt Athenæo. Prunus syluestris, ut idem auctor est Galenus, in Asia Prumnon dicitur, & nos ea uulgari uoce Prumnullā uocamus.

E X M. V E R G. C O M M.

Certiora, & ex re magis de Prunorū uiribus post Dioscoridem alij tradiderūt: demiraturq; hunc Galenus lib. 2. de simplici medicina, dicentem siccatis Damascenis Prunis compesci aluū, eū manifeste & hæc deiciant, sed minus q; alia. Vnde nō male suspicabitur aliquis, quod in cunctis græcis legitur, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν φύλλων. &c. quod est, foliorum decoctū potuisse quondam aliter legi. Nā præter aliorū decreta, qui fructū hoc tribuerūt, res ipsa id exigere uidetur. Nihil tamē in cōmuni omnium codicum lectiōe & fide mutati a nobis est, & quā forte hic locus exigebat castigationē, ad eā q; statim sequunt manifeste trāstulimus. Quod em in hoc scriptore passim legit τὸ δὲ ἀπὸ τῶν φύλλων ἢ οὐκ ἐκ νεφελῶν, non ἐκ νεφελῶν, ἢ ἑρρατῶν, qd nullā habet

hoc loco significationem, sed *διὰ τὸν ὄντον*, quod colluere significat, legendum est: id omnium probatis, mihi codex habet. Et Paulus Aegineta, de his ipsis libro 6. agens, ait, *τὸ δὲ ἀφ' ἑλκῶς αὐτοῦ τὰς κατὰ γαργαρίαν φλεγμονὰς ἵκται διὰ τὸν ὄντον*, quod est, Prunorum decocto gutturis inflammationes collui, ut sit in Dioscoride sensus, collui & gargariari decocto illo facium mala ab ea multa deinceps numerata.

De Arbuto. CAP. CLXXXVII.

Arbutus, siue Vnedo, arbor est Coronæ malo non dissimilis, tenui folio. Cuius fructus Pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo. Huic Apomacolæ cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur. Capitisq; dolore mouet.

BARBARI COROLL.

Arbutus græce, Comaros dicta, cortice deciduo, tenui, similitudine tamaricis, folio interlicem atq; Lauri. Arbor ampla non est. Flores Iulio mense, ab uno pediculo cacuminibus ramicem dependent, similes baccis longioribus myrti, neq; foliosi, sed concaui, seu ouis pertuso uertice. Cum deflorescunt, parte qua sunt annexi perforantur, relabendoq; in pediculū, speciem uerticilli fuso inieci præbent. Fructus anno perficit, cibo idoneis, ut paniter floscat subnascens, & prior coquas. Carbones officinæ argentariæ commendant coctione prima, ut ariā. Pomum hoc, & Comaron, & Memecylon Græci fere uocant. Latini pomū & arborem quoq; ipsam Vnedonem, & Arbutū appellant. Sunt qui duo genera constituent, Theophrastū, ut arbitror, secuti, Comaron, id est, Arbutū, & Mimecylon, id est, Vnedonem, a Theophrasto Ne-lian uocant, defluo & hoc cortice, folijs quoq; sed ima tantū parte deciduis, uiuente perpetuo coma. Mas sit, an femina sterilis, nō constat. Arbor ipsa fructuosa. Pomū in honori: ut cui nomen ex argumentum sit unū dumtaxat edendū, uel fortasse, quia folij hoc pomorū simile fructū terræ gignit, hoc est, fragis terrestribus e quinq; folio frutice nascētib; quæ & Mora terrestria dicunt a Seruio grāmatico, Nec satis scio, an recte. Ideoq; montana Fraga nominant a pœpīs, ut a terrestribus distinguant. Galetus & Paulus Arbutū comaron, Syledonē uero, siue ut ipse lego, Vnedonē a rusticis Italiæ uocari scribit, quā Epimelida, & Epimelida Græci nuncupant, syluestris mali genus, copiosum in Calabria, fructu acerbo, & infesto capiti & stomacho. Sed siue aliud hoc sit ab eo, quod Dioscorides inter mespila connumerat, & Epimelida meminit uocari, siue idem, certe Palladius Epimelides, siue Hypomelides inquit, sunt poma Sorbō similia, mediocri arbore nascentia, flore candidulo, sapore ex acri dulci. Pamphylus Apimelida Piri genus arbitrat, quod alij uocant Amamelida. Quidam Homomelida: frequēte in Ionia, & biseram, fructu Piri, sed sui generis. Omnino, ut Athenæus inquit, prædulci & sine nucleis, ac prælato piris. Alij Omomalidas uocant, ut Asclepiades, non pira, sed mala syluestria & montana: quæ Theocritus Oromalidas appellauerit, cū sicu maturescant. Amamelides, inquit Galenus apud Hippocratem, mespili genus est nascentis in Italia. Ex quo facile colligit, Amamelidas ei esse, quæ sunt Epimelides Dioscoridi. Mirū, qd eius usu, mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Auctores sunt, quinquagenū cubitorū altitudine, in Arabia esse Arbutos. Similis Comaro est & Adrachne, quā oēs fere Græci, Portulacæ noie interpretant falso: cū illa sit herba, & Adrachne uocet, unius literæ diuersitate. Theodorus, apud nos arborē Portulacā uocauit, ut a Portulaca herba distingueret, eruditius, qd felicius. Ceterū Adrachne est syluestris arbor, neq; in planis nascent, similis Vnedoni, fructu & folio tantū minorē, & nunq; decidētē, præterq; ab imo. Cortex exciduis, & scaber quidē, sed qui circumgelatus uideri possit, tū tristis asperū est. Qd in Theophrasto, nō περιπυρρύνον, hoc est, circumgelatū, sed περιπυρρύνον, hoc est, rumpentē se per ambitū legat, quod & Theodorus quoq; sequit. Alibi quoq; Theophrastus, περιπυρρύνον, hoc est, corticis abscissus, Platano & Adrachinæ cōe inquit est. Sed lectionē Plinij ueridicem puto: quia corticē excidere huic arbori propriū nō est, sed ad alia quoq; plura pertinet. Liberū tamen sit æstimanus hanc iudiciū. Corticem quoq; candidū, Theodorus ei reddidit, quia leucon, ut arbitror, legebat. Ego lepron, id est, squarosum, scabrūq; lego, Plinij secutus. In Helicone arbore hanc Pausanias enasci tradit frequēte. Etiam si Adrachnū uocari credidit, Magniudo arbori nō præcipua. Illud cum Subere habet peculiare, detractū in orbē corticē, nō emori: quod ueteres latini, cingere arbore uocabant: actio ne instituta cōtra eos, qui ita de glabressent, & balteū exemissent, Arborū furtim celsarū, eadē causa, qua legis aquilæ. Germinare cum Urbana Theophrastus eā scribit: Nec de urbana qualis esset inuenio, nisi quod mi-

A

κέρκρον

Pli. li. 17. c. 114.

C

B

Nota de Adrachne portulaca.

Cnlme uerū puto, herbā intellexit Portulacā. Inter biferas hæc arbōr, priorē fructū, incipiente pu-
bescere uua, peragit. Posteriorē, hyēntis initio, siue ut Theophrastus inquit, priorē cū dulce-
scit uua, posteriorē cū floret. Adrachne usus foeminis, ad opus telarū. Similis huic Apharca.
Plinius Aparachē uocat, e syluestri gñe arbōrū, æterna fronde, olympto monte frequens, nec
nisi montibus nascens. Habetur & urbana. Vtrūq; genus simul germinat, & ut Adrachne bife-
rum, septis ualliscq; utile, sed urendo quoq; prædicat. Differt Connaros a Comaro, ut in Paliuri
mentioe diximus. Testandū est & illud, grāmaticos græcos esse, qui fructū Arburi, Acylon uo-
cari tredant falso, cum Memecyloti eum dici constet. Acylon uero ligna glans sit.

De Amygdalis.

C A P. CLXXVIII.

amygdalis

Amygdalæ amaræ radicū decoctū, uitia cutis in facie corrigit. Il-
litæ nucēs idē inuñs præstant. Menses admotæ ciunt. Capi-
tis dolori auxiliatur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo.
Epinyctidas sanant ex uino. Item putrescentia ulcera, & quæ serpunt, &
morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum
emolliunt. Somnum faciunt. Vrinam cient. Contra sanguinis reiectio-
nes cum amylo assumuntur. Renum uitij, et pulmonum inflammationi
bus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Cal-
culosis, difficultiq; urinæ in passō auxiliantur. Et illinctu cum melle & la-
cte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellanæ magnitudine.
Quinis, septenisue præsumptis, ebrietatem non senſiūt potores. Vulpes,
si cum quauis esca cas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit et ad-
Dstringit. Reſcipientibus sanguinem, potum auxilio est. Impetigines quæ
summum corpus occuparūt, illitum cum aceto tollit. Tussi uetustæ cum
diluto uino potum medetur. Calculosis cum passō bibere prodest. E nu-
cibus græcis dulces cibo idōneæ, sed multo minus ualent in remedijs q̃
amaræ. Attamen extenuant. Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo pu-
tamine humida stomachi uitia recreantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. lib. 16. ca.
35. li. 17. ca. 18.

Amygdalæ flos, anteq̃ folia (quod fere soli propriū inter arbores tribuitur) manat e trun-
co. Lachryma ad nihil utilis. Proximū corpori operimentū, item summū, simile Iuglandiū, sed
tenuius, nucleo dissimili, lato, callosioreq;. Mori uulpes earum pastu ferunt, utiq; si non con-
tingat e uicino aquā lambere. Nihil æquæ degenerat, q̃ Amygdalus. Ideoq; aut plantā sapi-
us transferri, aut adultā inferi præcipiunt. In remedio est, & paxillum adigere, & lachrymā de-
fluentem extergere, reliquo cultu omni perinde adhibito. Ex Amygdalo cinerem & lixiuiam
probāt, ut acerrimā. Ad fornaces, artesq; aliquas non incōmodo quoq; ligno. Amygdalā ean-
dem esse cum græca & Thasia, Cloatius putabat. Alijs græca uidetur esse Iuglans. Columella
tria facit genera libro sexto, Græca, Iuglandis, Amygdalæ. Amygdalus dulcis, si a pecore
sit erosa, dicitur amarescere. Quemadmodū Amygdala nasci scripta possint, rei rusticæ libri do-
cent, origine a Græcis orta: quod & ad alios quoq; fructus feliciter conuersum est.

*
Pli. li. 13. ca. 8.

E X M. V E R G. C O M M.

Si huic, & Galeno, quorum decreta pro oraculo antiquis medicis fuerunt, credendum de
uisibus Amygdalæ est, primam capitis huius partem, parum feliciter latinis Barbarus reddi-
dit, dicens, amaræ Amygdalæ radicū tritarum decoctum, cutem in facie corrigit. Neq; enim
hic, si uerba eius omnia diligentius estimentur, illud decernit, sed quod Galenus lib. 6. de sim-
pli. Si accipiantur Amygdalæ radices, coquanturq; ephelides foris impositas auferret: subterq;
non decocto Amygdalæ radicū foueri ea labe hominis faciem, sed decoctam radicis materiā
uitio illi imponi. Quod primo lib. etiā Paulus Aegineta confirmat.

Alternat præterea, si melioribus græcis habenda est fides, Dioscorides, acetum, & rosa-

ceum, quo loco iubet in dolore capitis utroque uti, non simul, sed alterutro: ⁷³ enim, quod uel,

Reliquit & Barbarus, quod alioquin Plinius monēbat, & post Plinij Serapion cōtra sanguinis reiectionē, ultra amyllum cum mentha sumendas Amygdalas esse. Siquidem Plinius libro 23, cap. 9, his uerbis rem indicat, Et sanguinē sistunt, cum amylo & mentha: fuisseque hanc lectionē Serapionis ætate cōmentaria eius indicant, Et nos plures ex melioribus Græcis uidimus, in quibus *μετὰ ἀμύλου καὶ ἀδύσμου* manifeste adhuc legitur.

De Pistacijs.

CAP. CLXXIX.

Pistacia quæ in Syria gignuntur, Pīneis nucibus similia sunt, & sto macho facilia. Trita cum uīno contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

BARBARI COROLL.

Pistacea in nucū genere habentur. L. Vitellius, qui censor fuit, & hæc in Italiā primus intrauit e Syria, cū legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Caesaris temporibus. Mox & in Hispaniā, qui cū eo militauerat Flaccus Pompeius eques Romanus. Venetijs hæc, Iudaico uero, sacu seminis enata uidimus, folio maiore quæ Lentisci. Marem in hoc genere accipiunt, cui sub corio uelut ossei longi uident latere testiculi. Nicander Colophonius Pistacia uocauit. Et alius Nicander Pistacia. Sunt qui Pistacia, ut Possidonius. Inuenio & Astacia scriptū in poetis. Athenæus auctor est, Terminus, siue Terebinthos credi solita a nonnullis, quæ nunc Syri Pistacea uulgo appellant, foliorū similitudine, ut arbitror fallente.

EX M. VERG. COMM.

Male in omnibus græcis, præterquam in probatis, mihi codice legebatur, *πιστῖνα τὰ μὲν γὰρ ἐν ὕπνῳ*. Hic enim dicendi modus alterum sibi membrum & Pistaciorum genus exigebat. Quando, ut græcorum grammatici docent, semper τὰ μὲν, reddendum, τὰ δὲ est, non aliter quæ si in latinis dicas, hic quidem, ille autem, semperque proposita altera expectanda, & querenda altera pars est, quæ aliud, aut diuersum a priore illa aliquid ostendat: quod nullibi in hoc capite inueniri poterat. Fuitque, ut uidere licuit, uera & antiqua huius capitis lectio *πιστῖνα τὰ μὲν ὕπνῳ γὰρ ἐν ὕπνῳ*, facili in una tantū syllaba ad uitū lapsu, Idque etiā Plinius libro 23, indicat.

De Nuce iuglandæ.

CAP. CLXXX.

Nuces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, bilio sæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomitus ris ieiunis in cibo aptæ, Cum Ruta uero, & Ficis præsumptæ, uenenis resistunt. Nec minus si a ueneni haustu comedantur. Largius esitæ teneas latas pellunt. Illinuntur mammarū inflammationi, abscessibus, luxatiscque cum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autē, sale & melle, canis, hominiscque morsui proficiunt. Tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum, tritumque in oleo & uīno, infans tū capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias replet. Sistunt menses nūclei uisti, si triti ex uīno admioueantur. Iidem e ueteribus illiti carbunculis, gangrænis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & impositi præsentī sunt remēdio. Nucibus tussis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaque alio mixtæ eximunt acrimoniam. Liuios in corpore illiti tollunt.

BARBARI COROLL.

Caryon basilicon, id est, Regia nux uocata, fructificat autumno. Arbor Careæ græce dicitur. Notum in ea est, callieulacea tegumenta totidem, quot flores fuere, contrahi pediculo, singulisque his singulas includi nuces, duplici munimento protectas, puluinato primū calice, mox ligneo putamine, quot modis & fortis in parente, hoc est, utriculo atque uentre. Propterea Fescæ

A

πιστῖνα

Pli. li. 23, c. 8.

B

καρπὸς βασιλικῆς

C. 10. 1. 1. 1.

Pli. li. 11, c. 22, 23. Macrobi. lib. 3, cap. 13.

C ninae locutionis comites, & religiosas nuptijs, uerisimiliter hoc, q̄ q̄ cadendo tripudium faciunt, elidendo uirginū puellarum clamore. Germinat hæc non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus inopulso priore pululo. Qua forma & caudæ totus, & pragrandes rami crescunt. Hoc & Auellanae faciunt, & quibus germina in folium unū procumbunt uidelicet: quia desit initium undē germen erumpat. Medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, lscā dicitur Aetio. Forte ut alia quoq̄ multa, deprauate a latinis id acceptum, quasi elscā, quoniam prigniatio & cauteribus inopulso priore medicis. Mutari hanc in quercum senio, nonnulli produnt. Transulere Iuglandem reges. e Perside, ob id regiae nuces appellatur. Caryon uero, a capitis grauedine, propter olacitatem uocatā, nemo dubitat. Etenim arborū ipsarū, foliorūq̄ uires, in cerebrū penetrant, hocq̄ in cibus nucleī earū, minori momēto faciunt. Tinguunt cortice earū lanē, & capillus ruffatur. Primū prodeuntibus nucleis, id compertū, insectis tractatu manibus, pinguescunt uetustate. Sola differentia generū in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multilocho simplici. Solū hoc pomū natura compactili cinxit operimēto. Nāq̄ sunt bifida putaminū carinae, nucleorūq̄ illis quadripartita distinctio, lignea intercurfante mēbrana. Hæc arbor an fuerit in Italia Caronis æuo, nō constat: quoniam græcas nominat, quas quidā in genere Iuglandiū seruāt. Sunt & Galbæ, siue Caluæ. Itē Prænestinae, ab eodē Catone dictæ: quas maxime laudat, & conditas fictilibus in terra seruari uirides meminit. Postea Thasiæ, & Albenfes pbari ceptæ. Et Tarentinarū duō gēa, fragili putamine, & duro, quæ sunt amplissimæ & minime rotundæ: quas a frangēdi mora Moracias, & Moracillas sunt qui uocent. Præterea Molluscæ, putamen rūpēs, Macrobius, qui Persicū uulgo dictū Molluscā nucleū esse putat, aperte hallucinatus est, cū is nō de Persico, sed de nuce regia & Iuglādē q̄ sit e Perside cōuectā primū ad nos, Molluscā intelligat. Nā a quibusdā Nucleū persicā uocari tradit, Sueuū hoīs doctissimi testimonio ferus. Thasiā quoq̄ nucleū, arcq̄ Græcā, Amygdalarū esse gēis, Cloatius existimat. Prænestinā Macrobius eandē esse cū Auellana, Varronis & Nēuī auctoritate meminit. Iuglans a iuuādō & glāde, siue quasi Iouis glans, literis intercisis appellatur: siue quasi diu glans, id est, Dios balanos. Theophrastū uocasse Cloatius auctor est. Sed certe Dios balanos Castaneā Dioscoridi significat. Proinde nō parcius errauerit Nonius Marcellus, qui Iuglandē pro syluestri nuce interpretatus est. Biferas Iuglades, Siluaciano patuinī agri uiculo prouenire satis constat. Fomites ex hac nuce Mnesior optimos fieri cum dixit, de Iuglande uidetur intellexisse.

E X M. V E R G. C O M M.

C Vt Persicas, & Regias Græci, Romani uero Iuglandes in genere nucum eas dixerint, quas nunc priuatim Ethruria genteq̄ alia multæ nuces nominant, satis Plinius lib. 15. cap. 22. declarat, quare nos ea de re supersedebimus.

Barbari tamen supersticiosam interpretationē non probamus, qui quod hic *διωκεῖν* dixit, nihil aliud significās, quā quod ægre in stomacho concoquitur, & quod Plinius difficiles concoctū ait, resides in corpore, & difficile transire dixerit, longiore q̄ decuit uerborū ductu, nec satis apto uerborū intellectu. Quando aliud iudicio nostro est, ægre concoqui aliquid, & aliter dici residere aliquid in corpore, nec facile transire. Nec obstat, qd & Varro usus hac uoce est, sed tamē quod aptius & certius in Dioscoride ad medicinā dici debuert, desideramus.

De Nucibus Auellanis, C A P. CLXXXI.

N Vces Auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho infestæ sunt. Ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsā potæ, tussi ueteri medentur. Tostæ, & cum exiguo piperis potæ distillationem concoquant. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alopecij capillum reddit. Aiunt nonnulli, usta earum putamina, & in cineris speciem redacta cum oleo, cæsiōrum oculorum pupillas infantibus denigrare, persuso sincipite.

B A R B A R I C O R O L L.

N Vx Auellana, quā Græci Heracleotica appellat, nostri Prænestinā, & Abellinā patriæ uocabulo. In Asiā Græciāq̄ uenit e Ponto, propterea nunc Ponticæ, nunc Heracleotice dicitur. Quo nomine Macrobius, Castaneas intelligi falso putat, Oppliū secutus. Ponticas, sunt qui & Alareas nuces cognominent. Inuenio & Alariā uocari, arborem undē iacula & hastæ factitari sole.

Pli. lib. 15. ca. 22.
Macrobi. lib. 3. cap. 15.

ΚΕΡΚΗ ΠΟΥΤΙΝΗ

ſitari ſoleant. Auellane ſunt ex arbore, quæ Corylus dicitur. Has mollis quidem regit barba, ſed putamini nucleisque ſolida. Rotunditas contra, q̃ luglandibus. Vmbilicus Auellanis, et in uentre medio. Torrentur ex cibis. Corylus neglecta cōmeat in fructem: quæq̃ ſi quis eam minus ſublucet, fructum meliorem & copioſiorem ferre traditur: ut quæ naturę ſuę proprietate fructuſoſa ſit. Tonderi tamen, reſectariq̃ præcipiunt: ita fructuſoſam reddi. Alioquin ſi arbor eſcere patitur aliquis in corpulentiam & magnitudinem, alimentum omne ſumptit. Florere negant hanc aliq̃, ſed floris uice quosdā in ea uillos erumpere. Huic ſimul fructus dedit, uq̃ mō callus innaiſcit, magnitudine uermis grandiuſculi pinguis, ſingulo pediculo cōpactilis: ſulū uocant. Dehiſcit uere ac deſluit, cum folia emergunt, ſimili omnino ſorte qua Cacharys in robore, abiete, ceteriſq̃ ameniſeris. Sylueſtris prius natura: qm̃ hyemis patiētiſſima, & montibus magna parte prouenit. Nec urbanæ fructus magnopere q̃ indomitę pſtantior, ſoliū urbani maius. Seratumq̃ ambitu utiq̃. Alno ſimile, tñ latius. Coryli, alię nucē rotundæ, alię oblongę ferūt. Candidiorē urbani, meliorem in aquacis. Tranſlatū miteſcunt ſylueſtres. Cortex ſumus, tenuis, pinguis, & maculis albis uariuſ, materies lenta, prægraciles eiꝯ uirgæ deſquamantur, craſſiores deaſe interpolantur. Medulla tenuis ſuſſilaua, quæ dematur.

EX M. VERG. COM M.

Επιερχόμενος τοῦ ἐπιμυτος, parum recte perſuſo capite tranſtulit Barbarus. Nec enim *Επιμυτος* caput græcis eſt, ſed anterior tantum capillata pars, ſi Galeno in anatomia credendum eſt.

De Moro. CAP. CLXXXII.

Morus arbor nota eſt, cuius fructus aluum ſoluit, Stomacho inuulſilis eſt, & facile corruptionem ſentit. Hoc idem præſtat Mori ſuccus. Decoctus autem æreo uaſe, atq̃ in ſolatus adſtringentiꝯ redditur. Facit ad fluctiones, nomas, & tonſillarum inflammationes, addito melis exiguo. Sed inoleſcit uis eiꝯ adiecto ſciſili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricæ ſemine, iri, & thure. Immatura Mori poma ſiccantur, tuſaque acinorum rhois uice obſonijs miſcentur, ut cœliacos iuuēt. Radicis cortex decoctus in aqua, et potuſ aluum reſoluit. Latas uentris tineaſ excutit. His quoq̃ auxiliatur qui aconitum hauſerunt. Folia ex aceto illita, ambuſtis igni medentur. Tinguuntq̃ capillum, uitium & ſici nigræ frondibus ſimul coctis in aqua cœleſti. Succus foliorum cyathi menſura potuſ, contra phalangiorum morſus auxilio eſt. Ferueſcenti corticis, & foliorum iure dentes apuſſime in dolore colluuntur. Radix circiter meſſem incifa, facta in ambitu ſcrobe, ſuccum emittit, qui poſtridie concretuſ inueniri ſolet. Is in dolore dentium efficax eſt. Tubercula diſcutit. Et aluum purgat.

BARBARI COROLL.

Moro ſuccuſ in carne uinoſuſ. Trini coloreſ. Candiduſ, mox rubēſ, maturo niger. In nouiſſimis floret. Inter prima matureſcit & tranſuolat. Tinguunt manuſ ſucco. Matura eluunt, acerbam pilū coriſi folia eiꝯ in urina maſeſacta detrahūt. Minimū in hac arbore ingenia proſecerunt, nec nominibus, nec inſcriptionibus, nec alio modo q̃ pomū magnitudine. Mora diſſerebant Hoſtienſia, & Thuſculana Romæ. Autores græci, Morū inſerunt caſtanę, phago, terebinthi, piriſ ſylueſtribꝯ, malo, ulmo, populo, quæ ſit alba: unde cādida naſcant Mora. Naſcunt & in rubis, multū diſſerente callo: quę Maratha nominant ab Hippocrate. Quanc̃ corrupta fortalle cōſtitio eſt, nec *μαράνα ἀπὸ βαρῶν*, ſed *μόρα τὰ ἀπὸ βαρῶν* ſcribere oportuit. E pomo arboris Mori Panchreſtoſ ſtomatice, eadē Arteriace appellata, pluribꝯ modis ſit. Neq̃ eſt aliud oris, arteriæ, uq̃ ſtomachi iucūdiꝯ remediū. Hoc et uulnera ad cicatricē pducibāt. Succuſ ſic cato expſſuſ pomo, multū ſapori q̃ obſoniorū cōfert, ab Hippoc. Rhoō q̃nq̃ dictuſ. Mora geminatione priuſq̃ in folia exeāt, liſiſtra manu decerpi tubēt. Futura poma Ricinoſ, ſiue ut qdā legūt, cydinoſ græci uocāt. Si terrā ſi nō attingere, ſanguinē liſiſtūt alligati, quacūq̃ parte ſuat.

A

*μορα ἢ ρυκα-
μυρα.*

B

*Pli. li. 15. ca. 24.
The. li. 4. ca. 2*

n

C Ad hoc seruant repositi. Materia utilis operibus, quæ flexu cõstet. Ideo furculas ex ea circosq; faciunt, ut ex caprifico q̃q;. Itē nauibus tornacula, ut ex fraxino, ulmo, platano. Quanq; e Plata no celerit putrescunt. Itē auriculas liburnicis, & testudines atq; firmamēta. Mora in Aegypto & Cypro sui generis habent, ut mox dicemus. E ficu Aegyptia et Cypria, Sycaminō gr̃ci pomū ipsū uocant. Sycaminēā, & Sycean, & Sycen q̃q; ipsam arborē Hippoc. Nā Aegyptia & Cypria Sycomoros, & Sycomorea dici fere solent. Media Comordia, Sycaminō uocat et pomum & arborem, sed pomū neutro, arborē masculino gñe, ut apud Iuliu Pollucē notatū legit. Hip pocrates Morum arborem, est quando Sycen, & Moreon quoq; dicat: ubi uidelicet radicem Syces, primo de fœminarum incõmodis uolumine requirit, ut Galenus interpretat̃. Inuenio & Modon scriptum in Hippocrate, pro Moro, nisi fallor, culpa librariorum.

S De Sycomoro. CAP. CLXXXIII.
συκομορος
 Sycomorum aliqui etiā Sycaminum, idest, Morum uocant, cuius fructus Sycomorum etiā propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non ramis ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius gr̃ssis, sine granis interioribus. Quod nō maturescit, nisi ungue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus, ubi prouentu secundo iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum alio utile est, sed nullam præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus tenera arbore antequam fructum ferat eximitur, lapidis icu summo cortice desquamato. Si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia, aut uellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta reponitur. Vis succi emollit. Vulnere conglutinat. Discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiā, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quod Vlmus esse uideatur, folijs Sycomori, fructu Pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Macrob. li. 7.
 ca. 20. Pl. li. 17.
 capite. 17.

Humor hu-
 morem siccit

B A R B A R I C O R O L L.
Ficus Aegyptia, siue Morus, quam, ut Celsus ait, & Morosyon appellant. Fructum hanc nō caudice, sed ramis fere qdam falso tradunt: cum ueriores sint, qui utroq; nasci prodāt. Magnitudo, aspectusq; pomō fici, succo tñ & sapore caprifici. Sed dulcedo copiosior sine granis interioribus, scalpēdo tñ ferreis unguibus, nec aliē maturescit. Quod cū factum est, quarto die decerpitur, alio subinde atq; alio subnascente terno, ita ut etiā septeno numerosa partu pingulas æstates, multo lacte abundante. Subnascit etiā si non scalpāt, quater æstate, priorē impellendo foctū, q sit imaturus. Arbor nostrati Moro similis folio, magnitudine, cõspectu. Materies in paucas utilissima. Cæsa statim uret. Siccatur mersa in cilibus atq; stagnis. Cū fluitare cœperit, tempestiua opibus intelligit, ablato ita pondere, ac soluta. Id probe inuenterat signū habent: uidelicet alienus humor, alium eius omnē rigando suggit. Huic similis est, quæ uocat Cypria Ficus, in Creta. Nam & ipsa trunco pomū fert, & ramis, cū in crassitudine adoleuere. Distat a superiore: quod germina emittit, sine ullis folijs, radiculē similia, cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur. Caudex magnus, & Populo albē proximis. Folij ulmē quater germinat, quater suas ficos maturat. Sed grossus in ea nunq; excogitur, nisi emissio incisura lacte. Suauitas pomō Fici, sed interna. Similitudinem caprifici habent. Magnitudo Pruni, uel Sorbi.
 De Ficu Cypria iam dictum est in Aegyptia.

The. li. 4. ca. 2.

E X M. V E R G. C O M M.
Crediderunt Theophi, & Plinius, in Aegypto tñ nasci Sycomorum hanc. Alter eñ ubiq;

nō eius meminit, q̄ ut dicat, τὴν ἐν Αἰγύπτῳ συκομύρον, αὐτὴν Αἰγύπτῳ συκομύρον. Alter lib. 17. ca. 2. his uerbis de ea tradit. Et in Aegypto multa arborum gēa, quę nō alibi. Ante oīa Ficus ob id Aegyptia cognominata. Arbor Moro similis. Gręci ex utroq; Sycomorū, quasi ficū simul & morum, uel Sycaminon, idest, Morum tantum dixerunt. Ab illa nomen expomo, ab hoc & ab alijs ex arborum aspectu nomen factum est. Celsus aliquando Sycaminon, aliquando Sycomorū, interdum etiam Morosycon appellat, nisi uicium etiam in eo sit.

Illud etiā nō immerito queri, cur nā arboris huius ponitū obignauit & inerte sapore Sycomorū uocat: Sic em̄ ait, καλεῖται δὲ καὶ ὁ ἀπὸ αὐτῆς καρπὸς συκομύρον, δὲ δ' ἔστιν τῆς γλυκύτης, ex quibus aperte indicatur, non quia similis Moro arbor hęc sit, sed quod sāgido & inerti sapore sentiatur. Et si id hoc sensu simpliciter accipiat, nō ab resuscipari aliquis poterit, non συκομύρον, sed una tū mutata litera, συκομύρον, quasi fatuā et stolidi arboris ficū appellandū sycomori fructum esse. Id enim prima producta μάρον gręcis significat. Nos tamen id nō probamus, credimusq; quod hic ait, δὲ δ' ἔστιν τῆς γλυκύτης, ad proprium eius saporem referendum esse, qui in eo sit, ut ait Plinius pēdulcis, & sine interioribus frumentis, seu granis.

De Ficis.

CAP. CLXXXIII.

Fici maturę, recentes, stomachum lædunt. Aluum soluunt. Sed facile contracta ab eis fluctio sistitur. Sudorem euocant, papulasq; sitim sedant. Calorem restringunt. Siccis, natura excalfaciēdi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, Rheumatismis uentris & stomachi contrarię. Gutturī autem, arterię, renibus, uesicę, & ijs quos longa ualētudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus apertissimę. Feruefactę cum hyssopo, & potę, pectus purgant. Tussi ueteri, diurnisq; pulmonum uitijs conueniunt. Aluum molliunt, tussę cū nitro & croco, dein manducate. Decoctum arterię, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasma tū miscentur. Et in muliebres foras, cum feno gręco & pūsana. Ceterum cum ruta coctę, torminibus infunduntur. Coctę, illitęq; duricias discutiant. Parotidas, ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addita. Crudę si cum antedictis tunc dantur, eadem efficiūt. Cum malicorio, pterygię purgant. Cum atramento sutorio, deploratis fere tibiarum fluctionibus, & cacœthicis ulceribus medentur. Quin & cum uino decoctę, addito absinthio & hordeacea farina, utilissime hydropicis illinuntur. Crematę cum cæro sanant perni ones, prurigines. Sonitusq; si crudę terantur, & synapi liquido exceptę auribus instillantur. Tam syluestri, q̄ fatiuę Fici lacteus succus, coagulimodo lac contrahit, concretumq; dissoluit ut acetum. Exulcerat corpora. Venarum spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce gręca potus. Menstrua ciet cum luteo qui appositus, aut thyrrhenicacæra. Podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnogręci & aceto utilis. Lepras, lichenas, uiligines, uitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. Instillatum plagę percussis a scorpio ne, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Prodest dentium dolori lana exceptus, & in cauis eorum additus. Verrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem

C præstat succus e teneris ramis syluestris Fici, qui lacte prægnantes, silentè adhuc oculo tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bulbis carnibus ramuli ficulnei, faciem afferunt decoctionem. Lac efficitur quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathæ loco moueatur.

F I C U S B A R B A R I C O R O L L

The. li. 4. ca. 9.
Pli. li. 11. ca. 7.
li. 12. ca. 5. li. 15.
ca. 28. 18.

Fico circa Elephantium agrum folia non defluunt. Græci pomum Syca, & Palathen quæ uocant. Arborem uero Sycen, & Sycada. Quanquæ Sycada nouellam ficum fere intelligunt. ut Iulius Pollux inquit. Nam Ischades, aride fici sunt, aut caricæ interdum. Inuenias apud græcos Ischadas, recentes et ueteres quoque dici. Comœdia et Iscada, capiti pro sicca, uidef appellasse. Quanquæ & Iscada Sophocles, pro anchora est ubi acceperit. Fici pomum Hegeteriam, ab Atheniensibus uocatum, quasi ante alias fruges inuentum, auctor est Athenus, etiam quibusdam festis præferre pompæ solitum in ossis. Naxy, ficum ipsam Melichen appellant, a quo & Liberum patrem Melchion, ceu inuentore eius uocant. Ut Lacedæmonij Sycitæ. Quidam gigantem nomine Syceam, Ioue persequente, in Ficum a tellure conuersum fabulantur: unde in Sicilia ubi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxylis, ex Amadryade filiam, ut bi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxylis, ex Amadryade filiam, ut bi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxylis, ex Amadryade filiam, ut bi nomen sit inditum Syceæ. Sunt qui Sycen, hoc est, ficum, Oxylis, ex Amadryade filiam, ut bi nomen sit inditum Syceæ.

D Theophrastus inquit, *οαλεπιδή*, nisi quis *κεροντοποςδή* magis legendum putet. Nam Hippocrates, uere inquit, folia sunt Fico, pedibus cornicis similia. Ex interiore pomi huius semine, id est, minutis in eo granis, quæ græci *κνυραμίδας* uocant, etiam caprificus nasci dicitur a Theophrasto. Germinat sub arcturum, post uer: quod tempus comune omnibus est, præsertim edomitis, ac præcipuè in Fico, uite punica. Ficus in Hircania dulciores multo, fertilioresque, ut modios, 120. singulæ ferant. Externæ sunt in Italia Chalcidicæ: quarum genera plura. Item Lydiæ, quæ sunt purpureæ, & mamilianæ, similitudinem mamarum habent. Calistruæ, parum sapore præstantiores, sed græcorum iudicio prælatæ cæteris. Has & Ficus & Passarias uocant, Capitolinus auctor est in Clodio albino, Ficorum omnium frigidissimæ. Inuenio Pysçalia uocari quoddam earum genus, ab algore. Nisi quis malit ab Artice regiõis insula Pysçalia. Sed an Calistruæ sint, quia frigidissimæ dicantur, mihi parum constat. Nonnulli sunt, qui Pysçalia intelligant, quæ recentes non sint quidem, non tamen siccate. Africanæ ab aliquibus præferuntur, cunctis celebratæ Carthaginis excidio. Et aliæ ab Africanis Libyæ. Habentur & Sulcæ, & Topiæ quæ dicantur. Patri nomen obtinent etiam Alexandrinæ, post dicendæ. Candicat Serina, cognomine delicata. Nigra est & Rhodia, & Tiburtina, præcoquæ. Sunt & Liuianæ, siue ut alij uocant, Liuiæ pompeij, in usus annuos arefactæ solibus, aptissimæ cum mariscis. Et quas harundinei folij macula uariare dicunt, Harundineas ob id uocatas, a quibusdam Alfulas. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia alba, pediculo minimo latissima. Cloactus & Afinastræ, Atram, Paluscam, Augustam, Biferam, Cucurbitanam, Leptolydiam, Marficam, Numidicam, Pullam, Pompeianam adiicit in nomine. Sunt apud græcos Articæ, delatoribus inde nuncupatis, præsertim Aegilides. Sunt & Laconicæ, item Phrygiæ. Item Phibaleæ Hippocrati. Androction Leuceringon adiungit, quas nostri Albiceratas uocant, albas Ficos ferent. Addit et Oporabasilidas, & Celuron, & Phormynon, & Megaricam. Et alijs Toxaliæ sunt, & ex insula Pario Aemoniæ uocatæ, nihil a Lydijs distantes, colore sanguineo. Sunt & Amadei, et Coracei, & Nicoiei, & Basilicæ, quas & Basilidas uocant. Hybernas Ficos, Cydoneas græci appellant. Probabantur & e Zacyntho, quod & Plauti confirmat autoritas in Mercatore. Item Cimoliæ. Primo autem prouenit Porphiritis, longissimo pediculo. Comitatur eam e minimis & utilissimis appellata Popularis. Contra nouissima sub hyeme maturatur Chelidonia, hæc rubens est e nigro. Quæ porro nigra Ficus est, Barbachytra dicitur a græcis. Iulius Pollux, Chelidoniæ dicendo, Articas inquit intelligimus, quas Lacedæmone Chelidoniæ appellabant. Sunt præterea eadè serotinæ, & præcoces, bifere, alba & nigra cum messe maturescentes, atque uindemia. Serotinæ, a corio appellatæ duro, hoc est, ut Macrobius, Duricoræ, ex Chalcidicis trifero quarundam prouentu. Tarenti tantum prædulces nascuntur, quas uocant Onas. Sunt & Sagun-

ting, Tellanęq. Quibusdam prouincijs & Hibernę, sicuti Moesę: non natura, sed ingenio. In Ficorum genere, Caricę peculiari arbore fert Syria, & minores, eius generis quę Coitana appellant. Habentur & Caneę omniales, Marco crasso in Parthos mouendi. Caneę porro sunt, tam ex Carię oppidulo, unde nomen Caricis apud nos, ut consilio, aperte ut multa, q̃ ex Aeolica urbe Cauao cõmendabiles. Antiochenę uero Caricę, quas & Triphyllas uocāt, ut inquit Strabo, ab Antiochia Phrygę Meandro apposita nomen habent. Omnia hęc L. Vi tellus in Italiam Tiberij principatu transfudit. Ficus unum genus, pomum super folij dorsum ferentis, circa Idam ostenditur, & ob id Opisthocarpion uocatum, Idæi cognomine. Ramosa hęc, neq; celsa, cubitali crassitudine, ligno ualido, cõorto, lento, sine laete. Pars quę a terra est, leuis, enodisq. Superior comosa in orbem. Colos folio & cortici liuens, ac uiridis. Folium Tilię per omnia, sed molle, Flores mespilaceus, & cum Mespilo erumpens. Ficus rubra, magnitudine Olius, rotundior, sapore Mespili. Radice crassa, ut Ficus quoq; cætera. Item lenta materies, incorrupta, corde solido, neq; medullaceo siue molli. Alexandrinam hanc ibi uocant. Nascitur & in man ficus sine folijs, parua, rubro cortice. Quędam Ficum & Grossos ita ferunt in Cypro, Cilicia Hellade, ut ficum aduerso folio, grossos auerso sustineant: cum reliquę arbores sub folio pomum, ut protegatur, habeant. Laconicum genus uocatur, præcoces eas habens: quas Athenis Prodomos, hoc est, præcoquas atq; præcurrentes uocant. Eiusdem feracitatis est, & quę a Theophrasto Leucomphalios nominata est. Idem autor & Charition, & Aration ficum nominat. Ficus maturas gręci, Colythra, ut Philemon scribit, uocant. Seleucus Protericę fici genus uocari tradit, primitiuas eas ferentis. Habentur & alia Ficorum nomina, Ci-roce-laidę, Picridę, Hiladę, Sargelaphię, Lapyrię, Dracontię, Leucophię, Melanophię, Creneę, Mylę, Afcalonię, Trallianę, Rhodijs simillimę, Bringidariđas. Quancq; barbarę, tũ cum Atticis fere certantes. Prosenidas Pamphilus, Tithrasias Theopompus, generosos Plato in legibus, & ficus & uites quasdam cõmemorat, quasi nobiles: etiam si nobile a generoso, ut inquit Aristoteles, diuersum est. Fortasse illa genera intelligens, quę dicuntur Aegilides, inter ficos, & racemos, Nicosfraticos inter uuas: quę duo Athenis maxime cõmendabantur. Ut racemus Hipponius, in Rhodo insula, Thracinas, ad Lienam probari, apud Aetium inuenio. Morbus fico peculiaris, uermiculatio. Bestiolas eas uocant cerastas, stridulum animal. Itē patella: sed aliter q̃ in olea: quoties uidelicet radices imbrum superuentu, quasi deglabrantur. Item crados, scabies, & codę. Crados intelligitur, cum marcescunt rami, quos priuatim cradas in Ficu uocant. Attici ficum ipsam Cradem nominant. Nam & machina, quę in comædia Bellerophonias, & Perseos, & deorum imagines in aere presentabat, crada appellabatur: quia species ea ficum imitaretur arborem. Inter morbos est & uredo, idest, κλαυθμός, & tabes quę dicitur κηλιδίον, quasi quidam stupor, rigorq. Frigore hic & gelu, alijsq; annis contrahitur. Cõmunis hæc & alijs, quemadmodum & radicatio syderatioq; κρηνοδοκία uocata. folliculus Fici, ut frumenti, a Varone gluma dicitur. Ficaria quoq; grana, Plinius frumenta nominat: quas nos a gręcis Cenchramydas uocari diximus, succus maturefcentibus lactis, percoctis melle. Lactis omnibus mollis. Maturis frumenta intus. Lactę satiarum coagulāt lac, syluestrium nequaquam. Aut minus probe fructus, ut in uite alba. Eo melior futurus intelligitur, quo lectus germen antecesserit, contra quam cæteris arboribus. Ficus sola, ex omnibus arboribus non floret. Lactis inquit Macrobius, proprie ficorum dicitur ficus. Tanq̃ non pomum secerni a pomis apud idoneos autores, Afranium Ciceronemq; reperis. Fico fumus acerrimus, caprificoq. Item, cuiuscunq; lacteus cremor redundat, atq; ipsa hęc tamen fluuiata de tracto cortice, mox siccata, minime omniũ tedio illo infestant. Quin & flāmam quoq; mollissimam reddunt: Lixiuum quoq; cinere uehementer asperum. Quancq; ex Amygdalis asperum ignem excipere, optimas ficum & olea, contrarię causę faciunt. Ficum, lenta fungosaq; materię, oleam pinguis & densa. Senescunt ficus in arbore, anusq; distillant gummi modo lachrymā, ob id Athenienses, γυμνός uocant earum folliculos, ut nostri glumas, quemadmodũ prædiximus. Siccantur, seruantur in capsis. Ebuso insula præstantissimę amplissimęq; mox in Marrucinis, plurimę in Asia, Ruspinaq; Africę urbe. Panis uicem & obsonij habent, siccate, ac recentes quoq; Athletę hoc cibo uires aluere, priusq; Pythagoras exercitator eos transferret ad carnes. Sale inueteratis, & casei quoq; loco uesci excogitatum est. Decoctũ, inquit Paulus, Ficorum, plærq; Siræum appellatur: quod & defruto quoq; nomen est. Hippocrates Sycon. Studiosos uocis, abstinere Ficu gręci iubent, Aegesianas Alexandrini exemplo moti, q̃ is tragœdiarum actor optimus euaserit, quia, 18. annos a ficu temperasset. Produuntur & de hac arbore prouerbia, Ficum post piscem. Legumina post carnem, Gallinaceos amantibus, ficum

Cne serito. Assentari nescio, sicū fici, panē panē dico. Sacra ficus Athenis uocabat, uia quē dū
cit ad Eleusinem. Erat & Sicelensis Romę uia, quā Nomenum ducebat, & Nomēta quoq;
dicebatur, ex Viminali porta. Ceterum non a ficu, etiam si Plautus locum innuit, sed a figlinis
appellata, quasi figulensis: q̄ ibi foderetur figlinum, ut ad Auentinum quoq; montem. Ficum
atram, infelicem pontifices putabant, felicem albam. Quę autem felicia sint ligna, contraue,
Macrobius libri tertij calce docuit, acrifolium inter ea numerans: quod quidem quale genus
sit, haud facile reddiderim. Nec enim puto aquifolium posse legi, q̄ Aquifolium fit flex, quā
felicibus annuerant. Recentiores certe, Agrifolium pro Faba gręca, siue quod idem est, pro
arbore Loto capiunt. Sed Lotus felix erat arbor, ut idem Macrobius testis est. Scio Peucedanum
quoq; Agryophyllum dici a gręcis. Inter arbores infauistas, & Alternus, & Sanguis, siue
quod idem est, Sanguen, ab eodem autore collocantur.

Pli. li. 13. ca. 27.
25. li. 23. cap. 7.

Caprificus, Erinos a gręcis uocata, q̄ in Erinco Thessalię oppido primum apparuerit, ut
Photioni placet. Longe ualidior est q̄ ficus, nullis fere uitij obnoxia, ut etiam fico in si ta gros-
fos suas tueri credat. Interdū tñ inuadit eam scabies. Frequentissima in ficu, quoties post uergi-
las admissi sunt imbres, utiq; parui (nam largis causa omnis eluitur) flexilis materia. Nunq̄
maturefcit in ea pomum. Additur Ficetis, ut culices alimento in ea fraudati, euolantes in ficos
ferant: aperiantq; ora earū: an p̄ta sole imisso & lacte absumpto, maturitati præparent. Eos cu-
lices ficarios, Aristoteles Psenas, ionica uoce appellat. Etiā si legat corrupte pferas. Dicunt autē
Psenes, quasi galbę. nā & Psenes poetę cū dicunt, caluos & glabros intelligunt, ut est apud poe-
tā Simonidem. Nos tñ Galbas, æsculi uermiculos uocamus, ut prædictū est. Sūt in fico & Cen-
trinæ dicti culices, fucus apum ignauia malicięq; similes. Interimendo em̄ utiles, & ueros culi-
ces utiq; ipsi cōmoriunt. Caprificatio a nostris hoc uocatur, a gręcis erinasmos, & lycasmos.
Interim non arbor ipsa ferit, sed grossi ex ea pertulsi, uelut ferta suspenduntur ad eundē usum.
Theophrastus autor est, meliores quodā loco nasci ficos, sine ulla Caprifici ope: quas Aneri-
nasta prædicari uendendum uoce scribat. Caprificus, tauros quamlibet indomitos collo eorū
circundata, cicures & immobiles præstare dicitur. Habetur & Ficus indica, cuius germina per
ambitum radicari tradunt, neq; caudicem contingere, arbor magnitudine insigni, ut sub qua-
tres turmas equitum tñdī affirmant. Caudici crassitudo sexaginta passus. Ramorum umbra
bina operiunt. Folijs amazonicę pelte amplius, formaq; ut Solinus inquit. In Hircania
tam fecunda est Ficus, ut medimnos. 60. singulę ferant. Est autem *μυδιννος* modij sex ita-
lici, utiq; atticus. Nam prolemaicus maior est, ut qui sesquiplus sit atticō, sed exiguo pomō.
Caprificus in Co insula, non bisera modo, sed trisera quoq; habet. In Gallia transalpina, Stra-
bo similem Fico nasci tradit arborem, fructu capitulum corinthiæ columnę referens: cuius
lacte mortifero, sagittas suas illinant, infamit alias temperandi uenena, celo non pridem abo-
lerti cępta: eius rei nota Gallijs, ut hoc forte Virgilius intenderet, cum de Cimbro Tullio, qui
fratrem ueneno sustulit, in senario locutus est, de quo inter odoramenta diximus.

D

¶ De Grossis. CAP. CLXXXV.

εγρία συνδ

GR O S S I, quę Erinei nonnullis uocantur, coctę, illitę & stru-
mas nodosq; omneis emolliunt. Crudę, formicantes uerrucas,
& thymos nitro farinacq; additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum
sale & aceto, ulcera in capite manantia, epinyctidas, & fufures sanant. Iis
ficosę extuberationes, & genarum scabricię perfricantur. Nigrę ficus
folijs cauliculisq; candidę uiligines perunguntur. Faciunt ad canū mor-
sus & ulcera, quę Ceria, idest, fauos uocant. Grossi cum syluestris papa-
ueris folijs, ossa extrahunt. Furunculos cum cæra discutiunt. Contra mu-
ris aranei morsus, & scolopendrę uenena, cum eruo & uino illitę au xili-
antur. Fit ex cinere ficus tam syluestris q̄ fatiux lixiuium, crematis ramo-
rum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere. Siqui-
dem inter caustica intelligitur. Gangranis prodest. namque expurgat
& consumit quę excrefcunt. Quo utendum ita est. Spongia assidue hoc

lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & infuſiones ue-
tuſtas, & ſinus cuniculatim exedentes, magnosq; inſtillari conueniet. Et
enim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non ſecus atq;
emplaſtra quæ cruentis uulneribus inſciuntur, Enhæma uocant. Bibi-
tur ad diſcutiendum ſanguinem concretū, & contra præcipitationes, ru-
pta, conuulſa, cum cyatho aquæ recenter colatū, addito olei exiguo. Cœ-
liacis, dysentericis per ſe cyathus datus prodeſt. Neruorū uitij, conuul-
ſionibus cōmode illinitur ex oleo, ut pote quod ſudores moueat. Aduer-
ſus gypſi potum, & phalangiorum morſus bibitur. Hæc eadem præſtant
reliqua lixiuia, præſertim quernum. Omnia tamen adſtringunt.

B A R B A R I C O R O L L.
GROſſulos, atq; Groſſos, Græci Olynthos, & Erineos uocant, de quibus in fico & ca-
priſico abundanter egimus. Sed Groſſi propriè Olynthi ſunt, hoc eſt, primitiua ficus. Apud
Macrobiū, Groſſos legas ficos eſſe, quæ nunc matureſcunt. Alij ſic diſtinguunt, ut ficus
primo ſit Olynthos, deinde Pheix, poſtea Sycon, poſtremo Iſchas, Frondes ficus, Græci
priuatim uocāt Thuria. Nicander & papaueris folia ſic appellat. Eſt & eduliſ genus Thirion, ut
aliubi notauimus.

Cinerem lixiuium, Conian Græci appellant: de quo dictum in Ficu a nobis eſt, aſperita-
re inſignem, ex eo ligno eſſe, aſperiorē ex Amygdalo.

¶ De Perſea. CAP. CLXX XVI.
Perſea arbōr eſt, in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, ſtoma-
cho utilem, in quo Phalangia cranocolapta nomine inueniuntur,
præſertim in Thebaide. Arida folia illitu ſanguinis eruptiones ſiſtunt,
Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perſide extioſam eſſe, tranſla-
tamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

B A R B A R I C O R O L L.
Perſeam arborem, Aethyopia & Aegyptus habent ſolæ. Perſicum Aegypti Plinius, appel-
lare quodā loco maluit, hilarem inuitu, piro ſimilem per omnia. Semper autem folia habet, &
poma, ſubnaſcentibus alijs. Maturitas per Eſefias. Alio tempore crudi ſcula decerpunt, ac re-
ponunt. Magnitudo longioris piri. Amygdalæ putamine includitur, & corio, coloris herbidū
nucem intus habet, ut prunū, ſed minorē multo mollioremq; ſuauiſ carnī prædulcis, & in-
noſcua etiā largiorem mandentibus. Concoctu & deſectu facilem. Radice prægrandi. Materies
longitudine, craſſitudine, copia, inter cōmodiſſimas bonitate, firmitudine. Nigritia quoq; ni-
hil differens a Loto ea, quā Fabam græcā uocamus. Simulacra ex hac, & lectulos, & cubilia fa-
citauere, non tam decoro ligno q̃ ſideli, ut quod magna ex parte ſit contortū. Proindeq; naua
le tantū eſſe cœpit. Hanc aliqui ruſcentibus Myxis fecere ſimilem. Perſeam hanc, non Perſi-
cum, ut diximus, e Perſide in Aegyptum tranſlatā a regibus tradunt, propter ſupplicia: quo-
niā uenenata ibi eſſet, quod eruditiores tamen conſtāt negant: ſed a Perſeo Memphi ſatā fa-
rent, & ob id Alexandrū illa coronari uictōres iſtituiſſe in honore Atauri ſui. Fortaſſe Theopha-
ſtus hanc intelligit, cum textilem Perſicā in Aegypto plurimā nemore Thebaico fuiſſe ſcribit.
In quo & Aegyptia Spina, & olea, & quercus habeant, ut textilem a coronæ uſu dixerit. Qui-
dam pro cui capiti Palmæ ſimili, cuius folijs ad nexus & textilia utant, & Perſicā textilem uo-
catā putant: quia Perſis in magno honore fuerit. Aliā a Perſea, de qua Dioſcorides præſentī
mentionē loquitur, De Perſea porro hac Columellæ uerſus illi fortaliſ fuerint.
Quin etiam eiſdem gentis de nomine dicta,
Exiguo properant miſcere Perſica malo.
Plutarchus auctor grauiſſimus, Perſeam arborem inter omnes Iſidi gratiſſimā, & in Aegypto
maxime celebrari tradit: quia fructum ſerat cordi ſimilem, folium uero linguæ.

C De Iberide. CAP. CLXXXVII.
icupie **I**beris, siue Cardamantica, folia habet Nasturcij, uere uirentia, cau-
 lem cubitalem, aut minorē. In incultis nascitur. Aestate lacteum flo-
 rem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturcio similes
 habet, calfacientes, & adurentes. Ipsæ enim ischiadicis cum salsa axungia
 emplastro utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendat-
 tur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

Pli. lib. 25. ca.
 8. 12. & lib. 26.
 cap. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
Hiberida, siue Hiberlada, & Hiberiden herbam comperit Seruilius Democrates, assigna-
 to etiā inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumenta, parietinaq; & in-
 culta itinerū. Semine tam paruo, ut aspici uix possit. Radici odor nasturtij: de quo Cardami-
 na, & Cardamantice, & Apollonio Cardamen, & Hiberitis appellata est. Vfus æstate melior,
 & recenti tantū. Tunditur difficulter. Galenus Hiberida eandem esse cum Lepidio uocata con-
 iicit. Carmen quoq; Democratis ipsius prætexuit, ex eius libro qui Clinicus inscribitur. Multa
 de hac Archigenes, in epistola ad Aristonem; eamq; Lepidion & Agriocardamon, id est, sylue
 sire Nasturtiū uocauit. Vidimus hanc Venetijs, specie qua describitur a Dioscoride ac Plinio.
 Illud adijcimus, folia ei pusilla esse, qualia Nasturtio. Semen quoq; in siliquis admodum pu-
 sillis, tam exiguum, ut cernere non liceat. Flos item pusillus, & lactei candoris. Differt Hesp-
 eris ab Hiberide. Nomen uero Hesperis inuenit, non ab Hiberia, sed ab re: quoniam ut Theo-
 phrastus inquit, nocte plus oleat q̃ interdiu, contra q̃ herbarum plurimæ.

D De Halicacabo. CAP. CLXXXVIII.
halicacabos **H**alicacabum aliqui Diræon, alij Strychnon, alij quod insani-
 lam faceret Manicon, alij Dorichnyon, quod cuspides eo tinge-
 rentur, appellauere, Rhomani Apollinarem minorem, aut Vlticanam
 herbam. Alij Opsaginem, Daci Cocalidam, Aphri Cancabon. Frutex
 est multos habens ramos, fractu peruiaces, furculosos. Folia plurima,
 pingua, Cotoneæ malo similia. Florem rubrum. Acinum in folliculis par-
 uis croceum, ciceris magnitudine. Semina quina, sенаue Erui modo ro-
 tunda. Nascitur in petris non procul a mari. Huius succus cum uino po-
 tus drachmæ pondere somnum conciliat, ut papaueris opium. Semen
 urina cit. Dantur hypopictis duodecim corymbi. Plures aut potius men-
 tis alienationem creant. Remedio est aqua multa copiosa potui data. Suc-
 cus & cortex miscentur pastillis, qui doloris sensum auferunt. Decoctum
 in uino si in ore continetur, dentium dolorem mitigat. Radicis succum
 melle illitus, oculorum hebetudines discutit.

B A R B A R I C O R O L L.
DE Alicacabo una Strychni, hoc est, Solani specie, quarto uolumine differet: ibi quæ hic
 in Dioscoride leguntur repetita sunt ad uerbū fere: q̃q̃ libro quarto pro secūda Solani specie,
 primo pro tertia uidetur accepisse: nec Alicacabum ibi hanc appellat, sed quod uertius est, Hy-
 pnoticon. Alicacabus enim uera est, quæ quarto uolumine describitur.

¶ Finis LIB. Primi.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Secundus,

IO. RVELLIO interprete.



PRIORE, charissime Ari, libro, quem de Medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguëtis, arboribus, & nascentibus in eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autē secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frumentis, atq; oleribus explicabimus, subnexis herbaceis quæ acri prædita sunt facultate: ut pote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint. Qualia Allium, Cepa, Synapi intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse uideamur.

De aquatili Echino.

CAP. I.

Marinus Echinus stomacho uentriq; utilis est. Vrinam cit. Hu-
ius testa recens inassata, commode medicamentis ammiscetur,
quæ sporas abstergunt. Cremata uero cinis, sordida ulcera expurgat.
Luxuriantem carnem reprimat.

HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi, Patriarchæ
Corollariorū LIB. Secundus.

ERINACEVS marinus, quem Græci Echinos thalassion appellant,
alius piscis est ab eo, qui Echneis, hoc est, Remora, siue Remeligo dicitur, adhæ-
rens nauibus, & medio mari cursus earum impediens, palmari crassitudine, pedali, semipedali
ue amplitudine, magnæ Limaci similis, Odynolyon appellatus a quibusdam, quia partus gra-
uidis adalligatus, resoluat inueteratus sale. Alij & muricis genus quoddā hoc nōse, potentiaq;
accipiūt. At Echino, id est, Erinaceo, spinæ pro pedibus sunt, quibus uoluit in orbē, nec aliter
ingredit. Itaq; detritis sæpe aculeis inueniunt. Ex hoc gñe appellamus Echinetras, & Iulius
Pollux, Metras: quibus spinæ longissimæ calicesq; minimi. Neq; omnibus idem color uireus.
Circa Toronem candidi capiuntur, spina parua. Oua omniū amara, quina numero, nec nisi
per hyemem, atq; plenilunijs. Ora in medio corpore in terrā uersa. Tradunt sæuitiā maris præ-
sagire eos, quoties correptis operiuntur lapillis. Echinos aliqui & Patangas nominant. Sed
Aristoteles tria eius generā dinumerat, Ouarios, qui & mandatur, Patangas, & Bryssos. Ha-
beri & fluuiatiles Echinos, Paulus Aegineta prodidit.

Pli. II. 32. ca. 12

MARCELLI VERGILII

in Dioscoride ANNOTATIONES abbreviate.



ERia hæc una Echini appellatione Græci indicauerunt. In mari, & in testaceo ge-
nere piscē, cui natura est, spinis quasi pedibus, & earū in orbē uolutatiōe ingredit.
Mox in arida, & in quadrupedum genere, quod nouerunt rura omnia, animal
aculeato omni corpore, præterq; ore, pedibus, & ex inferiore parte, infestis & ad uulnus fem-
per paratis spinis, quibus salutem uitamq; suam, a canibus & uenatoribus tueri posse se cre-
dat: cui natura sit, in periculo in globum circumagi, nec nisi spinas ostendere & porrigere.
Quam ob causam Acanthon etiam Græci id uocauerunt. Postremo Castaneorum, a consimili

C spinarum figura & noxa, summum illud experimentum, quod paulo ante descripsimus: de quo satis dicta hæc sint. Quod enim ad terrestrem pertinet, a marino statim dicitur: cum pleraque legentes in eo monuerimus, quorum id primum erit. Non probari ab Aristotele libro. 4. de animalium historia, ad ciendam urinam marinos Echinos omnes, sed ex multis quæ ab eo illic numerantur unum tantum genus, quod in exiguo corpore longissimas & durissimas spinas habet, nec nisi in altis gurgitibus inuenitur. Verba eius hæc sunt, πρὸς δὲ τοῖς τοῖς ἀλλογίνοις μικρὴν ἀνδράσιν ἔχει μυρίασιν καὶ σαυρὰς γίνεται δὲ καὶ τῆς βαλάνης ἐν πολλοῖς ὄρνυσι ὅς χρῆται πρὸς τὰς τραχυὰς γίνεσθαι. Estque eorum sensus qui antea dictus a nobis est. Legentes monemus, etiā uideri nobis nō esse integrū, quod in omnibus græcis passim legitur, οὗ τὸ δρᾶναι ὁμῶν μίγνυται χρῆσιμος ὁ πλάθιν τοῖς περὶ τὰς δόρας ἐμύκασιν. Si enim quale id membrū est uertatur, non alius fiet sensus quā crudā marini Echini testā misceri utiliter tostā his, quæ ad exterendas scabies cōficiunt. At qui possunt, nulla intercedente copula, aut dictiōe alia, simul præcipi & doceri, cruda, & tosta: Necesse itaque omnino est, aut copulā intermiscere, quod nos fecimus: aut disinctionē, quod forte fuit, aut (quod nos magis credimus) suspicari aliquot deesse illic uoces, quibus in cruda Echini testa uis, usus, aut remediū aliquid doceretur: cui deinde de tosta & cremata subijceretur, quod ad læuigandas cutis asperitates pertineret. Id enim cineres, præsertimque marinarū testarū maxime possunt, ut in Purpuris mox patebit. A qua potestate longius crudæ abesse uidentur. Neque in huiuscemodi remediōrū rationem facile admittuntur.

De terrestri Herinaceo. C A P. II.

χρησιμὸν ἔχοντες

καχέταις

Terrestris Herinacei corium combustum, alopecijis cum pice liquida aptissime illinitur. Assiccatum corpus, & cum aceto mulso potum, renum uitijis auxilio est. Item aquæ quæ cutem subijt, conuulsionibus, elephantia, & male habitis, quos cachecticos uocant. Viscerum fluctiones exiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad eosdem usus utilissime reconditur.

Pli. li. 31. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.

Erinaceus terrestris, id est, Echinos chætaeos, & Acanthion epigios, uallatus est aculeis extra quæ ore, pedibusque, ac parte inferiore, quā rara tantū, & innocua lanugo operit. Vbi uenantem sensere, conuoluuntur in pilā, ne quid apprehendi possit præter aculeos. In desperatione urinā reddunt tabificā, spinis, & tergori propter quod petuntur. Ideoque artis est, uenari eos exinanito prius lotio. Capiti, aquæ calidæ aspersum resoluuntur, & suspensi posteriorū pedum altero, enecantur inedia. Hac cute uestes expoliuntur. Cibus sibi præparat in tempus. Etenim uolutatus supra poma iacentia spinis affixa, unti non amplius tenens portat in cauas arbores. Idem mutationes aquilonis in austrū prænunciat, condens se cubili. Echinus, Græcis uas arcum significat, in quod testimonia coniecta signabatur. Sed & fœni partem, & ollæ genus. Item muliebris ornamentū non dissimile omnino brachialibus, & armillis. Pollux auctor. Dicuntur & in castaneis Echini. Eos tamen latine qui Erinaceos uocant, non inuenio.

E X M. V E R G. C O M M.

Credidit quondam antiquitas, homini ut pleræque alia animalia inuidere etiā terrestrem Erinaceum, Testatusque id Theophrastus est in eo quod reliquit commentariolo de his animalibus quæ homini inuidere dicuntur, quæ ille multa numerauit, Stellionem, Ceruum, Equum, Phocam, Lynxem, & pleræque alia. Quorum Stellio exutam uere tuniculam, angulum modo deuorat, statim comitalibus utilem: cuius rei & Plinius testis est libro trigesimo, capite tertio. In locis fenestrarum, aut sepulchrorum cameris frequens hoc animal inueniri ostendens. Solereque, qui eorum membranas has uenantur, incipiente uere, ex fissis hardinibus textas, illis ueluti casae opponere: quarum angustijis id animal gaudet: eoque facilius circumdatur torporem exiit, quo inter harundines eas relicto non possint remeare. Nec ultra Plinius quicquam dixit, quæ nullum animal fraudulentiū inuidere traditum esse, cogitandum legitibus quod nos dicimus relinquens. Ceruus dextrum cornu terra obruit, contra rubetatum uenena necessarium. Equus pulli sui hippomanes præripit, ad amoris ueneficiā quæsitum. Phoca coagulatum euomit, iisdem comitalibus opatum. Et Lynx urinā suam celat, multū in medicina usus, & in delictis uitæ ad anulos expetit. Sed omnia falso inuidere homini creduntur. Nullus enim brutis inuidiæ contra hominem sensus est: metuque perturbata, aut aliter affecta id agunt anima-

lia hæc. Verissimileq; est Phocā, cū capi & teneri se sentiat, metu, doloreq; id pati. Sigdē in eodē affectu, idē aliquando hoīes animo p̄turbati patiunt̄. Et Stellionē tuniculā suam, & equū pulli hippomanes eodē, aut nō dissimili naturæ affectu deuorare, q̄ canes & fues a partu statim secū das suas etiā deuorare dicuntur, Lynceſq; & Ceruos ignotā nobis habere eius qd̄ agunt aliquā etiā. Multa enī huiuscemodi bruta agunt, quorū reddi rō a nobis nō potest. Ex hoc animalū hominū inuidentiū gñe, terreſtris Erinaceus antiq; esse creditus est. Is enī teneri se sentiēti, metu, affectuue aliō p̄turbatus, in globū se circūagit, circumactūſq; noxiā spinis & cuti suæ urinā remittit; cuius cōtagio corruptæ, nec multo post deciduæ spinæ, desinūt in arēbuis habere usū, & in medicina corū inuile fit. Eius cinere ad Alopecias nō hic tñt, sed ueteres Græcorū medicī, & Plinius p̄cipue utunt̄, ob egregiā siccādi, discutiendiq; uim quā habet. Quia etiā potestare in ueterata eius caro hydropi, quē Græci, Anasarca, uel Hyposarca uocāt, mederi a Dios. dicta ē.

¶ De Hippocampo.

CAP. III.

Hippocampus marinum animal est, exiguum, cuius cremati cinis cum liquida pice, aut axungia, seu amaraciniō unguento illitus, alopecias replet.

EX M. VERG. COMM.

Credimus olerū & plantarū erucas, quas Græci Campas dicunt, marino pisci a similitudine nomen dedisse. In locustarū enim genere Hippocāpus a ueteribus numeratur. Breuem, paruumq; hunc piscem scriptor hic ait esse, & nihilominus magnitudinis nota illi coniuncta est. Quod enim Græci hippo, multis in natura adijciunt, grande significat, ut in Hipposelino, & Hippomarathro, aut Hippolapatho indicabimus. Sed id sic intelligendum est, ut comparatū hoc animal, olerū, aut arborū erucis, grande sit: marinis uero beluis & piscibus, breue & paruum. Nec aliud hic intelligi uoluit dicens, paruum esse marinum animal.

¶ De Purpurā.

CAP. IIIL.

Purpura usta exiccata. Dentes abstergit. Excreſcentias in carne cohibet. Vlcera purgat. Et ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Purpure, a Græcis Porphyre nuncupantur. Hinc ipsas quoq; uestes Purpuras uocamus, auctor est Theopompus, tūi quondā precij fuisse, ut æquali argento penderentur. Nemo ignorat, Ostreorū quoddā genus esse purpurā; idq; santēs eius, quē testis detractis colligereſt, Ostreū, ut Victruius inquit, appellata est. Ostrea porro inquit Galenus, penultima correpta, & producta differunt. Producta genus est Aristoteli, ad oīa testacea, ut p̄r diphthongum u scribantur *ōspua* uidelicet. Correpta uero species est eius una. Quibus respondere apud nos quidā uolunt, conchā, per. x. & Concā per. c. Sed auctōres ipsi sunt, nec præter ipsos alius. Athenæus, ueteres per u diphthongū proferre solitos affirmat, nec aliter locutos Cratinū, & Archilochū, Platonē correpta. Sed placet Galeni ex Aristotelis auctoritate distinctio. Porphyrides ex auiū sunt gñe, a Porphyrioribus diuersæ: sicut ab utroq; Lathiporphyrides, siue Adiporphyrides, & lathiporphyre. Illud obiter notauerim, Porphyriories a nobis uiſos esse in agro Pataurino, allatos ex Hispania, quos ibi Telamones uocāt: siue quā statua uiriles, quibus mutili & coronæ sustinent̄, ita nominātur: siue quāsi thalamiorū & pudicitiz custodes. Etenim scribit Athenæus, uolucrem hanc sensum adulterij habere, ac significare id patrifamilias, in cuius dōtio alitur, nō uoce quidem, aut omnino aliter q̄ suspendio. Nisi quis Telamones, quāsi nutriticulas esse dictos putet. Ita enim Græci Altrices uocāt. Porphyriori similis est Terrax appellatus, ut Athenæo placet, Gallos gallinaceos uincens magnitudine. Vox grauius. Caro si mādatur, strutionis sapore. Pendent ei ex auribus utrinq; cartilaginēs, atq; cristæ, ut in Gallo Gallinaceo. Epicharmus, & Alexander certe myndius, qui aues scripsit, pusillā uolucrem hoc nomine intelligunt. Terrax inquit auicula est, a uoce dicta, quā oīa paries emittit. Plumis color macularum forde uariis, perperuisq; lineis. Magnitudine Spernologi eius, quā nos Spicilegam, siue Frugilegā uocare possumus. Quē Frugilega nomen generis est, ita uicū quærentis apud Aristotelem. Rura ipsum passerulū uocant Spicilegā, detrita modo priore syllaba. Ab eodem auctore Scolopax, atagenis colore tradit̄, Gallinaceo generi p̄similis, quā Theodorus Gallinaginem, uernaculā uocem secutus (ita enim uulgo nominatur) interpretatus est.

A

πικρὸν πικρὸν

πικρὸν

B

Pli. li. 9. ca. 16.

17. 18. 19. 40.

C

κίρκυρ

¶ De Buccinis.

CAP. V.

EAdem præstant concremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt. Ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet. Nam posteaq; uulnus cicatricē duxerit, ipsum in testæ modū indurātū, sponte sua decidet. Fit etiā calx e Buccinis, ut in eius mentiōe demonstrabimus.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 9. ca. 36.

Buccina, a Græcis Ceryces dicitur. Muricū nomen gñalius esse uideo, q̃ Buccinū, ut pote quod & Purpurā quoq; cōprehendat. Illud notare libet, Cerycas a nostris uerbū ex uerbo Buccina cōuerso s'esse, q̃ Ceryx idē sit quod Præco: q̃q; & a cera, quā mucō similē argitū mutuo saluant, cognominari posse uideantur: quod Græci κερύσιον dicunt. Muricum generis sunt, inquit Plinius, & quæ uocant Græci Colycia, Alij Corycia, turbinata æque, sed minora multo, efficaciora etiā, & oris halitū custodientia. Athenæus hæc non muricū, sed chamārū generibus contribuit: easq; in Macedonia κορυμβία dici, Athenis γρηία. In cætera Græciā, Tracheas, hoc est, asperas, uocari prodit: quod & Plinius fere aliubi secutus uidetur.

EX M. VERG. COMM.

Non parū naturalis historiæ partem, mare & maritima faciunt, nec parum in homine laudanda eorū cognitio: tam late uis utriusq; rei patet, totq; modis ad uoluptatem, necessitatemq; humanā instruunt uitā: & tanta est in mari nascentiū uarietas, quæ si quis numerare, & ex his quas habent no tas secernere conet, quod pene impossibile sit incōperit, & huic scriptori inutilem laborē inierit: qui ex tā multis pisciū, & testarū quæ toto mari nascunt generibus, pauciora quædā ad hominis morbos & medicinæ usum elegit. Pōterūt uolentes ex Aristotele, Plinio, & plerisq; alijs reliqua longius & certius cognoscere, & q̃d ad Purpurarū Buccinorūq; sapores, & in medicina uires aliquas priuatim pūnet, nō contemnendā ab Athenæo historiā, quo loco de Ofstreis agit, audire: Nos eā ganææ multū, medicinæ uero parū necessariā relinquitus.

D

κόρυμ

¶ De Ionijs.

CAP. VI.

Ionia uocantur Purpuratum Buccinorumq; media, qua parte testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem Purpuris Buccinisq; facultatem urendi consequuntur, ut pote cum ea parte eorum natura prematur. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles. Sed alium non molliunt.

BARBARI COROLL.

Ionia, sunt qui florē esse credāt eum, quē Purpuræ, ut Aristoteles scribit habent, & Buccinā, & qui a Democrito Anthos porphyrios dicat. Alia nigrū, alia q̃d rarius est rubentē, mediū inter Papauerculū & Ceruiculā, ut Athenæus testatur. Est aut Papauerculū in Buccinō pars eius ima esculentaq;: q̃q; oīs callus pinnæ & conchiliū interior Papauer quoq; dicit, ut idē auctor scriptū reliquit. Est & in Polypo, qui & Polyps dicitur, & Anosteos suū papa uer, ea pars uidelicet, quæ supra uentrē eius folliculi specie conspicit, liquore plenus, non atro ut in sepia, sed rubente. Ego in Dioscoride nō Ionia, sed Cionia, hoc est, uerbū e uerbo, Columellā lego: ita scriptū in exemplaribus aliquot inuenias. Est & uasculi genus Cionion, siue Cion: quo noīe in hō diernū usq; diē utuntur Caupones, hoc colūnas, a nostris ex interpretatione Græca uocitatū putes. Vnde apud Iuris pītos Colūnariū: q̃q; non colūnariū, sed colūbariū fortasse p̃nunciandū sit. Instrumenti genus ita nominatur Vitruuius, ad aquā hauriendam, per tympana. Eūm si a colūuie, Colluuiarium sunt qui legant. In quo illud mihi occurrit, Columbarium non a columbis, sed a græco uerbo, quasi colymbarium uenisse: quando Græci κολυμβίζω, & colymbistas uocant, quod nos urinare, & urinatores dicimus. Urinatorium ergo uas, quo uidelicet aut Vinum promitur, aut aqua, Columbarium a ueteribus dictum existinare possumus. Alioquin & columbæ ab hoc ipso uerbi Græci significatu appellantur. Quid si Columnar: um apud Iurisperiōs pro mensa lapidea, quæ Caribum, & Caribulum quoq; dicebatur accipias: De qua M. Varro. Altera inquit, uinaria mensa erat lapidea, quadrata, oblonga. una Columella, uocabatur Caribulum, in qua uasa ponerentur ænea.

De Myacibus.

De Myacibus. CAP. VII

A

MYaces laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur. Genarum crassitudines absumunt. Albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus utilissime imponuntur.

A R R B A R I C O O L B L.

MYtuli, Græci Myas, & Myacas appellant, Hippocrates Scaphidas. In harenosis sponte natura proueniunt. Quidam prius his genus faciunt eorum, qui proprie Myes dicantur; quorum proprietas sit, congregari muricum modo, & uiuere in algosis. Ille mutuo atrici, lentore cuiusdam cere, Meliceram uocatum, saluant. Gratissimi autumno sunt, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari. Ob id in Aegypto cõmendatissimi. Procedente hyeme amaritudinem, coloremque rubrum contrahunt. Degenerant, ut Athenæus & Plinius testant, in duas species. In Myias, idest, muscas, & Mytulos. Mytuli sale, uirisque recipiunt. Muscæ, siue ut in exemplaribus quibusdã Plinianis legit, Myiscæ, differunt rotunditate, minores aliquanto, atque hirtæ, tenuioribus testis, carne duriores. Laudantur apud Græcos Ephesijs. Est & piscis Muscæ, Ponto cõmendatus, ex Athenæo. Plautus in Rudite, nominat quendam Musculos. Captamus inquit Echinos, Lapadas, Ostreas, Balanos, Vriticam marinam, Musculos. De Mytulis intelligat, an de pisce Mure, iudicent legentes. In Aristotele Mystocetus piscis, a Theodoro Musculus conuertitur.

E X M. V E R G. C O M M.

QUæ sequuntur Tellinas, non Myacas, Mitulos a Romanis dici testatur Athenæus est. Nos tamen aliorum in eare obseruationem secuti, Myacas, non Tellinas Mitulos uocauimus. Similitudo, & idem fere eorum natales, nominum uagam & incertam hanc rationem faciunt. Quod in multis fieri quotidie uidemus, deficientibus in tanta rerum naturæ uarietate & copia, proprijs earum appellationibus. Est in Mitulis his, ubi nos legerimus mederi eorum cinerem palpebrarum asperitati, non crassitudini. Idque Paulus Aegineta lib. 6. etiam cõfirmat, nisi uitium in eo sit. Nos tamen cõmunem lectionem secuti sumus, confirmante eã Plinio, qui lib. 32. cap. 5. de mitulis hæc ait. Lauantur quoque plumbi modo ad genarum crassitudines, & oculorum albugines. Persuasit & illud etiam, nihil in his mutare: quod facillimus lapsus est in græcis ab asperitate, in crassitudinem: siquidem una tantum mutata litera, τριχῆ, quod asperum, τριχῆ quod crassum est sit: multisque locis occurrit in hoc scriptore huiuscemodi uerbum. Crassitudo autem genarum, quam nos crassas palpebras uertimus, Galenus in Hædoge sua fieri dixit, cum inuersa a nativo habitu palpebræ, duriores, carnosioresque sunt.

De Tellinis. CAP. VIII.

REcentes Tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum. Salitæ uruntur, tritaque in cinerem, & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

QUI Tellinas interpretatur in Martiali poeta Mytulos, improprie locutos arbitror. Cui aliud genus esse Mytulos, aliud Tellinas Dioscoridis autoritate cõstet, Athenæus certe Mytulos a romanis uocari, eas uidet existimasse. Sunt quoque Tellinas, & Otenia, idest, Pectunculæ, id est esse iudicent, a celeritate crescendi nominatas, uti τὰχιστα γίνεται τήλαι, hoc est, ocyssime perficiunt. Quod Aristoteles, ita Pectunculis, quæ Purpuris tribuit cõe. Anno enim magnitudinem totam impler. Plinius certe medicinas quæ hic de Tellinis reddunt, ad uerbum fere Pectunculis adscripsit. Tellinas ad Canopum in ægypto frequenter esse narrat: quarum tenuiores, exiliioresque, Basilicas, hoc est, regias appellat: his dulciores esse fluuiatiles & Nilò. Romæ circūferunt pusillæ quædã cõchule, quas quæ uendunt, Tellinas predicant. Hæ uulgaribus conchis minores, & leuiiores sunt, & cæcidæ, nec striatæ: quas Venedi piscatores, a capparibus similitudine, Capparoculas appellant.

E X M. V E R G. C O M M.

NULLIBI, quod hæcenus legerim, Plinius Tellinas appellauit: et nescio, an cõmune hoc multis. in mari nomen sit quæ celerrime in integram ætatem absoluuntur. Nouit nostra ætas Tellinas

C in mari ubiq; nascentes, quotidiani in cibis usus. Nihil illis Paulus Aegineta tribuit quod non a Dioscoride illis tributum fuerit, priuatim primo sub Tellinarum titulo, mox iterum ubi de onitni esculento iure agit, quo loco Tellinarum aluum maxime deſcere ait.

De Chamis.

C A P. IX.

χῆμα

C Hamarum, Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum uino assumitur.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 32, ca. 11.

C Hamæ, a Græcis χῆμα, species sunt Cōcharum. Aliud in mari uidetur piscis esse genus Chamæ, quas Hiartulas quidam interpretantur, habentes uuluam, sicut & qui Erythini, hoc est, Rubelliones dicuntur. Nisi quis ita distinguendum putet, quod & Aristotelis præferunt cōdices, ut Chamæ hiartulæ interpretetur; Chamas autem concharum speciem agnoscat. Chamarum duo reddunt genera. Tracheæ, hoc est, asperæ, mali succi, quas & Ostrea cognominant, & in Macedonia Corycos, & Athenis Crios, ut in Murice diximus. Alterum læues, multo meliores, & crassiores, ob id & Pelorides, & Pelorinæ a quibusdam, & Basilicæ uocantur, & ab Helio spartiano Lioſtea. Etiam si lithostrea mendose legeretur. Esset hic de Conchis, siue quod idem est, Ostreis, & Conchylis tractandi locus, sed copia deterreor. Sufficiat primatum gulæ huic generi datum esse, adagio inde nato. Conchylia uiduarum cupidæ, ut est apud Sophronem mimographum, & Phalerum Demetrium. Nec illud prætermisso, Conchæ genus, ex qua margaritæ, unionesq; uellantur, Berberion, & Berberi ab incolis uocati esse, Ping, aut Pectunculi effigie, nisi q; nec auriculas habet ut Pectunculus, nec operculum exterius, sculpturis ullis asperum, sed læue. Coloris quoq; nomen Conchylum, & chliaro conchylum, & cōcha ægyptia Paralios cognomine, quam & Pniā uocat Democritus. Idem Chrysocōchylū fieri docet, sed fictitium, & metallicum, sicut & Chrysocorallium, quod item & gemmæ est nomen.

EX M. VERG. COMM.

D Longa est in Athenæi ostreis Chamarum historia: q; forte sic dictas quondam fuisse ait, παρὰ τὸ κωνχίλαι, id est, q; aperto ore, & hiantes, contra q; alia in hoc genere semper sunt. Ex qua causâ latinorum aliqui Hiartulas eas appellauerunt, nominis rationem, & animalis naturam secuti. In genere minimorum ostreorum Chamæ sunt, tanta cū alijs affinitate, ut facile in antiquis scriptoribus cōfundat earū historia. Nihil difficilius in tota huiuscemodi rerū cōmētatione est, q; in ppellationibus his concordem ueterū historiā ostendere: ob id nos eam peritioribus relinquimus, contenti ab hoc scriptore didicisse, omnium huiuscemodi conchularum in soluenda aluo eandē uim & naturam esse. Fuisseq; in deſcienda aluo antiquis morem, conchylis his uti, indicauit M. Cato centesimo & quinquagesimo octauo sui de re rustica operis capite, inter cætera Mytilis tribus ad eam rem utens.

De Onyche.

C A P. X.

ὄνυξ

O N Y X conchylj regumentum est, ei simile quo purpura intergitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod Conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur posteaq; stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui a rubro mari defertur candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratiā suffiuntur. Sed aliquatenus castoreū olent. lidem suffitu excitant scēminas uuluæ strangulatu oppressas, comitialesq;. Poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit quo Purpura & Buccinum.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 32, ca. 11.

O Nyx græce dicitur, quod nos Vnguem odoratum uocamus, ostracium nōnulli appellant, siue Ostreacon. Galenus Poma, hoc est, cauū, siue quod idem est, Operculū, etiā in purpuris. Onycē uero Paulus testam uocari dicit conchylj duntaxat Indici, quod & Cōdyliō appellat. Condylos certe Ostrei genus est, eidem Paulo, ut alios præteream. Vngues uocant & quos Solenas Græci dicūt. Eos deniq; Donacas, & Aulos, Theodorus modo Vngues, mō Digiros ap

pellat, in utroq; Plinius secutus. Hinc & piscatores Ostrearum Solinistæ nominabantur, ut Athenæo placuit. Et ampulla unguenti Onyx quandoq; dicitur, Porphyrio grammatico.

A

EX M. VERG. COM.

Plinius Ostreacum cōmuni omniū testaceorum appellatione uocari Onychen hunc dixit. Posteriores Blattā bizantiā dixerūt. Hic Onychem generis nomine etiam appellat: quando ubiq; nascentes testæ, in quibus leuor sit & candor, eodem hoc nomine censentur, quod ab ungue humano factum sit, & ad gemmas marimonisq; certum genus translatum etiam fuerit. Ex eodem enim humano ungue, quem græci *onyx* dicunt, Onyx: & Sardonyx gemma, & Onychite marmor ab antiquis dicta sunt. Ex eodē plura alia etiam, quæ in græcis & latinis passim leguntur. Variavit natura omnes has in mari testas, uoluitq; eas coloribus, figuris, & quantitate differre: ut nominibus etiam distinguerentur. Onychesq; priuatim dicti sunt, in quorum testis nulli margines, nullæ rugæ, nullæ concauitates, nullæ asperitates essent, sed toto corpore leuor & candor, quales in humano ungue sunt. Ex hoc genere indicus Onyx est. Dico autem Indicū: quoniam ut ab alijs secernatur, gentis nota illi nomini adijcienda est. Sic enim Paulus Aegineta eum appellat. Sic etiam græcorum ueteres aliqui codices adhuc habent. Sentiri in cō Nardi odorem Diosc. ait: q; in palustribus Indiæ Nardum ferētibus inueniatur, uescaturq; ea. Non satis certa re, quo modo in palustribus Nardus uiuat, cui in arida uita est: aut si iuxta paludes illas Nardus nascitur, quo nam modo ostreum, cui natura est scopulis in mari herere, extra aquam uesci in arida possit: Barbarus ut alterum scopulum uitaret, in alterum incidit, adiecitq; quod alioquin in Diosc. non legitur. Neq; em̄ ille ait, in paludibus Indiæ nasci Onychem, ubi regio eius nardifera est, sed inueniri in Indiæ paludibus Nardum ferentibus: nec alia præter hæc in eo sunt. Credimusq; nos respondere quæ in hoc capite leguntur, his quæ in Malobathro a Dioscoride & a nobis dicta fuerunt, plura, s. odoris similitudine in censum & nomen Nardi uenisse, quæ multa tunc numerata ab hoc fuerunt: & inter ea quod Malobathrum antiquitas uocabat, folium tātum quod in paludibus Indiæ fluitans inueniretur odore Nardi, lectumq; ad multos usus seruarietur. Nec tñ inclinatur animus nobis, quas hic modo Indiæ nardiferas paludes dicit, easdem illis esse in quibus Malobathrū inueniri & colligi antea tradidit, sed pro comperto rem habere uidemur. Sigdem utrobq; ait siccat paludes illas æstate. Cūq; in eis Malobathrum inueniatur, odore Nardi foliū, & ob eum odorem in Nardi nomen a multis adscitū, nihil impedit, ne constituamus hoc loco, ex cōmuni omniū opinione, qui Malobathrū cū Nardo misceant, Nardiferas hunc dixisse paludes, quæ re uera non Nardum, sed Malobathrum ferrent. Constitutoq; hoc, facile & sequax est quod sequitur, pasci Nardo in paludibus his indicos Onyches, parato & ubiq; exposito sibi cibo, & quem extra aquas contra naturæ suæ leges querere non cogerent. Nunq; enim legisse me memini, in ostreorū genere esse quæ ambigua sint, & quæ, qualia pleraq; alia quotidie uident, in aqua parit & arida agere possint.

B

De Cochleis. CAP. XI.

TERRESTRES Cochleæ, stomacho utiles sunt, & non facile corruptuntur. Optimæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astry-paleicæ, & quæ in Sicilia, Chio, & Liguriæ alpibus gignuntur, Pomatizæ, idest, operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet. Quæ uero uepribus, fructetisq; glutinata cohæret, quam uocant nonnulli Cefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omniū testæ, excalfaciendi & urendi naturam sortiuntur. Purgant lepras, uiliginēs, dentesque. Emendant oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si uistæ tritæque ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante soluantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menfes tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia,

νεχλίας χυρπίες

Cum maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrenant. Viuæ corpus, & præsertim Africane cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, uesciæque cruciatus sanat. Terrestris, pilos incommodos replicat, si quis abraso aculeo leniore, pilum attingat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 9. ca. 56.
& 32. li. 32. ca.
11. li. 30. ca. 12.

Cochleam, & Limacem Græci Cochlian, & Cochlion appellant. Nam Cochlos, & Cochli, marinos calculos significat. Est & Cochlos apud Aristotelem, animal testaceum, & aliud quod Limaces, a Theodoro dictum Umbilicus. Hoc & Cochlian est, ubi Aristoteles appellet, sicut Limacem quoque Cochlon. Nobilitas præcipua Solitanis. A patria item Balearicis: quas in speculuncis nascetes, Cauaticas nominant. Aphnicanis duplex genus. Nudarum, testarumque: quibus magna fecunditas. Sicut Illyricis amplitudo. Nam Siculæ commendantur quæ diu parue sunt: quia magnitudo duras facit, aufertque succum. Laudantur & Caprearum insulis. Præterea sunt quæ albæ, siue albulæ dicuntur, in Reatino agro. Itemque acerate latæque, multifariam nascentes. Itæ minutæ. Iam aliæ in usu sunt, læ cibis damnatæ. Cochlearum uiuaria nepotibus præcis fuisse, sapienter, & sanæ, aliisque rebus alendo eas, tanto successu, ut singularum calix quadrantes, 80. caperet. In Aegypti Nilo grandissimæ feruntur, uocales ululatum expressa similitudine. Salua Cochlearum, quæ punctis, aculeo, uel stilo carnibus manat, a Græcis, ut Galenus inquit, Myxa dicitur, hoc est, mucosus lentor, siue mucor, mucosus. Limacem Teucer ad exemplum questionis ludicre, ita finit. Animal sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, crustarum, oculos nunc exerens, nunc retrahens. Cicero, terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguineasam. Inuenio Limacis genus Cocaliam ab Aristotele uocari, & aliud Abrotonem. Quam sunt qui locustam putent, item qui apem, Alij qui piratam in eo uocabulo intelligant. Strabo Cocleas prædicat Linusias, ab agro, cui nomen Lipo est, iuxta Pityntem, medio inter Panianam coloniam, & Priapum spacio.

Libro. 13.

E X M. V E R G. C O M M.

Domiportam Cicero, græcorum more, qui *περίπλιν* inter cetera nomina eam uocat, Cochleam dixit. Nec male una hac ratione laudata est necessario homini exemplo, ut sua omnia secum ipse etiam ferat, & Prienæ sapientis modo eas domi suæ opes coaceruet, quas nec hostis ferat, nec populetur bellum. Idem Sanguineasam appellauit: propterea, quod illi salua & mucosus lentor pro sanguine sit, quo in oculorum medicina, ut hic docuit, ueteres utebantur. Quibus, quod hætenus inuenerim, nullus fuit usus exsudati igne ex Cochleis humoris, quo nostræ ætatis medicina, præsentis remedio uuitur in his, quorum corpora ad tabem lubrica sunt, & macie cõficiuntur. Silice operimenti cinere, carnibus, & crudis totis Cochleis contra aliorum hominis mala antiquitas tantum usa est.

¶ De Cancris. C A P. XII.

capitulum

CANCROrum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto consimili radices gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus. Rimas pedum, sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potique ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure esitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

A R R B A R I C O O L B L.

Pli. li. 9. ca. 31.

Cancer græce Carcinus, mirabile contra morsum tanis rabidi remedium: præsertim ut Aesculapion parabat, qui popularis, & præceptor Galeno fuit, urens eos æstare in patella uiuos sub Canis ortum, cum sol in Leonem transisset, non nisi, 18. luna. Pelops medicus, idemque Gale-

ni doctor, qui rerum omnium causas, & effectus scire profitebatur, hanc Cancrorum uim in Canis morsu, qualitati corporis, ac materię, non proprietati naturę tribuebat. Nec fere quisq; est, qui eum sequatur.

A

De terrestri Scorpione. CAP. XIII.

Terrestis Scorpio tritus & impositus, suę plagę remedium est. Quin inuenitur affatus ad eadem prodesse.

σκορπιον χυρ-
σκιον

BARBARI COROLL.

Scorpionum duo summa genera fere traduntur, Terrestres, & Marini. Sed Pausanias uidisse prodit & uolucres, pinnatosq; ut locusta sunt, e Phrygia in Ioniam translatos.

Pli. li. ii. ca. 25.

De marino Scorpione. CAP. XIII.

Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, Malbugines, & hebetudines.

σκορπιον θαλάτ-
τιον

BARBARI COROLL.

Scorpionum, alij Pelagi sunt, atq; alto mari capiuntur: alij Palustres, ac cœnosi potius. Preteruntur sapore pelagij, quos & rufos colore prædicant, cum alteri sint subatri. Aristoteles & Scorpidas nominat. Nec constat, pro diuerso, an pro eodem genere accepit. Scorpiana certe, ut Athenæo placet, euidenter a Scorpione differt.

Pli. li. 32. ca. 11.

De Dracone marino. CAP. XV.

Draco marinus replicatus atque impositus, ictus spinę suę qua ferit, medela est.

δράκων θαλάτ-
τιον

BARBARI COROLL.

Dictum est huic Draconum generi Maritum, ut a terrestribus Aethiopię distingueret: qui, ut inquit Actius, non ueneno, sed dentibus, quos similes aprugnjs habent, opprimunt: colore enim uno, sed alij ruffo, alij cinereo, alij nigro. Preterea iubarum umbra tectā, prominentibus e mento barbulis, ore uasto, lingua præpeti.

Pli. li. s. ca. 13.

EX M. VERG. COMM.

Non ab re fuerit quesisse, ut in Scorpione dictum est, an eundem illum Draconem qui uulnerat, medicinam uulneri a se facto, facere dicat: an ex eodem genere quem potuerit aliquis habere. Nobis in priorem illam partem animus inclinat.

B

De Scolopendra. CAP. XVI.

Scolopendra in oleo decocta, si illinat, auellit capillos. Sed contactu pruritus facit.

σκολοπενδρα

BARBARI COROLL.

Scolopendra Marina dicitur, quoniam et terrestris sit, ut post liquebit. Dioscorides Ophioctenam quoq; nominat, aut Scolopendram, aut uermē scolopendrę similem accipiens, libro huius opis extremo. Emorsis inqt a Scolopēdra, siue Ophioctena, locus ambitu colliuescit.

Pli. li. 32. ca. 11.

EX M. VERG. COMM.

Quales terrę Scolopendrę, siue Centipedes sunt, tales & marinę, longiores, tereti corpore, & infinitis pene pedibus ingredientibus, notissimum omnibus in sectum, & ex quo rustici futurę pluuię præsigna aliquando accipiant.

De Torpedine pisce. CAP. XVII.

Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, criticatus uehementiam mulcet. Eadem apposita, conuersam sedē, prociduiamq; coeracet.

νάρκα θαλάσσιον

BARBARI COROLL.

Torpedo, a Gręcis dicta Narce, nomen utraq; lingua ex argumento inuenit, quod etiā e longinquo, aut si hasta, uirgaue attingatur, quamuis præualidos lacertos torpescere, q̄libet ueloces ad cursum pisces, alligari faciat. Est & Turpæna piscis maritimus, a quo Cerati quoddā genus, ad duricias emolliendas appellatum est a medicis, ut est apud Paulum.

Pli. li. 32. ca. 1.
3. li. 9. cap. 11.

C A Beuentu græci suam Narcem, Romani suam Torpedinem dixerunt. Vtrisque enim in sua appellatione eadē piscis nota & uis indicatur: quæ tanta esse traditur, ut hamo capta, per ferrū, se tam, harūdinemque in piscatore torporis sui naturā & uim Narce trāserat, & limo obruta, adnatantes pisciculos eodē torpore imobiles corripit. Ignauī ingenij piscis, & qui, quā alij manū festam & generosam uenationem faciunt, clandestinis dolis, & quali ueneno quodam hæc sibi acquirit: quasi Maronis illud ad uitam magis laudauerit, Dolus, an uirtus quis in hoste requiratur. Hanc Paulus Aegineta uiuentem, ad arcendos capitis dolores capiti imponi iussit: idque eodem illo torpore facere, quo membra omnia hominis contactu eius torpere creduntur. Viuentem præterea in oleo coquit, oleoque illo utiliter inungi articulorum dolores: & præter hæc, quod hic de procidente & inuersa sede ait. In culus mali significatione, non placet quod Barbarus ait, procidentis interaneis, aut euerfis morbum coercet. Latius enim interaneum patet, & hic se dem tantum dicit: & inuersam, non euerfam eam partem appellat.

V De Viperinis carnibus. C A P. XVIII.

Exidvne rēpē

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt. Nervorum uitijs auxiliantur. Increſcentes strumas reprimunt. De tracta autem cute, caput caudaque, quoniam carne uacant, amputari debent. Quippe commentitium est, quod præcipitur, certam utrinque mensuram præcidi oportere. Reliquum uero corpus elotum, dissectumque discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui Viperas esitent pediculos procreari, quod plane a ueritate abhorret. Adijciunt tali qui, longam senectutem agere, qui eo cibo uestuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem Vipera in fictile nouū demittitur: adijciuntur salis, caricarumque tritarum singulatim quinq; sextarij, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur: qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plurimumque, quo stomacho gravior fiat, immiscetur Nardis spica, aut folium, aut Malabathri momentum.

Plj. li. 10. ca. 61

V B A R B A R I C O R O L L. Ipa Echis, & Echidne a Græcis uocata. Sed prior mas. sequens femina est. Hæc colore sufflata, multis maculata capillamentis cernit, magnitudine cubitali, aliqui etiam palmorum ternū, utique si non sit Indica. quippe quā cubitorū .5. & dodraris a se uisā Nearchus, & Strabo prædicat. Cauda Vipere non paulatim gracileſcente, sed uniuersim, & prius Vipæ, & sine carne. Oculi subrubet, caput latiusculū, ceruix angustior. Alius pminula, meatus ad extremā caudæ. Inceſsus geti proximus, dentes canini quatuor. Contra mari, angustius caput, ceruix crassior, corpus uniuersū tenuius & pcerius, meatu superiore uentris parte festinatius. Dentes canini duo. totidemque uulnera. Horis septem, sumū die .1. cōficiūt Vipæ. Sūtque Dipsadas a Vipæ non distinguant: nisi quod Dipsades salta loca incolunt: unde fiat, ut caro earū salta quicquid sentiat, alienaque sit medicinæ, uehementissimā situm affertēs utriusque, et inde nomē: quales in Africa plurimæ nascant. Nullæ in Italiā, propter coeli, solisque mollicie. Hoc se Gal. Romæ ab ijs, quæ serpentes uenant, Marſicis dicant, accepisse scribit: nec tamen omnino credere. Cubitales esse phibent crassitudine, in gracilitate se minuit, nigris & rufis tibus inepit maculis, angustioreque Viparū capite. Diosco. etiā Preſteras uocari eas uoluit. Solinus distinguit. Percussus inquit diffendit, & corpulētia enormi diffit. De Vipæ, ut cōstat, The riaci passilli sūt, quæ eadmodum cōficiāt, alio loco indicabimus. Vipera Italiā nō aut nō habet, aut nō agnoscit. Quæque sūt quæ Marſos Angues, ut inquit Eustathius, & ut utulguſ ipsi nō uocat Marasos, p Vipis accipiāt: ita passim uocant. Hispanis, ex quibus quæ sūt minus atti, Aspides rubus dicunt. Aspidi uero tria gēna. Chelidonix, ab hirundinis colore, iuxta ripas amniū, sed Nilipicue uersant, paulo cubitalibus maiores. Secundū genus Cherſæ, hoc est, trerestre, sub uiridi fere, aut cineris colore, cubitorū quinū. Maiores ijs sunt Pryades, quibus idem color, sed & auro quoque proximus. Intra horas oēs cōficiū: celerius Chelidonix, tardius Pryades. Mas

biñs ictus, foemina quaternos relinquit. Pryadem fuisse, quam Cleopatra sibi admouit, Gálenus auctor. Hæc ceruicē exporrigens, metū ex interuallo quē ferat, Solinus Hypnalem dicit appellari, necantē somno, qua uita sibi Cleopatra inuiderit. Aspidas in Aegypto, Nicædæ ait, sunt qui ferūt alias dodrantes, quæ citius interimāt, alias etiā passum iussū longas.

E X M. V E R G. C O M M.

Negabant quondā Marſi, gens quæ in Italia impune serpentes uenaret, & tractaret, Viperas in nostro orbe nasci, ob coeli temperiem, & molliorem soli naturā. Id tamen non credere se Galenus ait. Omnes contra Aphricæ, peculiare hoc naturæ malū potius, q̃ animal esse testati sunt. Idem non satis certe genus & formā Viperae descripserunt: alijs Dipladem; alijs Præsterem, alijs aliud genus & nomen Viperae assignatibus: alijs hac forma, alijs illa deferibentibus. Longum sit, si Strabonis, Galeni, eiusdem scriptoris huius, multorūq; aliorum dicta hoc loco congesserimus, & præter longitudinē superuacuum etiā: cum ante nos plura ex his Barbarus in Corollario suo retulerit, quæ poterunt uolentes ab eo intelligere. Nos propositū nostrū agentes, ex uetērum Græcorū decretis primū monebimus, calido siccoq; palam temperamentū esse Viperinæ carnes, totumq; corpus per cutem purgare: ideoq; ab elephantij sibi, solo hoc cibo, multos ad sanitatē restitutos fuisse, testatus libro sexto Paulus Aegineta est. Nec minus libro 4. quo loco de mali illius curatione agens, Viperinis carnibus uti iubet: & si sit earū copia, nihil æque in cibo prodesse testatur. Iubet præterea, cōfecto uiperinis carnibus sale illo, de quo paulo ante dictum est, pariter uti, nec minus prodesse. Quem ille Theriacū ideo uocat, q̃ in τὸ θύριον, id est, uenenato, & serpente hoc animali confectus fuerit. Idem contra strumas eodem Dioscoridi, aut non dissimili remedio pugnat. Hic Viperae carnis strumam incrementa sisti ait: Ille non uiperam, sed quem Græci ὄφιον uocant, iubet in siciliē gypso circūlitum consigi, & in fornace cremari: tum addito sœno græco, melle subigi: eaq; ratione uti. ὄφιον autem intelligere oportet, quē nos Anguem dicimus omnibus notū. Vitur medicamētō etiā ex aspidibus cōfecto. Ex quibus cogitatū a nobis aliquādo est, nō adeo differre Viperas ab Aspidibus. & nostrates Angues nō dissimiles penitus uirēs habere posse: quodq; in Africanis laudatur, & alijs antefertē siccitate regionis, & coeli temperamētō fieri. Iubet deinde in præparandis ad cocturā Viperis, detrahi primū pellem, mox caput & caudā amputari: quia minus, aut nihil carnis hæ partes habent. In qua amputatione dānat, fabulosiniq; esse dicie, quod quidā præceperunt, certa aliqua mēnsura auferēdas Viperae partes illas esse. Quod tamē antiqui oēs testati sunt, eamq; digitorū quatuor fore decreuerūt. Plinius lib. 19. cap. 5. cuius hæc uerba sunt: Quatuor digitorū mēnsura utrinq; præcisa. Paulus Aegineta primo quartū uoluminis capite in Viperae coctura, προκοποιουμένων πρότερον πάντα κεραιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ὑποῶν ὅτιν ἀπὸ δακτύλων τῶν ὀφίων. Quod est, amputatis antea capitibus & caudis quatuor fere digitorū mēnsura. Id ipsum & pleriq; alij testant. Nec dānat, negatq; Dioscori. earū partiū amputationē, sed quā uulgus amputationis cām opinat, quia, scilicet ueneni sedes in his partibus sit: fabulosamq; huiuscemodi historiā testatur, & q̃ certa mēnsura amputandæ illæ partes sint. Causa em̃ amputationis est, nulla in his partibus caro, & ob id inutilitas, cōiecturaq; satis ad mēnsurā esse: ideoq; & Paulus Aegineta quatuor fere digitorū dixit, qui per latitudinē, & ut in manu se contingūt intelligendi sunt. Cōiunctū huic est, quod nos uitiosum oīno suspicamur, & ex similitudine uocis alterū ex altero participio factū esse, τὸ δὲ λοιπὸν πλύναντα καὶ τιμαχέοντα, &c. Quod si uerbū de uerbo ueritas significat, postremo autē lotā, & in frustra dissectā Vipera, &c. Lauare em̃ πλύνειν est. Et si sic legat, dubitandū non est, quin lauari antē cocturā Vipera oporteat. At nō sic in omnibus græcis legit. Vidimus em̃ nec spernendæ fidei cōdices, in quibus nō πλύναντα, id est, cum lauauerimus, sed πλατύναντα, id est, cū aperuerimus, & quasi diffusa inferiore parte diuicauerimus, tunc in frustra dissectā coqui oportere: nullo alio sensu, q̃ ut significetur, oportere Vipera euiscari, detraclisq; interaneis omnibus tūc coquendā esse. Persuademurq; in eo facile, q̃ hic sensus a rei necessitate non abhorret, q̃q; integra adhuc lectio in aliquibus hæc est, & q̃ Plinius eodem loco ait, exemptis interaneis discoqui in aqua, aut oleo, &c. præter Pliniū Paulus Aegineta eodē loco. Cuius hæc uerba sunt: ἀραιεῖν τὰν δὲ τῶν ἰνῶν, &c. Quod est, ablatis interaneis, quorū nulla fieri detractio, nisi aperta & dilatata inferiore parte poterat, ideoq; nos, restituta lotura, excēptis interaneis coqui Vipera diximus. Addiderūt huic cocturæ aliqui, q̃ a Dioscori. non dicunt, rutā, & porrū. Neq; ab re fuerit, suspicari in totē rerū censu, poruisse librariorum incuria perire, aut ambo hæc, aut eorū alterū. Dubitandū illi etia, quo loco Dioscori. ait credi, pediculos gignere qui uiperinis carnibus, aut earū iure uescant, fieri ne id, an contra non fieri pediculos Dioscori, dixerit his quæ ita uescuntur. Multa enim in utrāq; partem afferri pos-

C sunt, Galenus, Paulusq; Aegineta, quod hæcenus legerim, nihil de pediculis his docuerūt, sed alter quod ad hanc rem faciat tantū dixit, per cutem totū uiperinarum carnū cibo purgari corpus: potuitq; cōmuni purgationis appellatione illa, pediculos edā intelligere, qui, ut in pediculis a longa ualitudine fit, pellente corruptos humores natura, toto corpore aliquando gignuntur. Alter certius, longiusq; descripta eadem uiperinarū carnium potestate, ampliore adhuc uoce usus, ait gigni in cute uiperarū carnibus uescentiū cuncta illa, quæ corrupti intra hominem humores gignere solent; numerauitq; scabies, lepras, labesq; alias, in quibus extima uiatur cutis, nulla pediculorū priuatim habita mentione. Quodq; in his fit, propria earum carnium potestate, fieri & in alijs poterit, quæ quod crassum terrestreq; in humore nostro est, in exteriorē partem pellunt: in quo genere potuit & pediculorū labes illa etiam censerī. Plinius tantū pediculorum eodem libro his uerbis meminit. Ius, præter supradicta pediculos e toto corpore expellit. Quo uerbo usus, negare uidetur, quod Dioscorides, & si falsum mox dicit id esse, confirmat: nisi in expulsiōis uerbo, non fuga & euectio intelligenda sit, sed ut in auiibus, quæ pullos suos post incubitum excludere dicuntur, generatio, & quasi ex occulto & priuatione in lucem & uitam protractio, nec aliud expellere uerbum, q̃ ad generationem excludere Plinio illic significet. Quæ omnia longius dicta a nobis sunt: quoniam non desunt in græcis, in quibus contrario sensu *πρὸς γένεσιν*, quod est, non gignere legat. Nos in ambiguo communem lectionē secuti sumus, præsertim negatē id fieri Dioscoride. Variant in extremo capite non multo post antiqui Græcorū codices, suntq; in quibus *πρὸς ὑπομαχίας*, id est, ad stomachi utilitatem legatur. Habetq; utraq; lectio quo niti possit. In priore illa, & ratio, & cōmunis lectio est: in posteriore, ratio, & Plinij auctoritas, qui eodem libro & capite ait, Exurit cum sale in olla, quem lingendo claritatem oculorū consequuntur, & stomachi totiusq; corporis festiuitates.

De senecta Anguium.

C A P. XIX.

γῆρας ὄφιοσ

Senectus Anguium in uino decocta, dolori aurium infusu, & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipue uiperinam.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. 10. cap.
23. & 20.

Senectus Anguina, græce Geras ophæos, a Catone Pellis Anguina dicitur, Coriū anguis a Palladio, Leberis ab Hippocrate. Inuitat me Serpentū natura, ut præter supradictas de generibus earū reliquis, quatenus ad Dioscoridis extemū uolumen attinet, breuissime attingam. Hæmorrhus, & Hæmorrhoidis, a sanguinis effectu nominatur, qui toto corpore percussus, fluit. Ille mas, hæc fœmina est. Vtriq; colos arenaceus. Magnitudo palmorū trium. Crassitudine paulatim, in tenuitatem descendēte. Incessu tardo, & directo serpunt, ruffis, ut quidam scribūt, pedibus. Maculæ per totas, multæ, partim atræ, partim candidæ, squamis asperæ. Ob id ingredientēs, strepitu sese produnt. Fœmina in aluum iacet serpendo, meatumq; uersus caudam inferiore situ continet. Mas autem uersus aluū habet, ceruicemq; serpendo porrigit. Fœmina perniciosior, ut ex cuius ictu dentes gingiuarū, unguetq; decidunt. Colore sabuli uisunt & Hammoditæ, maxillis Viperae latioribus, cui & similis est, nisi q̃ uiperæ color suffuluus. Hos & Cenchrias nominat Aëtius, cubitales eos describens, nigris maculis, cauda superiore parte scissa, & prædura: unde nomen inquit, Cenchriæ, ut cerchriam potius, q̃ cenchriam putem legendum. Nam Cenchrites, siue Cenchrinus, siue Cancros, aliud serpentis genus est, quod & Acondion, & acontitem, & acontiam aspidem, hoc est, laculum uocāt aliquid: ut idem uoluit Aëtius, longitudine cubitorum binum in exilitatem fastigiatū, uiride præsertim sub aluum, ut milio, cum recens eius seges est, uideatur persimile robustum. Præterea se sæculi specie propripens, infestumq; saltui. Erasistratus epar, colon, uesciam affici eorum scribit, quos Cenchrinus peremerit. Arenæ colore, & cerastæ magnitudo, cubiti unius, summūq; duorū, squarrosa cauda, binis in capite corniculis, siue quadragenis, ut Solino placuit, squamis uero in uersum quandam sub aluo conditis: eo fieri, ut crepitum sibilō non dissimilem serpendo edant. Incessu obliquo. Nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur, q̃ in radicibus earū, dant. Incessu obliquo. Nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur, q̃ in radicibus earū, dant. Incessu obliquo. Nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur, q̃ in radicibus earū, dant. Qui uero supergredit imprudens, crura tumescere, cutem pedibus abscedere, manus quoq; ipsas curantium eodem modo periclitari. Amplitudo bicubitalis. Præpingue corpus, muni-

tum, loricaſq; ſquamis duriffimis, in quibus Acripennes muſcæ laitant, quæ ipſum animal conſiciunt. Amphibæna ſimilis eſt Scytalæ tereti, & æquali corpore, uti ne caput utra parte ſit cognoſci poſſit. Amphibæna etiā biceps eſt, ut inquit Galenus, & utraq; parte ingreditur. Vnde nomen. Cæterū nec Amphibæna, ut Aetius exiſtimat, interſcitur, nec Scytale, præterq; chalcidica, eandem afferens quam uipera perniciem. Scytale tanta uarietate fulget tergoris, ut notarum gratia moretur obuiſ. Prima ponit exuiſus. Hydros, ſive Natix primū in terra uiuit, & Cherſydros appellatur. Deinde in aqua. Similis eſt aſpidi puſillæ, præterq; q̄ ceruicem latam non habet ut alpides. Nominatur ab Aetio & Parous, in Syria proueniens, modo æris colore, modo nigricans. Iterū Spathiuros apud Chalcidem, ex craſſitudine in exilitatem procumbens, lato capite. Sed neutrum genus inferre mortem. Ab eodem auctore Pelias, & Elaps produntur, ſed quia noti ſunt, deſcriptione, inquit, non indigent. Elaps & a Solino dicitur. Fit & Chamedracontū mentio. Sed omniū ſine dubio peſtilentiſſimū eſt animal, quod a triplici frontis apice, quaſi alba mitrula, & plane regio inſignī Baſiliſcus appellatur, palmarū ternum longitudine, ſufflauus, exacuto capite, cuius uel ſibulum animantes nullæ perferunt, præter Muſtellam, a qua uincitur. Auditus, conſpectuſq; momento perimit. Quicquid morſu eius occidit, ipſum etiam extinctum, ſacientemq; nullum attingit animal. Vultus ab eo factū, ut inquit Eraſiſtratus, aureo colore obducitur. Ex iſs quas dixi peſtibus, alias eſſe furdas, alias haberi cæcas, quæ propterea Typhlini, hoc eſt, Cæciliæ uocantur. Prouidentia naturæ factū eſſe dicerem, nili facile reſponderi poſſet ab impertitis, melius conſulturam fuiſſe, omnino nō peperiſſe, q̄ ſi captas oculis, & auribus peperiſſet. Ita em̄ leges naturæ dicimus eadem facilitate, qua contemnimus. Atq; utinā accuſare mala ſatis eſſet. Odimus & bona. Vſu certe comperi, haud temere alios naturæ taxatores eſſe, q̄ quibus uitia ipſa placent, impunitatem conqueſtione redimentibus. Sed hæc alterius curæ ſunt. Illud obiter admonendi ſunt lectores, ea quæ de ſerpentibus a neoteriſis dicuntur, præſertimq; Arabibus, & eorum Principe (ita enim modo ſcholæ uocant, & Galeo quoq; præferunt, ſi Djs placet) uſq; adeo negligenter & ſordide mandata eſſe literis, ita mendacijs haberi plena, ut nō dico infantiffimi, ſed plane omni rerum uſu uacui fuiſſe uideantur.

A

Baſiliſcus,

Auicennā, Raſiſ, & Serapion taxantur.

EX M. VERG. COMM.

QVam hic contra dentiū dolores Anguium ſeneſcā in uiuō, Paulus Aegineta in aceto decoquit, & quā hic ^{ixv} id eſt, Viperā dicit, ille Dipladen uocat, non negligendo teſtimonio uaguū quondā in Græcis uiperarū nomen fuiſſe, unaq; hac appellatione plures huiuſce modi ſpecies nunc etiā intelligi poſſe. Nihil ſeneſcā anguis, ſive anguina uernatio hæc aliud eſt, q̄ quod hyemalem torporem exuentes, appetente uere Angues, ſpolium relinquit, & quā lubrica ſerpens exiit in ſpinis ueſtem, ut Lucretius cecinit, Græci ^{γῆρας} id eſt, ſeneſcutem eam dixerunt. Plinius quod uere id fiat, Vernationem appellauit.

B

De Lepore marino.

CAP. XX.

Lepus marinus Lolligini paruiſ ſimilis eſt, qui per ſeſe tritus, aut cum urtica illitus, capillos euellit.

λαγώς θαλάσσιος

BARBARI COROLL.

Lepus marinus, græce Lagoos thalaſſios, animal puſillum, odore tetro. Inter Lolliginēs ſere uerſatur, quibus & ſimilis eſſe dicitur. Venenū id eſt, alijs cibo, alijs potu, alijs conuiui. Si quidem grauida, ſi formiā ex eo genere aſpexerint, conſeſtim nauſea, & redundatione ſtomachi uitiū ſentitur, ac deinde abortum faciunt. Remedio eſſe marem tradunt, induratum ſale, ut in brachialibus ei habeāt. Eadē peſtis, in alto, uel tactu ſolo nocet. Veſcit eo uniū tantū aniāl, ut nō intereat. Mulus piſcis, & tener eſcit. Inde ingrator, uiliſq; fit. Hoīes qbus in paſtu fuerit, piſce olent, moriūturq; toride diebus, quot Lepus uiixerit. Oīno incerti tēporis ueneciū id aſſur māt. In India uiuentē capi negāt, inuicēq; illi hominē pro ueneno eſſe, ac digito quoq; in mari tactū emori. Eſſe autē ampliōrē multo, quemadmodū reliqua orbis eius animalia.

Pli. li. 9. cā. 48.
li. 32. cā. 5. & 116

EX M. VERG. COMM.

NOuerūt terreſtrem Leporem in continenti agentes oēs, Mariniſ piſcatores, & qui ad mare habitant, in formē ſagias oſſam q̄ piſcem: cuius formā ex ueteribus plures deſcripſerunt, inter uenenata ab hoc ipſo ſcriptore in ſexto uolumine numeratū, de quo tunc copioſius & certius ex Nicandro & alijs agetur. Hunc non ſatis certo intellectu, cum urtica ſimpliciter depilare cæteri interpretes dixerūt, cōem græcorū lectionem ſecuti, cui deſt quod in melioribus adhuc in

Cuenit, quodq; a Paulo Aegineta in sexto uolumine tradit. Quorū fidem & auctoritatē nos secuti, quod Dioscoridi deear adiecimus, cū marina urtica illitū leporē marinū depilare uertentes. Paulus enī his uerbis rem explet *λαγώς θαλάσσιος λῖθος καταχρίσας καθ' αὐτὴν καὶ μὲν ἀκαλόφνη θαλάσσιος τρίχας φιλοῖ*. Quod est, Marinus lepus concisus, inunctusq; perse, & cū marina urtica pilos auferit. Idipsum & meliores Græci habent. Esse autē in mari urticas, & homini medicī nā facere, testatus Plinius pluribus locis est, qui lib. 9. cap. 41. totā earum naturā & in medicīna uires pluribus locis descripsit. Testati & alij sunt, quos breuitatis causa relinquimus.

λαγώς χερσαίος

T De Lepore terrestri. CAP. XXI.
Terrestris Leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui ualitudine contracti sunt. Affrictu, aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat. Exustum caput, & cum adipe urfino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum, post triduum a concubitu potum, conceptum adimerē, paritūsq; spem intercipere proditur. Vuluæ & alui fluorem sistit. Comitiales iuuat. Contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, uitia cutis in facie, uiriliginem, lentiginēsq; sanat.

LEPUS terrestris, græce Lagos, & Lagoos cheræos, & a stupore atq; metu, Prox, & ab dormiendi habitu Derceumenos, Nicædro, Lagides quoq; Strabo eos uocauit dictus, ut Varro putat, non quasi lenipes, sed q; Eloes Boëtj leporē uocarent ita. Genus Leporum triplex. Italicum, Gallicum, siue Alpinū: qui toti sunt candidi, niuem esitant algoribus, qua liquecente, rutilescunt, raroq; Pomam perferuntur. Adapis nomine Hispanum, quos, ut Polybius est auctor, appellamus Cuniculos. Quorum fortis, uentre exectos, aut ab uberibus ablatos, gratissimo cibo Lautices appellant. Strabo Leberidas a quibusdam appellari tradit ipsos Cuniculos: qui ab effectū Lepores Gaorychia, hoc est, flosiores ab ipso cognominantur. Aristoteles & Iulius Pollux Leporē etiam Dasypoden uocari tradunt. Alij distinguūt Dasypoden a Lepore. Inuenio & Chelidoniam cognominatum genus quoddam leporis a Diphilo. Sunt qui Plinium accusent, q; Leporē alium a Dasypode uideatur habuisse. Nec intelligunt, genus quidem unum ambobus esse, sed discriminis tamē aliquid inter eos notari posse. Nam illud, quod a Plinio dictum uidetur esse Lepori coagulum, inutile. Dasypodi præcipuum. Lectiōnem arbitror corruptam, ut in Annotationibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen inficias eundem est, confundi sæpe nomina, ut & Leporē pro Dasypode, & contra pro Lepore Dasypodem Lepores appellasse uideam. Dioscorides certe Leporē, nec aliter uocare solet, opere toto. Apud nos certe Lepores montani, differunt a campestribus, in Tridentinis & Vicentinis alibus frequentes, nigritia, magnitudine, ferocia, densiore pilo, a cæteris distincti. De Lepore prouerbiū dictum est, *λαγώπενος κριῶν ἱππῖν μῆνι*, Leporis carnes concupiscis, usurpatum a Terentio in Eunuchō.

τρυγὼν

M De Pastinaca. CAP. XXII.
Marinæ Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentiū dolorē mitigat. Nā eos frangit & euocat.

Plin. 32. cap. 2.
u. lib. 9. ca. 20.

PASTINACA piscis, græce Trygon, Turturis appellatione dicitur. Hæc quæ momorderit, si figatur in arbore, querna maxime, liberari qui sit percussus, arborem siccefcere, auctores sunt. Ut meminit Aetius. Pastinaca dicitur, & insecti genus, quod ab Aristotele, Staphlinus appellatur, uerticilli magnitudine.

E X M. V E R G. C O M M.

Radium, quē nos aculeum in maris Pastinaca diximus, Plinius appellat, nulla rei, sed sola nominis diuersitate. Hanc Græci Trygona, Turturi æquiuoca appellatione, uocāt. Nec nobis ex antiquo scriptore aliquo causa satis patet, quod sæpe desyderauimus; quemadmodū desy-

derare nunc etiā cogimur, quis nam in sedando dentium dolore usus aculei eius sit; neq; enim hic docet, inspergendus ne, an imponendus dentibus sit: an percussisse, conuulsisse eo dentes oporteat. Poterunt diligentiores nouisse id, & nescientes docere.

¶ De Sepia.

CAP. XXIII.

Sepiæ coctæ comestum atramentum ægre concoquitur. Aluum molit. Collyrijs e testa factis conuenienter genarum scabriciæ perfriantur. Vsum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum, expurgat uiliginēs, furfures, dentes, & uitia cutis in facie. Elotum in medicamenta oculorum addi solet. Contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

BARBARI COROLL.

Sepias Græci *σένιας* uocāt, & Lolligines Theutidas, de quibus Matro græcus poeta cecinit. Solos pisciū cognoscere, quid atrū, quid album sit. Differunt Lolligines a Sepijs, toto genere, q̄q; & amicitia & similitudine conueniunt. Est & Teuthos, magnitudine insignis, qua sola ferè differt a Teuthide, ut Theuthos Lolligo, Teuthis Lolliguntula dici iure possit. Atramentum Lolligini suppalidum, nigrum Sepiæ. Inuenio & libi genus Teuthida, hoc est, Lolligunculam a Græcis uocatam. Thebani ridentur a Comicis, qui Sepiam opitrolicam, gallum galinaceum orthalicon, ficus tyca, hirundines cotiladas nōminēt.

EX M. VERG. COMM.

In uocibus uisum, & male sequax earum ductus est. Nam quod ad rem pertinet, facile est, quod hic docet intellexisse. Duo enim in Sepia. Primum sunt, quod duriori testa intra eam clauditur; & quæ foris claudit, id testa. Rursus in exteriore testa duplex rei substantia. Quod intus pumicosum, & tenerius q̄ pumex; & quod foris siliceum, durius, crustaceum, & in quo cum asperitate aliqua læuor est. Ex his in duobus tantū medicas vires aliquas esse Dioscorid. docuit: in eo quod testa clauditur, uentrem mollire; & in eo quod claudit, asperitatem palpebrarum leuigare, uiliginēsq; & alias his similes corporis labes exterere: non tamen simpliciter, sed cinerem eius. Quam ob causam addidit, crematā in propria testa Sepiæ testam, &c. obscure quidem, sed necessario rei intellectu, ex eo quod sequitur, donec quod crustaceum in eis est abscelserit. Crustaceum enim hic dicit, extimū illud operimentū, quale nos paulo ante descripsimus. Estq; sensus, cremadam Sepiæ testam, donec extima illa pars, quam hic crustaceam dicit, ui ignis coacta, à reliquo pumicoso corpore separata ceciderit: integræ enim cocturæ indicium id erit. Post quā hic iubet, friatam in puluerem corpori inspergi. Nosq; rei necessitatem, & Paulum Aeginetā secuti, ut legitur uertimus: qui de eadem hac re libro primo agens, *μικανμίαν σπινίαν ὀφθαλμοῦ* dixit, id est, crematam Sepiæ testam. Idem etiā nobis auctor fuit, ut in extremo capite salī fossili adijceremus: quod in aliquibus græcorum adhuc legitur; & ab eo in exterendis oculorum unguibus manifeste præcipitur.

¶ De Mulo pifce.

CAP. XXIIII.

Mulorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini Draconis, Aranei, ac Scorpionis morsibus medetur, si crudus atq; dissectus admoveatur.

BARBARI COROLL.

Mulum, Græci Tryglen, goneatida, hoc est, barbarum uocant: dictum ita, quoniam ter anno pariat, Præfertur ex Ionia. Est ab hoc diuersus, qui Trigolas appellatur. Item qui Myllos, de quo inter falsamenta, in Otiarichio disserui. Mulum piscem Proserpinae, item Dianæ sacrum fecere Græci: ut Citharon Apollini, Mercurio Bocas, Libero patri Citulum, Apuam Veneri, Neptuno Pompilum.

EX M. VERG. COMM.

Nouerūt gulæ proceres, Mullū piscem Græcorum uocabulo, nunc etiā Tryglen ab omnibus dictū, laudioribusq; coenis eum seruari, quæ de eo sciat ubiq; uox indicat, non comedi

A

σένιας

Plin. lib. 9. cap. 29. & 11.

B

τρίγλα

Plin. lib. 7. cap. 18. & 51.

Ca piscatore Tryglen. Fuit huic cibo omnibus sæculis gratia, nec uile pretiū: in quo singulis sex tercijis singulæ rependerent libræ, si Iuuenali credimus, dicenti, Mullū sex millibus emit, æquā-tem sane paribus sextertia libris. Hunc uenenatorū multorū moribus non recentē, ut Barba-
rus uertit, sed crudū imponi Dioscori. iubet. ὥμῳ enim in eo est, quæ uox Græcis crudum tan-
tum significat. Nescioq; ego, cur recentē potius, q̃ crudū uertere ille uoluerit, cōmunemq; græ-
carū uocū æstimationē mutare, non leui sane in medicina periculo, si crudum, & recens promi-
scua significatione misceauit. Multa enim in tota natura sunt, quæ cruda uetustatem habent, &
quæ cocta recentia dici possunt. Liber hoc loco gratias Plinio habere, qui ea quæ angustius a
Dioscoride dicta fuerant, latius explicauit. Hic enim marini Draconis, & simpliciter Scorpij,
Aranearumq; moribus imponi Mullum iubet, nullo inter terrestrem, & marinū scorpionem,
& araneas, & Phalangia discrimine. Plinius uero libro 32. capite 4. de hoc ipso pisce agens, his
uerbis rem docuit. Item contra Scorpiones terrestres, marinosq; & Phalangia illitus, &c. Quia
Phalangiorū uoce in eo remedio usus, aliud & ueneniarius araneorum genus q̃ Dioscori. intel-
lexisse uidetur. Hic enim non Phalangium, sed ἀράχνη ait: eam intelligens, quæ in trabibus,
parietibusq; suas telas suspendit. Quod totum peritiorum censuræ relinquimus, cōtenti qua
debemus & possumus fide scriptoris huius uoces uertisse.

ὄρχις ἰπποτάμι

H De testibus Hippopotamī. CAP. XXV.
I P P O P O T A M I testes exiccati, ac triti, contra serpen-
tium morsus bibuntur.

Plin. lib. 8. ca-
pit. 25. 26.

E B A R B A R I C O R O L L.
Quum fluuiatlem Hippotamon Græci appellant. Sanguine utuntur pictores. Geminus,
ut Crocodilo uictus, super Saiticam præfecturā, in Aegypto plurimus, in India quoq; ut O-
nesticritus est auctor, amne Indo. Celebratur inuentione sanguinis trahendī.

E X M. V E R G. C O M M.

DEregrinū Italiæ fluuiatilis hic equus semper animal fuit, Romanæ tamen urbis & Cæsarij
fortuna suæ genti sæpe id palā ostendit. Viditq; Ro. Po. in Aegypti Nilo ad Saiticam præfectū
ram genitū ambiguum, & cui æque in arida ac in flumine uita sit animal, binis & quales in bu-
bus sunt ungibus, dorso, iuba, & hinnitu equi: a quibus & flumine cōposito nomine, fluuiā-
tilis equus dictus est. Rostro præterea resimo, caudā torta, dentibus aproū aduncis, sed minus
noxijis. Depasci eum segetes, testis Nicander est. Qui in Theriacis suis de eo sic cecinit.

Ἰππὸν τὸν νῦλος ὑπὲρ εἰδὴν ἀιθαλῶσαν
Βόσκει, ἀρόνρια δὲ καὶνὴν ὑπὲρβάλλεται ἀρπη.
Ὅτι καὶ ἐν ποταμοῖς ἰππὸν ζάλον ὑλύνεται,
Χιλαὶ ἐντε χλαδουσινὸν δ' ἀπὸ χύατο ποίην,
Τόσων ὑπὲρβῶν λείπει βιβονόβειτον πτερ.
Ἐκ νύμται γιγῖσαι παλίστονον ὄρμαν ἱανών.

Quorū uerficulorū ea sententiā est. Aut equi quē Nilus supra nigricantē Saim pascit, aruiscq; eū
noxia immittit falcē. Hic ex flumine egressus, relictis coeno sis fluctibus, cū frumēta flauent, &
uirentē amiserunt frondē, quātū a flumine ingrediens per arua p̃greditur, tantū dentibus de-
pascitur, retrogrado incesso iter faciens. Quod Plinius felicissime descripsit his uerbis. Depa-
scitur segetes destinatione, ut ferunt, antea determinatas in diem: & ex agro ferentibus uesti-
gijs, ne quæ reuertenti infidiæ comparentur. Plures, nec paruifaciendas in medicina uires ei
Plinius q̃ hic tribuit, quas licebit uolentibus multis locis in eo scriptore inuenisse, præsertimq;
libro 28. capite. 8. Quorum hic unum tantum probauit, quod ille scilicet ait. Testiculī dra-
chma ex aqua, contra serpentes bibitur.

αἰσθητὸς ὄρχις

F De Fibrinis testibus. CAP. XXVI.
I B E R ancipitis uitæ animal, plæruncq; cum piscibus & cancris ex
aqua uictum capefcit. Huius testes serpentium uenenis aduersan-
tur. Sternutamenta mouent. Et in uniuersum uarios obtinent usus. Si-
quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmīs cum pulegio poti. Se-
cundas quoq; eijciunt. Contra inflationes, tormina, singultus, uenena,

ixiamq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcunq; ueterno obdormi-
scientes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odori suf-
fitu, idem faciunt. Poti & illiti profunt tremulis, conuulsionibus, et omni-
bus neruorum uitijs. In summa, calfactoriam uim habent. Eligi debent
Testes qui ex uno ortu connexi sunt. Fieri enim non potest, ut gemini
folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur. Liquore intus ueluti
mellis cærosi, odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus
tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniungentes in fol-
lem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita
exiccantes. Vanum est quod traditur, Testes ab ipsius euelli, et a sese abij-
ci, quum uenatu urgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita ut in sue sustri-
cti. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum eue-
stiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

BARBARICOROLL.

Fiber, quem Græci Castora uocant, ab extrema ora, ut Varroni placet uocatus, quoniam de-
extra & sinistra fluminis maxime uideri soleat. Et antiqui Fibrum, inquit dicebant, extremum.
Vnde sagis fibræ, & fibræ in auribus & iecore. Differt a Lutra Fiber sola cauda, cætero pilus
utriq; pluma mollior. Dicta uero Lutra est, q; se in aquis luter. Ob id græci eam *λυτρώ* uiden-
tur appellasse Theodoro: qui tamen lutrîn, non lutram conuertit. Plinius Enhydrida serpen-
tis nomen esse maluit, ut aquatilis colubri. Varro quoq; non lutram a luctendo, sed Lytram tra-
dit quoniam succidar, dissoluatq; in ripis arborum radices. Ceterum testes Lutræ comitalibus
prodesse docet experimenta, ut appareat cum Fibro cõmunem Lutræ proprietatem esse. Plini-
us e genere inquit, Fibrorum Lutris, sed nusq; mari accepimus mergi. Archigenes iustū uolu-
men de Castorū utilitatibus conscripsit. Plurimus hic in Ponto, morsuq; hominē, nō prius di-
mittit, q̃ ossa fracta cõcrepēt, ut Solinus ingt. Nascunt & in Hispaniæ fluminibus Castores, ut
ingt Strabo, cæterū nō inest uis illa medica, ut in pōticis. Castorē porro dictum, q; sese castrēt,
eale corporis parte redimētes, ppter quā expetunt: & ponticū esse canem, Seruius hono-
ratus p̃didit. Nam qui Canis marinus dicit, piscis est, & longe a Cane Pontico diuersus. Est autē
marinus canis, enā carmine Homeri celebris: cuius frustra Romę, thuriani pulmētī nomīne uē-
debātur tribus obolis in libras, Rutilij Rustij etate: qui res gestas populi Romani scripsit. Hoc et
a Plinio, Tomos Thuriani uocatur, ut ego quidem primus cõperisse suspicor, appellatus est. forte a
Thurijs oppido Italię, q; primū e Sicilia sic cõuectus. Athenus & Thurionē, siue Thurionē
dici obsoniū hoc latine lingua solitū affirmat. Suauissimūq; id ac lautissimū fuisse. Strabo Gale-
otē hūc, & Xiphia uocari tradit, & quemadmodū capiat ostēdit. Dictū & Scyllā, & Lamia, &
Carchariā quoq; arbitror a nōnullis. Vnde cōiectari liceat, aut eū esse Thurionē, quē nos uul-
go Sturionē appellamus: aut quod uerius existimandū est, ab eo quasi delicato & cupediario
piscē nomē accepisse. Notādū, Aristoteli aliud quodāmodo, sed affine tñ genus uideri Scyllā,
& Canē marinū. Nā Scillaros apud eum pro Squilla parua sumitur. Nec illud omittēdū, Pho-
cæniā apud eū dici, q; latine Tirsio uertat a Theodoro gaza, siue Turisio, aut Torsio, ut Plinius.
Delphino similis, paulo tristior, & rostris canicularum similitudine maleficus. Hūc puto esse,
quē ab Atheno mō Thurionem, mō Thurionē, mō Thurianū pulmentū uocari diximus, a
Strabone Galeotem & Xiphiam, ab alijs Canem marinum, aut si nō iidem omnino sunt pis-
ces, quod & ratio nōnulla suadet, certe similes fateri eos necesse est. Sunt qui græce Hyccam, si-
ue Hyccam, hoc est, porculum pro sturione capiant. Mentionem Hyccæ penes eundem Athe-
nū legas & Callimachum, qui eum piscem Sacrum uocauit. Aliud uidetur genus esse ab
Hycca, id quod Hyn, id est, suem uocant, qui sit, ut Atheno placet, idem cū apro, siue capro,
ut Archestrato, diuersum, qui suem marinam Plamitin, alij Plammatida cognominant. Nam
oppidulum Sicilię quod Hyccara uocatur, ab Hyccarū multitudine cognominatū putant.
Cyrenæi certe hunc non Hyccam, sed Erythrinum, hoc est, quasi Rubellionem appellabant.
Sunt tamen qui & pisces luidas uocatos, Hyccas nōminant, & Philetæ uersum

Οιδιλλικὴ ἰχθὺς ἰσχυρὸς ἰσχυρῶς,

A

Pli. li. 8. ca. 70.

Lib. 30. ca. 1.

B

Strabo lib. 3.

D I O S C O R I D I S

C sic interpretentur, quia difficile sit eos capere. Propterea & uermes, quos Intestina terre dicimus, & Græci Gefentera, & Iulos à nostris, uulgari uoce Porcelliones appellantur. Numenius & Hyenam piscem cōnumerat, qui an idem sit cum aliquo ex prædictis, in incerto est mihi. Est & terrestre quadrupes Hyæna, ut constat. Inter pisces & Syagris, a sue dicta potest uideri: quanquā inuenio quandoque scriptum Synagris. Diphilus & Capriscum dici quendam significat, qui & Mys uocetur. Nisi quis non in piscibus, quemadmodum & inter ostrea.

E X M. V E R G. C O M M.

Contra multa hominis mala, usa quondam antiquitas est, & nostra ætas adhuc utitur Castoreo, præsertimque contra uenena aliqua. Quæ uerissimi ille est a Dioscoride illuc numerata fuisse: sed ea liberiorum incuria excepto uno perierunt, idque Ixiass est, quod Barbarus Viscum, ex Plinio interpretatur ubique: non satis certam nunc rem notissima Visci appellatiōe indicans, uocumque similitudine Ixiass, & Ixon simul miscens: cum tamen alterum in ramis arborum inueniatur, au cupio inferuiat, & in medicina non penitus inutile sit; alterum ad Chamaeleonis aculearum herbarum radices nascatur, omni careat usu, & inter uenena ab hoc ipso, & a Paulo Aegineta numeretur: quemadmodum in Chamaeleone herba, & in uenenis longius ab hoc scriptore, et a nobis dicitur. Nec animus modo nobis est, Plinij, & Plinij secutos inscitie, aut incurie arguere. Fecit enim ante nos id Leoniceus, oī doctrinarum genere clarus homo. Sed quod ad nos pertinet, legentes monemus, quoniam nihil Viscum & Ixiass idem sit, non declinatio, non genus, non natales, non usus, non rei subtilitas, maluisse nos græca uoce in altero quam latina uti, & Ixiass uenenū dicere, Viscum uero quod in ramis arborum natum, multos habet in re nostra usus: ne uisci audita uoce, crederent legentes, homini ut auiibus mortem uiscum esse, abstinenterque eo, quas habet utilitates amitterent. Certius de tota hac re in utroque Chamaeleone, & uenenis patebit legentibus, & a nobis dicitur.

μελι κροκιδίου

De uulgari Mustella. CAP. XXVII.

Mustella, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & in uicinerata sale in umbra siccat. Ea binis drachmis cum uino non pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio. Toxico, simili sumpta modo resistit. Bius uentriculus coriandro sacculus, inueteratusque, percussus a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Crebrata in fictili, podragicis cōfert, cinere ex aceto illito. Sanguine peruncta, strumæ iuuantur. Comitialibus etiam prodest.

Pli. li. 29. ca. 4.

BARBARICOROLL.
Mustella uulgaris quam Græci γέλας, Cato Ecidion appellant.

βάτραχος

De Ranis. CAP. XXVIII.
Contra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt Ranae, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusque earum itidem sorbetur. Contra inueteratos tendonum rigores pollent. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium Ranarum cruor, auulsos genis pilos renasci prohibet, in uestigia euulforum instillatus. Decoctæ in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Pli. li. 9. ca. 42.
si. li. 32. cap. 4.

BARBARICOROLL.
Ranam Græci & fluuiatilæ, & marinæ dicunt, etiam nūquam pisce, Batrachō, & poetica uoce Barachon uocant, ut Iones: quod & apud Aristophanem & Xenophanem poetas legit. Batrachio & Chymistæ suū habent, excellentis in auri cōfectione miraculi, ex putrilagine diuini laticis nascentem, specie Ranunculi, uenenū sentissimū, quod uel solo halitu minus prudentes opprimat. Hoc ab effectu Chryfocolla quæ dicitur. Est & morhi genus Batrachos, tumētibus sub lingua uenenis, cui simile fortasse Plinius. 26. uoluminis initio monstrauit, rubentis sub lingua duriciæ. Inter Ranas est & quæ Phrynos græce dicitur, hoc est Rubeta, quæ in uepribus uiuat, quæque prius in

✠

aquis, postea fit terrestris. Perniciosa hæc, ut Chersidros. Grandissima cunctarū. Magnitudo testudinis parue, geminis quandoq; ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat: in flatq; se irata, tam proterue audax, ut insiliat quoq; proximum; quanq; suspirio se frequenter, q; morsu uindicans. Buffo inde, ut arbitror, a Virgilio & uulgo dicta, ueneficiorum plena, præcipue ossiculis duobus; quorum in sinistro latere inuentum, Apocynon uocat, quia Canum impetus cohibeat. Recentiores lapidem in capite huius Ranæ haberi tradunt, ad dolores illiū gestatu probant, sed qui uiua ea sit exemptus: quales uulgo magna etiam copia feritur anulis: quanq; hunc elici potius, q; eximi uiuentibus constat, puniceo in panno, cuius plurimum colore delectantur, ita dum ipsi seriando relaxant se, capitis onus deponunt: id mox in subiectam cistam e medio foramine collabitur: alioquin ea est illi inuidissima natura, ut lapidem eum, nisi tolleret, resorbeat. Huic aliquando & cauda ab initio est, quam post amittit: ob id in stagnis, cū adhuc pusillæ sunt, Muti ruribus uocantur. Alterum genus, & hoc exitiale, Calamites dicitur, quando arūdinetis fruticq; roris linctū uicinis, sine uoce, omniūq; minima & uiridissima: quæ si forte a bubus hauriatur, distendit eas. Hanc et Dryopetem uocari credimus a Plinio, quæ inter frutices & arbores uisatur. Est & genus uocalis parue, scandentis arbores. Inuenio & palustrem mutā inter uenena, hoc est, Eliobatrachon, diuersam a Phryno: qm̄ & signa, & medicinæ uariant. p̄sertim Actio. Aristoteles Ranas cōes, Telmatæos, aut Lymnæos, hoc est, lutarias & lacustres nominat. Varro luridā Ranā dicendo, p̄ Calamite uideat accepisse: qm̄ Philothrū sit, ut Plinius, idēq; Varro affirmant, illud efficacissimum: quāq; & epitheton Ranarū omniū putant id poetæ. Miror quāobrem Diosc. Phrynō, hoc est, rubetion, qd est leuis, cognominari dixerit. Nisi qs Rubetæ duo gñā constituat. Leuis, & sine cornibus, ex qua delibutorii uenenū, sicut ex palustri quoq; Muta cōdit: & Aspera cornutaq; quæ proprie sit Buffo; cuius dorsū paulo ante scabrū esse diximus ex Actij sententia. Habetur & Batrachos halica, hoc est, piscatrix rana, sed inter pisces Aristoteli, Ciceroni, Plinio.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est Ranis omnibus unum genus, nec idem color, aut similis uita & mores. Nascenti aliæ per se, conserpitis tantum æstiuo imbre, littorum & itinera puluerulentis harenis: quarum breuis uita, & nullus usus est. Habent alię legitimo naturæ ordine in aq̄s suos natales, nec mare tantum, sed profluentes omnes & palustres aquas incolunt. Sunt & quæ in siccis agunt: quales Rubetæ, & quæ in harundinetis inueniuntur, Calamitæ ob id appellatæ, inutiles, & ob uenenum suum letales. Sunt & in fluuiatilibus & palustribus, quæ uiridi, & quæ liuido colore sunt: quæ itidem tutius, & quæ non sine periculo comedi possunt. Ex toto hoc genere serpen-
tibus aduersari intelligendæ sunt, in profluentibus, aut stantibus aquis agentes, & in cibis utiles. Et quas hic uirides, nouum in palpebris pilorum incrementum prohibere dixit, in aquatiliū illarum genere eo colore cognoscendæ erunt.

De Fele. CAP. XXIX.

Recens Felis in cibo nutrit, & facilem præbet alium. Sale uero conditus, non suppediat alimentum. Arteriam expurgat. Eruocem expedit. Illita saliti caro, aculeos extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fots adijciatur. Fluctio-
nes siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa medetur.

BARBARICOROLL.

Silurus, piscis est fluuiatilis, q & alibi q; in Nilo nascitur. Aetius, Silluarion, ut puto, uocauit hunc, cuius selle suffusos oculos inungi cum attico melle præcipit bobus. Aristoteles uideatur Silurum intelligere Theodoro, cum Glanm piscem nominat.

E X M. V E R G. C O M M.

Thynos præcipue magnitudinis in mari pisces, æquant in fluminibus aliquot nascentes Siluri, priuatimq; in Aegypti Nilo. Vnde maxima eis ad ganem laus in poetis & gloria. Feroces iñdem uti in piscium genere, & qui non aliter q; hostes in aqua latrocinentur, obuia quæcunq; appetentes, & qd in ferocioribus rarum est, multo proliis amore. Aedita a foeminis oua, mares in hoc genere ne pereant custodiunt, tantopere sibi seruandisq; rerum generibus natura consulit. Crediderunt iuniores aliqui, Siluros esse quos nostra ætas Sturiones uocat, sed falso. Thynnus enim similiore Siluri sunt, & eorum magnitudinem æquantes.

A

B

Σιλουρος νιυρο

Pli. li. 9. c. 17. 51.

C

capit

De Cerro pisce.

C A P. XXX.

Cerri saliti caput exustum, excrecentes ulcerum oras, puluilloſq; reprimi. Nomas cohibet. Thymos, clauosq; abſumit. Caro nō ſecus atq; ſalfamentū pdeſt a ſcorpione pcuſſis, aut a cane demorſis.

B A R B A R I C O R O L L.

VERG.

DE Smaride, ſiue qd idē eſt, Maride, in ſequenti mentione dicit. Illud in tranſcurſu nō ſlebiſ, Maruda genus etiā meſurę dici apud Ariſtore. quę ut inq; Iulius Pollux, heminas. 6. capit. **M**AEnis cōgeneres, de quibus mox dicit, Smarides ſunt, rā ſimilibus inter ſe notis, tamq; mixtis natalibus, ut mutatis iampridē appellacionibus, nō facile nūc ſit alterū genus ab altero ſecernere. Id ego non auſim quod alias dixi, procul a mari natus homo. Poteram & ipſe hoc loco quā Plinius, Athenæus, plureſq; ali; de utroq; hōc genere longius tradiderunt, in unum collecta coaceruare, ſed nihilo magis res patuſſet.

maris

De Mænis.

C A P. XXXI.

MAEnarum ex capitibus cinis ſi illinatur, calloſas ſedis rimaſ abolet. Eius etiā garrum corporis putredines collutione ſedat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 32. ca. 11.

MAenas græci Mænidas appellant, laudatiſſimas e Lipara. vulgus Mænulas. Aleculam quāſi ex Plauto Theodorus interpretatur. Ego Aleculæ uocabulum generale credo, idē apud nos ſignificans quod apud græcos Anthracides, ut in Halme demonſtrabimus. In Paño nīa piſciculum quem Menapij & Belgę cæteri copioſiſſime uenantur & inueterant, Arengam nōcantes, ipſi Alecem hodie quoq; nōminant. Similes inter ſe uult Speuſippus eſſe Mēnas boacas, et Smaridas. Candidiores nēpe Mēnas. Sunt qui Boacas, ſiue Boecas appellent, hoc eſt, Leucomænidās. Smarides uero, ſiue Marides, ſunt quas nōnulli uocant Cynoſeuma, ut inq; Athenæus. Ariſtophanes byzantiuſ, ſolus non Bocas, ſed Boopas uocandos exiſtimabat: quia parui eſſent, & magnos oculos haberent. Miror unde Theodorus Cerros interpretetur, quas græci Smaridas appellant. Sū quidē Gerres, Plinio, Martiali q; inter uiles, ut illo uerſu, Fuiſſe Gerres, aut inuiles Mēnas. Odor impudicus urcei ſatebatur. ſed diuerſos a Smaridibus, ut in Caſtigatione Pliniana diximus. 32. libro.

VERG.

Non cinere Mēnarum in medicina tantum Plinius utitur, ſed carnibus etiā: quibus impoſitis, docet uerendorum puſtulas ſanari.

ad 6109

De Gobio.

C A P. XXXII.

Gobius recens in ſuillum uentrem coniectus, ſi contuſa rima in duodecim aquæ ſextarijs, donec duo ſuperſint decoquatur, & ſub diuo refrigeratus potui detur, alius ſine moleſtia deſcitur. Illitus cōtra ſerpentium canumq; morſus auxilio eſt.

B A R B.
Pli. li. 9. ca. 57.

Gobius, & Gobio uocat & græce Cobios. Plinius quoq; p. c. ſcribit, nō per. g. ſecūdo & 30. Guolumine. Præſertim nigro cādidus. Deterrimus omniū eſt, q uiridis appellat, etiāſi grandifimū, quem Diphilus Caulinem dici reſtis eſt. Gobios ſaxatiles, ſunt qui Corthonas dici putent. Siculi cēte Gobium, non aliter q; Corthonem uocabāt. Sunt & fluuiatiles qdam Gobij.

VERG.

In mortario tuſum antea iubet ad deſciendā aluū Paulus Aegineta decoqui in aqua Gobij. Piſcis e uiliſſimis eſt. Ob quam cauſā in Satyra Iuuenalis ait. Nec muſtū cupias, cum ſit tibi Gobio tm In oculis. Laudauit contra Martialis in xenijs dicēs. In Venetiſ ſunt lauta licet cōuiua terriſ, Principiū cōeꝝ Gobius eſſe ſolet. Plinius paulominuſ q; in eo genere Gobium nūmerauit, in quo terreni piſces cenſentur: quoniam paluſtriſ, & quaſi incolā terrę ſit contra aliorum piſcium naturam. Declinauerunt ueteres latini in ſecunda & tertiā declinatione eundem ſignificantē, ut ex pauloante citatiſ exempliſ aperte patet.

omēdri 108

De Thunno.

C A P. XXXIII.

Conditaneī Thunni caro, quā Omotharicō uocat, ſumpta, ijs auxiliant, quos uipa noīe Preſter, momorderit: ſed oportet uinū q; plurimū ſubinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur, Cōtra

acrimonias elicatorum maxime ualet. Canum moribus utilissime illiniē. A

BARBARI COROLL.

Omotarichos & Thyanno, falsa caro dicitur, Thūnina uulgo. Paulus Tarichon, siue Tārichos, hoc est, salsamentum. Differt autem a Salsamēto Salgama, ut ex Columella facile colligitur. Salsamenta Græci duorum generum fecere, Horæa, & Thūnia. In Horæo, quod a tempestiuitate uidetur appellatur, macra pinguius, in altero macris pinguiā præferri: quæ Cybia dicuntur. Inter macra sunt, ut inter pinguiā Cordylæ. Horæa ex Pelamydæ, id est, Lutaria minore fieri. Thunnia ex maioribus: quas aliqui Synodontidas appellant. Aliud genus uidetur, q̄ Synodontes uocantur, & a nostris Dentices. Similis est Pelamydibus & qui Triton, siue Chelidonia uocatur. nam Chelidon, aliud genus est, Polyō, ut inq̄t Diphilus, simile. Ad h̄c iam obiter & prouerbiū, quod fertur, Salsamentum putre cūnilam bubulam desiderat. Item & illud. Salsamenta simul ignem uidere, cocta esse. Crates salsamentum celebrauit Elephāthinon a se uocatum: cuius & Aristophanes meminere, sicut Omotarichon Alexis. Inuenio & Hemitarichon: & quod ab hoc plane differt Hemineron. Vtrūq̄ Salsamēti genus est. Sed Hemineron e Coracinō: quem Alexandrini Hemineron appellāt. Dicitur & Peltes, & Saperda Coracinus, & a nonnullis Aeolias Meotide stagno cōmendatissimus: quanq̄ alius piscis est Aeolias Epicharmo. Nam & Saperdam Photion p̄ Apua inueterata & arundinibus infixa capit. Item pro Succidia, & Larido, quod Paphlagōes, inquit, Ionden quoq̄ appellant. Laudantur in salsamētis Delcani, a Delcano amne dicti, quos aliqui Leptinos, & Lebianos cognominant. Item Mylli, quos & Platistacos, & Plastacos nominant, utq̄ maiusculos, sed cum parui sunt, Gnōdia, sicut media ætate Myllos. Sunt tamen qui Platistacos, & Plataces eosdem esse cum Coracinis putant. Inter Salsamenta preciosa, est & quod Spondylos uocatur. Athenæus certe id, quod in capite Mugilum Echinata specie conspicitur, Spondylum dici meminit. Item est ubi & ipsum H̄ræi salsamēti Spondylum cōmendari scribat. Sexitana, siue Gaditana, ex Orcyno, quæ Clides & Clidia, hoc est, ex eo Iuguli dicuntur. Quemadmodū ex Antaceis uocatis maxillæ, palataq̄. Antaceis nomen uidetur amnis dedisse, in Meotim lacum asiatica parte influens. Magnitudine sunt Delphinis pares, & ipso Cimerij Bosphoro gelu fodiuntur plerūq̄, nullis ossibus spinisq̄, ut Herodoto placet. In Boiysthene cōpiōsi, carne præduli, ut ait Plinius. Ex Orcyno sunt & Melandryæ. Sed et pubes eius tota sale accipit, admodumq̄ pinguis est. Pamphilus Melandryn, genus Thynni grandissimū esse statuit. Diphilus pisces quosdā salsamentarios uocauit Costas. Aetate nostra Græci piscem Hyscā, de quo supra dixi, tribus nominibus inueterant. Rhachin partē eius Doruariam & Spinalem uocantes. Quam nostrū uulguis, schinale corrupte appellat. Pleuram, idest, costas & latera. Hypocœliō, idest, aluum eius atq̄ pubem. Hunc piscem, ut testati sumus, Italia Sturionem modo uocat.

EX M. VERG. COM.

Quem composito ex crudis Thyñorum carnibus et salsura nomine Omotarichō hīc nominat, ceteri oēs simplici plerūq̄ Tarichon dicit. Salsamentū q̄d pisciū carnibus & sale constat, non simplex, aut unū, sed quorū fere sunt in Thynnis ætates, corporis partes, habitus, loca, & piscationis tempora, tot etiam nominibus ab antiquioribus græcis discretum, nec Thynnorum tantum, sed aliorum etiam piscium quorundam carnibus confectū. Eius rei longiorem historiam Athenæus libro primo Dipnosophetæ sui prosecutus est, quæ græcarum litterarum peritijs in eo legenda relinquimus. Eius autem linguae ignaris in Barbaro, qui licet breuius q̄ oportebat ex scriptore illo pluraq̄ collegerit, plura tamen q̄ in latinis inueniri possint exscripta ab eo in Corollario suo fuerunt.

De Garro. CAP. XXXIII.

Garrū omne quod ex piscibus, carnibusq̄ sale maceratis liquamen est, illitum, depascencia ulcera sistit. Morbis a cane medetur. Dysentericis, atq̄ ischiadicis infunditur. Nonnullis ut exulcerata adurat. Alijs autem ad laceffanda, quæ ulcera non senserunt. 74ijv

BARBARI COROLL.

Garus, & Garrū dicitur, a Garo pisce, ex quo olim conficiebat. Postea ex Scombropisce. Laudatissimum in finibus Carthaginis spartariæ Cætaris, quod Garrū sociorū appellabat, singulis millibus numum p̄mutantibus, congruos pene binos. Nec liquor fere ullus, præter uinguentia, maiore in precio erat. Scombri quidē Mauritania, Beticæq̄, & Carreia ex Oceano in

Pli. li. ii. ca. 79

C trantes capiebantur, ad nihil aliud utiles. Græci optimum Gari genus putant, quod Hemati-
on, hoc est, Sanguiculum appellat, ex in testinis Thynni, cum brachijs, sanie, ac eruore. Garū,
& Clazomenem, & Pompeios, & Leptin nobilitauit. Vitium huius est Alex imperfecta, nec
collata fex, neutro dumtaxat genere, ut Plinius atq; Flaccus, & primus omnium Plautus effe-
runt. Si quidem & græci liquamen uocant id, quod purissimum ex eo fluxit: id autem quod fe-
cis instar in cophino (ita enim uocant) obmansit, Alex. Vnde liquimarij dicantur. Quō etiā
pro liquore accipitur, promiscui gregarij q; pisciū: ut iam ad Ostrea Echinos, Vtricas, Cama-
ros, Mulorum iocinora pertineat. Camari sunt, quos græci quoq; Camaros appellant: itemq;
Asiacos. Est ubi Alecem uero Galeculam feminino genere ueteres appellant, minutum, uilem
q; pisciculum, ut est apud Catonem, atq; Plautū. Columella riualet nominat Aleculam, in-
ter pisciculos, & incrementi parui fluuiorum animalia. De hac uoce quid sentiremus, in Mena
& Halme diximus. Cœpit uero Garum & priuatim ex inutili pisciculo, minimoque cōfici. Apu-
am nostri, Aphyen græci uocant: quia non alio principio fere, q̃ ex pluuiā nascat, quasi Dypisphy-
es: ob id Apulas Theodoros, nunc Apuas cōuertit. Eundē Aphridā q̃q; nominat, & Gonō
thalassion: qm̃ ex spuma tm̃ marina cōalescat. quanq̃ Aphyarū multa gñā notant. Sed Aphri-
tis omniū p̃stantissima est. Quā & Aphrō, & Aphryan q̃q; uocat. Quæ uero int̃ has alba ē, Ci-
botis appellat. Meretriculas Athenis fuisse quasdam legitimas Aphyas cognominatas, quā gra-
tiles & cādidę magnos haberēt oculos. Græci Phalericas maxime pbabat Aphyas. Foroiulien-
ses, ex pisce quē Lupū uocat, ipsi Garū faciūt. Creuerunt deinde ad infinitū gñā. Nā et ad colo-
rē multi ueteris fiebat, tā dilutū suauitatis, ut bibi posset. Aliud uero, ad castimoniarū supstitio-
nē etiā sacris ludicis dicatū, ex piscib. squama caretib. Garus latinū nō habet nomē, ut Aufoni-
us poeta autor ē, q̃ & liquore Sociorū uocauit. Nec scio cū gbusdā, q̃ Aufoniū poetā id uelut
dicere qd̃ nō dicit, quasi fociorū Garū appellauerit antiquitas: ut Græcū nomē Garū, latini nomi-
nis, hoc ē, fociorū accessiōe mollesceret, ita ut quasi græcū uideri desineret. Nō hoc Aufonius
intelligit, sed illud. Malle se ingt uocare Muriā, cū scētissimi ueterū, & uocabula græca fastidien-
tes, latinū in Gari appellatiōe nō habeant. Sed q̃cūq; ingt nomine liquor iste sociorū uocetur,
Iam patinas implebo meas, ut parior ille

D Maiorum mensis Apuarum succus inundet.
Mendosus erat locus. Nam & pro in gari appellatione, legebat̃ ignari. Et pro apuanum, apala-
ria. Vtrūq; lectioni ueræ legitiq; restitui. Differt porro Garum a Muriā, & Alece: q̃ Garū
ex extis Scombrī, & quondam Gari piscis fiebat. Muriā ex Thynno fere Antipoli thuriā: in-
de uero & Dalmatiā nobilitans. Quanq̃ Muriā, siue Muries Catoni, Palladio, Columellā nō
liquamē ex piscibus, sed falsilagine facciam ad caseos cōdiendos, uinaq; significat. Erat & sua
uestitum Muries, ut ingt apud Festū Verris, certis p̃scriptisq; rebus condita: ut quę ritua-
lis esset, & ad religionisq; uita ceremonias. De Alece supra dictum est. Habetur & Halme di-
cta, latine Salsugo, & Salsilago, apud Dioscoridem & Plinium. Quanq̃ in medendi usu Salsū
go hæc, a Muriā nihil distat. Habetur & Halos achne, hoc est, ramentum quoddā salis atq; spu-
ma, cuius mentionē apud latinos in Plinio tm̃ cōperi. Habet & Oxalme appellata, q̃ ex aceto
& sale fiat. Nā Gari genus acidi Oxigarū appellatū, ipso nomine significat. Columella Oxiga-
rū Moreti genus facit. & Oxiporū q̃q; dici posse uult: rationē eius cōdiendi totius opis sine red-
dit. Vide id nominis habere, quia cum usus exigit, aceto Garoq; diluit. Sunt & sua medicia
Oxypora, sicut & Hydrogara, & Oenogara, & Eleogara. Alioqui Eleogaron & ferculi genus
erat delicatū, quod Sibariticum, missum in cœnis appellabāt: qm̃ Sibaritē quo aŋo id gancæ in-
uenissent, perhissent, autore Spartiano. Inuenio & Oxiliparū genus esse iuris, in quo Raia, ac
ceteri eius naturę pisces mādī soleāt. Illicia quid sint, nemo ignorat, sed e piscibus inuenisse pri-
mus traditur Heliogabalus, inter ganeones potius q̃ Romanos principes dicendus.

E X M. V E R G. C O M M.

S Atis in Garo nobis fore credimus, si quę corrupta in hoc capite sūt, in antiquā & uerā lecti-
onē instaurata fuerint. Quod fiet, cum breuiter dixerimus, esse Dioscoridi Garū, nō ut alijs, qd̃
feculentū carnosūq; in eo subedit, sed qd̃ liquidū, & aquæ mō fluens supnatat: neq; in piscibus
tm̃, sed in animalium carnib. Garū etiam dici, qd̃ ex earū salura exsudatū, siue ut Columella
ait, exsaniatum fluxerit. Et qm̃ liquidum sit, ideo in medicinæ usu, non illitum dicendum, ut
ceteri interpretes uerterunt, impressi tantum codicis lectionem secuti, in quo καταλαβόμενον,
quod illitum significat legitur: sed ut nos diximus, meliorum fidem secuti, si eo foueantur. κα-
ταυλόμενον enim, est quod uerbū certam in græcis habet significationem, cum liquore ali-
quo quidpiam fouemus. Quod totum rei necessitas exigit. Fouemur enim liquidis, & insper-
gimur, non illinimur. Postquam usus in strumis, & caum morbis rationem aliam docere

aggressus, non *uirtus* aduerbio, quod interim, & aliquando significat Dioscorides ait; intesti-
norū tormina & coxēdices sanari, sed uerbo *uirtus* usus, iniici & infundi Garū oportere dixit;
Icuis in una tāū littera lapsus, sed qui usum Gari in his malis, & oēm huius scriptoris hac parte
intellectū confundat. Quod aniaduertere alij interpretes debuerāt, nec tam incerto sensu.

Recentium piscium Ius, modo per se, modo ex uino potum, al-
uum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur ē gobijs, &
scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus
recipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

BARBARI CROLL.

CAP. XXXV.

Saxatiles Græci uocant Petreos, quos saxosum mare nutrit, ut Merule, Turdi, Elephedides,
Menaluria. Tria enim sunt piscitij marini genera, siue littoralis. Limosa regio plantum piscem
educat, ut Soleam, Rumbum, Passerem. Harenosi gurgites pelagium, ut Auratam & Denti-
cem. Saxosum litus, Saxatilem. Inter quos principatus gula Scarō. Deinde Turdo, ac Meru-
læ. Post hos Iulides, Phycides, & Percides, hoc est, Percæ laudantur ab Aetio. Iulidas Theodo-
rus in Aristotele conuertit Iuliam, Diphilus Phycidas, & Phycenas, quasi genera duo, sed uici-
na tamen inter Saxatiles enumerat. Porro contrarij Saxatilibus uidentur, quos Hippocrates
Planetas, & Cymatophlegas, hoc est, Errones & fluctuagos appellat.

EX M. VERG. COMM.

Saxatiles, qui a Diosco. numerantur hoc capite, cuncti pisces sunt: non ideo tamē, quod Bar-
barus fecit, mutandus capitis titulus erat. Neq; enim de carne eorū agitur hoc loco, sed de escu-
lento ture, quod coctis piscibus his sit, quo deniq; posse aluū hic scriptor ait. Sunt autem Aristo-
teli, Plinio, multisq; alijs Saxatiles pisces, quos saxosum litus nutrit, in ægotantium cibis a
Paulo Aegineta saepe laudati. Eorum sure hic deijci alium iubet, sic tamen, ut simpliciter, id
est, nullo addito condimento, aut sapore alio, in aqua præter ab eo numerata, oleum & ane-
thum coxisse eos oporteat. Nos salem ex ueterum codicum lectione, & Paulo Aegineta adie-
cimus. Quod & antiqua Dioscorid. interpretatio habet. Cuius licuit mihi uidere antiquissi-
mum, & Longobardis literis scriptum codicem, in corruptæ antiquitatis, multa adhuc uesti-
gia seruantem, in quo etiam sal oleo, anethoq; additur.

De Cimicibus lectularijs. CAP. XXXVI.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauīs fabarum inclusi, si ante
febriliū significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt.
Et citra fabas illi, percussis ab aspidē prorsunt. Vuluarum exanimatiōes
olsactu reuocant. Poti cum uino, aut aceto, adhærentes sanguifugas abi-
gunt. Triti, & urinariæ fistulæ impositi, stranguriam leuant.

BARBARI CROLL.

Cimices lectarios, græci Cores Clinicos appellant, ad differentiā syluestriū, in maluaq; na-
scentiū, ut arbitror. Aduersant aspidibus Cimices, adeo, ut gallinas quo die hoc animal ederit,
interfici ab illis negent. Contra Cimicibus Scolopendra, ut quæ sufficit necet eos.

EX M. VERG. COMM.

Foedissimum sane animal, dictū quoq; fastidiendum Cimex: ob quem non male descensu-
rus ad inferos Bacchus, in lepidissimo grecorum Comico, iter illud ostendi sibi precabatur,
& eas dari cauponas, in quibus paucissimi Cimices essent. Nihilominus concordia illa re-
rum, & repugnantia, quæ totam duce natura explet medicinam, quod homini prodesset,
aliquid in eis esse uoluit, non omnibus. nam in lectis inueniuntur Cimices: inueniuntur, &
in oleribus aliquot: præsertimq; in Malua, quos Plinius Agrestes nortinat. Sed his tantū
qui circa nos nati contra quartanas a Dioscori. numero septem cauīs fabarum inclusi deuor-
rari iubentur. Quod remediū genus falsum, nec referendū Plinius dixit, damnauitq;, agresti-
bus tantum Cimicibus ad tribuens: & præter fabas, ouo, cæraue in cludi ostendens. Quod mi-
retur aliquis in eo, qui noua, superstitiosaq; hæc in medicina remedia magnopere amaret.
Nos in plæbe & agro uidimus aliquādo id fieri, dantq; in cunctis febribus sorbendos, tritos in

C puluerem Cimices. Contra aspidēs prodesse eosdem testis iidem Plinius. Sed quod nouisse in Dioscoride oporteat, non καταπλασθῆναι, id est, illitos, ut fere Græci omnes habent, sed ut in melioribus adhuc legitur, καταποθῆναι, quod est, deuoratos.

καταποθῆναι

¶ De Millepeda. CAP. XXXVII.

Millepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu, contrahunt in orbem. Hæ ex uino potæ, difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis utilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 29. ca. pi. 6. li. 30. ca. 5.

O Nos, latine Millepeda, Centipeda, Multipedaq; dici: Græci & Oniscon, & Tilon quoque uocant: Galenus & Cyamon, a fabæ similitudine, fuscum colore. Photion & Iulum dici credit, Sed Iulus Vermis terreus est potius, quem Lumbricū uocamus. Athenæum sequor. Pilosa hæc, & arcuatim repens. Aliud genus Multipedæ habetur, quæ non arcuatur, Scps uocata, & Scolopendra minor: quæ perniciofa quoque est. De hac paulo post tractabitur. Illud meminisse oportet, Onon & Millepedam uocari & quoddam locustæ genus, ut dicitur. Oniscos & piscis est, quem nos Asellū dicimus, duos in capite lapillos, & cor in uentre habens solus omnium; hunc Græci etiam Banchon, & Chellaren, siue Gallarian appellant. Est & Mugilis genus unum cognomento Banchos, id uidelicet, quod ab Aristotele Chelones dicuntur, omnium minimi. Porro non defuit, qui inter pisces Onon ab Onisco dirimât, Onon & Gadon uocantes, Oniscon uero Gallarian, siue Galleridan, atq; Maxinon. Nam Onias Scari genus est. Sunt enim Scari alij Oniæ, alij Aeoli cognominati. Oniscos porro Hippocrati uulnerarium instrumentum est, ad luxata corporum, Aetius Oniscon marinum, ad uitia interaneorū commendat, Piscem intelligat, an uermem, non satis scio.

D E X M. V E R G. C O M M.

Notæ omnibus Multipedæ hæc, nullibi non in humidis & aquis nascentes; Græci a liuto colore ὄνους, quasi Afinos eas uocauerūt. Antiquiores Romani a numero pedum, nostra ætas & gens a tortus corporis specie Porculos uocauit. Eas nos in aquis & humidis agere potius, q̃ sub situlis diximus, Paulum Aeginetā, & rem ipsam secuti. Frequentiores enim in humidis, q̃ sub aquarijs uasculis inueniuntur: & ille non ὑπὸ τὰς ὑδρίας, quod est, sub hydrijs, sed ὑπὸ τὰς ὑδρίας, quod est, ubi hauritur & tractatur aqua, inueniri & agere Multipedas has dixit. Meminit earum lib. 8. de animalū historia Aristoteles, quo loco de pediculis animalium agit, quos in piscibus similes Multipedis his esse dixit, præterq̃ in cauda, quā illi latiore habent. Vocauitq; ὄνους πολύποδας, id est, Multipedes asellos, quoniam ὄνους, id est, aselli nomen hoc commune uagumq; per multa animalia in græcis sit: nam & in quadrupedum genere, piscium, & locustarum aselli nomine aliquid indicatur: quam ob causam Multipedes ille adiecit, idq; animaduertentes latini ueteres, a pedum numero Multipedas eas uocauerūt.

εἶδος ἐν τοῖς ὀρθοποῖσις

¶ De Blatta pistrinaria. CAP. XXXVIII.

Blatte eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. li. 29. ca. 6.

Blatras, Græci dicunt Silphas: ridendo cuiusdā errore, qui Silphiphoron Cyrenis agrī, hoc est, ut Catullus inquit, Laferpiferū, a Blatts cognominatū, ratus Blattiferū, conuertit in Strabone. In his pinguirudo quædā est, capite auulso, quæ celerime trāsit in uermiculū. Plura earū genera: Mollis, & q̃d Mylloxcon appellauere, quoniā circū molas fere uisat, fortasse quā Mylacrīda noīnat Aristophanes. Tertiū genus odoris tēdio inuisū, & exacura clune fastiditēdū.

E X M. V E R G. C O M M.

Longē breuior, q̃ Plinius in Blattarū remedijs Dioscorides est. Ille longiore historia Blattarum genera omnia, & singulorū priuatim remedium aliquod prosecutus est: hic in uno genere unum tantū remedium docuit. Causam peritiores conijciunt. Nobis ad suspicionem inclināt animus: facitq; in aliorū abundantia tanta capitis huius paupertas & breuitas, ut suspicemur non esse integrum hoc caput, neq; ex antiquioribus, & melioribus Græcis, quæ id ostendant,

coniecturæ defunt. Sed male sola suspitione de re aliqua censetur, ob id consulto eas relinquitur. Est autem in Plinio locus libro uigesimo nono capite quinto.

A

De Pulmone marino. CAP. XXXIX.

PODAGRAS; pernionesq; emendat Pulmo marinus recens, tritus & illitus.

πνεύμων θαλάσσιος

BARBARI COROLL.

Marinus pulmo, Pneumon thalassios a Græcis uocat. Pulmo etiā Pleumon dicitur Atticè.

EX M. VERG. COMM.

Quaes in mari Pulmones sunt, nouerūt qui ad mare habitant, fruticum natura magis q̄ pisciū; & in eorū censu & ordine, quæ a ueteribus Græcis *ωόφντα*, medio inter plantas & animalia habitu dicta sunt. Nomen illis similitudo fecit. Plurimū dierum in pelago hyemē Pulmones marini portendunt; & in sanandis hominū aliquot morbis egregias habent uires.

De Suillo pulmone. CAP. XL.

SVillus, & Agninus, Vrsinusq; pulmo impositu, intertrigines ab aquis contractas, ab inflammatione tuetur.

χοίριος καὶ ἄρ-
νιος καὶ ὄρκιος
πνεύμων

De Vulpino pulmone. CAP. XLI.

Pulmo Vulpis si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq; , auris dolorem finit.

ὀλώπικος πνεύμων

BARB.
Aristo. de partib.
animaliū
lib. 3. cap. 6.

Pulmones Equini, Suilli, & Vrsini, ceterorūq; animalium, ex Dioscoridis instituto referēdi erāt. In his quādo nihil erat scitu admodū dignū, ad diuerticula multæ lectionis uenimus; q̄ nec inuitalia, nec iniucida futura sint lectoribus. Suem igit Græci Hyem uocāt, & Sin, & Hyn. Aliquādo Thyrem, q̄ a suillo pecore antiqui principitū imolandi sumpserint lactentē porcellum, qui & Sub grumus est: Græci Orthragoriscō uocāt, quia matutinis uenales essent. Sed cōmuniori uoce Galathenon, Agnū Amnon, & Arna, & Arnon, & Rhena Hippocrates. Agnam Annada, & Annida, Hircū tragon, & Aegyptia uoce Murem. Vrsūm Arcton, Arcon uē. Arietē Veruecemue Crion & Cilon, præcipue sectariū. Vulpem Lampurim & Alopeca. Est & uolucris animal, & piscis hoc nomine. Græci certe Alopecis uocabulo, in medicina quādoq; intelligūt carunculas musculares eas, quæ utrinq; lumbos anialis quasi uestiūt: quas Hippocrates Plyas, Aristoteles pro lūbis ipsi Ploas, & Ploas, Hieronymus Plyas pro renibus accepit. Alij Neurometras uocāt. Earū porro caua, inanitate q̄ parū, Cibos nomināt, & Lagonas, nos Ilia; unde Lagonoponos, qui sit dolor Illi, alius q̄ qui laterū dolor appellāt, hoc est, Pleuritis. Vultus eā partē græca uoce, sed luxatā inuersaq; significat, non lagonē dicendo, sed Galonē. Dicta uero Ilia existimo a tenuitate, q̄ ea pars imbecilla, sublesta, ianis, & flaccida sit. Ob id & Ceneones itē Lagonēs uocatos, Athenus auctor diligētissimus affirmat. Nam & Lagana, & Artolagana hinc nomē habuere, quasi lagara. Porro Ina, & Ila gracilis est pellicula, ut Festus prodidit; unde Ilia crediderim fuisse noiata. Quādoquidē tenuiora quoq; intestina, q̄ in homine, atq; oue Lactēs proprie uocant, ut Plinio placēt, llas ueteres appellauere. Theodorus certe Gaza, Lactēs interpretat, pro eo quod Græci Mesenterion appellāt: nec quē sit auctorem in ea re secutus uideo. Illos certe morbi genus est, ita Græce dictus; nec arbitror, aut llas, aut Ilia hinc esse deriuata. Ina quidem Græcis & neruum, & uim significat. Dicitur Sus a Græcis etiā Choeros, hoc est, porcus. Nam Porceta est, quæ semel peperit, Scropha quæ sæpius. Mulieres inquit Varro nostræ, nutrices maxie, natura qua fœminæ sunt, appellant Porcū, & Græci eadē significatione, Choeron, siue ut Athenæus inq̄t, Delphaca: unde qui fratres sunt Adelphi nominant, hoc est, uterini. Porro Delphax porcus est adultus, atq; masculus, ut grāmaticus Aristophanes existimat, Coheros uero dum adhuc tener est. Alij cōtra uolūt. Hippocrates usum carnis e Choero dānat, cum e Sue, hoc est, uis cōmender. Certe Delphax, & pro fœmina Sue capif quādoq; a poetis, sicut & Chioeros quoq; apud Iones. Opimas Sues Græci qui dam sunt qui Petalidas, & Larinas cognominēt. Alterū nomen a uitis deriuatū est, quos illi Petalos appellāt: ubi parula habere cornua cōpere. Alterū a bubus, quos e pastoris nomine Larinos uocabāt, siue a larina Epiri uicula, siue a græco uerbo saginā significāte. Dicitur Sus & Verres, & cū exfectus est, Maialis: ut in gallis gallinaceis Capī, & in equino genere Cantherij: quia feminis usu careant. Nam Canthelios Græci pro segnibus accipiunt atq; tardis; ab

B

D I O S C O R I D I S

C asinorū similitudine, quos Canthonas appellant, a clitellis, quas Cantheleos uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

Spirandi officina Pulmo est, attrahens ac reddēs animā, idcirco spongiosus ac fistulis inani-
bus cauis, quibus aperiens se excipiat, contrahens uero aerem reddat: eamq; ob causam ope-
ratione folliis in fabrica, figura autē bubulæ ungulæ similis est. Preciosum uitę instrumentū,
& quod nō ratione hac tantū eam a morte distinguat, sed ex bestijs, quadrupedibusq; aliquot
homini medicinā faciat. Quā nos certius docere cupientes, quod in impresso codice legebatur
ιδάριον, quod aquarū significat, *ινδομεντων*, id est, calceorū necessario mutauimus. Obseruau-
imus etiā in Vulpino pulmone monere Paulum Aeginetā, non simpliciter *σπαρβιντα*, quod est
siccatum, sed *σικατινβιντα*, id est, sale inueteratū suspensiois prodesse. Quod adijcere his placu-
it, ut siccandi eius exti certiore rationē legentes haberent.

¶ De Asinino iocinere.

CAP. XLII.

ἰππος ὄνιον

A sini iecur inassatum, esu comitalibus prodest. Verū tamen iec-
iunis edendum præcipitur.

A R B A R I C O R O L L.

Pli, li, 32, ca, 11.

Haberi & piscem ferunt, qui a iecore dicatur Hepar, & Hepatus, qui felle careat, in capite
lapillos duos habēs, ostrei colore, sed rumbi forma. Hinc Eubulus, Rebaris, inquit, carere bili
me, nec mecum aliter q̃ cum Hepato pisce loquebaris. Hunc Phagro, & Rubellioni similem
Speusippus facit, Archestrato, Lebias uocatur. Inter saxatiles a Diodo ponitur. Color ei ni-
ger ab Aristotele tribuitur, oculi maiores, q̃ pro corpore, cor triangulum atq; candidum. Et
hæc dixisse in transcurso nihil officit.

E X M. V E R G. C O M M.

Continuata historia in uetustioribus & melioribus græcis de aliquot animalū iecore agi-
tur: neq; ab re. Male enim a toto partes, & a genere species alterius rei intercessionē separan-
tur. Eorū nos fidem & rei rationē secuti, de omni in scriptore hoc iecore deinceps egimus: nihil

Dioscoridi nociturā ab impresso codice mutationem hanc nostrā opinati: præsertim ut dixi-
mus, meliorū uetustiorumq; fide & rei necessitate confirmatā, neq; ex his quę reliqua in anima-
libus mox dicēda erunt quidpiā auferētes. Multū, longeq; plus q̃ cordi, iecori detulerunt anti-
qui aruspices: caput extorū in eo constituentes, & eius notas omnes ad futuram fortunā dili-
gentius obseruantes. Plato etiā, excepta iracundiā, affectionū aliarum omnīū nostrarum sede in
eo constituta, multas et graues quæ in exto illo fiunt labes, ut nos credimus, contemplatus est:
pro quarū multiplici curatione, ut aliquā naturę gratiam idem referret, medicinę se miscuit, &
ex diuersis animalibus diuerfa curauit, & adhuc curat mala.

¶ De Genitali Cerui maris.

CAP. XLIII.

*αιδανον ἄγριον
ιδανον*

Genitale masculi Cerui tritum, & in uino potum, a uipera demor-
sis auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Genitale Cerui, Aedoxon Elaphu, Græci appellant, Lydi genitale ipsū Acylon uocāt, ut
in Fago diximus. Est & piscis nomē Aedoxon, qd & nos Genitale nūcupamus marinū, a non
nullis Halefursion græce dictū: q̃q̃ Halefursion sunt qui pro Callionymo pisce capiunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Certius libro sexto remedium hoc Paulus Aegineta docuit. sicari enim prius: tum teri,
sicq; cum uino bibi Genitale id Cerui iussit, addiditq; misceri remedijs, quæ ad Viperarum
morfus componuntur.

¶ De Vngula Asini.

CAP. XLIII.

ονυχος ὄνιον

Vngularum asini cinis, per dies multos binis coclearibus potus,
proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subactę, strumas disci-
cutiunt. Et illitæ pernionibus medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vngues Græci Onychas, & Oplas uocant.

EX M. VERG. COMM.

A

DEsyderabunt non sine causa, frustra tamen legentes, quo humore dilutus Asiniae ungulae cinis comitialibus bibendus sit; nihil enim aliud in scriptore hoc legitur, & nos ex alijs scriptoribus nihil habemus, quod in ea remoneamus, ludicio id medicorum seruabitur, qui malo illi noxios humores omnes uitabunt: quale in primis unum est.

De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

Lichenēs sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli, qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

Λιχηνες ἵππων

BARBARI COROLL.

IN equo Lichen, & Hippomanes haberi solent. Lichen os est, dentibus caninis simillimū, in genibus & super ungulas animalis eius agnascens, Hippomani uero tantae in ueneficia uitres sunt, ut assusum aris mixturae, quae Olympiae, ad motos mares equos, ad rabiem coitus insti mulet. Est & herbae genus Hippomanes Hesiodo, quod & Seruius testatur. Nomen hoc & Dioscorides duabus herbis tribuit, ut post constabit. Sunt & Limi arborū Lichenēs appellati. Est & herba Lichen uocata. Graeci & Impetiginem Lichenas uocant, Hippon Graeci equum, Celtae, qui Breñno duce Græciam inuasere, Marcam uocant, auctore Paulania.

De qua Plin. lib. 26, cap. 4.

EX M. VERG. COMM.

CVtis uitium & aspredo graecis Lichen est, latini Impetiginem id malū dixerūt. Eius natura est, quoniam ex falsa pituita, flaua q̄ bile sit, ut quales ex fictilibus crustosae squamae decidūt, cum falsugo in eis aliquādiu fuerit, sic ex hominis cute squamulae etiam decidunt. Hae cum diutius in cute haeserunt callosam contrahūt duriciem, & ab harū similitudine in genibus & unguitibus equorū excrecentes callos, Lichenas Graeci dixerunt, quibus ad medicinā usa est antiquitas. Meminit earū Plin. lib. 28. capite decimo, meminit & Paulus Aegineta: qui praecep̄ comitialibus omnium uenenatorum moribus mederi etiā ait. Facile est in equis id uitium obseruare. Plinius adnatus in his equi paribus os esse dixit. Hic non magis os, q̄ quo uoluerit aliquis nomine appellare. Non esse autē os, indicat quod hic ait, ἢ τιτυλωμένον, quod est, ἢ callum duratos: sic: ἢ κατ' ἰππικαφὴν, non κατ' ἰππικαφὴν. Nihil enim hoc significat: illud autem ἀπὸ τοῦ γράμματος, quod est, flectere in flexu genu, & unguis fieri, & durari ait.

Lichenēs
Λιχηνες

De Ungula caprae. CAP. XLVI.

VNGVLARVM caprinarum cinere perunctae ex aceto, alopeciae sanantur.

ἀλωπεκία

BARBARI COROLL.

CApra graece uocatur Aex: quarū syluestres, atq̄ feras in Samothrace nasci Varro scribit, Platycerotas uocatas. Quem locū in auctore illo deprauatū omnibus exemplaribus corrigendū monemus. Non em̄ Platycerotas, sed latine Rotas legi, ubiq̄ saeculis cōiuentibus. Capras a carpendo dictas, idē Varro scripsit. Has & Chimaras Graeci uocant, & Chimaron, & Enorcha Theocritus, qui sit caper: q̄q̄ idem Vatro Caprū dici proprie uult, qui sit excastratus.

De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

CAprae inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest. Et dum coquit, apertos oculos uaporari. Carnes assas uesci per q̄ utile. Tradunt Hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi.

ἰππικαφὴν

De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

IEcur Apri recens si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpentium, uolucrumq̄ morsus auxilio est.

καύρον ἰππικαφὴν

BARBARI COROLL.

CAprinū, & Aprugnū latine dici posse uideo. Aprum Graeci, Capron uocant & Syagrōn. Siculi Aschedoron, ut est apud Aeschylum. Poetae item Clunim, ut in Triculento Plauti clui num pecus, legendū censeam, chluninū. Nam & Aristoteles suum serum Chlunin uocat. Suillum praefertur omnibus Actio, si quis, inquit, animal id arida fico pauerit. Quod genus Graeci Syconon appellant. Vnde ortū puto, ut imperitū uulgus omnia iocinora uocare Ficata co-

C perit. Sane, ut meminit Aristoteles, suum præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer.

¶ De Cane rabioso.

C A P. XLIX.

ἵπαρ κυνὸς
λυσιώτης

IEcur Canis qui rabie exagitur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pauciores dente eo, qui Caninus dicitur. Hunc a cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro a muleto brachio adnectunt.

B A R B A R I C O R O L L.

C Anem græci Cyna uocant. Poëtæ Acamynthion, rabiosum, Lysionta.

¶ De Soleis ueteramentarijs.

C A P. L.

καπνιστῶν πα-
λαιὰ σιγμάτα

VEteris Soleas crematæ illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calcamentorum attritus sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Corium e calceo, græci Cattyma, & Cassyma uocant. Nostri Veteramentum, & Veteramentarios artifices appellant, quos Græci Palæurgos. Sicut Veteramenta quoque ipsa Palimpega, & Palindoria. Hinc & Veteratores fortasse dicti, a consuendis fraudibus. Nam & apud Græcos Cattyma, sutelam, dolumque significat. Nam Alutarij sunt, qui ex aluta, hoc est, concinato corio pellicium opus faciunt; unde Alutamentum, ut Veteramentum. Pelliones quoque ab his differunt. Sed hæc instituti huius non sunt. Corium certe pecudis, sugillata uir prædicant. Ut propterea utilissimum sit ad eos, qui uirgis caesi fuerint. Pellis certe Calcedonia, in Hippocrate habentem mollem, Cornelio significat.

E X M. V E R G. C O M M.

Siccat cremati corij cinis, ideoque exulcerationibus medetur. In quem usum non satis integro sensu illini hic iubet. Desyderatur enim, ex quo liquore, aut unguine illinendus sit. Barbarus ex Lini oleo fieri iussit, cum tamen in scriptore hoc, quod hæcenus legerim, nihil huiusmodi inueniatur. Nos illud monemus, non esse herbarij, & eius qui medicam materiam tantum doceat, usum eius docere. Priuatim enim a medicis instituendus, & tractandus hic est: ideoque non esse certam eius rei disciplinam, sed oportere medicum his uti, & in usu ea addere, quæ utiliora & aptiora fore ille coniecerit.

¶ De Mergi iocinere.

C A P. LLI.

αἰθίας ἵπαρ

Sic Catum Mergi iecur, & ex Hydromelite binis codlearibus positum, secundas expellit.

B A R B A R I C O R O L L.

Mergum Aethyiam Græci uocant. Et poëtæ Dypten. Alioquin nihil aliud est Dyptes uerbum ex uerbo, quod Mergus. Poëtæ Græci etiam Poigas, & Bungas dicunt aues eas. Photion auctor.

¶ De Gallina.

C A P. LII.

ἀλεκτριδὸς ἑ-
νασχιθίσις

Diffectæ Gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur. Sed identidem alias sufficere oportet.

¶ De Gallinaceo cerebello.

C A P. LIII.

ἀλεκτριδὸς ἐ-
κίρατος

Gallinarum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus. Sanguinem a cerebri membrana profluentem sistit. Subdita autem uentriculo Galli membrana, cornu non abfimilis, cuius pellis in decoctionibus detrahi solet, siccatur, tritaque in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius e uetere Gallinaceo, aluum soluit. Abiectis itaque interaneis, falem coniici oportet, & consuto uentre, decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigantur. Totum

id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinū, mercurialeni, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem & strigmenta elicit. Prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi. Eorum uenter sale conditus, & in umbra siccat, cōtra eximias uacuationes medicamentorum trium drachmarum pondere, præsenti est auxilio. Quandoquidem protinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

BARBARI COROLL.

GAllos gallinaceos Alectryonas, & Alecторыs Græci uocāt, quia nos a lecto exuscitēt. Gallinas uero Alecторidas, & Ornithas. Aristophanes Alecторыs qui mares sint, Alecтриenas quæ foeminae. Alecторы nas utrumq; continere, ludens in comœdia non frauit. Inuenias et pro mari bus Alecторыs acceptos, ut inquit Athenæus. Alexarchus Callandi Macedonum Regis frater, is qui Vranopolim condidit, Gallum Gallinaceum Orthoboam uocabat, confectio nominis in quo uel ambitiosissimus fuisse dicitur. Athenæus pullos Gallinaceos a Græcis Hippos, hoc est, quasi equulos uocari scribit: credo, quia pulli proprie sunt equorum. Dicitur & Pullastra. Sed & iubas & capillum Græci Alecторidas appellant. Persæ etiā coruos hoc nomine significat, lure Gallinaceorum perunctos, Pantheræ Leonescq; non attingunt, præcipue si & alium fuerit incoctum. Si Gallinarum membra auro liquecenti misceantur, consumunt illud in se: ita hoc uenenum auri est. Intestina Gallinarum, cum rebus alijs incocta, ueteres Gigeria uocabant. Gallinarum tria genera, Cortalles & Villaticæ, siue quod idem est, Cortalis: de quibus medicinæ hoc loco habentur. Item Rusticulæ mansuetæ, ac feræ non dissimiles, Villaticis aucupio quæsitæ. Varro Africanis similes aspectu, ac facie incontaminata scripsit, a quibus productionem uocabuli Gallinaria insula uocatur, in mari Tusco Ligusticoue, contra Intemilium & Albingaunum. Gallinæ Africanæ sunt grandes, uariæ, gilberniæ, Meleagrides appellatæ a Græcis, ut Varro putat. Columella Numidicas easdem quibusdam esse cum Africanis tradidit. Africanas uero non Meleagrides, sed ipsas similes, nisi quæ rutilam cristam capite gerunt, quorum utrumq; sit in Meleagride cœruleum. Clytus Aristotelis discipulus, Meleagridas Gallinæ describit nostratis magnitudine, paruo capite, ad portionem corporis, & glabro, cristâ carnea, sed rotunda, & prædura, quæ paxilli modo promineat, colore ligni, ab ore ad malas carunculam pro mento esse, sed rubriorem quæ Gallinaceo generi. Etenim mentum uocari carnem, quam Gallinæ in rostro habeant: hoc Meleagrides carere. Rostrum acutius, & maius quæ Gallinæ, ceruix breuior & crassior, atq; nigra. Corpus uariatum, maculis in nigro candidis, frequentibus, per interualla maioribus lenticula, soleæ figura, uel orbiculis ut alæ, serrata specie, digestis in quendam uersum maculis lucentibus. Crura sine calcaribus, cætero similia Gallinacels. Mares a foeminis internosci ægre possunt: tam est in specie germanitas. Pullos suos uelut perose negligunt. Nam Medicæ, a Mediæ, quasi Medicæ generi uillaticæ ascriptæ sunt: propter magnitudinem in Italiam translata: cuiusmodi Patuinæ modo sunt, Puluerarij cognominatæ, a uico, ubi grandissimæ, ac spectabiles maxime nascuntur. Quas Turcarum Rex is, qui Constantinopolim ætate nostra cepit, ut muneris magni loco, a senatu missas habuit. Ad Pugillatum atq; prælia Græci e Boetia Tanagricas, ite Rhodias, ut Athenus & Columella, Maritilisq; apud nos, nec minus Chalcidicas & Melicas probauere. Quidam Alexandrinæ ex Aegyptio. Pausanias Boeticarum duo genera describit, alterum præliare, alterum Cossyphos, quæ si Merulas appellans. Magnas inquit, alit Lydia, sed colore coracino, calcaria & apex Anemonæ floris macula modo rubent. In rostro summo, & in cauda item summa candidæ. Ex omnibus generibus Cortales; foeminae proprie appellantur Gallinæ. Mares Galli seminares, qui Capit hoc nomine uocantur, cum sint castrati. Gallinas Græci quandoq; uocant in comœdia Mylactidas. Quancq; Aristophanes ita appellat bestiolam inter molas nascentem. Adrianas, siue Adriaticas Gallinas, Chrysippus exiguas intelligit, easq; ab Atheniensibus expetitas commemorat. Aristoteles quoq; paruo eas corpore, sed feroces, & quæ pullos plerumq; suos opprimat. Gallinas primi feruntur habuisse Persæ, ut Meleagridas Aetoli, & Pauos, siue quod idem est, Pauones Samos insula: quos Græci quoque Taos, & Taonas bifariam, ut nos appellant. Et Antiphon orator, aues uarias. Attici Taos, circumflectetes & inspirantes ultimæ pronuntiant, ut Athenæo placet.

Pli. li. 37. ca. 10
lib. ii. capit. 7.
lib. 29. cap. 14.

B

C

De Quorum natura. CAP. LIIII.

ὄν & ἀπαλόν

OVum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. Inassatum, sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatis cum meliloto. Cum uua autem fruticis eius quem Rhoa dicunt, & Galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat, Per se etiam offerri solet.

ἀνιδόν τού ὄν

De Candido oui. CAP. LV.

Candidum Oui crudum, refrigerat. Spiramenta cutis obstruit. Inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt. Faciem a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure, fluctiones arcet, auertitque. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle, & uino, mitigat. Vtiliter contra hæmorrhoidum morsus crudum forbetur. Summe tepidum prodest uesticæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabrie, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis reumatismis.

BARBARI COROLL.

D

OVum græci Oon uocant, cognomentis distinguitur: tenerum, siue liquidum, siue ut Cornelius, molle. Apalon Græci uocant: quod recentiores Elixum, & semicoctum interpretantur. Scleron, hoc est, durum, quod ita sit coctum ut indurecat. Sorbilia dicuntur, id est, Ropheta, quæcumque tantum in caluerunt. Quæ uero plus coquuntur, appellant Ephtha. Sunt & quæ Trometa, hoc est Tremula dicantur, optime alentia, etiam si facilius transeunt forbilia. Sed hæc alij aliter cognominant. Et quantum consicio, tenera & tremula sunt eadem, sicut & Sclera, & Ephtha. Habentur & quæ Teganista, a patellis, & sartagine dicantur, succi deterrimi. Mala sunt, & Optethenta, hoc est, tosta cinere. Ideoque ipsæ anteponuntur quæ Græci Exapheta, siue Pnista nominant, hoc est, quæ in aquam calidam mittuntur, immergunturque cum garo, uino, & oleo coquenda lento igni, ac modice coagulanda, ut inquit Paulus. Nam & quoddam obsonandæ carnis genus, Pniston ipsi uocant: quod equidem haud reor multum distare ab eo, quod Anabrafton appellant. Sunt & quæ uulgo dici solent Ootaricha, id est, oua salsa, in ueterataque, abdicandi usus. Nunc oua piscium salita in ossas, aut in pastillos durata, inclusaque membranulis, Oua Taricha dicuntur, inter lautissimos recepta cibos. Præferri uolunt omnibus ex gallina, ut Paulus inquit, ac fere Galenus. Item ex Phasianis, Perdicibus. Pessima dicunt anserina: quantum proprietate illa comedentur, quasi promptum ingenium faciant, si quis crebro utatur cum butyro, & melle. Schista quoque oua, Plinius appellat tota lutea, quæ triduo incubata tolluntur. Causa nominis, ut arbitror, quia diuidantur, & discedat uitellus a candido. Firmitas putaminis tanta est ouo, ut recta, nec ui, nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum inflexa rotunditate. Putamen in aceto maceratorum molli. Candidum ex his, siue ut Columella inquit, albus liquor, siue ut Palladius, albus oui, admixtum calci uiuæ, glutinat uitri fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum ouo non ardeat, ac ne uestis quidem coacta aduratur. Luteum & Vitellus oui dicitur, quem Græci modo Lecythos, modo Chryson uocant. Hippocrates etiam Chloron, Oua quæ non sint recentia, ueteres appellabant regeta. Est et uasculi genus Ouum, ab ouali specie. Sicut & quod Oocyphion Græci uocant. Sed & ipsum coelum a ueteribus Ouum dici solitum, & hominem quoque ceu quandam cœli paruam imaginem comperias.

VERG.

Monebimus legentes, mollis, forbilis, durique oui discrimina in nutriendo solam facere coctura: quantumque Ouom cocturæ accesserit, tantum in nutriendo uinum illi accrescere. Et hoc est quod hic ait, magis quæ forbile nutrire tenerum Ouum: quod nos, excelsio molle uertimus. Rursusque magis quæ tenerum, siue molle, quod igne duratum fuerit. Et ut tota res certius pateat, forbile hic Ouum uocat, quod in coctura concepto tantum calore, uix densari incœperit, & liquidum adhuc caleat, potiusque coctum sit. Tenerum deinde, siue molle, quod ulteriore coctura densatum quidem, non tamen duratum penitus fuerit. Durum postremo, siue igne duratum, quod extrema coctura ad eam duriciem peruenit, ut comanducari & teri dentibus opus sit. In quo ordine primum

illud & sorbile, ab usu & sūmendi ratione sic appellatum, exiguas, aut mediocres in nutriendo vires habet. Secundum mox quod tenerum, siue molle, duri comparatione, a nobis dictū est, ampliore coctura densatum, maiores in nutriendo vires acquirit. Durum postremo, quod nos igne duratum etiam diximus, maximae in nutriendo potestatis est. Et hic in ouorum usu gratus & quasi census nutriendi ab hoc scriptore traditur: cui addiderunt multa & certiora possiores, medicis nostrissima, & a nobis ob eam causam relinquenda.

¶ De Cicadis. CAP. LVII.

Cicadae quae inassarum manduntur, uesciae doloribus prosunt.

BARBARI COROLL.

Cicadę Tettigēs a Gręcis dicunt: quo nomine coci quoq; & absurdi, & imperiti dicebant. Sicut elegantes, & urbani Męsones: a quo facetas & sales, & quę scommata gręci uocant, Męsonia cognominantur. De Męsone Athengus, Chrysippū inquit, existimasse falso, a uerbo gręco deriuari nomen id, manducum & helluonem significante. Cęterū Megarensis homo quidam Męson fuit, comoediarum actor: qui & seruorum, & corum personarum, & eam primus comperit quę Męson appellatur: a quo dicta inquit falsa Męsonica uocari consueuerūt. Cicadę genus quoddam Acanthion, et Acantha uocant: quod mutum interpretantur notinullis quoniam in Acantho urbe Aetolię non canat: ut prouerbij quoq; loco sit, *κύνειος τίςτις*.

EX M. VERG. COMM.

Idem uerbis remedium & Paulus Aegineta docuit.

¶ De Locustis. CAP. LVIII.

Locustae odoris suffitu, urinae difficultates adiuuant, praesertim quae sceminas male habent. Earum carnes nullo sunt usui. Est & quoddam genus Locustae quae Asitracos, aut Onos dicitur, siue pennis, praelongis membris. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptim incolunt.

BARBARI COROLL.

Locustarū, quas Gręci nomināt Acridas, una species Onos appellat, & Apteros a Paulo, quia penīs careat: quā & Bruchon uocari putant, rodentem sata, & Artacō in sacris literis appellatā. Licet in Dioscoride Asitacō, siue Asitracō legamus corrupte, ut arbitror. Nicaner Mastacē appellat, pro Brucho. Aristoteles Attelabon. Clitarchus in Ambracia Locustas omnes Mastacas dici uoluit: ut Molurin, quę frumēta depopulat. Ionia Locustas a numero peniarū Terrā pelyridas nominat. Oetę Cornopas, alij Parnopas, & Pornopas: unde cognomen Herculi, & Apollini quoq; in Aetolia, quia Locustas abigat. Ridēdus uero Strabōis interps apud nos, quiculi cē, nō locustā uertit in Parnote, quę & Millepedę genus unū est: quod uocat Onos. In sacris certe literis sunt, quibus Locustę mandī solite, nō animal insectū, sed herbā hoc nomine significant. In qua sententiā magnus autor Chrysostomus, & prior eo Athanasius fuisse credunt: quasi pro animali acceptę, uescēdo nō essent. Oū tñ in Africa, ut Dioscorides cōmeminit, ad Leptin, cibo etiā frequētī cōmendent: hodie quę uulgo eas comedunt Aegyptij. Plinius & Indorū gentē quādā, & Aethiopū quę partem Locustis tñ uiuere, fumo & sale duratis, in annua alimēta, prōdidit post Diodorū, Strabonēq;: utrobīd Acridophagi nomen habeant. Locustā igit, siue Pedē Locustę, pro herba sumptā interpretantur, quā uulgo Repunculū, siue Napūculū uocamus, folio angusto, desinente in mucronem cauliculis, uertice torulos habentibus, ut in asparago et salictario lupo cernit. Item quę multi lateris. Ex quibus minores alij alterno semper inguine profiliunt. Radicula uel diuitt, lautorūq; mensis petita. Rapisti quēdam sapore, non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniocūdus. Semen ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit, quę grana fabulī. Alij Pedem Locustę pro Blito, aut ualde simili herba capiūt, in Arabicis scriptoribus. Sunt qui uocabulo Acridis, non herbā unam aliquā, sed summa herbarum omnium, quibus uictuarit homo sanctus in solitudine, accipiant. Quod si esset, perperam uerisset Hieronymus Locustas. Alioquin certum est, Locustas Iudeis inter animalia, quae non sunt interdicta cibo, numerari. Dioscorides certe paniculas auenę dependentes, ut in Bromo diximus, Locustas, Plinius Lobas appellauit.

A

vlt. 1716

Pli. li. ii. ca. 1.

vlt. 1716

B

Pli. li. ii. ca. 25.
Aristot. de natura animalium, li. 5, ca. 17.

vlt. 1716

C V T plura sunt in natura gēa, sic etiā pene infinita ueterib. earū nomina fuerūt. Nihilq; mō difficilior, q̄ attelabos, parnopas, mastacas, molurides, tetrapelyridas, cornopas, & alia in gr̄cis earū nomina digito signari, & dicier, hæc sunt: generatim excepta Afraco, quā et Asellū di cūt. Ob eā, ut nos credimus, causā, Dio. de Locustis egit. Nec priuatim strāgurijs, i. uessicæ stil licidio, sed *διουρίαις* i. urīnē angustijs mederi ait. Quo magis Barbarum demiror: q̄ ad dele ctationem certas gr̄corum & latinorum in morbis & remedijs uoces tantopere uariauerit.

Phinio

V Enter eius auis quam latini Ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 30. ca. 7.

O ssifragus, siue Phinis, & ut Aristot. appellat Phine, alienos fortis cū suis alit: q̄s Aqlenu triēdi tedio eiecerint. Quidā nō gen̄rare Ossifragū scripserē, ut Aristot. Phinius ex Haliēto na- sci Ossifragos, ex Ossifragis Vultures minores, & ex minoribus maiores, q̄ omnino nō gene- rēt. Differt Ossifragus, ab Ossifraga, etiā si cōfundat aliq; q̄ Ossifraga septimū est Aqlē genus, quē Barbara dicit, & Sanqualis. Ossifragus uero qualē indicauit, laudatus ad coli uitia, qm̄ inte stinū unū habeat, mirabili natura, oīa deuorata cōficiendi. Nescio quāobrē Ambrosius Fulicā accipiat, quā Gr̄ci Phiuin uocant: cum sit apud Maronem Fulica, ut quibsdā placeat Hero- dius, ex Arato, quē Poeta noster ea parte uidet imitatus, ubi prognostica tēpestati carmini suo inseruit. Idē Ambrosius Herodiū Gr̄co nomine appellat. Seruius Herodios accepit, quas nos Diomedēas aues uocamus. Pausanias Herodiorū genus maximū, & pulcherrimum, & augu- rijs quoq; proditiū uocari tradit Ocnon. Theodorus Fulicam, quā ab Aristotele Cephpos, si- ue Cemphos dicitur, intelligit. Ossifragus parum ualeat oculis, nubecula etiamnum suffusis.

E X M. V E R G. C O M M.

D

A Vis postremi inē Aqlas generis Ossifragus est. Nominis manifesta oībus cā. Longissime in Aqlarū cēsu Aristoteles & Plin. de eo egerunt, & qd̄ facile uolētibus inuenisse sit: nihil non ab illis dictū, a Barbaro in Corollario suo repetitū est. Nō parua laboris, & p̄c̄j mercede que- renda auis hęc erit, si qd̄ de ea ferē, uessicæ calculos per urīnā pellit. Sed q̄ uerū id sit, nō est te- status Diosc. *ισοριταί* qd̄ est, tradit, & ferri id dicēs, sapientē qd̄ & caute, in aliorum fidem & sa- nam reijciens, quā testari ipse non posset. Cuius morē & exemplū nos etiā secuti, nihil ultra ci traue mensurā & significationem uocū eius tradidimus: legentesq; in eo *ισοριταί*, quod est nar ratur & fertur, ferri & nos uertimus: ne si p̄cipi, ut Barbarus fecit, dixissemus, ueterum p̄- cepto confirmari & probari crederetur, quod hic non suā, sed aliorū fide credi tantū uoluerit.

De Galerita. C A P. LIX.

καρυδαλλός

Galerita auicula est parua, apicem in uertice pauonis modo ge- stans, quæ assa & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

B A R B.
Pli. li. 10. ca. 49

Galeritā, siue qd̄ idē est gallica uoce, Alaudā, Gr̄ci Corydon, & Corydalon, & Scordalō gappellant. Itē Corydalida. Oēs a Galero, siue Galea. Nā & Epitymbiditō Theocritus, ga ceu rymbō, hoc est, sepulchrū patris in capite gerat. Cuzulā gr̄cū uulgus nominat. Nota est apud Aristophanem comicū poetā fabula, primā uolucrū fuisse Galeritā: priorē q̄q; terra de- functū ei patrē, cū humari non posset, nōdū enata humo cōditum in uertice. Corydalis est & herba Capnōs appellata: qm̄ & ipsa doloribus coli medeatur, ut auis ipsa. Galeritā nemo fere ignorat, autem pusillā, & plerumq; obiter nobis obuiam, ingenio ad cantus docili, Passercu- lis, ut inquit Galenus, qui Pyrgitæ ac Troglytæ nominant, in oppidorū muris, ac turribus fre- quentes adfimilem, extra q̄ galero, quo illæ carent. Nam Corydylis, saltementarius piscis est, quem nos Cordyllam uocamus, Gr̄ci etiam Cordylida, & Dorylum. At Cordila tumores in capite significat: & Mitellam quoq; Cyprijs: eam quam Perse Cidarin, Athenienses Crobylon appellant. Porro similis est Alaudæ, Zerraneola uocata: nisi q̄ apice in terra nidificans: unde nomen. Differt ab Alauda & Parcus, etiam si qui negant. Est autem Parcus auicula Palumbo minor, aliquanto subtus candida, cætero Pauoni similis, & crista quoq;.

E X M. V E R G. C O M M.

V Arant in Alaudæ remedijs latini scriptores, & gr̄ci, Paulus Aegineta simpliciter elixam

(dico autem simpliciter, in aqua tantum) sumi diu iubet; hic assam præcipit. Plinius non assam tantum sumi, sed cinerem eius etiam in aqua bibi. Adhucque, quod suæ ætatis testimonio & experientia confirmat, idem homini præstare cor eius femini adalligatum, & recens, tepensque ad huc deuoratum; pluraque alia quæ lib. 30. cap. 3. uolentes nouisse in eo poterunt.

De Hirundinibus. CAP. LX.

DISSECTIS crescente luna pullis Hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendentes: e quibus duos, unum uersicolore, alterum purum eximes, si priusquam terram attigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle, lacerto, aut collo adalligati, comitialibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti Ficedulæ in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum quæ matrum cinis, cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. Anginæ eo commode perunguntur. Vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflitantur.

BARBARI COROLL.

Hirundines, græce Chelidones, lapillum dicuntur pullò excluso dare. Tria earum græcia, ut Banarum, syluestrium: quæ nidorum figura deprehenduntur. Ripariarum: quæ ita uocantur, quoniam in riparum cauis nidificant. Fit hoc capite Ficedularum quoque mentio, Græci eas modo Sicalidas, modo Ampelidas, modo Ampelionas uocant; autor Pollux, ut ceteros præteream.

EX M. VERG. COMM.

Chelidonio ab Hirundinibus, quas græci Chelidonas dicunt, Plinius lapillos eos appellat, qui in earum uentriculis inueniri feruntur, fabulososque existimat, & magicis artibus in medicinam illatos. Quod magis credendum in eo facit Paulus Aegineta, qui sexto sui operis libro de Simplicibus his agens, crematari Hirundinū cinere tamen in medicina utitur, anginisque & ad oculorum claritatem ex melle iungi præcipit. Recepit tamen antiquitas omnis quæ de eis in scriptore hoc leguntur: eamque ob causam qualia in græcis, latinisque omnibus adhuc leguntur, talia a nobis etiam reddita fuerunt; cætera omnibus eadem sunt.

De Ebone. CAP. LXI.

Eboris scobe illito paronychia sanant. Vi adstringendi ebur obtinet.

BARBARI COROLL.

Ebur a Græcis appellatur Elephas, eodem quo animal ipsum nomine. Quanquam animal Elephantus quoque dicitur. Ebur uero alij cornu, alij dentem Elephantum nuncupant. Est uasis potioris genus Elephas.

Quæ nos Eboris ramenta diximus, Plinius Scobem appellauit eadem significatione: et si ramentorum amplior quæ Scobis ambitus sit. Rameta enim ueteres latini dixerunt omnia quæ radendo, secando, incidendo ex materia aliqua, quasi inutiles reliquæ supersunt. Scobem uero priuatim, quæ lima, aut ferra detrita cadunt. Estque Rametorum uox cunctis his cõis, et quasi generis appellatio; illa autem unius, aut alterius rei tamen nota et significatio. Dioscoridus dixit scobina, detritum ex Ebone puluerem indicans. Quam rationem secutus Plinius ait, Scobe paronychia tollunt. Nos cõiorum & ampliorum rationem secuti, Rameta diximus; quæ cum ferramento detritum ex Ebone puluerem significant res; fecimusque id autoribus alijs græcorum medicis. Paulus Aegineta non ex dentibus tamen Elephantinis, quod solum Ebure est, sed ex unguibus, aliorumque ossium ramentis remedium hoc conficit.

De Suillo talo. CAP. LXII.

Vis talus comburitur, dum e nigro albescat: qui tritus & potus, inflammationibus coli, longisque torminibus medetur.

BARBARI COROLL.

Alus Astragalos Græce dicitur in sue: cuius uicem in homine, Malleolus appellatus implet.

EX M. VERG. COMM.

Non omni malo coli mederi cinerem suilli Tali hic scriptor ait, sed ex tribus eius generi-

Cbus illi rārum, quod cessante, nec transeunte crasso, & qualis peditu effari solet spiritu, in eo in testino fit. Habet enim plures id malum causas. Fitq; aliquando, cum inter eius membranulas crassius, pituitosusq; humor subsederit. Nonnunq; cessante, nec transeunte illi hac spiritu: quale pauloante descripsimus. Sepe ex eiusdem intestini inflammatione, aut ob acres erodentesq; humores dolorem acrimonia erosioneq; sua excitantes. Ex his secundum illud genus *ὑπενερμα- τώσις*, idest, inflationis uoce indicasse uidetur.

De Ceruino cornu. CAP. LXIII.

ἀλάφης κέρα

Ceruini cornu cinis elotus, binis cochlearibus epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliaci, regio morbo, & uerifica doloribus cum tragacantha. Fœminis fluxione uulvæ laborantibus, cū liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cōtustum, crudo fistili luto circūlito, & in furnū indito uritur, donec albescat. Id cadmię mō elotū, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est. Infrictū dentes expurgat. Crudi cornu suffitū nidore serpentes fugantur. Feruefactū in aceto, si eo gingivæ colluant, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

BARBARI COROLL.

Ceruum Græci Elaphon appellant, ut prædiximus, & Bredon poetæ. Alij caput ipsū Cerui Bredon uocant. Inulum, siue Inuleum eius, Nebron, et Cemada. Quancq; Cemas nondū pgregit in pascua. Damā uero Græci Proca dicunt. Aristoteles, et idonei fere oēs, et Dionysius a Ceruo non distinguit. Philetas, primogenios Ceruos Procas dici uoluit. Ab hoc animali Proconelos appellata est. Nam Ophion, quod Sardinia quondam ferebat, & interisse credit, Ceruus non erat, sed animal pillo, ac dente simili, Ceruo minus. Genus uero Ceruorum prægrande, Græci Echæineas, ab oppido uocāt. Aristoteles Achænas cognominat. Inulū, Varro & ex equo & asina uocari scribit: quos & Bardones aliqui appellant, sicut ex asino, et equa Mulum: quancq; uetusſi codices, tum Varonis, tum Columellæ Innum habent, non Inulū, q; ab equo patre nomen traxerit. Sed & Aristoteles quoq; Innū græce dicit, q; ex mulo & equa nascit, ceu paruus mulus. Proinde Nonius marcellus, Hinnas inquit, & Hinnos, sub quo nomine accipere debeamus Varro signat. Ait em̄, ex equis & mulis q; nascant, Hinnos uocari. Ut errauerit, q; distinctionis studio cōfinxit, Hinnulos ceruini generis esse pullos, eqnī uerō Inulos uocari. Quin si mutare oportet, uerius fit Inulos p simplex, n, & sine statu ceruinos pullos accipi: Hinnos aut & Hinnulos per duplex, n, & cū aspiratione, ex asina conceptos equi coitu, sed utiq; si sint marres, ut Plinius adiecit: q; q; Nonius marcellus alit, ut pmonui. Porro Inis, etiā infantē & paruū lū Græcis significat. At Ginni per, g, ab Aristot. appellant eq; pumili, nō alia rōne q; maris & uteri uitio, Gygenios a Strabone dictos arbitror, in Liguria montanis, ubi & Mulorum genus uocat hoc nomine. Non placet quorundam distinctio inter Dorcem, & Dorcadem: quasi Dorcas ceruinus pullus sit, Dorx animal diuersum, cum Dorcas Aristoteli non Ceruum, sed Capream significet. Certe Dioscorides in coaguli mentione, Dorcadem a Dorco separauit. An, ut eo distet Dorcus a Dorcade, quo Ceruus ab Inuleo, & in Strabone Zorces, pro eo quod sunt Dorces. Nisi uſitum sit in exemplari legas. Ipsum cornu Cerus uocant: quod & poculigene nomen est, nam cornibus ueteres bibisse, Pindarus, Sophocles, Homeruscq; testantur: si modo ut fere persuasum est, Rhyton, in Poeta eminentissimo idem sit quod Cornu.

EX M. VERG. COMM.

Non placet quod in extremo capite dictum a nobis, & ab alijs, est, collui ceruini Cornu de cocto utiliter molarium dentitione factos dolores. Cur enim molarium magis quam primorum, & caninorum: Omnium enim eadem ex inflammatione doloris causa, et ratio est. Nec sic canibus, qualis hic cinis est, sed natiuo unguine mollientibus remedijs, ad adiuuandas in pueris dentitiones, ut antiquiores præceperunt: qualia sunt gallinaceorum adeps, & leporis cerebrum: ac in dentibus *γυμφίους* molares tantum græci appellant. Faremur id quidem: & ab his *γυμφίους* facta uox nihil nisi molarium dentitionem significare potest, concedimus id etiam, sed hac conditione, dum certius aliquid & ad hanc rem aptius inueniatur. Inclinat enim animus, nobis significari ea uoce aliud in cunctis dentibus malum, Nec leuibus argumentis ob-

orta nobis hæc suspitio est, non ob eas quas paulo ante diximus causas, sed quoniam Galenus usum ceruini Cornu esse ait ad restringendâ gingiuam, & confirmandos dentes. Quod & Paulus Aegineta etiâ, cum de omni Cornu lib. 6. agit, his uerbis testatur est. *τὸ δὲ τῶν ἰσθμῶν καὶ μετὰ διὰ τοῦ μύλου, ἵνα περιπλάσσοντο ἐν τῷ στόματι ἵσθμῶν τοῦ σπινθίου.* Quod est, Cerui autem cornu tritum, uinoq; maceratū, mox circumlitū mobiles sistit dentes. Et paulo ante, *ὅσα πλάσσει*, id est, humen-tes & diffusentes ginguias compescere idem Cornu dixerat. Plinius etiâ lib. 18. ca. 10. den-tes mobiles confirmare ceruini Cornu cinerem testatur: doloresq; eorū mitigare, siue infricen-tur, siue colluantur. Addiditq; statim, arbitrari quosdam ad omnes eisdem usus efficaciorum crudi cornu farinâ esse, & densificia utroq; modo fieri. Quæ omnia eodum pertinent, ut den-tibus, non dentitionibus mederi ceruinum Cornu uideatur.

¶ De Eruca.

CAP. LXIII.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum olco peruncti, a uenenas-
tis bestiis feriri negantur.

καμπη

B. A. R. B. A. R. I. C. O. R. O. L. L.

ERUCA, pro animali acceptæ, a Græcis Campæ nominantur. Hippocrates in herba tithy-malo nascens, aculeatas esse prodit, utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus illud be-sitiæ, quam Liber pater in Libya fuisse dicitur, ad Zambiram oppidum, tumulo in monu-mentum eius facti condito. Vt Diodorus meminit.

Plin. lib. 19. ca
pit. 6. lib. 11. ca
pi. 25.

E. X. M. V. E. R. G. C. O. M. M.

Hortorum, satorumq; omniū pestis calamitasq; Erucæ sunt, dirū animal, lento & hūmido tempore, auctoribus Theophrasto, & alijs nascens: multiplex hoc malū, & quod in uitis & arboribus natū, frondem oēm & florem erodat, turpiq; facie depastam arborē relinquit. Nihil in carmine suo, & ultimo duodecimi libri capite Columella pro horti, annona diligentius cura uit. Si cætera defecerint naturæ & artis auxilia, ad superstitionē translata re, in qua non ueritus est, auctore Democrito, docere quæ saluo pudore dici & audiri non possunt, sed ut ille testatur, tam pſenti contra hoc malū remedio, & ope, ut non aliter q̃ cum decussa pluit arbore nimbus, Vel teretis malū, uel testæ cortice glandis, Voluit ad terrā distorto corpore campe. Qualia autē ea sunt, poterunt uiolentes ab eo audire. Nobis em̃ in scriptore hoc aliud consiliū est, nec in Erucis eius aliud qd moneamus habemus, q̃ ideo in oleribus nascentes Erucas eum appellasse, ut a picearū, aliarumq; arborū Erucis, quæ ueneni maleficium habent, separaret. Nostra ætas & gens torum hoc genus quacūq; forma sit, & ubicūq; nascatur, una appellatione Brucos no-minat: cum tamen Locustarum genus quoddam priuatiū Brucum Græci appellent.

¶ De Cantharidibus.

CAP. LXV.

FRVM ENIS congestæ Cantharides, ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili uase, non picato conduntur, & raro linteo ob-ligato ore, & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis q̃ acerrimi halitum, donec aestu examinentur. Postea lino transfixæ repo-nuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luthis lineis, quas in pennis trans-uerfas habent, promissoq; corpore, crassæ, ac blattarum modo præpin-gues. Sed inertes ac imbecilles, quæ unitis sunt coloris.

καntharides

B. A. R. B. A. R. I. C. O. R. O. L. L.

Nomine Cantharidū e nostris aliqui etiâ Scarabeos, maxime pilularios accipiunt: quī & Canthari dicantur. Et ab Hippocrate Copriones. Plinius, est inquit & Cantharis dictus Scar-beus paruus, fruteta erodens. Porro Cantharus & nauigij, & pocilli nomen est, & ornamentū quoq; muliebris, ut Athenæo placet. Ipsarum Cantharidum uenenū, in qua parte sit, non con-uenit Alij in pedibus, & capite existimant esse. Alij negant. Inter omnes constat pennas earum auxiliari, in quacūq; parte sit uenenum. Ipsæ nascuntur ex uermiculo in spongia maxime ty-norhodi, quæ sit in caule, sed fecundissime in fraxino. Cæteræq; in alba rosâ, minus efficaces. Improbantur duo earum genera. Minutæ, latæ, pilosæ. Item macræ, unicolores.

Pli. li. ii. ca. 28.

E. X. M. V. E. R. G. C. O. M. M.

Multa sunt, quæ Scarabeis congeneres Cantharidas faciunt: sed nihil æque cognationem eorum ostendit, q̃ uaginis clausæ utriusq; animalis pennæ. Ob quam similitudinē, diminu-

Cta a Scarabeo, quem Cantharon Græci nominant appellatione, Cantharida illi simile, sed minore corporis mole animal hoc dixerunt, pueris etiam notissimum: sed quod præsentī, & infamabili ueneno hominē perimat: quemadmodū inter uenena hic ipse in extremo opere docebit. Habent ueneri par maleficiū Buprestides, & picearū Erucæ. Hæ cæteris Erucis similes, & congeneres, discrimen ab arbore in qua nascunt homine ipso ostendūt, Pytiocapæ a Græcis dicæ: Illæ boū acerbæ pestis, in eadē gente a maleficiō suo nome inuenerūt. Descriptit Buprestim Plinius lib. 10. cap. 1. his uerbis. Rarū in Italia animal Buprestis est, longipedi Scarabeo simillimū. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomen inuenit: deuoratūq; , tacto felle ita inflammat, ut rumpat. Nouerunt nunc etiā rura hoc malum. Vidimusq; nos, peremptum aliquādo eo ueneno bouem. Non satis tamen ostendunt rustici eius animalis formam, diuersisq; appellationibus, diuersis locis, & diuersa forma describitur & appellatur. Copiosius inter uenena de his omnibus iterum agētur. Nunc satis sit nominū causam & rationem reddidisse.

¶ De Bupreste.

C A P. LXVI.

Βουπρέστις

Simili modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidū, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Quæ de causâ ammiscentur medicamentis quæ lepras, feroscq; lichenas, & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxilium prædiderunt. Argumētō, q̄ urinā moueant. Alij pennas, pedesq; contra potarum ueneficiā, remedio esse tradiderunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 10. ca. 4.

Pityocampæ a nostris Erucæ picearum, aut pinorum uocantur. Buprestis & animal, & herba est. Ex his Erucis u. r. miculi postea nascuntur, qui acceptis alis euolant: quemadmodum & in ficu, & cynorhodo, siue canina sentice.

D

σαλαμάνδα

¶ De Salamandra.

C A P. LXVII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est, ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur ut Cantaris in medicamenta, quorum uis est exesse, & lepras abolere. Similicq; modo reconditur. Liquefacta in oleo, pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruatur ad eundē usum.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 10. ca. 67.

Salamandra animal lacerti figura, stellatū, nunq; nisi magnis imbribus proueniens, & secuta serenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactū extinguat non alio modo, q̄ glacies. Quod quidā tamen negant. Aetius per ignem inquit, cadentibus flāmis ambulat, eumq; non solum frigoris ui, sed etiā pondere corrumpit, quasi obruens. Theophrastus & frigori & humori tribuit, qui ex ipsa lentus profluat. Si diutius tamen in igni mansit, comburitur. Cassiodorus, Salamandra subtile, & paruū inquit est animal, lumbricis associum, flauo colore uestitum. Salua eius, quæ lactea ore uomitur, quacuncq; parte corporis humani contacta, uel pede imo respersa, toti decidit pili, & colorem in uiriliginē mutat. Si arbori irroperit, omnia poma inficit ueneno. Ita populos sæpe totos necando frigida ui, nihil aconito distans. Quinimo, si contacto ab ealigno, uel pede crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum cadat. Manditur tamē a suisbus innocenter. Similis Ascalabotæ Salamandra est Aetio. Lacerta ueneraria, hoc est, Pharmacitide uelocior. Ascalabotem Græci, & Colloton, & Galeorē quandoq; appellant. Nostri Stellionē. Horum transmarini pleni lentigine, stridoris acerbī, qui & uescuntur, intantū scorpionibus aduersi, ut uisis protinus torpore afferāt frigidi sudoris. Tales in Italia non sunt. Viuit enim rose, ut chamaeleontes, prætereā & araneis. Qui autē Stelliones appellantur, ut Marcellinus inquit, in nouis domibus cernunt, forte n̄ quos Romanū uulgus Taranulas uocat, albas, innocuas, & pusillis lacertis similes. Sunt & Apulorum Tarantulæ in agris.

Phalangiorū fortasse generis, ueneni præsentanei, cōmoto statim eius mente, quæ percusserint. Auxiliari cantu eis, & omnino musica ratione, cōsuetudo regionis est. A Stellione fraudulenti-
 ssimo animali, stellionatus crimen, & stellatura, Spartianus in Pefennij Nigri uita, quos inq̃
 conspiterit accepisse stellaturā. Et alibi, Tribunos, qui stellaturas inquit militibus tulissent, capi
 tali pœna affectos. Inuidentiſsimū hoc animal intelligit, quoniā senectutis suæ membrā de-
 uoret, gnarum propter Comitales morbos impeti eam. Hinc stellare uerbū, pro inuidere. Cu-
 billa stellionis, in locis ostiorum, fenestrarūq̃ sunt, aut cameris, sepulchrisue.

EX M. VERG. COM.

Sunt nobis & alijs de Salamandra eadem fere omnia. Quod inter nos non cōuenit, unum
 tñ & illic est ubi legitur, φίλοι δὲ τρίχας ταῖς αὐτῶν μετ' ἑλπίου. Quā lectionem illi secuti, liquefactam
 in oleo Salamandrā depilare dixerunt. Nec male: id enim participiū illud plæruncq̃ significat.
 Nos autem non liquefactā, sed crematæ cinerem facere id diximus: in antiquissimis, q̃s idemq̃
 probatissimæ fidei græcorū codicibus, non ταῖς αὐτῶν, sed καὶ αὐτῶν, quod est, cremata legentes. Con-
 firmavitq̃ nobis eam lectionem Paulus Aegineta, qui crematæ Salamandræ cinere tñ ad hos
 usus uisitur. Verba eius hæc sunt. σαλαμάνδρας δὲ καυθίσας πῶς τέρας ἔνιοι μίστευσιν, &c. quod est,
 crematæ autem Salamandræ cinerem aliqui miscent.

De Araneo.

C R P. LXVIII.

Araneus, quem Holcum, alij Lycium uocant, subactus cum sple-
 nio, & linteo illitus, prolatusq̃ utriusq̃ temporibus, aut fronti,
 tertianos circūitus perſanat. Tela eius imposita sanguinem sistit. Vulne-
 ra quæ summā cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria uindictat.
 Est & alterum Aranei genus, qui candidam, tenuē, densamq̃ telam ordi-
 tur, quem in loco ligatum, & lacerto appensum, quartanis circūitibus
 mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus au-
 xiliatur.

ἀράχνη ἄλκων
 λυκων

BARBARI COROLL.

Aranæ Græci Arachnen uocāt, Araneorū, Phalangiorūue multa gñā. Innoxii sup̃ nomi-
 nē post dicendū. Noxiorū duæ species ab Aristotele tradunt. Vnī corpus exigū, uarium, acu-
 minatum, assultum ingreditens: ob id Pulex uocatus. Alteri maius & nigricans, prioribus cruri-
 bus longissimis: tardū hoc & imbelles, nec saliens, æque Phalangii. Præter hæc a Plinio uocat
 genus Aranei lanuginosum, grandissimo capite, quo dissecto, inueniant intus uermiculi duo,
 qui adalligati, ceruina pelle ante solis ortū, dicunt mulieribus p̃stare nē cōcipiāt. Vimq̃ illā du-
 rare anno, unde Atocion q̃q̃ dicit. Est & Rhagion uocatus, q̃ acino uuæ nigro similis est, ore
 mīmo, sub aluū pedibus curtissimis, & tanq̃ inchoatis. Dolor a morſu eius, qualis a scorpione.
 Vrina textis Aranei p̃similis. Quintū genus Astorcion, uel Astertion, ex manu scriptis codici-
 bus, aut Astorgion, q̃si discordiale & inamabile significent. Sed in picto Diosco. ἀστέριον, i. as-
 teriū, uirgulis albis, a proximo distinguit, cuius ictu genua labefactantur. Sextū ceruleus, utroq̃
 perniciosior, lanuginē nigra, caliginē morſu concitans, & uomitus araneosus. Septimū a cra-
 brone penna tantū differens, deterius etiamnum ceruleo: propterea made quoq̃ conficit a se
 percussos. Octauū Myrmecton, quia formicæ similis, sed multo maior, ruffo capite, aluo & re-
 liqua parte corporis nigra, guttis resperſus albis interſtinguentibus, acerbiorē q̃ uestiparū do-
 lore torquens. Viuit maxime circa fumos, & molas. Fuliginosum describitur Aetio, stellatū,
 præsertimq̃ dorſo. Nonū Tetragnathus, sed duobus fastigijs. Alterius mediū caput, linea cari-
 dida & transuersum. Itē altera distinguit, qui & peior, tumorēq̃ oris molitur. Alter cinereus, p̃
 steriōri parte candidus interior. Aetius Tetragnathon modice lato, & subalbo corpore descri-
 bit, pedibus asperis, duabus incisuris in capite, recta una, per obliquū altera, ut quaternas buc-
 cas habere uideat: unde nomen. In Aethiopia tam frequētes, ut regionē in ea quandā prope Sil-
 los, Acridophagosq̃ deferi cōgerint. Idem auctor & Cranocolap̃tē, & Scolition, & Scleroce-
 phalon enumerat. Ut primū genus longis cruribus, subuirdē, aculeo circa ceruicē infesto pro-
 dat: ita dictū, quia caput maxime percutat. Secundū squaler maculis, præsertim capite, longis
 pedibus. Tertiū caput duricia silicium. Lineamēta toto corpore similia bestiolis, quæ lucernas
 circūuolant. Hæc fortasse uel eadē sunt, uel parū diuersa plinianis, Præcipue uero Cranocola-

Pli. li. ii. ca. 24.

Cptes idem genus uidet illud esse, qđ nos Sextū haberi diximus, ceruleū, & caliginē morſu concitans, caputq; tentās. Habet & cinerei genus quoddā minime noxiū, telas muſcis in parietibus latiffime pandentis: qui & Muſcarius uocat, inter lupos, ut arbitror locandus. Comperio & Araneum candidū, longiſſimis, tenuiſſimiſq; pedibus. Item aliud genus craſſiſſimū, textū condentis in contignationibus: quorū uterq; in dictas, aut dicendas forte ſpecies recidit. Eſt & diſcrimen Araneorū, quos Ariſtoteles appellauit Lupos: quorū minimi non texant, maiores in terra cauernarū uilia, & exigua ueſtibus præpandant. Mediū genus lautiores, craſſioresq; telas orditur uel operoſiſſime, ob id Erudiſſimū ab eodem Ariſtotele uocatū, cuius duas quoq; ſpecies reddit. Maiorem ſubtus pedere, degrauatū mole corporis. Minorem, in ſublime equebuſdam telæ ſuæ latebris obſeruantem excubare. Græci qui de uenenatis iſtibus ſcripſere, Lupum uenari muſcas demonſtrāt rotundū, cælata, ſculptaq; ceruicula, tribus in ore, quod elatiusculum eſt, lineamentis. Aranei Lacertarum catulos irrediunt, utraq; labia mordicus apprehenſa, telas ſuas altius tollendo. Incrementa anniū futura præſagiunt. Sereno non texunt, ſed nubilo. Fœminā textrix, marem uenationi operā dare arbitrantur, idq; ſole oriente, occidenteſq; beſtiolis tum maxime infeſtis. Aranei clunibus in uenere conueniūt. Vermiculus ſimiles ouis pariunt, in telas expanſos: quia ſaliendo excludūt: Phalangio excepto, qui ſpecu in ipſo cubat, magno numero, triginta ſere: ſed ubi emerſit, matrem conſumit ſepius, & patrem. Incubant triduo. Cæteris generibus oua pauciora. Conſumant Aranei, quater ſeptenis diebus. Simul porro editi ſunt, ſila ſua mittūt, ſiue de ſuo qđ foris habent, ceu uellere cortices, ut Ariſtoteles uiſum eſt: ſiue ut Democrito, excrementi cuiuſdā modo, uelut corrupta intus alui natura, ſtatuo tempore: ſiue ut aliij dicere, quia intus ſit quedā lanigera fœcunditas, Ouidius. Cætera ſunt uentus, de quo tamen illa remittit

Stamen, & antiquas exercet Aranea telas.

Non habet Creta inſula maleſcūt animal, præter Phalangitū, alioquin Italiæ ignotū. Hoc cerui percuſſi, caneros edendo ſibi medent. Nominat & Mus araneus: de quo priuatim agendū nobis eſt. Araneorū telæ, priuatim Veſcæ, hoc eſt, ſiccæ, ac tenere uocari ſolent. Ipſum anial Araneus uocat, græce Arachnes. Tela uero Aranea, ut græce Arachne. Qz q̄ interim & pro aniali potēte capiūt Araneus Phalangia uero, & quod idem eſt Ariſtotele, Phalangas, & Phalangios arbitror eſſe dictos: & Phalanx internodiū ſignificat, qualis pars ea digiti, q̄ rigida manet, nec flexitū, ut Ariſtotele placet. Omnibus em̄ Phalangis internodia terna in cruribus. Ob id & fuſtes nodis rigentes, ut Plinius teſtat, Phalangas uocabāt. Vnde baiulos Viſtruius, quia Phalangis uti ſolent, Phalangarios appellat. In Albania Phalangitū haberi traditur Straboni, Helianoq; a quo ſiqui feriuntur, aut ridendo, aut ſlendo moriant de ſyderio ſuorū.

E X M. V E R G. C O M M.

Longa eſt Plinio, Nicandro, Ariſtoteleq; animalis huius hiſtoria: ſecitq; id multiplex eius genus, diuerſiq; in tam exiguo corpore ad uitam & mortem hominū euentus, & quæ artiſcioſe modo exercent, modo inſidioſe ubiq; animalia hæc agunt. Prima & maxima omniū, id eſt, noxios, & innoxios, diuiſio eſt: hos Græci ἀρᾶντες, nos Araneos, illos ambo Phalangia diximus. Rurſus Phalangiorū plura ſunt genera, priuatim ab antiquioribus latinis & græcis ſuis nominibus appellata. Araneorū itidem, ſed pauciora: quæ Dioſcorides hoc capite numerat. Qui primū Arachnes nomine uſus indicauit, non de omni Araneo, ſed de innoxio tantū agere, qui in parietibus & trabibus telas ſuas ad aliorum inſectorū uenationem ſuſpendit. Non ſi mus omnibus hic eſt, in uetuiſtis & rimosis parietibus habitās. Hunc Holcon, & Lycon, id eſt, lupum uocari hic ait: facta, ut nos credimus, a uenatione & inſidijs eius appellatione: & quoniam muſcas rapiat, trahat, & enecet, ideo lupum, & Holcon a trahendo dictum fuiſſe. Lupos Ariſtoteles totum hoc genus etiam appellauit.

¶ De Lacerta.

C A P. LXIX.

σαύρα & λαλῶ

Lacertæ caput intritū, & appoſitum, aculeos & omnia corpori inſiſſa extrahit. Varos, formicantes uerrucas, & penſiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Iecur exſiſ dentibus coniectum dolores finit. Si diuulſa admoueat, iſtis a ſcorpione leuamentum præſtat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 5. ca. 39.

Lacertam Græci Saurā. Huius una ſpecies Chalcidice uocatur, atq; Seps ſeorum reddenda, Lacertum, & Lacertam idem genus eſſe conſpicio, ut eſt apud Græcos quoq; Sauros, atq;

Saura. Est & piscis hoc nomine. Lacerta uidetur & uasis genus esse apud Iuris peritos. Sicut & apud Græcos Saura, cuius in palma meminit Hippocrates. Est & Herbar nomen Saura, Pluroni sacra, ut Nicander poeta docuit illo uersu, *σαυρα*
ἡχθαιον πλαται σφοδ ἡχθαιον.

Fortasseq; in eo uerbo aut Anagallidem intelligit: quippe quam Dioscorides Saurium a nonnullis dici prodat: & prophete Nycterin, quasi nocturno & subterraneo dicatam nuntiat: aut ipsum Sinapi, quod, ut Plinio placet, ab Atheniensibus Saurion uocatur: aut Nasturtium, quod ab Hippocrate Sauridion quoq; dicitur. Lacertarum pedes Græci Blasos uocant, hoc est, quorum pars extorsum, pars introrsum spectet.

E X M. V E R G. C O M M.
V Troq; genere Lacertū, & Lacertā idem hoc animal antiquiores Latini dixerūt, tam certū, tanq; ubiq; nascens, ut nihil dicendū aliud de eo sit. Nec fuisset nobis in cōmentatione eius alius labor, nisi quod fere in cunctis legit, pellere, siue malueris dicere, tollere imposuit Lacertæ caput *ἰσχυρόν*, id est, uaros: nō sic, sed *ἰσχυρ*, id est, clauos legi oportere: quod nos antiquissimorū codicum fide instaurauius: persuasitq; id audere Paulus Aegineta, qui clauos hōc re mediō curat: & pręter hęc res ipsa etiā, & cōgeneres morbi uerrucæ & formicæ, quibus rectius clauis, q̃ uari coniugebant. Quinetiā uerbum *ἰσχυρ*, quo hic usus est, & tollere significat, clauis aptius q̃ uaris competit, qui extenuantur leuiganturq; potius q̃ tolluntur.

¶ De Sepe. CAP. LXX.
Seps, quam aliqui Lacertam calchidicam uocarunt, in uino pota, *εὐφ.*
 morsus suos sanat.

B A R B A R I C O R O L L.
Seps, nunc Lacerti genus est, nunc ut diximus Millepedæ. Cum Lacertam significari uolumus, Chalcidicæ cognomen utimur. Sed an idem sit cum ea, quam Aristoteles Chalcida, & Zygna nūcupat, Theodorus more suo Dignydum conuertit, lacerto paruo similem, aestimabunt legentes. Ipse in diuersam partem moueōr Plinij uerbis, qui quodam loco ait, Peticulariter inquit, a Chalcide Cerafæ differt. Est & tuberculi maioris ac pestilentis nomen Seps apud Hippocratem, ab erodendo positum, Aetius, Seps inquit, serpens est cubitorum binum, crassitudine in exilitatem, ut alia quoq; genera serpentium, descendente: ingressu tardo, rectoq; lato capite, ore acuto, maculis corpore toto candidis: triduo, uel quadriduo interficit. Pausanias quoq; Aegyptum inquit, Arcadiæ quondam Regem in uenatione occupatum, & imprudentem Seps oppressit. Vipera similis est inquit, minime, cineris colore, maculis ex intervallo uariis, lato capite, angusta cervice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cancer: quod & Cerafæ inquit, serpenti proprium est. Chalcidicem Helianus, si quis inquit, habeat in tritico, fore ut incorruptum seruetur. De serpente in telligat, an de pisce Chalcidico, qui & Chalcis dicitur, non constat. De Sepe pro Multipeda, Plinius uigesimo uolumine. Multipedem inquit, Sepa Græci uocant, oblongam, pilosis pedibus, pecori præcipue nocuam. Castigatus est in ea parte locus, propterea q̃ non Sepa, sed Ipa legēbatur. Nam Ips genus uermis aliud, ut in pumice docebimus.

E X M. V E R G. C O M M.
AB exedendo Seps lacerta hæc dicta est. *σέπς* enim, id est, exest quæ ueneno suo contingit. Lacertæ similem omnes describunt: præsertimq; in Theriacis suis Nicander dicens, *σέπας γλῆμιν πεδανώσας* de μὲν σαύραϊν ἀδύσσει, quod est, Vitabis & Sepa, corpore humilibus lacertis similem. Dico autē humiles, quas ille *πεδανώσας*, id est, per terrā serpentes dixit. Fuit hoc illi ab euentu nomen, quemadmodū a corporis maculosis lineis, quas in tergo habet colore aris: quod Græci Chalcon dicunt. A Chalcis, siue Calcidica dicta eadem est. Nos enim eadem credimus: fuisseq; antiquam & uerā eius appellationem Chalcida, quasi aeneā, ob eam quā diximus causam: & ex eo deinde nomine, cuius rationem non nouissent omnes, ad adiectiuū gentis, & loci nomen translata eius appellationem fuisse, dictamq; Chalcidicam, quasi in Chalcide Euboicæ plurima inueniretur. Quod falsum est: cum in Libya & Cypro nasci præcipue dicatur, & inter petras illic uiuere. Factū ob id etiā est, ut in antiquis scriptoribus modo Chalcis, modo Chalcidica lacerta inueniatur: eorūq; auctoritate diuersum, non idem creditū hoc animal fuerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: habemusq; opinionis huius auctorem antiquissimū Nicandri interpretem. Nec eo secius liberum legentibus arbitrium relinquimus.

C De Scinco. CAP. LXXI.

φύλαξ

Scinco aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus: Quis inueniatur in Lydia Mauritaniae. Est autem terrestis Crocodilus sui generis, qui falsus affertur in nasturcio. Aiunt carnes quae renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmae pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactucae cum aqua potio, ueneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 2. ca. 5.

Scinco a Crocodilo cute distinguitur, candidiore, tenuioreque, sed praecipue seta squamarum, quae a cauda ei ad caput uersa est. Maximus Indicus. Post Arabicus. Afferuntur in ueterati sale. In Nilo natus, Ichneumone minor est, tanto inferior Crocodilo. In Libya duos cubitos excedere, Pausanias existimat. Venales Scinco ex Aegypto licet uidere, lacerti magnitudine. Sunt & Vincentino agro sui quidam Scinci, minores multo ueris, etiamsi pro Aegyptijs officinae subiiciunt. In Bithynia Chalcedonis agro fere, Crocodilos minores quodam fonte nasci, qui a Zarita dicatur, Strabo meminit: fortasseque pro Scincis accipit, quoniam paruos esse tradat. Crocodili Champsae apud Aegyptios uocantur. Iones uero Crocodilos primi uidentur appellasse, ut inquit Herodotus, sumpto nomine ab illo Crocodilorum genere, qui apud ipsos in sepibus, macerisque nascuntur.

γύρ τερπας

C De Terrenis uermibus. CAP. LXXII.

Terreni uermes impositi, praecisos neruos glutinant. Tertianas discutit, decocti cum anserino adipe. Infuli, affectis auribus medentur. Cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus praestant auxilium. Poti ex passo, urinam ciunt.

BARBARI COROLL.

Dermes terrenos, quidam Blinithas, alij Gensentera, hoc est, Lumbricos, & Intestina terrae uocant. Iulos aliqui, ut Dorion. Gaphagae a Syracusanis uocatur, quasi limo & terra uicti tent. De his nonnihil & in Fibro diximus. Est Iulus & Polypus & Cantilenae genus, quae lanifices siue purpurarii utuntur. Hoc nomine uocantur hymni quoque Cereris, ac Proserpinae. Sed & fruges ipsae. Propterea, quod singulares manipulos farris hordeacei, amalas Graeci uocant: ipsas uero metas, & fasciculos, qui ex multis manipulis praeligati sunt, Vlos, & Iulos nominant, ut Athenaeus inquit, meliusque Photion Vlos interpretatus, panes holoderos, hoc est, quibus nihil detractum sit. Nec satis scio, de autopyro panem, an de holopyro Photionis enarratio intelligenda sit: de quorum utroque in tritici mentione disertabitur. Terreni uermes, cum e cauernis suis prodeunt, tempestates, imbresque praenunciant.

μυγαλά

C De Mure araneo. CAP. LXXIII.

Mus araneus dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 29. ca. 4.

Murem araneum Mygalen, & Myogalen Graeci appellant. Negant transiri orbitam ab eo, naturae quodam torpore: & si transferit, moritur. Inde contra morsum eius, terram ex orbita sumendam praecipiunt. In Italia uenenatus eorum ictus, Eosdem ulterius Appennina regio non habet. Monendi sumus in Theodori praefatione de animalium historia, non Mygalen pro mustella, sed Galen scribendum ab impressoribus fuisse. Mus araneus ideo Mygale dicitur a Graecis, ut placuit Aetio, quia muris magnitudine sit, & mustellina specie. Os ei oblongum, cauda gracilis, dentes quadruplici uersu tenues: quod & uulnus indicat. Ex eo purus sitim sanguis effluit, mox saniofus, tum pustulae insurgunt, Sunt quibus caro seculenta. Ipsum animal maxime testiculos aggreditur. Pustulae, si praegnans percusserit, nec aliter rumpuntur, ut Dioscorides & Aetius scribere. Plinius, non pustulas, sed ipsum Murem araneum si praegnans ferisset, dissilire protinus existimarunt.

EX. M. VERG. COMM.

A

Descripserunt ex ueteribus plures araneū Murem, præsertimq; Aetius: q̄ ideo a græcis Mygalem, factō ex mure & mustela nomine, appellari ait, qm̄ mitris magnitudinē, & eadē illi caude gracilitate, et rictus longitudine, reliquō autē corpore mustelina specie sit. Amyntas tñ, antiquissimus græcorū scriptor, ideo Mygalem uocari ait, q̄ adulterino coitu ex mure & mustela nascetur, Quod nec uerum, nec uerisimile est. Qui enim ad generationem coibunt mus & mustela: quibus non solum dissimilis penitus natura, sed quales multæ aliæ inter animalia uidentur natiuæ & exitiales inimicitia sunt. Meminit aranei Muris Nicander in Theriacis suis, cęcumq; appellauit, hominī exitialem, in orbis rotarum percurrentem.

De Muribus. CRP. LXXIII.

MVres, qui in domibus oberrant, concisos, scorpionum plagis utilissime imponi in confesso est. Si inaffatos infantes ederint, oris saluam exiccare promittunt.

BARBARI COROLL.

MVris nomen ut Mustelæ, animalibus multis cōmune. Alpini, quos aliqui Marmotas uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominentibus, media magnitudine, pabulum hyemī præparant, anteq̄ condantur. Alterni, ut aiunt, mas, & foemina, complexo herbarum fasce, supinos cauda mordicus apprehensa, inuicē detrahunt ad specus, proindeq; tunc temporis detrito uideri dorso. Pares ijs Aegypti, similiter residunt in clunē, & in binis pedibus gradiuntur, prioribus manuum uice utentes. Sunt & Pontici, unius coloris, & uarij. Ex hoc gñe creduntur esse pelles, quibus muniri uestes contra frigora cōperē, candidos eorū Armillinos, fordium uulgus nominat. Nam uarij, parte tātum prona, candicāt. Venetis in dorso color, a quo Dissuaræ Pelles uocantur: quandoq; ferrugineus, deterior priore. Instruxit & ex Muribus luxuriā suam uita, alios magnis frigoribus, alios medio anni tempore a septentrionibus peccōdo. Armatius corpora, debellamus animos. Conduñ mures hyeme dumtaxat albi, quorū palatum in gustu sagacissimum esse referunt. Murem Græci Myn appellant, Cretenses Smynthion, siue Smynthea, unde Apollini cognomen, ut Photioni uidetur post Strabonem.

EX. M. VERG. COMM.

B

PLura sunt Murum ueteribus genera. Alpini, Pontici, Glyres. Et in his generibus diuerso colore & forma, sunt & in domibus nostris latentes: quos adiecta hac nota ad medicinam Dioscorides ab alijs secreuit.

De Vsu lactis. CAP. LXXV.

LAc generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluum emollit. Stomachum & intestina inflatione uexat. Venum tamē dilutius æstiuo habetur. E uiridi pabulo aluum magis laxiugat. Probatum autem candidum, æquāli crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum. Quoniam adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, magna ex parte uescuntur. Inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, asperum, & præpingue, non usq; adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, uentri magis idonea. Sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scamoniā, ueratrum, lematipem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem & stomachum subuertit. Quale in Iustinis montibus esse, a nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in uomitiones effundit. Adstringentius omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exuctum. In summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis,

C interaneorum, uesicæ, & renum. Foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque seruefactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluctiones adiuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 9.
Lib. 11. ca. 41.
Aristot. de natura animalium. lib. 7.
cap. 5. 11.

Lac Græce Gala, Camelinum, ab hominis lacte, dulcissimum: præcipue si ad unam mensuram tres aquæ addantur. Bos ante partum non lactescit, Asina prodius. Pullo eius ubi pingue pabulum est, biduo a partu maternum lac pressisse mortiferum. Genusque morbi uocatur Colostratio, & infantes Colostrati, densato lacte in casei speciem. Ex proximo semper a partu Colostræ fiunt, quæ nisi admisceatur aqua, durefcent in pumicem. Est autem Colostrea, siue ut Plinius Colostrum, prima a partu spongiosa densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunque Colostrum plerumque accipit. Itemque pro eo quod ab Aristotele Trophalides appellantur. De Colostro & Martialis poeta meminit, & Lucilius, & Plautus in Penulo. Mea inquit Colustrea, meum cor, meus molliculus caseus. Inter opera uero ganæ preciosissimum ex lacte Caput uocatur: quod Britanni atque Belgæ Cremorem lactis hodieque nominant, conficitur & quæ Spuma lactis dicitur. Insucriæ supra memorati, Cremoris æmula, quam græci Aphrogala, ut inquit Aetius, appellant. Vtrinque dentatorum lac non coit. Tenuissimum camelis. Mox equabus. Crassissimum asinæ, ut coaguli uicem impleat. Omne Lac igne spissatur, frigore serefcit. Spissatum igni, Pyriathes, & Pyriephthon uocari a græcis, autor est Aetius. Meminit & Iulius Pollux, sicut spissatum coagulo Pyctes, quod rustici nostri Lac luncatum, a luno co & carice, aut quibus alijs leges tribus inuoluitur, appellant. Athenæus uero primum lac Pyriephthen, & Pyriephthon tradit uocari. Photion primum Lac a græcis etiam Pyos, & Pyon dici uoluit. Alioqui Pyos & sanguis concretus est: quod & Pus dicitur. Pulsem ex ouo & lacte Oogala medici cognominant. Lacticia, qui uocant ex Lacte quoquo modo cibum, etiam si quida in sacris literis id usurpant, non probo. Lactarium opus dixerim potius, autore Spartiano. Cœnas inquit Heliogabalum exhibuisse alia die de oleribus, alia de pomis, alia de dulciarijs, alia de opere lactario.

D

οὐστὸς γάλακτος

De Sero lactis. CAP. LXXVI.

Lac QVODCVMQVE Serum continet implicitum. Quod ubi discessit a lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri: ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis.

B A R B A R I C O R O L L.

Strabo lib. 1.

Serum iam multo potentissimum quidam ad tertias decoquunt, & sub diuo refrigerant. Græci Orron uocant. Hoc quemadmodum a lacte separaretur, Dioscorides mox indicat. In Erythia iuxta Gades, insula unius stadij, patente freto, lac sine Sero premi tradunt, ut Strabo reatilit: tanta pinguitudine, ut in caseo conficiendo, aqua diluatur.

αἷμα

De Schisto, ceu scissili lacte. CAP. LXXVII.

Ex omni lacte fit quod Schistum appellant. Lac autem scissili nouo feruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, insparsis postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetui mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis. Ita enim serefcens, liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo scissilis labrum detergere, sectariumque argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax

est contra rosiones uestionesq; , ab exitiabilibus medicamentis factas , uti a **A** cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bubulum ad id eximie confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq; . Asininum peculiariter collutos dentes, gingiuasq; stabilis. Fluctiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosq; , ouillum, bubulum, aut caprinum cum marinis lappillis decoctum, sistit. Per se autem, & cum hordeacea pūsana, aut halicacæo cremore infusum, magnopere intestinorum rosiones mitigat. Exulceratæ uulvæ immittitur.

B A R B A R I C O R O L L.

LAc Schistō uocatur, quasi scissile, ac dimidium, quoties uidelicet concretum eius partem, quæ Casealis dici potest, ab serosa, ut Galeno placet, separamus. Improprie tamen Schistōn inquit lac nōnulli appellant, id in quo aut littorales calculi, aut ferrum ardens restinctum sit.

De Muliebrilacte. CAP. LXXVIII.

HVmanum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammis autem **B** lexuctum, prodest tibi, & stomachi rosionibus. Contra haustu leporem marinum præsidio est. Oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur. Podagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus. Nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum præbeat. Pri-
miperæ canis lacte perunctos narrant glabrescere. Potum contra uenena antidoti uicem obtinet. Abortus mortuos expellit.

B A R B A R I C O R O L L.

LAc mulieris ante septimum mensem inutile, insalubreq; . In omni usu præfertur eius, quæ **P**l. li. 12. ca. 9. geminos enixa fuerit, tum eius quæ marem fere. Inefficax eius quæ sequiorem sexum edidit. Eius quæ marem peperit, lacte gustato, Canes rabiosos fieri negant.

De Caseo. CAP. LXXIX.

Caseus recens, sine sale, sumptus alit. Stomacho utilis est, & facile **T** in membra delegatur. Corpus auget. Aluū modice emollit. Alius tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. Illitus, oculorum inflammationibus, & sugillatis prodest. Qui uero recens salitus est, minus alimenti præbet. Corpus apte minuit. Stomacho aduersatur. Negociū uētri, interaneisq; exhibet. Vetusiore sistitur aluus. Sero quod a caseo manauit, q̄ optimē canes aluntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Caseus non fit ex utrinq; dentatis, ut diximus. Bubulum, Caseo fertilius q̄ caprinum, ex eadē mensura, ut Aristoteles tradit, pene altero tanto. Quæ plures quaternis marnas habent, Caseo inutilia, & meliora quæ binas. Caseus infumatus laudabatur a ueteribus: nec hodie cōtemnitur. Omnis porro Caseus, senectute fit saluus: sed in museum redit saporem, aceto e thy-
mo maceratus. Barbaros Caseo non usōs tradunt, sed in iocundū tamē acorem solitos lac co-
gere, quod & Oxygala uocatum sit: cuius rationē aliam Columella postremo sui operis libro tradidit. Casei genus Saprūm, quasi putrē dicas. Faciunt utilem coeliaciis. In Plinio legendū sit
epityron, an caprarum, in mentione Casei lib. 11. controuersum diu fuit. Ipse nō epityrum, sed

Caprarum lego, non quia Epityrum oliuæ fractæ genus sit, ut quidam putant: quandoquidem oliuæ genus illud pityrum & pityrida, non epityrum appellari constat: sed illa ratione potius, quod nisi caprarum gregibus sua laus est, in recenti maxime eam argente fumo gratiam, & reliqua legamus, uix stabit sensus, nisi plane quis extorqueat. Præterea, cum de bubulo, & ouillo Caseo differuisset auior, maxime sequens erat, ut de caprino quoque loqueretur. ne quia sit omnium fere deterimus, improbari omnino iudicaretur. Adde, quod infumari, non aliis magno fere Caseus, quam caprinus affolet. Nec fere placet, nisi musteus, atque recens. Athenæus latina uoce usus, fumosos Caseos appellat. Laus Caseo Nemaufensi, Lefuræ, Gabalicique pagis. Alpino duobus generibus. Doceati, ex Dalmatia. Vantifico, ex Ceutronia. Cebano e Liguria & Apennino, maxime lactis ouium. Auximati, ex Umbria. Item Iunensi magnitudine conspicuo, singulis quoadque milibus pondo. Item Vestino, Crustuminoque, ac Coditio campo. Nam Siculum Iulius Pollux meminit, & Aristoteles, qui & Phrygium quoque nominat: sed Siculum ex ouillo & caprino mixtum lacte, Phrygium ex equino asininoque fieri solitum commemorat. Siculum Athenæus præferri putat omnibus, utique post Achaicum, ex oppido Tromilia, unde Tromilistis dicatur, & a Simonide Stromilium, ex caprino lacte. Epityrum uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit, edulium, Siciliae quam Italiae frequentius: cuius uocis in Plauto mentionem haberi sciunt omnes. Vnum inquit epityrum edam. Pollux uidetur hoc Xeriantyron uocasse, siculum edulium id esse affirmans. Athenæus Hypotyrida placenta genus facit, fortasse idem cum Epityro. Nam Catartyron condimenti nomen est e caseo, apud eundem autorem. Trans maria Bithynius fere in gloria erat, Salonies ab oppido appellatur. Gallicisapor medicamenti uim obtinet. Nunc a Cisalpina Gallia commendantur, Placentini maxime. Formaginem Theodorus pro Caseo cur dixerit, aut quem autorem secutus ita uerterit, quod Aristoteles Trophalida scripsit, nisi quod in Columela forte legit, cœcretum lac in fiscellis, aurin calathos, uel formas transferri solitum, non uideo. Aliubi Theodorus idem, Trophalida colofrum interpretatur, ut prædiximus. Neutrum satis probo. Caseum Græci Tyron uocant. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes poeta reddidit, Chloron, hoc est, recentem atque molle: qualis in fiscella ferrur. ob id Fiscellis uocatis: quia inde caseum abliguriunt: Xeron, hoc est, aridum, atque ut Iulius Pollux interpretatur, macilentum. Copton, hoc est, prædurum. Nam & Copta rhodia, & Copta sicus hinc nomen tulere. Xyston, hoc est, tonsilem atque rasilem. Nam & horum sic dicuntur. Tmeton, hoc est, scissilem. Pecton, hoc est, coagulum, colofiratumque: nam est qui accescere incipiat & lacte siculneo coierit, Opian uocant. In Creta Caseos quibus lata forma est, sed gracilis, Thelias, id est, quasi foeminas appellant.

Quod Hippacen uocant, Caseus est equinus. Ea uirus redolet. Magnopere alit. Bubuloque proportionem correspondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarint.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippacæ differt ab Hippice: quod Hippacæ caseus atque coagulum est, Hippicæ uero herba, Scythica equestris, a Theodoro dicta. Phrygiū caseum, Aristoteles ex equino & asinino lacte confici solitum scribit, ut in caseo notauimus. Hippocrates inuentum scribit Scythiarum Hippacæ. Ex equino lacte, in ligna, inquit caua infundunt id. Deinde obrumbant, in natantem spumam, Butyrum uocant: id quod fidat, Hippacem: id quod in medio subsistit, Serum. Vires exiguo cibo sustentat Hippacæ, quemadmodum & Hippicæ.

Butyrum

E De Butyro, & eius fuligine. **C A P. LXXXI.**
Lacte pinguiissimo probatum fit. Butyrum, quale bubulū est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue discedat. Butyrū natura oleosum est, & emolliens. Vnde largius epotum, uentrem resoluit. Prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle, si infrietur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris ulcera infanti bus emendat. Illitum foris, capaciōra alimentorū facit corpora. Et ab albidis pustulis per summa scatenibus asserit. Contra inflammationes, et duris

cias uulnæ, quod nec uirus respicit, nec uetustatem sentit, Butyrum efficax **A** est. Dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamēta ad- di solet, quæ pus mouent. Vtile præsertim cum nerui, aut cerebri mem- branæ, uesica, aut ceruix uulnera accæperit. Id autē purgat. Replet. Car- nem creat. Ab aspidē percussis utilissime imponitur. Recens obsonijs ad- ditum, olei uicem pensat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo Fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum ac- cenditur, fictiliq; opercularo, quod superne in siphunculū desinat, & sub pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur Fuliginis modus, quem fa- cere institueris. Penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medi- camentis oculorum, exiccare & adstringere. Fluxiones cohibet. Et ulce- ra celeriter ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Butyrum spuma Lactis est, cœcretiusq; q̄ quod Serum uocatur. Hic & Butyrus dicitur, & Butyrum, & ab Hippoc. Picerton. Laudatissimus Barbaris cibus, & q̄ diuites a plæbe distin- guat. Butyrum a boue nominatur, q̄ a bubulo lacte fiat; ut miretur Dioscoridem Galenus, q̄ ex caprino, & ouillō cōfict lacte dixerit. Ex caprino tamē fieri solere, testis est Plinius. Quod quidem cū sit, hyeme calefacto eo, æstate uero dumtaxat expresso utuntur, crebro iactu, in longis uasis, angusto foramine, additur paulum aquæ, uti acescat. Quod est maxime coactū, in summo fuit. Id exemptum addito sale, Oxygala, hoc est, acre Lac appellant. Reliqua deco- quunt in ollis, ibi quod supernatur, Butyrum est. Quod magis uirus respicit, hoc præstantius. Oxygala fit & alio modo, lacte acido in recens addito. Casei genus a Galeno Oxygalactinon uocari Asiæ, Pergameno præsertim agro dicitur.

Pli. li. 28. ca. 9.

EX. M. VERG. COMM.

Ex lacte Butyrū fit, spuma eius dū coquit cœcretior q̄ Serū: & qm̄ plurimū e bubulo fit, a boue nomē inuenit. Alioq; ex omni lacte fieri posse, & hic, & Plinius testati sunt: q̄d antiquores aliqui negauerunt, nomen magis, q̄ rei naturam contemplati. Oleosum natura Butyrum esse, Diosc. ait, & p̄ter hoc non μαλκτικόν ἀνδρῶν, quod fere in omnibus græcis legitur, quod molli- endo aptum significat, sed ut in uetustioribus, & ut res ipsa exigit, γαλακτικόν, .i. lactuosæ natu- ræ. Barbarus ex priore illa lectione, molliens id uertit. Nos ex posteriore, oleosum natura Bu- tyrum esse, & lactis naturam sequi diximus: non tam ueterum codicum fide & autoritate per- suasi, q̄ pallui eius uerbi ὕδατος significatione admoniti, quæ apre id indicabat.

B

De medicina Lanarum. CAP. LXXXVII.

Succidē Lanę molles, e collo, feminibusq; laudatissime habent. Sub- ueniūt inē iniriā uulnerib. pcussis, desquāmatiss, liuidis, ossib. fractis, aceto, oleo aut uino imbutę. Siquidem capaces sunt liquidorum, quibus oblesæ partes fouentur. Et ob pecudum sordem, sic enim Oesypum uo- cant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cū ace- to & rosaceo efficaciter imponuntur.

ἔρια διὰ πῶρα
τὴ ἀπαλὰ

De Lanis ustis. CAP. LXXXIII.

Crematariū Lanarū cinis crustas obducit. Excrescentias in carne cohibet. Et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & car- p̄te in fictili, crudo cæterorum more uruntur. Nec secus purpurarum to- menta cremari solent. Aliqui cum sordibus Lanas carpūt, & melle irri- gant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris pauli, uerucula inter se di-

καυμένη ἔρια

Cstantia componunt, & conceptas lanas oleo ita suffulas, ut ne stillare quidem possint, affulis tædæ subiectis, & eisdē lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & uistas tollūt. Quod si e tædā pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & considerare patiuntur. Idc; sapius, mutantes aquā donec linguam adstringat, nec mordeat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 9. ca. 49.
Lib. 29. cap. 2.

Lanam, Græci Erion uocant. Ad medicinam laudatissima est Gaïatica, Tarentina, Atrica, Milesia, Lanæ quibusdam locis non tondentur, sed euelluntur. Ob id cum dempta est, atq; cōglobata, quidam Vellera, alij Velumia appellant. Mirum quod tradunt, mederi Lanas pecori, cibos fastidienti, si cauda præcussissime præligata, indidem uellantur: statim enim uesci pecus incipere, & quod extra nodum sit, præmori. Lanam succidam Græci Rhyparam, Ionîa Sisy-pen, alij Oesypiram, hoc est, sordidam, & cum Oesypo suo, de quo paulopost dicturi sumus, nominant. Galenus autor. Succidam, a sudore dictam non a sudore, sed a sue nominatur, cuius caro est. Lanarum sunt & a coloribus, quos bibunt, discrimina. Cymatiles a fluctibus, Geranochro-es a gruib; lam ab Amethysto, ab serenitate, a Croco, a Rosa, a Myrto, a Glandibus, ab Amygdalis. A Cera, a Coruo Coraxicæ, a Purpura Colossina. Et hæc partim ex Plauto, partim ex Ouidio in Artrib; & Syrabone, Adulteros, ut Aelianus tradit, in Gortyna Cretæ deprehensos, Lana coronabant, mollicia; probro; atque ita per ciuitatem, ad Magistratus traducere moris erat.

Supplicium ad
ulterorum a-
pud Cretenses
olim.

E X M. V E R G. C O M M.

Quales fuerint ueteribus, & unde nomen inuenerint succidæ Lanæ, satis docuit Varro rerum rusticarū secundi uoluminis ultimo capite, cuius uerba hæc sunt. Tonsuræ tempus inter æquinoctium ærnum & solstitium, cum sudare inciperint oues, a quo sudore recens Lanæ tonsa, succida est appellata. Hic præter tonsuræ tempus, quod succidarū appellatione signatum ab eo est, ex qua etiā pecoris parte tondendæ essent, ad medicinā docuit: ex collo scilicet, & femoribus, unde molliores, & copiosiore sudore sordidiores tondent: quorū alterū molli, alterū adspergines felicius cōbibit. Dicimus aut adspergines quæ Græci *ὑπερπυρρα*, & *ὑπερπυρρæ* in sua medicina passim dicunt, quæcūq; humida & liquida corpori inspergunt: quæ quoniā cito dilabunt, linteolis, stuppis, alijsq; huiusmodi inspersa imponunt: & in hunc usum apertissimas esse pecoris lanas Diosco. ait. Nec aliud in Satyra Aquinas poeta indicauit dicens. Vinū, qd succida nollat Lana pati. Eo em, alijsq; humoribus ad medicinā quotidie inspergunt.

signatur

O De Oesypo, pecudum forde. CAP. LXXXIII.
Oesypum uocant græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles radícula curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris amplius coniectis, aqua infunditur, magnocq; impetu cocleari uti respumet agitur, aut lignea rude ualidiuscule cōturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidente pingui quod super natat, collectoc; in fictili uase, de nouo aqua in labellū fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximit. Hoc tantisper fieri solet, dū consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum lingua Oesypum, adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidūq; spectet. Tū in fictili uase condit. Verū omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus

non, secus atq; cæratum foeminae, confricant. Ita enim, candidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in ætheo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua ut diximus lauant, colatumq; in fictilem ollam, quæ calidam aquam continet, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat. Et si manu in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri, aut concreti habens. Veluti quod cærato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulua, cū meliloto & butyro. In uellere appositum, menses & partus euocat. Vlcerà non aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligit, uti demonstrauimus. Quæ in oculorum medicamenta commode addi solet.

BARBARI COROLL.

Oesypum, & Oesypus, utroq; modo effertur, ab eo quod Oes, hoc est, ouis. Græci mascur lino fere utuntur, Latini frequentius neutro. Laudatissimum a sudore alarum, & feminum, si cut in Articis ouibus genitum: quod & notauerit Ouidius, Pli. li. 19; ca. 12

Oesypa quid redolent, quibus mittantur Athenis. Hippocrates, Caprinæ clunibus sordem uocauit Oespen, ouillam Oesypiden: quo quidè nomine, Lanam quoq; succidam significat quibusdam. Quidam hoc a Galeno Hyfopū dici putant: errore uulgi, & quidem a Græcis orto, qui non Oesypum quādoq; sed Hyfopum scribant: ut siue prudentes, siue imprudentes, non Oesypum simpliciter, Hyfophon Hygron, & Hyfopum pharmacum sapis sine cognominent: quasi ab Hyfopo herba distinguere uoluerint, ut Paulus in compositione, quam a Ruta *πυράνραν* appellant, utilem pleureticis;

B

De Coagulo.

CAP. LXXXV.

LEporis Coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum moribus, celiacis, dysentericis, & foeminis fluctione uulua laborantibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulua cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant. Potū uero partus enecat. Et post excretionēs, pariendi spem adimit. Equi Coagulum, quam Hippacen aliqui uocant, priuatim celiacis, dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ, apri, cerui, uituli, bubalique Coagula similes naturas sortiuntur. Contra aconiti potū in uino, & concretū lac in aceto, cōuenienter assumuntur. Hinnuli Coagulum triduo a purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini Coagulum castorei uires representat. Comitibus, strangulatis uuluis potu conferre existimatur. Sed syncæri hoc experimentū est. Aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tū præcipue agni Coagulū, maduerit. Quod si uerū est, statim lique-

πύρα καγόν

Cfcit in aquam. Sin minus, confimile permanet. Excipitur autem catur-
lis qui nondum natate possunt. In summa, Coagulum omne dissipata
cogit, & coacta dissoluit.

B A R B A R I C O R O L L.
Coagulū Pitya, & Pitya græce dicit, & Tamsos poetis. Plinius ex hædo laudar. Aristote-
les ex Inulo. Præcipuū tamen Dasypodis: quod & profluuiū alui medeat, unius utrinq; denta-
torū. A Pitya Pitynā uulgo dici, concretū igni serum, & quod in caseum coire non potuit exisit.
mo. Est & apud Græcos id quod appellant auctores noui, Melcen, imbuto uase aceto, atq; ita
excalfacto, mox lacte infuso, ac nocte tota quiescere citra ignem permisso. Qz q; & alij plariq;
modi sunt. Sed hic & compendarius, & facilis. Sunt quibus Melce uideat esse, quod Oxygala
uocauimus. Tamen si butyrū quoq; rustici non alter fere appellant, q; Melcen.

E X M. V E R G. C O M M.
Nota oībus res Coagulū est. Et nihilominus qui in græcis literis, se tantū profecisse iactant,
ut singulis diebus aliqd cōponere se posse dicant, & depromere, quicq; sacrarū literarū antiq; in
terp̄tes nouis æditionibus castigare ausi sunt, in Plutarchi cōmentariolo, cuius titulus est, quo
modo quis ab inimicis utilitatē inueniat, pro coagulo lac uertērūt: non intelligētes, quantū ab
altero alterū differat, & qd in ea re scriptori illi propositū & consiliū fuerit. Licetq; auctore Ari-
stotele lib. 1. de historia animalīū, Coagulum lactis substantia sit, non tamē illi idem est: & ut re
ipsa differunt, lac, & Coagulū, sic etiā diuersis a græcis & latinis appellationibus indicant. Mul-
ta de animalīū Coagulis in utraq; gente uetustissimi scriptores docuerūt. Sed in græcis omniū
copiosissima historiam eodem libro & loco Aristoteles, & inter latinos Plinius.

De Adipis ratione. CAP. LXXXVI.
A^{step}**D**E P S A N S E R I N V S, aut gallinaceus, recens, & sine sale
conditus, ad uulua uitia proficit. Sale inueteratus, & qui tem-
poris spacio acrimoniam concēpit, uulua inimicus est. Recens ex
emptis membranīs in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-
paciōr sit, quantus sit modus Adipis quem curare institueris, obstru-
ctio diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquescent inde hu-
mor in fictile alterum excolatur, donec Adeps omnis absumatur: mox
loco uehementer frigido reconditur, & ad usū digeritur. Alij fictile ful-
ciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ
solis uicem penfet. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranīs teri-
tur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento. Mox
lineo colo transfusus reponitur. Utilliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps, & Ursinus hoc curan-
tur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-
giore aqua cœlesti & q; frigidissima, exemptis tunicis, diligentissime ma-
nibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua
abluitur. Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergi-
tur. Et subditis leuib; prunis, spatha mouetur. Eliquaturq; colo trans-
funditur in aquam. Vbi uero refrixit, & guttatim aquam omnem ex-
cludit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quo facilius sæculentum uirus pessum eat. Postea
in pilam spongia madefactam transfunditur, Vbi coire cœpit, residens
in imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; ficti-

li bene operculato, perē frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillū, A
 ceruinūq; ita curato. Elotum ex his quodcūq; tunicis ut in suilli mentio-
 ne dictū est exemptis, pilae emolliendū tradito, ac manibus fricato, affusa
 paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut
 pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conficito;
 & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, atq; in aquam
 colato. Cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato. Et quae ante dixi-
 mus facito. Tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam co-
 lato. Refrigeratūq; ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum au-
 tem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua ma-
 rina ex alto petita eluendū est. Mox in pila tundendū diligenter, affusa
 maris aqua. Cum uero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conficiendū,
 & marina aqua, quae non minus dodrante superemineat, proluendū. De-
 coquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui atti-
 cas minas, quaternis tyrhenicae caerae drachmis. Excolatumq; detractis
 quae pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum, opertumq; so-
 li interdiu credendum, ut ad candorem reducat, & uirus euanescat.
 Priuatim taurorū pingua sic curari debent. Renibus euulsum pingue,
 profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis fictili nouo postq; exi-
 guū salem insperferis, liquefacito. Dein in nitentem aquam excolato: &
 ubi conrescere coepit, manibus iterum confricando uehementer laua- B
 ro, aqua saepius infusa, refusaq; donec q̄optinie elotum uideatur. Rur-
 sus in olla cum pari modo uini odorati decoquito. Et cum iterū efferve-
 rit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. Postridie si grauius
 adhuc oleat, noua olla repetitū, uino odorato perfundatur. Eadem quae
 prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur, & sine sale, praefer-
 tim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet. Sed ita para-
 tum, non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum
 pingua curari oportet. Taurorum autem & uitulorum pingua, nec non
 ceruorum medullae, odoramentis imbuuntur hac ratione. Pingue quod
 odoratum reddi debet, demptis quo diximus modo membranis, elo-
 tum, & uino q̄odoratissimo nulla maris aqua diluto feruefactum, per
 noctare sinitur. Alterum id genus uinum eadem mensura infunditur,
 colliquatur, & exquisite colatur. Nouemq; eius heminīs, iunci Arabi-
 ci septem drachmae adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fie-
 ri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmae, cum paribus palmae, ca-
 lami, & casiae modis adduntur. Et xylobalsami, aspalathi singulae drach-
 mae, cinnamomi, cardamomi, & nardi singulae unciae. Omnia exactius
 tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto quod supra carbones
 firmiter collocatum sit, ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi per-
 noctant. Postridie uinum effunditur. Aliudq; generis eiusdem adijcitur.

C Ter simili modo conferueſcat. Matutinis uinum effundatur. Et ablutō uafe, ſi quid imo ſubſidens hæſit, detergatur. Poſtremo eliquatum pingue, & excolatum, ad uſus reconditur. Hoc autem modo odoramētis imbuitor, quod antea curatum eſt. Verum ante dicta prius inſpiffari ſolent, quo facilius ſibi odoramentorum uires adſciſcant. Itaq; aſſumens quod uoles cum uino ſeruefacito, impoſitis una myrti ramulis, ſerpylo, cypetro, item aſpalatho plenius tuſo. Aliqui tamen pro uſu, uno dumtaxat horum contenti ſunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter & linteocolatum, aromatis uti expoſitum eſt imbuitor. Adipibus ſpiffamenta ſi fiunt. Syncærus, & ſanguinis expers adeps, reliqua habens quæ ſapere tulimus, in ollam nouam demittitur, inſuſo uino albo, uetere, odorato, quod ſemipedis altitudinem ſuperet: lento igni ſerueſcat, dum uernaſculus odor aboleatur, planeq; uinum redoleat. At ubi depoſito uafe refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiſdem ſextarij, & ſemius lori, eiſ inquam cuius e ligno ludicræ tibiæ faciuntur, tuſi minæ quatuor adijciuntur. Lento igni ſubinde miſcendo decoquuntur. Cumq; odoris uirus euanuerit, excolatusq; adeps refrixerit, una contuſi aſpalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino ſubigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibunt. Poſtridie in fictilem ollam tricongialeſ ea omnia cum adipe iniecta, additis ſextarijs tribus uini, una ſerueſcūt, quouſq; & uim & odorem ſpiffamentorū adeps ipſe cootraxerit: qui eliqueſcens colatur, & reponitur. Quod ſi maiorem odoris fragrantia efflagites, drachmas octo q̄ pinguiſſimæ myrrhæ uino macerata, quod multos in annos aſſeruāt eſt, miſceto. Gallinaceus, anſerinusq; ſic odoribus imbu ſolent. Cuiusuis corū percurati ſextarij duo fictili olla excipiuntur, eryſceptri, xylobaſſami, palmæ elag, & calami plantæ contuſi ſingulorum ſeſcuncia admiſcetur. Vini leſbij ueteris cyathus unus adijcitur. Ea ter efferueſcunt prunis. Mox uafe ſublato ab igne, die noctuq; refrigerantur. Poſtridie liquata per linteum mundum in uas excolatur. Vbi uero adeps coierit, concha excipitur, ſiſilicq; nouo denſius operto, perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id inſtituere oportet. A ſtate ſiquidem pinguiſ non coguntur. Nec deſunt qui tyrrhenicæ cæra momentū adijciāt, quo facilius in unum corpus omnia coaleſcant. Eadem ratione ſuillus adeps, & uſinus, cæteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sanſuci odorem adeps ipſe repræſentabit hoc modo. Curati q̄ optimi adipis, præſertim taurini mina una, tempeſtiuiq; ſanſuci exquiſite confracti ſeſquimina miſcentur, & inſparſo largiore uino digeruntur in offas, quæ in uafe cooperto nocte quieſcunt. Matutinis in fictili olla leuiuſculo igni, aſuſa aqua coquuntur. Dumq; ſuū adeps odorem exuerit, deſæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. Poſtero die deſterſa ſorde quæ peſſum ierat, ſanſuci, ut dictū eſt, contuſi iterum ſeſquimi-

na priori pastillo adiicitur. Eodemq; modo in offas cogitur. Alijs quæ diximus peractis, decoquitur, & colatur. Quod si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut uitulinum, a putredine tueri uelit, ita faciendum est. Quamuis Adipem diligenter elotam, & siccata in umbra, super cribrum per lintea munda manibus uehementer exprimat, listuq; consuta umbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua charta inuolutam, frigido loco recondat. Pinguia autē, indito melle, uindicantur a putredinis uitio. Vis omniū est excalfacere, mollire, odorem ciere. Taurinus adeps, bubulus, & uitulinus aliquantum adstringunt. Earundem uiriū compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui insidias moluntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus. Qua ex causa decoctus cum polenta, rhoe & caseo, dysentericis datur, & cum pisanæ succo infunditur. Ius decocti phthysicis in sorbitionibus prodest. Datur quoq; utiliter his qui cantharidum uena hauserūt. Hircinus, ut qui ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionē respondet ouillus. Suillus uero contra uulnæ & sedis uitia idoneus est. Ambustis igni medetur. E sue uetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, & emollit. Elotus uino pleuriticis prodest. Cinere, aut calce exceptus, inflammacionibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt, cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusq; conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere. Pernionibus subuenire. Vulpinus medetur auriū doloribus. Fluuiatiliū piscium pinguia perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquefiant, & melli ammisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines, suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo uetere. Pilos alis euulsos, perunctis radicibus obliterat.

BARBARI COROLLA

Adipem, atq; Seuum, item pingue, medici fere cōfundūt, cum ueteres, tum noui. Sed differunt: quæ ruminantia Seuum habent, Adipem cætera. Vel ut Aristoteles tradit, cornigera, non utrinq; dentata, & quorum in pedibus tali sunt. Pinguescunt Seuo bisulca, scissisq; in digitos in pedibus adipe. Adeps atq; Seuum semper in fine carnis sunt, pingue uero inter carnem, cutemq; succo liquidum. Adeps atq; Seuum concretæ sunt, ac gelaſcunt, fragiliaq; si refrixerint, pingue non gelatur. Atq; hoc Plinius intellexisse mihi uidetur cum dixit. Adeps concretus est, & cum refrigit fragilis: appellatione Adipis, etiam Seui cōplexus. Lupino Adipi apud uetereſ palma fuit: adeo, ut nouæ nuptæ intrantes, solene haberent postes eo inungere: ne quid mali medicamēti inferretur. Seuum Græci Stear uocant. Nam Staes massa est farina, quæ & Conspersionem, & Balthium, atq; Tractā dicimus, Adipem uero & pingue Pimelē appellāt. Item Pion, atq; Lipos: a quo genus carnis Alipaston uocatur, hoc est, sine pingui, quā Strabo comicus, seruijs apponit. Dicitur & Grassos Adeps ipse a Græcis, & Grassōn, sed ouilis maxie cum sordibus, & sudore illuies. Dicitur & Demos a poetis ipsum pingue, ut nihil præterijſſe uidear. Archigenes sudorem sordesq; corporis, Grassōniā uocauit. Pollux Grassōn, & Cinauram, Quædam non pinguescunt, ut lepus, atq; perdix. Steriliora pinguia in utroq; sexu, celeſta

Plin. 29, c. 19.

Pli. li. ii. ca. 37.

Crius senescunt omnibus animalibus. Est quoddam & in oculis pingue. Adeps sine sensu est oīs, nec arterias habens, nec uenas. Pingue animalū, plerisq; sine sensu. Quā ob causam fues spirātes, a muribus erosae perhibentur. Adipes homini detrahunt, & uiuit, leuatus onere. Habent & arbores suos Adipes, quos Alburna Plinius appellat: quos amputare, & adimere, Exalbur nare dicimus. A colore nomen sumptū: cum ligni pars est deterrima, & teredinem breui sentiens. Vnde robur exalburnatum, quod a Theophrasto Melandryon est dictum: quia sit ei co- lor nigricans. A cuius similitudine falsamēti genus quoddam Melandryon fortasse uidetur ap- pellatum. Quid autē sit Aruina, Suetonius in eo libro, qui de uitis corporalibus inscribitur, explicuit, durum esse dicens pingue, quod est inter cutem atq; uiscus. Non solum autē pingui- tudo, sed etiam pinguedo latine dicitur: quicquid Seruio grāmatico uisum fuerit, qui alioqui mihi parum uidetur Plinium multis partibus legisse.

Pli. li. 28. ca. 9.
Aristo. de na-
tura animalū
lib. 3. cap. 17.

ADEPS SVILLVS, ET AGNINVS.
Adeps Suillus Vnguen, ut inquit Palladius, & Axungia latine dicit; & Græci quoq; usur- pant. Sed Oxyngon fore appellant, tracta origine ab axibus curruum perungendis. Qz quam est, ubi Plinius acetī fecem, Oxyngion interpretatus esse uidetur. Etnos fortasse quibuldam locis, auctoritatem summi uiri nostro iudicio prætulimus. Alioquin Paulus Aegineta Oxyngion pro Axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui Phœnicite nomen est. Lau- datissima ex apris. Tanta porro uis, ut genibus etiam adalligata, redeat ad os sapor, eamq; ex- puere uideantur. Neq; occulta ratio, quoniam hoc animal radicibus herharum uescatur, ide- oq; innumeri e simo quoq; usus. Axungiae nomen ad alia quoq; pinguiā transferri: sed raro comperi. Laridum uero salita est animalis eius caro, quasi large aridum, ut Macrobio placet. Sunt qui Suillum pingue, Laridum uocatum putent.

Gellius lib. ii.
cap. 1.

* D

ADEPS BVBVLVS.
Bouem Græci Bœa, & Bun uocant, itemq; Taurum, & quandoq; Italon, unde dicta sit Ita- lia. Nam steriles uaccas nostri Taurus uocabant; sicut prægnantes Hordas, atq; Sordas. Vnde Hordicalia Romæ festa, quo die Hordæ boues imolabantur. Ephesij pincernas ipsos appella- re Tauros solebant. Nam Portis, & Portax pro iuuenta dicit a Græcis. Item Damale, siue Da- malis, ut Dores solent *Δμαλιν*, quam nos lunicem uocamus. Damales uero ipsum iuencū si- gnificat; quē in Alexandri Cæsaris uita Lampridius Damalionē uocauit. uterq; sexus in Mo- scho continetur. Photion Damalin uocari omne animal existimat in iuuenta.

Sapientie 4.

ADIPES ODORATI, E VITVLO, TAVRO, CERVO, ITEM MEDVLLA CERVI.
Vituli Græci Moschon, unde Moscheuma in Agricultura usu dictū existimant. Qui Vitu lamen in literis sacris interpretati sunt; cū latine dici possit, Viuiradix. Moschos & pediculū si- gnificat, quo frondes & fructus ramis annexi pendēt: qui & Pecioli, & a Palladio Tenax uo- catur. Viuiradix & Auulsio partū distant, sicut Moscheuma, & Paraspadēs apud Græcos. Di- citur & Moschos, siue quod idē est Oschos Pampinus, & Capreolus, & Clauicula, quæ Græ- ci Helicis, & Ligna, & Clemata, & Amphidas quoq; appellant, ut Galenus inquit.

Plin. 10. ca. 22.

ADIPES GALLINACEORVM ET ANSERVM.
Anseres, & Ocæ siue Aucæ, a Græcis Chenes appellant. Vnde Chenoboscion, locus ubi alunt. Nam chenizin uerbū, ad muscos pertinet, quasi sibiari sonum pſentans. Herbā in Var- rone pabulo Anserū feri solitam, non herin, ut habent exemplaria, sed Serin scribendū mone- mus, auctore Columella. Ferunt eam, cum est aqua tacta, etiam cum est arida, quasi renouella- ri, uiridemq; fieri. Laudant Anseres situti, hoc est, altilis ueteribus, & ex his iocinora.

σιρί μυλῶν

ADIPVM MEDICINAE.
Caprinum Adipem astrictiorem esse q; Suillum, Galenus falso creditū a Dioscoride com- monuit: nisi quis astrictiorem, pro eo quod est acriorem, accipiendū putet; quandoquidem hō- mo inquit, alias peritus, sed barbarus, proprietatem græcæ linguae minus tenuerit.

De Medullarum ratione. CAP. LXXXVIII.

Laudatissima est ceruina. Mox uitulina. Post hanc taurina. Dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autūnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest, ni quis eam

ossibus extrahat, & recondat. Omnes Medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Vlcera explent. Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes aquæ resparsu molliat, selectisq; ossibus elotæ, donec aqua syncera emanet, & deterfa sorde pinna, si qua innatet, liquatæ per duplicatũ lin-
teum in pilam exprimuntur. Et ubi coiere, omni fece quæ ad ima sedit de-
rasa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito om-
nia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauimus.

MEDULLAM, quam Græci Myelon uocant, uituli, Galenus post ceruinam præfert omnibus: eamq; priuatim a medicis appellari Moschion scripsit. Medulla proprie, inquit, Galenus est, quæ ossibus includitur. Improprie uero etiam e spina dorsii. Notat, hoc esse, dorso, ut ita dicam, nominata, quæ sit reliqua medulla durior ac siccior. Nam ea quæ spondylis, hoc est, articulis uertebriisq; continetur, spondyliosis habet nomen, ut inquit Pollux,

Pli. li. 29. ca. 92
Gale. lib. 3. de
aliment. & ad
Paternianũ, 82

EX M. VERG. COMM.

ADiecerunt posteriores Medullarum disciplinæ ex animalium partibus discrimina aliqua. Tradideruntq; pinguiores, & ad molliendum maiore ui & potestate Medullas esse, quæ ex ani-
malium anteriorũ, posteriorumq; crurũ ossibus erutæ fuissent: squalidiores uero & duriores, quæ ex spina, & dorso: præcipuamq; habere uim cõtra corporis duricies, quæ græci scitromata uo-
cant, de quibus alibi certius & ex pfecto dicei. Nunc qd nouisse legetes inutile penitus nõ erit, monebimus, qd Barbærus dupodiariũ uas appellauit, maluisse nos in re non satis certa, græco-
rum uoce uti. Credidit em̃ ille ut uidet *διπλωμα* a græcis ideo dictũ id uas fuisse, qd duplicẽ ca-
peret mensurã aliquã, & ex nominis ratione rem auguratus est: cum tñ nullam habeat Medul-
larum curatio mensuræ in uasculo necessitatem. Et Paulus Aegineta libro primo, quo capite
de ouis & eorum diuersis cocturis agit, nihil aliud *διπλωμα* esse ostendit, qd fictile, aut æneum
uas, in quo ad ignem densantur oua, quæ ille *πικτά*, quod est, præfocata appellat: facilis in-
tellectu res, ignota tamen nostra ætate uasis forma, & nominis ratio.

B

¶ De Felle. CAP. LXXXVIII.

FEl omne curatur hoc modo. Recēs præligato ore folliculi lino, de-
missum in feruentem aquam, spacio quo quis stadia tria percurfa-
ret: mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente.
Sed quod ad oculorum medicamentũ adijci solet, ligatum lino in uitreum
uas, quod mel habeat, immittitur, circũuoluto ad os uasis lini principio,
& operto uase reconditur. Est enim uis omnium acris, & exalfaciens. In-
tensis tamen, & remissis uiribus differunt. Siquidem præstantius in esse-
ctu esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis qui Callionius appellatur,
marinæ testudinis, hyenæq;. Item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, &
syluestris capræ. Quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes,
& oculorum caligines, albuginesq;, & genarũ scabrias. Ouillo, suillo,
hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, p-
fertim infantibus, leiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum
sedi subijciat. Priuatim taurino anginæ cum melle perungunt. Sedis ul-
cera sanat, & ad cicatricem usq; perducit. Idem auribus fractis, & purulẽ-
tis, cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur. Et sibilo earun-
dem ex porri succo. Admisceri insueuit uulnerarijs emplastris, & circum-
linationibus quæ contra uenenata parantur. Phagedænicis ulceribus, co-

204

Clis, & scroti doloribus ex melle prodest. Lepras, furfures cū nitro, & ter-
ra cimolia t̄poptime purgat. Ouillum et urinum contra eadem pollent.
Verum inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiu-
uat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest. Naribus
inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum Felle peculiariter per-
uncti, lusciosi sanantur. Hircinum idem obitunus. Thymia abolet. Et
luxuriantes elephantiorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autē
contra aurium ulcera, reliquaꝫ omnia, magno usu assumitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. ii. ca. 37.

FEL, siue Bilis, Chole a Græcis dicitur. Minorum animalium subtilius. Equinum tantum
damnatur, inter uenena. Ideo flammis sacrorum, equum tangere non licebat Romæ: cū tamen
publicis quoꝫ sacris imolaretur equus. Taurino Felle aureus color ducitur, æramentis atque
pellibus, qualia Græci cholobaphina cognominant. Bilis duplex, Atra, & Flaua: Sed cū sim-
pliciter pronunciat, Flaua inquit Galenus, intelligitur. Flauæ duo fere genera. Lutæ, quam
Græci Ochran uocant: & Ruffæ, siue fuluæ, quam Xanthen dicunt, uehementiorem & calidi-
orem priore. Sūt & alia cholorum discrimina. Virentis, quam Ioden, ceruleæ, quam Cyanē-
am: & subnigræ, quam Phæon, Itidis modo fuscæ. Callionymum piscem, cuius mentio-
nem habet hoc loco Dioscorides. Sunt qui Callichthyn, & Andhiam quoꝫ appellent. Itē Hel-
lopa, hoc est, Accipenserem, & Castum, Sacrumꝫ piscem. Aliqui etiam Lycon. Sed differre tū
eos inter se, cum ex Aristotele, tum ex alijs autoribus, aperte constat. Sacer certe piscis est pro-
prie, quem Pompilon uocamus. Dixi Hellopa eundem qui Accipenser dicitur. Ceterum Ar-
chestratus, eum qui uocetur inquit a Romanis Accipenser, Galeon a Græcis appellari existi-
mauit, perspicuo errore, ut aliubi monstrabitur. Fit & de Perdice sermo hac parte. In quo scien-
dum, Perdices, & Cacabidas, & Cacabos etiam uocari, a sono quem edunt canentes. Theo-
Dphrastus autor est, non omnes eum sonum reddere, sed Ditybizin aliquas. Perdicum porro
multa genera: sed præstantissimum, cui rostrum purpureum. Nam Italice, inquit Athenæus,
præparatæ sunt, nec rostrum rubens habent. Idem autor Phasianum, siue Phasianicum, aliquā-
do Tatyrim, aliquādo Tetartum, & Tetartum uocatū scribit. His adiecit Attagas, non attagenas
dicendo, etiam si Varro, & Gellius ita nominent. Atagenus certe piscis e numero est.

De Sanguine. C A P. LXXXIX.

Sanguis anseris, agni, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palum
ubi autē, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis,
& recentibus corum uulneribus, lusciosisꝫ illinuntur. Peculiariter colū-
bæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirci, ca-
præ, cerui & leporis sanguis patinis inassatus, dysenterias, & coeliacorum
profluuium sistit. In uino potus cōtra toxica efficiat est. Leporinus sanguis,
ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginēsꝫ emaculat. Caninus com-
mode ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra
epotum, toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotū tra-
dunt prodesse comitalibus. Marinæ autem testudinis cum uino & lepo-
ris coagulo, cuminoꝫ, contra serpentium morsus, & hausta rubetæ ue-
nena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duricias discu-
tit, emollitꝫ. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medi-
camenta additur quæ erodunt. Septica uocant. Sanguine chameleonis ge-
narum palpebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum san-
guine præstat. Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptio-

nem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. **A**
 Leuat podagras muliebres, & ignem sacrum, illitus.

BARBARI COROLL.

Sanguis Græce vocatur Hæma. Distat a Sanguiculo, quod proprie sanguis ædi est in cibū, igni coctus, Nigrum lus, ut Iulius Pollux arbitrat, uocatus. Hoc a Græcis Hypotrimma, & Aemalea, & Aemation, & specialius Hyposphagma dici putant: sed ex omni tamē quadrupede, adiecto melle, aut sapa, sale, aceto, lacte, caseo, cumino, laferpitio. Inuentum Lacedæmone putant. Vulgo id nos lus Dulce nominamus. De alio Sanguiculi significatu diximus in Galieno. Non dissimile uidetur, quod Græci Creocaccabon appellant, hoc est, carnem minutatim concisam cum sanguine, & adipe, iussulento quod, ac dulciario liquore. Nam quod Myma uocat, mihi quædā uidetur miscella Creocaccabi, & Hyposphagmatis fuisse: nisi quod paulo plura sunt, quæ in Myma requiruntur a quibusdam, autore Athenæo. Iuris & illa sunt genera, quorum in Pseudulo festiuius poeta meminit, Cicilendrum, Hypolindrum, Cicimandrum, Paropsis, Captis, Mæcis, siue Magis, ut coniicio. Equæ uirginis sanguini uim inesse negant, quæ maribus foeminisquæ, non uirginibus. Taurinum ubique inter uenena collocant. Excepta Egyra, ubi descē fura in specum sacerdos uadēij causa, tauri sanguinem præsumit. Caprinum bibentibus, pallor accidit. Hircorum sanguine ferramēta acuiuntur, indurata subtilitate, & scabricia expolita, uehementius etiamnum, quæ scobina fabri. Adamantis natura inuictissima, & duarum rerum uiolentissimarum, contempris ignis, & ferri, non alia rumpitur ui, quæ hircino sanguine macerata recenti, & calido. Etiam si hoc gemmarum nostri falsum & ridiculum existimant. Anatem, de qua mentio hic habetur, Græci Nessas, & Necta uocant. Quantū Necta magis est, ut septa anataria significant, quæ anates ipsas. Anatem ueteres, & anilem morbum uocabant, Similes Anatibus sunt, sed maiores, quas Glafcia Græci uocant, ab oculorum colore. Sunt & Boscades, et quas ab urinandi uoluptate Colymbos, & Colymbidas nominant. Inter omnes eas minimæ, atri ac sordidi coloris, acuto rostro. Soli earum spectantur oculi, cætero merguntur. Habentur & Chenalopeces appellatæ, sed anseri contriuntur. Inuenitur & Boscadis unum genus, maius Anate, sed minus Chenalopece. Huc & Phascades pertinent, paulo grandiores quam Colymbi, cætero similes Anatibus. Est & Vria dicta, non multo minor Anate, rostro longiore, ac tenui, colore sordido figlinæ. Angustum & Phalaris uocata, rostrum obtinet, caput rotundius, uentrē subcinericeo colore, tergus nigricatus. Nominantur hic & Columbae. Græci eas modo Peristeras, & masculino genere Peristeros, ut Attici, & neutro Peristena, modo Pelias, et Peliasas uocant, ut Dorici. Quantū Aristoteles distinctum genus facit, qui & alia dinumerat. Quo fit, ut in pocillo Nestoris, plerique non Columbas, sed Pleiadas cœlestis fidus intelligendas arbitrentur in Homero. Columbae porro Siculæ præferuntur omnibus. Laudantur & Cypriæ, luteo colore. In India Columbas esse græci affirmant. Cæterum Columbarum quas diximus Peristeras a Græcis esse dictas, duo genera constituunt, ut Galenus est autor, Caroeidion, hoc est, domesticum, & Nomadicum, hoc est, pascuum & syluestre.

EX. M. VERG. COMM.

Quod ad medicinā pertineat, de sanguine satis nouisse illud sit, nullū frigare sanguinē. Omnibus enim ingenuis & necessariis calor est. Differunt solum, quod alter altero minus, magisue calet. Fuitque hic quondā in sanguinibus uirum & naturæ census, ut suillus humidiior, minusque calidus cæteris sit, temperamento suo hominum sanguini maxime similis. Columbarum uero, palumbis & turturis æquali inter se temperamento, oculorum medicinæ calidus inferuiat: instillatusque crassiori cerebri tuniculæ, in his quorum calua perforata esset, in inflammationes arceat. Noctūque cum uino, aut aqua, contra spiritus angustias utiliter bibatur. Vesperilionum, ranarum, chamaeleonis, ricinorumque, qui in canibus hærentes inueniuntur, mammarum incrementa in uirginibus compefcant, & quæ eo inungantur alia depilet. Negauit tamen, factō periculo, Galenus uera hæc esse. Inuenimus etiam, caprinum ob siccitatem suram, contra cutem subeuntes aquas cum melle utiliter bibi, & renum calculos frangere. Agninum comitalibus prodelle. Hædinum nuper coagulatum, cum aceto bibi contra cruentas pectoris excreationes. Vrsorum, siluestrium caprarum, hircorum, & taurorum abscessus maturare. Et terrestres crocodili oculorum claritatē facere. Quæ omnia a Galeno, Plinio, Pauloque Aegineta, & ab alijs longius dicta sunt. Poteruntque uolentes plura his etiam in antiquis medicinarum autoribus inuenire, consulto a nobis relicta: satis fore credentibus, si communiora aliqua dicta fuerint.

Pli. ii. 29. ca. 14.
& alias sæpe.

B

B

C

De Fimo. CAP. XC.

Armentarij bouis Fimum si recens admoveatur, uulnerum in flammationes mitigat. Folijs autem inuoluitur, & calfactū cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus tali imposito compescit. Illitum ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu Fimi, quod a masculo boue redditum est, procidentes uuluae reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, praesertim quae in montibus errant, potum in uino, regium morbum emendat. Menses cit cum odoramentis haustrum. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, sceminarum profluuia sistit. Caeterosque sanguinis impletus ex aceto cohibet. Medetur alopecijs exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morfibz, ulceribus quae serpunt, igni sacro, et parotidibus. Vtilem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis, qua parte brachio committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur; deinde sigillatim feruentes, stercoris capri pilulae imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolore mitigare. Adustrum id genus Arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum, sanat epinyctidas, clauos, peniles uerrucas, thymos, & ambusta, igni rosaceo carato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetus tum lateris dolorem mulcet. Adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum carato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum Fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui herba pascitur siccum Fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius excalescit, & urit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit. Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis igni medetur. Gallinaceum uero omnia eadem, sed inefficacius praestat. Priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiae Fimum si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini Fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur. Cum thure & mulso, calculos expellit. Subditae infantibus muscerdae, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimum canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera inflammationem minantia intumescere non patitur, Sed ea statim glutinat. Sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili Fimum Crocodileam uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est tenuissima

et friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquesces, A
 quæ cum teritur, fermenti acorem quadamtenus refert. Adulterant eam
 fumorum fimo, quos captos oryza pascunt: ipsumque non dissimile uen-
 dunt. Alij Amylum, aut Cimoliam miscent, & adscito colore per rarum
 cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem.
 Qui siccati pro Crocodile uaneunt. Inter omnes continere inuenio hu-
 manum sterces, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

B A R B A R I C O R O L L.
 Fimum Græci multis nominibus, Apopatema, & Apopaton, & Bolbitō, & Hippomacto-
 boliton, & Scatos, & Apofceuei, & Aphodon, & Eumarean ionice appellant, & Scor; quæque
 hominis hoc proprie: ut asini, Onida, & Onthon: equi, Copron: pecudis, Oespoten, uel Oipo-
 ten Aristophani, & Synpen: Iones suis Hypeleton: murum Myocoproon, & Miscelerda, nos
 Muscerdam: ut suillum Suceſdam. Liquidius quod est, nostri Soria cognominant. Vnde So-
 rioli, quibus soluti scula est aluus. Et cōforire uerbum, pro eo quod est inquinare fimo: quod
 Plautus concacare dixit. Et Sorica locus in publico, ut latrina in priuato. Fimos porro etiam
 lusorias tabellas, hoc est, alueolos dixit Horatius. Asinini certe pulli Fimum, quod primū edi-
 dit, Polion uocari tradit Aristoteles. Plinius Polean priuatim & caprinum, Spyrañhos, & Spy-
 radas, & Spyrdana, quas Palladius Caprinas baccas uocauit.

Pli. li. 17. ca. 59

C R O C O D I L E A.
 Crocodileam Ceruse modo elui præcipiunt. Est & Crocodile, siue Crocodilina, & Cro-
 codilis uocata quæstio Sophistarum ludica, ut Priōn & Ceratina, sed alienæ omnes ab hoc
 opere. Crocodileam Plinius etiam intestina ipsa terrestris Crocodili appellat: ob id diligenter
 exquisita, quoniam iocundissimo nidore fragrant. Viuit enim odoratissimis animal id flori-
 bus, simile Crocodilo ei cui uita in terra, aquaque communis, sed multum infra magnitudinem
 eius, & in terra tantum.

De Vrina. CAP. XCI.

H Vmanam Vrinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus ac B
 uenena, incipientemque aquam intercutē proderit. Marini scorpi-
 onis, uiperæ, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina,
 ad perfundendos canis morsus idonea est. Pruritus, & lepras nitro addi-
 to expurgat. Sed uetus ulcera capitis manantia, furfures, psoras, & ferui-
 das eruptiones, multo magis abstergit. Nomas, & præcipue genitalium
 cohibet. Auribus infusa manans pus supprimit. Decoctaque in calice ma-
 li punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, ortho-
 pnoicis auxiliatur. Decocta in æreo uase cum melle, emendat cicatrices,
 argema, caliginemque. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt.
 Lutum quod in Vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat. Feruefactum
 cum cyprino, inditumque, uulvæ dolores mulcet. Strangulatus leuat. Ge-
 nias deterget. Oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha in-
 stilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædicta est. Priua-
 tim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem
 subijt, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque
 per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. Asinina, tra-
 ditur renum uicijs mederi. Lyncis urinam, quam Lyncurium appellat,
 simulac excernitur, glaciari, coireue in calculi duriciam, uulgo creditum

C est. Quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophorō. Id potum ex aqua, stomacho, aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asininæ urinæ potu renū uitia sanari traduntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Vrina, siue Lotion, Græce Vron uocatur. Vrina struthionis atramenti lituras abluit. Fuliones pedum uitij carere affirmant Vrinæ beneficio. Magi præcipiunt, ne quis contra solem, lunam ue nudetur Vrinæ caussa; neue umbram alicuius respergat. Hesiodus contra obstantia reddendam, ne Deorum aliquem nudatio ea offendar. Non desunt qui Amuletum esse dicāt, suam cuiq; matutinis omnibus inhiatam in pedem.

L Y N C V R I V M.

Pl. li. 2. ca. 32.

DE Lyncurio non constat autoribus, an sit, aut unde sit. Qui electrum id esse negant, gemmam tamen fatentur, ex urina Lyncis omnino, sed quam animal id statim redditam, aggesta pedibus terra obruat inuidia, ceu gnarum peri eam ab homine; celerius ita concresecere in gemmas similes carbunculis, igneo colore fulgentes, atq; frigidas, quæ & scalpanē. Quancq; distinguunt e maribus, præcipueq; feris & fuluas & igneas; e fœminis, præsertim cicuribus, candidas atq; languidas existere, nec frondes & acus modo rapere, sed æris quoq; ferriq; bractœolas, ut Diocles & Theophrastus referunt. Alij dixerē Langurium, & esse in Italia circa Padum Langurias, quæ ab aliquibus Langæ nominentur. Falsa hæc omnia Plinius existimat, nec uisam æuo suo gemmam appellatione tali scribit. De Lyncurio lapide non hoc, sed alio inter fungos, mirum quidem, sed uerum dicturi sumus. Succinum Dioscorides hoc loco Pterygophoron cognominat, q; stramenta, 'flocos atq; simbrias' in se trahat: aliubi Chryso-phoron, ut Plinius Chryseletron. Lynces clarissime omnium quadrupedum cernunt.

E X M. V E R G. C O M M.

DHabet Vrina in animalibus, quæ perrenes, & quos urinæ meatus dicunt, ex sanguine in uescicam non aliter q̃ per colum fluit, quod cōmune omnibus sit, calorem. s. & acrimoniā. Priuatim omnium aliorum animalium, excæptis eunuchis, humana infirmior est. In nutrimento non paruas habet Vrina uires: ideoq; in fame pora Vrina seruati aliqui sunt. Sanat præter ea quæ a Diosc. dicta sunt, pedum attritus, sed nondum inflammatos, ex calceis factos. Caprarum & Chamædorum urina aluum deſcit: ideoq; contra cutem subeuntes aquas, utiliter bibitur. Ex homine omnium efficacissima impubis pueri est. Auguria talitudinis ex ea a medicis præcipue accipiuntur. Suntq; tam multi eius colores, tā diuersi habitus & odores, ut nihil æque in medicina difficilius & utilius nouisse sit. Nisi forte aliquis Romani Cæsaris exemplo, ad rigandas, stercoreandasq; simul arbores ex ea uestigal in gente sua excogitauerit. Ea pruritū foueri utilissimum Dioscorid. ait: *υνηροιο* græci id malum uocant, in senibus non adeo euabile. In reliquis ætatibus haud difficilis curationis, si deprehensa mali causa fuerit: quæ plærumq; est corruptis, & (ut aptius loquamur) putris, pituitosus, aut biliosus humor. Contra quem Vrinæ acrimonia & calore inter cætera pugnandum est. Exigebat post omnia hic locus, ut de Lyncurio, siue gēna, siue succinum id sit, aliquid diceremus. Sed tanta est ueterum in historia eius uarietas, ut nihil censere de eo audeamus. Sunt enim qui negent Lyncurion esse. Sunt qui esse quidem dicant, sed unde, aut quid sit, affirmare non audent. Plinius diuersis locis multa, sed quæ omnia de gemma intelligantur. Quæ possunt uolentes facillime ab eo audire.

¶ De Melle.

C A P. XCII.

μῆλις ὀμῆτιον
σῆμῆτιον

Pincipem locum obtinet Mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymeto; mox Cycladibus insulis, & e Sicilia, cognomine Simblion. Maxime probatur dulcius, & acre, odoratum, sufflauium, nec humectū, graue, & minime fluxū, qd ob sequacē lenticia nō facile abrumpit, tractūq; resilit in digitos. Mel abstergerdi uim habet. Ora uenarū aperit. Humores euocat. Qua ratione in fordida ulcera, sinuseq; cōmodissime infunditur. Decoctū, atq; impositū, abscedentem carnem glutinat.

A Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. Item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale tepido instillatum. Lendes, & foeda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, praeterim quae circumfisione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emolliatur. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatumue medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus uenena fungorū, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. Crudum tamen alium inflat. Tussim laceffit. Et ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in Mellis genere uerum, deinde aestiuum. Hybernium uero, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur Mel, amarum est. Quoniam apes inibi absinthio uescantur, quod uitia cutis in facie & maculae apissime perunguntur. Heracliae in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorūdam florum dote Mel conflatur, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & salsamenta, aut eorum mulsū, resumpta quoties uomitione reiiciuntur. Acre autem est. Et olfactu sternutamentum mouet. Quod cum costō illitum, foeminarum cutem emendat, & cum sale fugillationes rapit. Est & aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur. Salis modo coactū est, dentibus ut sal fragile. Aluo idoneum, & stomacho utile. Si aqua dilutū bibatur, uexatae uesicae, renibusque auxiliatur. Illitum ea discutit, quae tenebras oculorum pupillis offundunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Mel a Graecis Meli. Naturū in Carina Graecae monte Mel, muscae non attingunt, propterea medicamentis eligitur. Varro Siculum praefert omnibus: quibus Thymum bonum frequensque sit, quo ad mellificium nihil est praestantius. Strabo e Cycladibus, & inter Cycladas Calyminum anteposit omnibus. Natura Mellis ea est: ut uitia coarceat, ne serpere ultra patiat. Quam ob causam, uel exanimū corpus hominis, per annos plurimos innoxium conseruat. Est & suus in Melle, ac mulso flosculus, si recta est apud Columellam, in oliuae conditura lectio. Sunt enim qui uasculum Mellis, non flosculum ibi legant. Sed certe in omni re purissima & tenuissima quaeque pars, floris appellatione demonstratur. Est & in pomo flosculus, qui & Umbilicus dicitur. Nam & in fico pomo fundus, graece Omphalos dicitur, hoc est, extremitas altera, quae petiolo annectitur. De coelesti Melle dictum est superius in Eleomelie. Hircanum Mel, ex ipsis quoque fluit arboribus, sine cura mortalium, examinibus insibi se cogentibus atque mellificantibus, ut inquit Strabo. E petris quoque, ut Diodorus. Sed minores apibus sunt, Arthredones appellatae. Meminit bestiolae huius & Aristoteles, inter crabrones uiuentis. Etiam si corrupte legatur in ipso, Tenthredon, pro Anthredo. nam crabrones Anthredinae a Graecis dicuntur. Hoc ipsum fere in Media, & Armenia quibusdam locis uisitur. Diodorus, & Quintus Curtius, arbores in Hircania, quarum folia multo Melle ungantur, faciem querens habere tradunt: ac nisi solis ortum incolae praeuorterint, fore, ut uel modico tempore is succus exinguatur, Mellis inuentionē, Plinius & Diodorus Aristeo Atheniensi, uel Arcadi regi, ut Trogus, sicut medicina ex eo, Gelius Oceani filio soli assignat. Trogus colligendi Mellis usum monstrasse Gargorin scribit, uetusissimū Regem in Hispania Curetum, qui saltus Tharte florum incolere: in quibus Titanes bellum cum Dijs gessisse perhibentur;

Pli. li. in ca. 14.
Aristot. lib. 2.
cap. 11. de animalibus.

C M E L S A R D O V M.

Cum Mel in Sardinia progenitū uirus habeat, mirum est, cur nullum tamen animal homini pestiferū, in insula ea nasci perhibeatur, extra q̄ Solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatione Pliniana dictum est abunde. Non solū uero Mel Sardoum, sed & Chalcicum infame traditur amaritudine. Sunt & alia Mellis fastigia, quæ mox subiunget dissertatio.

M E L P O N T I C V M.

Mel Heracleoticū, siue Ponticū, ex herba fieri candida cōmemorat, quæ Aegolethros uocet: quia uexatio iumentorū sit, præcipue caprarū. Non sentitur aut̄ omnibus annis hoc malū, nec nisi cum flos ille marcescit aquoso uere. Signa ueneni sunt, nunq̄: denari, color magis rutilus, & q̄d ponderosius est, q̄ probū: qui gustauere abiciūt se humi, refrigerationē quæretes. Exitū hoc per extremēta, ad canes quoq̄ peruenit, similiterq̄ torquet eos. Mulsum tamen ex hoc Melle inueteratū, desinit esse p̄ciosum. Aliud genus Mellis in eodē Ponti situ, Manicon, siue Menomenon appellat, ab insania, quā facit, existimatū, rhododendri flore contrahi, quo scaturit syluæ. Optima tamen ex hoc uno cera fit. In Perside aut̄, & in Mauritania Casariensi, Getuliac̄: Massylis cōtermina, ueneni Fauis gignunt: quidāq̄ non toti, sed parte, quo nihil fallacius, nec nisi liuore deprehendunt. In Themiscyra Pōri regiōe, mons est Scydissus, cuius in colunt Byzeres & Hepacomitæ dicti iuga, hi tris cohortes Pompeij, ea cōmantes interfecerunt, dispositis qua trāseundū erat Mellis insani uasis, quod ibi ex arborū quārtundā, ut inquit. Strabo ramis, fundit. Corruent enim potu eo militē aggressi, facile confecerunt.

S A C C H A R V M.

Pli. II, 12, ca. 9.

Saccharum laudatius ferebat Indiā: nunc popularis ortus eius est in Aegypto, Cypro, Rhodo, Creta. Italia quoq̄ nascitur. Nullū epulum magnificū iam, nē quotidianus quidem uicus placet, sine Saccharo. Digerit in passillos, effingit in placentas, a maza & pane, ut puto Maza-partes uocatas. Q̄q̄ & Marcipanes ab auctore dictos conlectari licet: quandoquidē & Marcia rum unguentū, & Marci passillos in medicina legimus, ut est apud Aetium, & priorem eo Paulū. Omnino cōponitur in oēm figurā Saccharum, non aliter q̄ farina, trahiturq̄: etiā in picturas, opere historiali: uenatus, classes, oppida, & quascunq̄ rerū asserri libeat imagines præsentās: a coronatis ministris, cū abicine introferri solitū conuiujs, & ad principia eorū, & in secundam quoq̄ mēsam. Vnde natū sit prouerbiū: nullum ferculū corrumpi Saccharo. Amplissimū nūcis uellanae magnitudine, Plinij tēporibus, & medicinæ dūtata usu, nunc tam promiscuū, ut desinat prodesse, multis ob̄sit. Pueris certe lūbricos & tineas contrahit, Varronis uersus sunt.

Prouerbiū.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo, Illius & lentis premitur radicibus humor, Dulcia cui nequeant succo contendere mella, Strabo quoq̄ nō ex ipsis tantū arundinibus, sed & radicibus quoq̄: Mel exprimi cōmemorat in India. Nunc ex Alexandria Aegypti, & Cypro cōmendatissimū. Melius quo uetustius, q̄q̄ calidius, ita & capiti fere nocens. Dilutū aqua, refrigerandi uim concipit: præsertim ter coctū. Primo excoquunt arundinē, deinde flaua pars fecerit: hanc Saccharū existere. Hoc iterum coqui potest, atq̄ ita fit candidius & concretius. Quod si tertio coquat, maxima in eo fit & candoris & densitatis accessio. Quartum & quintū quoq̄: solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis fere tranlucet: q̄d genus aliq̄ Candidū, aliq̄ Cantū cognominat. Saccharū Græci Sacchar uocant. Rarū, nec plane cognitū Galeni quoq̄ seculo: tantū abest, ut instrumētum nitidioris uitæ fuerit. Q̄q̄ non magnopere pridem inuētum puto, ut nucleos pineos, amygdalas, auellanas, pistacea, citreum, cinamomū, coriandrum, anisum, feniculū ductili tunicarum facilitate contegat, circumdarum modo corticis crassitudine, modo cutis tenuitate uestiens. Dulciora quidē ex nucleis pineis, & amygdalis condebat antiquitas: sed cum melle, ut est apud Paulum. Venale porro Saccharū, in dupondiairos fere panes, metæ effigie diuiditur. Preciū optimi, in libras aurei nummi fere sexcunx. Cyprium non coibat ante: nunc densatur, tanto inuentoris quæstus, ut inde locupletissimus euaserit: neq̄ ratio tamen cōmunicata est, sed archanam habent, ut ad heredes laifundi cuiusdam, aut monbpolij uice transeat. Illud monendi sumus, in Pampinij sylua quadam illo uersu, Et quas præcoquit Aebusita Cannas, Hypasitam, non Aebusitam legendum: ita enim populi uocantur Indiæ a fluuio Hypasi, ut est apud Strabonem, Pliniumq̄. Nec audiendi sunt, qui nullo auctore, nullo teste, in Syria locumeum tradant, inter Libanum & Antilibanum, conualle media. Nam ibi arundo quidem prouenit, sed odorata, non saccharæa: ut alibi quoq̄ diximus.

De Cera.

CAP. XCIII.

A
kugot

CAera optima est subfulua, odorata, subpinguis, pura, odorisque quadamtenus mellei, natione Pontica, aut Cretica. Secundū lo- cum obtinet candida, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo. Ex ea radunt album, syncerūq; atq; transfundunt in uas, quod satis ha- beat marinæ ex alto petite, insparsoq; nitri momento decoquunt. Cumq; iterum, tertioque inferbuit, separatim uas refrigerant, ac cæræ pastillum eximunt, deterfa sorde, siqua forte adhæsit. Tum denuo indita noua ma- ris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, basin ollulæ noduæ aqua frigida madefactam, in cæram summam suspensa manu intingunt, quo celerius concresecat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæræ orbiculo, iterum uas inum aqua refrigeratum, tantisper immitti de- bet, dum tota excipiat. Orbiculi lino confuti, ita ut intercedat spacium, suspenduntur. Et interdū, continuo sub sole, noctu sub luna aspergunt, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, ea- dem factitari, & identidem recoqui operæ precium est. Nec desunt qui pro marina, in muria q̄pacerrima, semel aut iterū excoquant. Dein laguncu- la tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato cespite hærboso insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipi- unt hoc obeundū munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pa- riat, ut nō facile liqueat. Cæra omnis mollior, calfacit, modice explet corpo- ra. Datur in sorbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decem grana Cæræ hausta, lac in lactantibus non patiuntur coagulari.

BARBARI COROLL.

CEra græce uocatur Cerōs. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tene- bris siccat, quarto die liquatis igni nouo siccili, aqua fauos tegente, tum sporta colatis. Rur- sus in eadem olla coquitur Cera, cum eadem aqua, excipiturq; alia frigida, uasis melle circum- litis. Optima quæ Punica uocatur. Plurimum habet ex Propoli Cretica: ideoq; locum secū- dum in nationibus obtinuit. Tertium Corsica: quoniam ex buxo confet, & medicaminis uti- m referat. Fieri candidam Ceram, nihil aliud esse uideo, q̄ Punicam fieri. Hæc medicinis utilissi- ma, uarios in colores pigmentis Cera trahitur: ob id & Tracta dicitur, ut puto etiam à Græcis. Nigrescit, addito chartarum cinere. Anchusa mixta rubet, ad reddendas similitudines, & innu- meros uitæ usus, ut taceatur interim pugillariū, parietūq; & armorū tutelæ. Superat niuem candore Cera, quæ Pharmacopolæ nostri præparant, nuperrime uri cepta publicis, priuatisq; sacris solēniis & prophanis usibus. Officina tantū una concinnabatur hæc patris memoria. Nunc urbe tota uenditur, nec alia crematur Cera dumtaxat apud nos, q̄ candida. Primus o- mnium Cornelius, e Senatu domū rediens, funali Candido usus dicitur, tanta uerecūdiā, ut non prius accendi pateretur, q̄ tota curia & foro decessisset: quia cæteri, aut laterna, aut triviali Cæ- ra deducerentur. Exemplum eius deinde sequuti oēs, maiestatiq; hoc illius ordinis amplissimū, non luxuriæ dant. Itaq; Senatu misso, post occasum solis, tam longus est ordo luminū, ut pla- ne diem reddant. In Cera qui nascitur uermiculus, ab Aristotele uocatur Acar.

EX M. VERG. COMM.

QUod habet in medicina utilissimū Cera, excipiendis, retinendisq; alijs medicamentis ma- teria est, qua omnium generum Cera quotidie fiunt. Maturandi, abstergendiq; uires aliquas nihilominus habere illam, aliqui ex ueteribus tradiderunt: hic calefacere tantū, molli- re, expleq; eam dixit: & omnia medicriter, quoniā parum efficacis uis eius ad omnia fit: pre- terq; (modo id Cera possit) ad prohibendā in nutrimentis lactis in casum densationē. Quod uisū ex Dioscoride uerbis descriptū à nobis est, Barbarus id Colostrari dixit.

Plu. li. 3. ca. 143

C De Propoli.

CAP. XCIII.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. Aculeos, et oīa infixā corpori extrahit. In uetere tussi suffita proficit. Impetigines admota tollit. Et in alueariū foribus, cerosę naturę iuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

E Propoli Apes faciunt ad foramē introitus protectum, æstate maxime, ut ingit Varro. Alia hæc ab Rhitace uocata, qua fauos extremos simul conglutinant. Interdū extra fores aluci obdurant omnia, qua uenit inter fauos spiritus. Interpretatur hanc Gaza noster & Cæreum quandoque. De hac & in Lili mentione disceremus.

VERG.

Quæ in aluearibus apium uideri etiam uisum possunt fundamēta operis, ut diuersos habent in apibus usus, nec eandē ex qua confecta sunt materiā, sic diuersis appellationibus a grecis pariter & latinis discreta sunt. Inter ea post Meryn, & Pissoceron, tertia Propolis est, inter coria & ceras media crassioris materiæ: ueluti gūmi, additis aliquādo etiam floribus: nondū tamen cera, sed fauorū stabilimentū: qua oēs frigoris, aut iniuriæ aditus apes obstruit, magni ad medicamēta usus. Quorū genera hic breuiter complexus, nihil quod de Propoli ab alijs dictū fuit, non duobus uerbis, & maior uero totidem generibus profectus est. Eam Plinius ab apibus præcipue fieri dixit, ex gutta quam populi arbores in folijs ferunt.

C De Tritico.

CAP. XCV.

Optima e Tritici generibus ad secundę ualitudinis usus habetur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorē malī referūt. Dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominant. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignūt. Canū morfibz profunt māsā & imposita. Confectus eorū similagine panis, plus alit quā cibarius. E trimestriū farina panis leuiorem cibū præbet, & qui facile in mēbra demandet. Farina eorū cum hyoscyami succo illiniūt, aduersus neruorū fluctiones, quas Græci rheumatismos uocant. Itē contra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto multo tollit. Furfures autē in acri aceto decocti, turgentes māsas sedant. Viperarū ictibus auxiliant. Et torminosis profunt. Farinaaceum fermentū calfaciendū extrahendique uim habet. Priuatim callos pedū, clauosque extenuat. Cætera tubercula, furunculosque ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorū farina, contra uenenatos ictus cum aceto, aut uino cōmodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modū delingat, cruentis excreationibus proderit. Contra tussim, & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsā, aut hydræleo decoquatur, oēm discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus inflammationes omnes illitu mulcet: cum emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbis succisue huic rei accōmodatis ammisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur forbendum.

B A R B.
Plini. lib. 18.
cap. 7, 10, 11.

Triticum & Satiuū & Syluestre, cultu annorū trium mitescit, in Leontino Siciliæ agro plurimū. Degenerare Triticū in ordeum, ex eodēque nasci pede, utruque fabulosum existimat Theophrasto: Frumentū omne radicibus multis ac præterniuis exit, folio uno, germinibus

quino multis, sed quæ in ramos brachiari non possint: cuius contrariū in omni legumine cōspicitur, excepta Faba. Frumentū Sitos græce dictū, quicqd ex se aristas mittit: in herba quā Græci Loion uocāt per hyemem est. Remollito autē coelo, cauliculus de medio assurgit: cuius tertio aut quarto genu spica geritur, non prius euident, q̄ folliculo inclusa: qui Gluma dicitur. Consummato eo, flos erumpit: quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus, plurimūq̄ septem durat. Varro quindecim diebus frumentū in uaginis esse dicit, quindecim florere, quindecim arescere. Post florem cresscit, inquit Theophrastus: maturaturq̄ intra quadragesimū diem, cū tardissime octauo a satū mense, plurima parte metitur. Aegyptus, ut scribunt, septimo. Foliū harundineum, angustius tamē Tritico q̄ ordeo, caulis quoq̄ leuior, & lentior, nec perinde fragilis. Triticū multis integitur tunicis, ordeum nullis. Culmus Tritico altior q̄ ordeo, spica quoq̄ remotior a folio. palea suauior, mollior, succosior. Inconditæ Tritico spicæ, explanatæq̄: ordeo dispositæ in uersus. Vtriq̄ culmus spicā sustinet, quæ & Spicæ, & Spicum à Cicerone dicitur in Arato. Spica grānum & aristati, quæ uti à cus eminet ē folliculo siue glumā. Sunt autē Aristæ partes in spica primæ, quæ a Græcis Antherices dicuntur, & Atheres. Est autem Athier propriè in ordeo, ut Galenus interpretat, culpis ipsa spicæ. Nam & mētū pars extrema, hoc nomen inquit, habet, cum arisam non habet. Mutica spica dicitur, quasi mutila. Vaginā uocant, sub qua latet herba. Stipulæ sunt folia culmū ambiētia. Est autē Culmus, idem quod & Calamus, cum spicæ penitus oriūtur in summo spicæ iam maturæ. Quod minus est q̄ grānum, uocatur Frit. Quod uero ad culmi cacumina in firma spica geritur, minus item q̄ grānum, Vrucus appellatur. In tritico m̄tātescente gurguliones, hoc est, Bias (sed lego Cias, ut in pumice notauī) a Græcis uocatos, innasci ferunt, ut in faba Midae, Gigni & cantha ridem in Tritico (Scarabeus is paruus est) ut Phalangion in Eruo constat. Tritici multa discrimina. Sitanias uocat. Genus id est filiginis trimestre, ut Columella uoluit. Frumentago dicta Theodoro, diffrens crassitudine surculorū, quemadmodū inter ordea Crithanias, Ordeago nominata. In nomine sunt Assyriū, Aegyptum, Ponticū, Thracium, Siculū, Africum, q̄d facile absoluat folliculo. Nam Thraciū multas habet tunicas. Habetur & Cachrydias, siue Canchrys, culmo crasso, quod etiā Africo tribuitur. Ponticum leuissimū. Siculum ponderosum. Ponderosius Boëtium. Deponderūt hoc Athletæ. Ponticū & Aegyptium line lolio nascūtur. Item Siculū, præcipue Agrigentiniū. Q̄q̄ cum siculo, in elæpyron nasci perhibent. Sed innocuū, neq̄ lolij modo graue, caputue tentans. Nominat & Alexandrinū, oblongo semine, quod fortasse idem sit cum Aegyptio, & Calymno. Ex Calydnis insulis, a Ptolomæo Philadelpho in Aegyptū conuecto. Dracontias, & Selenusium, & Stengias, crasso cūncta calamo. Iam aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanii, uideo idem esse cum trimestri. Satniū dorice uocatū, & atticæ Titinū, quasi purum, ut Photioni placet, de quo & paulo suprà dixi. Galenus Sitanium, inquit, est Triticū instantis anni, id quod uere feritur. In Truculentio Plauti Eranio, pro Setanio legitur mendose, castigauimus. Non possunt inquit, militares pueri setanio exducier. Euboicū certe intra diem quadragesimū a satū metitur, firmitate ac pondere præcipuū, non ut trimestri leuitas, ob id cibario pani utile: nam & fur furis partū habet, inuentu rarū. Bimestria, in Achaia & Sicilia primū uenere, parum fecunda, sed cibo facilia & iucta. Olynthi & in Euboea apud Cerinthum genus effoditur terræ, qua Triticum oblinētes diu id seruāt. Trimestria ubiq̄ sunt, uerū inutilia, & infirma, singulari calamo. In Asia quodā loco trans Bactra frumētum nucleis oliuæ par nasci referunt. In Pissotis, tam firmū, ut multos Macedonū largiore ufos, eo saries peremerit. Omni frumēto nocent imbres in flore. Itē iam plane crassato, Triticum plus q̄ ordeum uligine cōmeat in lolium. Camatias in Thessalia Tritici genus est, quod admissio pecore de generat Babylone: propterea nihil patitur, etiā bis derosum. Præter lupinū, nihil æque in spica durat q̄ Triticum. Durat bonitas cibo in petrā Cappadociæ, in septuagesimū usq̄ annū Vnde Cappadocio pani summa gratia, qui & Apalos, a teneritudine uocat, & Syrorū lingua Laigman. Addebat in massam lac & oleum, & salis quantum satis esset. Laudabatur & Parthicus: quē alij aquaticum uocabāt, quoniā aqua traheret a tenui & spongiosa inanitate. Triticum ex Alfo Troadis, in panē sibi Reges Persarum quærebant. Varro conditi diligenter Triticū, quo uentus non perueniat, mansurū ad annos promittit. Vis Tritico tanta, ut cados plenos sicceret. Panificij multa & nomina & genera. Ex his nauticum intelligi, qui uetus atq̄ siccus a Dioscoride in medicinis dicitur, fortasseq̄ biscoctus: quē Græci Diaphthon appellant. Syncomistos uero, is est quē alio nomine Autopyron uocari Galenus auctor est: quoniā ex omnibus farinæ suæ partibus deractione nulla consistet. Inter Pityriā, & Semidalitin, hoc est, furfuraceum, simi lagineumq̄ mediū. Et enim Autopyros, siue quod idem est, Autopyrites, & Xeropyrites, &

A

Theoph. li. 1.
capi. 25, 26. 27.
28. de planta-
rum caussis.
Itē li. 4. ca. 17.

B

C Pynos Athenæo, siue Pynos Hippocrati, a Tritico, non ab igne flectitur, propterea q̄ non ex Tritici parte sit, sed ex ipso plane toto. Dicitur autē Anerectos ab Hippocrate. Item Syncomistos, quasi confusaneus, quoniā castratus nō sit, sed omnia simul tulerit, fursures, utriculos, & similia. Idem fere qui Sordidus. Cuiusmodi Neronē usum legimus. Q̄q̄ Paulus Sordidum, a Syncomisto separat. Vtriculos in auctoribus intelligo, id qd fursure melius est, & similia dezerius: hodieq̄ Fertini suos farinę uentres uocant. In Cisalpina Gallia Redundano appellat. Me dianū in Venetia provincia. Autopyri panes dicunt, & qui fursure tantū leuiter succreto sunt, qualis fere Cibarius, & Secundanus est, & qui Rubidus fortasse a Plauto poeta dicit. Hoc autem fieri solet, ut Galenus ait, quotiens Tritici generosum non est. Generosum inquit uocat, quod similaginis plus habet q̄ fursuris. Nam similago & simila prorsus idem sunt, Semidalis gręce dicta. Nimis fortasse multa de hoc pane, sed consulto: quia parum constabat inter eruditos qualis esset, præsertim cum in Plinio illa uerba legerentur. Ad omnia inquit, hæc fermentatus qui uocatur Autopyrus utilior: nullo nō accipiente fermentatū panem eundē esse cum Autopyro. Nō hoc significari uoluit Plinius: nec tantū hallucinatus fuisset homo, seculorū omnium post Varronē fere doctissimus, sed quod fermentatus panis, non quicūq̄, sed qui sit Autopyrus, ad omnia ea quę dixisset utilior esse uideatur: quod & duobus locis seorsum Galenus præcipit: in altero panē Autopyrum, ut secundo ad Glauconē uolumine, in altero fermentatū ad omnia illa præferens, de simplicibus facultatibus lib. 9. Sunt qui fermentatū panem Apopyrian uocant, ut Cratinus, non a Tritico, sed a pruna: quoniā torretur, ut ipsum nomē indicat. Farinā Græci Aleuron, & Alphon, & Halisparton, & Aliaton, & Aliton uocant. Q̄q̄ Alphita polentā fere significat, & Aliata farinam coctam, & Halisparton agrum consitū poetis. Fermentū Zymen. Cyribia, quæ nos excreta Tritici, aut ordeī, ut Columella, siue ut Palladius Creturū uocamus, auctore Iulio Polluce. Photion & Galenus etiam ipso Fursures, quos Græci Appherema, & Pityra, nos etiā Canicas, & Apludas uocamus. Vnde Canicaceus panis, id est, fursureus Pacuuiō. At Ceribia in Cratino, idem Photion pro sabalibus interpretat. Pepalem uero Pollux ipsum farinæ pollinē. Dioscorides & Plinius Pepalem Alphon, pro polenta capiunt fere. Tritici Syracusani Spyron, non ut cæteri Græci pyron uocabāt. Panem Arton, quē Phryges Beccūm, ut testis est Herodotus, a perfectione, quia rotunda eius forma sit, ut Athenæo placuit. Tritici summa tria genera obseruant, qui minus operose persequunt ista. Primū Robus, pondere & nitore præstat. Alterū Siligo: cuius candor & species in pane præcipua, sed pondere deficitur. Tertiū Trimestre, de quo supra diximus, Sitanū uocari: cuius usus agricolis gratissimus, inopiæ subsidio: hoc & Candidum esse dicitur. Nunc locus est, ut Panis genera dicantur q̄ breuissime. Zymites, hoc est, fermentatus, qui & Nastos dicitur. Q̄q̄ Nastos, quibusdam placente genus est. Contrarius huic Azimos, qui & Daratos. Nam acidus & squarofus, græce Oxylepes uocatur ab Aetio, febrientibus eum dante, quibus uenter fluat. Hunc Aegyptij Tyllastin dicunt. Alij ex ordeo confectū accipiunt, qui Cyllastis uocetur, Herodotus ex iligine, Semidalites e similia. Dictam uero Similā a Cerere putauerim: quam Syracusij Simalida nomināt, & Sitona. Aleurites a farina. Gyrites a polline. Condrites ab halica, siue Zea. De Syncomisto, & Autopyrite, & Apopyria diximus. Item de Cappadocio, & Apalo, Parthico, & aquatico, & rubido. Ipnites, & Caminites, a coquendratione. Item Aeschariates a craticula, sub finem cœnæ cōuiuiis apponi solitus, & intingi passō, usq̄ ad ebrietatem legitimā. Hic & inuoluebatur, atq̄ ita ut calebat intortus. Athenis maxime placebat. Cōiectari liceat id genus panificij, quod a tenuitate, & candore Nebulas fere uocamus, Aeschariates ueteribus fuisse. Nam & apud nos uulgari uoce ita dicitur, una tantū detrita priore litera. Hinc & Escharulas mulieres a panificio dictas crediderim: cuius uerbi mentionē in Plauto, ut cæteros raceam, inuenias, Tabyrites pusillus erat. Achænes prægradis, quo in Theophrasti utebatur Atticæ mulieres. Qualis autē sit Apurites, Polluci non constat. Præfertur omnibus sanitatis usu a Galeno Cribanites, siue quod idem est, Clibanites, hoc est, ut Varro Textuaceus, a clibano, quē Attici Cribanon appellat, nostri Textū, q̄ in textu calido coqueretur, usas comitilibus matronas scribunt. Cribana uero placente genus sunt, specie māmofa. Entrophyas, qui & Agorūs, hoc est, Forēsis, & Venalitiū, & Atticus uocari solet. Dipyros, qui & Pyrites Poluci, delicatus fuisse dicit, siue idem qui Dipyrites ab Hippocrate cognominat, siue alius. Quia porro Dipyrites, ad aquā intercutem cibo utilis existimat, cōiectari liceat, pro bis cocto pane capiendū esse eum. Laſgana, siue Lagana, minimo pondere, q̄q̄ leuior & tenerior, etiānum a carbone dictus Epanthraxis, Saturnalibus præberi solitus, nihil, ut quidā putant, ab Encryphia differēs. Vterq̄ subcinericius est, iam Homoros, & Staetites, & Encris, & Aliphantes, &

Hemiarton,

Genera panis
multa.

Hemiarton, & Placites, & qui Tyrontes a caseo nomen habent. Encridi similis est Physcilus, quo Spartani utebantur in sacris epulis, Rapi effigie. Magnos & fordidos panes Cilicios uocabant, & a colore subnigro Phæos, sicut Aglaeos, qui a nostris cibarij & gregarij dicuntur. Ornides ab Oryza, siue ab semine quodam Aethiopico, tam simili sesamo, ut difficile possit internosci. De sicu ægyptia, Sycaminites sit. Collabus, siue quod idem est Collix, & per diminutionem Colliphion, ut Xyliphion e caseo recenti constat: de quo Iuuenalis, & in Persa Plautus. Hic & Crimmarias, & Chondribos quoque dicitur. Sunt & Maconides uocati. Sunt Chrysocollæ, sed ex lino, ac melle. Aegyptij sunt, & ad sistendam aluum utiles, ut inquit Strabo, Caces appellati. Sunt Colloræ, siue Colliræ: quos Plautus non Colloras modo, sed Coluria uocauit, & Collyria ut existimo in Persa, & Collyridas sacra literæ. Is olei mistione conspersus intelligitur a Hieronymo. Sunt Obelij Baccho sacri: ita dicti, uel quod obolo Alexandrie uenirent, uel quod in ueru torrerentur. Sunt Eunite. Aut etiam Enite, cognomento Lecythitæ. Sunt Pani: unde apud nos uocabulum. Etenim Messapios reduridatiam & saturitatem, Pania appellasse, testis est Athenæus. Varro tamen Panis uocabulum a panō duci putat, quod figuris in eo faciebant, ut in lana mulieres. Habetur & Cnestos a nidore. Itē Banchylos, & Thronos. Spodites idem uidetur esse cum Banchylo. Patrias nobilitauere Cyprius, & Cappadox, de quo supra dictum est. Artopiticus uero panis a Clibanite ac Turnago differre eo dicitur: quod hic e diuore fermento splēdidus conficitur: illi fermentum semper per se tenerrimum desiderant. A boleti forma Boletinus, papauere accepto & fumosi casei colore. Strepticus, siue Streptos, ex lacte, oleo, pipere conficitur: aut olei loco, adipe. Artolagana pusillū uini, lac, piper, oleum, siue adipem olei uice continent. Caprydia sunt, quæ alio nomine Tracta dicimus, ut Athenæo placet. Cuius uocis & apud Caronem metio est, ubi de placenta, & spira, & scribilia loquitur: quo uerbo ipse non Panificium, sed porciones tota materia detractas, & in solum, hoc est, stratum in tabella, siue alueto diffusas cōgestasque significat. Proinde in hoc usu Græci sic loquuntur, *ἡμιν λάβανον*, pro eo quod est, tracta facere. Hinc et Cera candida, Tractum dici a Græcis quoque, autor est Photion: a quo & uerbum *τρακταίνω*, pro eo quod, perficere, ac subigere, ut alba fiat Cera. Paulus quoque Ceram tractam, ad p̄foras cōmendat. Sunt & Cubi, hoc est, quadranguli, aut etiam quadrati, ex oleo, anetho, caseo. Quamque Athenæus eos quæ Romæ quadrati uocarentur, incisuris præinctos, & Bomiltos a Græcis appellari prodit. Thargelos, qui & Thacysius: ita dici panem uolunt, quæ primæ e nouella melle fingit. Est & Samites, & Pyramus: quem nonnulli eundem cum Semite putauerūt. Thiagonos Dijs coquitur in Aetolia. Sunt & Dramices, & Araxis. Quamque Dramin in Macedonia uocari, qui panis in Thessalia dicitur, nonnulli scribunt. Ericitem uocant, qui ex confracto, nec excreto sit tritico. Blemā porro calidus, & egregie subactus, ac Dephtus panis est apud Seleucū: quem nostri forte Depsitium uocēt, ut est apud Catonē. Quamque in Catone sunt qui Speuticum, a festinatōe legendum putant: nec ut arbitror male. Brattimes, & Pityrites idem est, qui Fufuraceus, a quibusdā Euconos, & Teuconos appellatus. Nam Spolea, eum panem Græci uocant, quo necessarij dūtaxat cognatiq; uescuntur. Est & Phaciños de lente, popularis Alexandria, ut scribit Athenæus. Opis pistori genus est, & quod Buccellatū ab Paulo, & Aetio uocatur. Iustiniani codex, & Marcellinus in militaris annonæ grā cōnumerant, quæ his coquat, a buccæa dictū. Est autē Buccæa, ut ex Eusebio colligit, idem fere quod bolus. Sunt qui Buccellatum, fermento putent carere. Plautus Rubidum panē eū nominat, uidet Nauticū accipe: quia sit bis coctus. De Placentis alius mihi locus est: & sane proluxa metio ea foret. In Amylo dicent, ubi & panis quædā grā, sed admodum paucā necessaria libabimus. Alioquin & Placenta panis est, ut Athenæus inquit. Illud obiter aīo tasse nō fuerit inutile, genus id quod Itricon, & Itrion Græci appellant, a nostris Libū uocari, et neutro et masculino genere, ut Athenæus testatum reliquit. Ego nō Libū simpliciter, sed Libū suminale interpor, ut in Amylo docebimus. Caro Libū ex caseo & ouo condidit: ut autē legumen, ita & triticū si coquatur: appellationē habet nouā. Episo & faba Etnos, ex lente & aphaca Lenticulam, ex tritico Pyanum, & ut recentiores malunt, Holopyron uocamus. Aliqui fruges omnium generum in passo coctas Pyanon appellant. Ut mirer Iulium Pollucem, qui Pyan non quasi Cyamon, pro faba caperit. Chidron uero coctum triticum, ut Athenus inquit, seu frictum far, ut Hieronymus: quasi molam salſam. Est autem Mola salſa tostū far, sale conspersum: quo uictimæ perfundeantur. Vlochyon græce dicta. Iulius Pollux Chidron sorbitonem ex tritico uirenti factam intelligit: quia uirens triticum Chieria ab Aristophane dicitur. Nam Pelānos apud Aristophanem, a quibusdā accipitur pro spece leguminis. Pausanias placenta genus accipit in Pelano. Euripides pro quacumque re concreta, gelataue.

Strabo lib. 17.

B

C

De Hordeo.

CAP. XCVI.

npi 18

Hordeū optimū est candidū, purumq;. Id minus q̄ triticum alit. Pitfana tamen ob cremorem in decoctiōe redditū, plus alimentī prębet, q̄ polęta ex hordeo facta. Cōtra acrimonias atq; faucīū scabricas, exulceratiōesq; pollet. Quibus etiā triticea pitfana p̄sidio est. Sed plus alit, magisq; urinā mouet. Lac abūde suppediat, si cū sceniculi semine decocta forbeat. Hordeū abstergit. Vrinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersat. Tumores cōcogit. Farina hordeacea decoquit in mullā aqua cū fico, ut inflāmatiōes collectionesq; discutiat. Duricias cū resina et fimō colubarū cōcogit. Cū meliloto aut et papaueris calyce dolores finit, q̄ latus excruciant. Aduersus intestinorū inflatiōes, cū lini semine, scenogræco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice ligda, cæra, oleo, & impubis pueri urina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, uino, malicorio, syluestribus pyris, & rubo, alui, p̄fluuiā sistit. Podagricis inflāmatiōibus, cū coroneis, aut aceto p̄dest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liquata eadē cū aqua, atq; cū pice decocta, pus excitat. Cum aceto liquata itidem contra articulorum fluctiōes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflāmationesq; mitigat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. eodem ut supra.

Strabo lib. 10.

D

Ordeum, Chymif; Lurum Vulcani appellant, in græcis codicibus. De Ordei radice, ortu, herba, flore, spica in tritici menūone diximus. In Aegypto metitur sexto mense; aliubi multo tardius. In Chalcia, Rhodiorum insula, celerime q̄dam loco. Itē Messan in Sicilia, ubi Mylas uocant. In India syluestre nascitur, iocundum in panis esu. Hoc eqs appositū Alexandri, necabat eos primo; deinde in palea exhibitiū, paulatim desijt esse noxium. Fundit hoc in brachia, quemadmodū & Crithanias, hoc est, ut supius dixi, Ordeago. Ad Cedropolin, in Thracia q̄d nascitur, iumenta non attingunt: cuius rei causa, ut Theophrasto placet, malus odor, etiā si nō sentit homini. G̃na Ordei cōplura. Alijs granū rotundiū, & breuius. Alijs matus, oblongius, et rarius. Aliud cādicat. Aliud uergit in purpurā, copiosius farina, ualidiusq; q̄ cādidū. Itā aliud binos spicarū uersus, aliud ternos quaternosq; habet, itē gnos: nullū tñ plures sentis, cui spica folio perq; pxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris. Hoc Achilleis, & Achilleas ab Hippocrate cognominatur: ob id, p̄pensius obnoxii erugini. Erysibē græci uitiū hoc appellat, plenilunij fere accidens: q̄d & Rubigo frequētius dicit, ordeo q̄ tritico infestor. Eteocrithon genus Ordei est tutū a Rubigine: qm incuruū nascat. Sunt & Leptides, a tenuitate dicta recēti oribus Græcorum. Nam Amphicaustis, in tragœdia Ordeū montanū significat, q̄d & Eufus uocat. Differt Polęta a Farina ordeacea, q̄ torref polęta, nō farina. Polęta Græci Alphita, nō ut in Palladio corrupte legas, alphica. Itē Gerania, instrumenti nomine, quo pcutunt ligneo: & E-naulemata, p̄sertim cū uino et oleo. Ordeū Crithē et Cri, et Proconiō poetæ: q̄q; et tritici rostit Proconiō quoq; dicitur, & genus item fustis, Photioni. Galenus in Hippoc. Proconiū, paulatē ex ordeo recentī, aut etiā ex ordeo nondū tosto, significari tradit. Ordeacei uero panis genus unū Mazā nominant, inf ordeaceos panes deterrimum. Aetius potentā ordeacā, quæ sit humido conspersa, Mazā appellari testis est: quæ uidelicet mandata cruda cū defruto, uel in zelle, uel aliq̄ quo huiusmodi. Mazari uero plura genera, siue nomina. Phytien Attici uocant, quæ non multum subacta sit. Est & Anthema, & Ephicois, & Concon, & Tripte, & Cardamale dicta, & Berex, siue Barax. Alij Caryx, etiā Carycce, a nigricia nomen habens, non a nucibus. Distinguit Berex a Caryca Iulio polluci, et Tolypha, et Thridactia, siue Thridacisca, et Anemolos. Itē a uino Oenutta, siue melle Melitutta. Nam Achilleos uocata, ex ordeo cui Achilleis nomen est, constare creditur. In nomine sunt et Cypria, et Magidis. Hesiodus Amolgeē dictā meminuit, quæ nihil aliud sit q̄ recens. Iis uero quæ in sacrificijs Trophonij degustandæ prębebantur, Melitutte, Arestē, & Hygie nomen erat. In summa, laudatur Lydia, Carycce, Eretria. Prę-

fertur omnibus Conchos. Maza in laino non habet nomen, nisi quis interpretes panis offam, ut ipsi quandoque fecimus. Et ante nos Theodorus gaza, Offam, inquit Festus, abscisum globi forma nominabatur, ut manu gloriata pultē. Frumenti genus est quod uetēres Ador, & Edor, & semē Adoreū, & Far uerna culū, ait etiā Vermiculū uideo appellasse: ab edēdo: uel quā adu- rebatur, ut tostū fieret, ex quo mola falsa in sacrificijs, & Adorea pro laude. Nam Ordeum etiā ani Sifar quandoque dici solet. Leguminibus fere ascribitur, quia ex eo pitana fiat, ut Columella inquit. Inuenio tamē & Sacrum ordeum a Grecis uocari Didalida: quasi eo pro farre ac mola falsa usos existimare liceat, si Photioni credamus: qui & Cāchryn dici frictum Ordeum nota- uit. Galenus plurali tantum numero Canchryas pronunciat. Singulari uero non Ordeum fri- ctum, sed radicem Libanoidos, hoc est, roris marini, ab Hippocrate significari cōmonet. Con- fractum porro indiligenter Ordeum, Ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro Ado- rej quatuor sunt publica discrimina. Far Clusinum candidius, ac nitidum. Far quod uocat Ver- miculum, rutilo colore. Far Candidum, maioris utriusque ponderis quā Clusinū. Quarto genere se- men trimestre Halicastrum uocatum, pondere, bonitateque præcipuum. Ordei uero illarū differen- tiarū. Cantierinum quidam & Exhastichū appellat, animalibus quæ ruri sunt pascendis utilius, & homini quæ melius, quā malum tritici, fragili culmo, & nulla uestitum palea, celeriterque deci- dens, ac triui facile. Aliud genus est, quod Distichō, siue Galaticum uocamus, ponderis & can- doris eximij: quod Oryza esse quidam interpretantur ætate nostra, Greci, quemadmodū Far ipsū uocent, nisi Ordei appellatione contineri dicant, haud scio reddere.

¶ De Zytho. CAP. XCVII.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit. Renes & 3000
neruos tentat. Membranis, præsertim cerebrū uestientibus officit.
Inflationē parit. Vitiosum succum creat. Elephantiasin. Qui eo potus ge-
nere perluitur, agilis, & ad opus obeundum expeditus euadit.

¶ De Courmite. CAP. XCVIII.

Fit & ex hordeo potus quem Courmi nominant. Hoc sepe potu, B
no 994
pro uino utuntur. Verum dolorem capitis mouet. Malum siue
cum gignit. Neruis nocet. Consumilia etiā potus genera ex tritico fieri
solent in Britania, & quæ occidentem spectat Iberia.

BARBARI CROLL.

Zythus, & Zythum dicitur, & Græce uulgo Phiocadion. In Ægypto sitideoque a poetis Pli. li. 22. ca. 25.
quandoque Pelusiacus potus uocatur. Madscent aqua fruges, donec resoluantur in liquorem
uino similem. Iuebrat hoc, & acre gustu est: quoniam ex putrilagine acedente constat. In Me-
diæ montanis, septentrionali situ, gentes uini loco succum & radicibus quibusdam ebibunt.
Curmi porro fortasse hoc sit, quod Ceuissam in Gallia uocant, & Curmi, Curnithos insle-
ditur. Possidonius homo stoicus, non Curmi, sed Corma appellat. Inuenio & Celiā, & Ceriā,
unde Sicera, & Sicerites uinū forte nomine. Quanquā Hieronymus in ea uoce, quā uult Hebrai
cā intelligi, accipiendū esse dicit omne potionis genus, quod inebriare possit bibētes. Id autē pluri-
bus omnino modis ac nominibus, ratione tamen una fere ubique. Hispani iam et uetustatem ferre ge-
nera ea docuerunt. Spuma uero dum resoluatur frumentū concreta, utuntur sermēti uicē: quā
uocant leuior illis quæ ceteris panis est. Aristoteles Pinū uocari tradit, quod ex ordeo fit uinum.
Hoc qui sunt remulenti, non in omnē partem cassabundos corruiere, ut ceteri, sed retrorsum dū
taxat, ac supinos. Paulus uinum quod ex sordibus uellerum elutis conficitur, Pinon uocari pu-
tat. Sophodes, Aeschylus uinum ex ordeo Bryton uocant, non Zythion, aut Pinum. Est & a-
pud Theophrastum Bryton. Hellanicus & ex oryza Bryton fieri cōmemorat. Fit & e millo, ut
Athienæus testis est. Nam Cyceon homericus aliud genus erat: id ex mixto farina casco confit-
bat, in sorbitionis usum. Sunt qui Pinon pro uino capiant, quo sanæ cum sordibus suis lauan-
tur, atque ita siccantur reponitur. Illud notatione dignum existimamus, Dioscoridem ebur scri-
bere maceratum Zytho, facile tractari. Plinius nou ebur, sed ipsum animal tractabile hoc mo-
do reddi prædicat. Cæterum inquit, Elephantū mitificatur ordeī succo.

EX M. VERG. COMM.

Aniquum est, ex frugibus fieri pocula, quorum ad ebrietatem non minor quā uini etiā uis c ij

C est. Nec nostra ætas eadem sibi parare his locis desuevit, quibus negata uina, ex quo non satis homini aqua est, quod eorum uicem expleret, quærere sibi homines coegerunt. Inter ea Zythus quondam fuit, qui ex hordeacea fruge madida fieret. Meminerunt Zythi Plinius in naturalibus, Diodorus Siculus in Græcæ historia. Meminit & in carmine suo Columella, Aegypti inuentum & usum Zythi ostendens, cum cecinit. Iam Siser Assyrioque uenit, quæ semine radix. Se etiam præbetur madido satiata lupino. Vt Pelusiaci proritet pocula Zythi. Veteres grecorum medici, acrimoniam habere Zythum dixerunt: quoniam ex corruptione factus esset. Frigidum præterea: quoniam acorem haberet: ideoque mali succi esse. Quos autem in medicina usus habes Zythus, & hic, & alij manifeste dixerunt.

De Zea, seu Semine. CAP. XCIX.

Z Ea duorum generum est. Vna simplex. Altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit. Ob id Dicoccos appellatur. Plus quæ hordeum alit. Ori grata. Digerit in panificia, minus quæ triticum alens.

Pli. li. 22. ca. 25.
lib. 18. cap. 8.

Z Eam nostri Semen dicunt. Hæc si feratur pinisita, hoc est, tusa, transit in Triticum, ut Tiphæus idque uon protinus, sed anno demum tertio; nunquam contra. Nihil hac robustius, terramque magis exinians, radice alta, multiplici, culmo numerofo, fructu facillimo, cunctis animalibus succundo, simillima tritico aspectu quemadmodum & Tiphæus. Solū non deitque, ut Tiphæus, sed letum, pingueque desiderat. Zea & in Bromo dicta comeat. Dionysius halycarnasæus latine dici Fabulam existimat. In Catone porro Fabulus albus, faba candida ut arbitror significat: quæ bubus est languent, dari precipit. Vt in Columella deprauate legi putet, Balbulos albos in cura Boi, p Fabulis albis. Dioscorid. certe Papauer albus, a Romanis Fabiolū uocari tradit. De hoc lectione ad fabæ mentionem differo, Zea, Zereio, & Zontio, & Zostio apud Aristoph. in comœdia, quæ Babilō inscribit, locus uocat, quo seruitia puniendi mittebant. Meminit & Pollux. Ad quod allusit poeta noster comicus in Alinari (ni fallor) cum dixit, Qui potentia præsente, & ubi uiuos homines mortui incurant boues. Gregorius Tifernas in Strabone Zeas interpretat, rustica potius quæ latina uoce Speltas: credo quia Rhemius Palamō prior usurpauerit in carmine de pederibus, ac mensuris, quod tamen Prisciano grammatico inscriptum circūferet, Octo inquit speltas pederis scrupulū.

EX. M. VERG. COMM.

D Nihil difficiliorem medicæ materiæ cognitionem semper fecit, & adhuc facit, quæ non eadem ubique omnia sunt: neque ubi eadem sunt, isdem nominibus appellantur: & quæ quo communius aliquid humano generi natura fecit, eo facilius neglectum ignoratur. Idque in frugibus animaduertisse licet: in quibus nulla alicui certa huius, aut illius ex antiquis scriptoribus indicatio nunc esse potest, cum tamen nihil in illis frequentius inueniatur. Fecerunt id mutata per tempora earum appellationes: sed multo magis, quod paulo ante diximus, neglecta communia, et quotidiana naturæ bona: & ut in Zea, de qua nunc agimus, accidit. Eam Plinius, Theophrastusque tritico similem & hordeo dixerunt, ab Homero nullo non fere carmine laudatam. Posteriores non tam nunc frugem, quæ Speltam rura nostra appellant, esse eam existimauerunt. Nec huius scriptoris descriptio & historia, ab ea seminis forma penitus distat. Plinius in Italia, præsertimque in Campania feliciter prouenire lib. 18. ca. 8. testatus est: priuatimque semen appellari perclarum, ut ille ait, re. Quam in medicina ueteres grecorum medici, tritico similes habere uires dixerunt, medioque inter calorem & frigus temperamento esse. Ex hac fieri Alicam, non secus quæ ex hordeo, idem Plinius testatus est. De qua non multo post dicemus. Esse autem tritico similem Zeam, Theophrastus præcipue, s. de plantarum historia uolumine ostendit.

18. p. 100

De crassiore Farina. CAP. C.

Crimnon crassior est ex Zea, triticoque farina, ex qua pulstem faciunt. Abunde alit. Facile conficitur. Aluum uehementius adstringit, si Zea ex qua fit, prius torreatur.

BARBARI COROLL.

Crimnō fortasse hoc est, quod Cremor latine dicitur, ut succus à cremore differat sola crassitudine. Interim confunditur. Cornelius Celsus cremore pituitam pro succo fere accipit. Crimnon & Hordei genus est Phōnion, et Cyceonis homerici liquamentum, Hippocrates Crim-

nodeas urinas pro crassiss, & ad similitudinem farinæ tritici corpulentis accepit, ut Galeno placeat, in Aphorismis, sicut alias eruo, alias frondib, alias fursuribus haberi similes docemur. Nā Crymodes aliud est. Ita uocatur febris quæ pulmone, sacris ignibus correpto prouenit: sicut Lepyræ, quæ stomacho, & Typhodes, quæ iocinere. Pultem Græci Polton, et Poltarion appellat. Plinius, Calidam inquit potionem in pultario poposcit Ofilii. Vt Pultarium aut pro uase, aut pro sorbitionis genere accepit. Puls certe, ut Aetio placet, omnis sorbitio uocatur, quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquendo in succum resolutis conficitur.

EX M. VERG. COMM.

Aris, non naturæ opus Crimnon quondam fuit, idem Romanæ Pulis, qua quondam Græcia pariter & Italia pro pane usa est: manifesteq; id Plinius lib. 8. cap. 5. testatur, Pulse, non pane longo tempore uixisse Romanos dicens. Translata deinde ad medicinam res est, relictaq; uetere appellatione, posteriores Græcorum medici, non crimnon, sed *πολτόν*, aut *πολτάριον*. i. Pulse, aut Pultriculam appellauerunt. Sic Paulus Aegineta, sic ante eum Galenus aliquando dixerunt. Fieri autem solitam præcipue ex hordeo, nomē testatur, *ἐκ τοῦ κριθῶν* enim, id est, ab hordeo, *κρίμων* dicta est. Vtilior deinde deprehensa fuit quæ ex Zea, & Tritico fieret. Qualis deinde ea esset, satis hic ostendit dicens. Crassiores q; farina sit cōfectione, trituraq; Crimnon esse. Post hunc Paulus Aegineta lib. 6. de eadem agens, Crimnon, id est, Pulse, appellari ait, quod ex Tritico & Zea crassius esset. Cæteri Græcorum medici eam his uerbis diffinierunt. *κρίμων καὶ πολτόν τοῦ παχυμύρου ὅστις ἀνομάζεται πῦ, τι πυρίνῳ καὶ τοῦ τοῦ ζείου ἀλεῖρον*. Quod est, Crimnon, siue Puls dicitur, quod in Tritici & Zeæ farina crassum & crassiorum partium est. Poteritq; quæta & qualis hæc crassitudo farinæ in Crimno sit, cupiens nouisse, si quas Hippocrates, & posteriores Græcorum medici *κρίμωνόωδον* urinas appellant, aliquando uiderit, in quibus corpulentioris farinæ similes nubeculæ apparent: quasq; Plinius lib. 23. fursures, & nubeculas appellauit.

De Siligine. CAP. CI.

Et DE M generi Siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. ἐλυσσ
In panes ut Zea cogitur. Fit quoq; e Siligine crassior farina, quam B
Græci Crimnon uocitant.

BARBARI COROLL.

Olyra, Siligo à nostris uocatur, autore Plinio. Catoni quoq; genus est tritici. Siligo locis apertis, celsisq; ferenda, & ubi sol q̄diutissime sit. Vitium est Siligo tritici. nam omne triticum solo ulginoso, post tertiam sationem, conuertitur in Siliginem. Est & Olyra Galbarum propria quæ cognominatur Arinca, uel Italici copiosa. Theophrastus Olyram folliculo describit multiplici, ut Tipham, sed Bromo & Zea molliorem, infirmio remq; Sit autem Siligo, quam nunc rustici Secale uocant, ambiguum est quibusdam, nō mihi. Plinio certe farraginis & pabuli genus est Secale nominatum, occari tantum desiderās. Hoc inquit Taurini sub Alpibus Asiā uocant, deterrimū, & ad arcendā famiem utile, fecunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiscetur huic far, ut mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoq; ingrassissimū uentri est. Nasct̄ qualicūq; solo, cum centesimo grano, ipsumq; pro letamine est. Farrago autem excrementis farris prædensa seritur, admixta aliquando & uitia. Eadē aliqñ in Africa sit ex Hordeo, unde hordeacea Farrago dicitur. Hæc esse puto, quam Græci uocāt Cratin, ut est apud Aristotelem, siue quod idem est, Grastin. Interpretantur enim Grastin, uirēs hordeum. Alij Crastin dicunt, & fenum semianidum intelligunt, utiq; Pollux, quod & Poam, & Chilon uocant, atq; Chonton. Fit igitur optima Farrago, cum catherini hordei. 10. modijs iugerum obseritur. A farragine Farraginarum deducimus, pro loco ubi Farrago seritur. A Siligine differat radica: quam pastores Consiliginem uocant, in Maris montibus frequentem, omini pecori maxime salutarem. Corrigendus in Columella est locus, ubi de Consiliginis usu loquitur, circūscribendum esse ita, manante sanguine, tanq; oliæ reductum appareat. Legendū est, Tanq; o, literæ ductum appareat. Hoc in transitu monuisse quid officiet.

EX M. VERG. COMM.

Congener, & ut Theophrastus ait *ἐμαϊόπυρον*, quod est, tritico similis Olyra est. Semen eius antiquiores Græci figura inter triticeū & hordeaceū tradiderūt. Longa est Olyræ in Plinio historia: nec in Theophrasto breuis. Collectaq; ex his scriptoribus simul oīa, eā indicare frugē uideatur, quā nostra tempora Secalem uocāt: non tñ id pro cōperto habemus. Quod certū sit, inter tritici gñā, aut tritico similia ab omnibus numeratur, Græciæ magis & Aegypto q; Italiæ pecu-

Cliaris: & ob id in gentibus illis feliciore prouentur, magisq; nota, Siliginis nomen huic aliqui etiam communicauerunt. Sed si Columellæ grauissimo rei rusticæ scriptori credendum est, Siligo secundæ conditionis triticum est. Verba eius sunt. Triticæ genera plura cognouimus: uerū ex his maxime ferendum est quod Robus dicitur: quoniam pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Habent nihilominus qui Olyram siliginem non dixerunt, Latinos alios autores, quibus tueri rem suam posunt. Sed nos, qui ex professo hæc docuerunt, libentius sequimur. Vagæ rerum in gentibus appellationes, nec ubiq; eadem res, diuersitati, & incertitudini huic causam dederunt.

A **De Athera, idest, tenui pulicula. CAP. CII.**
ἀθήρα **ATHERA** ex Zea fit tenuissime molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pulicula infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

EX Olyra Atheram constare Plinius, Dioscorides e Zea scribit. Actius etiam ex amylo. Familiaris Aegyptio Athera ex Siligine, hoc est, Olyra, quæ ut dixi Arinca dicitur. Iulius Pollux, Atharen uocat pultem e miliacea farina. In Plauto, Atharathrion compositum uidetur ex Athara & Thrio, quod placentæ, aut libi genus est, dictum a folijs fici, quibus circumdatur: aur seorsum utrumq; legant, qui eius poetæ studiosi sunt. Potest & Athara, & Oathrion legi, ut est apud Alexin comœdiarum scriptorem. A quo locus is in Plauto festiuissimus, ex persona coci sumitur: qui & Candauli mentionem habet. Erat autem Candaulos, siue Candylos, miscella ex carne cocta, pane, caseo phrygio, ut Athenæus inquit. Vt Photion, ex lacte, ac melle: qui & Amæta cem tradit heroi cum edulium fuisse. Dicitur & pinnula ea quam sub uentre habent rhynnides, Athera, ut inquit Aristoteles, sed ut sit Tribrachys.

D **Non uidetur Athera hæc a Pulte, nisi liquidiore habitu differre. Nec Paulus Aegineta aliter eam sexto uolumine descripsit: puliculam sorbilem ex tritico, zeauæ emollitis confectam esse Athera dicens. Obseruauimus tamē ex olyra, amylo, & milio factam pultem, Atharam pariter dici. Plinius Aegyptiorum uocem Atharam esse dixit, 22. uoluminis ultimo capite: a græcis tamen recepta, non ad pultem tantū, sed ad tubercula quæ in homine aliquando extolluntur ea uox est, quibus quā subest ueluti tenuis et dilutior pulicula, ab Athara hac Atheromata int̄ abscessus ab antiquis græcorum medicis dicta fuerunt: de quibus certius cum primum dabitur occasio dicemus.**

T **De Trago. CAP. CIII.**
τραγός **TRAGOS** quandam Halicę figuram gerit. Multo minus quā Zea nutrit, q̄ multum aceris habeat. Quare ægrius conficitur. Aluumq; magis emollit.

T **BARBARI COROLL.**
Plinius lib. 18. **Ragos** cognomine Sitedes, hoc est, Cerealis, ut ab herba Trago distinguat, frumenti genus est. In Hippocrate quid sit Strygis, quod ipse leuius esse tritico, & uentrem magis soluere testatur, non comperi, nisi quis pro Trago Strygit capiat.

EX M. VERG. COMM.
Non habet in græcis unam significationem tantum Tragus, sed animal, herbam, frugem, & qui sub alis sentitur uirosi odorem significat. Ideo in frugis significatione, Tragon εἰς ἄνδρα id est, Tragum frumentaceum ueteres aliqui frumenti genus hoc appellauerunt, peregrinum Italix. Cuius breuissime Plinius meminerit, nec ultra q̄ ut diceret, ex omni eo dem genere grani prætulit Oreuntium, & Tragum. &c. locus est libro decimo octauo, capite septimo. Quinctiam capite eiusdem libro decimo. Inter peregrina Italix tritici genera Tragus hic numeratur his uerbis. Adijciunt his genera bromos, siligo exceptitia, & Tragos externa, omnia ab oriente inuecta. Est & illud ex eodem Plinio intelligendum, non frugem tantum ipsam, & tritici genus Tragum dici, sed quæ ex semine eius prisanæ similis ad medicinam conficeretur farina. Verba eius eodem capite sunt. Prisanæ conficiendæ uulgata ratio est: simili modo ex tritici semine Tragum fit in Campania tantum, & Aegypto, Hic Tragum figura similem Chondro ait, non

fatis certo intellectu, similem ne frugi dicat, quam græcorum aliqui Chondron, id est, Far no-
minant, an Alicæ, quæ passim Chondros etiam uocatur. Vtrunq; enim Chondros in græcis
significat: si qua hic usus est uoce *χῆμα*, & eius tota significatio expendatur, ad frugem potius,
q̃ ad alicam referenda similitudo uidebitur. Frugis enim figura aptius q̃ alicæ dicitur. Si ea
quæ mox hic de Chondro ait, ad alicam magis q̃ ad frugem, Chondron siquidem alicam, non
frugem uocat, Nobis inclinat animus ad frugem magis, q̃ ad alicam referri oportere, Legenti-
bus tamen & hoc liberum relinquatur.

De Bromo.

CAP. CIII.

Bromus genicula quædam habet. Folio & stipula triticum imita-
tur. Et in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas ge-
rit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata uti hordeum. Pul-
te huius alius sistitur. Prodest tussientibus in sorbitione succus.

BARBARI COROLL.

Bromos correpta prima, semen est spicam ferentis herbæ, de qua & libro quarto seposita
mætio est: hic enim de grano ipso potius, quia sit inter fruges, disseritur. Semen hoc natura ma-
xime operuit, ut Theophrastus inquit. Radice copiosa innititur, multiplici culmo sparsa, syl-
uestri fere habitu, quasi ægyptos, inter uitia segetis, auenæ modo nascitur, dependentibus, ut
Dioscor. inquit, locustis, ut Plinius, solijs, Poëtæ Bormon, & Bormacem quoq; dicit interim.

EX M. VERG. COMM.

Quis non credat, Hauenā. cūctis notissimā frugem, hoc capite a Dioscoride describit: tam
apposite in eo pictura naturæ nōdet. Quis etiā in hoc scriptore adeo incautus fuit,
ut quæ inter Bromon, & Aegyloper, alterā in frugū, alterā in herbarū genere discrimina sunt,
non facile sola eius lectione statim intellexerit? Toto em̃ genere, & partiu notariq; historia disse-
runt. Hæc inter congeneres fruges a Dioscoride numerat, & describit, magno argumēto Bro-
mon Hauenā frugem esse: illa inter herbas. Hæc culmū habere dicit: illa *ἁρόδανος*, id est, Herbula
appellat. Hæc in summo dependentes paruulas ueluti locustas, duplici crure diuicatas habet,
in qbus semen est: illa in cacumine *καρπώδης*, id est, qd semen cōtinet, duos, tresue colore rubētes
habet, ex qbus ariste capilli figura prodeunt. Hæc in medicina ad cataplasmata & tussim utilis:
illa ad oculorū ægyptos, & discutiendas duricies uim habet. Et ne longiores simus, quis non
credat aliā ab Aegylope Bromon. i. Hauenā esse: si Paulū Aeginetā. g. uolumine legerit seor-
sum de utraq; agentem: & utriq; quæ sua sunt assignantem. Hanc similes hordeo uires habere,
quibus leniter & sine erosione siccet, habere iridem aliquid quod adstringat, eamq; ob causam
alui fluores compescere: illam discutiendi tantū habere uim, qua duricies, inflammationesq; &
oculorum ægyptos sanat. Erit quarto uolumine in Aegylope iterum de his dicendum: quæ
nunc causa est, ne in re nota ultra q̃ deceat immoremur. Quodq; nunc dictum est eo pertinet,
ne quis ex eo quod Barbarus in Dioscoride ait, Bromon Hauenæ genus esse, & in Corollario
de grano tantum Hauenæ dici hoc loco, de herba autem in quarto, eandem Bromon & Aeg-
loper huic scriptori esse opinetur, & hic de semine, in quarto de planta sub diuersis nomini-
bus actum a Dioscoride fuisse.

De Oryzā.

CAP. CV.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Medici
ocrem cibum præstat. Sed aluum supprimit.

BARBARI COROLL.

ORyzam, Theophrastus Oryzon uocauit. Quidam Ordeum galaticum, quia graue sit
atq; candidum, appellant. Peregrinum initio semen, ex Indiaq; illatum, simile Zeæ aspectu lo-
lij, magna parte in aquis cubitorum quaternum altitudine: cæterum effundit non spicam, sed
milij modo ac panici iubam. In Baſtrianis quoq; ac Babylonia, & Suside, atq; Syria inferiore
gignitur. In Italia uero multis locis. Indi hanc Farris, seu Zeæ modo pistam reddunt concoctū
facilem. In eadem gente Bosmorus, frumēti religiosi genus traditur, tritico minus. Inter amnes
prouenit, excussum areis retoretur protinus. Iuramentorū adiguntur messorēs, non absporta-
turos id se prius inde, q̃ coxerint: ne semen in alias terras cōmunicari possit, Strabo auctor. In
Diodoro Bosporon, non Bosmorton corruptis exemplaribus inuenias.

C Nota omnibus etiam Oriza, parati & quotidiani in sanitate usus, præsertim quibus locis abundat. Descripsisse eam inutile, & inanis iactantiæ fuerit. Quod uetères Græcorum medici ei tribuerunt, est: ægre concoqui Orizam: exigui nutrimenti esse: & quod hic ait, aluum subprimere.

xordpoo

H De Halica. CAP. CVI.
Alica fit ex Zea, quam Dicocon appellauimus. Plus alit quàm Oryza. Aluum magis cohibet. Stomacho longe utilior. Decocta in aceto, illitaq;, lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægylopijs medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, insulsum idoneum est.

A BARBARI COROLL.
Alicam Theodorus hanc interpretatur, quam Græci Chondron uocant: quod & Plinius quandoq; facit. Paulus Alicam differre a Chondro putat. Alix inquit, similis Chondro est natura: nisi quod uentrem magis subprimit. Plinius, Alica inquit, res Romana est: neque Pompeij magni ætate in usu fuisse traditur, pisanaq; antefertur sine dubio. Pisana Græcum uerbum est, & Pisana quoq; dicitur, & olim græce Besana, Chondros porro, ut Paulus ait, similis est tritico, plus tamẽ lentoris habet si comanducetur. Hippocrates Chondron dicit esse utilissimi cibi forbitionem. Aetius Chondrum Alicæ cum dicit, Pisana ex Alica significat, hoc est, Alicam farinis, modo frefam, in forbitionis usum, ut pisana. E Zea pista quemadmodum Chondros fiat, ut ex Olyra quoq; generosa Tragos, rei rusticæ scriptores Græci produnt. Inuenio & Hadron dici, quæ sit Chondros, Alix, & Alicion uocatur. Quod Alix Callimacho pro Chlamyde accipitur. Thesalico uocabulo Chondros, & cartilaginẽ significat, & nucleum in ture, præsertim ceu quendam callum: quæ & Pyrena Hippocrates appellat. Oino Chondros ea frumenti species a Græcis intelligitur, quæ a nostris Far, siue Farrum uulgo nuncupatur. Archigenes Far Chondro potius simile, quod idem uidetur existimasse, Far inquit Romæ, ut Chondros, Græcis conficitur sanitatis usu. Frumentum aqua maceratum nudatur cortice: mox siccatum in sole tunditur, sed leuiter, ita ut singula grana in partes quaternas, quinasue dissiliant. Idem Archigenes (ut meminit Aetius) pulte ad dysentericos, ex Farre quemadmodum conficiatur docet. Ad eumq; usum Far, inquit, clusinum desydero. Ita enim legendum credo, non illiusum, ut omnes Græci habent codices. De clusino Farre dictum est supra ex Columellæ sententia.

R EX M. VERG. COMM.
Romana res, inquit Plinius, Alica est. Nobis eam cognouisse Hippocrates etiam uidetur, multo ante eum medicinæ professus. Plures fuerunt latinis & græcis Alicæ confectiones: quas fere omnes idem scriptor lib. 18. cap. 11. prosecutus est. Quam tamen ille confectionem cui Gypsum adijceretur Africæ assignat, Græci ut suam uendicant: & hoc modo conficiunt. Tunditur Zea: tusaq; in calidam coniicitur aquam: statimq; exprimitur. Mox tusum in tenuissimum pollinem album, illi gypsum exigua quantitate additur: adpersoq; itidem sale sub ardentissimo canis estur, ne ace scat, insolat: & cum insolata fuerit, cribratur, & seruatur. Hæc nos ex græcis collegimus: quibus non dissimilia Plinius antedicto uolumine narrat: quæ relinquimus omnibus parata, & in eo scriptore exposita.

uixpoo

M De Milio. CAP. CVII.
Milius in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Sistit pulte sua aluum. Vrinam cit. Torretur Milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus auxilio sit.

BARBARI COROLL.

Milius intra quadragessimũ diem metitur. Caulis ei harundineus. Flos lanugineus, ut frumento, largior aquatio detrahit folia. Plus centum manet annos, si condatur quo uenti non perueniant. Nihil leuius, mollius, aut caloris capacius Milio est. Farinã milicæam, seu fractum Milium, sunt qui Scutum uocari putent in Horatio. Sunt quibus uasis potius appellatio ea uideatur, ex Scroto, id est, corio confusi: quod genus Græci Thylacos, id est, folles, & quasi pasceolos dicunt. In quibus tamen, ut est apud Aristophanem, panis quoq; seruabatur: cuiusmodi & Panarium, & Pa-

nariolū a nobis cōmode uocari potest, quacūq; cōfiet materia: quæ uox in Varrone, & Papi-
nio pœta, & Martiali, Suetonio, Tranquillo legit. Nos de Scruto quid sentiamus in Cicere di-
cimus. Nam Miliariū uas a pondere, non a Milio nomen habet. Est autē, in quo excalescunt a-
quæ, ut Athenæo placet: qđ e Græcis aliqui appellant Ignolebeta, id est, caldariū. Porro Miliū
a miliaria summa deriuatū, non a græco, Festus existimat: apud quos Cenchros, & Strabonē
Cenchrys dicit. Hippocrates Paspalem uocauit. Varro Miliū a græco deducit. Nam id Meli-
niem inquit uocat. Dioscorides & Theophrastus Melinē, pro Panico intelligūt. A Milio, atq; uas
quedā Miliarie dicunt, ut eide Varroni placet: quas ego non ausim eas credere, quas a Mi-
lio Græci Cenchridas appellant: q̄ illæ uideantur in latino Tinnunculi uocare.

EX M. VERG. COMM.

Milio posteriores naturam & uires assignarunt, refrigerandi in tertio, siccandi uero in se-
cundo ordine. Habere præterea uires extenuandi aliquas Milium crediderunt, nihilq; ad con-
cipiendū & retinendū calorem aptius eō esse.

De Panico.

CAP. CVIII.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eo-
demq; modo in panes subigitur. Eosdem habet usus. Minus ta-
men & nutrit & stringit.

BARBARI COROLL.

Panicum Helymos, etiam Melinos a Theophrasto dicitur. Melinos porro cantionis græce
nomen est. Item Elynos, siue Linos, lugubris eiulatus, quē nos Lessum dicimus. Tibiæ genus
quoddam apud Sophoclem uocatur Helymos, ut in Harundine docuimus. Quadagesimo
die absolui constat, ut æstiuā omnia. Calamus harundinis, ut miliū. Flos lanuginis. Durantissi-
mum inter fruges Panicum. Ideoq; Diocles medicus, Mel frugum merito appellauerit. Seras
uermiculos, e quibus Sericum uellus metitur, Panico ali quadriennio apud Seras populos,
tradit Pausanias: quinto anno Harundine recēti, quam prædulci pastu, uidiū carpentes dis-
siliant. Alioquin non ultra eam finem uicturi. Ex utero Bombycem eam peccī, multo fertiliō-
rem q̄ uiuentium, detractam pedibus, quos araneorum modo sub arbore textentium oñones
habeant. Esse autē corpus ijs amplitudine scarabei maximi. Seras ipsos in Aethiopia sinum ru-
bri maris in timū colere, uel ut alijs inquit, placuit, in Scythia Indis cōtermina, qua insule iā-
cent Seria, & Abasa, & Sacæa, nihil contendo, uerum, falsumue dicat. Scio & ab alijs de hoc iā-
tata. Illud testari bene est, Seras uermiculos, iam pridē in Italia tam multos alī, Vicentino ma-
xime agro, ut non aliare prouentus quibuscūdam maiores consent. Sed hos non Panico, non
Harundine, sed Mori folio uescit: ob id, multis locis plantaria sunt eius arboris frequentia. Cir-
cā Mediolanū quoq; Abiterno agro feritur, alias non magnopere in illis uisa regionibus, nunc
crebra in latifundijs Ludouici Sfortiæ, clari ætate nostrā Principis, prædijs eius ad Ticinum
amnem, uilla magnificētissime substructa.

EX M. VERG. COMM.

Fœminino genere Melinen, & masculino Melinon, Theophrastus Panicum notissimam o-
mnibus frugem uocat. Romani a paniculis in quibus semen est, Panicum appellauerūt.

De Sesamā.

CAP. CIX.

Sesama stomacho inutilis cibis. Halitus grauitatem facit, quoties in-
ster mandendum commissuris dentium inhaeret. Nerviorum crassi-
ciem illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationi-
bus, coli doloribus, & cerastæ moribus. Capitis dolores, qui æstuatione
ne concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in uino. Præ-
sertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit ole-
um quo Aegyptij utuntur.

BARBARI COROLL.

Sesamum, & Sesama uocatur, & Plauto pœtæ Sesuma, caule serulaceo, flore foliaceo, ut
Ision. Quadagesimo perficitur die. Genus ex eo candidum præfertur dulcedine: quod & in
ceteris leguminibus contingit. Grana eius in siliquis distincta, ut Lupini, sed peculiari quodā-

C modo septa. Viride nullum attingit animal. Nihil ita emacrat solum: ut pote cui crassior & multiplicior harundo sit q̃ Milio, & radix quoq; numerosior, Sefartia, & Sefania quandoq; le gas corrupte in Columella, pro eo quod est Sefama.

E X M. V E R G. C O M M.

D Efficit iam pridē feri in Italia Sefamū, neq; inter fruges nostras numeratur, pauloq; minus q̃ peregrinum, & alienum modo nobis est: quondā tam cōmune, tamq; omnibus agris satum, ut aqua esset huius & aliarū frugum cura. Indicantq; id quæ tam multa de semente eius a Columella, Plinioq; & ab alijs docentur. Nouerunt tunc omnes Sefamū, nunc cum fruge multis locis nōmen etiā ignoratur. Et nisi ex Græcia repetatur, & Aegypto, quibus regionibus adhuc feritur & abundat, nulla fere erit quæ ab hoc & alijs Græcorum medicis Sefamini olei ad medicinam utilitas ostenditur. Frugis oēm figuram Plinius lib. is. capi. 7. apūssime & felici pictura descripsit. Ideo nos nihil de ea repetemus: dictū ab eo tantū adiicientes, candido colore semēt eius esse, dulce simul & odoratū: quod minores aues, quales fringillæ, passerēs, & cardueles sunt, auidius appetunt. Græcia omnis eo ad dulciaria utitur in panificio tritum, reliquo pani compinsentes: mox in summa panis cute integrum addito liquore aliquo inspergentes, ut retineatur, & in coctura pani concorporetur. Aegyptus oleum ex eo exprimit, quo in cibo, & omni alio domestico usu utatur, tanta copia, ut amplissima latifundia nulla alia fruge uiriant. Nostra ætas, ut paulo ante diximus, uix nōmen eius audit, & si aliquando utatur.

¶ De Lolio.

C A P. CX.

λίγα λήγος

L Olium quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, uetera ulcera, gangrænascq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenas. Et ex aceto & sulphure uiuo, lepras. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino. Abcessus etiā rumpit, qui ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, utilissime schiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrhā, aut croco suffiatur, conceptionem adiuvat.

B A R B A R I C O R O L L.

L Oliū e Tritico & Ordeo, corruptis uligine seminibus, e lino quoq; nasci non desunt qui affirmant. Negant uernā esse frugē, sed hyeme statim ineunte proflire terra, folio angusto, hirsuto, pingui, non tunicis, ut Avena multis, sed nudū: nec ptunditur. Quidā non ex tritico, aut ordeo, sed inter ea, ut in Sicilia Melampyron puenire putant. Inter Lolia flosculi uisunt, e carne tantū, non e cortice atq; uena, ut cæteri. Loliū Græci Aerā uocant, etiamsi Calimachus pro pila quoq; & globo Aeram accipit. Plinius certe aliud uidet genus existimare Loliū, aliud Aeram. Vnde farina Aerina dicit, Aeræ inquit granū minimū est, in cortice aculeato. Cum est in pane, tam Aerā q̃ Loliū inebriat, celerrimeq; uertigenes facit. Ajunt in Asia & Græcia, balneatores ad pellendā turbā, solitos Aerā inijcere carbonibus. Triticiū hæc circūligando se firangunt, Plautus quoq; Loliū oculis officere testat in Milite: q̃q; non Lolio, sed Oleo corrupte legebatur hoc modo. Mirus oleo uisitare, & tam uili tritico. Quid iam? quia lusciosus es.

Sed scribendum ita fuit,

Mirust Lolio uisitare te, tam uili tritico.

Et reliqua. Ouidius,

Et careant Lolijs oculos uisitantibus agri.

E X M. V E R G. C O M M.

I nter uicia frugum & noxas Loliū est, omnibus notissimum, macro solo plæruncq; proueniens, & cum degenerauerunt uicio aliquo frugum semina, inter eas nascens: neq; enim solum in triticea, sed in omni fere alia segete & per se etiā prouenit: frugum acerba pestis, ideoq; a Poëta infelix appellatum.

¶ De Amylo.

C A P. CXI.

ἀμύλλον

A Mylum ex eo appellatum est, q̃ sine mola fiat. Optimum ex tritimestri, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciendi Amyli hæc est. Purgatum trimestre tritūcum madescit quinquies in die, & si

fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quo minus cremoris dulcedo una excludatur. Vbi mollißimum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursum infusa, teri. Tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. Reliquumque quallo, sportisque siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole. Namque si paulisper udum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, caucaeque efficax est. Sanguinis reiectiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. Lacti atque obsonijs ammiscetur. Fit etiam Amylum ex zea, quae maceratur, ac eluitur uno aut altero die, & farina modo manibus subigitur: pressaque feruentissimo in sole, ut ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina usus. Ad alia tamen conueniens.

AMYLUM ex omni Tritico, ac Siligine, ut Cato uoluit, sed e Sitatio, i. trimefri: quod item Siliginis genus est laudatissimum. In uetio eius Chio insula debet, unde commendatissimum Plinii temporibus. Probat leuitate ac laeuore: utique recens sit. Quia uero etiam Placentae genus est Amylon, de Placentis agere tempus est: quod & in Tritico pollicitus sum. Ergo patriae nomen habent Paria, & Samis, & Rhodia: quae & Coptam, & Coptoplacunta noiant, insignem duriciam, ut Martiali placeat: Accipiebat haec & papauer, & mel, cui simile uidetur. In Festo Coctum dici legimus, & alibi Coccentum. Alexandrinis Pancapra celebrabat, in modum rotae Papyro inuoluta diuturnitatis gratia. Similis haec res erat, quae Itria dicunt, & a festo Sumenalia, ut coctio, quod sumen *ῥῆπος* dicat. Constabat autem Itrion, sesamo, ac melle. Quod & a sesamo & Sesamites, & Sesamides pilari specie appellant. In noie sunt & Amæ Ionis, quae alij Ametas, & Amerisicos uocant. Sunt & Splenia colore candida. Habent & Amphiphontes, sacrum Dianae ferunt, faculis urentibus circumdatis, ut Bassinae, iridi, ex triticea farina cum melle. Celebrant & Thymatides, & Samiae, & Philoxeniae. **B** & Coccora, quorum meminit Demosthenes in oratione per Ctesiphontem. Sunt & Tagethiae, quae & Enchyridas uocat Pollux. Apud Catonem est, quod uocat Enchyton: cuius & Menader meminit. Aliud hoc, an idem sit genus cum eo quod Epichytes dicit, aestimandum relinquo. Phorion nihil distinguit. Pollux uidetur seungere. Epichytes certe, atque Anites quoque noiant, ut Paphilus existimat. Caerontang sunt & Spira, funi nautico in orbe conuoluti similis. Et Globi, siue Globuli: fortasse is, quae Syracusani Epicyclios uocabant: Nam pastillum in sacris libi genus rotundum erat. Item Erneum, & Sphaerite, & Scriblite. Item Sauillum: quod Athenaeus Subityllum noiat. Et ex balica quoque fieri monstrauit, Aelius silo Subuculum uocari scribit. Libi genus ex halica, oleo, atque melle, ut Festus inquit. Chrylippus multa res genera adiungit. Tarentinum, Crassianum, Siculum, Crustulum, Iulianum, Apicianum, Canopicum plucidum, Cappadocium, Hedybion, Maryprum, Plieum, Guttatum, Montianum, Coerianum, Turtatum, Tabonianum. Tria haec postrema Crustulaceae sunt generis. Iis adicit Mustaceae, e mullo, quorum hodieque in lumeni agro usus. Mustaceae, Sesamata, Purium, Gorgioianum, Paulianum: & haec quoque Crustula. Iam Lucetulae, Argyrotyphemata, libi Circi, siue Circuli, adempta farina, & aqua, & caseo: quae circuitum aequabiliter fundebat hos quidam, qui magis incendere faciebant: & Lixulas, & Semilixulas uocant, ut Varro inquit Sabino uocabulo. Exaphis, Crustoplacutes, Oryzites, Phthoes, Ostracites, & quae Catillus ornatus a Romanis dicit, lactucas, & piper, & axungia accipiens. Fit ex siligine. Post haec sunt Creion: quae apud Argiuos sponse ad sponsum ferunt. In carbone coquit. Glycinas ex passo & melle, Creensibus familiaris, eademque fere cum Mustaceo, quod ex mullo fieri docuimus. Empemptas uero triticeus panis est cautus, ut in quae Placentae caesariae, ut in theca recondi soleant. Encris in oleo primum coquit, mox accipit mel. Habet & Panis hoc nomen, ut diximus in Tritico. Cyribanae Lacedaemonis sunt, propter in conuiujs foeminarum circiter solite, cum uirgo laudanda esset a choro muliebri. Crimipites, a Crimino fit, de quo supra diximus. Strectes ex pingui, melle, caseo, ac sesamo conficit. Erat & panis nomen Strectes. Charistos Aristophani Placentia est, panis Eubulo. Praemium hoc in puigillis dabant. Apud nos hinc fortasse Chthaliones, quasi Charitiones appellati ex amygdalis, & saccharo, nec alia fere materia quam Mazapanes, sed oblongi, fastigati: in medio quasi delibescens crusta tumet. Ex eadem miscella sunt & Fungi, sollicitudine matronali cum feriantur, praetatis semper quos sanctumoniales ipsae

A

Pli. li. 19. ca. 78

De Placentis.

B

C finxerint. Epidatron sub finem coenae mensis apponebatur: unde nomen. Nanos panis uide-
tur placetaceus magis q̄ placenta, constat caseo & oleo. Psorhia, siue ut alij Psathyria, sunt qui
micās panis, quas & Attaragos uocant, ita nominatas putent. Attaragus porro & pro rimula
in pane ignis ui facta capitur, & oīno pro uilissima & minima quaq̄ re: ut Ec̄ta apud nos: unde
uerbum Ec̄tafacio, de quo Festus. Polluci Attaragos est superior in pane crusta, sicut in ima E-
psethia. Sunt qui genus placenta fecerint. Taganitae a patellis ac sartagine dicuntur. Elaphos,
a mensis nomine quo fingebat. Sicula est Amor bites. Aliud ab hac genus est Amoras appella-
ta. Oedepesia Cōi celebrant. Syracusani Myllos, ex sesama, & melle, muliebribus pubis specie: q̄s
foeminae Dearum focis & altaribus circūferant. Nastos e nucibus & intestinis, & farilibus, ad
iecto melle fit atq̄ lacte. Vnde dicitur Nastos, quasi sartum. Ab Erinaceo nomen Echinus ha-
bet. Ab Hemina Coryliscus. A tritico Pyramuntēs, & ab ijs diuersae Pyramides, fortasse haud
ijs dissimiles, quas Caro Graneas triticeas appellat. Pyramides porro in peruigilijs dabantur:
quasi praemia ijs, qui nocte tora insomnes excubassent. Quidam tamen & Pyramuntas hoc ge-
nus uocabant. A caseo, & usu cribri Tyroscocina dicunt. Ab ijs differunt Hypotyrides appella-
tae: quas e caseo, lacte, ac melle condūt. Nam Pityrides, siue ut alij quidā legunt, Epityrides, &
Epityra, oliuae genus est: ut aliubi docuimus. In Creta fit a uentre, Gastris uocata, e nuce, tha-
sia, & auellana, & amygdala, & papauere. Item pomis, & sesamo, & pipere quadrangula figu-
ra. Ab ijs est Postos dicta: quam nos Pulrem uocamus. In Catene quidem punicea fit Pulus
mentio inter Placentas: forte non dissimilis a libo eo, quod punicum uocabant, q̄ ex Africa
uenisset, & Probum cognominabatur. A melle Melicerides. A suisbus Chœrinæ. Latina sunt,
& sacris dicata libi genera quae Fertum, & Strues appellātur: unde Strusetani, qui ea ferre con-
sueuissent. Strues uero dicebatur, q̄ erat digitorum coniuñctorum similitudine: qui superie-
cta panicula, in transuersum continebantur. Item Libum farreum a farre. Libum uero, q̄ pri-
us libaretur q̄ esset coctum, ut Varroni placet, dictum est.

De Fœni græci Farina. CAP. CXII.

D Græci Telin, alij Carpon, alij Buceras, alij Aegoceras, Latini Fœ-
num græcum appellant, Aegyptij Itasin. Vis farinae est mollis-
re, dissipare. In aqua multa decocta aduersus tam internas, q̄ externas
inflammationes efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita ex-
tenuat. Succus decocti eius, foeminarum malis subuenit, & siue tumor,
siue praclusio sit uuluae, fouentur, & insident. Decoctū cremor, capillos,
furfures, & manantia capitis ulcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum
anserino adipe pessi uice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimū imbeci-
lis partibus, & ulcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tene-
smos, foetidamq̄ dysentericorū proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur,
ex myrto, capillos & genitaliū cicatrices abstergit.

B A R B A R I C O R O L L.

Plin. l. 24. ca. 19:
Columel. li-
bro 2. ca. 11.

Fenum græcū a Theophrasto Buceras uocāt. Ab aliquibus Ceratits, Epicerās Hippocrati,
quoniā semen habeat simile corniculis: unde Siliquā nōnulli appellant. Plinius Siliiciam, Var-
ro Siliiculam. Inuenio & Carpum in nostris, & Græcis auctoribus uocatum: q̄ q̄ & pro balsa-
mi semine Carpum fere accipiunt. Item Carpos pro Fæno græco, quasi flocculum, siue aren-
tem furculū. Dioscorides Boton quoq̄ dicit uocatā. Quidam Lobon, hoc est, siliquam legen-
dum, non loton credunt. Ego & lotum dici posse uideo, ut in Anoni diximus.

F E X M. V E R G. C O M M.

Fænogræci a principio statim numerantur a Dioscoride aliae appellationes aliquot. Ea-
rum plures a siliquarū figura, quas corniculis similes habet, factae sunt. Neq̄ hae quidem noui-
tiae, posteriorumue temporum, sed uetustissimae sunt, & a Theophrasti temporibus. Siqui-
dem auctor ille libro quarto de plantarum historia, a bubuli cornu figura Bucceron appella-
uit. Eademq̄ ratione alij non a bubulo, sed caprino cornu similitudine accepta, Aegoceron
Fænogræcum dixerunt. Alij a cornu simpliciter Ceratida, *κίρας* enim græcis cornu est,

De Lino. CAP. CXIII.

A

LINVM aliqui Linocalamin uocant, alij Annon, alij Linton agri-
on, Romani Linum, Pœni Zeraphœs. Vulgo notum est. Cu-
ius semen easdem quas fœnum græcum uires habet. Discutit, & emol-
lit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaque
aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie, uarosq;
crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, parouidas, duricias
que discutit. Vlcerata quæ serpunt, fauosque, cum uino decoctum expur-
gat. Vngues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vitia
pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituitur. Tussim
lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placen-
ta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, uuluaq; erosio-
nibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad uulua inflammationes
in deflectionibus perquam utile.

BARBARI COROLL.

Linum, a Græco sumitur. Semen eius Linospermon appellatur. Oleo seminibus expresso,
fractes, & recrementa quoq; ipsa reponuntur, saginando iumentorum generi, præcipue bubus
obesitate sola insignibus futuris. Quales ad nos Mediolano coronati ueniunt, Principibus 3t-
annis officij gratia donantibus. Visceratione hinc solenni orta, Magistratibus diuisa carne glo-
bulis, quos quia fere pares sunt, Sociolos consuetudo appellat. Quidam nō Sociolos, sed Suc-
cidulos, a suilla uisceratiōe uocari malūt, quæ singulis annis ante Curia uenationis die agit. In-
ter Lini genera est Cholcicum: quod tamē Sardoniciū uocant Græci, Bk & Aegyptium: a quo
Xylina uestes, quas & Gossampinas dixere. Hoc iurisperiti Lanam ligneam appellant. Est aut
em Gossampinus, siue Gossipiō, siue Xylon, fruticulus e superiore parte Aegypti, etiam in Ita-
liam delatus, fructum ferens barbatae nuci similem, plenum lanugine: nec alterum Lini genus
est, quod huic candore, aut mollicia præferri putent, quanq; firmitatis in eo parū. Huius pu-
tant esse generis quod uulgo a pocilli credo forma Cothonem uocamus, siue a mali similitudi-
ne coronei, quod in eo gignitur. Id maturitate hiascēs, lanuginis pilas ostendit. Folia huic uisū
minora. Aliqui Gitonē, a Git, cui similem fere gerit in capite folliculum, appellant, Draconis
acetarij e Lini semine, ut post dicemus, nascentis, folia ipsa testantur originem.

Plin. libro. 19.
in præfatione.

B

De Cicere. CAP. CXIIII.

Cicer satium aluo idoneum est. Vrinam ciet. Inflationem pa-
rit. Colorem commendat. Menses ac partus expellit. Lac au-
get. Cum eruo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, uerruco-
sas informaciones, ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginesq;
Contra carcinomata, & ulcera quæ cacœthe uocantur, cum melle &
hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit u-
rinas, dato cum rore marino, hydropicis, aut regio morbo laborantibus
eorū decocto. Lēdunt ea exulceratam uesicam & renes. In uerrucarum
formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas
tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abijci post se præcipiunt. Ita de-
cidere eas arbitrantur. Syluestre Cicer, folijs Satiuo simile est, odore a-
cri. Sed semine discrepat. Idem quod satium præstat.

BARBARI COROLL.

Cicer Erebinthos a Græcis uocatur, Legumina gallicani, ut Varro ait, nominant Legaria.

ἑρῖνθος ὅμπερος

Theoph. lib. 9
capite. 6.
Pli. li. 19. ca. 12.
Col. li. 2. ca. 11

C Dicuntur ita, quoniam uellantur e terra, non subsecuntur ut fruges. Eadem Gelius etiam Legu-
menta nominat. Inter hæc Cicer altissima radice adhæret. Floret diutissime ut Eruum; quadra-
gesimo die uellitur; caulis admodum lignosus. Ciceris aliud Arietinum, Crios a Græcis uoca-
tur. Aliud Columbinum, idemq; Venereum, Erui similitudine, Orobiaeos ob id dictū, a Co-
lumella Punicum. Siliquæ Ciceri rotundæ. Vni leguminum florenti, pluuiæ officiant. Erucis
nascentibus, eluta falsilagine; nigrum & rufum candido ualidius, herbas omnes enecans, sed
tribulum celestissime. Siderario Radicis & Erucæ, quas aliqui Vricas, & Græce Campas uocāt,
Ciceri propriæ dicuntur. E Cicerē corrupto nullum sit animal, contra q̄ in cætero frugum
genere. Quantū hoc & seminibus olerum, & quibusdam alijs commune. Nigrescit hoc q̄ cor-
rumpitur. Durat Erui modo annos. Ciceris generibus syluestre adijcitur, a Dioscoride, Gale-
no, atq; Paulo, cuius uis alia duo excedat. Orobiaeos, siue Orobias, calidior est Arietino, sub-
amarulq; ut Eruum; unde nomen. In Columbino, & Orobiaeon, & Syluestre contineri puto.
Nasci & in India suum Cicer aiunt, diuersum omnino genere. Cæterum tam simile, ut mensis
appositum, dignosci fere non possit. Cicerculam uero Theodorus putat esse, quam Lathyron
Græci uocant, folio non rotundo, ut plurima leguminum, sed oblongo; caulis humilispens,
ut piso: quaterni & inæquales grino sunt anguli, ut Plinius inquit. Idem Theodorus, Ochron
uocatum, interpretatus est modo Eruiilium, modo Eruiale, modo Cicerum. Folio ut Cicercu-
la oblongo, uermiculatus, ut item Cicerculæ, obnoxio, secutis post imbres caloribus. **C O L V**
M E L L A quidem Cicerculam similem piso tradidit, Ciceram uero non tam leguminibus,
q̄ pabuli generibus annumerat. Nec Cicerum, sed ut dixi Ciceram uocando: quæ Bubus Erui
loco detur, fresa in Betica, nec hominibus inutilis: sapore nihil differens a Cicercula, colore etiā
tum discernitur, quo sordet obsoleior uidelicet, et nigro propior. Sunt qui Ochros etiā
Phasilos appellari scribant. Habentur & Dolichi uocati: quos Theodorus a Plinio sumptum
interpretatur Siliquas, qui & Lobi, siue Lobia nominentur: q̄ soli fere leguminum, ut inq̄r Ae-
tius, cum thecis suis mandantur in patinis. Scandunt hi pedamento cui accubant, prælongo af-
fixo: ita enim reddi putant frugi: contrahens eruginem, ni fiat ita. Semen eius æuum non patit,
breuitq; marcescit ut aphaca. Nec desunt qui Lobos, siue Dolichos a ueteribus, pro Phasiolis
dictos existimēt: et a recentioribus Pisos. Cæterum Theophrastus, & ante Theophrastū Hip-
pocrates, Pisum a Dolicho manifeste separauerunt. De Phasiolis nusq̄ meminit. Nisi quis Pha-
siolos ab eo significatos Dolichorum appellatiōe censeat, ut Aetio placere uideo. Sed nō sem-
per Paulus Pisum, & Ochros, & Phasiolos, a Lobis, siue quod idem est, Dolichis manifeste se-
iunxit. Illud quidam putant Lobos esse, nō candidos istos et triuales Phasiolos, sed rubentes
ex milace herba. Alioquin idem Paulus in quadā compositione, Phasiolos requirit albos: qua
si sint etiam nō albi, unq; ad renes. Pisus, Pisum, & Pisa uni tantum Palladio genere feminino
dicitur: cuius Africanum genus unum haberi meminit. Idem ualuulas thecasq; Ciceris, Cotu-
las appellat. Quod admonitionis gratia, non imitationis retulimus. Inter legumina & Acani
feruntur, a duricie uocari, quod eos κάθυρι, id est, frangere non sit, lenti similes, ut grammaticū
quidam interpretantur. Ego haud sciō, idem, an diuersum id genus sit ab Aracis: quos Aetius
Cathyris, hoc est, Cicerculæ, ut Theodorus uult, similes esse dixit, & usu, & uiribus: duriores
tantum, & p̄fici difficiliores. Aracos inquit Theophrastus, inter aphacas, siue lentem nascitur,
res dura & scabra, & proinde uilis. Hippocrates Aracida nominat, ab aliquibus dicta Lecithos.
Est & Aracidna, & alia q̄q; Aracos in Tubere dicenda. Quidam Lecithō p̄ genere accipiūt, ad
Pisum, & Aracum. Nec scio, an ijs assentia, qui Lecithō ab ouī luteo, cui similis colore sit Ara-
cidna, deductū putent: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe Lecithō p̄ lente, cui detracta
sint putamina, uidet interpretari apud Hippocratē: quasi λυθιδος ἢ λιαντος, hoc est, id q̄d in
tra coriū est. Proinde contrariū ei genus eculēti fortasse fuerit: q̄d Horatius illo uerū insinuat,
Vilia uendentem tunicata Scruta popello.

D

Ut Plautus quoq; Scrutea, & Collubia in hūc forte sensum appellauerit in Persa. Ceterū Hora-
tianū forte nō scruta, sed scuta legas, pro uasculo rustico. Vnde Scutiscum Catoni se penume-
ro, Matellum, Trullum, Scutiscum unum: Matellā, Trullā, Nasiternā unam. Quantū pro uase
sunt q̄ceperint Scruta in Horatio. Ceterum Collubia, & Collubiæ sunt, quæ Tragemata etiā,
& Bellaria dicunt, Ciceris fixi, uuarumq; passerum uilia munuscula, ut Hieronymus interpreta-
tur. Vnde Colybiſtas, pro numularijs mutaritiūm fontis exercentibus, uocari cæptos asserit:
q̄d genus a Polluce nominat Colybos. De Colybo & ante diximus. Propterea locū in Plauti
Persa eum, non strutea, & colluthea, ut omnes habent codices, sed Scrutea, & Collubia legēdū
putamus. Fortasse Scrutea sunt, quæ græci Cataphysmata, hoc est, missilia uocabant, spargisq;

lita: siue a uilitate, ut diximus, siue quoniam e pelliculis folliculis, quos & Pasceolos uocamus, effundi consueuissent. Quid si Coluthra legamus? cum maturas ficus ita graeci uocent, ut inquit Philemoni. Nam strutea pro eddonis quocumque sumi possunt. Apud Aristophanem & comicos Lecithopola: mulieres dicuntur, quae uilia quaedam uendunt, quasi Nugiuendulae. Sidonius Apollinaris in epistolis, nunc inquit quaedam friuola, nunc ludo apta uirgineo, Scruta donitabar, hoc est, scuitila quaedam & quisquilias, & nihili munuscula. Meleager Graecus autor, uolumen singulare scripsit, Lecithi & Phaces comparationem continens. Porro legumen omne, ut inquit Athenaeus, tribus modis manditur. Aut enim ex eo fit quod Etnos dicitur, ut ex faba bar, hoc est, scuitila quaedam & quisquilias, si placet. Quancumque quid sit Conchis proprie, dictum est a liubi. Aut Lecithos, ut ex araco. Aut Phace. Aut ex aphaca & lente: quod nos Lenticula. Theophrastus Lori aegypti radicem decoctam Lecithodem fieri cibo gratam scribit, hoc est, araci, uel leguminis alterius in modum. Quancumque Theodorus albumen oui, quemadmodum in ea uoce luteum intellexerit, uehementer miror: cum Lecithos, uellut ouii potius, quam candidum significare uideatur. Hoc primi uidimus, seu recte, seu perperam. Certe si errauimus, utilis & eruditus error futurus est. Nec illud tacuerim, Lecythion pro gutto oleario, & ampulla falso a quibusdam coepisse, Lenticulam uocari. Nescio quid perire: cum Lenticula uasculum non sit magis, quam id quod graeci Discii uocant. Defendit eos fortasse Apuleij de strigilecula, quae lenticulari forma uisibatur, aut toritas. Satis est locum notasse. In summa, Lecithos, pro legumine, aliquando pro putamine periora scribitur, pro uittello per, y, per ampulla per, u, potius quam per, y. Hec fortasse curiosius quam debui perscutus sum, sed innotandum fuit, quia & Graecis & Latinis multa hinc caligo per diu fuit.

¶ De Faba. CAP. CXV.

Faba inflationem excitat. Aegre concoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi confert. Carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice elitata, dysenterias et celiacorum profluvia sistit. Contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior intercoquendum abijciatur. Viridis plus nec gocii stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Lomentum eius & perse, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes praeduralque mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat. Lac restinguit. Furunculos, sugillata, per rotidasque, cum fenigraci farina & melle discuit. Cum rosa autem, thure & oui candido, procidentem oculos, tumores, uasque, reprimat. Subactum uino, suffusos ictu oculos recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluctiones, fronti illinitur. Decocta in uino, testium collectiones sanant. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo uetri illinitur. Vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescent, et minus alimenti capefunt. Cum polenta scisso alumine, et uetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice, in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluentionibus ab hirudine concitatis. Namque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Faba Graece Cymalos, Hellenicos uocatur, ad differendum Aegyptiae. Aul. Gdus & Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Plautus in Stich. Conuiuium, inquit, hoc satis est pro opibus nostris, satis commodule, nucibus, fabulis, ficulis. De quo & in Zea diximus, Graeci Cymalos non uocant, & primam in mamma concretionem lactis. Eadem parte scapus & radix funditur, idque in omni leguminum genere. Non diuersa, ut in frumento singularis ei radix, sed capillata fibris, ut caetero legumini. Folij exit multis, ut pisum atque cicer: non singulis, ut triticum. Die-

C Pus quadraginta floret, non uniuersim, ut frumentum, sed particularim, ut reliqua legumina: xost florem rotidem diebus perficitur, quantum legumina nulla. Differunt folio rotundo, ut maxima pars leguminum geniculato & inani caule, lignosissimoque post erit. Sola fere legumini scapo recto assurgit. Circa Philippos Ateram non uocant, in pingui solo herbam, qua necantur Fabæ. Teramon de qua in Macro. Nonnunquam porro fieri, ut Teramos in Ateram transeat, cum uapores atque halitus terræ madidam, indigena quidam uentus efflauerit, ut Theophrastum Plinius intelligit. Aliter Theodorus, qui duo illa, Teramon, & Ateramon, siue Ateramnon, pro costibili & incostibili, non pro herbis ita nuncupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facit significat, ueriores Theodori quam Plinii sensum fuisse. Ateramna uulgo legumina Græci uocant, inobsequiosa & contumacia. Quod genus seminis etiam Ceras holon uocatur a Platone, superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniant, quæ per bouum cornua ferendo cecidissent in terram. In Macedonia & Thessalia moris est, arua fabis florentibus inuertere: quia legumen id solo proficit, quasi pro stercore. Nascitur in marcescente Faba uermis, quem dixi, Mydas. Siliquæ, Fabarum folliculi sunt. Fabalia uero, purgamēta earum dicuntur, auctore Plinio. At nigrum id, quod in summa ea uisitur, Hilum uocatur: cui respondet in proverbio apud Græcos Gry: etiam si aliud significat, hoc est, unguis fordecularum. Legumina Græci Ospria, & Theophrastus Chedropa nominant. Aristophanes Beleccos, ut quidam interpretatur, Fabæ genus quod Marsicum uocat, uere feritur. Faba cum suis corticibus elixa, Conchis appellabatur, ad discrimen frefæ: nam Conchos aliud elisij genus est, ut in Hordeo monuimus. A Fabis, Fabaginem Caro dixit, & Plinius Fabalia. Interdictum esse Pythagoricum, cibo Fabam. Inualuit opinio contra uerum. Sicubi porro detestatos usum eius ueteres inuenias, non Cyamon, id est, Fabam in eo uerbo, sed Venerem intelligi demonstrat oportere Gelius. Tota Insubria & Liguria, recentes Fabæ uenditum uoce nuncupantur Baianæ. In Etruria & Latio, Scaphi. Vtrumque originem habet eruditam. Nam & Baianas Apitius ipse appellat, & Scapos fabarum Plinius decimo octauo libro. Inuentus est inquit Scapus, ceterum Fabis onustus, ut inde uulgo Scaphi, pro Scapis, renuis in statilem diuerticulo uocentur.

De Faba ægyptia.

CAP. CXVI.

ἀγυπτιος κίναμος

D **A**gyptia Faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto platurumque prouenit. In Asiæ etiam, Siciliæque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris amplitudine. Et ubi flore exiit, fert folliculos oculis similes, in quibus Faba supra operculum bullæ modo prominet. Cibotion ideo nominant, id est, arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctæ estur. Ei Colocasias nomē est. Faba uiuens manditur, & exiccata nigrescit. Græcā magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. Dysentericis, coeliacisque prodest, in sparso polenta uice lōmō. Datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si ternique inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectat, gustu amarū, si tritum et cum rosaceo coctum instilletur.

BARBARI COROLL.

Theoph. li. 2.
de causis plantarū. cap. 19.

Faba Aegyptia, & Colocasia idem sunt, ut fructus ramen ipse Ciborium dicatur, radix uero Colocasia, & Mazizanon ab Actio. Pocilli genus ab hac similitudine, Ciborij uocari scribit Athenæus. Paludibus stagnisque nascitur. Caulis ei longissimus redditur, decem pedum a Strabone: uel ut Theophrastus & Plinius, cubitorum quaternum, digitali crassitudine, mollis & sine geniculis, rimæ intus per totum, ut Lilio. Propter quod & Lilium Aegyptium ab Herodoto uocatur: quemadmodum & Lotus ipsa. Calyx in cacumine rotundus, uesprium fauicem similes. Triginta plurimum oculis: qui singulas singuli continent, non quidem omnino tectas, sed paulo extrantes. Ipsi quoque calyces agri extrant, latissimis circa folijs, quæ singulas Fabas ob-

ge uideantur. Magnitudo ipsa, ad similitudinem eorum, quæ ut Plinius inquit, Personata in nostris fluminibus uocantur. Atterenti Fabas, amaritudo uel odore prodit. Radice crassissima, plenior quæ Harundinis, rimosa ut Scapus: g & Araneosus sentiri dicitur, ubi coctus est, in mædendo, ait Plinius, filis ad morsum ut in lana sequacibus. autore poeta Martiali, Thyrsus uero inter folia emicat spectabilis, a Theophrasto, Pilos ut arbitrantur uocatus. Quæque Theodorus Pilulas interpretatus id uidet. Alij calicem rotundum in eo uocabulo significari uoluerunt. Indigenæ implexis Colocaliæ folijs, in uariâ speciem uasorum positare gradissimum habet. Nascitur sponte, ac satur, quo modo & in Italia quoque. Non excoquitur Syriæ, Ciliciæque, & in Trorone Chalcidis lacu ad maturitatem omnino peruenit, sed magnitudine deficitur. In India quoque fluuiio Hydaspes cernit, Alexandro id falsum in coniecturam trahente, nauigari posse in Aegyptum inde. Fructus quidem, ut dictum est, amarus, sed ipsa radix perquam lauta cibus. Seritur in limo paleato, ut descendant, comprehendantque: rob id Spirobolos quoque dicitur. Vbi semel coaluit, durat ad infinitum. Refugium eam Crocodilispinis horrentem, caule ac radice: oculis timentes, quos hebetiores habet. Nominatur & Taba quædam Indica, ex arboribus, in siliquis digitorum decem longitudine dependens, mel se plenius, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus.

EX M. VERG. COMM.

Quod ex Aegyptia faba usum in Aegypto nostra ætate habet, radix sola est: quam coctam, sed in caleolas prius sectam incolæ quotidie comedunt, odore cottoni mali, & lebi, nobilitatiq; communem cibum. Nec minus tota Aegypto Colocalia nunc, seruat antiquo nomine, quæ nobis Rapa nota sunt. Falsum est quod antiquiores omnes de ea tradiderunt, non nisi in aquis nasci: quoniam in arida, sed non procul a mari, & humido harenosoque solo, etiam fara, & perse prouenit. Licetque nunc totos Colocalijs constitutos agros, ut ferunt, supra Tripolim urbem ad mare, non in innocundo spectaculo uidere. Latissimis siquidem & numerosissimis folijs aurent, quibus solis æstus in calidissima regione etiam arcet.

De Lente. CAP. CXVII.

LENS SVO cibo aciem oculorum obtundit. Aegre concoquitur. Stomachum male habet: eumque, & intestina inflat. Sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Quæ ex causa aluum cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accurate, priusque aqua inter coquendum effundatur. Quippe primum id decoctum uentrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat. Capiti, nervis, ac pulmonibus inutilis. Melius suo fungetur munere contra alui fluctiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisue, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois, quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet: alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibata deuorari, proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit. Ulcera purgat. Decocta in aceto, duricias & strumas discutit. Cum cotoneo, aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisque, addito rosaceo. Sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle decoquitur. Nomis quæ in gangrænam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ ferunt, igni sacro, pernionibusque, ut antea dictum est. Contra turgentibus

C mammae, et usq; eo duras ut quandam cartilaginis speciem referant, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 12.

Lens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem mollioribus. Melior quæ est tibialis, & quæ maxime aquâ absorbet. Enecat Lentè herba Securidaca, ut Plinius Aparina, siue Lappa, ut Theophrastus. Nascitur & sua India Lens fenogracæ similis, quam circa occasum vergiliarum demerunt. Differt hæc a nostrate omnino. Sed illatam cibo discerni posse negant ab ignaris. Aegyptia Lens a Marone Ouidioq; laudatur. Pelusiaca ob id uocata. Græci Lentè Phacon, Lenticulā Phacen uocant: quo nomine & Vlixis soror fuisse tradit, ab alijs Callisto appellata. A quibusdā non Phace, sed Phaceus: ut Orpheus, & Peleus uocata est Lenticula: sed si peregrinitatis in comœdia coarguuntur. Laudes Lenticulæ apud autores Græcos legas, præsertimq; Pythagoristas: utiq; si ratione Zenonis sequare, præcipiētis, ut in eā Coriandrū. n. parte indat.

ἢ αἰ γὰρ ἡμετέρας ἀνδραγύων νοσηνόν.

Congruūt & cū ea Bulbi. Ob id & Bolbophace dicta est a poeta quodam. Vnde scitū illud ortum uidetur, contra perditos gulones, Lentem laudat, ut apud Phalereum Demetrium est. Notū & prouerbū apud Vaironē in satyra Menippæa; τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον, hoc est, unguentū in Lenticula: ut obiter emaculemus inolitum, atq; adeo receptum in Aulo Gelio multis seculis errorē, ubi τὸν ἐν τῇ φακῇ μύρον, pro eo quod est, ἐν φακῇ μύρον legitur. Et ne librarij mendum fuisse uideretur, Theodorū Gaza locū interpretatus est, fabulam in Lenticula. hoc nos Athenij uiri doctissimi testimonio corrigendū monemus. Hoc adagiū, contra cacozelos, et aprocasos inueniunt: quos, ut est apud Senecam, & eundem Gelium, Infrunitos appellamus, qui nullo discrimine rerum quas agunt, aut dicunt, habito, pari nixu, cuncta moluntur: & eadem ornamenta, si guras, emblemata, conuenire omnibus locis et temporibus existimant. Cuiusmodi et illud est, τὸ ἐν λαγάνοις πίπρι, hoc est, Piper in oleribus.

De Phasiolis. CAP. CXVIII.

Phasiolus

Phasioli infant. Spiritus cienti. Aegre coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad uomitiones idonei.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Phasiolo in Cicere differui. Habetur & genus herbæ Phasiolus, ut post constabit, Græci pro legumine Phasiulon, & Phasiolon, & Phasilon quandoq; appellant. Nostri Phaseolum, & Phaselum. Columella.

E X M. V E R G. C O M M.

Dolichum, nescio an Theophrastus aliquando idem legumen hoc appelleret. Piso enim magis q̃ Phaseolo congruunt quæ de Dolicho ab eo dicuntur. Verba eius lib. 8. de plantarum historia hæc sunt. ὁ δὲ δόλιχος ἐστὶν παρακαταπῆλη τοῦ βόλου μακρὰ ἀγαθόν, καὶ γίνεται κάρπιμος, ἔσθλη καὶ φαεινὸς καὶ ἰσχυρὸς. Quod est. Dolichus uero, si prope longius lignum defixerit aliquis, ascendit, fecundusq; fit: sin minus, deterior, & rubigine uidiatur. Paulus tamen Aegineta primo uolumine quo capite de leguminibus agit, de Phaseolo his uerbis usus est. ἢ δὲ φαεινὸς καὶ δολύχων καλούμενος, quod est, Phaseli uero, qui & Dolichi nominantur. Magna utriusq; autoritas. Neq; ego ausim pro re, quæ ad utramq; partem trahi potest, inter eos censere. Dolichon enim longū græcis dicitur, quod Phaselorum siliquis msgis competit: & Pisum per se stare nequit ideoq; adiunctis sibi lignis, ut Theophrastus ait, nititur.

De Eruo. CAP. CXIX.

Eruum

Eruum paruus frutex, omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualuulis habens, e quibus farina fit nomine Eruina, ad multos medendi usus conueniens. Eruum capiti onerosum est. Aluum esu turbat. Sanguinem per urinam extrahit. Elixo boues saginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana, candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter cōbibant. Postea torrentur, usq; dū hians cortex disrumpatur. Molitaq; farinario cribro incernuntur. Postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. Vrinam ciet.

Meliorem colorē efficit. Sanguinē per uescicam, aut aluū cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumat. Vlcerā cū melle purgat. Lentiginēs, & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat. Nomās, gangrēnas, duriciasq; serpere non patiūt. Mammārū duricias emollit. Attra ulcera, quæ theriomata uocāt, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum uino illitū, mōribus uiperarū, canum, hominūq; medetur. Vri nāe difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentū non sentiunt, tostitū, & in nucis magnitudinē melle collectū, conuenit. Eius decoctum perniones, & pruritus in toto corpore sanat, fouendo.

BARBARI COROLL.
ERuū, Herbumue, aliud candidū, aliud ruffum. In siliquis grana sine septo habet, quæ se inuicē quasi tangāt, ut in Piso. Siliquæ forma teres, & ad rōnē grani Cylindracea, utiē Pisi. Patentiū silium uetustatis est atq; cicer. Genus est & Eruiā leguminis, quā nōnulli falso Durellā uulgo dictā interpretant; propterea, qd hodie quoq; in Vmbria uocant Eruiā agricolæ, qd in Galia & Venetiā prouincia Dorā, Durellāq; folio crasso & oblongo leontopodij, sed maiore: capitulis semē includētib; minutū, simile nasturtio, tantū exilius flore cādido. Scopas ex ea ruri faciūt. At Eruiā, syluestris herba ē, amaritudinis eximie, colore & folio cicercule, qd minore.

Phil. li. 18. ca. 15.

De Lupinis. **CAP. CXX.**
Satiuus Lupinus notus est. Cuius farina cū melle delinctū, aut potu, uentris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cū sua amaritudine esitati eadē efficiunt. Decoctū eorum idē munus præstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrēnas, incipientē scabiē, eruptiones pustularū, ulcera in capite manātia, uirilignes, maculasq; fouere utilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in uellere. Eorū farina cutē liuoresq; corrigit. Inflammationes cum polēta & aqua mitigat. Tubercula, & coxendiciū cruciatus, ex aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rumpit. Decocti coelesti aqua, donec in liquamētū crassiciem redigantur, faciem abstergunt. Medentur pecorū scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita, ut tepente decocto abluantur. Cit urinā radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere coeperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatē faciunt. Gignunt & syluestres Lupini satiuus similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiuū possunt.

Simplicior. 2. 1. 1. 1.

B

Simplicior. 2. 1. 1. 1.

BARBARI COROLL.
LVpino cura officit, quāvis alte conditū in terra, diducit eam radice, & in summa nititur. atq; ita germinat ceu per uim. Grana eius in siliquis discreta septis. Viride nullum mandit animal. Diuquinus id tradunt Eruo, ac Cicere, Sabulum, & arenas, & omnino uicia terræ sequit, horretq; culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, plus utilitatis. Miscēcunt cinere, aut aqua calida. Circumagi Lupinum cum sole, tradunt pleriq;.

LVPINVS SYLVESTRIS.
LVpini syluestres per omnia minores inueniuntur satiuus, præterq; amaritudinē.

De Rapo. **CAP. CXXI.**
DEcocta Rapi radix alit. Inflationē parit. Mollesq; spongiosasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, pers-

2077. 11. 1.

u. iij

Cnionesq; fouentur. Contritoq; Rapo, atq; imposito iuuantur. Si excauata radici rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti esu, urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferrunt, Anodyna uocant, idoneum est. Potum contra uenena salutare est. Venerem concitat. Muria conditum, minus alimenti sufficit. Sed multo magis appetentiam recreat. Syluestre Rapum in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue. In cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis caliculatis. Cumq; pulpæ aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet. In qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore utimur, præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina fieri solent.

B A R B A R I C O R O L L.

Theophr. lib.
7. cap. 4.
Pli. li. is, ca. 19.

Rapa, quasi Ruapa, ut inquit Varro, tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut in sequentem annum regerminet. Semen includitur siliqua. Vtrunq; sexum in hoc quoq; genere intelligunt, ex eodem semine provenientes, ut scribit Theophrastus. Quæquæ uidetur Athenæo, marem a Theophrasto nihil aliud intelligi, q; Napum Buniada. Effeminari collocatæ rarius dicunt, masculifcere densius compositæ. Laudatur semen eius tenue. Seritur semine, post transfertur. Dulcescit algoribus: per quos & in radicem, non in folia incrementum capescit. In Italia Nursinæ præferuntur a Columella. Pollux, & Athenæus e Mantinea maxime commendant. Gongylen, & Gongylida Græci uocant, quemadmodum & nostri Rapum, atq; Rapam. Nam Rapina ut Napina, & Cepina dicitur: & Rapitum, ut Auitium, Piscitium. Cato coles Rapitos uocauit alio loco. Rapa biennio sata conuertuntur in Napos, alio Napus Raporum naturam accipit. Gongyliorum uocabulo Hippocrates globos pusillos quasi pilulas, & catapotia significat Galenus ipsos autem pasillos, siue orbiculos, quibus in medicina utimur, Dactylios appellat: quod & officinæ modo seruant. Rapas Lacedæmonios Gasteras uocare Apollas tradidit. Sed Nicæder colophonius Gasteras a Boëtis Brassicas intelligi: Rapas uero Zacetidas appellari uoluit. Amerias, & Timachides non Rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. Sunt e Græcis qui Rhaphyn esse dicant Napum Buniada: licet Glaucus non Rhaphyn, sed Rapyn uocet: unde apud nos Rapo nomen uideri potest manasse.

R A P V M S Y L V E S T R E.

Pli. li. is, ca. 19.

Syluestris Rapa longior, in speciemq; Raphani, caule breui, semine intus candido, duplo maiore q; papaueris. Has in Dalmatia frequentes sponte nasci, Possidonius est auctor.

E X M. V E R G. C O M M.

Communem latinis græcam Gongylen, non Rapum, sed uocem fecit in carmine suo Columella, cum peractis Vulcanalibus cecinit: Nube noua feri cæli impendentibus undis Gongylin, illustri mitti quam Nursia campo. Nec peregrinitatem uocis ueritus latinus homo est: tam grata omnia erant omnia, quæ ab ea gente in doctissimis audirentur. Cumq; in secunda græcorum declinatione, & in quinta nomen id in græcis inueniatur, ex quinta elegit secundam, scilicet hoc quod Dioscorides ait, sunt qui Gongylida, nulla significationis diuersitate. Nisi quis forte diminutiuam formam Gongylida, a Gongyle factum id nomen dixerit. Quacunq; autem forma dixerit aliquis eadem significatione, semper indicabit quod rotundum sit: quia figura ubiq; præterunq; nascuntur Rapa. Græcis enim *σφγγυλον*, id est, rotundum significat. Quod deinde hic ait, minus nutrire in cibo Rapa quæ in muria seruatur, ex antiqua salgammorum consuetudine rationem habet: quoru cum esset quotidianus usus, docere Dioscorides uoluit, mutata aliquantisper natura, minorem ex conditura uim in nutriendo Rapa habere. Quomodo autem condirentur, & condita seruarentur, Columella, 11. uolumine capite quinquagesimo tertio satis docuit. Poterunt uolentes ex eo scriptore omnia facile nouisse, Quos obiter monemus,

quærendum medicæ materiæ studiosis esse, quas nam hic dicat in sylvestris Rapi siliquis capitam speciem & figuram. Quale enim id sit, non satis constat.

A

¶ De Buniade Napi.

CAP. CXXII.

COcta Buniadis Napi radix inflat. Modicum alit. Semen eius potum uenenorum vires hebetat. Antidoti ammiscetur. Conditur sale radix.

Bovide

B A R B A R I C O R O L L.

NAporum in medicina quoque Græci fastigia duo seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis, quod Bunion uocant, dicendum inferius. Alterum genus Buniada appellant, de qua hic agitur. Amiterinam Buniada maxime sunt qui probent. Græci Thebaicam. Officinæ modo ignorant Buniada, & sylvestris Rapi semine Buniadis uice utuntur. Quod facile cognosci poterat. Est enim sylvestris Rapi semen & nigrius & maius, quod Buniadis.

E X M. V E R G. C O M M.

RApis congenere Napi sunt, quibus locis nascuntur, omnibus cogniti, & a cunctis rei rusticæ scriptoribus longissime descripti. Eorum plura a Theophrasto, Plinio, aliisque genera numerantur. Columella in his etiam græca uoce in eodem carmine usus ait, Quæque Amiterinis deferunt Bunias aruis. Eodemque loco de conditura eorum a Rapis statim certam rationem monstrauit.

¶ De Radice.

CAP. CXXIII.

RAphanus latine Radix dicitur. Excalfacit. Flatibus gignit. Ori suauis est, sed stomacho aduersatur. Ructus ciet. Vrinam pellit. Alio aptior. Summo tamen cibo sumi debet, quo magis eius distributio nem adiuuet. Cum autem presumitur, cibum subleuat. Quare uomitionis commodissime datur ante cibum. Sensuum aciem excitat. Deocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassiciem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet. Hydropicis commodissime illinitur. Lienosis utilis. Sugillata cum melle tollit. Contra uiperarum ictus auxiliatur. Alopecias ad pilum reducit. Lentigines cum liliacea farina emendat. His qui fungis strangulantur, tam cibo quam potu salutaris est. Semen uomitiones facit. Vrinam mouet. Menses cit. Lienem extenuat. Cum aceto potum gangrænas ualidissime emarginat. Coctum cum aceto mulso, anginæ perque utiliter gargarizatur. Contra cerastis morsus, potum ex uino auxilio est. Sylvestris Raphanus, quam Romani Armoraciam uocant, alij montanum Raphanum, alij Apium, alij Iscada, alij Chamæbalanum, Romani etiam Radicem sylvestrem, ramulos tenues iuncea os duos siue tres spargit, rubentes, folijs rutæ sylvestris, oblongioribus, & angustioribus, semine paruo, radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radicis superior uomitione, bilem pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota susque deque purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesquiobolo potus, utraq; parte purgat.

papauis

B

B A R B A R I C O R O L L.

RAdix, quam ut Varro inquit Raphanon, & Raphanida, & Crambidion Græci nominant, caudice uno assurgit fere arboreo, ut in Ruta quoque cernitur: proinde hoc genus olerum Den-

C drolachana cognominant, hoc est, ut Theodoro placet Oleriarbores. Die tertio a saturo profilit, radice terra adoperata, Rapi modo. Sequenti anno germinat, tellure abiecta. Semen in siliquis. Genera, Bæotium rotundum & dulce, Liothasion, quod alij Thracium uocant, patetissimum hyemis, Cleonæon, in longitudinem porrigitur. Corinthium, amplissimum detecta stirpe nascitur. Quo folium leuius, eo suauior atq; mitior est Raphanus. Dulcescit ut Rapum frigoribus. Traditur genus unum cruce folio. Pulices appellantur bestiolæ Raphanis in nascentes. Raphanorum radices lignescere Theophrastus est auctor. Hæ, ut inquit Palladius, foeminini generis existimantur, quæ minus acres sunt, & habent folia latiora, leuiora, & iocunde uirentia. Raphanum, ut brassicam, uiribus inimicū esse constat, ut si circum se feratur, diffugiant. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur Symæa. In Aegypto cum cepis & alio pyramidibus condendis præberi solitum, Iulius Pollux auctor. Confirmant id & Diodorus, & Plinius, qui scribunt ad id opus in Raphanum cepas & allium talenta mille octingenta erogata. Ut mirer Laurentium Vallam, apium, uertisse pro Raphano. Sunt & Græcis qui Symeam apud Iones genus oleris apio similis accipiant. Itemq; pro edulio ex adipe, atq; melle. Sed Symeam legi malo, q̃ Symeam. Utq; hinc fortasse ferculum nuptiale uulgus Syrmiam corrupte pro Symæa dixerit, ex amygdalis, & pulpa gallinacea, & saccharo. Nam Hippocrates Surmeam, siue Symæam, pro fucci quodam genere. seu passum, seu defrutum id sit, intelligi uolebat, cum præciperet, quid in uino odorato, Symæaue sumendum esset. In compositionibus quibusdam Pauli & Aetij Bacanum inuenio commemorari. Nec quid ea res sit comperio, præterq; in quodam glossemate, ubi semen, siue nucleum, siue mucronem Raphani Bacanum esse legebat. Bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo, utq; parti eius uisceris incuræ prædicat.

A G R I O R A P H A N O S.

A Grioraphanos, ab Raphano agria differt auctoribus: ut aliud sit syluestris Raphanus, aliud Raphanus syluestris: quemadmodum leuca canthe, ab acanthida leuce diffat, id est, alba spina, a spina alba. In quo tamen honestius puto nominibus Græcis uti, q̃ Latinis. De Agrioraphano, & hic, & libro quarto paucis immutatis agiuri. Apion, & Ischada nominando. Nec Theodorum probo, caricam, atq; pirum interpretantem. Falsum est & quod scribit, inter spinas esse, quam pirum uocant. Non enim hoc in Theophrasto, quem uertit, legitur. Fefellit hominem, q̃ auctor ille de Orchis herba scribit, similem ei caulem esse apio, sed spinosum. Proinde Plinius, caule inquit spinoso est Orchis. Paulus Chamæraphanon quoq; dici hanc existimat, quæ Apios, siue Agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepæ, sed ampliorem, uel ut Theophrastus inquit, asphodeli, uerum squammosam. Nascitur in montosis & asperis, aliquando & herbosis. Effoditur uere.

D De Syluestri Raphano. **CAP. CXXIII.**
ῥαφανὶς ὄσπριον
Syluestris Raphani, quam Romani Armoraciam uocant, folia satiuo similia, & quadamtenus Lampfanam imitantur. Radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium q̃ radix in olera recipitur. Excalfacit. Vrinam concitat, æstuosus.

R Aphanos agria, id est, Radicula syluestris, & quæ Cheria, & in Ponto Arinon, & ab aliquibus Leuce, a nostris Armoracia uulgo dicitur, fronde copiosiore q̃ corpore. Laudatissima nascitur Arcadiæ. Seritur in Italia, & Armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

S De Sisaro. **CAP. CXXV.**
σίσαρον
Sisarum uulgo cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis. Vrinam ciet. Et appetentiam inuitat.

S Iser Græci Sisaron appellant. Duorum generum est, Satiuum, & Erraticum. Inest longitudine Siseri neruius ut pastinacæ: qui decoctus extrahitur, magna tamen parte amaritudinis relicta: quæ mulsio in cibis temperata, etiam uertitur in gratiam. Nobilitauit hoc princeps Tiberius, flagitando a Germania omnibus annis ex Gelduba castello, quod impositum Rheno est, ubi generositas præcipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non prætereundum, quod tradunt, ideo utilem stomacho uideri cibum, quoniam nemo tres Siseres edendo con-

tingeret. Sisaram Varro, Plinius Sisarum appellat herbam, cuius flore uestantur apes; ut in Eryce disputatum est.

EX M. VERG. COMM.

Inter olera quorum radix tantum in usu est Sifer antiquis fuit, nec quæsitam in eo nisi radicis crassitudinem Plinius, & Columella indicauerunt. Siquidem alter. 12. rei rusticæ suæ libro de satione eius agens, iubet pastinato, stercoreatoq; loco, & præ rarissime ponenda esse pastinacam, Sifer, & inulam, ut maiora capiant incrementa: Alter naturalis historie libro. 19. e Germania maxime laudauit: quoniam egregiæ generositatis, & amplissimæ magnitudinis, in frigidissima regione nasceretur. Seri hoc non semine, sed bulbis ueteres dixerunt: qui ut in lilio, inula, & auro sit, a reliqua radice aulsi, ad nouam sobolem in hortis disponuntur. Fecerunt in hoc genere ueteres etiam satium, & erraticum: quemadmodum & in pastinaca, cui congener esse creditur, si cuncta a ueteribus de eo tradita diligentius obseruentur. Poterant dici & alia, sed quæ ab alijs tradita sunt, sine desyderio a nobis relinquuntur.

De Lapatho, & Rumicæ. CAP. CXXVI.

Ex generibus Lapathi, Oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satium, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum genus est, quod alij Oxalida, alij Anaxyrida, aut Lapathon uocant, syluestri ac exiguo Rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olere alius emollitur. Crudi illitu, melicerides temporis tractu discutiuntur. Syluestris & Oxilapathi, & eius quam Oxalida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balnearum confricetur. Coctæ in uino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcēt. Strumas, parotidasq; discutiunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ & inditæ, sceminarum profluvia sistunt. Cum uino autem potæ, regio morbo medentur. Calculos uesticæ comminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

BARBARI CŒROL.

Lapathum, nostri Rumicem fere appellant. Radicē altissima, & inter olera maxime singulari; nec enim lateribus crassiores alias emittit, sed prætenues. Multicaule hoc olus, ac ramosum, & cum perfecte adoleuit, figura betæ proximum, corpus carnosum & niuidum: eoq; uel exemptum terræ diu recens. Viuacissimum præ cæteris oleribus est Lapathum, præsertim satium. Differt hoc a syluestri, q̃ sesquipedalis satiuo radix, breuior syluestri: gustus tamen gratior syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiuis collata. Syluestre Lapathum, Aetius Centrodes, a pungendo cognominauit, radicem ei sublongam tradens, Raphano parue similem. Q̃q̃ porro Lapathum a nostris Rumex dicitur, proprie tamen Rumex est; quem Oxalida, & Oxylapathum Græci nominant, satiuo similem, folijs aquosis, colore betæ candido, radice minima. Cantherinum Lapathum ab aliquibus uocatum. Quidam Oxylapathon satiuo similis esse, q̃ Oxalida, siue Rumicem existimant. Lapathos Democritus pro uenaricis scribibus accepisse dicitur. Theocritus Alapathon uocauit, ab effectu, quoniam exinanit. Et eum Atolci Alapatha, quæ nos inanitiones dicimus, appellant.

λαπάθος
ὀξύλαθος

ὀξυλίδα
ἀναξυρίδα

B

Pli. li. 20. ca. 211

C **Q**Uæ a principio capitis huius frequens uox auditur, ἔξ' ὀρέν, & quæ ab his composita sunt, ἔβλαπτον, & ἔβλιν, in quibus anceps ad acetum, & quæ acuminata sunt significatio est, causam antiquis interpretibus, & latinis medicis dedit, ut omne Rumicis genus uno acetosæ nomine indicarent; quod scilicet ἔξ' Græci acetum dicunt. Cum tamen quartum Rumicis tantum genus acido sapore sit, ideoque ἔβλιν dicta fuerit: qua uoce uinum quod acorem contraxit, & aculescentem fecem, Græci etiam appellant. Cætera uero omnia ab acuta foliorum magis minusue cuspidē ἔβλαπτον, & ἔβλαπτον dicta fuerint. Quod forte miretur aliquis, si ne sciat late in græcis patere significationem τοῦ ἔβλιν, id est, eius quod illi acutum dicunt: nec tantum indicari ea uoce quæ in cuspidem, aut mucronem desinunt, sed quæ celeri motu etiam transiunt, & subito efficaciter sensu sentiuntur: quoniam quemadmodum illa cuspidē mucroneque suo primum penetrant, eodem modo & hæc festinata & efficaci actione potestatem suam exercent. Sic Homerus gladium acutum sæpenumero dixit. Pindarus uero acutam niuem, non eodem quo gladius modo acutam, sed gelu, sensuque suo in humanum corpus penetralem. Qua uoce Lucretius, & Maro felicissime in frigore uli fuerunt. Eadem ratione Hippocrates etiam καὶ ὀρέν, id est, occasiōem non acutam, sed citissime transeuntem, & præcipitem dixit. Ob hanc ipsam causam acetum etiam ἔξ' a Græcis dictum est, quod acore suo altius, efficacissimeque in hominis sensum penetret, nec sine doloris aliquo sensu sentiatur. Fuit itaque in Rumicum nominibus antiquis græcis hæc ratio, ut una eademque uoce in alijs acidus significaretur sapor, in alijs acuminata foliorum cuspidē. Ideoque nos in quibus acidus sapor sit, ea descriptione uli sumus, quæ id indicaret. In quibus autem acuminata essent folia, aliquid itidem adieciimus, quo ea significaretur species. Quodque hic in quarto genere ait, non oxalida ab acido sapore tantum, sed anaxyrida etiam dici, a foliorum figura acceptum est.

De Hippolapatho.

CAP. CXXVII.

ἵππολάπαθον

HYppolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Eisdem habet uires quas supradicta Rumicis genera.

B A R B A R I C O R O L L.

D **H**ippolapathum malus satiuo, candidiusque, ac spissius. Adiecere nonnulli Bulapathon, radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & Hydrolapathum tradunt, in aqua natum.

De Lampfana.

CXXVIII.

λαμφάνη

Lampfana, quod Romani Napium uocant, syluestre olus est. Plus alit quam Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesque conquantur in cibo.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 9.

Lapfanam Græci uocant Lampfanem, Cyma est, siue Brassica sylvestris, pedali altitudine, foliorum trium: quæ hirsuta ei sunt, Napo simillima, nisi candidior esset flore. Hinc a latius uocari Napium existimo: in quo tamen Dioscoridem auctorem solum habeo. Lapfanam diui Iulij carminibus, præcipue iocis militaribus celebratam, ait Plinius. Alternis quippe uersibus exprobrauere, Lapfana se uixisse apud Dyrrhachium, præmiorum parsimoniam cauillantes. Aliam puto herbam fuisse, qua cum lacte uicitauit exercitus. Cara nomine, ut alibi notabimus. Nam radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

E X M. V E R G. C O M M.

Hæc est Lapfana illa, qua Plinius ait ad Dyrrachium, uixisse Cæsarianos milites, eamque in triumpho Imperatori suo iocularibus carminibus exprobrasse: Vulgare olus, & in Brassicarum genere. Eam præcepit Columella prope aluearia ferendam esse: quoniam copiosam ex ea ceram apes colligant: Vulgaremque dixit, quoniam ubique fere nascitur, folijs non dissimilibus Brassicæ, & ut nos uidimus, utrinque trinis.

De Bunio, Napi genere.

CAP. CXXIX.

βούνιον ἄκτινον
ἀνέμοσφορον
παρδάκρον

Bunio aliqui Actinam uocant, alij Anemosphoron, magi Paradachry, Aegyptij Erxonem, Romani Scopæ regiā, Aphri Zigar, aut Tēpso. Caulē emittit quadrangulū, & in eo foliosos ramulos, tenues,

preterniuis foliolis et flosculis scatentes, longitudine digitali, folia ppter radicē, Apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odoratū, minus Hyoscyamo. Excalē facit Bunion. Vrinā ciet. Secūdas detrahit. Lienī, renibus, & uesticę utile. Eo humēti aridoue utunt, exēpto radice & caulib. succo, ex aqua mulla.

B A R B A R I C O R O L L.
Bunion, hoc est quod nostri Napum uocant, ut in Buniade meminimus. Quanc̃ Dioſcorides Scopam regiam uocari Romæ scribat. Cæterum alia quoq; Scopa regia est, ut in Sideri te constabit. De qua porro Scopa regia loquatur Plinius uigesimo primo libro, non leuior inquit odor ei, quam Scopam regiā uocant, quanc̃ folia eius oleant, non flores, existimandū relinquo. Paulus Aegineta Buniō, a nonnullis Arctiōn appellari scribit. Galenus Arctiōnē, De Buniō eadem a Dioſcoride libro quarto, quæ hic legebantur detraximus, q̃a inutiliter re petita esse uidebantur.

¶ De Blitō. CAP. CXXX.

Blito Aegyptij Echlotoripā appellāt, alij Riplā. Romani Blitū, Daci Bles. Olus est aluo utile, nullius in medicina momenti.

βλῖτον

B A R B A R I C O R O L L.
Blitum, siue Blitus (Græci etiam Bleton) erumpit ocysissime, semen ut Betæ, corticeum, cō pioſum, racemofumq; ut Atriplici. Radice non una, crassa, in rectum tendente, ut Beta, & Lathion, & maxima pars olerum, sed continuū, multiplici, ac proluxa. Inſpidum, & sine acrimonia. Vnde conuiciū foeminis apud Menandrum faciunt mariti. Blitum duplex ostenditur, rubens, & candidum. Apud Aristophanem quoq; Blitomamæ, pro solidis accipiuntur, quos Plautus noster Bliteos appellat in Truculento.

Pli. li. 20. ca. 22
Theoph. lib. 9
cap. 112. 34

Blitea inquit, & lutea est meretrix. Etiamſi corrupte legitur Blittera. Hippocrates Bubleton quoq; nominat herbæ genus: modum in uerbo non sit. Scio enim & Bolbiton pro fimo bubulo, & Bolbiton pro quodam polyporum genere minuto capi ab Hippocrate, ut Galenus testatum reliquit. Sed & Onobleton herba, linguæ similis, Hippocrati, contra foeminarum profluuiū in uellere apponitur.

B

E X M. V E R G. C O M M.
Maledicebatur quondā hominum ingnauis ex hoc olere, & in accusanda ridendaue alſcutius ſocordia & inutilitate, despectiorem Blito uulguſ appellabat; tam nullum in morbis, aut ſanitate uſum habet. Edendo herbam esse Blitum, Paulus Aegineta in sexto ait, humereq; in ſecundo ordine et frigere. Palladius in Martio mēſe, his uerbis de natura ſationeq; eius tradidit. Hoc mēſe Blitus ſeritur, ſolo qualicumq; ſed culto. Olus hoc neq; runcādum, neq; ſarculandū eſt. Cum ſemel natum fuerit, ipſum ſe per multa ſecula ſeminis ſui deiectione reparabit, ut etiam ſi uelis uix poſſit aboleri. Paulus itidem Aegineta, præter paulo ante dicta, in primo inter olera Blitum numerauit, coniunxitq; Atriplici: nec quicq; de utraq; aliud dixit, q̃ humidū eſſe, uentrem deijcere, & parce nutrire.

¶ De Malua. CAP. CXXXI.
M A L V A M hortenſiam Pythagoras Antema uocauit, Zoroaſtres Diadema, Aegyptij Cochortem, Magi Lienem capræ, aut muris Vrinam. Satiua eſui longe aptior ſylueſtri. Stomacho aduerſatur. Aluum iuuat, ſed multo magis caules. Interaneis & ueſicæ utilis. Cruda folia cum ſalis exiguo manducata, ægylōpas ex melle ſanant. Verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra ſalem utēdum eſt. Contra aculeatos apium ueſparumque icūs, illita efficax eſt. Eadem cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcerā manantia in capite, ſurfureſq; cum urina ſanat. Sacris ignibus, & ambuſtis decocta folia, tri-

μαλὰχ' ἀνθίμα

Ctaque, utilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulvas in fessione mollit. Prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulvæ, sedisq; dy-
stere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxi-
liatur, si continuo a bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum mor-
sus remedio est. Lac euocat. Semen in uino potum, addito Loti sylue-
stris semine, uesicæ cruciatus lenit.

Pli. li. 20. ca. 21
Theo. li. 9. c. 19

B A R B A R I C O R O L L.

MAlua cultura opera, intra sextum, septimumq; mensem grandescit in arborem, hastarū,
baculorumq; usu in Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario, ad Hesperidū hortos, &
iuxta delubrum Herculis. Duo genera earum summa: quæ amplitudine folij discernuntur. Ma-
iorem Græci Malachen uocant in satuiis. Alteram ab emolliendo uentre dictam putant Mala-
chen e syluestribus; cui grande folium, & radices candidæ, Athæa nominatur. Est & quæ uni-
caulis nascitur, Monocaulos ex factō cognominata. Omne solum in quo feruntur Maluæ, pin-
guius faciunt. De Althæa, quæ item Deidromalache, siue Anadendromalache dicitur, & libi-
cus, uolumine tertio disseritur. Est & Alcea huius fere generis seorsum indicanda.

ατρηφάξις
αἰγυπτίου

De Atriplice. C A P. CXXXII.

Atraphaxin aliqui Chrysolachanon uocant, Romani Atriplicē,
Ægyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera. Syluestre,
& Satiuum. Coctū est ut olus. Aluū mollit. Panos discutit, siue crudū,
siue coctum illinatur. Semē cū aqua malsa potum, regium morbu sanāt,

Pli. li. 20. ca. 20

B A R B A R I C O R O L L.

Atriplex, octauo die a satū, Octobri mense provenit. Radix ei una descendit in altitudinē,
unde fibræ aliæ promantur, ut in Beta. Foliatum habet semen, & obductum cortice, numero-
sum, racematimq; singulis ramis insidens. Atriplex & syluestre est, & satiuum; accusatum a
Pythagora, tanq; faceret hydropicos, morbosq; regios, & pallorem. Coquitur difficillime, ac
ne in hortis quidem iuxta eum nasci quicq; nisi languidum, culpauit. Addidere alij plurimas
ægritudines ex eo gigni, nec nisi aqua sæpius mutata coquendum. In Italia difficulter id nasceba-
tur. Syluestri capillos tingebant. Atriplex ueteres, nō Atriplicē uocasse perhibent: ab græco
nomine potius, q̃ ab auro, ut arbitror. Hippoc. etiā Adraphaxin appellat: post Atraphaxin
dixere Artici, d, literam in, t, mutare amantibus: ut facit Aristor. qui entelechiam, pro endele-
chia usurpauit, ut Lucianus autor est. Quibus porro Atriplex idē uidet esse cum eo genere qd̃
Spinacia uulgo dicimus, & Græci recentiores Spanachia, fallunt apertissime. Si quē porro uo-
cabulum id parum delectat, Atriplex Hispaniensis nominetur. Et Hercule fieri potest, ut inde
profectum sit ad nos olus, ieiunij aptissimum, nec ueteribus (ut coniectio ac demiror) com-
pertum.

E X. M. V E R G. C O M M.

Iocatus ex hoc olere quondam in fabula quæ Equites inscribitur, græcorum omnium comi-
corum lepidissimus Aristophanes, est, falsi Atriplicis olere, ab oratoribus Athenienses impleri
in condone dicens: compositiq; ex olere, & mendaciō nomine, quæsitam in populo uulgari
ratione gratiam, & credulæ plæbis irritam bonorum spem simul deridens: non aliam ob cau-
sam, q̃ quia uulgare hoc olus est, nullamq; habet maiorem utilitatem: qualia hominum men-
daciā sunt, ubiq; omnibus in promptu parataq; & inutiliter plærimq; euadentia: quod olus
hoc etiam habet in tertio refrigerandi ordine, per aluum celerrime descendens. Quæ tota spei
fortuna est: siquidem in ancipiti posita, quantum uis leui pulsu & strepitu tota perit & euolat.
Sationem Atraphaxis docuit Columella libro. 12. his uerbis. Cherephilum, itemq; olus Atri-
plicis, quod græci uocant ατρηφάξις, circa calendas octobres obrui oportet, non frigidissimo
loco. Nam si regio sæuas habet hyemes, post idus februarias semine differenda sunt, suaq; se-
de partienda. Papauer, & Anethum eandem habent conditionem sationis quam Cherephi-
lum, & Atraphaxis. Cur autem Chrysolachanon etiā, id est, aureum olus quondam dicere-
tur, facilem habet coniecturam: quoniam luthæo flore sit, ideoq; ab auro nomen inuenit.

De Brassica. CAP. CXXXIII.

A

Cramben Romani Brassicam uocant. Ea aluo est idonea, si modo leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluum sistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuæ. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, et tremulis esse, prodest. Summo cibo sumpta, crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho Cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. Ea condita, stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum uino quoque epotus, uiperarum moribus auxiliatur. Cum sceno & græci farina, podagris & articulorum uitij illinitur. Prodest & fordidis ulceribus, & uetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque. Epinyctidas, ignem sacrum, lepræque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinēt. Cocta, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasque ualent. Lienosisque, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam uocē instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post concēptionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum, tineas repellit. In antidota celiacorum additur. Faciei cutem, lentiginemque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremari, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

αρωμα

B

BARBARI COROLL.

Brafficam, antiqua Græcia, non Cramben, sed Raphanon appellabat: quod & Aristoteles, ut Iulius Pollux inquit, et Theophrastus fere sequitur. Crambe quasi Corambele dicta existimatur: quæ pupulas oculorum, quas Græci Coras uocant, hebetet, autore Columella. Sed & ipsi quoque Antici Corambem dicunt eam. Dederit hoc locum prouerbio fortasse, repetitâ Brassicam, nedum nocere, etiam occidere. Græci tostam carnem Crambaleam uocant, Athenæus autor. Brassica, ut Varro inquit, dicta quasi passica, quæ ex scapo minutatim præficatur, & passica fiat. Die a saturo decimo se ostēdit Brassica. Digenitur a Theophrasto in genera maxime tria. Syluestris, cui folium æquabile, paruū, rotundū, multiplex: ramosæ, succo aspo, medicato, ad detractōnes per aluum præpuo. Secundum Crispæ: quæ & amplitudine folij, & bonitate succi præfert omnibus. Tertium Leuis appellat. Nonnulli addidere Quartū, cui semen deterrimū, aut omnino nullum. Cato quoque tria facit discrimina. Vnam extētis & grandibus folijs, caule magno: propterea Cauloden uocatam, aliquando Septembrinā, ab alijs Eleada. Alterā crispo folio, Seinada nominatam, a similitudine foliorū Apij: quā & Apiam cognominant, alij Cliauculā. Tertiam proprie appellatam Crambem, minutis caulibus, folijs tenuioribus, & simplicibus, densissimisque, sed amariorem, leuiorē, tenerā, quæ ob id & Lenis dicatur. Sed de syluestri Brassica suo loco agemus. Athenæus tria inquit Brassicæ sunt fastigia. Primū Halmiris: quā & præfert omnibus, præsertim in Eretria, & Cumis, & Ephesi, & Rhodo, & Gnido genitā. Secūdū Liophyllos, a foliorū leuore dictum, ubique nascēs. Tertium Selenusia, folio crispo, et Apij similitudine, a qua & nomē habet. Hæc naturæ, illa ganeæ distinctio. Tritiana magnitudine ac sapore præcipua, cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio, capite parula: mox Aricina, altitudine non excellior, folio numerosior quæ tenuior, cuius sub omnibus pene folijs fruticat cauliculus peculiaris. Ideoque utilissimū genus existimat. Pompeianæ, in oppido Capaniæ. Pompeijs præter caulis, ab radice gracili, intra folia crassescens. Rariora hæc, angustioraque, sed teneri

Theo. li. 7. c. 4.
Pli. li. 20. ca. 9.
Cato de re ru
stica, ca. 15. 157

D I O S C O R I D I S

Ctas in dote, frigora non tolerat. Sabellicę usq; in admirationem crispa sunt folia : quorū ei assuetudo ipsum caulē extenuat, sed dulcissima perhibentur ex omnibus . Non pridem ante Cebumellam subierē Lacutres, a loco dicti, quo lacus Turni, siue ut Plinius scribit, lacus Turonis fuerit, conuale Aricina, capite prægrandes, folio innumero. Alij in orbem porrecti. Alij in latitudinem torosi. Nec plus ullis capitis post Tritianos, et Cyma nullis ferior. Hoc genus quidā interpretant qđ mō Capitis coles, & in Hispania Murrianos uocāt, Brutiani, frigoris alunt, grandes folijs, caule tenues, sapore acuti. Addunt ijs Silirenses, Tiburini, Stabiani, Parchenopei, q̄ sunt hirsuti. Vesuuii, q̄ sunt amari, nō sine suauitate. Marrucini, rubent paucis folijs. Signini breuiiores, crassiores, lapidiores Cappadoç folijs, caule pene nullo, frequētibz tunicis, & contra frigus muniti, priusq; in florem exeant, ut uix prima folia discernantur hyeme. Cuiusq; generi pruinę plurimū suauitas conferunt. Suauissima ex omnibus est Cyma. Est autē Cyma qđā ipsorū caulium, delicatior teneriorq; cauliculus, quem a prima sectione, proximo uere præstant. Gręci Cyema, quasi partē eius uocant. Nōs & Cymas, & Cymata uocamus: nec in Brassica mō, sed in Raphano, & alijs cōpluribus: q̄q; absolute Cyma, nō nisi de Brassicę fructu capis. Palladius Quymā uocat, et semel opere in toto Plinius. Post Cymā æstiuū, autumnaleq; cauliculi, mox hybernū, tū deinde iterum Cyma, nullo æque genere multifero, donec sua fertilitate cōsumatur. Omnibus oleribus antepōnit Caro Brassicā; ppter ea, ut inquit Varro, nōmine oleris Brassica intelligitur. Vires ad Brassicā assitę diffugiunt, in trorsumq; in fundum se declinant: quo argumento usus Androcydes, cōtra ebrietatem ualere Brassicam dixit. Tāta est inter plantas quoq; discordia. Hinc Nestor in eo libro, qui Alexicepos inscribitur, olus hoc ex Lachrymis Lycurgi, a Libero paire uiribus adalligati, natum prodidit. Brassicę decoctę aqua; nihil æque setechumi effusa, crustę si occupent intus uasa calidaria, in tantum, ut non sit eas auellere: si Brassica in ijs decocta fuerit, abscedūt: Coles capitateos, uulgaris sermo, Scapitos appellat, antiqui Lacutres, et Tritianos, ut consēdo. Ex semine uetusto Brassicę nasci aiunt Rapham, & contra ex Raporum Brassicam. Nobilitauit Brassicam Ionia, per eam iurando, quasi p̄ aliquem Deorum: ut Zeno Citeius stoicę familię caput, per Capparin, Socratis credo æmulatione deierantis per carum. Ob id & mantin, ceu uatem quandam ab Hipponactē Brassicam uocari, testis est Athenæus: qui & puerperis in Attica regione amuletū cuiusdam loco Brassicę apponi solitam commemorat. Nomen oleris commune quidem est quibuscumq; Lachanum apud Gręcos. priuatim tamen Brassicę tribuitur. Ab olla dictum Olus, testis est Varro: ut eo uideatur poeta Veronenis alludere cum cecinit, non olera Olla capit. In quo sciamus obiter, non pro uase in eo uersu capi Ollam, sed nomen esse uiri proprium, quod ignorantes fere grammatici, delyrant: Quemadmodum & in eiusdem poetę uerbo, Mentula.

E X M. V E R G. C O M M.

Avtor omnibus, ut credimus, post se Theophrastus fuit, ut Brassicę, quę edendo est, præcipuam diuisionem triplicem faceret: nec aliter, si conferantur ueterum latinorum cum eo in hac parte cōmentaria, rem diligenter intuentibus uidebitur. Nihil enim octauo de plantis libro, de olera hoc ab eo dictum, non ijsdem uerbis, Romana breuitate a Marco Catone rusticorum rerum capite centesimo & quinquagesimo septimo redditum est: & post Catonē a Plinio naturalis historia. 19. cap. 7. Quę ideo nō repetuntur a nobis: quoniam quę tria a Dioscoride numerantur hoc loco Brassicę genera, satiuę, agrestis, & marinę, aliam diuisionis rationē habent. Siquidem illę ex ruris, hortorumq; disciplina, & ad usum sanitatis in pascenda familia ab autoribus illis traditę fuerunt: hę diuersis locis nascentes, ad medicinam docentur. Oportet itaq; in priore illa Brassica, & quam satiuam hic dixit, tria illa Theophrasti, Catonis, & Plinii genera collegisse. Omnium enim pares uires sunt. Tum agrestem, & marinam illis adiecerē sponte sua, alijsq; locis, & ad medicinam tantum nascentes, & quę non aliunde q̄ ex similitudine aliqua in familiam & nomen Brassicarum uenerunt: quales plantę alię multe, deficientibus proprijs appellationibus, quibus indicarentur, gentiū adoptione, nomen, & dignitatem inuenerunt. Vidimus nos marinam Brassicam, nihil præter florem simile satiuę habentē, eadem figurā qua a Diosc. describitur, tenuissimis, & in longitudinem porrectis folijs, qualia in Salice sunt, pediculis pendentibus, & in longis ramulis per interualla binis deinceps dispositis. Hanc in antiquissimis gręcorum codicibus a Romanis legimus marinum Codiculum uocari. Agrestem Plinius Erraticam etiā nominat, cōmuni syluestribus cunctis appellatione. Quę enim gręci ἄγρια dicit, erratica plærūq; latini appellauerūt. Non relinquendum illud etiā, qđ ad gręcorū in hoc olera appellationes pertinet: quam posteriores in ea gente Cramben dixerunt, antiquiores Raphanum dixisse. Testatur id Theophrastus libro de plantis octauo, qui non alio q̄

Raphani nomine p Crabe utit, Verba eius sunt, τὸν δὲ ραφάνον τριχὴ διαρραμύνει. &c. Nec multo post, ἰδίως δὲ ἢ ραφάνον ἔχει. Itemq; lib. 2. de causis plātarū, κατέπιρ ἢ ἐμπικλος τῷ τῆς δάφνης χρὸς τῷ τῆς ραφάνου. Quę oīa nō de Raphano, quę Radicula nūc est, sed de Crabe; quā Brassicā nostri nomināt, ab eo dicta fuerunt. Idem, & longe certius Aristoteles lib. 5. de animalī hīstoria, q̄ loco de erucis in Brassicis nascētibus his agit uerbis, αὐτὸ γινώσκειν ὅτι τοῦ φύλλων τοῦ χλωρῶν χρὸς μαλιστα ἐπὶ τῆς ραφάνου ἢ καλοῦσι τινὲς ἀραμύνειν. Qd̄ est, Nascunt et alię ex uiridibus folijs, p̄sertimq; in Raphano, quā Crambē aliq. i. Brassicā nomināt. Actum de tota hac re lōgius a nobis est, ut intelligenter legentes, quanto periculo huiusmodi docent, nisi res prius q̄ uoces cognouerit aliq; & scirent, quī medicīnam profitentur, posse aliqñ fieri, ut Raphanū p Brassica in antiquis finis græcorum scriptoribus inueniant, qualis Hippocrātes est; oportereq; in ea uoce, non Radiculam quę nunc græcis & latinis Raphanus dicitur, sed Brassicæ olus intelligi.

¶ De Syluestri Brassica. CAP. CXXXIIII.

Syluestris Brassica, quam Romani Rusticā appellant, maritimis prærupisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq; amara. Cuius Cyma i lixiuio cocta ori nō insuauis. Folia illitu uulnera conglutinant. Et inflammationest, umoresq; discutiunt.

BARBARI COROLL.

Brassicam syluestrem, Græci medicantes Ceram quoq; nominant; nos Erraticam. Quancq; sciendum, Ceram genus Raphanū a Plinio acceptū, non Brassicæ. Hanc aliq; Petræam uocāt, in micillissimam uitibus. Sunt qui Colem syluaticum appellent. Syluestris laudes imenso plus prædicat Caro q̄ satiuæ. Folia syluestri leuia, rotunda, parua, & ut Plinius inquit, bina, sed densissimā, & plurima, plantis oleris similior. Inter syluestres Brassicas & Lapšana est, ut diximus; itē Sandix, & Iasione, & Enthusifcon, siue ut aliq; codices, Anthrifcon. De Petræa Theophrastus, si modo hæc est quam supra diximus, circa Pfophidem nasci scribit optimā, numerosamq;. Aliubi non Petræam, sed Petræum uocauit. Alioquin & Capparis Petræa quandoq; dicitur. Nā Petrophytes Aizoum est, ut Empetron Saxifraga.

κράμβη ἀγρία

Theo. lib. 7. capite. 4. 5.

B

¶ De Brassica marina. CAP. CXXXV.

Marina Brassica a satiuā prorsus abhorret, q̄ folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula a ramulis rubentibus exeunt, singulari ut Hedera stilo. Habet lacteum succum, sed paucum, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hærbā in totum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carne.

BARBARI COROLL.

Brassicæ marinæ cauliculos quidam Halmyrida uocari putant, quoniam nisi in maritimis non proueniat. Nauigatione quoq; longinqua, uiridibus asseruatis ad transferendum. Plinius hanc marinum Olus, est ubi appellari, recentiores græci Thalassocramben.

κράμβη θαλάσσια

¶ De Beta. CAP. CXXXVI.

Beta duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticula, ut uentrem sistat. Quod magis radice eius præstat. Candida aluo utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxi succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat. Aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis & foliorū, furfures, lentescq; deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs uililignes nitro antea perfrictas, alopeciarū inanitates, atq; depascentia ulcera, illi ni prodest. Eruptionibus popularū, igni sacro, ambustisq;, cocta medet.

BARBARI COROLL.

Beta culturæ quadam ratione incrementum capescit arboris. Seritur circaensem maium,

Pli. li. 19. ca. 8.

x iij

C sicut omnia, quæ græci uocant Epispora: quod genus etiam sementis primæ nomen habet: etiam si alio quoque fata mense proueniant. Ideoque Beta æstate, sexto die nascitur, hyeme decimo. Peculiare in Beta est, ut non continuo singula semina producat, sed anno interim sequenti, sæpe tertio. Radix Betæ unica, longa, recta, carnosæ, gustu iucunda, & nonnullis grata cibo uel cruda. Elateribus aliæ item crassæ, modo singulæ, modo binæ, ternæque funduntur. E quibus fibræ coherentes alligant. Cortex neque crassius, neque Raphani modo extricabilis, sed Olusastro ad quandam modum similis. Semen integritur cortice. Folio Beta uiret, pede candicat, figurâ, b, literæ cum deprimitur, ab olitoribus refert, unde nomen. Beta hortensiorum leuissima est. Græci præferunt ex Alsca ubique candidam, parcissimi seminis, appellantes Siculam. Nostri Betæ grana faciunt, uernū, & autumnale: quæque & iunio & ianuario feratur. Medici Betam innocentiorē, quam olus esse indicauerunt, ut inquit Diphilus. Quamobrem appositæ, non nemini degustare etiā religio erat, utque ualidis potius in cibo essent. Gemina huic natura, & oleris, & capite ipso exiliētis bulbi. Neque alij hortensium lauitudo tanta, ut in lactucis, cum cœperit colorē trahere, imposito leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In Circiensis agro amplissime proueniunt. Vini sapor in dolio corrumpitur Brassica, sed odore Betæ folijs demersis restituit. De aliâ porro Beta, præprie syluestri dicemus in Limonio. Græci Betā modo Seudos, seu modo Teutlos uocant. Hippocrates Tetydon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro, quod de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse Teutlis, ut Athenæus inquit, ex Diphili comici sententia. Nam duo fuere Diphili: medicus, qui & Siphnius cognominatur: & comicus. Hic imperitum quandam in comœdia describit, taxans quod Teudon Teutlida nominaret. Eudemus quatuor Betæ facit genera. uulsiile, surculosum, populare, candidum. Betam græci, ouillum Corium or Betæ facit genera. uulsiile, surculosum, populare, candidum. Betam græci, ouillum Corium uocant: unde Bætylus is lapis appellatus est, quem pro Ioue Saturnus uorasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine, ad Iuliopolin in Syria, proxime Libanum montem. Est & auicula, quæ uocatur Betylus, olim dicta Detylus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Q uorquot hætenus de Beta notissimo omnibus olerē, aut in historia, aut medicina aliquid tradiderunt, æquines duo genera eius fecerunt, colore alterum ab altero distinguentes. Theophrastus lib. s. *ἡ φυλὴ τῶν τῦτλων τὸ λευκὸν τοῦ μίλαντος, καὶ ὁ μίλαντος τῶν τῦτλων*. Quod est. Meliore autem succi copia in Betis candida quæ nigra est: pauciorē etiam semine, quam Sicelicam aliqui uocant. Plinius 19. uolumine a Theophrasto accepta eadem, his reddidit uerbis. Eius quoque a colore duo genera græci fecerunt, nigratū, & candidam, quam præferunt, parcissimi seminis: appellantque Siculam. Paulus Aegineta etiam in sexto, candidam nigræ anteposuit. Athenæus præterea in tertio Dipnosophistæ, candidam nigræ prætulit: quod simul alium mollit, & stomacho accommodata est: quod non facit nigra, quæ adstringendi uim habet. Et ne longiores simus, nullus non de Beta agens, discrimen eius oleris hoc tradidit: & nihilominus præter Theophrastum, nullas discriminis eius alias notas aliquis ostendit, quibus cognita in frequentiore usu esset: & is non quod ad colorem pertineret, sed quod ad uires, bonitatemque succi, & exiguam seminis copiam. Solus Columella, quod hætenus legerim, in carmine suo facilem coloris huius in Beta cognitionem indicauit, dicens. Sic & humo pingui, ferratæ cuspidis ictu. Deprimitur folio uiridis pede candida Beta, pedem candidum, radicem appellans, quæ facilis cognitu, nota omnibus cum seretur & uelletur erit. Quæ enim nigra radice erit, agrestis Beta habebitur: ideoque in uetustioribus & melioribus aliquot græcis, a principio huius capitis legitur, non ut Barbarus uertit *τῦτλον μίλαν*, quod gran de significat, sed una tantum mutata litera, *μίλαν καὶ ἄγριον*, quod nigrum indicat & syluestre. Hæc enim candida comparata, agrestis a græcis habebitur: non quam Plinius uicelimo libro cap. s. Limonion, aut Neuroides a quibusdam uocari ait. De qua hic ipse scriptor libro quarto folia Betæ similia habere tantum dicit.

ἡ φυλὴ τῶν τῦτλων

De Portulaca syluestri.

C A P. CXXXVII.

Syluestris Portulaca, quam aliqui Aizoon syluestre uocant, alij Telyphion, Romani Illecebram, aliqui Portulacam, Aphrimœmœon, Daci Lax, Aegyptij Mochmutim. Folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutis, latioribus. Nascitur in petrosiss. Nonnunquam in hortis. Folia Oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex u

na radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum parant, uiscosi, & aliquantum salsi. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. Discutit strumas, cum axungia illita.

BARBARI COROLL.

Andrachne sylvestris, de qua hic agit, genus est Aizoi, ut quarto uolumine constat, ubi Dioscorides hanc herbam fere hsdem uerbis demonstrat. Nasctur breuiore cacumine, q̃ minus Aizoum: quod in muris, parietinisq; prouenit: cui & similis ostenditur. Colligi hanc & cibi causa constat. Habentur & alia duo genera sylvestris Andrachnes, hoc est, Portulacae nomine, ut in Telephio, & Pepli diximus. Telephion in Theocrito, sunt qui folium papaueris accipiunt, ad explorandū amorem crepitu adhiberi solitū, qui lusus fere puellaris erat, ut inquit Polylux, etiamnū ex Lilio. Non defunt qui sui generis herbā intelligant, succo seminis sanguineo, folijs Loti satius, siliqua Pampini modo intorta. Alij miscellam quandā esse putant Telephion, quae corporis partibus imposita, si cutis rubescat, indicium amoris esse, ob id Philtrōn quoq; dici: sin accendatur, & exulceretur, odij. Ego Telephion Theocriti eādem esse cum ea de qua hic agitur existimo, quippe cui excafactoria & ulceratoria uis insit.

Pli. li. 35, ca. 25.

De Portulaca. CAP. CXXXVIII.

Portulacae uis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, ceterisque, cum polenta imponitur. Ardoribus stomachi, sacro igni, uesicae doloribus auxilio est. Communducata, dentium stupores sedat. Stomachi & intestinorū aestuationem, fluctionesq; mulcet. Renes & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant. Veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febris ualens. Contra teretes uentris tineas, cruentam excreationem, dysenteriam, haemorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est. Item cōtra sepsis morbus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur. Interaneis fluctione laborantibus, atq; uuluarum erosionibus infunditur. Contra dolores, quos aestus excitauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. Eruptiones papularum in capite, cum uino emendat. Vulneribus quae ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

Arist. li. 3, ca. 2.

BARBARI COROLL.

Portulaca exit post Cucurbitam, Ianuario mense, ut Theophrastus inquit, seritur: Hippocrates Portulacam fluuiatilem dicendo, uidetur recentem, & non inueteratam intelligere. Fluuiatilis inquit Portulaca refrigerat, inueterata excafacit, atq; purgat.

Theoph. li. 7.

De Asparagis. CAP. CXXXIX.

Asparagvs, quem aliqui Petreōn, alij Myacantham, alij Myon uocant, uulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, uentrem emolliunt. Urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, renum uitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit. Cum uino autem phalangiorum morsibus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen ad eadem ualet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atq; defossis. Quod, q̃tum equidem sentio, plane a ueritate abhorret. Is tamen Asparagus multis ramis fructicat, folijs feniculi, numerosis, radice rotunda, grandi, tuber habente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant.

Arist. li. 3, ca. 2.

C Assus autem, coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Cum ficis, aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctū, concēptum adimit, & sterilitatem adfert.

A S P A R A G I C O R O L L.
 Pli. li. 19. ca. 8. **A** Sparagus, uel ab asperitate, ut inquit Varro, uel quoniam ita Græci nominēt, Aspharagos a Theophrasto dicitur. Ipsum quoq; guttur a quibusdam Aspharagus uocatur. Ab Apione tamen grāmatico, non Aspharagus, sed Spharagus. Corrudā nostri appellant hancher bam. Spinosi sunt Asparagi ex toto fere, ut scorpius, unde Scorpiones quoq; a Columella fortasse nominātur: quamq; Asparagus cognomēto Scorpius, siue Scorpio aliud genus est, ut in Scorpio de herba disputabitur. Post æquinoctium autumnī flos exit e quodam folliculo secundum aculeos. Asparagā uero Theophrastus pro planta ipsa uidetur accepisse, aut etiā pro loco, ubi satus est Asparagus: eodem etymo fere quo apud nos Cepina, Rapinaq;. Theodorus Corrudagine quasi aliud q; Corrudā genus interpretatur. Cato certe ad eundem modum Corrudam, quo Cepinam & Rapinā accipit. In arundinero inquit Corrudā ferito, unde fiant Asparagi. Exit uere caulis cibo idoneus: tum scabrescit, & processu in florem abit: qui nō ex ipso tantum, sed ex prioribus erumpit. Non enim caulem habet annuū. Hæc ueteres, qui Altiles Asparagos non uidentur nouisse. Corrudam Attici, non Horminion (aliud enim est) sed Orminion, & Ormenon potius, aliqui Libycum Asparagū dixere, utiq; syluestrem qui post inuētos Altiles, proprie Corrudā est. Corrudæ iterū species duæ, candoris solo discrimine. Candidiori efficacior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestrem Asparagidā scribit uocari: satiuū, Ormenon. Serunt spongij hortenses Asparagi. Ita enim Radiculæ Altiliū uocantur. Vellunt præterq; primo anno radicitus, alioquin decerpis stirpes præfractæ angunt, & quasi excæcāt oculos spongiarū, nec patiuntur Asparagū mitti: spongiæ post quadragesimū diem inter se implicantur, & quasi unitatem faciunt: post annos aliquot transferunt fertilitate in decenniū durante. Serunt & seminibus paxillo dimissis. Vi et thyrsos, siue stilo primū emicant: qui caulem educens, tempore ipso quo fastigatus est, in thoros fruitur. Nullum hīs gratius solum q; Rauenæ fuit, quæ gloria in hodiernū quoq; mansit ei terræ. Nomen porro Asparagi generale est: ut Betæ, Bliti, Lactuæ, Atriplici, Maluæ, Rapo, Sinapi, Radiculæ, Pyrethro, Brassicæ, Nasturtio, Bryoniæ, Lauragini, ut in omnibus hīs alia res Asparagus, alia frutex sit. Errant qui Corrudā pro eo capiunt, quæ medicorum officinæ Lupulum cognomināt: folijs apertissime redamantibus, quæ in Corrudā capillamentī modo tenuata, in Lupulo Bryoniæ similia, paulo asperiuscula. Caulis ei spinis horret, cacuminibus tamē, & Corrudæ modo in torulos turbinatis. Flores habet folia ceos & candidos, qui fere allium, uinūq; subolent. Hanc Græci uulgo Bryton uocant, a Bryoniæ ut puto similitudine. Brusculam, quasi bryon scansile, rura dicunt. Aut hæc oīno, aut non ab similibus huic herba est, qua occidentis populi Ceruisiam suā maceratis humore floribus comendant, sapore quodā uini, Habiolam, siue Habillam Gallicæ uocantes, Humulū, & Tholophin Germani. Ego Lupum salictariū a Plinio dictam censo, subit enim, scanditq; salices, & arbuta omnia, circūuoluendo se complectitur. In Flaminia quoq; Lupus reptitius uulgari nomine uocatur hodie. Herbariū inquit sponte nascentiū, quibus utimur in cibis, in Italia paucissimas nouimus, Fraga, Tanum, Ruscum, Batin marinam, Batin hortensianā, quam aliqui Asparagum uocant Gallici: præter hæc Pastinacā pratensem, Lupum salictariū: eaq; uerius oblectamenta q; cibos. Habetur & aliud quoddā genus, ut idem Plinius testatur, incultius Asparago, mitius Corrudā, passim etiā in montibus nascens, refertis superioris Germaniæ campis. Nam quod in Nefide Campaniæ insula sponte inquit oritur, opimū existimatur.

V E X M. V E R G. C O M M.
 Ix credat aliquis, q; multa in notissimo olere toto hoc capite mutata, corrupta, & addita fuerint, quæ nouisse legentes inutile penitus non fuerit. Estq; illud ante omnia sciendum, de agresti Asparago omnia hæc a Dioscoride dici. Ideoq; a principio statim Petræus, id est, in petrosis nascens dictus est: ut ea additione ab Altili, quem in hortis consitum, solæ nouerunt diuitum mensæ, discerneretur. Nec tantū Petræus illic legitur, sed in aliquot græcis *ἄγρος*, id est, agrestis etiā inuenitur. Indicantq; id manifeste quæ sequuntur appellationes, Myacantha, & Orminion, quæ omnes in agresti Asparago a Plinio numerantur. Habetq; Myacantha caussam &

originem nominis ex Rusci appellationibus: ut in eo indicabimus. Orminion autem a nobis dictum est, quod myon in impressis codicibus legebatur, nulla significatione: instauratusque locus Plinij, & aliorum auctoritate merito a nobis est.

¶ De Plantagine.

CAP. CXL.

ARnoglosson, alij Arnion uocant, alij Probaton, alij Cynoglosson, alij Heptapleuron, alij Polyneuron, Magi Eurechnemona, Aegyptij Asonth, Romani Plantaginem, Hispani Thesalicam, Poeni Atijrcon. Duo eius genera. Minor, folia habet angustiora, minora, molliora, lætiora, & tenuiora, caule anguloso, in terra sessili, floribus pallidis, semine summis caulibus emicante. Altera maior & uirentior, latis constans folijs, olerum generis. Cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, a medio ad uerticem tenui semine circumdatus. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentem. Quare omnibus malignis ulceribus, & fluctioni opportunis, atque elephanticis, fordidisque illita profunt. Profluuiâ sanguinis, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibent. Vetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt. Chironia sanant. Sinus conglutinant. Moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, pgnis, parotidibus, strumis, ægylopijs illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale Betæ, cum lenticula coctum. In leucophlecinatia, inter aridas epulas hærbæ decocta datur. Comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. Cum cimolia, aut cerusa, igni sacro medetur. Fistulis infusus prodest. Lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. Contra rabem datur in potu. Aduersus strangulationes uulvæ, in uellere subijcitur, etiam si uulua fluctuatione laboret. Semen ex uino potum, alui fluctiones & sanguinis excretaiones sistit. Decocta radix, & manducatu, & collutione dentium dolores sedat. Eadem cum folijs, ulceribus renum, & uesicæ in passio datur. Ferunt tres radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari, & quatuor quaternis. Sunt qui radicis gestamine, discutiendis strumis utantur. Syri ius Plantaginis & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos uirēs defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, ueneris die. Hoc autem ueluti arcanum accipit, quod ueraci experientia compertum est.

BARBARI COROLL.

Plantago herba, Stelephuros, & Ortyx a Theophrasto dicitur, a Plinio Σελαφύρος, & Ortygia. Coturnix a Theodoro ueritur, a Dacis Σιμπεάξ, Alij Thyétericem, alij Theucaricon

A

ἀρνόγλωσσος
ἀρνίον
κυνόγλωσσος
πάλυντρον
ἰππία πλυντρον

B

Pli. li. 27. ca. 9.

C appellant, a nostris quandoq; Septineruia. Quamq; Heptaneuron alia uidetur herba q; Plantago, id quod ex emplastro quodam aduersus collectiones, cui nomen est Botanicon, aperte liquet: quippe in quod tres quarantur herbæ: Plantago ternis uncis, heptaneuron senis, leoneuron quoq; ternis. Nec quæ sit Leoneuron intelligo. Flosculus ei lanugineus, ut frumento: particulatim erumpens, ut aphaca, & intubum. Inter spicatas est Plantago, sed minor, nigrioribus folijs, & linguæ pecorū similis, unde nomen apud Græcos Arnoglossos: maior folijs laterū modo includitur: quæ quia septem sunt, Heptapleuron nonnulli uocauere. Caulis angulatus, & similis Napi. Arnoglosson, & Arnoglossa dicitur, a Græcis Plantago.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ a Dioscoride numerantur tam multæ Plantaginis appellationes, una tantū uoce a Plinio colliguntur. Siquidem 25. uolumine capite. s. linguæ pecorum similia Plantaginis folia esse dicens, Romana breuitate complexus omnia est: quæ in legendum gratiā explicanda modo a nobis sunt. Arnoglossos itaq; a Græcis Plantago dicta est, q; agninæ linguæ folia eius speciem habent, ἀγνιον enim agnum, γλώσσαν uero linguam ea gens appellat. Eandem habet rationem & causam ἄρνιον, quasi adiectiua forma agninā herbam dicas. πρεβάτιον itidem ab oue, quasi ouillam. πρεβάτιον enim græcis ouis est. κυνόβλωστον, id est, canina lingua, non quia quæ uere Cynoglossa dicitur Plantago sit, sed non dissimili foliorum figura. Videturq; appellatione hac minor potius, q; maior Plantago significari, quæ caninæ linguæ similior q; maior est. Dico autem Caninā linguam herbam sic appellatam, de qua in quarto agendum erit. Heptapleuros eadem, & Polyneuros ex eadem caussa, iisdem notis dicta est. πλυνφας enim Græci costas dicunt. Et quoniā septem crassioribus fibris, quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sint, ideo nomen id inuenit. Nec minus a multitudine earundem fibrarū, quas neruos etiā uocant, Polyneuron. Factumq; postremū hoc nomen ex eo est, quoniā non semper septem, sed aliquando quinque tantū his fibris distincta est. Eamq; ob causam, quoniā non semper responderet numerus, aliqui incertā relinquentes rem, Polyneuron, quasi multineruū dixerunt. Tam enim quinque q; septem multa sunt. Variant autē Plantaginis fibræ pro latitudine folij: quod enim latissimū fuerit septem, quod angustius, quinque plerumq; habet.

D De Lauere, seu Sio. C A P. C X L I.

σίον ἀναγallis
σῖνον ἀρωματικόν

Sion, quod in aquis est, aliqui aquatilem Anagallida, alij Darenion, alij Lauer, alij Schinon Aromaticum uocant. In aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, Holusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. Vrinas cient. Menfes & partus extrahūt. Dysentericis in cibo auxiliantur. De Sio Crateias tradit, hærbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora q; Mentæ, nigra, & ad Erucam accedentia.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 26. ca. 8.

Sium latius Apio est, nigrius, pinguius, copiosum semine. Sion ἡ ὄσλα a Græcis uocatur, hoc est, Sium in aquis, siue aquaticū. Hoc multū uulgo Cresionē dici rentur falso, promiscuū & acetariū olus, & refrigerantis naturæ: At Sium calfacientis est, & odoratū. Sunt qui Lauer Plinio uocatū, in riuis proveniens, utile torminibus coctum & conditū, & ad calculos uesicæ crudum pro Sio capiant. Nam & Dioscorides hoc loco Sium ait a Romanis Lauer dici, etiā si Lauere scriptū est. Sunt qui herbā, quæ ab eodem Plinio Silaus dicat, in glareosis & riuiulis nascēte, Apij similitudine, uescis perinde laudat, pro Sio & Cresionibus intelligant. Ego in castigatione Pliniana uerbū illud Silaus, adulterinū arbitratu sum, nec Silaus, sed Lauer scribendum. Hoc autē Lauer, ipse pro Cresionibus accipio, nō pro Sio, qd odoratū est, ut cōmonui.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est ut uidetur dubitandum, quo loco nascatur Sium: quale autem sit, Anagallis indicabit: ob cuius similitudinem aquatica Anagallis a quibusdam dictū est: indicabit ob eandem causam & odoratus succus. De quorū altero actum in primo uolumine est, de altera non multo post in hoc ipso agetur. Idem hoc Sion a Romanis Lauer dici, hic ipse scriptor testatur. Meminit autē Laueris Plinius, ut credimus, lib. 26. non tamen idem Laueri in eo Sion est: quoniam de Sio. 22. uolumine eiusdem numeri capite longius egerat: dixeratq; latius Apio esse, in aquis nasci, pluraq; alia, quæ poterunt in eo uolentes certius expendere. Nos illud tantum mo

nemus, Lauer dici Sion ob natalium similitudinem, quoniam ambobus uita in aquis sit. Quid autem Lauer Plinio dicatur, non difficile erit rem diligenter in eo contentis plantis intellexisse. Describit enim, in aquis nascentem uulgarem herbam, qua rura fere omnia cum aceo in cibis utantur. Sunt qui credant hanc esse, quam uulgius Cresiones appellat. Quod nos ut non negamus, sic etiam non confirmamus. Quod autem testatur est, non esse Sion quod Lauer. Id enim auctore Dioscoride odoratum est. Lauer nullo odore commendatur. Qualecunque autem Sion sit, non adeo dissimile Apio describitur. Nec est quod miretur aliquis, nostra aetate tantarum rerum incertitudinem: cum hec quondam florente Græcorum fortitula, Sium, ut paulo ante monstrauimus, a professoribus cognosceretur. Ostendunt nostrae aetatis herbarij, dissimilem huic penitus quam illi Sion uocant, Feniculi folijs, altiore crassioreque caule, grandi in summo umbellae nisi confertior sit feniculo, non dissimili colore, in cunctis albicante.

S **SYMBRION**, alij Serpillum uocant, alij Veneris Coronam, Theophr. lib. 6. cap. 7.
Romani Veneream, aut Eusteralem. In solo inculto nascitur, Mentae hortensis similitudine, odoratus, latiore folio. Inseritur coronis. Calfaciendi uim habet. Contra stillicidia urinae, calculosque semen ex uino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. Item contra uesparum, apiumque ictus, Vomitiones potu cohibet.

S **SYMBRION**, siue ut recentiores Græci, Cimbium, degenerat in Nepitam aspectu, sed odore in Mentam, ut Theophrastus existimat. Laetissimum nascitur circa piscinas, & stagna, & in puteorum parietibus. Folium in secco nascenti angustius, quam quod in aquis prouenit: de quo mox ageretur. Sisymbrio montes praecipue scaten, sicut Thracia: ubi & Serpyllum, aut aquae deferunt ex his auulsos ramos, feruntque. Item Sycione ex suis montibus, & Achenis Hymetto, Sisymbrium folio tantum coronat.

S **SYMBRION**, siue ut recentiores Græci, Cimbium, degenerat in Nepitam aspectu, sed odore in Mentam, ut Theophrastus existimat. Laetissimum nascitur circa piscinas, & stagna, & in puteorum parietibus. Folium in secco nascenti angustius, quam quod in aquis prouenit: de quo mox ageretur. Sisymbrio montes praecipue scaten, sicut Thracia: ubi & Serpyllum, aut aquae deferunt ex his auulsos ramos, feruntque. Item Sycione ex suis montibus, & Achenis Hymetto, Sisymbrium folio tantum coronat.

EX M. VERG. COMM.

Sisymbrium ut odore in Mentam, figura in Nepitam degeneret, praecipuam a culturae negligentia causam habet. Nisi enim assidua cultura coercetur, & translatione nouos ueluti naturales quot annis accipiat, in varias plantas quod primum diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticae, & plantarum historiam tradentes scriptores omnes, Theophrastusque praesertim: qui nullibi de naturae mutationibus his egit, ut non Sisymbrij in Mentam, degenerantis exemplum usus sit: causamque mutationis eius in quinto de plantarum causis longius profectus est docens fieri, ut cum Sisymbrium non excoluerit olitor, nec propriam illi & necessariam culturam reddiderit, altius radices agat, actusque in altum omne illud nutrimentum conuertat, eoque destitutas superiores partes infirmiores fieri, & odoris acrimonia amittere: eaque amissa, reliqui corporis odorem infirmum, languidumque, & Mentae similem fieri. Eamque ob causam, ne id patiat, transferri sapienter Sisymbrij in disciplina ruris & hortorum praecipitur. Serpilli figura & speciem aliquam Sisymbrij habet: ideo a quibusdam, ut hic ait, Serpillum etiam uocatum est. Quomodo modum in similibus fieri solet. Plinius Serpillum ait syluestrem Sisymbrij a quibusdam dici. Facit id negligentia, & rerum ignorantia: cogitque, commutatis ob similitudinem inuicem nominibus, diuersa rerum genera, graui periculo miscere. Veneris coronam, & herbam Veneream, ob odoris suauitatem, uerisimile est dictum quondam fuisse Sisymbrium. Amorum enim Deorum amoribus aptas tantum sibi exigat herbas, quibus coronata in comestationibus suis iuuentus, suauiore odoris oblectamento, uoluptates suas commendet & augeat. Et haec de primi, aridisque & incultis locis nascentis Sisymbrij appellationibus dicta satis sint. Quae deinde in altero & si modo in aquis nascente a Dioscoride numeratae fuerunt, ab eodem etiam declarantur: Ideo enim Cardamine facta a Nasturcio nomine, dictum quondam Sisymbrij hoc fuit, quod simile Nasturcio in gustu & sapore sit. Tantaque est Sisymbrij huius quod Cardamine dicunt, ad Sium similitudo, ut Paulus Aegineta in sexto retulerit, dicere quosdam, Cardamine hanc Sium esse. Nasci hoc ipsam locis quibus & Sium, a Dioscoride tantum dicit, in aquis, scilicet, idque genus Plinius etiam descri-

C pisse his uerbis uidetur. Lætissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Cum tamē hic aliter tradiderit, non circa, sed in aquis eodem quo Sium modo nasci. Non possunt abundantibus rebus, deficientibusq; nominibus priuatim, seorsumq; omnia citari. Generatim necesse est uocari, describiq; multa, unamq; hanc ob causam medica ubiq; materia tam parum certa est, tamq; in antiquis etiam scriptoribus multiplex, & uaria. Nos quod possumus præstamus, immensis operis huius aliquam post nos alijs partem relinquentes.

¶ De altero Sisymbrio. CAP. CXLIII.

κροδαμιν

Alterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alij Sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis quibus Sion prouenit. Quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, q̃ gustu Cardamū, id est, Nasturciū representet. Folia primū rotūda prodeunt, adulta Erucae modo findunt. Id exalfacit. Vrinās mouet. Crudū estur. Purgat lentiginēs, cutisq; uitia in facie, noctibus impositū, matutinisq; detractū.

B A R B A R I C O R O L L.

Si Sybrium syluestre a quibusdam Thymbræum appellatur, pedali, nō amplius altitudine conspicitur. Huic cognomentum est Cardamine, ut Galeno placet, atq; Dioscoridi.

¶ De Crithmo. CAP. CXLIIII.

κρίθμον
κρίταμον

CRITHMum, seu potius ut aliqui Critamon, fruticosa hæbula est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosis, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti Portulacæ, crassioribus, & longioribus, salso gustu. Flores candidi sunt, & semen ceu Rorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. Habet intus semen rufum, radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta uino, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumue in olerē. Seruatur etiam in muria.

Dbet intus semen rufum, radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta uino, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumue in olerē. Seruatur etiam in muria.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 27.

Crethmon, Batis latine dicitur: q̃q̃ Batis duplex, marina, & hortensiana: quā aliqui Asparagum uocāt gallicum. Liguria Baticulam hodie quoq; appellat. Caulis ei palmū altus Plinio, cubitalis Dioscoridi. Semen feruens, nucleo interiore, qui ut in Rosmarino Cachrys uocetur. De marina potius q̃ de hortensiana, siue quod idem est, satiaua loquitur Plinius, quotiens Crethmon nominat. Proinde alio loco de Bati medicinis, alio de Crethmo differit. Satiaua Batin, & olus Chordum a Columella dictam inuenio. Hanc quia serotinum sit olus, quo modo & Fœnum Chordum, pro eo quod secundariū est, & augusto mense uellitur, autumaleq; uocatur. Sed & pecus Chordum, & Chordū suum dicimus, ut Græci Opsigonon. Nam Merachoron uitiatus in utero partus suillus uocatur Aristoteli. Hæc rustica Hecale apud Callimachū notat apposuisse. Hippocrates Aethiopica Batin cōmendat. Est & Batis, siue Batos. inter pisces, quā admodū & Botis. Q̃q̃ sunt qui Botin, pro herba potius q̃ pro pisce capiant. ut Athenæus inquit, Batin, atq; Baton nostri Raia appellat. Nam quod Græci Rhinam, ipsi Squatina uocamus, cuius arida cutem Hippocrates Ichthyen noiat. Quamq; & instrumentū medicinale, quo partus ex utero præcidit, Ichthya dici solet. Raia certe Theodorus pro Batracho, siue Rana quādoq; uertit: nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batis porro piscis in tria genera dirimitur, Baton, Hobaton, & Asterianbatin: ex Squatina & Raia, natus Rhinobatos.

E X M. V E R G. C O M M.

Quam Græci Crithmon, a figura seminis, ut credimus dixerunt, Plinius, & alij ubiq; Batim, Columella nunc Batim, nunc olus Chordum, q̃ sero & appropinquante uindemia condiatur, appellat: ad mare primū, & in littorum petris, quoniam priora satius sunt syluestria, & per se nascētia, inuentū: mox in hortis ubiq; ad quotidianos usus consistit herbam: quam ditiorū, & plæbis mensæ pariter nouerunt. Eam hic paulominus q̃ cubitali altitudine in

caulem crescere ait: ceteri palmum erigi a terra tantum dixerunt. Quod in Italia, præsertim in Hortensi uerius uidetur. Non ideo tamen arguendus Dioscorides. Nulla enim in his certa naturæ lex & mensura est. Refertur magnopere in huiuscemodi rerum historia, quibus locis aliquid cõmentetur aliquis: credimusque nos quod hic ait, cubitali fere altitudine esse Batim, sic accipiendum esse, ut maxima omnibus locis hæc eius mensura sit, nec altiore cubito Batim alicubi inueniri. Estque legitimus hic, et ob naturæ uarietatem necessarius metiendi omnia modus; ut præfinito altero extremo, nec ultra, nec citra id aliquid fieri intelligatur.

¶ De Coronopo. CAP. CXLV.

Coronopus, aliquibus Ammonos, alijs Astrion, Pœnis Atir sitte, Romanis Cicatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dicitur. Oblonga hærbula est per terram repens, fissis folijs. Coquitur in oleo. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in semitis, iuxta domicilia, & locis incultis.

B A R B A R I C O R O L L.

Coronopus, hoc est, Pes cornicis, inter aculeatas a Theophrasto ponitur, sponteque nascentes. Interim & feritur, medicinae ad usum, Stilago, aut Stilago dicitur a nostris, a Græcis etiam Coronopodion, ut Galeno. Sunt Arabes qui hanc Coruinum uocent. Nec prohibeo, dū res constat, quibus cuique libet uocibus utatur: illud monendi sunt, herbam, quæ nō Pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam Coronopoda uideri, quæ Ranunculi genus, quod Polyanthemum cognominatur: quandoquidem aculeata & oblonga esse Coronopus herba traditur, & aluinis prodesse: Coruinus autem pes, aus eius, & Ranunculi similitudine conspicitur, plurimis foliorum diuisus, cuius uel tactu solo pustula, ambugi modo corporibus attollunt, florea aureo, copiosoque quibus notis, Ranunculum Polyanthemum uocatam coniungunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Scripsit de Coronopo de hac sæp pridē multa Leoniceus, uir nostri ætate dignus, cui multum defuerant bonarum literarum cupidi, in cõmentariolo eo quod de Plinii erratis aliquot edidit. Conatusque inter cetera est, quam hic romana appellatōe Coronopodis Castatricem esse dicit, ostendere ab Apuleio Galli crus dictam fuisse: & ex Galli crure ab imperitis græcorum librarijs Castatricem in hoc scriptore factam esse. Quod si confirmare ego ausum, uaticinari magis quæ censere me credam. Nulla enim eius uocis uestigia in hac supersunt. Nec coniectura aliqua in ea se offert, qua quod ignoratur & latet in lucem trahi possit. Illud potius admittendū, quoniam græci a Cornicis pede eam uocauerunt, uerisimile esse, latinos a Galli crure congruentibus alijs notis, ob similitudinem, nomen illi fecisse: quemadmodū ab aliquibus etiā, non cornicis, sed Coruinus pes hæc ipsa nominatur. Idem, præterea eandem a Plinio ait lib. 24. Graemen aculeatam appellari. De quo dubitandum nulli esset, si hic aut aculeata dixisset Coronopodem, aut quod aculeos indicaret aliquid illi adiecisset. Quam ob causam, nō sine ratione subsistet in Plinio alijs, audiens in aculeatas lib. 21. & secundo Coronopoda ab eo numerari. Nec nos Plinium arguimus, sed uarietate historię demiramur: dubitamusque, posse eam notā Dioscoride esse. Theophrastus lib. 3. de ea tradidit humi caulescere, quod hic ait per terram sterni: numeratque inter aculeatas, & sponte nascentes. Vulgaris & ubique fere nascentis herba hæc est.

¶ De Cicerbita, seu Soncho. CAP. CXLVI.

Sonchon asperum, aliqui Cichorium uocant, Romani Cicerbitam asperam. Aphri Gathonem. Huius duo genera. Syluestrior magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibis expetitus, anguloso caule, interdum rubicāte, folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtri usque uis refrigerat. Modice adstringit. Vnde aestuanti stomacho, et inflammationibus illiti prosunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat. Lac elicit. In uellere appositus, sedis ac uulua collectionibus opitulatur. Tam hærbā quæ radix illita, uibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs. Eum qui ra-

A

κορωνόπος

Pl. li. 22. ca. 19

B

σόνχος

Cmos habet, folia distinguunt. Sed ad eadem pollet.

B A R B A R I C O R O L.

Sonchos, in candidum, nigrumq; diuiditur. Lactucae similes ambo: nisi spinosi essent, caule cubitali, intus cauo. sed qui fractus copioso lacte manet. Sunt qui nigro uelci prohibeant: quia si faciente morbos. Sonchum Hecale cum Bati supradicta Thefeo, apud eundem poetam intulit, non tacendo Euclidis paradisi dicto non insulso, qui Sonchum in coena copiosam apponenti, senarium ex Euripide poeta protulit, ubi Capaneus inquit.

μικρὸν τραπίλαις ἔστιν ἰσχυρὸν τὰ γὰρ.

Aculeatur postq; tenera esse desijt, et adulta facta Sonchos, ut Galenus inq; Aetius hanc quandocq; Diplocon uocauit. Dioscorides Cicerbitam a Romanis dici prodidit: quod quidem uocabulū in Ethruria hodieq; durat. Nunc Romanum uulgo Crispinos, Venetia Lactucinos. Folia ex aceto, saleq; manduntur. Esculentia est & radix.

E X M. V E R G. C O M M.

Estur toto fere anno Sonchos: sed nihil autumno, quo tempore post primas pluuias nouo ortu tenerior frondet. In acetarijs nostris frequētius est. Eam, ut hic etiam testatur, rura nostra, & omnis Ethruria Cicerbitam uocat. Non ideo tamen credimus fuisse hoc eius antiquum nomen. Potuit enim ex non multo tempore Diosco. accreuisse, eo quo a principio diximus modo. Est ubi Crispinus, & ubi Lactucella Sonchos uocetur. Quotq; toto orbe gentes sunt, tot fere huiusmodi herbarum appellatione audiuntur. Nihilq; in medicae materię disciplina periculosus est, q; neglectis rebus, nominum tantum sollicitum esse. Nota omnibus Sonchus est. Certas enim habet notas: & si in scriptoris huius historia omissum uideatur quod precipuum in ea est, cuiusq; meminit Plinius, & unde Lactucella a quibusdam dicta fuit. Id autem est lactis liquor, quo fractus caulis eius manat. Potuit a Dioscoride propterea, q; nota uulgo Sonchus sit, ea nota relinqui. Potuit perijisse, ut perierat etiam in caulis descriptione ὑπόλευος, quod est, inanis & uacuus: quae uox in cōmuni graecorum lectione nulla est, & ex alijs, in quibus erat, restituta a nobis fuit: praesertim monente id Plinio, qui ait, caule cubitali, anguloso, intus cauo, & qui fractus copioso lacte manet: quae omnia manifeste Sonchus habet. Inter aculeatas herbas, sed non simpliciter a Theophrasto lib. 6. Sonchus numeratur. Aculeatur enim postq; induruit, & arefcere coepit. Fecerunt ceteri omnes Sonchi duo genera: appellaruntq; alij candidam, & nigram: alij asperiorē, & mītiorem: alij edendo, alij non edendo esse dixerunt, eadem rei diuisione et significatione. Vbiq; em̄ duo illa nascunt gēna. Solus Diosco. tertiuū genus Sonchi arborefcētis fecit, q; caret Italia. Nec nos hactenus qualis ea sit, & ubi nascat, a q; audiuius.

De Intubo, & Seri.

C A P. CXLVII.

Satiuam Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Romani Intubum. Duum generum est. Altera syluestris, quae Picris, et Cichorio uocat. Altera latioribus folijs constat. Stomacho q; hortēsia utilior. Quē iterū in duas species digerit. Vna folio latiore pdit, Lactucarū simillima. Altera angustiore ē folio, & gustu amara. Vtracq; refrigerat et adstringit. Stomacho utilissima. Aluū sistit cocta, si cū aceto adsumat. Syluestres stomacho meliores. Quādoquidē astuant ē ipsū, et quē imbecillitas uexat, leniūt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinunt. Podagris, et oculorum inflammationibus auxilio sunt. Hærbā cum radice illita, percussis a scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ceruifa & aceto ualeat ad illitus eorum quae refrigerationem desyderant.

B A R B A R I C O R O L.

Serin satiuam Dioscorides non describit, sed syluestrem dumtaxat. Summa ergo Intuborū genera, Seris, & Cichorium. Seris Lactucae simillima, Troximō a recentioribus graecis uocatur. Iterum duplex hæc, Satiua, quae proprie dicitur Seris, minor Cichorio & uenosior. Et Syluestris, melior priore; nigra hæc & aestiua, deterior hyberna, & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit, Cichore, nunc ē satiuum. A latinis Ambugia, & Intubis erraticus, in Aegypto Cichorium nomen habet. Duplicis & hoc naturę. Folio angusto, Chreston, & Pan-

eration, propter salubritatem uocatū, folio latiore, quod Edypnoidea cognominant, & Leonis dens uulgarī uoce dicta creditur. Similitudo Intubis tanta cum Lactucis, ut neq; ex eodem genere dici possint, neque item ex alio. Hyemis quidem impatientiores sunt q̄ Lactuca, uirul- q; praerentes, sed caule nō minus grati. De Cichorio Theophrastus uerba subiiciemus in Chon- drilla: quando & illa species existimatur Intubi a nonnullis.

EX M. VERG. COMM.

Prima oleris huius, & amplissima diuisio est, in satiuū, & erraticū. Dico autē Erraticū, qđ pōnte sua natum, omni humano cultu caruit: qualia in plantis, & disciplinā ruris multa fecit natura, feniculū, serpillū, pluraq; alia: a ueteribus latinis sic appellata, q̄ sub nulla olitoris, aut agricolae lege, libera uagantur & errant. Ideoq; in castigata, satiuus minus speciosa sunt. Quod manifeste in Intybo deprehenditur: cuius a principio unum idemq; genus, hac una ratione, in duas statim distrahitur species: quarū diuersae penitus notae sunt. Amarescit enī Erraticū, & angustiore folio est. Satiū ori, & in cibo gratius, latioribusq; folijs. Quod autē unū idemq; in anti- bobus seruat, flos est, & q flores ferunt ramuli: quos natura nobis indulsit, ut esset unde sati- uum Intybū facere uolētes, Erraticum cognosceremus. Post primā deinde & amplissimā diui- sionem illam, alia rursus, accedente maiore, diligentioresq; cultura, & hominis labore, diuisio facta est: discretūq; satiuū Intybū in Lactuce dulcedine, foliorūq; quātitate & figura simile: & qđ minus eo sit, & amarulenti saporis. Et hic census Intyborū nostra aetate etiā est, uocatq; Flo- rentinus ager Erraticū & Amarū primū Intybū illud, qđ graeci ab amaritudine Picrida nomi- nāt: gentes autē aliq; priuati Cichoriū: a multis quē habet in radice capillamētis, Radiculā. Idemq; huic nōmīni genus est, quod translatum, terraq; sepius obrutū, candorē tēneritudinēq; acquirit, & maiorem amaritudinis partem amittit. Duoq; haec genera sunt a Diof. primū nu- merata, Satiuum deinde illud uno Intybi nomine nunc censetur: ut corrupta ab Intybo uoce, Ethruria Endiuia passim appellat. In hoc & maius, et minus est, dulcedinisq; et amaritudinis discrimen aliquod: quod ut uidetur ex una diligentia & culturę ratione euenit. Prius illud notis- simo uerbu in Georgicis suis indicauit Maro, cum dixit. Et amaris Intyba fibris. Intelligens enī Intybū gñis nomē, ut graecis Seris est, latinis esse amaritudinem, ut a uerba contraheret specie, addidit. Secundum illud Galenus dicens, *μικρόν & σμαίνι λεγόμενον εντυβολόχανον*, quod est. Ci- chorium, quod Romāni olus Intybi appellant. Indicauit & Flaccus cum cecinit, me Cichorea, leuesq; Maluæ, & cetera. Est enim Cichorion peregrina graecis etiam uox, quā omnia haec In- tyborum genera simul indicet. Est ab aliquibus ad primum illud & amarum Intybum cōtra- cta fuerit. Nihil, ut uidetur, in antiquis scriptoribus circa congeneris plantae huius appellatio- nes certum est. Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, Cichoriū appellat syluestre illud ge- nus, quod eodem autore ab amaritudine nomē inuenit. Agit enī de herbarum caulibus, atq; *ο δὲ τὸν μικρόν μίλας καὶ ἀποφύτον ἔχον πολλὰς, ἔτι δὲ γλῆξας καὶ ἀσθενείας τοῦ διὰ καὶ διεμὰ χρὴν- ται.* Quod est, Cichorei autem caulis magnus est, multas habet uelut brachia agnationes: len- tus itidem est, & in frangendo contumax. Quā ob causam, pro uinculis eo utuntur. Qua de- scriptione, uidetur amarū & agreste illud significare. Idem paulo post Picridem hoc ipsum ap- pellat. Sape etiam in describenda in aliquibus latiore foliorum figura, *μικροῦς δὲ α* appellat, idest, Cichorii similia, satiuum indicans: hoc enim latiore & lactucino folio est. Paulus Aegi- neta Romana appellatione usus in primo, *εντυβὴν* totum hoc genus uocauit. In sexto deinde sa- tiuum, agreste, & amarum uno eodemq; nomine Serim: in secundo postremo Serim satiuū, Intybum agreste. Plinius libro. 19. capite septimo, a Lactuca digressus, satiuum esse Intybum his uerbis declarat. Neq; ex eodem genere possunt dici, neq; ex alio Intybi. Pauloq; post. Est & erraticum Intybum, quod in Aegypto Cichorium uocat. Mox iterum lib. 20. cap. 8. de Erra- tico & satiuo haec ait. Intybi quoq; non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Am- bubeiā appellauerit: in Aegypto Cichorium uocat quod syluestre sit: satiuum autem Serim. Columella lib. 2. cap. 19. cum docet, quomodo prata colantur, Primū ne stirpes, aut spinās, &c. atq; alias ante hyemem, alias per autumnum exstirpemus, ut rubos, uirgulta, iuncos: alias uel lamus, ut Intyba, ac solstitialis spinas. Qua descriptione, Intyba indicauit, quā syluestria sunt. Satiua enim in pratis non inueniuntur. Idem postea li. 9. capite. 11. cum de educandis anseribus agit, Serim satiuum appellat his uerbis. Palustris quoq; sed herbis destinatur ager: atq; alia pabula conferantur: ut uicia, trifolium, fœnū graecum, sed praecipue genus Intybi, quod graeci appellant Serim. Postremo Palladius in octo. ni mense satiuum Intybū uocat, uerba eius sunt. Mense octobri ferenda sunt Intyba, quā hyemal seruiant, &c. Ex his quā tam multa & longis- sime repetita a nobis sunt, colligere facile est, nullam in his, nec graecis, nec latinis certam, per- y ἦ

A

B

C petraamq; appellationem esse: sed in græcis Cichorium nunc agreste, nunc satium Intybum indicare: Picridem semper agreste, quemadmodum Serim plarumq; satium. In latinis Intybum modo satium, modo agreste, Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos autores legentibus aliquid utilius, q̃ præcedente rei coniectura, contra q̃ in cæteris sit, non ex uocibus res, sed ex rebus uoces intellexisse. Solus Celsus libro. 2. cap. 29. de utroq; gñe agens, ad certas uoces in medicina rem contraxisse uidet: satiumq; Intybū, syluestre Ambubeia appellasse. Verba eius sunt. Leticula, cui uel Beta, uel Intubus, uel Ambubeia, &c. alterutrū sumit, aut satium qd Intybū, aut agreste qd Ambubeiam uocat. Censeremq; ego: qm̃ graui periculo in medicina hæc uariant, satium in græcis Serim, in latinis Intybū: Agreste in græcis Picrida, aut Cichorium, in latinis Ambubeiam semper appellari: ut certa nominū ratio, certam legentibus rem indicaret: nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior uideri aliquibus uideret.

κονδριλλα

De Condrilla. CAP. CXLVIII.

C Ondrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, caulem, flores, & folia habet Cichorio similia. Qua ex causa nonnulli syluestris Intubi speciem esse pronunciarunt. Verum tenuior tota est, in cuius ramulis gummi mastices simillimum, tuberculo fabæ inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ, sceminarū menses trahit. Tusa cū radicibus tota, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammistu uiliginēs emaculant. Gummi, inordinatos pilos repliat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoueat. Contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumñrosū, humi sparsum, caulem succo madentē lacteo. Radice tenui, rotunda, leui, uegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in latis, & cultis.

The. li. 7. ca. 7.
Pli. li. 21. c. 1517

BARBARI COROLL.

C Hondrilla, siue Chondrillon olus est folio Intubi, & propter amaritudinem ingustabili. Succus radici lacteus, copiosus; acer. Caulis fere pedalis, succo manans amaro. Radix Fabæ similis, aliquando numerosa. Gummi eius proximum terræ funditur. Herbam mures agrestes a serpentibus læsi, mandunt. In Theophrasto Andryala, in Plinio Chondryala, pro Chondrylla deprauate legitur. Hanc Galenus speciem Seridis unam esse meminit. Germinat post Virgilia. Omnia Intubacea, ut Theophrastus inquit, ineunte uere, caulem, floremq; simul edunt. Cichorium foliatu, & caulibus, & ab radice, unaq; cum emerfu ramusculorum flosculus emicat. In caule per partem, ut Heliotropium usq; in autumnum. Caule magno, furculisq; brachiatu pluribus, itemq; ad uinctum quoq; lentis, ut radices: quarum prolixitate contumaciter emoritur. Fert & siliquam, siue folliculū, et in ea semen per extrema caulium. Intubam autem pleriq; falso intelligunt amari iecoris, non herbam, in Virgilij uersu primo Georgicorum, Et amaris Intuba fibris.

Quo doctissimus Poeta, ad genus illud Intubi uidetur alludere, quod Picris appellatur. Aetius Picrida pro Cichorio syluestri, quod & Serin dici uult, accepit. Iulius Pollux autor est, appellatione Cichorij ueteribus syluestria olera uenisse dumtaxat: quæ & gracilia, & tenuia cognominabantur. In Ouidio ad eutem probari Seram legimus illo uersu.

Et simul instantis corpora finge Seræ.

Quod autem id genus sit fructis, non ausim decernerē: nisi q̃s ab eo Serā, pro Seride uocatum credat. Nā & Chondrilla, quæ itē Seris est, ad illū usum, ut Diosc. hac parte docet, adhibebat.

E X. M. V E R G. C O M M.

Intybis congenerem esse Condrillam, argumēto est ueterum omnium de ea historia, q̃ ab Intybis statim de Condrilla agentes, eam illis coniunxerunt: deincepsq; descripserunt quā natura coniunxerat, & simul docendam esse ob similitudinem monuerat. Plura ceteri omnes q̃ hic de

ea docuerunt: caule pedali, & amarissimo totam sapore esse: radicem habere numerosam: gummi illud proximum terræ in ea inueniri, & candidum conspici florem: multaq; alia: quæ quoniam in Corollario suo a Barbaro collecta fuerunt, a nobis relinquuntur. Adiciemus hoc solum, tantum esse illi cum Ambubæia, quam diximus ægreffe Intybum, similitudinem, ut sæpe legentes in campis fallat. Nascitur, ut hic etiam ait, pingui & lutofo solo: quem habitum una uoce *καλοῦνται* χαρίως felicissime Dioscorides indicauit. *καδὲν* enim *χαρίως* in re rustica ueteres dixerunt eas agrorum partes, quæ nullos habent terræ mixtos lapides, sed solam terræ profunditatem: ob quam causam, non dilabentibus per lapidum interualla aquis, lutosus ager & pinguis sit. Idq; una *τῶ καδὲν* uoce Dioscorides monstrauit. Sit autem hoc, an secus quod Barbarus uerit, nasci in terrosiss, aliorum iudicium sit. Nos rem primum, mox uocis rationem secuti, & pinguibus lutosissq; locis nasci eam diximus.

De Cucurbita.

CAP. CXLIX.

Cucurbita esui apta. Cruda illius tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syria sin uocant, in sincipite illinuntur. Oculorum inflammationes, podagraeque refrigerant. Succus e ramentis tulsis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. Adustiones cutis illitu adiuuat. Totius seruesactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potius, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

BARBARI COROLL.

Cucurbitam satiuam Colocynthen greci uocant. Syluestrem, Colocynthida. Erumpit a titia, post quintum, sextum, septimum uel diem. Cucurbitæ multa genera. Satiuum, & Colocynthis, ut prædiximus. Tertium Somphos cognominata: quia sit inanis, digitali crassitudine, non nisi in saxosis nascens. Cucurbitam marinam nonnulli putant. Satiuæ fastigia duo. Prima, Camerarium in tecta scandens, leni umbra testudines & pergulas operiens. Plebeium humi reptat flagellis. In priore, miræ tenui pediculo libratur pōdus immobile: auræ. Crescit qua cogitur forma in uaginas uiriles coniecta, postq; defloruit: plerumq; & draconis intorti figura: liberatate uero pensili concessa, iam uisa est nouem pedum longitudinis. Cortex uiridi tener deditur cibis, quemadmodum & primus quoq; caulis. Ipsæ quo longiores tenuioresq; sunt, eo gratiores, & ob id salubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; seminis tales habent. Chrysipus uisus omnium damnabat eas in cibis, cum tamen adagiū illud celebre iam esset, *καλοῦνται δὲ οὐ γινέσθω*, hoc est, saniores esse q̃ Cucurbita. Siccantur fumo Cucurbitæ hortensiorum seminibus condendis, rusticæ supellectili, Alexandrinæ maxime. Iam & in balnearum usum uenerunt, urceorum uice, multo etiam prius cadorum ad uina condenda.

EX M. VERG. COMM.

Quoidianus, sed uulgaris usq; dum lignescat, cibus Cucurbita est, quibus nascitur locis omnibus pariter nota: nihil ideo longius de ea repetendum. Quod in medicina nouisse inuile non sit, ex grecorum placitis, quod in infantum Syriasis sit, breuiter dicemus. Cuius mali appellatione Romani caruerunt. Ersi Plinius ardores capitis id lib. 10. capite. 3. appellauerit. De Syriasi autem hac grecorum medici, præsertimq; Paulus Aegineta his uerbis docuerunt. Inflammatione partium circa cerebrum, membranasq; eius, in infantibus Syriasis est. Concauum fit in ea sinciput. Concaui itidem cum pallore oculi. Accedit etiam totius corporis siccitas. Sue currit huic malo, impossitum sincipiti cum rosaceo utellus oui: sic tamen, ut continua mutatione renouetur. Oportet eodem loco etiam imponere herbarum quam Heliotropiū greci, latini Solarem dicunt, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem Peponem uocant, adiacentem carni cutent, aut horrentis solani cum rosaceo succum. Greci dulcem, & quæ edendo est Cucurbitam foeminino genere in secunda declinatione *καλοῦνται* dixerunt: medicam uero & amarā, de qua uo loco longius agetur in quinto, & ab hac diminuta appellatione *καλοῦνται δὲ*. Est & illud animal suadertendum, in dulci Cucurbita ex duplici genere duplex etiam nomen esse. Rotundæ, & in globum tumenti, q̃ Cucumeri similis sit *εὐκρά*. Tereti & in longitudinem extentæ, *καλοῦνται*. Latini utramq; eodem Cucurbitæ nomine appellauerunt.

C De Cucumere satiuo. CAP. CL.

πινυρ

SATI V V S Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habetur. Refrigerat, qui corruptionem non sentit. Vesicæ prodest. Olus factu reuocat, quos animus liquerit. Semen modice urinam mouet. Cum lacte, aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 7. ca. 1.
Theophrasti
lib. 7. cap. 4.

CUCUMIS a curuitate, ut placet Varro. Græce Sicy, & attico more Sicyos uocat, & Sicydiō a Phrynicho poeta, & cucumeraria Sycelata. Cucumerem Heraclides Tarentinus Hedygeon uocauit. Quinto, sexto, septimoue die emicat, sed omnino celerius q̃ Cucurbita. Radice breui, ut Pepo. Dulciores fiunt, maceratis aqua, lacteue seminibus. Tres satiuī differētię Theophrasto sunt, Laconici, Scytali, Boeti. Laconici rigantur, nō gaudent aqua reliqui. Adiecit ijs Euthydemus quos Draconias uocauit. Tanta porro naturę cognatio est inter Cucumeres, Pepones, Melopepones, Cucurbitas, ut spenunero & pprietas & nomina latini, gręciq; cōfundant. Ipsum quoq; instrumentū Cucurbitulā gręci a Cucumere cognomināt, Sicyā uocando. Quāq; non defunt q̃ Sicyam hoc intelligant, qđ uulgo Anguriū, et Palestinus Melo dicūt. Athenęus certe Sicyā ueteres p̃ Cucurbita uocare solitos affirmat. Arq; ita & Nicandri poetā uti Georgicorū uolumine. 2. Apud Gręcos certe Cucumeris appellatiōe, Pepones q̃q; ueniūt. Demetrius lxiōn, Sicyos dici uoluit, ἀπὸ τοῦ σικιότατος καὶ, αἰσῶ. q̃a uenerē ciant: qđ n̄ cōtra multū sentiunt. De Cucumere puerbiū Gręci celebrāt illo uersu, σικύαν τρωπέουσαν γυνὴ τὴν χλαίναν ἔφαται. ut mulier uidelicet textēdo Cucumerē manducet. Fortasse, qm̄ textrices, ut Aristoteli placet, im pudice sunt magna ex parte. Ceterū cartilaginei oīa ea gñis sunt, crescūt quacūq; libeat effigie. Virides Italię Cucumeres & q̃ minimi sunt, inquit Plinius, prouincijs q̃ maximi. Citrinos, nigrosq; phant. Copiosissimi Aphricę, ac grandissimi Moesię. Aquas ita diligunt, ut ad eas modice distantes, etiā dissecti āreperant. Oleum odere mire, ita ut in hamos curuent, ne attingant. Inuenti et sine seminibus sunt, macerato uidelicet semine farina cuiusdā herbę, quam Culicem appellant. Citrinos Cucumeres intelligūt, qui uulgo Citreoli a colore Ciri nominant, maiores multo uulgaribus, nec striati, q̃ iam & in Italia passim nascūt. Particulatim flores Cucumis, si bi ipse superflorescens, et sicciore locos patit. Candida lanugine obductus, magisq; dū crescit. Seruatur in muria usq; ad alios fere prouentus, & uiridis quoq; in sabulo locis opacis, siccō siccō operiente, Cucumeres in fistula, ut est apud Hippocratem, dimissū flore, mira longitudine, quasi anguina specie proueniūt. Quāq; anguinus Cucumis, idem uidetur esse qui Syluestris, multo infra magnitudinē Satiui, Erraticus, & Angueus Columellæ appellatus, a Satiuo penitus differens, uix, ut solo aspectu gentilis ei appareat. Sero tinū æstate germen, & flos, gaudeat; frigidis. Cucumim nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis tradunt. Alij in Arcadia, similem Heliotropio, cuius inter folia & ramos proueniret semen, magnitudine nucis iuglandis. Esse autem ad speciem Scorpionis, cauda reflexa, candida: propter quod aliqui Cucumim Scorpioniu uocant. Decoctiōnē Syluestris sparsā mures non attingūt, cicimes ea necant. Cucumis syluestris Elaterium quoq; dicitur, quemadmodum ex ipso succus. Vinum & inde fit Phthorium uocatum, ut post liquebit. Herbam Culicem, cuius hoc capite meminimus, a Theophrasto Conopa uocari censeam, nec ne, quoniam & Cynopa scriptum est maiori parte, nō dixerim. Theodorus Canis oculum, & Canuram conuerit, quasi Cynopa, non Canopa probauerit. Olus est hoc Theophrastus inquit, primisq; post æquinoctium imbribus germinat, & inter spicatas herbas ponitur, a Plinio quoque duobus locis dictum, ut in castigatione Pliniana demonstrauimus.

πινυρ

C De Pepone. CAP. CLI.

PEPONIS caro in cibis, urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriasm uocant, sincipiti imponuntur. Fronti admota, oculorum fluctio- nes auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgāt, & nitorē afferunt. Radix sicca, & ex

hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionē mouet. Si quisq; mode rate secundā coenā uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quoq; illita cū melle, ulcera concreta in modū faui, quæ Caria uocant.

P EPO, a Græcis Pepon, a Theophrasto Σίεϋος, & Περσίεϋος quandoq; dictus, a Polluce Spermatias. Cucumerum generi contribuitur. Siquidem cum magnitudine excellere, uocantur Pepones. Particularim floret, ut Faba. Sunt qui & Melopepones dicuntur, in Campania primum reperti, effigie mali cotonei, a quo & nomen fortuito natum ibi, mox semine ex illo genitum factum. Non pendent hi, sed rotundantur humi, figura & odore præstantissimi, ubi maturuerit. Quæ non pendent statim a pediculo recedunt. Lusitani Regis Liburnicæ inter alia meridiana illius nauigationis miracula, Melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicant, quorum odorem Elephantis, sagacissimi olfactus animal, de longinquo sentiant, aduolantesq; cum cumeraria tota depopulerentur ac præterant. Illud propter factatam a medicis controuersia præterire nolo, Auctores esse Græcos aliquos, qui præcipiant, post Pepones, Melopeponesq; uinum bibendum ijs, qui pituitosi fuerint, biliosis uero acida edenda.

De Lactucis.

CAP. CLII.

L Actucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur. Somnū conciliant. Aluum emolliunt. Lac euocant. Verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit. Et Veneri refragatur. Frequentiores tamen in cibo, claritati oculorū officiant. Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscuntur, succo, aut lacti syluestris Lactucæ similem.

L A T U C A, Lactucula, & Lactecula, sicut apud Græcos Thridax, & Thridacina dicitur, & uulgo Myrulon, caulem primo blandum, processu spinulis inhorrentem habet: die quarto aut quinto emergit. Suauior reciso caule regerminat. Semen lanugine occultitur. Ex ijs candida tenerior & dulcior. Lactucæ Græci tria monstrauere genera. Vnum lati caulis, adeo, ut olitoria ex ijs hostiola facituri prodiderint Theophrastus & Plinius. Foliumq; ijs paulo maius herbaceo, & angustissimum, ut alibi consumpro incremento. Alterum rotundū caulis. Tertium a gente cognomento Laconicum, sessile, folio Scolymi, rectum, amplumq; nec brachiatum a caulibus. Alij distinguunt in nigras, rubentes, candidas, ratione satius colores uariante. Primas Ianuario, secundas Aprili, tertias Martio ferentes. Quidam fastigia quinque faciunt. Purpureas & crispas, utranq; Cecilianam uocantes. Tertium Cappadoceas. Quartum Græcas. Longiora his folia, caulesq; lati, præterea longi & angusti, Intubis similes. Quintum genus Picris, amaritudine insignis. Vnde nomē. Alij Crispā, Fuscā, Cappadocem, Tartefiacā, & Cypriā, ut Columella. Cappadoci pexuni, densum, pallidūq; folium. Tartefiacæ, siue Beticæ, candidū, crispissimū, Cypriæ, siue Paphiæ rubicundū ex candido, tenerrimū ac leue. Alij distinguunt Atram, quæ Meconis, & Meconitis dicat, a lacte papaueris simili, maxime soporifero, quod apud antiquos Italiæ solū genus earū fuit: & ob id Lactucis nomen inditū. Purpuream, siue fuscā, maxime radicis, quā uocant Cecilianā, a Cecilio Metello dictā. Rotundā minimā, sed latis folijs, Atylida nominatā, siue ut Græca fides habet, quæ & a mulieribus ita uocari scribit, Astylida. Et Eunuchion a Pythagora, hoc est, Spadoniā, quia hæc maxime refragetur Veneri. Candor lacteum contingere putant arte, atq; cura, sed ijs dumtaxat quibus semen album est. Candida Lactuca maxime hyemem tolerat. Irrepsit & fatuis alia, ut Plinius inquit, admodum probata, quæ Cecilia uocatur, a supradicta Cecilianā, quæ purpurea est differens, folio Cappadociæ, nisi crispū, latiusq; esset. De Caprina, & alijs agrestibus, in Lactuca dicemus syluestri, & uno eodemq; pede quemadmodū Lactuca, Ocimū, Apium, Eruca, & omnino generum olerum diuersa proueniant, Græcus auctor Didymus, memorie scriptū reliquit, Cypriā Lactucam Brenthistin uocabant. Sunt & Brenthiæ quædam radiceulæ, quibus mulieres genas rubificent, quas nonnulli Fucum, aut Anchusam interpretantur.

Spillog

Theophr. li.
bro 7. cap. 5.
Pli. li. 30. ca. 7.

C NObis in tam noto, tamq; utili olerē suspecta capitis huius tanta breuitas est. Inclinatq; animus, desyderari posse in eo multa ex his quae Plinius, Galenus, Paulus Aegineta, pluresq; alij docuerunt, praesertimq; Serapion; qui in collectis a scriptore hoc, abscissibus, & sacris ignibus maderi hoc olus ait; quae hominis mala in hoc scriptore modo nulla sunt. Accedunt suspitioni huic nostrae etiam argumenta alia. Primum, q; in feminis medicina nihil hoc loco legitur, prodesse scorpionum ictibus, & Cenchri moribus. Quorum alterum Plinius, alterum hic ipse in extremo opere, capite de Cenchri morfu indicauerunt. Verisimileq; est, ut in caeteris ab eo factum fuit, ad eius periculi remedium ex hoc olerē semen etiam accipiendum fuisse. Mox quod plurali numero, non procul a fine legitur, continuū Lactucarum cibum claritati oculorū officere, deesse aliquid ostendit. quoniam singulari numero semper antea de satia Lactuca egerat; quod inconcinnum simul, & hoc scriptore indignū est: credimusq; nos, nihil dicendum huiusmodi ab eo fuisse, nisi prius aliorum scriptorū exemplo, de tam multis satia Lactuca generibus egisset. Quo fit, ut suspicemur deesse huic capiti aliquid, praesertimq; Lactucarū censum, & nomenclaturā aliquā: quam negligentes in exscribendo antiqui librarij, mutilum nobis hoc caput reliquerunt. Eamq; ob causam nos locum uirij nota signauimus. Poterit tamen qui plura Lactuca genera, nomina, & bonitates noscere uoluerit, ex Columella, Plinio, alijsq; multis ea audire, & conditurae earum antiquam rationem intelligere.

De Lactuca syluestri.

CAP. CLIII.

ἄγρια ὄπιδιον

Syluestris Lactuca, quam Magi sanguinem Titani, Zoroastres Phetrombion, Romani Lactucam syluestrem appellant, Satia similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis. Vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto multo succus ad duos obolos. Argema, caliginemq; repurgat. Contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum allicit. Doloris leuamentum praestat. Menses trahit. Contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter q; satia, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

B A R B A R I C O R O L L.

Lactuca syluestris, radice breuior, & multicauior q; satia est, sponte nascens in aruis, folio pusillo, & ubi consummatum est, aculeato: caule candidiore, a lacte copiosissimo acri medica toq; quod carpitur per melle, scapo inciso, praeclarum ad multa. Syluestris Lactuca plura genera. Esopon, de qua hic agitur. Secundū Caprinae, qua pisces necantur, Marinam Cornelius appellat, de qua inter Titymallos sermo est. Tertium in syluis proueniens, Isatis uocatur. Quod & duplex est, Satium, & Syluaticū, ut suo constabit loco. Quartum Hieracium, rotundo folio: quemadmodum post liquebit. Communes nota Syluestrium, candor caulis, interdum cubitali longitudine, Thyrsos & folijs scabricia. Succus omnibus candidus.

De Gingidio.

CAP. CLIIII.

γίγγιδιον
ἀγρίδιον

Gingidium aliqui Lepidion, Romani Bisacutū, Aegyptij Dorystrū, Syri Adorū, Aphri Tiriſta appellāt. In Syria & Cilicia plerūq; nascit. Hærbula syluestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior, radice parua, candidatē, subamara. Olus hoc crudū, coctū, coctū ue estur magna stomachi utilitate. Vrinā cit. Decoctū ex uino potū, uesciq; prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 15.

Gingidium Syria in hortis operosissima. Vnde natum est adagium, Multa Syrorum olera.

Simillimam Staphylino, & Scandici herbam ferit, non differenda recentium medicorum imperia, Gingidium pro Fumaria, siue Capno accipientium.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrinū Græciæ & Italiæ, si Plinio, & Dioscoridi credimus, Gingidii quondā fuit. Ille in Syria, hic in Cilicia & Syria nasci & feri dixerūt. Quo minus mirer aliquis, ignorari nostra ætate, quodnā olus Gingidiū sit. Cognouit tamen id utraq; gens: descriptiq; Plinius. 20. uolumine, capite quinto omnē eius figuram & usum. Paulus Aegineta libro. 1. capite de oleribus post Ocimum, Sinapin, Nasturcium, Vrticam, multaq; alia quæ acrimoniam habent.

De Scandice.

CAP. CLV.

Scandix, quam Romani hærbam Scanariam, aut Aculam nominant, syluestre olus est, amarum, subacre. Quod crudum, coctum ue manditur, Stomacho & uentri utile. Decoctum in potu, uesciæ renibus & iocineri confert.

B A R B A R I C O R O L L.

Scandix olus est syluestre, ut in Braslica notauimus, Plauto quoq; dictum. Hanc Aristophanes Euripidi poëtæ obijcit ioculariter, matrē eius ne olus quidem legitimū uenditasse, sed Scandicem. Vnde uerbum *ἀσκανδική* pro eo, quod est, *ἀσπικτική* confectum, hoc est, ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere, aut facere. Eademq; erat, ut Theophrastus ait, Enthusi-con, siue ut Athenæus & Plinius, Anthriscion, si tenuiora folia, odoratioraq; haberet. Et lasione olus est syluestre, repens in terra, cū lacte multo, florem fert candidū. Conciliū uocant, linguari folio, sed ut descriptio tamē, & quasi rudimentū multorū in ipso appareat. Theophrastus aut doctor. Plinius, Foliū inquit unū habet lasione, sed ita implicatū, ut plura uideant. Huius flos, ut Theophrastus uerbis utar, conceptaculo a uersa parte nō indiget, sed postrema eius exeunt in angulos, qualis fere oleagineus aspicif. Stimulat hæc herba coitus, lactis ubertatē præstat, phlegmatis pdest: infantū illita capiti, nutrit capillū. In Plinio tamē pro lasione *ἀσπικτική* affina deprauatū erat, duobus locis. Differt Scandix a Sandice: q; Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliē non describit, q; q; olus est syluestre, gustu acri, subamaroq; folijs Anthriscif, sed maioribus, & minus odoratis. In exemplari græco Dioscoridis, adpicta uidē Scandicem, feniculi folio fere cum comiculis, in summo floribus luteis, siue albis. Hæc ipsa specie in syluis quoq; uisit, frutice odora to, flore candido, Paulus, Aëdus, & si recte memini, Galenus, similitē Gingidio fecere Scandicē.

E X M. V E R G. C O M M.

Hæc est Scandix illa quæ toties Athenis in theatro plausum & risum excitauit: cum in Comœdia lepidissimi poëtæ, Dicaeopolis ex agro in urbem profectus, rudis homo, ab Euripide eam humiliter poëtæ supplicans peteret, *ἐνδολυκὴ μυστρά* *μυστρίδος ἀσπικτικής*. Nouerant enim omnes uulgare & uile olus: meminerantq; poëtæ, illius matrem quodidē in urbem uenientem, uendito eo olore, filium in summa paupertate theatro & spectaculis educaſſe. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad uirtutem in angusta re studium & occasionem admirantes, totis subfellijs audito uersiculo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, uulgare, & sponte sua nascens, locis plerunq; inculdis olus, plæbis cibus, & quotidianum pulmentum, & acetariū, quo ad sanitatē magis q; quæstis toto mari & orbe obſonijs proficerent. Vires enī illi sunt siccandi in extremo ordine, calefaciendi uero in secūdo, aut incipiente tertio. Sed quod utilissimum in ea est, urinam ciere, & renes egregie laxare, testati ueteres Græci sunt: utiturq; ad eas difficultates sapissime Paulus Aegineta: iubetq; in primo, si non iuste quotidie purgetur aliquid, Scandice, Apio, Asparago, similibusq; alijs follicitandam esse urinam, Plinius etiā 12. capite eiusdem numeri, multis Scandicem prosequitur laudibus: peculiaremq; illi laudem tribuit, q; uenere fatigato corpori succurrit, marcescentesq; senio iam coitus excitat. Quo magis mirū, in tanta moriū ruina & labe, in nullo honore esse herbā: neq; ab Herbarijs nostris cognoscī. Græci nunc etiā Scandicem appellāt, nihilq; in eorū gente notius, sed non congruentē antiquorū notis ostendūt. Quā enī illi Scandicē modo appellāt, latiore, & quasi Betæ folio est. Antiquiores aut, utin re nota sit, nullas eius certas notas tradiderūt. Veritatem, ut ex multis conijcere licet, tenui, & q; si capillato folio est. Plinius li. 21. cap. 17. inter sponte nascentes numerauit: coniunxitq; illi, ut uersimile est, cōgeneres plures alias, quæ oēs tenui folio & capillatæ sunt: præsertimq; Causalim, & Tragopogona: q; a capillamentis, q; pro folijs habet, Coma dicta a Græcis est: Ob quā causam non ab re penitus fuerit, similem in foliorū figura illis credere.

A

ekavdiſ

Pli. li. 21. ca. 17.

B

C De Gallinaceo pede, seu Caucalide. CAP. CLVI.
 Aucalis, quam alij Caucum, alij syluestre Daucum, alij Myrtin, Democritus Brion, Romani Pedem gallinaceum, aut Pedem pulli, Aegyptij Sefelin uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, hirsuto, folijs Apio similibus, feniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum, coctumue olus estur. Vrinam mouet.

B A R B A R I C O R O L L.
 Aucalis, olus est flore candido. Syluestris Daucus, ut Galenus inquit, a pluribus uocatur, propter similitudinem & gustus & uirium.

E X M. V E R G. C O M M.
 Genus herbarū lib. 8. de Plantarū historia facit Theophrastus, quod ἀγροπαιον uocat, id est, in aruis sponte sua nascēs: statimq; in eo Caucalidem hanc numerat, nullis alijs adiectis notis. Nec parū, si quis rem iuste aestimet, fuerit, tam certe, a tam graui auctore, Caucalidis natale solum, & ubi quaerenda sit, audisse. Id enim additū his quae hic scriptor, Galenus, & alij tradiderunt, facillimā eius inuentionē nobis efficit. Nota em̄ omnibus Apij folia, quibus familia Cauca-
D calis sua habet. Altitudinē deinde, hirsutam lanuginē, in summo incisa folia, & candidi floris umbellā oculus deprehender; inuenietq; Dauco tam similem herbam, ut aut syluestris Daucus sit, aut rudimentū naturae Daucum facere condiscentis. Qualis autē Daucus uterq; sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non Caucalis nascit: praesertimq; in noualibus, anteq̃ noua aratione renouent. Galenus Dauco Caucalidem sapore & uiribus similem ait. Hic tamen, ex similitudine figura, ab aliquibus agrestem Daucum potius appellari ait. Habet em̄ & haec, & Daucus folia in cisturis diuisa. Habent ambo etiā candidi floris umbellā. Dico autē umbellam graecorū exemplo, qui ἐνδιαιε ab ἐνδρα appellant, in aliquibus plantis floris ueluti pedamentū, in plures diuisum longiores pediculos, qui singuli florem sustinent, & in orbem circumactum. Qua floris figura feniculum, anisum, sambucus, pluraq; alia sunt. Quod quoniam umbellae, quae solem a uultu mulieres arcent, forma est, ob latitudinem circinationēq; suam, ideo Graeci primū eam floris formā οὐράδωρ, mox Graecos imitari latini, Umbellā dixerūt. Quae uox huius scriptori multa est. Caucalidis huius Nicander etiā in theriacis suis meminit. Retulitq; Chrissippus antiquissimus scriptor, in secūdo de oleribus, habere Caucalidem in gustu falsuginem aliquā: quod nec sensus, nec ex ueteribus alij indicant. Longe plura q̃ hic in medicina Plinius Caucalidi tribuit: quae poterunt uolentes in eo legere. 21. uolumine, eiusdem numeri capite.

De Eruca. CAP. CLVII.
 Evzomon, Romani Erucam uocant, Aegyptij Ethericem, Pœni Asuric. Cruda Eruca uenerem largiore cibo concitat. Semen eodem effectu prodest. Vrinam cit. Aluo perq̃ cōmodata. Semine ad condimenta utuntur, quod uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris Eruca, maxime in Iberia, quae occidentem spectat. Cuius semine pro Sinapi incolae utuntur. Vrinam uehementius pellit, multo satius acrior.

B A R B A R I C O R O L L.
 Eruca, Euzomos graece dicta, quoniam cōmendet iura. Concitat haec morantem, ut poetā inquit, Venerem, frigorum contemprix. Idcirco iungitur Lactuq; in cibis, ut contrarię durarum naturae temperamentum afferant. Nemo ignorat florem Erucae candidum, multas in folio diuisuras esse.

De Ocīmo. CAP. CLVIII.
 Ocimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat. Aluum mollit. Spiritum mouet. Vrinam pellit. Lac euocat.

cat. Aegre tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosæ
 ceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scor-
 pionis ictibus per se prodest, & cum uino Chio oculorū doloribus. Suc-
 cus, uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat, Semen potū con-
 uenit infanientibus, difficili urinæ, inflatisq;. Naribus haustum, sub-
 inde mouet sternutamenta. Quod idem hærbæ efficit. Sed oculos pre-
 mi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdican-
 dum censeant. Quandoquidem manducatum, & in sole positum, uer-
 miculos gignat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur a scorpione, qui Oc-
 cimum ederit, nullo conficiari dolore.

B A R B A R I C O R O L L.

O Cimum prorumpit e terra celerrime, floret particulatim, contra q; olus; cæterum, pri-
 mo parte inferiore, demum superiore: quo fit ut diutius quoq; floreat. Quemadmodum Fab-
 ba, & Heliotropium. Radix una descendit in altitudinem crassa, & admodum lignosa. Cæ-
 teræ a lateribus exiles ac prolixæ. Semini cortex obducitur. Vni Ocimo aqua datur meri-
 die: cum cætera matutinis rigentur. Feruenti quoq; aqua sparsum, maturius prouenire dici-
 tur. Sub canem exalbefcit. Differre uidetur Ocimum ab Ocimo, q; Ocimum pabuli & far-
 raginis quoddam genus est uocatum: ab ocys uerbo, quod ualet cito, ut Varro placet: si-
 ue ab eo quod citat alium bubus, & ideo h; datur, ut purgentur. Pabularium, & Catoni e-
 rat Ocimum, sed sistebar eo bubus alium. Id erat e segete uiridi defecta anteq; gelaret. Quā-
 tamq; manibus carpendum, non falcula secandum, ut renascatur ocimum, Cato præcipit. Sura
 Manilius, aliter interpretatur, & tradit Fabæ modios decem, uixæ duos, tantundem & Erti-
 lise in iugerum: melius & auena Græca, cui non cadit semen, addita miseri, & autumno Bo-
 um caussa seri solitos, hoc apud antiquos Ocimum uocatum. De Ocimo sunt, qui scribant
 capras id aspernari, & insaniam facere. Tritum si operiatur lapide, Scorpionem gigni. Ma-
 nipulo eius cum cancris decem marinis, uel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum Scorpiones
 a proximo omnes. In cibo pediculos facere. Capras id est stare, alij uolunt. Habetur & sylue
 stre Ocimum, quod aliud est q; Acinos. Qzq; Acinos, quemadmodum & Ocimoides a Ro-
 manis Ocimastrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus, de syluestri Ocimo
 nihil scripsisse Dioscoridem, de Ocimoides nihil Plinium. Martialis de Ocimo scripsisse rem
 miram dicitur: q; modo purpureos, modo albos; modo roseos flores pariat, & si ex eo se-
 mine frequenter satum sit, nunc in Serpyllum, nunc in Sisymbrium abire solitum. Recentio-
 res Græci, qui de Rustica re scriperunt, Basilicon, & Misodulon appellant Ocimum: tan-
 tamq; cum eo foemine discordiam inesse prædicant, ut si pultario subiectum sit, nec mulier id
 sciat, futurum, ut nuncq; cibo manus admoliat, priusq; subductum fuerit: ut fortasse huc
 alluserit Persius poetâ illo uersu.

Dum ne deterius sapiat Panutia baucis,

Cum bene discincto cantauerit Ocima uernæ;

Pro, excantauerit, hoc est, cantando excluderit. Nam & Varro, Plautusq;, ut ait Nonius,
 Excantare usurpant pro excludere. Meretriculam quandam Corinthi Ocimum uocatam legi-
 mus in comedijs: sicut aliam Abrotonum: quo & Themistodis mater fuit nomine. Qzq;
 sunt qui Euterpen uocatam scribant, & aliam Thyrallidem, & aliam Sisymbrium: & aliam
 Meconidem, & aliam Herpyllidem, & aliam Myrrinem.

E X M. V E R G. C O M M.

E St Ocimo quemadmodū & plerisq; alijs, in ruris & hortorū disciplina, eadem quæ uirtu-
 tis humanæ fortuna & ratio. Maleficio enim & iniurijs meliorescit. Vtq; illa infortunio aliquo
 obruta, aut a Principibus neglecta, maleue habita, nihil ex suo censu amittit, sed quod in ferro,
 metallisq; alijs sit, longo attritu subinde magis nitet, & speciosior plerunq; emergit. Sic etiā
 non dissimili ratione Asparagus lætior in census prouenit. Gaudet calcari, & atteri pede Cro-
 cus, pereundoq; lætior prouenit. Crispum nuncq; in hōris fiet Apium, nisi cum est natū intēre
 meatū eius, superuoluto cylindro coëctat ositor. Rutā dum consieritur, maledictis prosequun-
 tur qui adfunt; nec aliter maiore bonitate nasci id olus antiquitas credidit. Ex hoc genere Oci-

Pli, li. 10, ca. 12.

B

Cum est: gaudetq; & ipsum cum obrutum terra semen est, paucula, uel cylindro diligenter incultari. Nam si terrā suspensam reliquerit olitor, facillime totū corrumpitur & perit. Quodq; uix credat aliquis, feruenti aqua conspersum, celerius etiam provenit.

¶ De Orobanche.

C A P. CLIX.

οροβανχη

Orobanchen, alij Cynomorion appellant, a similitudine canini genitalis. Cyprii Tyrfinen, communiter Lycon. Cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut candicante, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter legumina nasci constat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus cruda, & in patinis Asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Orobanche Cynomorion quoq; appellatur, a similitudine Canini genitalis. Enecat & Cicer, circumuoluendo se ut Eruo. Vnde nomen Orobanche. Dicitur a recenti Græcia & Osprioleon, & Leonteos borane, hoc est, Herba leonina.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex maleficio nomen Orobanche fecit antiquitas. Et quoniam fruges, legumina, Eruiq; praefertim circūligando se enecat, Erui angina dicta est. Id enim Orobanche græcis significat. Qui quoniam ea in uitæ humanæ usum aliquandō ueniret, leguminiq; cocturam sepe numero adiuar, in damnāda eius fama, hanc saltem illi gratiā habuerunt: ut in cōmuni frugū, leguminiq; omniū iactura solum Erui strangulare crederet. Quod ut Theophrastus ait, cirris quibusdam circūligando se facit. Numerat ille primū librō octauo de historia, mox quinto de causis plantarū multas huiuscemodi nocentes alijs plantas: quæ aut adnascētes, aut scandentes, aut circumligantes se, alijs pestem afferunt: cōmunemq; omnibus plantis alias, alias priuatim aliquibus noxā afferentes. Qualis angina Erui hæc est: quæ cæteris quidē omnibus nocet, priuatim tamen & maxime Eruo notissimę frugi. Nocendi autē caussa, infirmitas Erui est. Nocent & aliæ alijs, quas idem Theophrastus eodem loco numerauit, & nos suis locis dicemus. Hanc ipsam Erui anginā Plinius etiam lib. 22. capite ultimo, ait a similitudine canini genitalis Cynomorion ab aliquibus nominari: non mala, neq; inconcinna similitudine, si plantā contempletur aliquis: quæ a radice surgens nudo, glabro, singulariq; caule, in summo folia aliquot conferda, & inter ea emergentes habet flores simul & quasi in glomerem collecta omnia: qua forma caninum genitale in summo est crassius, & quali galeritum. Vidimus nos Erui anginā, nec quicq; inter segetes & legumina per æstare frequenter inuenitur.

D

¶ De Barbula hirci.

C A P. CLX.

τραχυπωγων

Barbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule, folijs Croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, e cuius summo semen nigrum dependet. Vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

B A R B A R I C O R O L L.

Tragopogon, hoc est, hirci Barba, quæ & Scandix a Plinio uocatur, nisi quod suspicor deprauata lectio est. Describitur a Theophrasto in hunc modum. Radix longa, dulcis, folium Croci longius, caule paruo, super quem calix latus, & Barbula, quæ summo uertice in cana & proluxa funditur. Nascitur in asperis, sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falso uolunt, quā uulgo Barbam petrae, & in Gallia Cispadana Barbulam hircinā uocent. Habetur & quæ Gerontopogon, id est, senis, siue præbyteri Barba dicitur, Tragopogoni fere tota similis: nisi quod lacte manat, & radice amara est, non dulci. A Nicandro Geraopogon fortasse nuncupata. Sed & radice dulci carpitur Romæ. Tragopogona uocari & in Trago pisce, inuenio partē sub gula eius nigrantē: ut Athenæus auctor est. Tragos porro piscis, Exocoëto, qui & Adonis uocatur, similis describit: præter nigrū id quod sub gula eum habere diximus.

Theophrast.
lib. 7. cap. 7.

VNa eademq; causa est, cur Hirci barbam, & Comam Romani, Græciq; Tragopogonā quondam appellauerint. Cuius si fuerit aliquis oculatus testis, nihil a ueteribus dicet aptiore imagine descripsi fuisse. Non tñ præterq; in integra ætate has notas in ea deprehender. Quo tēpore eū florēt, pauloq; ante descripsi calicē, & ex calice prodeuntē comosam lanuginē, & capillamenta ex se fundit: a quibus Coma, & Hirci barba dicta est. Eā lib. s. de historiā plantarum Theophr. aptiore pictura, et his uerbis effigiauit. Quidā uel alia innumerabilia nomināt. Inī quē & illa est quā Hirci barbam uocant. Cuius radix longa & dulcis: folia Croco similia, longiora tantum: caulis breuis, in summo cuius ingens calix est & barba, de summo uertice cana pendens, prolixa. Nascitur sponte sua in aruis. Sed crescit etiam altius in hortis, aut pastinato altiusq; subacto solo. Suspensa enim terra, crassiores & altius radices agit. Non fuit hæc quondā in honore hortorū. Nos etiam meminimus in maiore precio q̄ nunc sit aliquando fuisse: tam nec in gustu & ganea nobis ipsis constamus. Ethruria, gensq; omnis nostra, q̄ in asperis & petrosis nascitur, Saxifragam, alieno illi assignato nomine, ubiq; uocat: nihilq; hyeme notius, & ad acetaria paratius, præsertim radice, quē una in hac planta ob dulcedinem suam non ingratiū habet usum. Quod animaduertat aliquis in ea est, dicere Plinium in asperis nasci sine usu. Sed congruentibus alijs notis, non multifacienda est saporū per tempora gratiæ uarietas, & inconstantia.

De Ornithogalo. CAP. CLXI.

ORnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cum hiantes se pandunt lactei uisuntur. Inter quos dissectum ut milio capitulum emicat. Coquitur cum pane ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

BARBARICOROLL.

ORnithogale, siue Ornithogalon, caulem habet semipedalem Plinio, Dioscoridi duū palmorum. Coquitur in pulre.

De Tuberibus. CAP. CLXII.

TVbera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescentes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

BARBARICOROLL.

TVber Græce Hydnon à Galeno dicitur. Quidā a tumore legunt Oednon. A Theophrasto describitur, carens medulla, neruis, uena, cortice. Hoc & Aschion ab eodem autore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba, aut caule supra terram plufcula, cibo idonea, in Aegypto maxime, ut Aracidna, & quod Araco simile uocatur a Theophrasto. Plinius Aracos appellat fructum. Duo hæc pariunt sub terra, non minorem superno: cuius pars carnosā radicem mittit altā atq; crassā, simplicem, cæteras uero quibus in fide fructus, graciles atq; multas, & summo cespite coherentes agit: nec folium, nec herba ulla, aut quicq; aliud supra terram cernitur. Loca modice arenosa diligunt. Quia porro geminum et utraq; parte fructū ferunt, Amphicarpa cognominantur.

EX M. VERG. COMM.

Nihil quod medicinā augeat, aut instruat Tuberibus Diosc. tribuit. Terrestrī in substantia cōcerni, & constare ueteres aliqui dixerunt, & extenuandi aliquam habere potestatem. Credidit antiquitas, cognitionem illis aliquam cum celo esse, nec nisi tonante Ioue nasci. Quod in Satyra Aquinas poeta monuit dicens. Et facient optata tonitrua ecenas Maiores, &c.

De Smilace. CAP. CLXIII.

HOrtenfia Smilax frutex, cuius semen a nonnullis Lobia uocatur. Folia habet Hedera, molliora tamen, tenues caules, & capriolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adolefcunt, ut topiarum quoddam tabernaculum effingere uideantur. Fructum sceni græci profert longiorem, & corpulentum, in quo semina renum simi-

ἐρνιθογάλον

B

Ἰδνόν

Pli. li. 19. ca. 23.

*

σμίλαξ ὁρτέν

D I O S C O R I D I S

Clia, sed inæquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Fructus cum semine in oleribus Asparagi modo manditur. Vrinam ci et, & tumultuosa somnia facit.

B A R B A R I C O R O L L.

Smilax cepea, id est, hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea, quæ læuis a Dioscoride, libro cognominata est. Recentiores cum Aetio Phaeolum a Dioscoride hoc loco intelligi scripserunt, utiq; non candidum, sed rubentem, qui & Lobos & Dolichos dicatur, & latine Siliqua. Etenim duo esse Phaeolorum genera, Paulus Aegineta in compositione quadam ad Renum uitia, quæ *διουττιζω* uocatur, indicat, Phaeolos in eam quærendo candidos: quasi sint etiam non candidi. Quamq; est ubi Plinius Siliquam syluestrem dicendo, satiuam quoq; fieri posse aliquam intelligat, de quo in Smilace tractet latius. Porro Theodorus cognomento Priscianus, quamq; recentiusculus, Phaeolo inquit uirtutem eam tribuunt, ut & uentrem soluat, & urinam moueat. Dioscorides Phaeolos aluum, Lobia, siue Smilacem urinas ciere uoluit.

E X M. V E R G. C O M M.

Credidit Barbarus, nominis similitudine persuasus, quoniam Phaselium alterum genus Lobon graeci uocent, & hic Lobia, Smilacem hanc a quibusdam uocari, ait legumen illud hoc loco indicari: quoniam & id capreolos, seu clauiculas aliquas, quibus nitatur & implicet se, habet: & in utroq; Phaeolo, renibus similia semina sunt, & in rubente hoc amplius idem color. Nobis tamē parum uerisimile uidetur, ad eam altitudinem & frondium copiam esse legumen aliquod augeri, ut scenas & tabernacula uestiens inumbret. Id enim *καρυωτεσις* graecis, et huic scriptori significat. Sunt autem graecis *καρυά*, id est, Scenæ quaecumq; in castris, alij siue locis ex frondibus, culmis, pelibus, tabulisq; temporaria domicilia sunt: quales ad umbram in hortis aliquando etiam eriguntur. Antiquiores latini Atteguas uno nomine cuncta hæc dixerunt. Sic Iuuenalis, Dirue maiorum Atteguas. &c. Quineriam antiqui hebrearum literarum interpretes, eius gentis tabernacula Atteguas interpretati sunt. Barbarus opus topiarium hoc dixit, non fa-
Dris, ut nobis uidetur, ad exprimendum uocis illius & uerbi captum,

De Medica. C A P. CLXIII.

medicæ

MEDICA cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio praten-
si similis est. Procedens uero folia contrahit, caules edens trifolij, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Quod in cornicula incuruatur. Id siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali ammiscetur. Viride semen quibus refrigeratione opus est, illitu suffragat. Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Medica nominationē unde inuenit, testatur ipso nomine: quæ imperitia uulgi Medica uocari cepit. Theophrastus perire stercoreatam putauit, aut minctum pecoris incumbens respersam. Per bella Persarum, quæ Darius intulit Græciæ, aduecta scribitur. Differt ab ea quæ Medion uocatur, ut suo loco indicabimus. Medica feritur iactato semine, ita ut pabulum, & frumentū, tanta dote, ut uno satū plus tricenis annis durare credat. Similis est Trifolio, caule folijsq; semper uirens, ut Dionysius est autor. Item geniculata. Quicquid in caule assurgit, in folia contrahitur. Sexies reflorescit: cum minimum, quater, modo non fecerit. Arescit sureulosa. Postremo in puluerem inutilem extenuatur. Pabularium omnium cōmendatissima. Hac quondam plena erat Venetia, sed pridem perijt. Nunc in eandem prouinciā reuerti eam, quasi postliminio curauimus, ab annis multis fere non uisam in Italia, sed ne intellectam quidem magnopere qualis esset, allatam ex Africa in Campaniā. Semen eius, sub dente Phaeoli recentis saporem præsentat. Propter altitudinem radicum eius reliquæ herbe intereunt, sine ipsius damno.

De Aphaca. C A P. CLXV.

aphaca

Aphaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs. Sili-
quas maiores fert, in quibus terna quaternaue semina, lente minora, continentur. Quæ adstringendū uim habent. Quare torrefacta,

Stomachi aluiq; fluctiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

A

BARBARI COROLL.

Aphaca differt ab Aphia, quæ olus item est, ut Aphaca, florem edens cum germine. Differt & ab Apharca, quæ arbor est Vnedoni similis, ut diximus. Aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat. Et ut uerum fatear, idem, an diuersum genus sit, fere ambigo. Olus inquit est Aphaca, imbribus ab Aequinoctio primis germinans, per parres florendo, amaritudine ingustabili, aculeata herba, uerum ex mitioribus properat flos eius. Sed breui marcescit, & in lanuginem pappum uocatam soluitur; deinde alius subnascitur, atq; iterum alius hyeme rota, & uere usq; in æstatē: qui & luteus fit. Forma siliquis Aphacæ latiuscula ut Lenti; celeriter perit, ut Dolichos. Necatur a Securidaca. Semen præter alias differentias madidius est, q̃ Lentis. Inuenio e recentioribus, qui uitiam esse Aphacem existiment.

Theophrast. lib. 7. cap. 7.

E X. M. V E R G. C O M M.

DE Aphace Plinius lib. 27. cap. 5. nihil non ab hoc scriptore dictum, n̄ idem, totidemq; reddidit uerbis. Aphace tenuia admodū folia habet; pusillo altior Lenticula est. Siliquas maiores fert, in quibus terna, aut quaterna semina sunt, nigriora, & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Natura ei ad spissandum efficacior q̃ Lenti. Reliquo usu eodē effectus habet. Stomachi, aluiq; fluctiones sistit semen decoctum. Et hæc Plinius, Barbarus post eū in Corollario suo, quæcumq; in Theophrasto lib. 8. de plantarum historia de Aphace leguntur, totidem uerbis pariter reddidit. Sic nihil fere quod adiciamus relictum nobis est, nisi quæ diuersis locis ab eodē Theophrasto dicta sunt, breuiter collegerimus: haud sane, quia collectis his digito legentibus Aphacē ostendere cogitemus, sed q̃ coaceruatis in unum tot notis, facilius poterit alicui rei nobis incognitæ coniectura esse: & quod se nobis non obtulit, alij se offerre. Diximus non multo ante, cum de agresti Lactuca ageremus, quale herbarū genus esset quod Theophrastus *ἔρποναιον* nominauit. Ex eodem genere, eodem autore Aphace est: idq; hic ipse etiam testatur in aruis nasci dicens. Nullam itaq; in ruris, hororumue cura culturam Aphace habet: quærendaq; in aruis est quo tempore inculta cessant. Retulit idem, non admitti in cibos Aphacem, ob amaritudinē suam, similia agresti Cichorio folia habere. Primam appetente uere florere, citissimeq; senescere, florem in lanuginosos pappos resolui, pluraq; alia in ea fieri: quæ omnia a Barbaro collecta, relinquenda a nobis sunt. Ex quibus non facile ratio cinetur aliquis; uitiam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, syluestrem omnino existimandam esse.

B

De Porro capitato. CAP. CLXVI.

Capitatum Porrum inflationem facit. Noxium succum creat. Tu multuosum somnum parit. Vrinam ciet. Aluo accommodatur. Extenuat. Oculorum aciem hebetat. Menfes pellit. Sed lædit exulceratam uescicam, renesq;. Cum p̄isana uerō coctum, esu pectoris uitia extrahit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deflectionibus, ad præclusiones uulvæ & duricias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctū, aut frigida maceratum, dulcescit, et multo minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam uim habet. Quare succus cum aceto, addituro, aut manna, sanguinis profluuiū sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat. Contra omnia thoracis uitia, tabemq;, pro delinctu efficax est. Arteriam esu purgat. Sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Cum aceto & thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia, illita cum uua rhois, qua ad obsonia utuntur. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpūt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

πράσον
καρδαμύνη

PORRUM, siue Porrus, die a satū decimono nono interim uigesimo prorumpit. Biennium per fert: ab eo tempore semetēscit, emoriturq;. Vermiculi Porros, Brassicam, Lactucasq; infestantes, & alia quædam olerum, Prassocurides uocātur: quasi Porricidæ, aut etiam, ut Palladio uidetur, Herbicidæ: non ut Theodorus, Blattæ alueariorum, apud Aristotelem, *ἡ κεράμεων*, pro *κεράμεων* legerat, etiam si tinea alueorum in Columella dici legimus, ex stercore papilionum nascētes, et Lucifugas Blattas in Marone. Nascitur et in mari Porru, extra Herculis columnas, ut Theophrastus inquit, sed inter Algarū gña. Capitatum Porrum, Græci Cephaloton appellant, & Gethyllida. Sunt q; Gethyllida, p Gethyo accēperint, qd & Epithyllida uocauerunt. Didymus uir doctissimus is, qui trita milia et quingenta scripsit uolumina, Gethyū simile facit Ampelopraso, mox dicendo. Gethyllides, ut Athenus inquit, Latonē sacras esse Græci uolunt: qm̄ o-lus id in Malacia pregnant Latona concupisset. Delphis legem esse, ut qui maximam attulisset Gethyllida, sportulam e sacerdotis mensa caperet. Has magnitudine Rapi crescere nonnunq; tradunt. Gethyon inuenio, & Geton sine, y, & aspiratione scribi.

E X M. V E R G. C O M M.

Liberalis cibus Porrum est: non tamen a natura tantope damnasti, ut non medicinam multiplici remedio etiam instruat: præsertimq; q; ueteres, qm̄ in caput creuisset, Capitatum dixerunt. Cui maiores q; sectiuo ad omnia effectus antiquitas tribuit. Quapropter & hic de Porro acturus, id genus elegit qd ad medicinā primū haberet bonitatis honorem: eaq; est causa, cur capitati tantum meminerit Dioscorides, ne quis forte adiectum Porro capitati discrimen miretur. Vtrumq; enim Porri genus, sectiuum. s. & capitatum, eadem omnia potest, sed capitati effi-cacior uis. Et quoniam ubiq; inuenitur utrumq;, ideo alterius tantum & efficacioris usum Dioscorides probauit. Nihil in disciplina ruris sectiuo & capitato Porro frequētius in antiquis est. Laudauit Martialis in Xenij suis utrumq;, in altero fila, in altero niueum stipitem describens. Necq; ab re: quando discrepent inter se, satio, cultura, & forma.

De Ampelopraso. C A P. CLXVII.

ἀμπέλοπρασον

AMpelopratum stomacho magis aduersatur. Et plus Porro ex-calfacit. Vrinam & menses uehementius ciet. Id contra serpen-tium morsus esse conuenit.

B A R B A R I C O R O L L.

AMpeloprason dictum est, quoniam in uinētis folio Porri nascitur, ructu graue.

E X M. V E R G. C O M M.

Non fuit Plinio, nec post eum tot alijs cura latinum nomen Ampelopraso dare: græcorūq; appellatione usi omnes, cogitandū legentibus reliquerunt, inter uites nasci hoc Porru. Id enim græcorum uox illa indicat. Nos præter id syluestre Porru etiā Ampeloprason diximus: nec si ne autore. Siquidē Paulus Aegineta lib. 6. sic illud nominauit. ἀμπέλοπρασον ἢ οὐ πρᾶσον ὃν ἄγριον. Rursusq; lib. 1. capite de his quæ esculentas habent radices, τὰ δὲ ἀμπέλοπρασκα τῶν πρᾶσων ὡς ἔ-γρια ἰσχυρότερα. Quod est, Sunt autem Porris sicciora Ampeloprasa ueluti syluestria. Credimus præterea, nec negligendis coniecturis, peris̄se in hoc capite aliqua. Sigdē q; omnīū mihi est uetu-
tissimus & pbatissimus Diosc. codex, plura alia habet ad historiā, diuersasq; appellatiōes Am-peloprasī pertinentia. Quæ licet ex Galeno accepta uideant, consiliū tñ, institutūq; Diosc. in de-scriptionibus his habent. Numeratq; esse illi caput Allio simile, folium Titimallo, florem pur-pureum, caulē Lychnidi herbæ æqualē, et semē Nasturcio simile. Plinius etiā pter ea quæ nūc in Diosc. legunt, ructu graue ait esse: eruptionem sanguinis per genitale cōpelcere, & ob eandē causam a partu mulieribus dari: dari & contra canum morsus, nonnullaq; alia. Quæ ignoras-se, præsertim tam multa, aut oblitum fuisse diligentem in scribendo hominem, parum uerisimi-le est. Quin etiam Paulus Aegineta exulcerare, & incidere addidit.

De Cepa. C A P. CXLIX.

κεράμεων

CRommion aliqui Polijdos uocant, Magi Calaborim, Romani Cepam. Cepa longa acrior est q; rotunda, item flaua q; candi-da, & sicca q; uiridis, & cruda q; cocta, aut condita. Omnes tamen mor-dent. Flatus gignunt, Appetentiam inuitant, Sitim mouent, Et extenuāt.

Fastidium pariunt, & expurgant. Aluo utiles sunt. Ea detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus laxant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. Anginæ eodem perunguntur. Suppressos menses pellit. Caput purgat naribus infusus. Canis morsibus cū aceto, ruta, & melle illinitur. Cū aceto autem perūctas in sole uiriliginis sanat. Et cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Cōtra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatem emendat. Ad purulentas aureis, & eliciendā earundē aquā ualet. Alopecie earum sicco perfricantur, qui celerius q̃ Alcyoniū, pīlose uocat. Largiore cibo Cepa capitis dolores ciet. Coctaq; uehementius urinam pellit. Eos lethargicos efficit, qui ualetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo uescantur. Cum passis uuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

BARBARI COROLL.

Cepæ, aut etiam Cepulæ caua sunt folia: quod peculiare cum Gerhyo habet, nec nisi oleribus hæc proprietas. Plura earum genera, Sardiæ, Gnidie, Samothraciæ, Setaniæ omnium minime, sed prædulces. Præterea Fissiles, & Ascaloniæ. Fissiles appellant, quia hyeme cum sua coma inertes relinquunt, & folia uere detrahunt: ipsæ deniq; diuisuris, alia parte inferiore subnascuntur. Hoc exemplo reliquis etiam generibus uelluntur, ut in capis crescant potius q̃ in semine, Ascaloniæ uerum propria natura. Etenim uelut steriles sunt ab radice, nec parte illa crassescunt. Maturæ celeriter putrescunt. Serii semine præcipiunt: quia deponit caulem, semenq; tantū reddant, deinde inaniant, & euanescant. Samo, & Sardibus candidissimæ proueniunt. Iulius Pollux e Samothracia cōmendat. De Creticis dubitat, an eadem sint quæ Ascaloniæ: quia satis capitari soleant, sed distant sapore tantum dulci. Reliqua Ceparum genera, depositu proficiunt. Ascalonium genus optimum Columella prædicat. In nomine est & Pompeia Cepa, & Maritima simplex, quam uocant Vnionem Rustici: ea est autem quæ nō fructificauit, nec habuit soboles adherentes. Cepa in rectitudinem dissecta, nō germinat. Radix non ut Allio nucleis includitur, sed tunicis, ut Bulbus et Scylla. Cephæ syluestres non sunt ullæ: ut quæ apud Aristophanē poetam Thymum pro Cepa syluestri capiunt, errasse coarguamus obiter. Mentem lædi Cepa quidam scripsere. Hippocrates conspectu potius, q̃ esu cōmendasse dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quidā Aegyptijs Porru & Cepe nefas trucidare, & frangere morsu, damnatq; ab ea genti: alioquin in sanitatis usu, & medicina utiles Cephæ fuerunt. Quod contra q̃ in reliquis naturæ partibus sit, quæ uitæq; Lunæ fortunæ plerūq; sequuntur: & dū toto orbe ea fulget, subinde augentur: percute autem illi luce, & ipsæ paulatim minuunt: una hæc in eius sideris morte & tenebris, speciosiore habitu lætiorq; fiat & germinet. Accessit ad eā suppositionē etiā, q̃ inutiles feriat, in lætitiāq; agentibus, pariter & ieiunio castitatē custodientibus essent: his, q̃ sitim et cibi appetentiam excitarent: illis, q̃ lachrymoso odore quæ habent, optatam per ferias lætitiā turbaret: & quas in diuinare Dei munere lachrymas, tristitiāq; animi mortales fugerent, inuiti lachrymoso olerē admittere cogerent. Erant & aliæ superstitionis Aegyptiæ in hac ipsa re causæ, nō minus ridiculæ: quas Plutarchus cōmentariolo illo quod de Iside & Osiride scripsit, longius & diligentius indicauit, a nobis aliud modo agentibus, relinquendæ. Quæ Ceparum ex nationibus diuersissima antiquis fuerint, Theophrastus lib. 8. de plantarum historia, & ab eo accepta omnia uicesimo uolumine Plinius, longius docuerunt.

De Allio. CAP. CLXIX.

Allium græci Scorodon, alij Geboscon, alij Elaphoscorodon uocant. Quoddā satiuū atq; hortensium habetur. Quod in Aegyptiæ

Plin. lib. 19, ca. 6.

B

exogodion

C pto, singulari ut Porru capite cōstat, dulce, ī purpureū uergēs, partiū. Reliqua uero magna & cādida, ex plurib. coaugmētāt nucleis, q̄s Agliithas grēci nomināt. Aliud est syluestre, q̄d Opiofcorodō, i. Anguinū uocant. Vis Allij acris ē. Excalfacit. Mordet. Excernit. Aluū turbat. Inflatōes facit. Stomachū exiccat. Sitim gignit. Flatū permouet. Acie oculorū esu hebetat. Eosdē effectus p̄bet Anguinū, q̄d et Elaphofcorodō dicit. Latas uētris tineas in cibo sumptum abigit. Vrinās detrahit. Contra uiperarum īctus, et priuatim hemorrhoidum prodest, ita ut non aliud magis, si cū uino iugiter adsumatur, aut tritum in eodem ebiat. Cōtra rabioforū morfus, et illitu, et cibo ualet. Magnē et Allio utilitates cōtra aquarū mutatioes. Vocem clarifica. Veterem tussim crudū, coctum uel lenit. Potum aut cū origani decoctō, pediculos et lendes enecat. Cremati cinis illitus, fugilatiōibus cum melle, et alopecijs cum nardino unguine medet. Eruptioes papularum cū oleo et sale sanat. Vitiliginēs, lichenas, lētiginēs, ulcera capitis manantia, lepras, et furfures eximit. Cum thure et tēda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. Contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruescētē comē ius, sceminarum defessionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Factum ex eo & nigra oliua intritū, esu citurina. Laxat uenarū spiracula. Hydropicis utile.

D

BARBARI COROLL.

The. li. 7. ca. 4

Allium, siue caput Allij, habet plures uelut coherentes nucleos, siue spicas, quas Grēci Gdges, & Agliithas. Dorice ipsum quoq; Alliū Aglidion appellant q̄nc. Discrimen, q̄ aliud pręquox est, sexagesimo die maiorefcens. Aliud serotinū. Est et in magnitudine diuersitas. Vlpiciū nominatur pręgrande. Grēci Cyprum, & Antifcorodon præcipue celebratum Africæ, ob id & Aphroscorodon, siue a spuma dicitur, a nostris Allium Putricum uocari consuevit, sed erudum, inter pulmentaria ruris, quę Myrtos appellant, Allio trito in oleo & aceto: ut mirari sit, quantū ita increfcet spuma. Myrtos ab odoris fastidio est dictus. In hūc & caseū q̄q; addebāt. Alij genus placentē faciūt ex oleribus, ut Phorion. Nos in Dioscoride q̄d hac parte Myrton legitur, Myrtos legendū monemus. Est & in nucleis diuortium: quo em̄ plures futere, hoc asperius sentiūt. Genus esse Theophrast. ait, sine nucleis. Radix primo extumescit in nucleos: deinde curuatur: ubi accreuit, diducit iterū in nucleos, & ex uno plura fiūt, p̄sertim Vlpiciū, ut Cepi: nisi matura prius uellant. Scordio a Scorodo, idest, Allio, itē ab Ophiofcorodo, idest, Allio syluestri differt. Quāq; impiticia medicorū sit, ut Alliū syluestre pro Scordio in pastillis theriacos addi soleat: cū tñ Scordii folio Trixaginis, nō Allij descriptū legant: si mō autores bonos audire sustinent. Sunt in Allio q̄dem capita, sed nō solo: nam & in Cēpa, & in Porro capitis et capituli nomen legas apud Columellā. Alliorum Manipulum Græci τριππλον appellant, adhibet soliti quibusdam sacris, ut Photion inquit: in quibus mos erat, Allium manfutare, ne unguenta redolerent. Comas eius cum capite solo Molyzam Hippocrates appellat. Caput ipsum etiam Datis uocatur. Quāq; Datis Lampadem quoq; pusillam significat. Galenus auctor.

EX M. VERC. COMM.

F vit q̄ndam, & adhuc est Alliū, sicubi lōgius ab urbibus inōcētius utiuitur, honestū simul & gratū rusticæ plebi obsoniū. Nisi em̄ id sit, nō cōtundisset messoribus suis Allia Serpillūq; Maritana illa Testilis, quos uerisimile iustiq; erat, lautiore epulo p̄ mensem sole & ope defarigatos, a muliere excipi: nec q̄ in comœdia inexpectatā fortunę seruit mutationē Theatro signficabat, ridicule dixisset, tā beate tunc agere omnes, ut q̄ antea calculus ab egesto statim fimo sedē exterrere cōsueuisset, tūc relatū ad eā partē integris Alijs idē facerēt: quali nihil ex antiqua paupertate numerare sibi liceret, quō neglecto melioris fortunę mensuram augere posset. Eāq; ob causam, in ruris honore, & hortorum disciplina non contemnendum locum inuenit Allium.

Doquerūt ueteres longius, quot Alliorū genera, & quo cultu in hortis colenda essent, nō neglīgenda ab his, q̄s aut nūq̄ satis cognita naturæ maiestas delectat, aut ad iustas, piāsque & certas opes a fœnore & mercatura innocēs augēdæ rei studiū cōuertit. Poterūt nouisse ea oīa cupientes Pliniū, Columellā, Palladiū, mille alios de tota hac re longius agētes cū uoluerint audire.

¶ De Scordopraso.

CAP. CLXX.

Scordoprasum magnitudine Porrum æquat, qualitatum Porri & Allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum Porrimodo dulcescit, & in olerum uicem transit.

EX M. VERG. COMM.

Quale hoc simul Allium & Porrum ueteribus fuerit, incertū nobis est. Plinius, quod haecenus legerim, nullibi eius meminit: nec rei rusticæ scriptores alij: solus Paulus Aegineta, breuissimeque in sexto inter Allia id numerauit. Verba eius sunt. Porri & Allij mixta habet qualitates & uires Scordoprasum. Monstrum aliquod naturæ credimus id fuisse, coactis humano opere coalescere simul, non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuerunt.

¶ De Sinapi.

CAP. CLXXI.

Sinapi hortenium, aliqui Napi, Romani Sinapi uocant. Eligi debet maturum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum interne uirescat, & quodam succo madeat, casium colore. Si quidem recens id genus, adultumque habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur. Contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamque arteriæ scabritiem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. Sternutamentum ciet, tritum & naribus admotum. Comitibus quoque auxiliatur. Fœminas uulvæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, illinitur cum ficis ammistum, donec rubescat locus. Ad coxendicū cruciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualetudinis causa, ex alto uitia extrahenda sunt. Alopecijis illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cum melle, adipe, aut carato rapit. Feræ impetigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspargitur. Extrahentibus emplastris, scabiemque extenuantibus utiliter ammisceri solet. Grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus in sole siccatur.

BARBARI COROLL.

Sinapis, & Sinapi, & Sinape media producta legitur. Græcia & Napy uocat, quasi Naphy, ut Athenæus interpretatur, quoniam acri, & proinde incommoda natura esse uideatur, addit & pusillo corpore. Sinapi uero dici putat, quia olfactum luminibus officiat, ut Allium. Athenienses etiam Thapsi, & Saurion appellant. Quinto die post satum comparēt, eoq̄ semel satō, uix est liberare locum: quia semen cadens prodius uirēt. Tria eius genera. Gracile. Secundum Rapi folijs, Tertium Erucæ. Optimum Aegyptium, præsertim ad Sinapismum: in quo usu & Syriaticum dabatur. Succus tribus modis exprimitur. In fistili, calefcitq̄ in eo modice ad solem. Exit & cauliculo inciso lacteus, ad dentium dolores cum induruit. Fit & oleum ex semine, ut docuimus. Pro pulmentario quoque in patellis decoquitur, citra intellectum acrimoniæ. Coquuntur & folia, sicut & reliquorum olerum, Pythagoræ principatum ei dedit inter ea,

z iiii

A

scordoprasum

sinapi

B

Pli. li. 30. ca. 222

C quorum uis in sublimē fertur: quia non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Sinapismus a Dropace distinguitur, q̄ Dropax cum pice fit: eoq̄ Pittoris, & Pittoris quoq̄ dicitur, hoc est, Oppicatio. Sinapismus e Sinapi conficitur, multoq̄ uehementior est Dropace. Propterea Sinapismus Dropax uel præcedit, ut præparet, uel consequitur, ut reliquias abfoluat. Maxime laudatur Dropax, Gallus cognomine.

E X M. V E R G. C O M M.

Fuit Samio sapienti quondā Sinapis in maximo hortensium omnium, quibus tantum cum toto discipulorum grege magister uescebatur, honore & precio. Neq̄ ex tam multis, quas habet in sanitate & ualitudine uires & usus Sinapis, aliquid magis priusq̄ admirabatur & amabat Pythagoras, q̄ in altū sublimeq̄ ferri uim eius, & quasi in cœlū niteretur, cū per nares in cerebrū penetrasset, purgatoria & ad usum mentis uegetiora illic omnia ab ea fieri. Laudata ab his magnopere etiā, qui medicinā homini in tam multis quodidie morbis facientes, nihil ad calefaciendum, siccandūq̄ aptius & præsentius datū sibi a natura inuenērūt. Recepta eadem in uitæ & sanitatis usu iam pridem est: nec hyeme ad intinctus quicq̄ frequentius ubiq̄ cibis intermiscetur, gratissimo obsoniorū condimēto, nisi acrimonia feruoreq̄ suo non sternutamēta tantū, sed lachrymas etiā cieret. Quod solū in carmine suo Columella illi obiecit, dicens. Seq̄ lacerentū flentum factura Sinapis: quasi omnium animantium sensu, modoq̄, & ipsa non cœtibus sibi renoceret.

¶ De Nasturcio.

C A P. CLXXII.

ad p. l. a. u. o. y

Cardamon, alijs Cynocardamon, alijs Iberis, alijs Cardaminasca, Aegyptijs Semeth, Romanis Nasturcium dicitur. Optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre. Excalfacit, Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienem immittit. Partus exanimat. Vrinam cit. Venerem stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle, lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonū uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium uenenis potum resistit, atq̄ eas suffitu fugat. Capillorum defluuia cohibet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur. Tumores collectionesq̄ discutit. Emittere furunculos, illitum cum muria. Hærbæ ad omnia eadem effectus, licet minor.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 20. ca. 17.
lib. 19. ca. 8.

Nasturtiū die quinto nascitur: duorum generū, mite, ac syluestre. Prioris quoq̄ ratio duplex, albi, & nigri. Nomen ei a nariū tormento, uigoremq̄, uel prouerbio significat, iubente Nasturtiū mandendū inertibus, quasi torporem excitet, animūq̄ obacuat, contra uenerem inhibeat: q̄q̄ Dioscorides accendi eam putet. Miræ amplitudinis in Arabia dicit gigni. Nasturtiū herbis reliquis succū adimit iuxta satis, quod & apud Aristophanē poetam legit. Hanc Græci non modo Cardamū, sed etiā Cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates Sauridion, a Sinapis, quod & Saurion dicit, similitudine. Milesium Nasturtiū ueteribus laudatissimum fuisse, Iulius Pollux auctor est. Persas id cū sale mensis apponere solitos, celebre est, cum principio frugalitatē amplecterent, mox aucto imperio, in omne genus luxur prolapsi.

E X M. V E R G. C O M M.

Eius plures quondā, ut uidet, appellationes fuerunt: sed oēs ex eodē principio, & ab eadem Cardami appellatione, excepta Hiberide, q̄ agreste Nasturtiū est, ut in. uolumine diximus, in Dioscoridis cōmentatiōes has irreperūt. Cynocardamon em̄, et Cardamānice solo noīe statim Cardamon indicāt. Hiberis uero, ut hic paulo ante dixit, & ut nos auctore Paulo Aegineta tūc cōfirmauimus, agreste Nasturtiū est. Has ipsas uoces oēs Apuleius etiā in Cardamo numerauit: inuicē sibi ideo rīdentes, quoniā inter satiuū & agreste Nasturtiū maxia similitudo partū & uirū oīm sit. Ob eamq̄ cām uagis appellationibus inter se utunt. Notū nunc olus ubiq̄ Nasturtiū est. Contra uenenata p̄cipue usus eo Nicæder: usus & hic ipse cōtra Cenchridis uenenū, quæadmodū tunc copiosius docebimus: usus & Paulus Aegineta, Græcorūq̄ medici oēs totiens, & in tā multis, ut non contemnendā medicinæ partē solum Nasturtiū explcat.

¶ De Thlaspe.

CAP. CLXXIII.

A

Thlaspi

Thlaspi, aliqui Thlaspidion, alij Sinapi perficum, alij Myiten, alij syluestre Sinapi, alij Dasinophon, alij Myopteron, alij Biatron, Aegyptij Sintempsum, Romani Scandulatum, alij Capsellam, aut Pedem gallinaceum uocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus, in cacumine diuisis, selquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis, fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pendente, semine Nasturcij incluso, lenticulæ effigie, nisi quod infringitur. Vnde nomen accepit. Flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens. Bilem & pituitam utrinq; extrahit, potum acetabuli mensura. Prodest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas subpurationes rumpit. Menfes ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateias, quod aliqui Persiconapi uocant, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

B A R B A R I C O R O L L.

Thlaspe, loculos fert peltarum similitudine, in quibus sit semen, folia latitudine digitali, & longitudine. Galenus Thlaspen, Dioscorides Thlaspi neutro genere pronunciat. Thlaspion, & Thlasposin Hippocrates, Peltam amazonicam Iulius Pollux, hederæ frondibus assimilat.

Pli. li. 27. c. 13.

E X M. V E R G. C O M M.

Galenus genere foeminino *θλασπιν* nominauit: & quod hic ait, potum sanguinem trahere, ille contra coxendicis dolorem clystere infusum *θλασπιν*, quod est, cruenta euacuare dixit. Adiecit præterea Dioscorides perficum & erraticum Sinape a quibusdam Thlaspi hoc dici, ex similitudine ut credimus uirum. Plinius non hoc, sed alterum illud genus quod auctore herbario Crateia hic ipse in extremo capite testatus est, perficum Sinape uocari: nec aliunde ut uidetur in primum illud genus, q̃ ex secundo hoc appellatio illa irrepsit. Cæteræ Thlaspis appellationes illæ causam & originem suam nobis non ostendunt; eamq; ob causam sine honore commentationis huius nostræ a nobis relinquuntur.

B

¶ De Arabide.

CAP. CLXXIII.

DRabis hæba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroq; latere folia, ceu Lepidij, sed molliora, & candidiora. In cacumine uero Sambuci umbellâ gerit, candidos flores habentem. Hæba hæc cum pitana coquitur, in Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere obsonijs ammiscetur.

Arabide

B A R B A R I C O R O L L.

Legebatur Draba, non Araba. Sed huius secundi calce, ubi caput hoc repetit, Arabis, siue Araba, non Draba scriptum est. Galenus, Paulusq; nullā mentionē huius herbæ faciunt.

¶ De Irione.

CAP. CLXXV.

ERysimon, aliqui Chamæplion, Latini Irionem uocant, Magi Hercules Alphita, Aegyptij Erethmon. Iuxta urbes, domicilia, hortosq; nascitur, folijs Erucæ syluestris, cauliculis in lori modum lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut scenogræco corniculatis, semine Nasturcij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extussuntur. Regio morbo, & lumborum uitijis prodest. Contra uenena in delinctu cum melle datur. Illi

ἱρυσίμων
καμαίπλιον

C nitur ex aqua, aut melle utiliter cæcis, carcinomatibus, parotidibus, ducti-
cijijs mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, &
calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madefcat, atq; torreatur:
uel linteo illigatum, oblito adipe peraffetur.

Pli. li. 13. ca. 10.

B A R B A R I C O R O L L.
Erysimon Galli Velarū, Irionem Romani appellant. Inter fruges annumerat, caule ferula-
ceo, ut Sesama, floreitem ut Sesama foliaceo, amarū, fruticosum, folijs Erucae angustioribus
paulo, & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit, Sesamæ proximū: nisi esset pingui-
usculū. Erysimon nostri herbarij significant, quæ uulgo, nobilis Eruca dicitur, quam & Erucae
ueræ præferunt: ut mirū sit, quamobrem inter fruges a Plinio constituta uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

SI esset frugibus, leguminibus, & oleribus idem qui homini sensus: liceretq; illis, ut in repu-
blica sæpe aliqui fecerunt, mutata fortuna transugæ, modo harum, modo illarū partium esse:
dicerem ego, græcis Erysimon, latinis uero Irionem Bacchi illius modo, qui ab Aristophane
in ranis suis, nunc Deus, nunc homo: iterumq; dominus, mox seruus, uariante fortuna descri-
bitur: in alijs scriptoribus inter fruges, in alijs inter olera numerari uoluisse: tam incerta in an-
tiquis scriptoribus historia eius est, tamq; aperte a Theophrasto & Plinio frugum, ab hoc ipso,
& Paulo Aegineta olerum generi adscribitur. Nec persuadebitur unq; non esse frugem Erysi-
mon, seu Irionem aliquis, Theophrastum de eo sic docentem audiens, quo loco lib. 5. de plan-
tarum historia, de frugum culmis in uniuersum sic agit. τῶν δὲ θριπνῶν κτήχρον μὲν καὶ μάλιστα κα-
λαμῶδις, σπασάμεν δὲ καὶ ἑρυσίμον καὶ ῥηκῶδιον. Quod est. Aestiuarum autem, Milij scilicet & Panid
harundinaceus caulis, siue culmus est, Sesami uero & Erysimi ferulaceus. Rursusq; eodem li-
bro. σπασάμεν δὲ οὐδαίε ὑστίει χλωρὸν, ὑστίει μὲν ἑρυσίμον, &c. Ex quibus ratiocinari licet, in censu fru-
gum numeratum Erysimon frugem esse, & ex culmo inter olera censerī non posse. Plinius iti-
dem, Theophrastum secutus, frugibus Irionem ubiq; adnumerat, libro. 13. Primum capite, 7.
Aestiua quæ æstate ante Vergiliarum exortum feruntur, ut milium, panicum, Sesama, Irio.
D Mox iterum eodem capite. Sesamo & Irioni sanguinea folia. Nec multo post eodem libro, sed
capite. 10. Sesama ab Indis uenit: ex ea & oleum faciunt. Color eius candidus. Huic simile est
in Asia, Græciacq; Erysimum: idemq; erat, nisi pinguius esset, quod apud nos Irionem uo-
cant, medicaminibus adnumerandum potius q̃ frugibus. Idem etiam libro. 22. capite ultimo
ait. Irionem inter fruges Sesamæ similem esse diximus, & a Græcis Erysimon uocari. Con-
tra hæc olus aperte Dioscorides, non frugem describit, a Nasturtio statim & Thlaspi, folio
erucæ, coliculo, non culmo, cornutis in summo siliquis, non spicis aut paniculis, & li. sœno-
græco similibus: quodq; frugi nunq; conueniat, inter rudera, & circa horros nasci. Et præ-
ter Dioscoridem Paulus Aegineta libro primo capite de Veneris utilitate & usu: quo loco do-
cens, quibus cibis ad uenerem uti oporteat, inter cætera monet comedenda, καὶ τῶν λαχάνων τὸ ἑρ-
μινον τὸ ἑρυσίμον καὶ τὸ ἴριον, &c. manifeste inter olera Erysimum numerans, ut uideatur. Essetq;
latinis Irionem, quod Græcis & huic scriptori Erysimon est. Satis tam multis locis testatur
Plinius, præcipueq; libro. 22. capite quo paulo ante diximus, quo loco integrum, & hīdem
uerbis totū hoc caput latinis reddidit, quod cognouisse omnibus paratum, & in promptu est.
In tot itaq; tamq; diuersis antiquorum scriptorum auctoritatibus, temere & impudenter fe-
cerit, qui in hoc, aut illo genere Irionem numerabit; præsertim docentibus Theophrasto &
Plinio, seri in agris, & inter fruges Irionem: Dioscoride autem & Paulo Aegineta, per se nati-
locis incultis: & si feratur, in hortis inter olera quod olus sit ferendum esse. Nobis, ut creda-
mus frugem a multis existimatum Erysimon fuisse, in causā siliquæ sunt, quas sœno græco si-
miles Erysimon habere hic ait: q̃q; inter fruges pabulo destinatas numeratur: a multis ue-
ro olus, folio agresti Erucæ, & semen Nasturtio simile. Antiquiores omnes non secus q̃ de quo
tidiana & uulgari re de eo agunt. Alicubi nunc genus etiam parum cognitum est, ignotæ &
appellationes illæ aliæ, ideoq; a nobis relictæ.

¶ De Pipere.

C A P. CLXXVI.

πίπρι

Piper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter initia, prælon-
gum fructum, ueluti siliquam promit. Quod longum Piper est.
Habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum Pi-

per euadit. Id autem suis temporibus adultum, racemos emittit grana fer-
rentes, quæ noscimus. Ea acerba, candidum Piper faciunt, aptum oculis
laribus remedijs, antidotis, & medicaminibus quæ contra ueneriata pa-
rantur, Theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet. Et quo-
niam priuſq; ematureſcat decerptum eſt, ſubamarum relinquitur. Anti-
dotis, & theriacis medicaminibus expetitũ. Nigrum uero, utpote quod
tempeſtiua maturitate collectum ſit, odoratũ eſſe conſtat, candido ſua-
uius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utiliũ. Sed candi-
dum adhuc in acerbum uergẽs, prædictis infirmius eſt. Eligi oportet gra-
uiſſimum, plenum, nigrum, ſine multis rugis, recens, minime furfuro-
ſum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri ſemina macie conſecta, caſ-
ſa, & inania, quod uocant Braſma, Indorum lingua, ſic ſignificante abor-
tum. Viſ omnium excaſcit. Vrinam ciẽt. Concoquit. Extrahit. Diſcu-
tit. Abſtergit caliginem quæ oculis obuertiſatur. Piper febrium rigori-
bus, ſiue potu, ſiue illitu, ſubuenit. Serpentium morſibus auxiliatur.
Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, ſtatim ab initu ſuppoſi-
tum. Tuſſi, omnibuſq; pectoris uitijs, ſiue eclegmate, ſiue potu, ſuccur-
rit. Anginæ eo & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recenti
bus lauri folijs, tormina diſcutit. Cum uua paſſa manducatum, pituitam
a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit. Appetentiam mouet.
Concoctionem adiuuat, in embammata additum. Strumas cum pice
diſcutit. Vitiligines ex nitro emaculat. Fiſtuli nouo, ut aiunt, motum, tor-
retur. Non eſt huius arboris radix Gingiber, ut aliqui exiſtimauere, ſi-
cuti paulo poſt oftendemus. Namq; Piperis radix Coſto ſimilis eſt, gu-
ſtum calfaciens, eiq; Hygræ cognomentum eſt. Hæc lienem reprimit,
cum aceto illita aut pota. Caput etiam purgat, manducata cum uua ta-
minia, quam Staphidem agriam uocant.

P B A R B A R I G O R O L L.
Piperis genera duo Theophraſtus conſtituit. Rotundi ut Eruũ, putamine carieq; ſubrutilla
ceu lauri baccæ. Oblongi, nigri ſemina continẽtis papaueraceæ, qd multo ualidius priore iudi-
catur. Paſſim in India ſunt, ut Plinius exiſtimat. Quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis noſtris
ſimiles, q̃q; in fronte Caucaſi, ſolibus oppoſita, naſci tantũ eas aliqui putauere. Semina a Iuni-
pero diſtant paruulis folliculis, quales in Phaſeolis uidemus. Piper quod intẽperie cœli carbuti
culatur, lingua Indorum Bregma dicitur, ſignificans abortũ. Hoc & pallidum eſt & aſperri-
mũ. Tria cæteri fecere genera. Nigrũ, quod & Cõmune dicitur a medicis, Dioſcoride, Paulo, Ae-
dio. Lenius longo & nigro eſt, Candidum. Piper longũ facillime adulteraẽ Alexandrino Sina-
pi. Emitur hoc in libras. 25. album. 17. nigrũ. 14. utiq; Plinij tẽporibus. Nicæder Colophonius,
uetuſtatis ſtudioſus, non peperit, ſed Peperion appellat. Hippocrates uero medicũ Pharmacũ.
Aliud genus eſt apud eĩdem Hippocratem Indicum Pharmacũ, quo forminx, quibus anima
foeret, ora ſibi colluũt. Medicamentũ id eſt, cuius compoſitionẽ reddit ipſe. Cæteri eſt ubi Pi-
per ſemen Indicum dicatur ab Hippocrate; in quo rotundũ, quod in eſt, Myrtidani uocari pro-
dit. Eſt etiã ubi rotundũ Piper Strongylen Myrtidani ſcriptum reperiã in eodem auctore. Syl-
ueſtre porro gentibus ſuis eſt Piper. Piperis arborem iam etiam habuit Italia, maiorem Myrto,
nec abſimilem. Amaritudo eadem recentĩ, & cum laſceſcit, quẽ Piperi. Deſyderat toſta illa ma-
turtas. Ideoq; & rugarũ deſt, & coloris ſimilitudo. Huiusmodi eſt & quod Luſitani regis dili-
gentiſſimi Liburnicæ, magna parte meridiani ſitus ambitu Mauritanicẽ circũuecta, retulere hoc

Pli. li. 12. ca. 7.
Theophra. li-
bro. 9. cap. 12.

*

Strabo, lib. 17

C anno, Sed abest illa, ut dixi, retorrida rugosaq; maturitas. Nam folibus tostum Piper, e candi-
do & leui mutatur in nigrū rugosumq;. Adulteratur Iuniperi baccis, mire uim trahentibus, in
pondere uero multis modis. In Aegypto granū Piperi simile paulo tantū maius nascit, Cori-
on uocatur, ut Straboni placet. Est etiānum in India Piperis grani simile, quod uocatur Garyo-
phyllon, grandius, fragiliusq;. Tradit in luco Indico id gigni. Aduchebat odoris gratia. Nunc
& cibi, ut Piper, Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta Caryophyllon, non Garyo-
phyllon uocandū existimauit, quasi nucifoliū: etiam si hanc inquit non habet naturā, quā no-
mine pretenditur. Sed flores arboris cuiusdam Indicæ festucae sunt, & nigri, longitudine pol-
licari, acres, odorati, subamari. Lignū eius Xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore uio-
larum genus altitium Caryophyllon, uulgo dicitur, ubiq; modo nascens.

E X M. V E R G. C O M M.

Fruticem, non arborem Piper ferre affirmat, albæ uitæ, quæ in sepibus plerumq; inuenitur, si-
milem, propinquas scandentē arbores: quæ racemosum fructum ferat, magnitudine ea qua ui-
detur, sed uiridem, nec aliter q̃ in Ligustro coaceruatum, anteq̃ maturitate nigrescat: lectumq;
æstate, ante integram maturitatem sub sole in palmeis tegentibus expandi, caloreq; solis & æstu
corrugari, & nigrum fieri. Nec longum, aut album Piper aliquod uidisse illic se dicunt: esse qui-
dem arbores alias, quæ sapore Piperis aliquid ferant, & inter eas, cui conferre in nostro orbe ali-
quam posse se negant, quæ oblongum ueluti uisillum inter folia ferat, ponticæ nucis floribus si-
milem, quod illic longum Piper incolæ appellant. Folium Piperis ipsi uidimus ab eis allatum,
colore pallido magis q̃ herbaceo, longitudine quantum diuaticati pollex & index humani di-
giti aperitur: latitudine qua parte maxime patet, quatuor digitorū: Plantaginis figura, præ-
terq̃ in summo, cui habet numero pares & figura similes a tergo fibras septem per longi-
tudinem extensas, mediam claudentibus utrinq; trinis: non tamen ut in Plantagine, utrinq; binæ
media nascunt, sed inæqualibus interuallis utrinq; prodeunt. In summo fastigiātū, & acumina-
tius q̃ Plantaginis extremū folium est. Desinitq; in mucronē eodem, quo in malo medica mo-
do uidetur: non omni, sed in qua folium acuminatum est: idq; in Piperis frutice breui pediculo
pendet, & qua parte a pediculo incipit folium, paulo minus q̃ rotundum est. Quæ omnia di-
cta longius a nobis sunt, nō ut antiquorum historias damnemus, sed ut meminerint toto hoc
opere legētes, q̃ difficilis omnibus medicæ materiæ fuerit, & futura semper cōmentatio sit, præ-
fertimq; ubi parum integra ueterum cōmentaria totam rem miscent.

D

De Gingiberi. C A P. CLXXVII.

Zingiber

Gingiberis sui gñis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex
parte nascēs. Qua uirēte, ad multa, perinde ad q̃ nos Ruta, utun-
tur. Et primis potibus, & eduljīs ammiscēt. Huius radices Cyperi mo-
do paræ sunt, candicantes, & odoratæ, atq; Piper sapore imitantur. Elis-
gi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condium
tur, q̃ celeriter cariem sentiant. Ficilibus in Italiam asportantur. Gingi-
beris cibo conueniens est. Et cum condimēto assumitur. Excalcatorium
uim, & excoquentem habet. Aluum leniter emollit. Stomacho utile est.
Efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt. In Antidota addi
solet. In totum Piperi uiribus non dissimile.

Pli, li. 12, ca. 7.

B A R B A R I C O R O L L.

Zingiber, in Arabia & Troglodytica in uillis nasci dicitur. Parua herba. Precium radices in
libras sex. Quidam hanc & Sinsiberim, & Gingiberim appellant. Facile pertūdīt Zinziber,
ob incoctā quandam & excrementitiā corporis uliginem, ut Galenus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Qui de Pipere, ex India ad nos reuersi, quæ superiore capite dicta a nobis sunt, retulerūt,
ijdem Zingiber gramini simile in India nasci dixerunt: geniculatū, nouasq; subinde
radices agens, longius sub terra augeri, inueniriq; ubiq; non aliter, q̃ & nostrum gramen: bisq;
auter folia per annū proferre, quæ harundinacea sint, sed nō tantæ longitudinis, latitudinisq;
nihil eo frequentius tota illa regione & copiosius nasci, ingensq; saporis discrimen ex tempore

quo lectū fuerit sentiri. Quodq; Gal. & post eū Paul. Aegineta dixerūt, ideo terebinib. tentari, sentireq; cariem, & pforari, q; crassioris cuiusdā & ineuitæ humiditatis particeps sit, fieri id illi dicunt, cum importune per uer ante maturitatem lectum fuerit: esseq; opportunū legendi tempus, cum folia illa aruerint: idq; in effodiendo Zingibere ab Indis obseruari.

De Hydropipere. CAP. CLXXVIII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt, Caulem ædit angulosum, prædurum, multis alis concuum, folia menthæ, maiora, molliora, cãdidioraq; gustu Piperis acri, citra tñ illam odoris gratiã. Fructum acrem in furculis paruis, prope folia racematim cohærentem. Folia cum semine illita, tumores, ueteresq; duricias discutiunt. Sugillata delent. Quæ postq; inaruerunt, tusa pro Piperi in obsonijs ammiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

BARBARICOROLL.

HYdropiper, quale sit in Plinio, nondum comperi. Nam Piperis, quæ & Siliquastrum dicitur, non nihil ab Hydropipere uidetur differre, non solum medicinæ usu, uerumetiam descripiõe. Monstratur enim caule rubro, et longo, densis geniculis, folijs Lauri, semine albo, tenui, gustu Piperis, uulgo dicta Costum. Distat porro Siliquastrum a Salicastro, ut in mentione sua docebimus, sicut & a Seliqastro. Eteñ Seliqastrũ herba non est, sed antiq; gr̃is sedile, ut Põpeius inq̃t. Georgius Tiphernas, Siliquã Cerauniam, in Strabone Siliquastrum interpretatus est pessime. Non desunt qui Persicariam mō nominatam Hydropiper esse suspicentur, quanq; foliũ Persici huic reddatur, unde nomē, Hydropipĩ uero Menthæ atq; Lauri. Est & in folio Persiciaræ litura, maculę modo inscripta: quę si fuisset in Hydropeperi, fortasse nō omisissent autores. Est ergo Persicaria folio Persici, flore cãdido, spicaceo, gustu acri, semine minuto, caule nō dofo, rubenti, longo: quę sunt oĩa & Hydropeperi tributa. Liberũ sitæstimantibus iudicium.

EX. M. VERG. COMM.

NVlla Plinio, latinisq; alijs scriptoribus sub Hydropiperis titulo & uoce planta hæc est. Nec qualem hic describit prope aquas nascentem, inuenire adhuc licuit. Vidimus tamen in antiq; simo latino Dioscoride, & qui longobardis literis scriptus, sexcentorum annorum uetustatem refert, Hydropiperis appositam imaginem, diligētĩ ut erant ea tempora pictura, effigiatam. In qua descriptioni huius scriptoris omnia conueniunt, caulis, geniculi, alarum concauitates, folia, foliorumq; color. Vnum in fructu discrimen tantum est. Quod enim hic ait, in ramulis secundum folia nasci, & acinosum esse: in ea pictura in summis ramulis est uasculi potius q̃ folli culi, aut siliquæ figura: indicatq; in eo claudi semen, quod hic cum fructu miscet, fructum, uasculum, & in eo semen simul appellans. Quod deficientibus coniecturis alijs, non penitus ab re audisse fuerit. Quemadmodum nec inutile etiam, ex aliquarum plantarum natura cognoscere, quæ aliquando nobis in hoc opere Alarum concauitates in plantis sunt. Græci translata ab humano corpore appellatiõe *μαχιδας* dicunt caua, quę aliquando bina, aliquando singularia, & ex intervallo semper in plantis uidentur, humanis alis similia, in quibus ueluti lacuna est. Sunt autem homini alæ qua parte brachium humero coniungit ex interiore parte, in quibus non aliter q̃ in pectore pubes aliqua nascitur, uirosi plærumq; odoris. Earũ similitudine, concauos geniculos, quales in harundinibus, & plerisq; alijs sunt, *μαχιδας* gr̃eci, Romani Alas dixerūt. Ab Adnatis eo differētes, q; ex alis noua semper germinatio prodit: Adnata uero nullam habent certam partem unde emergant.

De Ptarmica. CAP. CLXXIX.

PTarmica frutex est, furculos habens paruos, multos, & rotūdos, Abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, & in cacumine capitulum uti Anthemidis, paruum, rotūdum. Quod suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamēta efficacissime mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

CP Tarmice, subfalso herba gustu, Diptarmice a quibusdam uocari solita, quoniam sternutamentum iterari faciat.

E X M. V E R G. C O M M.

EX renomen habet Ptarmice: Ptarmion enim græci sternutamentum uocant. In quo egregium necesse est habere uim: ex quo tam præsentis salutis augurio & honore, dignata eam Græcia est. In nullo, quod hætenus sciam, herbarum censu sub hoc nomine latinis Ptarmice est: & si Barbarus in Corollario suo testetur, a quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Minerunt eius tamen inter græcos Galenus, & Paulus Aegineta, eadem omnia quæ Dioscorid. posse eam testari, adijcientes tamen, uiridem sugillata, liuorelque alios discicere.

De Radicula, seu lanaria hæba. C A P. CLXXX.

προῦθιον
πρωθυμίου

ST R V T H I V M ab aliquibus Cerdon, ab alijs Catharhis, ab alijs Struthocamelus, a quibusdam Chamærrhyton, a magis Calyrhyton, a Latinis Lanaria hæba, aut Radicula appellatur. Nota est hæba, quæ purgandis lanis utuntur, quæ eas eluunt. Huius radix est acris, Vrinam ciet. Prodest tussi, quàm iecur excitauit, & orthopnoeæ, ex melle sumpta cochlearis mensura. Aluum soluit. Eadem cum Panace & Capparis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat. Duriciem lenis absument. Menses imposita trahit. Partus enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discutit, cum farina hordeacea & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & colyrijs, claritatis causa. Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cum melle & naribus infusa.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. li. 24. ca. 11

ST Ruthion, a nostris Radicula uocatur, spinosa herba, non tamë acanacea. Flos sine odore, spectabilis æstribus, caule lanuginoso, Semen nullum, Radix magna, quæ conciditur purgandis lanis. Mirum quantum conferens candore, molliciaque. Nascitur Satiua ubique, sed sponte in Asia, Syriaque, saxosis & asperis locis præcipua. Trans Euphratem tamen laudatissima, cauleseculaceo, tenui, & cibus indigenarum expetita, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur. Folium Oleæ, a medicis aureum Poculum uocatur. Hippocrates comendat nascentem in Andro insula littoribus. Ab hac similitudine potiorum quoddam uasculum fortasse Struthion appellatum sit. Smyrnæa mulier Galena, florē hunc non Struthion, sed Strythion uocauit. Porro Struthion latine, ut est apud Festum, a salacitate passeris membrum uirile significat, præcipue in mimis: ut qui passerem, in Martialis & Carulli uersibus, aliter accipiunt, nihil mihi dixisse uideantur. Ne quis in ea re Politianum, quia sine autore loquitur, somniasse cauilletur.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 19. uolumine cap. 3. ad candorem & molliciem lanarum Struthij succo usos fuisse antiquos ait. Idem tamen. 24. cap. 11. quod nos paulo ante diximus, his uerbis testatur. Tingentibus & radicula ramos præparat, quam Struthion uocari diximus a græcis. &c. Diuiditur in eodem usu, quod in græcis alioquin unum est: & ramulis Struthij tribuit, quod radicibus illi tribuerit, quæ succo saporeque asperæ, ad imbibendos colores uingine sordidas præparat lanas. Possit quidem quod Plinius ait, purgas æsypolanas candidiores reddere: sed illud obicit. Quod autem ab insectoribus primum, & ut græci dicunt πρῶτον a Struthio quærebatur, purgato fordium & æsypouingine erat. Nescimusque nos, quosnam Plinius ramulos in Struthio appellauerit. Radicibus enim in tingendo, ut diximus, utebantur: ostenditurque latinum nomen, radicem tamen fuisse usum. Neque enim alia ob causam radicula, quæ ex potiore usu dicta a Romanis est. Quinetiam, nihil fere excepta radice Struthion est, quam per longitudinem, & in latera sub terra, non in altum extendit, proferentibus se ex interuallo graminis modo & quasi ex geniculis, quinque in unum collectis plerumque folijs, ex quibus coliculi cum floribus prodeunt. Vulgaris, & ubique locis incultis nascentis herba, solio ut diximus in cespitem conferto, & per interualla ex eadem radice erumpente. Lauri figura, uerum maiore. Latini ab usu Lanariam radicem, & herbam. & ab eius præcipua & utiliore parte Radiculam dixerunt. Vnde autem græci Struthion nominauerint, non satis nunc patet.

nisi forte a foliorum positura, quæ autum alas quadamtenus imitantur, nomen illi fecerunt. **A** *σπούδι* enim, & *σπούδιον* ea gens passerem, & minores alias appellat aues. Quod si in cibos radix hæc transiret, crederemus ob caliditatem, quam in quarto ordine habet, Venerem stimulare, & ob id Struthion dictam. Græci enim *σπούδι* passerem dicunt: & ab eius ausu salacitate *σπούδιον*, quasi passerem ad Venerem procliuiores homines, & ex ea ratione id facientem herbari Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro comperto est.

¶ De Cyclamino. CAP. CLXXXI.

Cyclaminus a quibusdam Cyfanthemon, ab alijs Cyssophyllon, *κυκλάμιον* ab alijs Chelonion, alijs Ictyopheron, ab alijs Silenē, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Aspho, a Magis Miaspho, Aegyptijs Theſce, a Romanis Rapum terræ; aut terræ Umbilicus uocatur. Folia habet hædera, purpurea, uaria, in quibus fuscæ deq; albicant maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquante, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; detrahit. Menses potu appositue citet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. Illita, contra serpentium ictus remedio est. Radix immista uino, inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contentum, loco calido, & perfrictiōibus tuto recumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deijcienda quoq; alui excrementa, in uelle re sedī subijci. Illito umbilico & imo uentre coxarū tenuis, aluū emollit. Sed abortū efficit. Suffusionibus, & retusæ oculorū aciei, oblitus cū melle succus, prodest. Medicamentis abortum inferentibus, amiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptiones papularū reprimat. Vulneribus ex aceto, aut melle medetur. Licet nem absumat. Vicia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto, luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est. Ipsaq; in oleo uetere seruescenda, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto in terdum thyrrenicæ cere momento, ut stigmatem crassitudinē unguentū contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix Scyllæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

BARBARI COROLL.

Cyclaminos a nostris Rapum, & Tuber terræ dicitur, ut inquit Plinius, non malum terræ, ut Theodorus putauit. Nam Malum terræ, ut Dioscoridi uidetur, Aristolochia est. Erraticum uero malum a Plinio uocatum, & ad calculos radice commendatum, quale genus sit, nondū comperi: præterq; si quis pro Anthemide accipiat, quando utilem uesticæ uitis eam nouimus. Er Chamæmilon, hoc est, malum terrestre, dicitur a Græcis Cyclaminos. Folia habet minorā q; Hedera, nigriora, & tenuiora, sine angulis. Flos ei, ut Plinius scribit, colossinus, & in corollis

Pli. li. 21, ca. 9.
lib. 25, cap. 9.
lib. 26, cap. 12.

Cnas admitti solitus. Est autem genus in eo nomine coloris, ut Straboni placet a Colossis urbe Troadis, ubi præcipua lanitij commendatio fuisset: quemadmodum Laodiceæ, Coracinum pecus, a colore item uelleris appellatum. Sed cum duo florum genera Cyclamino reddantur, purpureum, & candidum, uter eorum Colossinus dici possit, extimandum relinquimus. De Coracino Laodicensium uellere, etiam Viétruius. Pernicialia Cyclamino cum olere sunt odia. Siquidem aduersam ei Brassicam inarescere affirmant. Sphæritis herba quæ sit Actio, nõ constat. Quid si Cyclaminon interpretare: cum q alopecias emendat, cum q Cyclaminos Orbicularia latine dicitur, hoc est, Sphæritis.

E X M. V E R G. C O M M.

Est præter numeratas a Dioscoride Cyclamini appellationes, ubi nostra ætate porcorum, ubi terræ Panis Cyclaminus appelletur. Nullusq; non audito alterutro nomine, ubiq; fere inter sepes & uepres nascentem plantam intelligit, quam subulci pecori suo gratam cognouerunt, et ab eo nomen illi fecerunt, porcinum Panem appellantes. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, a panis figura sub terra latentem eius radicem, terræ Panem uocauerunt. Nihil in agro agentibus nunc etiam notius, nigro colore: radix in orbem circumacta, non tamen in globum surgens, sed ueluti pressa pondere, in latitudinem se explicans, eadem forma qua nunc in quotidiano usu panes uidentur. Qui primi nomen illi fecerunt, circumactam in orbem eius circinationem contemplati, *κνὸς τοῦ κύκλου*, quasi ab orbe Cyclaminon, idest, orbicularem dixerunt. Fuitq; hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Secura ætas, non radicem, sed folia eius contemplata, q; hederacea essent, Cissanthemon, et Cissophyllon eandem nominauerunt. *κισσός* enim græci Hederam dicunt: & si in prima hac Cyclamino longe maiora q; Hederæ folia sint, solamq; Hederæ figuram in folio referat. Non defuerunt quondam etiam, qui a testudinis forma, Cheloniam eandem dicerent: quemadmodum non defunt iidem, qui ideo testudinis nomen retulisse dicant, quoniam ea id animal uescatur: quemadmodum contra pisces oderunt, qui non secus q; ueneno aliquo in aquam coniecta Cyclamino enecantur: ideoq; piscium Venatio dicta fuerit. Plinius tertiam Cyclaminum id facere dixit, cuius hic non meminit. Romani scriptoris huius historia. 1. secuti, Rapum terræ, uel Umbilicum, uel Tuber dixerunt: quoniam hic dixerat radicem esse nigram, Rapo similem. Umbilicum autem, quoniam ut in aliquibus circinata forma umbilicus est, sic & Cyclaminus sub terra uideatur. Dico autem umbilicum, non qualis in homine ceterisq; animalibus media pars est, sed quales in Epigrammate suo Marcialis dixit. Iam peruenimus usq; ad umbilicos, extremam uoluminis clausuram, quæ aut nodus, aut fibula opus claudebat. Vidimus nos aliquando Cyclamini radicem, globo & latitudine amplissimi panis: ex qua folia erumpebant: & inter folia flos breui pediculo, potius q; colliculo surgens, in quo color erat qualem hic describit. Plinius Colossinum uocat. Nec ambigendum de eo colore erit, qui Cyclaminum florentem uiderit. Eundem lib. 25. idem purpureum dicit. Nec uideretur tantum scriptor in his sibi constare. Habet ut uideretur Cyclaminus numerosas, & egregias in medendo uires. quas paulo minus q; omnes nouit & indicauit ante Dioscoridem Theophrastus lib. 9. de plantarum historia, ostendens & ipse, adalligatum Cyclaminum partus adiuuare: prodesse ad amores: subdi mulieribus: purgare caput: ulceribus ex melle mereri: & ne longiores simus, nihil non idem in utroq; est. Addidit Theophrastus, tantum crema ri radicem Cyclamini, tum uino restingui, cineremq; eodem quo fex modo in passillos conformatum seruari.

De Altera Cyclamino. C A P. CLXXXII.

Est & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cissophyllon uocant, minoribus q; Hederæ folijs, geniculatis caulibus, crassissq; circa uicinas arbores capriolorum modo se uoluētibus, flore candido, odorato, acinis Hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini drachmæ unius pōdere potest cum uini albi cyathis duobus triginta diebus, lienem per urinam & aluum absument. Ad Ortopnoeam bibitur. Reliquias a partu purgat.

B A R B A R I C O R O L.

Cyclaminos altera est, cui nomen ab Hederæ floribus impositum Cissanthemos, de qua hic agitur. Plinius & tertiam Cyclaminon demonstratam sibi prodidit, cognomine Chamæcis.

son, uno omnino folio. Radice ramosa, quā pisces necantur. Ideoq; hanc proprie Ichthyoterā A uocari autumo, quanq; nomen hoc a Dioscoride Cyclamīno primā datur.

EX. M. VERG. COMM.

Alteram Cyclaminum hanc a sup̄iore illā diuersam faciunt, minus in latitudinē exēqua-
ta, & globosior radix: longiores coliculi, quibus in alias arbores utiūm modo ascendit: folia
longe q̄ illius minora, quantitate, incisuris, totoq; habitu hederacea. Ob quā causā Plinius ait,
hanc tantū Cissanthemon dictū fuisse. Flores candidi, odoratiq;: qui in illa purpurei sunt, & si-
ne odore. Acinosus fructus, & qualis in Hedera corymbaceus: & qd ad medicinā pertineat, ra-
dix inutilis, quæ sola in altera illa expeitur & usum habet. Hæc aspis locis nascens, illā int̄ ue-
pres & in sepibus. Hanc ipsi nōn uidimus, nec possumus oculati testes eius legentibus esse.

De Dracunculo. CAP. CLXXXIII.

DRACVN TIV M magnum aliqui Aron, aliq; Αρακόντιον
Isaron, aliq; Iaron, aliq; Geracicon, aliq; Biarion, aliq; Armiagrion,
aliq; Cyperida uocant. In umbrosis sepibus gignit. Caulem habet rectū,
laeuem, duum cubitorum, baculi crassitudine, uersicoloribus draconum
maculis, purpureis tamen euinentibus. Folia Rumicis, inflexa. Fructū
summo caule facit racemosum, coloris primum cineracei, mox per ma-
turitatem in crocum & purpuram uergentis, radicem prægrandem, ro-
tundam, candidam, cortice tenui uestitam. Colligitur, & dum matu-
rescit succus exprimitur, sicuturq; in umbra. Radix quoq; messibus ef-
foditur. Elotaq; particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur B
in umbra. Cum diluta potione crudam, coctamue, cum melle delingi
prodest, contra orthopniceas, rupta, conuulsa, tussim, & destillationes.
Potā cum uīno uenerem stimulat. Vlcerā quæ cacœthe uocantur, at-
que phagedanica expurgat, præsertim cum uite alba. Ex ea & melle col-
lyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. Ad uisilignes cum
melle efficaciter illinitur. Polipos, & carcinomata absumit. Succus ad o-
culorum medicamenta, item contra nūbeculas, caliginem, albugines
que effectum præbet. Herbar, radicisq; odor, teneros conceptos abortu
uiuat. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-
cum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, utpote
quæ adstringant, uulneribus recentibus imposuere, & cocta in uīno
pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse
a uipera ferri, inficiantur.

BARBARI COROLL.

DRacunculus a caule uario draconis more dicitur: siue a cauda, quæ illi subrutila est, &
draconis in torti modo conuoluta. Dissōnā aliquātum in hoc genere scriptores. Alijs Dracun-
culum ab Aro separantibus. Alijs idem existimantibus. Glaucias Dracunculum syluestrem
Aron uocabat. Phenias Aron, & Aroniam. Aliqui radicem Aron appellauere, caulem Dra-
cuntion. Theophrastus Aron putauit genus esse, sub quo species quasi multæ continerentur.
Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera, Dracunculum maiorem, Dracunculum minorem,
Aron, & Arisaron, quanq; in describendo Aro, discrepat a Plinio. De Dracunculo quoq; pa-
rum conuenit inter eos, ut sequenti capite liquebit. Dracunculis hordeo maturecente fodit,
luna crescente, Serpentariam sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocratem & Ophin herbam,
semine muliebribus medicinis uilē probari. Nec an eadem sit cum Dracuntio satis constat, eti-
am si a serpente nomen habeat. Idem Hippocrates candidam radicem cum nominat, Dracun-
tij radicem, ut Galenus uult, intelligit.

The. li. 9. ca. 22

C **E** Rilegentibus & nobis non leue laboris compendium, si antequā de maiore Dracunculo agatur, tota minoris medicina & hystoria pariter reddita fuerit. Sunt enim utriq; paulo minus q̃ cuncta communia, tamq; in minore incerta, mixtaq; cum maiore multa, ut continuo sermone de utroq; utilius dixisse fuerit. Aequo animo ob eam causam tātisper dum hoc agimus, differri sibi nostram Dracunculi commentationem legentes patientur.

De Dracunculo paruo. C A P. CLXXXIII.

D Racunculus paruus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni, caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule racematim cohæret, colore primum felleo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque, radice rotunda, bulbosa, raphano non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. Naribus etiam ex lana impositus, polipum absumit. Carcinomata illitu sistit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit. Orthopnoeis, ruptis, uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta, tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. Vrinam pellit. Venerem excitat, cū uino pota. Phagædenas ulcerum, & quæ cacœthe uocantur, trita cū melle & Brionia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas, & efficiendos partus fieri solent. Qui radice suas manus perfricuerunt, a uiperis feriri negantur. Illita ex aceto uiliginēs emaculat. Folia recentibus uulneribus, conceptorum lintheolorum uice, conuenienter imponuntur. Decoctam in uino pernionibus appouisse prodest. Caseus folijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctae, ad sanorum usus, pro olere recipitur. In Gymnetidibus insulis, quæ Calarides uocantur, coctā radicē cū melle multo, in conuiujs placentarū loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim concidit, & lino traiecta siccat in umbra, & ita reconditur.

B A R B.

Pli. li. 24. ca. 16

D Racunculi duo sunt Dioscoridi, maior, & minor, ut prædiximus. Plinio tres. Vnus folijs Betæ, nō sine thyrsio, flore purpureo, similis Aro. Alter radice lōga, ueluti signata, articulo saq; tribus omnino cauliculis. Tertius folio maiore q̃ cornus, radice arundinea, totidem (ut aiunt) geniculata nodis, quot habet annos, totidem etiam folijs. Aetius Dracunculi semen occultari terra, & piperi simile describit. Olitores & Draconem uocatam ferunt, huic toto genere dissimile, quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine incluso, raphanis, aut scillæ bulbis, atq; in terra obruto. Pusilla herba, nigro ac minuto semine, folio tenui & oblongo, acri, & utranq; originē prodente, linguam & folio & radice amburens, & aceti & salis gustu. Pyretrum sunt qui a ueteribus appellatam falso putent hanc, inter olera acetaria gratissimā. Ita em uocare institui, quicquid crudū manditur ex aceto, sale, oleo. Quanc̃q; hortos suos prisca Acetaria uocabant: non ab aceto, ut quidam rati sunt, sed ab accipiendi, quasi acceptaria: quippe quos, ut inquit Cicero, quasi alterā succidiā ueteres habuerint. Ab eodē uerbo et Acetabulum deducit, etiā Græci Oxybaphō ab intinctu aceti nomināt, ita em aceto uas dicatū uocabat.

ut Athenæus testatur. Quæ & mensuræ genus significat, quod & Cochleare dicimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Miscuerit adeo ueteres cū Aro Dracunculū, totq; nūc ipsēdem, nūc diuersis notis descripta Dracunculi gñā ab illis fuerūt, ut nihil in re aliōq; n satis nota, difficilius aut ipsi fecerint, aut per se legēdīs ostendat. Quodq; anxios diu nos habuit, & adhuc habet, nec aliter in partes trahit uarias, percip̄ oīa uersat, q̄ qui in amoribus Medæ ab Apollonio primū descriptus est, solis ex aqua fulgor, summi feriens laquearia tecti, nūcq; stabilis, sed continua uersatione in oēs discurrens partes, Dioscorides est: & quæ in cunctis græcis duo maioris, minorisq; Dracūculi capitā in eo legunt, nullibi qd egregiā diuersitatē faciat, uariata eorū historia, aut medicina, & si alterū Rumicis, alterū Hederæ folia habere hīc dixerit. Multiplex em̄ huic scriptori similitudo est coloris, figuræ, quātitatis, uirium, aliorūq; huiuscemodi. Fitq; ob eam causā sæpenumero, ut qd totū diuersum est, in partibus simile dictū, totā similitudinē referre male credat: & qd undiq; simile est in partibus, differre dictum totum dissimile falso habeatur. Quod in utroq; scriptoris huius Dracunculo fieri facile potuit. In quorū altero folia Rumici in quantitate & figura, in altero Hederæ in colore cōparari potuerūt. Nihil em̄ nobis, excusso diligēter utroq; capite, inuērum est adeo dissimile, diuersumue, ut alterā oportuerit, p̄sertim tam longā rei & medicinæ hīdem uerbis historia conficere. Auxitq; suspitionē nostrā, q̄ nec Galenus, nec post Galenū Paulus Aegineta diligentissimus in græcis medicinæ auctor, & qui scriptoris huius dicta ubiq; bona fide retulit, alterū hunc, & minorē Dracunculū nouerūt: nec post græcos latini scriptores Apuleius, Ioannes Serapion, & qd multi apud nos est, uetustissimi latini codices, in qbus unius tantū Dracunculi caput, alterius uestigiū nullum ostendit. Ex eo factū est, ut crediderim, & adhuc credā, unum tantū a Dioscoride Dracūculū hoc loco describi. Neq; em̄ uerisimile, si alter ille in natura Dracunculo esset, & ab hoc scriptore descriptus fuisset, relinquendū ab illis penitus fuisse. Et nihilominus in cunctis & antiquissimis græcorū codicibus, utriq; hoc caput adhuc legit. At non est eadē utriusq; historia & medicina. Concedimus id quidē: monemus tñ uo cū magis q̄ rerū diuersitatē esse: nec ad constituendū rei genus satis id esse. At minori Dracunculo aliquid tribuit, quod in maiori non legit: quale est, incorruptū seruari, folijs eius inuolutū caseum. Neq; id etiā diuersitatis necessitate facit. Potuit em̄ in noua alterius eius capitis descriptio ne illud addi. Siquidem non Dracunculo Plinius, sed Aro eam uim tribuit: possuntq; eandem habere rationem quæcūq; alia minori addita magis q̄ alia inueniuntur.

¶ De Aro.

C A P. C L X X X V.

ARon apud Syros Lupha uocitatum, aliqui Alymon, alij Thymon, alij Dracontiam, Cyprij Collocassion dicunt. Folia emittit Dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis, caulem subpurpureum, dodrantralem, pistilli specie, a quo croceum semen exit. Radice Dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen, & folia Dracunculi uires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

B A R B A R I C O R O L L.

ARorum Theophrastus inquit radices, inhibita germinatione fiunt atiles, folijs uidelicet terra obrutis. Prægrandia hæc sunt. Item caua, cucumeracea. Radix nuda corice, quæ mandī possit. Nam & folia in aceto inquit decocta eduntur, nec insuauis cibus est, caulem ei nullum reddendo. Dissert a Dracunculo, si Plinium sequamur: qui radicem habet nigram, in latitudine rotundā, multo maiorem, & qua manus impleatur, Dracunculus subtiliam, & iurtortam. Semē ei seruēs ac mordax, Aro lenius. Quod & Galenus cōfirmat. In cibis Aros foemina præfertur: quoniam mas sit dulcior, & in coquēdo lentior. Folijs Ari, caseum ne cōputrescat, seruari affirmant: quod qdem a Dioscoride, maiori, aut minori Dracunculo tribuitur.

Confundit Plinius cum Dracunculo Aron lib. 19. capi. 4. Numeratq; Aron inter Aegypti chorētia, his uerbis. Est inter gñā Bulborū, qd in Aegypto Aron uocant, Scyllæ proximū amplitudine, folijs Lapathi, quæ Rumex est; caule recto, duum cubitorū, baculi crassitudine;

A. iij

Theophr. li. bro. 7. cap. 11.
Pli. li. 24. ca. 16.

V E R G.

C radice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda, &c. Folia enim Lapathi, caulis rectus, duū cubitorum altitudo, & baculi crassitudo ex maioris Dracunculi historia cuncta sunt: nec Aro congruunt, cuius caulis semipedalis pistilli figura est. Quam formā in nostri orbis Aro quotidie licet uidere. Confundendiq; simul diuersa genera, nulla maior, ut credimus caussa fuit, q̃ similitudo primū: mox antiquorū historia, in qua totū hoc genus Aron aliquando, nonnunq; priuatim illud Dracunculus, hoc Aron dictum est. Discreuit tamen alterum ab altero natura: & illud procerius, hoc breuius fecit. In illo figura est, qualē superiore capite tradidimus: in hoc ubi q; cognosci potest. Reliquit in hoc etiā Dioscorides inuolucrū illud, & cucullum, quō inuolutum semen claudit, pallido magis q̃ herbaceo colore, non ut in Dracunculo purpureū. Numerabatur quondā, ferebaturq; inter olera Aron: quod uix credibile sit, tantā habet radix, quæ in ciborū usu erat acrimoniā. Cogitandūq; alterum est, aut aliunde inuectū mitius fuisse, aut culturæ genere aliquo & humano artificio meliorescere nunc etiam posse.

¶ De Arifarō. CAP. CLXXXVI.
ἄρισφαρόν **A** Rifarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longe maioris q̃ Aron acrimoniæ. Vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radiceis, genitale animalis cuiuscūq; in perniciem agitur.

B A R B A R I C O R O L L.
A Rifaros, siue Arifaros, in Aegypto nascitur. Similis Aro herbæ, minor tamen multo, minoribusq; folijs, & utiq; radicē: quæ tamen Oliuæ magnitudinem prægrandis impleat. Alba, geminum, altera unicum emittente caulem. Corrupte nomen huius herbæ medici, ut ab ipsis iam non Arifaros, sed detritis duabus literis, Afarus dicat: quod quidem & in Afari mentione testati sumus. Est & Aris herba Hippocrati, nec qualis sit, & an pro Arifarō capienda sit, nō constat. Aris & instrumenti quoddam genus est.

E D X M. V E R G. C O M M.
D Congeneres, ut uidetur, plantæ tres hæ sunt, Dracunculus, Aron, & Arifaros. Bulbosas enim radices oēs habent: & in reliquis non adeo dissimiles, in medicina conueniūt. Plinius lib. 24. capite. 16. Erin, sed ut credimus, corrupta ex Arifarō uoce appellat. Additq; in historia eius, nasci in Aegypto. Et quod hic ait, emplastri modo impositā radicem, omnium quadrupedū genitalibus in perniciem ea agere, ab eo aliter, & his uerbis dictū. Sed unū miraculum ingens, contactū genitali cuiuscūq; foeminini generis, animal in perniciem agi. Hic autē non magis foeminini, q̃ masculini sexus id malum fore ostendit. Signauimus hoc, ut suspicari & querere legentes possint, huic ne capiti aliquid desit, an aliter Plinius rem intellexerit. Dubitauit in Plinianis castigationibus Barbarus, diminutiua ne forma nō Arifaros, sed Aris, quasi paruū Aron uocanda planta hæc sit: quoniā Arin Hippocrates, herbā sibi tamen ignotā appellauerit: & q̃ Arifarō oīa minora q̃ Aron haberet. Sed uocandā Arifaros esse Paulus Aegineta lib. 6. testatur, dicens multo breuius Aro Arifaros esse, uocatq; Arifaros manifeste, non Arin.

¶ De Hastula regia. CAP. CLXXXVII.
ἡσπιδάριον **H** Astulam regiam Græci Asphodelon, aliq; Narthecion, Romani Albuca uocant, uulgo notum. Folijs est maioris Porri, caule læui, ferente in cacumine florem, quē Anthericon appellāt. Radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ ex calfaciunt. Vrinæ, & menses epotæ cient. Lateris doloribus, ruptis, conuulsis, & tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino medentur. Ea uero uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine cōmanducata. A serpente demorsis datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs, floribus, & radice ex uino morsus illinire oportet. Item ulcera sordida, & depascencia. Mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in facie uini bulbis. Recentibus oculorum inflam-

mationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha, & croco decoquitur, fitq; perq; utile oculis medicamentum. Ad purulentas aureis per se, aut cum melle, uino, & myrrha tritus, prodest. In contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Citius e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidam uiliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen, floresq; in uino potati, scolopendræ, & scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt. Aluum purgant. Floret messibus Albucum. Quare æquinocætiæ uerno, antequam semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, ueneris cupiditatem inhibere. Quod hærbarius Crataeas asseuerat, Addiditq;, sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

BARBARI COROLL.

A sphodelus, de clarissimis herbarum Hastula regia uocatur, radice cibus apta, folio Porri syluestris, angusto, prælongo, subleno, caule præcellenti, qui cubitalis est, & sæpe duum cubitorum, Antheriscos, siue Anthericos a Græcis, Albucus a nostris proprie uocatus. Differt Antheriscus ab Anthrisco, ut ex mentione Scandicis facile colligitur. Asphodelus, & aqua, & sicco uiuit. Lignosum ei semen, copiosum, triquetrum, colore atro. Nascitur in orbiculo subiecto flori, decidens æstate folliculo dehiscente. Particulatim florere Asphodelos, incipiens ab imo. Vermes in eo uolucres, specie flosculorum eroso, floris incipientis operimento euolant. Proprium huic cauli, qd tametsi leuis & angustus, in ramulos tamen fundit superne. Torretur hic in cinere ad esum. Itæ bulbus cum semine, oleo, & sale addito, cum fici quocq; tundit, præcipua uoluptate, ut uidetur Hesiodo, in syluis eum nasci prædicante. Mentionem Asphodeli & Homerus fecit, Heroion, siue ut alij codices, Erineon appellatum ab aliquibus uideo. Cochleæ terrestres mire in Campania caulem eius persequuntur, & sugendo arefaciunt. Bulbos eius Napis modicis similes octuaginta sæpe simul aceruatos autumnò colligunt, cum plurimum ualent. His mures necant, & cauerna præclusa immoriuntur. Amuletum esse putant, in domibus ante portas satum. Hellanicus prodit, quosdam esse Nomadas in Libya, qui nihil aliud possideant, qd litulam, gladium, & calicem, & ex Asphodelo casulam, umbræ tantum gratia: quam & circumferant. Eius tamen genera duo faciunt, Albucum intelligentes candidum: cui scapus cubito amplior, purus, leuisq;. Asphodelum uero, siue Hastulam regiam, cui acinosus sit caulis. Dionysius discrete uitæ sexu, marem, & foeminam, pronuntiando in ea.

EX M. VERG. COMM.

Vix credat nostra ætate aliquis, in cibos & sanitatis usum uenisse quondam Asphodelum: tam alienum homini nunc cibum est, tamq; inter medicamenta magis qd olera merito censet: nisi Hesiodus audierit canentem, nescire homines iniuste rem suam augentes, *ἔσθ' ἢ μάδ' ἔχ' ἡ ἀσφιδέλου μύ' ὄνισσας*, grauē potestatem, sapientemq;, & cuius carmina in priuata uita pro oraculo a professoribus sapientiæ recepta semper fuerint. Et post Hesiodum Plinium, mandit Asphodelum, se mine tosto & bulbo dicentem: & ad temperandam eius acrimoniam fici misceri iubentem. Tanta rudi, nouoq; adhuc sæculo, aut indifcreta ciborum frugalitas erat.

De Bulbo uomitoriō. CAP. CLXXXVIII.

BVLBVS QVEM uomitorium uocant, folia habet lentiora multo & longiora Bulbo cibario, radicem similem, cortice magno. Ea mansa, aut decoctum eius potum, uisceræ malis medetur. Vomitiones mouet.

BARBARI COROLL.

BVLBUS Vomitorius, a Græcis Emeticos uocatur, folijs nigris.

Pli. li. 21. c. 17.

B

BVLBVS

C De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.

Βουλβο cibario
1100

CIBARIVS BVLbus uulgo cognitus, a nobis estur. Stomacho & aluo utilis rufus, & ex Aphrica delatus. Amarum uero, & scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent. Excalfaciunt. Venerem stimulant. Linguam, tonsillasque exasperant. Multum alimentum præbent. Carnes creant. Inflationem pariunt. Luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. Spicula extrahunt. Gangrænas, & podagras ex melle, aut per se, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent. Stomachi dolores mitigant. Furfures & ulcera quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata, uarosque per se, aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle & aceto, emendant. Fractis auriculis, unguibusque, ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus. Item cum cinere e mænarum capitibus, impositi. Cremati uero, & cum alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiorum cibo abstinentum. Quoniam nervos tentant. Cocti cum polenta, & ex fuillo adipe impositi, tumores ac tubercula uelocissime ad supurationem perducunt, & rumpunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19, ca. 5.

D

BVLbi foliū angustum, ut omnibus fere bulbosis. Radice feritur hortensis. Nam semine partim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in Avena, Loro, Betaque conspicitur. In Taurica Chersepheso tam dulces sunt, ut crudi mandari, Laudant ex Alcatheo, Pelasga, ut Ouidius ait, urbe candidus, hoc est, ut puto Megaricus, auctore Pausania, sed ad uenerem. Idem auctor. Daunis, an Libycis Bulbus tibi missus ab oris, An ueniat Megaris, noxiū omnis erit.

Est & Bulbi genus circa ripas amniū, cuius inter esculentam partem, & summū corticem lanæ contineatur natura: ob id Eriophoros appellatū, ex qua uestes quoque fiunt. In Indis Bulbi non lanigeri, sed criniti nascuntur. Bulbis amaritudo in uertice. Habetur & Bulbina, rubicundo radicis bulbo. Item candido, & squamis carente, folijs Paracæ, ut inquit Plinius. Codices antiqui non Paracæ, sed paruis habent. Ego porraceis legendū existimo: quandoquidem ita modo creditur Bulbina, quam Maurice Buberigi cognominant herbarij, folijs croci, flore uiolæ, purpureo, siue ferrugineo inspicis, nigro semine. Syluestrium Bulborum florem, coronis inferuere ueteres, Anemonem uocantes post Narcissum, ut Theophrastus inquit, exeuntem uere. Conditione Bulbi eum florē Græci appellant: haud scio an hic sit, qui per initia mensis Aprilis Narcisso similis eripit, maioribus diuisuris, seu stella quaternis folijs cadidis, cum caecis interioribus, & odoratus, fronde porracea, radice bulbofa, seu Allium, sine odore glutinosa. Bulbum rufum Græci Bolbon, & Hippocrates Bolbion pyrron uocant. Inuenio apud Hippocratem genus syluestris oleis Omoconitidem, siue Oloconitidem uocari, dulcem, Bulbo simili radice, uerum parua, & Oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrinos Græciæ diu & Italiæ fuisse Bulbos, aut peregrinis quasi ad omnes usus meliores utas fuisse has gentes, & plura eorum fuisse genera Græcorum antiqui, & probatoris fidei scriptores omnes testantur. Theophrastus primum, s. de plantis uolumine, cuius ea de Bulbis historia est. Bulborum autem plura esse genera, manifestum. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differunt. Alicubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio edantur: quales in Taurica Chersepheso sunt. Post Theophrastum deinde Athenæus secundo sui dioposophistæ libro inter cætera, quæ de Bulborum huiusmodi natura multa dixerat, Regios uocari aliquos ait: quos cunctis alijs prætulit. Post Regios a colore Rufos laudauit. Subiciens

statim Candidos, Lybicosq; in genere Scyllarū magis, q̃ Bulborum esse. Aegyptios omniū deterrimos: quemadmodū contra, auctore Nicandro, cunctisq; alijs, Megarenles omniū optimos. Quod genus conferi praeipue Cato iussit, & Columella in carmine suo his uerbis instituit. Iam Megaris ueniat genitalia semina Bulbi: Et quæ Scylla uenit getulis obruta glebis. Primum illud Ruffum & optimū, mox Candidum, Libycumq;: & Scyllæ magis q̃ Bulbo simile genus describens. Addidit eodem libro Theophrastus, quod & Athenæus pariter retulit, maximā & huic generi propriā Bulborum differentiā esse, quā ad maris littora aliquibus locis nascentes Bulbi ostendūt. Inueniūtur enim littorales, in quibus intra primas tunicas lanæ sint, inter id quod manditur, & extimam tunicam mediā, tam uera & præsentī natura lanæ, ut uestes ex ea texant: uocariq; ob id Lanosum Bulbū: non quemadmodū in India nascentē Capillatum noiant. Hoc genus, q̃ ad mare, & littora nascit, & cum eo reliquos Bulbos oēs, quoniā congeres inter se sunt, iuniores aliqui marinā Cepulam dixerūt. Cum tū Lanosum illud genus ad mare nascent, priuatim cognouit illo discerni debuerit. Serebat in hortis diligenter antiquas hoc olus, eratq; illis in quotidiano usu, irritamentū Veneris potius, q̃ uitæ necessarius cibus. Nihil enī ab antiquis aliud in eo laudat: neq; ex alia natura ut Columella, quod paulo ante diximus, genitalia semina Bulbi, appellauit. Et Martialis in Xenij suis. Cum sit anus coniux, & sint tibi mortua mēbra, Nil aliud Bulbis q̃ satur esse potes. Idem tot alijs locis salaces eos uocans, nec aliā uiam, nec aliū usum cognouisse in Bulbis uidet. Indicant idē in antiquis Græcorū Comædij sales & dicteria in Theatris iactata: quale illud est, *βελβών χίτραν καταφαγών*, qd est, Bulborū pleno fictili satur: contra salaciores dictū. Et contra Veneris impotentes *ὀυδὲν ὀνήσει βελβόρ ἂν μὴ ἐλαυγὶ χιτρος*, id est, nihil pderit Bulbus, nisi farinā habueris. Sefami enim farina, caseo, melle, & aceto ad cibum condebantur Bulbi. Perse enim amari, nec in cibis grati sunt. Numerauitq; Tarentinus Heraclides Bulbum hunc inter ea quæ feminis abundantia faciunt: hic inflare dixit, quæ ad Venerem non minor q̃ illa occasio est. Priuatim, ut a principio diximus, totū hoc genus Bulbos antiquitas uocauit. Alioquin commune omnibus his Bulborum nomen est, quorum radices sub terra sic crescunt, ut ad nouam quorannis fobolem decerpi aliqua pars possit: ut in ilio, croco, & plerisq; alijs sit. Non sic tamen certa est nominis huius ratio, ut ad alia genera aliquando etiam non trahatur: a quibus licet non auellatur noua illa foboles sub terra, tamen augentur. Sed illa est totius bulbacei generis propriā nota.

De Scilla.

C A P. CXG.

Scilla uim acrem atq; feruentem habet. Assatam multo utiliorem esse constat. Polline, aut luto oblita, in clybanum conijcitur, aut carbombus obruitur, donec obducēs farina sufficienter intosta fuerit. Quæ exempta, si non emolle scat, altera farina, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur itē in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustra tim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, aut acrimoniam habeat: traiectaq; lino frustra siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. His Scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars cruda Scillæ in oleo seruē facta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto, demorsis a uipera, cataplasma est. Ad singulas affaē parteis, adiectis octonis tosti salis, cochlear unum, aut alterū damus ieiunis, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus urinā ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, Regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis & cruenta extussientibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coqui

ούλλε

Ctur cum melle, & estur eorūdem gratia, maxime ut cōcoctionē adiuuet, Strigmenta per aluū extrahit. Cocta, & simili sumpta modo, eosdem præbet effectus. Sed cauendus Scillæ usus, his qui intestinum sentiunt ulcus. Ad pensiles uerrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 20. ca. 9.
Theophr. li.
bro. 7. cap. 11.

B A R B A R I C O R O L L.
Scilla, siue ut Varro appellat, Squilla, Hippocrates uero etiam Scella, & terra & mari alitur, Radix sit Bulbus, an Cyma, siue fructus, a Theophrasto dubitatur, quoniam sunt qui radicem in ea geminā demonstrant. Vtuncq; tenera esu est, non omnis, sed eius quæ ab usu Epimenidia Scilla dicitur, angustiore folio, ac leuiore q̄ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt. Germinant celerius quædam intra Scillam consista. Nam & fructus condendos, præsertim granata seruat, exempto pediculo prius. Folio caulis, ut in Croco & Narcisso profilit. Florere ter dicitur, singulis floribus singulas sementes, quæ ternæ, denunciat. Cum senuerit, folia demū emicant. Scillarū in medicina species duæ, Alba quæ masculus, Nigra, quæ foemina. Genus unum Scillæ, aut Bulbum eius omnē Hippocrates Schoenon uocat, ut Galenus inquit, q̄q̄ sunt qui Schinon scribant, non Schoenon in Aristophane poeta.

παρατίσιον

¶ De Pancratio. CAP. CXCI.
Pancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente. Folijs lilij, sed longioribus, Scillæ uires & præparatiōem habet. Eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̄ Scillæ facultas inest. Radicis succus, cum Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

B A R B A R I C O R O L L.
Pancration, quam & Scillam pusillam uocamus, folijs Lilij albi crassioribus aspicitur.
E X M. V E R G. C O M M.
Eandem penitus, non similem Scyllæ Pancration hoc nostra ætate Herbarij ostendunt, confunduntq; simul, alioquin diuersa genera: tanta nataliū similitudo & mixtura est. Nos utramq; simul uisam, præterq; colore, & id quidē non satis manifeste, diuersam secernere nequimus.

καπνίσκος

¶ De Cappari. CAP. CXCII.
Capparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui malū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidam Thalliam, aut Petræam, alij Olophyton, alij Ionitem, nonnulli Oligochloron, aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Magi Potera, alij Pentheron, aut Cor lupi, alij Alochorodon, Romani Inturim, Aphri Hærbieæ athon. Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. Spinas ut rubus habet, in hami modū aduncas. Folia mali Coronei rotunda, fructū oleæ similē: qui cū dehiscens pandit, florem candidū promittit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ figura inuenit: quod apertum, grana acinis punicatorū similia ostendit. Radices lignosas spargit, grædes, numerosasq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur. Caulis, & fructus cibi gratia condiunt. Aluū turbat. Stomacho aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen, stomacho q̄ cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, qudraginta diebus, lienē absumit.

Eturinam, cruentumq; excrementum emittit. Bibitur utilissime in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis. Menstrues ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadē proficit. Vlcera omnia uetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat. Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, utiungines albas absterget. Radix, foliaq; intrita strumas, ac ditricias discutit. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & Marmarica Capparis uehementer inflant. Apula uomitus facit. Libyca, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; offretenus exest: quare in cibis non ab re damnatur.

BARBARI COROLL.

Capparis, siue ut Palladius Cappar, alij diligentia marcescere affirmant, alij negant. Frutex est firmioris ligni, seminifq; cibi uulgaris, caule q; una plerumq; decempro, aculearos rorsim modo ramos habet, folio quoq; horridulo ac spinoso, radice una, caule humili. Germen & flos æstate roseus, odoratusq; folium ad uergilias usq; uiget, sabulosi macrisq; gaudet. Quatuor ei genera. Arabicum, quod & pestilens est, ut Plinius, & Galenus ait. Africanum, Marmaricum, Apulum, omnia quondam infesta, nunc mitia undecumq; illara. Quidam eum Phyllostaphylon, Ophoeostaphylon uocant. Innocentius Italicum cibum. Capparis nisi area defossa, hoc est, circulari scrobe coerceatur, & ripis, undiq; circumstructis lapide, late serpit, euagaturq; per agros, & cogit solum sterilefcere.

EX M. VERG. COMM.

Vulgaris, quotidianiq; usus cum suo fructu herba Capparis est: & quo communior cunctis ubiq; gentibus, & ubiq; nascens, eo plures appellationes inuenit, singulis eam suo nomine indicantibus. Quo fit, ut exceptis paucis, nullum habeant reliquæ intellectionem. Cynosbatus tamē, idest, caninus rubus, ob hamaros quos habet rubo illi similes aculeos, dicta Capparis est. Quemadmodum Phyllostaphylon, q; inter folia fructum quasi uuam fert: & si hic paulopost Oliuæ comparauerit. Sic Petraea a natalibus suis, quos inter lapides & rudera inuenit. Cur autem Sinapi persicum a Romanis hic Capparim uocari dixerit, incertum nobis est: quentadmodum contra norum omnibus, Capparim a cunctis rei rusticæ scriptoribus appellari. Vsum eius ante alios cibos in sanitate commendauit Paulus Aegineta: iussitq; sumi ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Monuit præterea, excitare Capparim cibi appetentiam: iecur, lienemq; laxare: & piniitiam per alium deicere: idq; est quod hic ait, aluum turbare.

De Lepidio. CAP. CXCIH.

Lepidium aliqui Gingidium uocant. Herbulæ uulgo nota. Muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris, et exulcerans. Quapropter ischiadicis illita, præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice quarta parte horum illinatur. Lienosis simili modo prodest. Lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

BARBARI COROLL.

Lepidium, Aegineta Paulus Hiberida, siue Hiberiada iam uocari ceptum scribit, a Galeo (ut arbitror) temporibus. Lepidium ab eo, q; lepidas & maculas in facie deſicq; ac repurgat: quas Columella Fucas uocauit, appellatum Græci putant. Idem auctor Columella, duo genera Lepidij esse intelligit, syluestris, & satiu: ut syluestre quidam accipiant pro Hiberide, satiu pro Lepidio. Peregrinum inquit Plinius fuit & Lepidium, feritur a fauonio. Dein cum frutificauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoreaturq;. Per biennium hæc, postea ipsæ fruticibus utuntur, si non steruita hyemis impediatur: quando impatientissimū est algoris. Exit & in cubitalem altitudinem folijs: non ut Hiberis nasturtij, sed laurinis, utiq; per initia, uerū molibus. Post Gladioli reſuſi fere speciem accipiunt, uſuſq; eius propter acrimoniam non sine la-

A

Pli. li. ii. ca. 25.

B

Lepidium

Pli. li. ii. ca. 8.
lib. 20. cap. 17.

B

C etc. Herbarij modo hanc, non Lepidium, sed Raphanum appellant, in Pannonia frequentem ubi ferunt eam non aliter q̃ radice scobe. Paulus Lepidium inquit, quod apud nos habetur, folio Lauri, sed maiore multo nascitur: quod ei tamen æstate nullum est.

¶ De Ranunculo. CAP. CXCIII.

βαρβάριον

Ranunculum, aliqui sylvestre Apium uocant. Complura eius genera. Vis tam omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs cōstat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amaraq̃, multis capillamentis hellebori modo fibrata. Nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq̃ in Sardinia proueniens, q̃ acerrimum: quod sylvestre Apium appellāt. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas nō sine dolore gignunt. Quare ungues scabros ex-
trican. Scabiem eximūt. Stigmata delēt. Formicantibus uerrucis, & pen-
silibus, alopecijsq̃ paulisper illinuntur. Tepente decocto permiones for-
uentur. Sicca radix, tritaq̃, sternutamenta ciet, naribus admota. Denti-
um dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Plin. li. 27, ca. 13.

D

B A R B A R I C O R O L L

Batrachion, siue Ranunculus, siue Strumea: quoniam medetur strumis, nam Strumus So-
lani genus est. Dicitur & Apiastrum Ranunculus, hoc est, Apium sylvestre, uenenatū in Sardi-
nia, manifesto Nigidij doctissimi uiri errato: qui Apiastrum pro Mellisophyllo appellat: quā-
q̃ huic & Varro sequitur et Dioscorides. Opacis gaudet. Primum genus, cui et color liuidus,
ad latitudinem Malug accedentibus folijs. Secundo generi, caules ut Plinius inquit alti, ut Dio-
scorides, minores q̃ priori: nisi librariorum culpa fuerit, μικροκαυλότερον pro μακροκαυλότερον sci-
bentium. Genus ab his diuersum in totum uidetur, Batrachion, cognomine Polyanthemōs,
caustica ui exulcerans cicatrices, & ad colorem eas reducens, & uiliginis concorporans. neq̃
aliter indicatur a Plinio quale sit: nisi quis & hoc in unam quatuor specierum contribuāt, acce-
ponat: illam uidelicet, quam plurimis foliorum diuisuris & Plinius & Dioscorides deliniant,
uulgo dictam Pes Coruinus, alteram omnino q̃ Coronopus, de qua superius habita mentio
est. De uenenato Salustius, In Sardinia inquit quædā herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, Apia-
stri similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. In ea in-
sula, ut Pausaniæ ac Solino placet, locis riguis prouenit iusto largior: nec tamen aquas inficit.
Strabo ex hac ipsa herba Hispanos toxici genus conficere ait: quod urgente ui maiore haustu,
circa dolorem humanis rebus exigit. A qua *καρδαμύνη* uulgo *γίλαρ*, quod & Dioscorides in ue-
nenis meminit. Hōmerus Sardanion risum uocauit illo uersu.

μυδιον, ἢ θυμὸν καρδαμύνην μάλα τοῖον.

Vide Erasmi
Chiliadas.

Meminit & Plato in Repub. Timæus aliā originem prouerbio huic reddidit, aliam Clitarchus,
aliam Sophocles & Simonides poetæ: nos id in annotationes Plinianas distulimus.

¶ De Fremio. CAP. CXCIV.

ἀνιμών

Fremi v m, græci Anemonem, aliq̃ Agriam, aut Ni-
gram uocant, aliq̃ Anemonem phcenicam, aliq̃ Euemion, non
nulli Meconion, aliq̃ Tragoceros, aliq̃ terræ Parinem, aut Barbylam.
Oftanes Berilion, item Ornios Cheranion, Pythagoras Attracilida,
Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo Fremij genera. Vn-
um sylvestre. Alterū in cultis nascens. Cuius multæ species. Vna phœ-

niceum florem profert. Altera candidam, aut lacteum, aut purpureum. **A** Harum folia Coriano similia, tenuioribus prope terram diuisuris: caules lanuginosos, tenues, in quibus flores ut Papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea. Radix oleæ magnitudinē, aut amplius paulo grandescit, fermeq; geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo maior, latioraq; folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radicū capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris. Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix, pituitam trahit. Decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorumdem, & hebetudines emendat. Sordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum pituita decocti edantur, copiam lactis præbent. Menstrua ciunt, uellere appositi. Illiti quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent. Quoniam a syluestri Fremio, Argemonem, & Papauer, quod Rhœam appellant, de quo inter Papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaueris & Argemonæ color, minus puniceus spectatur, & utraq; tardius floret. Quinetiam Argemonæ croceum succum, gustu admodum acrem reddit, Rhœas uero candidiorem & acrem. Insuper Fremio & Rhœadi capitula syluestris Papaueris similia insunt, sed in Fremio supne crassiusculū, in Rhœa de angustius. Fremij genera nec succum remittunt, nec caput habent, sed quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

BARBARI COROLL.

A Nemone quidam Fremium uocari putant, sed scribendum est Phenion, autore Plinio. Edit florem suum haud multo post germen. Erumpit autumnō post Aphacem a primis imbris. Inter aculeatas, sed mitioris generis Anemonem collocant. Quatuor sunt nominis huius fastigia. Duo coronis dicata, hoc est, syluestris bulbi florem uocatum Anemonem: et aliam Anemonem, quæ Timonia, siue Limonia potius cognominatur, post Heliodryson florentem, & cum Viola nigra uere. Duo medicinis, syluestrem, & satiuam, de quibus præsens mentio copiosissima omnium est, phœniceum florem habens, inter satiuas. Satiuis omnibus folia Apio similia, nec fere semipedalem excedant altitudinem, cacumine Asparagi. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante, ob id Anemone dicta. De Othonna syria herba, quam quidam Anemonē existimauere, dicemus in loco. Nicander Anemonem, Anemonida solet appellare. eamq; ex Adonidis cruore natam prodit. Sosibius Anemonas a Spartanis Phenidas uocari tradidit. Horus Anemonæ flores inquit in Aegypto pingi, quoties morbos hominum intelligi uoluit.

EX M. VERG. COM M.

V Agum, cōmuneq; plantis aliquot, & si congeneres omnino non sint, earumq; floribus fuisse quondam Anemones, nomen, testes, & indicio sunt Theophrastus, Plinius, hic ipse, & Burcolicorum insignis poeta Theocritus: modo eius legitimum poema sit, quod passim legimus Adonidis Epiraphium carmen. Nominisq; inconstantiam, & cōmunionem hanc, papauera ceti præcipue, in cunctis his, floris figura fecisse nobis uidetur. Neq; enim satis constat, tam multis ne diuersis temporibus prodeuntibus flores, Anemonæ omnes dicti quondam fuerint: q; non nisi spirante uento dehiscerent, & in folia se explicarent: quod manifeste patitur, quæ priuatim primoq; Anemone dicta ab antiquioribus græcis est: quam uim naturamq; eius ex re factum illi nomen indicat, & Plinius lib. 11. cap. 11. his uerbis testatur. Flos nunq; se aperit, nisi uento spirante: unde & nomen accepit. Potuit quidem in proferendis floribus eadem omnium infirmitas esse: uerum tamen quod obseruasse uolentibus difficile non erit, cur Anemone omnes dicerentur, cōmunis omnibus tota floris figura maxime fecit: pauciora tria, scilicet ad summam, quæ in

C floribus folia, grandia, eadem, infirma, & quauis iniuria decidua: quodq; non minus obseruandum fuerit in cunctarum medijs floribus, inter folia surgens apex, cacumen, capitulumne, aut papaueraceum uasculum: quæ notæ papaueraci floris omnes sunt. De coloribus nō agimus: quoniā nullibi magis luisse uidetur natura, & in Anemonis his tam uarij & inconstantes sunt, ut nihil quod certum & exactum sit doceri possit. Tamq; late quondam patuit Anemonarum nomē, ut quod posteriores rubrum Papauer dicunt, in triticea & hordeacea segete, Maio mens puniceo colore florens, de quo nunc agitur, Anemonem ueteres etiam dixerint: & si contra credi posse multa indicio sint.

¶ De Argemone. CAP. CXVI.

ἀργεμόνη
οἰωνόν
ἀνθεμία
ὀμόνοια
ἄνθος πιδύων

ARGEMONEA Græcis Oenone uocatur, ab alijs Anthemis, alijs Homonœa, aliquibus Flos campestris, Romanis Concordialis, aut Pergalia. Alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syluestri Papaueri similis est. Folia habet Fremij, diuisa, florem puniceū, caput in cauliculo Papaueris rhœadis, oblongius, & summis paribus latum, radicem rotundā. Succum Croci colore acrem dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt. Ea, ut hærbarius Crateias autor est, contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro & sulphure ignem non experto, contra uililgines efficax est. Easq; sicco linteo antea confrietas in baln eis sanat. Facit & ad scabiem.

BARBARI COROLL.

Pli. lib. 25. ca. 9

Argemonen, & Argemida puto dictam a Dioscoride, ubi de Anemone loquitur. Folia habet Anemones æqualia, et Apij modo secta. Nascitur in aruis apud nos, ut Plinio placet. Genera eius tria faciens, ut id demum probetur, quod radice Tus redoleat. Diuersum uidetur genus esse quod apud Plinium Argemon nocatur. Argemones radicem Eupatorium a recentioribus appellari quondocq; uideo, autoritate (ut arbitror) Dioscoridis in Anemone hoc inueniunt, ut aliud tamen intelligatur genus esse quod Eupatorium proprie uocari solet.

EX M. VERG. COMM.

FVirg. & adhuc est magnæ litis cum Eupatorio Argemone, duo simul diuersa genera miscenibus cunctis. Nec satis adhuc constat, nominis ne, an rei controuerfia hæc sit. Si quam nostræ ætatis in Eithuria medici Argemonem circunferunt contempletur aliquis, nihil cum uera Eupatorio, descriptaq; hoc loco Argemone cōmune uidebitur habere, si quam iuniores scriptores tradiderunt, & nos in antiquissimis eorum cōmentarijs pictam uidimus Eupatorium, multo nomine Argemonem appellasse, merito credentur. Eupatorii em̃ a Dioscoride traditas in quarto uolumine notas omnes, in historia & pictura illi assignant. Nec est q; demiretur aliquis, nos picturarum fide ad hanc rem utentes. Calami enim, & penicilli eadem pene ratio & usus est: nec alter altero minus, incertiusue nostri animi sensus alijs ostendit. Verisimileq; est, relictas ab illis medicæ materiæ picturas, ex his quæ tunc in communi æstimatione erant, relictas fuisse. Quod totum non sine causa a nobis dicitur. Vidimus enim, & nunc in manibus habemus sexcentorum annorum latinum Dioscoridem, regiū, ut tunc tempora erant, opus, in quo diligentissima pictura omnes Eupatorii notæ Argemonæ huic adiectæ fuerunt: quæ ex historia huius scriptoris tribuendæ Argemonæ non erant, quam agresti Papaueri similem dicit, folio Anemones incisuris diuiso, flore in caule puniceo, & in flore erratici Papaueris capitulo: quorum nihil in Eupatorio uidetur. Miscuit hæc, & ignorari fecit similitudo: quodq; hic super ore capite in Anemone ait, nesciētes, syluestrem Anemonem ab Argemone hac, ob similitudinem discernere imperiti herbarij, syluestrem Anemonem, et Argemonem hanc unam eandemq; crediderunt, & esse tradiderunt: & ne ociosum in incognita re uacare Argemones nomē, ad Eupatorium transfulerunt: Argemonemq; sui generis alioquin herbam Eupatorium, falso appellauerunt. De Eupatorio copiosius suo loco agetur. In Argemone hac autem satis illud nouisse sit, sui generis esse herbam, syluestri Anemonæ adeo similem, ut discerni nequeat: appellata tamq; a ueteribus Argemonem, q; oculorum & lucis uitio, quod græci argema uocant, illia

medeatur. Plinius plures, maioresq; q̄ hic & alias illi uires assignat. Videturq; in ampliore, & honestiore medicinae & remediorum censu eam constituisse: quo fit ut suspicemur, potuisse eū scriptorem Argemones nomine etiā pro Eupatorio uti. Non tamen hoc constitūimus. In Eupatorio enim certius tota haec agetur res.

¶ De altera Argemone. CAP. CXCVII.

Altera est Argemone, quam Artemonen aliqui, alij Arselā, aut Sarcocollam uocant, Romani Argemoniam. Ea folijs syluestri Papaueri similis est. Recens trita, intercisiones impositu sanat. Oculorū inflammationes mitigat. Pota cum aqua, dysentericis auxiliatur. Vulnēra conglutinat. Conuulsis, & uellicatibus, imposita medetur. Inflammationibus utilis. Contra serpentium morsus cum uino bibitur.

BARBARI COROLL.

Serpentibus & uenenis Argemonen aduersari nouimus, & ob id fortasse nomen habet. cū sit Arges Hippocrati nomen anguis, ut Galeno placet.

EX M. VERG. COMM.

Tria Argemones genera Plinius sua ætate cognosci, & numerari a Romanis tradidit: probari tamen unum tantum, & id, cuius radix Tus olet. Antiquiores græci, Galenus. f. & Paulus Aegineta, unam tm Argemonem nouerunt. Hic primam & alterā descripsit, & medicinae utilitatem tradidit. Dicimus aut in hoc duo eius gēa legi, ut in impressis, & q̄ circumferunt græcis codicibus inueniunt. Nā in uetustissimis nullū est alterius Argemones hoc caput: nec quē nos habemus uetustissimū latinū Dioscoridem, alteram hanc Argemonem ostēdit. Obseruauimusq; nos in multis, pares uetustate græcū & latinū Dioscoridē, quē tam sæpe citamus, fide pares etiā esse, nihilq; aut in altero inueniri, aut deesse, qd non in altero pariter inueniat & desit. Quā legi timū itaq; scriptoris huius caput hoc sit, uiderint piores. Nobis inclinatur animus, ut credamus adulterinū, supposititiūq; esse. Vtimurq; ad hanc suspicionē, nō tam quas pauloātē diximus rōnibus, q̄ q; pleraq; sunt in eo alienē huic scriptori elocutionis indicia. Dubitamus præterea, de esse huic Capiti aliquid, quo loco, f. sanare præcisiones Argemone hæc legitur. Desyderatur enim cuius partis præcisiones. Nobis inclinatur animus, neruorum intelligi oportere: quoniam hic, & alij græcorū medici *διουκονδε*, quæ uox huic scriptori eo loco est, in neruis priuadam plerumq; appellāt. Plinius præfectiones eas dixit undecimo uolumine, capite. 37. Eius uerba sunt, Mitrūq; uulneratis neruis summus dolor, præfectis nullus.

¶ De Anagallide. CAP. CXCVIII.

Anagallis purpurea, quibusdam Aëritis, aut Aegitis uocatur, alijs Sauritis, a Magis Oculi sanguis, aut Chelidion, Romanis Macia, Ethruscis Masytipos, Gallis Sapana, Dacis Cerceraphron. Anagallis communis, a quibusdam Corchoron, alijs Halicacabō, alijs Zeliaurus, Magis Nycteritis, Aegyptijs Mecij, Romanis Aneciaton, Aphris Asirrisce. Duo eius genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, scemina dicitur: Mas, quæ phœnico. Frutices sunt parui, in terra iacentes. Folijs in quadrāgulo caule pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus. Semine rotūdo. Vtrāq; mitigandi uim habet. Inflammationem arcet. Adactos corpori aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem injiciatur. Argema cum mele attico emendat. Retusa oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarū morsus, iocineris et renum uitia, ex uino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum ædit florem, prociduum sedem reprimere. Quæ uero

A

σαρκοκόλλη
δρτιμώνη

B

αναγallis
αεριτις αεγιτις
σαυριτις

C phoeniceum, illitu euocare.

Plin. li. 26. ca. 7. **F**rutice tenero Anagallides, non altiores Palmo nascuntur in hortis & aquosis. Prior floret cerulea. Mirum q̃ feminam pecora vitant; aut si decepta similitudine (flore enim tatum distat) degustauere, statim eam quoq; (asyla, siue, ut alij codices scribere, casyla uocatur, a nostris ferus oculus) in remedio quarunt. Præcipitur effossus, ante solis ortum, priusq̃ quicq; aliud loquantur ter salutare eam, tum sublatam exprimere, ita præcipuas esse vires. Anagallin Dioscorides Sauritis quoq; dici perhibet. Sunt exemplaria in quibus Gauritis, non Sauritis legitur. Hippocrates Anagallin dicendo, utilem mordendis & afflicandis ulceribus Anagallidem uidetur intellexisse. Aetius Nycterida herbam ad oculorum albugines comprobât; pro Anagallide ut puto accipiendam reliquit, quandoquidem et Nycteritis a Dioscoride uocatur. Erant qui Passerinam uulgo dictam, florem candidum ferentē, Anagallida existimant. Quem admodum & qui Myosotin, idest, muris Auriculam pro Anagallide compictam præferunt. Anagallidem phoeniciam, a colore Paulus Aegineta Corallium quoq; dici meminit. De quo & compositioni datum nomen, quod Diacorallin. Quanq; & pastillus est hoc cognomine, sed in eum lapis Coralus, non hæc herba sumitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non demirabitur aliquis, in humili & neglecta nunc ab omnibus herba, tam multas appellationes. Plærumq; enim sit, ut ubi maior fortuna & uirtutis gloria splendet, illic etiam numerosus nominum ambitus audiatur. Plinius ex tam multis quæ nunc in scriptore hoc numerantur, unum tantum reulit, Anagallida dicens aliquos Corchoron uocare; quæ uox antiquissimis græcis ad maledictum translata est, contra eos, qui in humili & indigna fortuna, maiores ea honores sibi quærent. Frequensq; in græcis dictum est, κόρχηρος ἢ λαχάνειο, quod est, Corchorus inter olera. Quoniam hæc necessarium, gratum, & utilem usum habentille uero miscei se quidem in horto oleris, sed ob humilitatem suâ sine gratia, aut maioris utilitatis spe. Theophrastus tamen libro. s. de plantarum historia, in prouerbium & maledictum transisse ob amaritudinem testatus est. Verba eius sunt. καὶ ἵτις αὖ πάλιν τούτων ἐν οἷς καὶ παροιμιασμένοι οἱ διὰ μικρότητα κόρχηρος. τὸ φύλλον ἔχειν ἀμυγδαλίου. &c. Quod est. Et præter hæc plura alia, inter quæ & Corchorus est, ob amaritudinem in prouerbium translatus, folio Ocimi figura. Quod si hæc ratione intelligendum id erit prouerbium, contra eos dicitur, qui paratam homini uoluptatem, & suauiore rei alicuius usum, tristi & amaro aliquo turbabunt. Fuerunt deinde, qui colorem floris Anagallidi adijcientes, Puniceam, & qui Aeritim, idest, æriam a ceruleo colore nominarent, genera eius potius distinguentes q̃ nouis appellationibus indicantes. Quemadmodum & Augitum a fulgore coloris & luce aeris, quam græci ἀυγὴν uocant, alij pariter indicauerunt. A lacertis deinde notissimo insecto, quas græci σαύρας dicunt, Sauritis appellata Anagallis fuisse credi potest: quoniam succo eius uiperarum moribus antiquitas mederetur, quæ lacertis quadamtenus similes sunt: uel quod frequens hoc insectum in aruis inter Anagallides inueniatur. Acceditq; sententiæ huic testis Nicander in Theriacis suis, σαύρας herbam appellans, contra uenenata utilem. Quam ob causam, mutata tatum nominis forma, hic Sauritim ab aliquibus appellari dixit. Non tamen ex Nicandro colligi, & pro comperto haberi potest, σαύρας ne ille Anagallidem, an aliam in olerum genere herbam sic uocet. Nosq; ad hæc rem coniectura magis q̃ ratione, aut aliorum autoritate usi sumus. Fecit præterea similitudo ut Hirundinaria, & Alicacabus, alterius generis herbæ, sola appellatione in Anagallidum censum & nomenclaturam uenerint. Et hæc pro tam multis Anagallidum nominibus dicta satis sint. Cætera enim incognita nobis, alijs docenda relinquuntur. Restituimus huic capiti etiam quod in eo perierat, mederi scilicet Anagallides præterquam iocinorosis, eum subeuntibus aquis. Id enim in exscribendo relictum a librarijs fuerat, nec nisi in antiquissimis græcis & latinis seruabatur.

De Hedera. C A P. CXCIX.

κισσός

Hedera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpos, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyssion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Persis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Syl-

ua mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est. Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra nigrum, aut Croci æmulum, quam uulgius Dionysiam uocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet palmites, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Nervos tenet. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus. Ambustis cum cerato illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino unguento, melle aut nitro, naribus infunditur. Et contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est. Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Nigræ Hederae succus, aut e poti corymbi corpus infirmant. Mentemq; turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punice cortice cum rosaceo, si instillantur a contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta illi nuntur omnium ulcerum generi, etiamsi cacœthe sint. Vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. Mouent menses triti, & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes sceminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulua inditis, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus, putrida tædia narium, graueolentiamq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma Hederae Psilothrum est. Illitu pediculos enecat. Succus in aceto potus, contra phalangia prodest.

B A R B A R I C O R O L L.

Hedera frutices quædam uendicant, sed arborum magnitudine crescendo æquat. folia primo angulosa, processu rotundant. Multa ei gēna. Humi reptat Chamæcissos: de qua in loco. Celsarum tria capita. Candidū. Nigrum. Et Helix, id est, Clauicula, siue Pampinus uocata. Candidū aliud fructu solo, aliud fructu & folio. Id quod fructu solo cander, aut crassiusculū, densum; globatumq; habet eum, & Corymbias uocat. Athenis uero Acharniconitriguū, aut minorem acinum, sparsiolemq; Racemū, & Silenition appellant. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam differentia sunt, sed minus perspicua. Alicui enim semen nigrū. Alij croaceum, cuius coronis poetæ utant, folijs minus nigris: quā & Nysiam, & Bacthicā, & Dionysiam uocabāt, maximis inter nigras corymbis. Alij duo genera fecerunt a colore acinorū, Erythranon, & Chrysocarpion. Helix ab Hedera distat aperissimo discrimine. Primū folia huic angulata, concinna, exigua: Hederae simplicia, rotundioraq; distat & longitudine internodiorū, præcipue tamē sterilitate: quoniam fructum non gignit. Quidā hoc ætatis uitiū intelligunt, primoq; esse Helicem; & Hedera fenestru fieri; quod quidē falsum esse Theophrastus & Plinius contendant: cū quia foliū & germen Helicis ab Hederae quilibet ætatis folio plurimū differat: tum quia plures eius differentia noscant. Herbacea, seu uirens, quæ numerosissima est. Altera folio alto. Tertia uersicolore, quæ Thracia uocat. Herbacea duplex genus. In uno tenuiora folia, digestaq; per ordinē, longiora densioraq; in altero diuersa oīa in minus. In uersicolori quoq; alia folio crebriorē, tenuiore, ordinato: in altera in condito, nūc maiore, nūc minore, maculosoq;. In candido gēne, alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinē possimū Herbacea. Nunc reuertor ad Hedera. Hedera ubi semērefcere coepit, germē sublime, rectūq; agit. Radice numerosa, contorta, densa, crassa, lignosa: nec admodū profunda. Præsertim nigra. Et candidarū quæcūq; asper rima imitissimaq; est. Hæc & arbores amplexu & fūctu stragulat, tanta crassitudine, ut ipsa per

Theophr. li. bro. 6. cap. 2.
Pli. li. 16. ca. 24.
lib. 24. cap. 10.

C se arbor fiat. Signa eius, folia maxia & latissima, mamas, hoc est, germina subrigētis, quæ sunt cæteri inflexæ. Racemi stantes atq; recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni brachia. Post ipsam Nigræ: sed propriū Albæ, q̄ inter media folia emittit brachia, q̄bus arbores cōplectit, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis succisa durat, atq; utuit, & tondē initia radicis habet, q̄t brachia, ob id flexipedē cognomētō apud pōetas. In nigra & alba alijs dulcedo Acini: alijs tanta amaritudo, ut aures nō attingāt. Est & rigens Hedera, q̄ sine adminiculo stat sola oīm generū, ob id uōcata Cissos a Theophrasto & Plinio, quasi Columellā in eo uocabulo significat. Sed summa diuisio h̄sdē auctoribus, in marē, & sceminā, q̄ alterā foliū durius, pinguius, maius habet, & florem ad purpurā accedentē: altera non habeat. Vtriq; tū flos syluestri rosæ similis, sed minor & inidoneus. Quæ descriptio uidet̄ recētoribus quibusdā non Hedera, sed Cisso cōueniens, cui & sexus & flos punicis tribuit̄. Sed Theophrastū sequutus est Plinius li. stirpiū sexto, hæc ipsa non de Cisso, sed de Hedera prodentē. Hedera Theophrasti ætate in Asia nasci nō poterat: nec in India, nisi mōte Mero, unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalū laborasse oīdo tō diadūt, ut sereret eam in Medis. Inimica arbor satis oībus, sepulchraq; æt muros rīpens. Serpentū frigori gratissima. Vfos in funes, et armamēta nauū Hedera ueteres, auctor est Athenæus, quā & Rhodano petebāt, ut Canabim. Catonis experimentū, uolentū scire, aqua in uinū addita sit, nec ne: ut uasculū e materia huius faciat, uinū quod erit dilutū, transfluat, aqua manebit, nec em continet uinū inquit uas Hederaceum. Quod poculi genus græci Cissybion, ab Hedera uidelicet appellant, q̄q; pro quocūq; ligneo id accipitur. In quo significatu & Cymbiū, & Cypellū quandoq; sit. Alij uetustos calices Cissybīa intelligunt, propterea q̄ in Didymeī Iouis dedicatione folijs hederaceis libare mons fuisset. Cymbia uero, quæ ansis careant, oblonga & angusta, nauigij spēm præhēntia. De Hedera Cilicia, quæ tamē Hedera non est, in Smilace trachea quarto uolumine monstrabit̄. Cisson, hoc est, Hedera pusionē Liberi patris fuisse Græcia confinxit, in noīs sui fruticē conuersum, dū minister cū eo deo saliens, terræ allisus perijt. Athenienses Citton ipsū Bacchū uocant, & apud se Acharnis uico natā Hedera primō uolunt, ut ingit Pausanias, Syluestre Hedera cerui phalangio pculsi mandūt, & liberant, Aelianus auctor.

D ^{E^oX M. V E R G. C O M M.} Nmerantur a Plinio uiginti Hederarū genera, folijs, corymbis, uiticulis, altitudine, humilitateq; & usu diuersa, oīa a Theophrasto diuersis locis accepta. Copiosiorq; ille generū numerus, quē in ore oīm fuisse quondā uerisimile est, occasione ut nos credimus scriptorē hunc exscribentibus attulit, ut a principio statim Hederarū historię tā multis, tamq; diuersis appellationibus, non una noīaretur planta, sed unius plura numerarentur genera.

De Chelidonia. C A P. CC.
χελιδόνιον
παιονία
ηρατεια **C** Helidoniā magnam, nonnulli Pæoniā uocāt, alijs Cratæam, alijs Aubion, alijs Glauciā, quidam Philomedion, alijs Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan, Aegyptij Nothoth, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali, aut altiore, surculoso. Folijs Ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore cæsijs, flore uiolæ albæ, secundū singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati Papaueris, tenuis, longa, in qua semen Papauere maius recluditur. Succus in aereo uase, cū melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos Radix cum aniso, & uīno albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpūt. Imposita cum uīno, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excæcatis pullis adferentes hærbam uisum restituere.

EX M. VERG. COMM.

Chelidonium, siue Chelidonia, siue Chelidonea, hoc est, Harundinaria maior, fruticoso caule, folio Pastinacę erraticę ampliore, ipsa altitudine duum cubitorum, flore luteo. Collyria quoq; quibus ex hac utuntur, Chelidonia appellantur.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Hirundo, quę Gręci Chelidona uocāt, notissima auis; notissima omnibus etiā hęc herbę nomen. Vtq; id pro cōperto est, sic contra non satis certū, quid sibi & auī tam cōmune sit; quidue inuicem agentes, patientesue cōmunicato nomine inter homines censeantur.

De Chelidonia minōre. CAP. CCI.

Chelidonia minor, quam Tyrinon syluestre aliqui nuncupārūt, hærubula est stolonibus constans, sine caule, folijs Hederę, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus. Radices habet complures pusillas, in granorū tritici modum aceruātim congestas. Quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt, iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & Fremij modo summā cūtem exulcerat. Pforas, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus, ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctū eius cum melle gargarizatum ualide caput inanit: & omnia pectoris uitia extrahit.

BARBARI COROLL.

Chelidonia minor, folia Hederę habet, minus candida.

EX M. VERG. COMM.

Emendauimus ex antiquissimorū gręcorum latinorumq; codicum fide, in minore Hirundinaria quod male in impressis uulgatioribusq; πύργον legebatur: diximusq; agreste triticum, id est, πύργον uocari minorem hanc Hirundinariam. Nec tantū antiquitatis fide & testimonio id fecimus, q; ex historia scriptoris huius, qui habere eam ais inter cętera, radices tritici modo coaratuas. Satisq; pro ea dicta hæc sint.

De Othonna.

CAP. CCII.

Othonnā aliqui maioris Chelidonię succum esse aiunt. Alij siccum floribus corniculati Papaueris expressum. Alij permixtos cęruleę Anagallidis, Hyoscyami, & Papaueris succos esse contendūt. Alij Troglodyticę hærbe succū, quę Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabię tractu, qui ad Aegyptū spectat. Othonna similis Erucę, perforatis crebro folijs, & uelut a tinea derosis, squallore obsitis, paucis. Flore Croci, latifolio. Quare quidā Fremij speciem esse putauerūt. Extractus succus oculorū medicamētis adijcitur, ubi expurgare est opus. Morde tenim, & abstergit omnē caliginem, quę oculis offunditur. Tradunt humorem quendā ex hærba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmāt, lapidem esse Aegyptiū, in Thebaidē nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

BARBARI COROLL.

Othonna herba nascitur in Syria, Plinio secundo. Paulus Othonnam uocando in cōpositionibus plerisq; maius Chelidonium interpretatus est. Sed aliud tamen genus est Othonna, quod hic describitur.

EX M. VERG. COMM.

Quis audeat ætate hac nostra, cui præteritorū seculorum negligentia & temporū iniurijs nouissima quęq; adeo perierūt, ut quę in horris etiā quotidie perse, aut humano o-

A

Theophr. II-
bro. 7. cap. 14.
Pli. li. 25. ca. 8.

χελιδόνιον τὸ
μικρόν
τύρινον ἄγριον

B

ὀθόννα

Pli. li. 27. ca. 12.

C pere nascunt, ex antiquis appellationibus signari & ostendi digito nequeant, qualis, & quæ quidam Othonna fuerit dicere. Scriptori huic, & post eum cunctis alijs non satis cognita, & ex aliorum fama historiaque tantum tradita: quod magis miremur, oes in diuersis penitus generibus numerata, alijs succum, & hunc multarum simul & per se herbarum, alijs herbam cuius longior sit historia, alijs lapidem in Thebaide Aegypti nascentem eam indicantibus. Quo fit, ut propter ea quæ a posterioribus tradita de ea fuerint, nihil nos dicere, & in tanta tot scriptorum unius rei uarietate censere ualeamus. Plinius lib. 27. cap. 12. herbam tantum credidit. Verba eius sunt. Othonne in Syria nascitur, similis Erucae perforatis crebro folijs, flore croci: quare quidam Anemonem uocauerunt. Succus eius oculorum medicamentis conuenit. Mordet enim leniter, & calefacit, adstringitque siccando. Purgat cicatrices, & nubeculas, & quicquid obstat. Quidam tradunt lauare, atque ita siccatam digerere in pastillos. Quæ omnia paulo minus, quæ in eisdem uerbis ex hoc scriptore accepta sunt. Videturque Plinius, relictis de Othonna opinionibus alijs omnibus, in herbarum genere eam pro conperto constituisse. Paulus Aegineta de simplicibus sexto uolumine agens, non herbam hoc nomine, sed herbarum succum in Arabia ad Aegyptum nascentis appellauit. Idem eodem loco retulit, & eodem quo hic scriptor modo dicere alij lapidem Aegyptium esse Othonnam. Hic ipse propterea in confectionibus medicamentorum quorundam, Othonnam interpretatus est, maioris Hirundinariae succum. Nos illud tampridem cogitauimus, & in eam partem inclinatum animus, ut credamus sui generis herbam omnino esse Othonnam: quæ uero alia de ea tradunt, a uirum & potestatis similitudine ab aliquibus credita, dictaque fuisse: & ex eorum ratione, quæ graeci ἀντιβαλλόμενα, i. ut nostræ ætatis medici uocant, quid pro quo, ad Othonnam translata fuisse. Quod autem dicimus, huiusmodi est. Potest Othonna oculis mederi: atque hic χρυσόσθαι ὡς τὰ ὀφθαλμικά ἐπὶ τοῦ ἀποκαθαίρειν, quod est, exprimere ad oculorum medicinam ex ea succum, ubi purgandum exterrendumue aliquid sit. Quod totum pariter potest Hirundinariae succus, de qua hic ait, ἀρμόζειν πρὸς ἐνδονόχους: quod est, conferre oculorum claritati. Causaque hæc, ut nos credimus fuit, ut Othonna Hirundinariae succus esse crederetur: non quia idem illi esset, sed quod idem posset, nec aliunde quod ex eadem hac parte Glaucium esse Othonnam, pariter tradidisse alij. Siquidem & Glaucium (ut hic in eo dicit) χρυσόν ἐστὶ πρὸς τὰ ὀφθαλμικά, quod est, usum Glaucii ad oculorum medicinam esse: quibus cornutum Papauer etiam, Anagallis, Apollinarisque herba pariter utiles (ut ex earum historia medicinarumque legentibus patebit, nos enim breuitatis causa suis locis dicenda iterum, nunc relinquimus) succo suo in Othonnæ appellationem uenerunt. Ex his facilis coniectura est eius, quod paulo ante diximus, quia pro Othonna, quam non facile omnibus locis inuenisse erat, in Arabia & Trogloditis nascentem, a medicis alia illa imperari solet, ideo credidisse multos sui generis herbam aliarum multarum succum fuisse: qui legitime deficiente ea, in oculorum uitijs, ob æquales uires, in usu esset. Nec alia ratione Aegyptius lapis Othonna etiam creditus est: quoniam ex eo, scilicet collyria ad eadem oculorum uitia conficerentur. Eum lapidem Barbarus æris colore, quasi χαλκοχρῶν, secutus quorundam codicum fidem dixit. Nos uetustiorum, meliorumque lectionem λευκοχρῶν, id est, candido colore.

μυοτῶτα

¶ De Auricula muris. C A P. CCIII.
MYosota, alij Myoton, alij Anthilion, alij Alfinen, nonnulli Myorthochon, alij Myrtosplenon, Latini muris Auriculam uocant, Aphri Labatholabat. Nomen ideo accepit, quod musculorum aures folijs imitetur. Lucos, & fabulosa loca amat, ideo Alfine dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratorem habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta instillatur. In totum eadem potest quæ Helxine.

Pli. li. 27. ca. 12.

BARBARI COROLL.
MYosotis Alfine cognominata, quasi nemoralis. Nascitur & in hortis, & maxime in prærietibus. Incipit a media hyeme. Arescit æstate media, cum prorepat auribus musculorum expressis. De hac sub uocabulo Alfine repetuntur omnia hæc libro quarto. propterea nihil ibi diximus. Dicuntur Myosotides, & Myosotæ a Galeno.

EX M. VERG. COMM.
Satis cur Myosota, & Alfine herba hæc quondam dicta fuerit, hic scriptor ostendit: & qui

græcas nouerunt literas, auditis tantū uocibus illis, idem intelligent. Plinius etiā libro. 27. ca-
pite quarto eam describens ait, Cum prœcepit, musculorū aures folijs imitatur. Cuius anima-
lis uox alijs appellationibus coniuncta, eandem causam habet. Siquidem Myoton, muris au-
rem pariter significat: & Myotosplenon, ex muris aure & aspleno herba composita uox est:
quæ ab altera muris auricula ad priorem hanc trāsata fuit. Siquidem hic in ea quæ paulo post
sequitur Scolopendrio, quæ eadem Aspleno est, similem esse dicit. Est illud in appellationibus
his etiā animaduertendum, de eadem herba doceri hoc loco sub titulo Myosora, iterumq; in
quarto sub titulo Alfine: esseq; eandem utrobq; historiam eius & medicinam: ideoq; cum se-
mel hic de ea actum fuerit, non esse de ea iterum agendum. Cum eo peruenerimus, iterum le-
gentes idem monebimus. Illud etiā significasse uolumus: quæ plerumq; inuenitur, & quam
nos aliquando uidimus Muris auriculam, altera, & quæ statim sequitur est.

De altera Auricula muris. CAP. CCIII.

Muris Auricula quā Myosotida uocant, hærba est caulibus pluri-
bus ab una radice, aliquatenus rubentibus, concavis ab imo. Fo-
lijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per interualla assi-
due geminatis, atq; in micronem desinetibus, & tenuibus caulicu-
lis, ex alarum sinu prodeuntibus, flore cæruleo. Radix digitali crassi-
tudine, multis capillamentis fibrata. In summa, Scolopendrio similis,
sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Helxinet,
muris Auriculam uocitent.

BARBARI COROLL.

Myosotis hæc quæ posterior describitur, iustius Myosotis tantū dici solet q̃ proxima, quæ
Alfine potius, q̃ Myosotis appellata sit ueteribus.

EX M. VERG. COMM.

VNum tantū nos uidimus Muris auriculæ genū, alterū scilicet hoc, & secundo loco a
Dioscoride traditum: respondentq; sensui omnes eius notæ: prioris nullum inuenimus ocula-
tum testem. Antiquissimi etiā latini Dioscoridis codices, posteriorem hanc solam ostendunt.
Quineriam Plinij ætate, si quis uerba eius sagacius odoretur, non satis certa res erat. Ait enim
post descriptam Alfinem, Sed aliam docebimus quæ iustius Myosotis uocetur. Paulus Aeginē-
ta postremo unum tantū genus eius in sexto pariter agnoscit. In omnibus tñ græcis duo capita
hæc legunt, quo uertimus modo ubiq; scripta: cæq; ob causam qualia erant latinis reddita.

De Glasto satiuo. CAP. CCV.

ISatis satiuæ, aliquibus Augion, Magis Arusion, Romanis Gluta,
aut Glastum dicitur. Glastum quo insectores lanarum utuntur, foliū
habet Plantagini simile, uerum pinguius, nigriusq;. Cuius caulis duum
cubitorem altitudinem excedit. Illita folia, tumores omnes discutunt,
Cruenta uulnera glutinant. Sanguinis profluuiā sistunt. Ignem sacrum,
phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant.

BARBARI COROLL.

ISatim Lactucis syluestribus annuerant. Duo ei genera Plinio redduntur, itemq; Dioscori-
di. Nascent in syluis. Alterū insectoribus dictum: quod & satium Dioscoridi, Galenoq; tri-
detur. Plinius syluaticum uocari tradit, simile Lapathō syluestri folijs, nisi plura essent & nigri-
ora, quam uulgo modo Gualdum, ueteres Glastum, siue Glastum lingua gallica dicebant.
Eo Britannii mares & foeminae oblinebant se. Mares, ut cæruleo colore merum hostibus affer-
rent. Foeminae, ut in quibusdam sacris incederent nudæ, colorem Aethiopum imitantes. Ita-
tim Dioscorides Egnen quoq; uocari prodit. Credo hanc ab Hippocrate Icenē, siue Ignē di-
ci. Dioscorides Isān latine dici Rutam, Apuleius Alutam scripsere. Falsum utrumq; suspicor;
& Lutam, siue Luteam uocari credo. De Lutea herba Plinius & Vitruius inter colores tan-
tum loquuntur. Plinius, Chrysocolla inquit illa quocq; herba tingitur, quam Luteam appel-
lant. Idem paulo post: Luteam Chrysocollam ab herba Lutea dictam putant, quam ipsam cæ-

istrio
dicitur

Pl. li. 26. ca.

Ceruleo sublitā pro Chrysocolla inducūt. Viētruius, qui non possunt inquit Chrysocolla propter raritatem uti herba, quæ Luteum appellatur, ceruleum insciunt & utunt uiridissimo colore, hæc autem inquit, Infectiua appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Nihil nunc Isatide notius, Maximūq; sibi uestigal ex ea fecerunt, qui Tiphernates agros ad Tyberim, omnemq; regionis eius tractū, neglecta omni alia annona, hac tantū herba conserūt. Tantus nūc tinctis colore eius lanis honor est. Guadū nostra ætas appellat. Apuleius in commentariolo illo, quod de aliquot herbis reliquit, Alutam ab Italiā uocari ait. Quæ uox q̄ integra in eo scriptore sit, non satis cognitū nobis est: quoniam nihil herba huius est corio. Quæcūq; autē ea futura sit, eam credimus esse quā hic pariter uitiosa uoce Rutam a Romanis uocari ait, cōmune nihil, aut simile illi habentē. Non tamen ab re est, ex Ruta, & Aluta uitiosis uocibus, neq; Isatidis conuenientibus tertiā aliquam suspicari, Luteam, scilicet quā Romani aliquot scriptores inter colōres retulerūt, Viētruiusq; præsertim, ad extremū septimū uolumen dicens, Qui non possint propter caritatē, Chrysocolla uti herba, quā Luteam appellant, ceruleū insciunt, Barbari quondā tingendis corporibus suis tam uiri q̄ feminae ea utentes, Glastum uocabant. Eratq; in tingendo præcipuus eius usus, Antiquiores græci, latiniq; inter syluestres Lactucas eam numerauerūt. Plinius longissime de ea egit. 20. uolumine capite septimo.

¶ De syluestri Glasto.

C A P. CCVI.

ἄγρια ἰσάτις

Syluestre Glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In quorum cacumine folliculi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & supradicta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, satiuum Glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos linguæ speciem representantes, in quibus semen continetur, Melanthio simile, caulemque supra binum cubitorum altitudinem attolli. Syluestre uero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiolem. Florem purpureum, aut ceruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

B A R B A R I C O R O L L.

DE hac Isati dictum est in satiuæ proxima: qui & Radiculā, quæ sit Struthion, Isatin uocari putent, ducunt mendoso loco: quē nos in Plinio correximus. 19. naturalis historiæ libro.

E X M. V E R G. C O M M.

ABundabāt in syluestri Isatide multa, quæ ab eo quo nos desijimus loco in alijs legunt: eaq; ob eam curū, minusq; omni ea parte nos fecimus hoc caput. Nec sine rōne, ut credimus: quādo in antiquissimis græcis, q̄s licuit uidere, nulla ea est. Neq; is quē nos habemus, longissime antiquitatis latinus Dioscorides id habet. Quodq; plūris facere nos decet, q̄ absurdū uidet, post utriusq; Isatidis decreta, hunc ipsum scriptorē, quæ a se facta fuerant dānare, legētesq; his uerbis monere, Cæteri scire oportet, falsas esse descriptiones has. &c. Cum liceret quæ male incepta a se fuissent, anteq̄ ederent, in melius, & quod uerū esset mutare. Accreuit ea pars scriptori huius ab aliquo, qui aut certius de Isatide omnia nouisset, aut nouisse se crederet. Multa huius scriptori hac rōne adscripta a medicis, a librarijs deinde illi cōmixta, & inserta mala insitione, in unū corpus coaluerunt. Quæ nisi diligentius & cautius excutiantur, & purgent, multis locis, usum eius & grauā dehonestabunt. Est illud etiam hoc loco repetendū, quod non multo antea in Arabide dictum a nobis est, abundare, scilicet hoc loco, quod Isatidem statim sequitur, Arabidis caput. De ea enī quæcūq; ea sit, q̄d oportebat, dictū hoc ipso uolumine fuit.

¶ De Telephio.

C A P. CCVII.

Telephium aliqui syluestre Semperuiuum, alij Portulacam syluestrem appellāt, Romani Illecebram, Aegyptij Anoth, Aphri

ἐλεψιον
αἰγῶν ἄγριον
ἡνιπράχην ἄγριον

Tirtopurin. Hærbæ Portulacæ similis & caule & folijs, habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhaerentes: a quibus rami seni septenarius fruticant, a radice referti cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosiss. Flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maxime inter vires. Tempore uerno folia senis horis illita, albam utiliginem sanant. Sed postea hordea cæa farina illini debet. Perunciam etiam in sole utiliginem tollunt. Sed ubi inaruerunt, absterguntur.

Telephion uagum et cōmune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq; ab radice ramos ei tribuit, Plinius etiam octonos. Differre hanc merito existimant ab alia quam diximus hoc libro Telephion, & Andrachnen agriam uocari: quandoquidem tam Dioscorides q̃ Plinius medicinas earum, atq; notas seorsum utriusq; reddunt, ceu duorum generum. Telephion hic descriptam, sunt qui eam putent esse, quam Romanæ officinæ Pulmonariam uocāt, Vegetius in Mulomedicina Pulmonariam, siue Pulmonatiam appellat: quam & Confliginē dici tradit, bubulcis & mulomedicis, hoc est, ueterinarijs præclare cognitam.

The. li. 9. ca. 19

Pli. li. 27. ca. 13.

Telephion. 17. uolumine capite ultimo breuius certiusq; scriptore hoc Plinius descripsit. Nihil tamen non acceptū ab eo est. Quo fit, ut suspicemur uisū aliquod in historia Diosc. esse. Sunt em̃ pleraq; parum certa, nec sequaci uerborū serie tractata. Nos tū nihil mutauimus: monemusq; tū, p̃ter sex horas, q̃ tēporis spacio hic iubet leucem Telephij folijs illini, addere Pliniū ternis mensibus id faciendum esse: quod in scriptore hoc desyderari posse uidentur. Manifestam tamen causam id non habet, longiusq; id tempus merito alicui pro rei necessitate uideatur.

EX M. VERG. COM M.

¶ Finis LIB. Secundi.

PEDACII

B

DIOSCORIDIS

De Medicinali materia. LIB. Tertius.

IO. RVELLIO interprete.



SUPERIORIBVS charissime Ari cōmentarijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis, arboribus, & prodeuntibus ex eis fructibus & lachrymis. Item de animalibus, frumentis, oleribus, & hærbis acrimonia præditis. In hoc autem Tertio de radicibus, succis, seminibus, hærbis quæ & uernacula consuetudine usurpantur, quæq; pluribus scatent remedijs, differemus.

¶ De Agarico. CAP. I.

Agaricum radix fertur Laserpitio similis, sed facie summa solutior & fungosa tota. Duo eius genera. Fœmina rectis uenarum discursibus constat. Mas rotundus est, & undiq; compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ in Aqu

in galia. vide de arboribz. conf.
 folia prouenit. Sunt qui radicem esse Plantæ affirmant. Alij ut fungos
 nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia
 Asiae contermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmum. Ad
 stringendi, calfaciendiq; naturam habet. Contra tormina, & cruditates,
 rupta, præcipitationesq; efficax. Datur duobus obolis in uino mulso,
 febriū non sentientibus. Febriculosis uero in aqua mulsa. Arquat
 quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; uitio laborantibus, dysentericis.
 Item si urina ægre reddatur, si uulua strangulatus urgeat, si pallor mem
 bra decoloret, drachma una dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien
 negocium exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, ita ut cibi
 tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur. Simi
 li modo acide ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tri
 bus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum do
 lores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur.
 Menses ciet, Fœminis, quas inflatio uulua uexat, utiliter æquali modo
 datur. Rigores soluit, datum ante februm significationes. Aluum pur
 gat drachma una, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venenorum an
 tidotum est, drachmæ instar, cum diluta portione sumptum. Si serpentes
 ictū uibrarūt, morsumq; subfixerūt, tribus obolis ex uino potum, mire
 auxiliatur. In sumā, internis omnibus uitij conuenit, p uiribus et ætate
 datū nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiē. Patriarchæ Cor
 ollariorum LIB. Tertius.



Pli. lib. 25, ca. 9

AGARICV Min arboribus nascitur, fungi similitudine circa Bosphorū, co
 lore candido. Masculus amarior. Galliarum quoq; glandifera maximæ arbores
 Agaricum ferunt. Est autem (ut dixi) fungus odoratus, in sumis arboribus nascens, noctibus
 relucens, & candidus. Ideoq; in tenebris decerpitur. Dioscorides Agaricum ueneri uim habe
 re, sed id quod nigrum est affirmat; & regione Sarmatarum, quæ *Ἰνδία*, hoc est, syluestris dicitur
 nasci. Quidam codices non Agriam, sed Agariam habent. Vtrumq; tueri possumus. Primum
 ex Plinio, Regio inquit Sarmatiæ syluestris Hyleum mare, quo alluitur, cognominauit. Alterū
 ex Ptolomæo, qui Agarum & urbem, & amnem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexan
 drinus, Agaros scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert, propter
 quod Mithridates eos apud se habuerit.

De Rhapontico. C. A P. II.

RHa aliqui Rheum, aliqui Rhiā, Latini Rhaponticum uocant.
 Prouenit in ijs quæ supra Bosphorū sunt regionibus, ex quib
 bus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & ruf
 fior, fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum habetur quod te
 redines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, mandu
 catumq; colorem reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id epotū facit
 ad inflatiōes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolorū, ad conuul
 sa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū, uesicæ, & pectoris uitia, aduers
 sus intenta præcordia, & uulua mala, coxendicum dolores, sanguinis

excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualetudinibus eodem quo Agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabe experient, ex psso: si lienis excrescat, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omneis ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

BARBARI COROLL.

Rhaponticum, radicem Ponticam a Cornelio uocari censeo, a Galeno & Paulo Rheon, a Plinio Rhacom, nisi deprauatus (quod fere suspicor) locus sit, uulgo Rheu. Aetius Rhaon. Plinius Costo nigro simile demonstrat, in cetera cum Dioscoride conueniens. Habetur & Rha Barbarum, multo praestantius, efficaciusque Pontico, sed ante Paulum Aeginetam fere medicis incognitum. Eius mentionem auctoris, in compositione quadam ad podagras habuit.

EX M. VERG. COMM.

Qui supra Pontum & Cymerium Bosphorum ad Panticapeum regionis eius metropolim uicinus Tanai, in Meotidem paludem influit, maioris illius fluminis luce & nomine, non satis in Geographia clarus quondam Rha dictus fluminis, Ponticae radici huic nomen dedit, & in ripis suis nascentem, ueluti adoptione quadam in sui nominis honorem admisit. Nec alia nominis eius, quam a natali solo causa & ratio est, ab Ammiano Marcellino historiae suae. uolumine his uerbis tradita. Tanais, qui inter Caucasos oriens rupes, per sinuosos labitur circumflexus, Asiamque ab Europa determinans, in stagnis Meoticis delitescit. Huic Rha uicinus est amnis. In cuius supercilijs uegetabilis quaedam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. Quod nouisse non parum hijs fuerit, qui sollicitis animis diutius fuerunt, & adhuc sunt, Ponticae ne huic radici eadem, an alia sit quam nostra aetas in quotidiano medicinae usu Barbaram appellat, facti enim dimidium, ut poeta cecinit, qui modo caput habet. Auditis siquidem Ponticae huius radicis natalibus, non difficile erit, diligenter per mercatores qui ad nos Barbaram illam afferunt, a uenditoribus facta percontatione, nouisse, an quae nunc Barbara dicitur, Ponticae eadem sit: et an his quibus locis nasci eam Marcellinus ait, an alibi nascatur. Nobis pro comperto habemus nihil est, & si diligentiores in quaerenda rota hac re fuerimus. Si enim quae nunc ad nos Barbara afferitur, aliud quam Rha fluminis supra Pontum & Cymerium Bosphorum ripas natale solum habebit, radices duas eodem nomine, sed diuerso patriae & gentis cognomine tunc esse constituendum erit. Sin contra, ex quibus Arrianus Marcellinus locis tradidit ad nos afferri, unum tantum radicis huius faciendum erit genus, & in eo ex diuersis notis, non eadem bonitas. In quam partem inclinat animus nobis. Quod autem maxime inter se differunt, odor est: qui in Barbara uehementissimus, in Pontica nullus, si huic scriptori credendum est, sentitur. Nos certe scimus, sine odore uisam aliquando radicem quae Barbara uideretur, & crederetur, non tamen esset, ideoque a medicis in usu damnatam. Quocumque autem modo id fiat, non uidetur hic scriptor, siue alia penitus, siue bonitate a Pontica diuersa sit, Barbaram cognouisse. Nunquam enim *ἄνυσμον*, id est, sine odore eam dixisset. Ceterae in hoc & in alijs scriptoribus Ponticae radicis appellationes, ex eodem principio, primaeque illa Rha fluminis appellatione fluxerunt, ideoque a nobis & alijs relinquenda. Relinquenda & quam Plinius dixit Rhecomam, sine ratione aliqua, nunc in eo scriptore & incognitam penitus.

De Gentiana. CAP. III.

Gentianam aliqui Centauriam radicem, alij Aloen Gallicam, alij Narcem, alij Chironion, Dardani Aloitin, Romani Gentianam, uel Cicendiam, alij Ciminalē uocant. Huius inuentio prima assignat Gentidi Illyriorum regi, a quo cognomen habuit. Folijs proxime radicem, Iugladi, Plantaginisue similibus, subrubris, a medio caule, praefertim iuxta cacumē paulum dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni

Culato, & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cubitorū. Seminē in calycibus lato, leui, paleaceo, satis ad Sphōdiliū semē accedente. Radice longæ Aristolochiæ, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montibus iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radici excafactoria, & adstringens. Contra morsus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & uino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis prodest. Hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eijcit. Imposita ut lycium, uulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentiū medela. Succus præcipue eodem effectū prodest. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyrijs acris imiscetur. Radix uirginitatem absterget. Succus extrahēdi ratio hæc est. Conrussa radix quinque diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrixit aqua, lintheo excolatur, Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Ficulisq; reconditur.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 25. ca. 7.

Gentianam ubiq; nasci, sed copiosissimam sub Alpinis montibus in Illyrio, præstantissimam affirmant, folio fraxini, magnitudine lactuæ, caule tenero, trium aliquando cubitorum, radice lenta, subnigra, sine odore, aquosa.

E X M. V E R G. C O M M.

DNota omnis nunc etiam Gentiana est. Eam Centaurio similem Centauriam radicem aliqui nominauerunt, & ex eo Narcem: quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloem Gallicam, nulla foliorum, sed radici similitudine aliqua, quam utriq; genus recta sub terram agit. Chironia a centauro Chirone dicta idem est, quoniam et Centaurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credimus præterea, quoniam Aloe diceretur Gentiana, a Dardanis Aloem pariter nominatam fuisse. Suspiciamus tandem in extremo capite uisum esse, illic scilicet ubi de radice coctura agit, quam coqui hic iubet usq; dum radix illa superftet & emergat. Qui sensus rei non satis responderet. Neq; enim ponderosæ radices, quanta uoluerit aliquis coctura donec per se emergent. Poruit quidem sic intellexisse, tamdiu coquendam Gentianæ radicem, donec decrescente paulatim aqua desinat radix sub ea esse, eaq; ratione superftet. Verum hic nunc cocturæ alicuius spacium sic docuit. Præterea antiquissimi latini omnes pro eo habent, donec uirtutem ex se dimiserit: manifesto argumento, aliam fuisse quondam eius loci lectionem. Potest tamen ut diximus, defendi res: ideoq; nos cōmunem aliorum omnium lectionem secuti sumus, & nihilominus quod obseruatum etiam à nobis fuerat, alijs significauimus. Non sunt etiam de Gentianæ natalibus Barbaro, & nobis eadem omnia. Ille in altissimis montium crepidinibus nasci eam, nos in altissimis montium uerticibus diximus. Dioscorides in *ὑψηλοτάτοις ἀκρωτηρίοις* ait: quæ uoces nihil aliud q̃ altissimos uertices significāt. Siqui de montes omnes a grecis trifariam diuiduntur: *ὑψίμας*, quod imas partes & radices significat, *ὑψιπέρας*, idest, montium cacumina, & *ὑψιπύκναις*, qua uoce descendencia iam montium latera indicantur. Atq; hic *ἀκρωτηρίοις*, & addidit *ὑψηλοτάτοις*, idest, uerticibus altissimis. Cur autē ille crepidines uerterit, quæ fundamenta maioris alicuius molis sunt, non satis uideo.

ἀριστολοχία
ραγγύλη

De Aristolochia rotunda. CAP. IIII.

ARISTOLOCHIA rotunda nomen ex eo sibi adoptauit, q̃ existimetur optime puerperis opitulari. Tria eius gēna tradūtur. Vna quæ scemina uocatur, folijs hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, flore cādido tanq; pileolo, rubro, grauiter olente.

BARBARI COROLL.

Aristolochiæ color ater, folium Alfinæ, ut Theophrastus inquit, rotundius. Nascitur in montibus præcipua. Genus quadruplex in ea latini seruant. Vñ Rotundæ, quam & Pheuxiæteron uocabant aliqui, folijs inter maluam & hederam nigrioribus, pinguionibusq; : qua cõfusa cum calce, in mari sparsa, pisces aduolant cupiditate mira, ut ait Plinius, uidisse id restatus, continuoq; exanimati fluitant: ob id piscatores, ingt, Campaniæ uocabant hanc Venenum terræ. Nunc & Cyclamini radice id contingit in eadem terra: ut putant. Alterum masculæ, atq; Longæ. Tertiū radice longissima, quasi uidum nouellarum, efficacissima: quæ & Credica nominatur, florē purpureo, colore buxæ, bacculas ferens ut Capparis: quæ tamē tria in omnibus quoq; inueniuntur generibus. Est & quarta Pistolochiæ nomine, tenuior q̃ tertia, densis radicis capillamatis, lunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrhizon cognominant, & Satyri- on esse dicunt, ut in eius mentione docui. Odor omniū medicatus, sed Clematidis, hoc est, tertiæ iocundior. Nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas mēsisbus tempestiuū est. Maxime tamen laudat Pontica, & in quocunq; genere ponderosissima, quæq; medicis aptissima. Nascuntur fere pinguibus locis & plano, ut quidam scripsere.

De Aristolochia longa.

CAP. V.

Aristolochia longa, mascula appellatur, nonnullis Dactylitis, alijs Melocarpus, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, longiorē q̃ rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flore purpureo, graui ter olente, qui marcescens in Pyri similitudinem cõformatur. Tuberbis radicū rotundis, ut Rapum. Longæ uero radix digiti crassitudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnunq; paulo grandius adolefcit. Ambæ colōre intus buxæ, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ Clematidis uocatur, ramulos habens tenues, res fertos folijs subrotundis, minori Semperuiuo similibus, flores Rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis resistit. Longa uero aduersus angues & uenenā, drachmæ pondere ex uino bibitur & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, et omnia uuluarum onera ejcit. Eadem efficit subdita in pesto. Rotunda ad eadem pollet. Insuper singulibus, suspirijs, rigoribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula exurit. Ossium squammas illitu adimit. Ulcera putrida exest, & sordida expurgat. Caua cum iri & melle explet. Gingiuas & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur. Viribus tamen inferior est. Appellatur a quibusdam Ararisa, & Melecaprum, Ephestios, Lestitis, Pyxionix, Dardanion, Iontitis, Gallis Theximō, Aegyptijs Sophōeph, Siculis, Chamæmelon, Italis Malū terræ, Dacis Absinthiū rusticum. Nascitur in montibus & calidis locis, aut campestribus et petrosis. Ad grauem febrim efficax est. Si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuatur, Vulnera impositu sanat. Carcinoma- tis narium, cum cypiro & dracunculi semine, & melle prodest. Rigoris bus medetur, cocta in oleo, aut adipe sutillo, illitaq;.

BARBARI COROLL.

De hac qualis esset proxime indicatum nobis est. De Tertiā, in primo Aristolochiæ genere

A

Pl. li. 26. cā. 7.
lib. 25. cap. 2.αριστολολοχία
μάνρα
διστροχίτις
μυδοναπτος

B

γλυκύριζα

Glycyrrhizam aliqui Ponticam, alij Glyceraton, quidam Symphyton, alij Leonticam, alij Glycyphyton, aliqui Seythion, alij Adipson, alij Sylithrā, alij Lybieftafon, alij Omœnomœon, alij Penchaomœon, Latini dulcem Radicem appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus, folijs Lenifci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, rufas & paruas, radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum Lytj exemplo. Is in arteriæ scabricia efficax habetur. Verum oportet ut linguæ subditus eliquefcat. Aestuantî stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat uesciæ scabiem & renum dolores cum passô potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accômodatur. Cômmanducatus, stomacho prodest. Recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 22. ca. 9.

Glycyrrhiza, siue ut Palladius, Glycyridia. Sunt qui hanc & Eryngem eadem esse falso putent, quoniam spinosa, & foliata uideretur. Fruticosa est, præstantissima in Cilicia, deinde Ponto. Adipson uocatur: quia sitim, famemq; sedet. Carpitur Vergiliarum ocaseu: quæ longa est ceu uitis, colore buxeo, Melior nigra, quæq; lenta, q̃ quæ fragilis.

E X M. V E R G. C O M M.

DSolo nomine in fingendis componēdisq; uocibus suis Romanis feliciores Græci, amabilem omnibus Glycyrrhizam fecerūt. Nec aliter q̃ in comœdia Glycerium, & in Venusinis carminibus Glyceram grato dulcedinis sensu in amorum leporibus poetæ illi illustrarunt: sic Ponticā, siue ut Theophrastus appellauit Scythicā radicem hanc, grata naturæ eiusdem dulcedinis nota, sola appellatione gens illa cômendauit. Nec tantum ut amarent eam omnes effecit, sed in Scythia & Ponto sub septemtrionibus nascentem, propriam sibi, noui, & a se facti nominis alius adoptione fecisse conarentur: laborarentq; libenter pro ea omnes, quæ in sanitate & ualitudine tam suauis posset homini rependere gratias. Quod nos modo agimus, præsentî quotidie ab ea fructu & spe in tussi, & exasperatis faucibus: quo malo, frigidityte, tenuitateq; nostrî aeris sæpenumero tentamur. Eam Theophrastus nono de plantarum historia, uolumine nondum facto illi a græcis, aut saltem non recepto ab omnibus, Glycyrrhize nomine Scythicā radicem uocauit. Estq; hoc quod Dioscorides ait, Scythicā ab aliquibus dici: & si passim in græcis non Scythicā, sed scythion corrupte legatur. Verba eius sunt. γλυκύριζα δὲ καὶ ἡ σκυθική. ἡ δὲ ἰουδαϊκή αὐτὴν καλοῦσιν. γίνεται δὲ περὶ τὴν μεσότην. Quod est. Dulcis & Scythica radix, quā aliqui Euthyglyciam uocant. Nascitur circa Mæotim paludem. Idem eodem loco causam reddidit, cur Adipfos etiā diceretur, non iam quia sitim simpliciter arceat, q̃ quia Scythæ ea, & Hippace, de qua diximus superiore uolumine, decem, & aliquando duodecim diebus sine alio cibo purarent. Verba eius sunt. λέγεται δὲ καὶ τὴν διψάν παύει ἰάντις ἐν τῷ σμάτι ἔχει. διὰ ταῦτα τε καὶ τὴν ἰππικὰν διαγίγνεται τοῦτο σκύθος ἡμῶν καὶ ἡλικα καὶ ἡ δωδικα. Quorum sit sensus qui pauloante dictus a nobis est. Eadem ratio fuit, cur Pontica itidem diceretur: cur aut Symphytō, uisum similitudo fecit. Est enim, ut in quarto nolumine certius patebit, Symphyti radix dulci & saluam prouocante sapore. Pectoris & illud uitia emendat: faucium asperitati confert: postremoq; sitim cômmanducarum arceat: quæ omnia dulcis Radicis propria sunt. Credimusq; nos, ἡ τὴν ἀπὸ βαλλομένων, idest, ex æqualibus, & eorum comparatione ad dulcem Radicem alterius plantæ translatum nomen fuisse. Dico autem æqualia, quæ nostræ ætatis medici, quid pro quo, appellant. Numerantur & aliæ ab hoc scriptore appellationes. Glyceraton, & Glycyphyton: a dulcedine factæ omnes, sola nominum conformatio diuersæ: quarum altera dulcem plantam, altera quod dulcedine sua amabile sit, significat. Celsus quod hic ipse testatur libro quinto

capite. 10. dulcem radicem simpliciter uocauit: quæ nos imitari, dulcē Radicem, & si græca uoce Plinius usus fuerit, Glycyrrhizā diximus. In cæteris appellationibus non est quod legentes moneamus, barbaræ em̄ sunt, aut adeo corruptæ, ut a barbaris nō differant.

¶ De Centaurio magno. CAP. VII.

Centaurium magnum aliqui Narcen uocant, alij Limnæstion, alij Maronem, alij Plectroniam, alij Chironiam, alij Limnæstin. Magi Herculis sanguinem, Romani Fel terræ. Folia habet iuglandis, oblonga, uiridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu Papauerum, in rotunditate oblonga, flos cæruleus, semen Cnico simile, floccis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubeſcens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneſo, in Arcadia, Helide & Meſſenia, pluribusq; locis circa Pholoën, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, ueteri tussi. Sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur: si febris sit, in aqua, cæteris in uino. Item ad tormina & uulua dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulua subdita, menses atq; partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget uitia, quæ inflammationem minantur, plurimisque scateat remedijs. Pulfationes uulnerum, urinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complentur.

BARBARI COROLL.

Centaurion maius, caules habet geniculatōs, folia lata & oblonga, & ab radice densa, radix tenera, fragilisq; Durat annis nec ultra duodecim. Cōmendatissima in ijs quartis Dioscorides meminit regionibus, præterq; in Alpibus. Dicitur & Centaurea, & Chironion, quia curatus ea Chiron sit, cum Herculis pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Nostri herbarij aliud Centauriū maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, auresa parte candicantibus, interna uirentibus, Salice maioribus, & connexis fere.

Pli. li. 25. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Quæ Centauriū a biformi quam fabulati poetæ sunt natura eius dicta fuerit, Chironia a nomine, Pelethronia a Thessalia monte, in quo Lapidæ quondam equitadi perita gens, fræna & giros, ut poetæ cecinit, alios docuerunt: inter quos & Chiron censebatur. Eandem hic Maroniam uocari ait, non amplius ex Thessalia, sed ex Thracia, in qua Maronius mons & Maronia ciuitas Homero notissima erat: quo loco copiosum forte, aut probatū nascitur Centauriū. Limnæstion itidē a natalibus suis Centauriū aliqui uo cauerunt, q; secundū paludes, quas Græci limnas dicunt, & aquarū scarebras nascit: quod & Plinius testatur. Libadion eadē aquarum significatione uocari dicens. Quæ deinde Romanæ uoces Centaurio in Dioscoride accreuerunt, Vnæſera, & Phieri, nullam nobis significationem habent. Et quod Fel terræ in maiore hoc Centaurio legitur, ex minore adiectum contrariio sensu est. Siquidem ab hoc ipso maioris, radix dulci sapore describitur, minoris amaro. Præter quædā sensus & experientia eadem ostendit. Alterius enim dulcior, alterius amarior in gustu sapor sentitur. Quo fit, ut Fel,

C quod amaro sapore est, minori, nō maiori cōueniāt. Aperter id Plinius etiā lib. 35. ca. 6. restatur, de minore agens his uerbis. Hoc Centaurion nostri Fel terræ uocāt, propter amaritudinē sum mā. Ex eo facile fuit, ex maiore in minus appellationē eam transferre. Et hæc pro Centaurij appellationibus dicta hæctenus sint, in quo ueluti inutilia, nec huic scriptori legitima reliquimus, quæ in extremo capite in impressis, alijsq; quibusdā græcis codicibus legūtur ab eo loco, solicer qui in græcis est, *ἰσχυρὸν δὲ πικρὸν*, &c. In nouissimis aut latinis, cognominata est & Panacia. &c. Fecimusq; id uetustissimorū græcorum & latinorū fidem secuti, in quibus tota ea pars nulla est. Et si in Plinianis castigationibus hac sola auctoritate nixus, qd in Plinio legebat, mēderetur & ouis morbis decoctæ succus, non ouis, sed omniū scribi oportere Barbarus decreuerit: propterea, q; Panaciā dici etiā Centauriū in Dioscoridis hac parte legisset, quæ uox omniū morborū remedia pollicetur. Verū id nos non pbamus, & nihilominus unicuiq; suū seruatur iudiciū. Persuasitq; id p̄cipue, qd ultimū in ea parte ad superstitionē solam p̄tinet, legendū esse, Centauriū apperente ortu solis, casto tēpore, quo oīa pleniora & p̄fectiora sunt, quæ ætate huius scriptoris insueta, et naturā docente homine indigna erant. Scimus qdē Theophrastū lib. 9. de plantarū historia, multas huiuscemodi obseruationes p̄currere: & in sodiēda Centaurij ra dice nescio qd de Triorche accipere dicere, quē tunc cauere oporteat. Sed nihil qd ad solem & tēporis obseruationē pertineat, in eo legitur: & nihilominus cuncta ab eo ex uulgi opinione re feruntur: & quatenus tutū sapienti erat, contra plebis superstitiones conari, ab eo damnatur. Cautius enī eo loco Theophrastus, ne uideretur religioni obfrepere, ait. *τὸ δ' ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς μύτης ἐκ τῆς ἀκροῦς*, quod est, præcedente autē precatione aliqua, radices fodere nihil absurdum. &c. Verum nos latinorum omniū, & meliorum græcorū, in quibus nihil huiuscemodi legitur, fidem secuti, omne eam partem expunximus: & nihilominus poterunt uolentes ab alijs eam si placuerit repetere. Diximus deinde, nasci Centaurium, & amare stirpibus & arboribus consecrata loca, *ἀρμυῖς* sic appellantes, non sepes, sed arboribus fruticibusq; densos montes. Licet enī a quercu, quæ *ἄρμος* græce dicitur, nihilominus in cōmuni significationis æstimatione, syluolus stirpe omnis locus ea uoce indicatur.

D **De Centaurio minore.** **C A P. VIII.**
κενταύριον μιν
κρόν
Centaurium minus aliqui Limnession, alijs Elleboriten, alijs Amma-
 ranton, Magi Herculis sanguinem, Latini Febrifugam, alijs Au-
 ram, multi Radicem, Daci Tulbellam appellant. Limnession aliqui uoca-
 uere, quoniam rigua amet loca. Hærbæ Origani, aut Hyperici similis,
 caule anguloso, palmum excedente, flore Lychnidis, e puniceo in pur-
 puram uergente, folijs Rutæ prælongis & paruis, fructu tritico simili, ra-
 dice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustati amaritudinem adfert. Hærbæ
 recens tusa, suo illitu uulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & ci-
 catrice obducit. Bilem, crassosq; humores per aluum exigit, si decocta de-
 uoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissime infunditur. Trahit enī
 sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perq; ul-
 lis. Siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat. In uellere ap-
 positus, menses & partus extrahit. Epotus peculiariter neruorum ui-
 tijs succurrit. Legitur semine prægnans, & diebus quinque madefacta,
 decoquitur donec superemineat aquæ. Mox ubi refrixit, lintheolo ex-
 primitur. Et eiecta hærbæ, iterum decoquitur, usquedum mellis cras-
 situdinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; contundunt,
 atq; succum fictili non picato exprimunt, & in sole lignea rude assidue
 mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus uasis adhære-
 scat, detrahunt, reliquoq; humori permiscunt. Noctu diligenter operiūt.
 Namq; ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quæ autem sicca ra

dicibus, aut hærbis liquamenta exprimuntur, decocta ut in Gentianæ A
mentionē retulimus, præparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut
contulis hærbis faciuntur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. Sic e Ta
psia, sic e Mādragora, reliquisq; similibus succus, sic ex acerbis uuis Mel
ligo elicitur. Lycium tamen, & Absinthium, Hypocistis & consimilia,
decocta eo quo diximus modo coguntur.

B A R B A R I C O R O L L.

CEntaurion minus, a foliorum tenuitate Lepton cognominatū, sicut Libadion, quoniam
secundum fontes nascitur. Ipsa herba legitur autumno. Succus e fronde, aut caulibus conci
sis madefactisq; 19. diebus capitur. Hoc Centaurium nostri Fel terræ uocant, propter amari
tudinē summā, Galli Exacon, quoniam omnia mala medicamenta potum exigat per aluū.
Est & Centauris appellata, cognomine Triorches. Hæc qui eruit, iubentur accipiem caue
re, dictum a numero testium Triorchem: quoniam ut Theophrastus inquit, raro non uulnera
tur ab alite, qui colligit. Tradunt & per se infestam esse carpentibus, raro unq; non ferientibus
se, dum secāt. Hæc succum sanguineū mittit. Imperiti miscent has notas, & uni generi assignāt.
Nam quod Ceutaution Panaces uocat, alterius est naturæ, ut in Panace mōstrabimus, Huius
radix minoris, penitus inutilis medicinæ est, ut Galenus quoq; scribit.

Theophra.
lib. 9. cap. 9.

E X M. V E R G. C O M M.

Cv Elleboritem ab aliquibus uocari Cētauriū minus in hoc scriptore legatur, difficilem
habet coniecturā. Nihil enim inter eas tam simile est, ut misceri & cōmunicari diuersarum plan
tarū nomina potuerint. Incertum itidem, quæ Amaranthi nominis in eo causa sit, & ob quas
uires Romani Febrifugiam dixerint, & Multiradicem herbam. Cum Amaranthus spica poti
us q̃ flos sit purpurei coloris, quia nuncq; marcescit, sic appellatus. Nisi forte ex colore floris
tantū captata similitudine sic uocari ab aliquibus cœperit: unaq; tantū radice nitatur Centau
rium, & nullis febribus mederi hic dixerit. Quales itaq; in scriptore hoc a nobis inuentæ sunt,
tales etiam post nos alijs relinquuntur.

B

De Chamæleone albo.

CAP. IX.

CHamæleo albus quibusdam Chrysisceptron, alijs Ixia, Roma
nis Carduus marinus, Aegyptijs Ephear dicit, alijs Ephthos
chin. Ixiā ideo aliqui uocauere, q̃ quibusdam in locis uiscum circa ra
dicem inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet Syli
bo, aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; Chamæleone ualidi
ora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echini marini, aut Cin
naræ modo erigit. Flores purpureos ueluti papporum lanugines emit
tit. Semen Cnici simile. Radicem in lætis collibus crassam, in montosis ue
ro graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odo
re, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas interaneorū tineas pellit.
Bibitur autem in uino austero cum Origani feruesfacti succo. Hydropi
cis commodissime drachma in uino datur. Etenim eos extenuat. Contra
difficultatem urinq; decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentū ue
nenis resistit. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polen
ta aurt aqua, & oleo madefacta.

χαμδιδιός ,
λευκός

B A R B A R I C O R O L L.

CHamæleontē album, a Theophrasto Ixinē uocari Theodorus existimauit, quia Carduū
pincam interpretari uoluit: quæ nihil aliud est, ut Dioscoridi placet, q̃ albus Chamæleon. Plin.

Pli. li. 21. ca. 18.
& 21. ca. 16.

Cus in Theophrasto non Ixinem, sed Helxinem uidetur legisse. Fere suspicor utrūq; falli, Theodorū, & Plinium: Theodorū, quia Chamæleonē album Ixiam quoq; dici nouerat. Sed aliud est Ixine, aliud Ixia Theophrasto noni uoluminis intio, ubi non omnibus locis. sed in Creta la chrymā ab Ixia, hoc est (ut arbitror) Chamæleonē albo fundi scribit. Pliniū quoq; decipi existimo, affinitate uocis, Helxinē, pro Ixine capientē, librarijs alterū pro altero scribentibus: qui modo parū diligentes, modo nimis sciolī, peruertunt oīa. Tres igit herbz sunt, Helxine, Ixine, Ixia, Ixia Chamæleon albus est Hippocrati, & Galeno. De Helxine suo locō ageſ, ubi de Ixina quoq; differendū nobis erit. Chamæleonē album Ixion quoq; dici uideo, quia uiſcū gignit album, nō ubiq; sed sub alīs foliorū, maxime circa Canis ortū, cum Tura nasci dicūtur. Succus radicis decoctus mures cōtrahit & necat, nisi protinus aquā sorbeant. Volētibz scire, uicturus sit æger, nec ne: precipiūt radicis diluto p̄fundi triduo quī langueat: moriturū negantes, qui ter tias uices pferat. Theophrastus auctor. Nascit̄ æque oibus locis, capite magno, & Acano herba simili: unde quidā inquit, eam uocauerē Acanon, qđ quidē & Ixine appellata cōtinet.

E X M. V E R G. C O M M.

IN Lacertarū genere Aegyptus, Africa, & India Chamæleones passim, & quotidie uidet, mater herbarū Italia, regionesq; aliæ oibus fere locis: tā undiq; spinis & aculeis fertiles agros,annonamq; suā natura omnibus miscet & turbat. Descripsit animal Pliniū longissime octauū uoluminis capite. 21. facileq; est legentibus nouisse, unde factō a leone ferociore, grandiq; bestia nomine, paulominus q̄ integram Lacertā, & minori Crocodilo simile animal, humilem, & ueluti per terrā serpētem Leonē Græci uocauerint. Descripsit idem herbā eiusdem operis uolumine. 22. capite. 19. possuntq; legentes in eo itidē cognoscere, unde ab animalū genere in herbarū censum humi repens leo ille transierit. Quod non totius, aut partium, diuersorū in natura generū figura & spēs fecit, sed idem mutationis euentus. Vt enī animal mutabili coloris natura est, mutatq; eum subinde, & oculis, & cauda, & toto corpore: redditq; semper quēcūq; proxime attingit, pręter rubrum & candidū (& si discrepent in hoc antiqui scriptores, excipiantq; alii qui candidū tantū) eodē modo & herba cū terra colores mutat: hic nigra, illic uiridis: alibi cyanea, alibi crocea, atq; alijs coloribus. Nec alia noīs huius in herba, q̄ a coloris mutatione, quā simile cōmunemq; cū eo animali habet ratio, in græca appellatione est. Alioquin in censu Carduorū uterq; Chamæleon est, candidus, scilicet & niger. Dico aut Carduos nunc, spinosum omne illud genus, qđ siue altius a terra erigat, siue humilius serpat: siue his, aut illis, hac uel parte, aut illa aculeatū sit, spinosum florē aliq̄ profert, in quo lanis & pappis femina inuoluunt. Neq; erit difficile, diligenter pingua, inculta loca, præsertimq; rudera mensibus Maio & Iunio obseruātibz, utrūq; hoc genus, & eorū discrimina obserualle: præcipueq; ex floribus, qui ex latiore ueluti pyxide in altero purpurei prodeunt, in altero quo mox colore describentur. Fuerunt qui hunc Pineuam Carduum huic scriptori additum legerent.

C De Chamæleone nigro. CAP. X.
Hamæleo niger, quem Pancarpon aliqui, alijs Vlophonon, alijs Ixiam, alijs Cynomazon, alijs Ocimoïdes, alijs Cnidion coccon, alijs Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum, aut Vernilaginem, Aegyptij Sobel uocant, folijs Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta uiderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacynthi æmulos, uersicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem cum sibi sulphur & bitumen ascituit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cæra oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa & in aceto decocta dentes fouentur. Eos quoq; frangit, si scriptorio stylo seruens ad

χρυσιδίων
μίλων

moueatur. Vitia cutis in facie, uiliginesq; cum sulphure emendat. Et rodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetracq; ulcera illi tu sanat. Quare Chamæleo uocetur, a uarietate foliorum euenit. Mutant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicania, aliubi cærulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Chamæleon niger, spinoli generis, uerū folijs aculeatis non constat. Gelidis & inertibus locis prouenit. Ex nigris, aliqui mare dixere, cui flos esset purpureus: fœminā, cui uolaceus. Vno nascitur caule, cubitali. Vlophyton uocatur, quoniam anginae modo iuuēcas necet, & ab odoris grauitate Cynozolon. Ferunt & nigri uiscū: sed qd pro Mastiche non sit, ut ex albo;

E X M. V E R G. C O M M.

Communis utriq; Chamæleoni lxiæ uox & appellatio est, falso tamē, & sine causa: quoniam albo tantū adnascitur uiscum, unde ea facta est, illiusq; propria, cæteras nigro relinquit. Quorum Plinius duas numerauit: Vlophonon, q; nicos canum necat: iuuenas quoq; Anginae modo perimit. *ὄφιον*. enita, & *φόνος* græcis exitum significat. Cynozolon item, propter grauitatem odoris: quoniam *κύνος* olere h̄dem græcis est. Nos illud addidimus, ideo Cynoma non dici, q; in pulte necadis canibus datur, quam Græci *μάστιγ* dicunt. In cæteris non est quod legētes moneamus, præterquā, non uideri integrum, quod redditum est, Librario stilo eadem denti, in quo dolor est. &c. Neq; enim rationem nobis aliquam, cur sic fieri debeat, id ostendit. Cogitq; id suspicari antiquissimus latinus Dioscorides, in quo nihil est, quod ad Librariū um stilum pertineat: sed in carbonibus combustam radicem Chamæleonis, dentibusq; admodum, eos frangere indicat. Communem tamen omnium Græcorum, & aliorum interpretum lectionem, secuti & nos sumus.

De Crocodilio.

C A P. XI.

B

Crocodilion Chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore ut Nasturcij acuto. Feruēfacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nares pellet. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scutum. Quod suapte ui urinam ciet.

B A R B A R I C O R O L L.

Crocodilion radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Actius hanc fortasse intelligit, cum radicem Crocodiliadis eius quæ maxima est, commendat in eo capitem dolore, qui Cephalæa dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Differt ab utroq; Chamæleone Crocodilion: q; eorum alter albus scilicet, sine caule in medio inter folia spinam marino Echino similem profert: Niger non unam, uerum duas, tresue aliquando coliculis potius q; caulibus impositas ostendit. Crocodilion autē singulare mittit caulem, & in caule spinosum Echinū. Est & alia differentia: q; illi pinguib; & campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & conseritis arboribus locis. Differunt & radice: quæ in illis est, qualis ab hoc describitur: in Crocodilio longa cum latitudine aliqua, alij. q; notis illis, quæ descriptæ paulo ante sunt. Nasci Crocodilion Barbarius a Plinio acceptum in fabuletis dixit: quæ uox *τόπος ἀφανής*, quibus hic nasci eam ait, nullatenus ut credimus responderet: modo fabulæ illi significant, quod in ruris disciplina cunctis alijs significant. In medicina hoc amplius Græcorum uetēres medici tradiderunt, prodesse Crocodilij radicem pectoris excreationibus.

De Labro Veneris, seu Disfaco.

C A P. XII.

Nifano

Disfaco aliqui Crocodilion uocant, alij Chamæleontem, alij Onocandion, alij Veneris Lauacriū, Romani Labrum ueneris, alij Carduū ueneris, Aegyptij Sefeneor, alij Chir, alij Melera, Daci Sciarum. Aculeatarū generis est. Caulē habet altū, spinis horridū, folia Lactu

Cæ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorsi medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde Dipfaci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta candida spectantur, dissectaq; medullatenus, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; , si tusa & decocta in uino radix, usq; dum sit crassitudo cæræ, immitatur. Medicamentum ærea pixide recondendum. Aiunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

B A R B A R I C O R O L L.
Pli, li. 24. ca. 17. **D**ipsacos, folio cauo, in quo salsus ros. Nascitur in aquosis & flumine. Huius herbæ carduus is est, quo rudes panni, uelut echino quodā, ut inquit Plinius, uestes expoliuntur, & colluuntur. Floccis siue fimbrijs, quas Græci Crocydas appellant, detractis, complanatisue. Hic frutex Labrum Veneris, aut Venereum latine dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.
Tota Romana & antiqua uox est, Labrum Veneris, nō ab oris humani parte sic dictā, sed ab his Labris quæ Maro dixit, plena musto in uindemia spumare. Indicatq; id, q; Græci Romanam uocē imitati, ἀρρεστίνε λουτρόν eam dixerūt: quod erat in latinis Labrum, græcæ λουτρόν, ex usu balnearū transferentes. Sunt em̄ græcis λουτρόν quæ lauandis corporibus parantur; quemadmodū in balneis labra etiam Romanis. Nota res est, latet tñ causa: nec nos hæcenus inuenimus, cur Labrū Veneris spina hæc ab illis quondā dicta fuerit. Videmus quidē quot annis, ea uos in ea sinus illos, in quibus etiā ardentissimo solis æstu ex roribus, aut pluuijs aquis ad multos dies seruatur humores. Sed quomodo his Venus lauaret, aut se aliquādo lauisset ignoramus. Græci a siti Ἀλφειον eam dixerūt: uel ut hic ait, quoniā humorem illū contra eam paratū semper habet: uel quæ nobis ex natura magis causā uidetur, q; secus fontes, aquarū scatebras, aquosos limites & fossas nascit, nec alijs locis raro inuenit. Egregia est plantæ spēs, quæ supra hominis altitudinē aliquādo crescit: quodq; in ea contemplari aliquis gaudeat, bullantes toto eius corpore spinæ sunt, & uelut peluem constituētia bina illa folia, intra quæ humor semper inuenit. Cum creuit, in summo singulorū caulium singulos Echinos in oblongo rotundos profert, flore qui purpuream lanuginem refert. Oem eius spēm diu nos obseruauimus: in Echinis aut nascentes uermiculos inuenire non licuit, & nihilominus græci latiniq; , quod merito credendū sit, oēs testant. In medicina usum radix tantū habet. Nosq; quibus ea medet rimis, fistulis, formicis & uerrucis iam pridem diximus, qualia mala illa omnia in homine sunt.

ἀκναιβα λινυδι

De Spina alba. **C A P. XIII.**
Spina alba, quam Agriocinnaram, alijs Donacitin, alijs Erylisceptrum uocant, Romani Spinam albam, aut Regiam, alijs Cardum Ramparium. Nascitur in montibus & syluosis. Folia albi Chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, digiti magni aut pollicis crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum. Flores purpurei, in quibus semē ceu Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extussiunt, efficax est. Urinam cit. Tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

BARBARI COROLL.

Acantha leuce, hoc est, spina candida, ut superius quoque diximus, aliud genus est, quod Leucacantha, siue Leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste Leucacanthon uocare consueuerunt. Habetur, sed inter arbores uel promiscua, quae Spinus albus uulgo dicitur; cortice ligni candido, molli folio: aculeata tota, Pruni magnitudine. Quo nomine ueteribus cognita haec sit, haud possum reddere.

EX M. VERG. COMM.

Spina haec alba alia est ab ea, quae primo uolumine ab hoc ipso scriptore, & a nobis longius descripta fuit. Illa inter spinosas arbores genus suum habet: haec inter aculeatos frutices, & cum reliquis carduis, quorum multiplex genus est, numeratur. Illa *λευκακανθα*, composito & coniuncto nomine, haec discretis uocibus *ακανθα λευκη* appellatur. Illa undique suis spinis, & quales in arboribus uidentur infesta riget: haec praeter spinas in folijs aculeatum etiam echinum in summo caule habet. Illa in sepibus, haec montanis & siluosis nascitur locis. Illa tandem solidam habet materiam, haec concavum & inanem caulem. Sunt praeter haec in utriusque historia & medicina discrimina alia etiam. Quae poterunt uolentes ex hoc scriptore, & ex ipsa facillime cognoscere. Nullibi enim non nota omnibus haec spina est, cuius flore ad lactis coagulum multis locis in Eithuria pastores & uillicae in casei confectione utuntur. Eam hic ait syluestrem Cinaram uocari, propterea quod satiuae Cinarae comparata, minora aliqua, asperiora uero omnia habet. Est enim Cineræ altitudo Cardui omne id genus, quod siue in globis squamatis corticibus, intus nitentibus tumet siue calathi figura longioribus & in exteriorem partem descendentibus, ipsam squamatis corticibus aperitur; quae ueluti naturae monstra in ganeam gulae proceres uerterunt.

De Spina arabica. CAP. XIII.

Arabicae spinæ, quae Acanthis aliquibus dicitur, naturæ, albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones ratum etiamnum ualet. Prouenit in asperis.

ακανθα αραβικη

BARBARI COROLL.

Acanthen, hoc est, spinam arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius Lamam uocauit, etiam in India nascentem, a qua gummi adulterio Myrrhae prouenit, ut in Myrrha & Mafighe notauimus. Eandem hanc cum ægyptia spina Acaciam fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & ægyptiam & arabicam appellant.

EX M. VERG. COMM.

Inter congeneres herbarum spinas, non inter aculeatas arbores Arabica, siue Aegyptia spina hæc numeranda est. Eam ueteres greci utriusque gentis nomine indicauerunt. Ideoque nos inuenta in antiquissimis grecis, aliam illi uocem Aegyptiam, scilicet addidimus. Maximas etiam in adfringendo siccandoque uires illi tribuerunt. Peregrina quondam Italiae ea fuit, nunc quod sciamus, nulla est.

B

De Carduo. CAP. XV.

Carduus s. græce Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracantha nominatur, in Aegypto Citus. Folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quæ illita grauolentiam aliarum, totiusque corporis emendat. Item si decocta in uino bibatur. Copiosam autem urinam foetidamque expellit. Herba cum recens tenere solet, in olera Asparagi modo transit.

σκόλυμος

BARBARI COROLL.

Scolymos a Theodoro, Carduus, diu floret, ac sero. Distat a cæteris spinosis, quod radix eius uescendo est, decocta & cruda, maxime dum florescit: quodque lactem succum durata emittit, circa solstitium flos incipit. Senescens in pappos amittitur, quod quidem est huic generi commune. Mirum quod sine interuallo tota æstate, aliud floret, aliud concipit, aliud parit. Semen uliginosum & armatum aculeo. Folium arescens desinit pungere. Caput ei Theophrastus contra quod Dioscorides, spinosum negauit, sed oblongum haberi dixit: quod in hoc uno tantum spectetur

Mi. li. 21. c. 2. 16
lib. 22. cap. 22.

C inter ea, quæ lanugines folio spinosas obtinent. Nascitur similis Scolymo Carduus circa Tegea, radice dulci: quam, cum Pandius statuarum magister esitauisset, alienatus mente fert. Hæcenus Theophrasti de Scolymo sententia. Nunc quæ ceteri scripsere uideamus. Scolymon oricus & Limonia uocauit. Frutex est nunquam cubitali altior, utique in montibus, & ædiu syluestris, & nondum altilis. Alioquin in Mauritania caulis ei duodecim cubitos altus. Palmos quoternos crassius esse dicit, thyrsilque foliorum ac radice dulci: laudata quondam in pauperis cœna. Florent Scolymus, & cadas acerrimi cantus esse, mulieres libidinis audissimas, uiros contra in coitu pigerrimos, scripserunt Hesiodus, & Alcaeus poetæ. Distet ab hac, quæ a Plinio ite Limonia uocat, contra serpentes, herba lacteo succo manans, cœrescente gummi modo in humidis locis, affirmare non ausim. Est & Lemonium pro syluestri Beta in Theophrasto capietis, & aculeato folio eam prodētis. Habet & Anemone genus unum, cognomine Limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & Cynoglosson herbam Limonium appellent. Sane Scolymos Carduus intelligitur syluester. Syluestrium autem Carduorum genera duo. Alterum fruticosius, a terra statim. Alterum uniuersale, & crassius. Vtriq; folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus, lanuginoso caule. Sed alter florē purpureū mittit, inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura, qui proprie Scolymos dicitur. Radicis horum ex aqua decoctæ natura, sitim potioribus uini facere, hinc illud Columella de Cynara.

Quæ dulcis lacho

Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.

Quid autem sit in Columella uersu, mirtiolum in Cynara crinem spectari aliqui, nihil habeo quod afferre possim: nisi quis non mirtiolum, sed mirteolum, uel muriceum certe legat. Sunt enim muricata Scolymo cacumina, ut inquit Plinius. Murtioli mentionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimo uolumine. Habeto inquit, uiridis feniculi semina, & lentisci destricta & purgata murtiola. Fateor nescire quid sit murtiolum. Scio Murcum montem Romæ dictum, qui sit & Auentinus, autore Festo: ut obiter corrigamus locum in Plinio iunior, Auentinum & Martium montē, ab Anco Martio Urbis adiectos prodente: non enim martium, sed murtium legere oportet. Scio & intimū circum Romæ a murcis cognomē habuisse, quasi ab urcēis, quibus ibi fingerentur, ut Porcilio placet: siue a propinquo Veneris murææ sacello, quæ postea Murteam, & Murtiam uocare coeperint in Auentino colle, ut Varro. Hinc & Myrtum arborem uulgo, & Murtum, & Murtellam uocamus hodieque. Plinius certe duobus locis Scolymum, & medicinas eius eeu duarum rerum descripsit. Cynaram potro Carduum intelligit fatuam: ita enim Lucius Columella uocat. Palladius Carduum a cinere, ut quidam autumant, quo lætatur, uocatam. Sunt qui puellæ nomen in eam herbam uersæ inrelligant, Paulus, & Aetius Scolymon a Cynara discriminat: priorem stomacho prodesse, Cynaram officere monstrantes. Proxima certe genera uidentur esse. Fuit hæc ueteribus maximi res questus, ex Carthagine magna & Corduba præcipue, festeria sena millia, carduetis etiam multis paruis inferetibus ætario. Tantus est earum rerum prouentus, quæ Veneri obsonantur et gantæ: ut nihil inuenit portenta quædam naturæ uideri Carduos, & quæ refugiant quadrupedes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret. Adhibentur Cynaræ conuiuijs, Asparagi modo coctæ iuribus: nec sine his magnifica, aut adijcialis ulla est cœna, utique si neque locus, neque tempus obster. Ligures Arceæ cum uocant, quasi alcoccalon: ut prima eius uerbi syllaba pro articulo sit, quem Mauritani omnibus fere uocibus preponunt, ut in Hyoscyamo ex Plinio quoque usu ostendimus. Coccalus uero græce idem est quod Strobilus, hoc est, nux pinea, cui similis est Scolymus. Dioscorides, Romani Scolymum uocant inquit, Strobilum. Nondum irrepsit hoc ferculum Venetis, una tantum eius planra Mauriano uico cernitur in hortis barbaricis.

E X M. V E R G. C O M M.

V Agum per aculeatas omnes plantas Pyxacanthæ nomen est: quæ primo uolumine Lycii uocari etiam diximus: suisque spinis tum, non ubique spinosis omnibus adest. Impudent quidē, sed multo impudentius a suo genere in aliud ab his translata, qui naturā ignorantes, temere omnia misceant. Strobilum a Romanis Carduum uocari Dioscori ait, græca quidem uoce, sed tunc forte quotidiana, & in usu populi: quæ a Pineæ nucis figura cui simile in summo Carduus capitulum habet, facta est. Græci enim *σπείλον* arborem Pinum, & nucem eius pariter uocant. Quæ quoniam con figura in Pinastri, & oblonga est, quam formam Cardui capitulum habet, communica appellacione Strobilos, Carduus hic a Romanis aliquando dici potuit. Si quidem Plinius, 16. uolumine cap. 11. de Pinastri agens ait, Eisdem arbores alio nomine per ora Italiæ quas

Strobilos uocat, ut plerique arbitrantur. Ex quo patet, scribere etiam Plinio historiam suam, fuisse eam uocem in Pinastris Italicis popularem. Simile Chamæleoni Cardui, Nicander, Theophrastus, et alij fecerunt. Sed Theophrastus, hoc amplius: non solum habere Carduium radices, quæ crudæ parit & coctæ in hominis cibos ueniant, quod priuatim solus hic in spinoso genere habet, uerum quod easdem cum florere optimas habet: quodque uix credibile uideatur, cum durat per ætatem fuerint, & quasi in lignum transierint, candidum liquorem ex se mittere. Estque hic Scolymus, siue Carduus is, quo per solstitium florere, Hesiodus ait, in arboribus maxime canere cicadas, acerrimeque ad uenerem stimulari foeminas, uiros autem ignauissimos tunc ad eam fieri. Descripsit, & remedia eius tradidit pluribus locis Plinius: a quo poterunt uolentes multa audire ad omnes Carduos pertinentia, priuatimque ad Scolymum hunc, qui priuatim Carduus ab omnibus dicitur, & est.

DE POTERIO.

CAP. XVI.

Poterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acidoton uocant. Large fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthæ proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris: Seminis nulli usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum neruosas, & firmas. Quæ proxime terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisus neruis, & uulneribus glutinandis illinitur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

BARBARI COROLL.

Poterio circumsoditæ autumno, præciditurque ad succum. Radices habet multas, bene olentes, sed duas, aut tres, cubitorum binum. Galenus hanc Neuradis appellatione intelligit. In Plinio non Poterio, sed Pontirrim, nec Phrynion, ut in Dioscoride, sed Paroenio, lib. legi uideo, corrupte utriusque. At, non paroenion, sed Phrynton, nec Pontirrim, sed Polyrrizon mendose item scribitur. Phrynion porro a Rubetis ranis dicta est, quibus aduersat. eas Græci Phrynos uocat.

EX M. VERG. COMM.

Quæ Poterio in Dioscoride adiectæ sunt Neurados, & Phrynij appellationes, in alijs Græcorum & Latinorum scriptoribus, Galieno, scilicet Paulo, Plinioque præcipue & post se illam trahentes sunt. Siquidem priores duo illi Neurada tantum uocant, Plinius Phrynion, omnes tamen Poterion ab alijs appellari addunt. A neruorum medicina & ope alterum: a rubetis ranis, quibus ea medetur, alterum nomen illi factum est.

DE ACANTHIO.

CAP. XVII.

Acanthium albæ Spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, et lanugine araneosa obductis, quæ collecta & in unum aceruata Bōbicis effigie præbet. Folia, uel radices ad remedia opisthoni bibunt.

BARBARI COROLL.

Acanthion spinulam significat. Est enim spinæ albæ proxima, sed minoribus multo folijs.

EX M. VERG. COMM.

Perisse capiti huic aliquid, sermonis parum sequax ductus ostendit. Quid autem desiderare, & amissum instaurare nos oporteat, Plinius, 24. uolumine, cap. 12. manifeste indicat: quod de aculeatis plantis quibusdam agens, Acanthium hoc his uerbis descripsit. Huic similis est spina illa quæ Græci Acanthion uocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis: qua collecta, etiam uestes quædam Bōbicis similes in oriente sunt. Ipsa folia uel radices ad remedia opisthoni bibunt. Et hæc tenus Plin. Quæ si quis ab eo dicta cum scriptore hoc cõrulerit, oia eadem utriusque esse inueniet. Præterea, quæ Plinius ait, lanugine obductis, in nullis Græcis hæcenus inuenta, uerum ad expendam Acanthij & scriptoris huius historiam tamen necessaria esse, ut sine eis non possit integer sensus Dioscoridi esse: cõtraque suo loco instauratis nihil apud audiam. Erit ergo hic sermonis ductus. Spinæ albæ similis habet folia Acanthium, in summis extremitatibus aculeata, araneosa lanugine obducta: qua collecta, simulque composita, bombicinis similes uestes sunt.

C

ἄκανθα
ἰριόκανθα

¶ De Acantha. CAP. XVIII.

ACANTHAM, aut Hærpacantham, quidam Melamphylalon, Romani Pæderotam, aliqui Topiariam, alij Mamolariam, quidam Cræpulam uocant. Nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, Brucae diuifura, nigricantia, pinguiâ, læuia. Caulem binum cubitorum, digitali crassitudinis, læuem prope uerticem, ex interuallis circumdatum, foliolis paniculatis oblongas referentibus, Hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus, semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ uistis igni, & luxatis artubus illitæ subueniunt. Potę urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 22. cap.
20. & 22.

Acantha, siue Acanthos, topiaria & urbana est herba, elato longoq; folio, crepidines marginum assurgentiumq; puluinorum toros in hortis, historiali facilitare uestiens. Duo genera eius sunt. Sylvestre, aculeatum, crispum, quod & breuius est, Agriacanthos appellatū. Alterum lenacatiuum, quod proprie Pæderota uocant, alij Melamphyllon, de qua hic agitur. Unguenti quoq; genus est, quod Pæderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus sibi os linebat. Alexis poeta foeminas, quibus nimis candida cutis esset, Pæderote uti solitas in comædia significat: quod & Aegyptium unguentum dicitur: ut in Stracte diximus. Pausanias auctor est, genus herbae Sicyonis in uno tantum ueneris septo nasci Pæderota nomine, folio minore q; fagi, maiore q; ilicis, & omnino quernis simili, altera parte candido, altera subatro, ut albe Populi: hanc cibi tm spectari, præterea nusi q; gentium. Sit autem Acanthus hæc uulgaris spina, cuius & in Aspalatho meminimus, nec ne, dubito. Plinius certe duobus locis, altero Acanthon, altero Spinam uulgarem appellando, easdem utriq; medicinas tribuit. Spina est, & Appendix uocata: quoniam bacca in ea puniceo colore nominentur Appendices, siue ut ueteres dicebāt, Ampedices. Ii & Lumam pratenfis spinæ genus appellabant, & ab eo Lumesta, & Lumarias falces, autor Varro: dictam ita, q; a terra soluunt, id est, luunt eas agricolæ. Acanthos, Seruius inquit grammaticus, in Aegypto & Cyrenaica insula nasci fertur. Sed homo literator, herbarumq; parum gnarus, cum Spina ægyptia confundit, quæ ab Acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

E X. M. V E R G. C O M M.

Hæc est Acantha, siue Acanthus ille (utriq; enim genere a græcorum medicis, scriptoribusq; & pœtis alijs omnibus dicitur) quæ antiquis in tanto laudum & honoris ambitu fuit. Quæ Maroni pastoralis poculi ansas amplectabatur; quæ in hortis crepidines marginum, assurgentiumq; puluinorum thoros, longioribus & latioribus folijs uestiebat: et in architectura Corynthiæ columnæ, capitulum grati foliorum amplexu nunc etiam ornat. Quæ inter aculeatas non censeretur, nisi in oblongis foliolis nucamenti modo caulem eius per interualla uestientibus, & ex quibus flos prodit breues aculeos natura illi seruasset. Quod ceteri interpretes cōmuni & uulgari græcorum cōdicum lectione decepti, ad Hyacinthinum colorem retulerunt: cum ad spinas referendum esset: *ἀκανθώδης* legentes, quod est Hyacinthinis, cum *ἀκανθώδης*, id est, spinosis & aculeatis legendum esset, nulla Acanthi cum Hyacintho foliorum coloris in flore, nucamenti, aut Spinæ cōmunione, similitudine. Descripsit Acanthum Plinius. 22. uolumine, & eiusdē numeri capite, Melamphyllōq; & Pæderota uocari & ipse ait: sed nullā earū uocis causam docuit: p̄sertimq; cur Pæderota eā aliq; dicerēt: quæ tota græca uox est, nec aliud q; puerrū amorē, aut qd a pueris amē significat. Quo magis demirē aliq; qd in Diosc. legit, a Romanis Pæderota Acanthū dici: cū uocis eius, quæadmodū & aliarū illarū græcæ tm autores fuerint.

¶ De Syluestri spina. CAP. XIX.

ἰριόκανθα

Est & syluestris Spina Carduo similis, aculeata, breuior q; quæ in hortis satisq; pueniat. Cuius radix ad eadē ad quæ supior pollet.

BARBARI COROLL.

DE Agriacantha, hoc est, sylvestri spina, proxime dictum est, ubi alterum spinę genus sylvestre nominauimus.

De Anonide.

CAP. XX.

ANonis, quam aliqui Onotida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulę, pusillis ad Rutę, aut pratensis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucunde olentibus. Muria conditur anteq̃ spinosa fiat. Cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti durioribus aculeis horrent. Radicem mittit candidam. Quę excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus, urinam ciēt. Calculos comminuit. Margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentiũ collutione mitigat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

BARBARI COROLL.

ANonis, & Ononis quandoq̃ dicitur, ut Galeno Theophrastoq̃, spinosa post uer, folio rutę, aculeata, ramis ut Tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq̃ in segetibus, aratro inimica, uiuaxq̃ unice. Propagat se in annos, ideoq̃ runcanda & extirpanda tota est, cum terra maduit imbribus. Germinare incipit æstate, a frugibus perficitur autumno. Durat anno folium toto caule per interualla collocatum, ut corona. Flos mutilus in siliqua, nec conseptus. Est & alia Ononis, cognomine Flomitis, quę a Dioscoride Onosma dicitur, quanq̃ sunt qui Onomida, non Ononida uocent, hoc uolumine a nobis reddendam. Ononim porro dictam Phoiũ uult, q̃ alinos se ad illam terentes & scabentes fuit. Plinius Anonin similem Fœno Græco, Dioscorides Loto senarię, aut Rutę faciunt, ut æstimare liceat, Lotum senariam, cum Fœno Græco eandem uideri, aut persimilem.

EX M. VERG. COMM.

Inter aculeatas plantas omnib. facile cognoscenda quotañis renascit̃ Ononis, unice uiuax, & in annos ipsa seipsam propagans: nisi cū terra imbribus maduerit totā runcauerit & extirpauerit diligēs agricola. Frondet ea uiuitq̃ in aruis, sed lætior in proscisso iteraroq̃ agro surgit, labore hominũ ut ceterę fruges & ipsa pficiens: nihilq̃ auiq̃bus locis hac peste frequentius: quę non solũ pedibus ingredientũ aculeis suis nocet, sed aratorē etiā remorā, aratro inimica, & illi se implicans. Descripserunt Ononin antiquiores oēs qui de medica materia, aut de plantis aliquando egerunt, sed unus omniũ felicissime Theophrastus, & de plantarũ historia uolumine.

De Leucacantha.

CAP. XXI.

LEV CACANTHAM quidam Polygonaton, aliȝ Phyllon, aliȝ Ischiada uocant, Romani Spinam albam. Radice Cyperi ualida & amara. Quę manducata, dolorem dentium sedat. Veteri laterum dolori, atq̃ ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino potu. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eodēdem præbet effectus.

BARBARI COROLL.

Leucacantha, siue Leucacanthos, ab Acantha Leuce differt, ut sæpenuero cōmonui: priorem gręce Plinius fere appellat: posteriorem latine Spinā candidā, id est, Acanthā leuce.

EX M. VERG. COMM.

VNo, eodemq̃ breuissimo capite Plinius, uolumine omnem Leucacanthę huius historiam & medicinam complexus est: dicendum ideo nihil nobis aliud superest, q̃ ex similitudine aliarum plantarum Polygonaton Phyllon, & Ischiada dictam ab aliquibus fuisse: quemadmodum ex earum plantarum historia cognouisse licebit: in quarum singulis aliquid est q̃h Leuca-

A

ἀνώνιδ

Pli. li. 19. ca. 4.
The. libro. 6.

B

λευκάκανθα.

Canthæ huic æquale, aut commune sit. Sine caule, sine flore, sine Echino spina hæc est, folijs longis, aculeatis, Lactucæ similibus.

De Tragacantha. CAP. XXII.

τραγακάνθη

Tragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, furculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia, nonnunquam tenuia exoriuntur. Quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occulunt. Est etiamnū Tragacantha lachryma, quæ, uulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, sincera, & subdulcis. Cutis spiracula ut gummi obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoq; sanguæ, liquefcit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & uesciæ rosiones, mixto cornu cerui usto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Pli, li. 12, ca. 21.

Tragacantha, siue Tragacanthos, radicem spinæ albæ continet: in Creta nasci tantum credita. Sed & in Achaia, & apud Medos quoq; prouenit, in Areadia largissime: nec Cretica deterior, aspectu tamen prælata: lachrymam non incisura, sed sponte manando spissescere Theophrastus existimat. Precium Creticæ in libras. 12. apud quam uidelicet & dignatio remanet.

EX M. VERG. COMM.

In quodidiano medicinæ usu Tragacantha est: utq; omnes lachrymâ passim nouerūt, sic peregrinam Italiæ stirpem. Si Theophrasto credimus, pauci nouisse nunc possunt in Creta, Areadia, Peloponnesi Achaia, & Asiæ Media nascentem. Quo magis grecos demiretur alijs, qui natam apud se plantam, & plantæ lachrymam corrumpi in hoc scriptore permiserint, perireq; legitimam & necessariâ eius in sole densationem. Quo em̃ loco hic ait, Vocatur Tragacantha etiam sectæ radici inherens lachryma, &c. desunt necessariæ uoces aliquot, quibus doceatur, sectam radicem spinæ huius lachrymam mittere quæ in sole densetur.

D

De Eryngio. CAP. XXIII.

ἐρύγγιον

Eryngion aliqui Eryngen, alijs Caryon, alijs Gorginion, alijs Herion, alijs Origanum, Chlounion, alijs Myracanthon, alijs Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserton, Romani Capitulum Martis, Daci Sicupnoex, Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alijs Oriam Chloem, alijs Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: quæ cum adolescunt, per multas caulium prominentias spinose inhorrescunt. In quorū summitatib. globosa capitula, durarū acutissimarūq; spinarū ambitu stellatim circūuallant: quorū colos alias uiridis, alias albus, interdū ceruleus inueniunt. Radix oblonga, lata, foris nigra, interne cædida, pollicis crassitudine, odorata. Nascent in asperis, & caestribus. Vim habet calfactoriam. Potamenfes & urinas pelit. Tormina, inflationesq; discutit. Contra iocinerū uitia, serpentium morsus, & hausta uenena, cū uino prodest. Bibit aduersus plurima, cum seminis Pastinacæ drachma una. Appensa illitaue tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

BARBARI COROLL.

ERyngion, clara in primis aculeatarum herba est. Genera eius duo, albicans, & nigricans. Priorem Græci Hecaton cephalon, nostri Centumcapita uocant, omnes caule & radice in citibos græcorum receptæ, utroq; modo, siue coquere libeat, siue cruda uesci. Radicem eius, alter utrius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inuentu. Et si uiris contigerit mas, etiam amabiles fieri. Ob hoc Phaemon Lesbium dilectum a Sappho. Ipsa dura, fruticosa, caule geniculato, cubitali maiore aliquando, & satiuia quidem est: sed & sponte nascitur in asperis, & saxosis, & in litoribus maris, durior nigriorq; folio Apij. Sub solstitio colligi eam iussere quidam. Sunt qui & Acanon Eryngion ascribat, sicut & Glycyrrhizam falso Asclepiades, ut me minit Actius, Eryngion cui Orion, hoc est, montani cognomen est, solijs describit paruis & angustioribus, flore aureo, & oculi figura. Ex Eryngij radice Gallia Cisalpina confectiorem cum saccharo, aut melle condit, Eryngiatum uocatam.

Si Eryngij caulem, ex grege ouis, capellaue aliqua morsu defectum ore substulerit, totus statim subsistit grex, relictoq; pascendi studio, nouo ueluti spectaculo attonitus, non prius admirari rem desinit, q̃ accedens pastor caulem illum abstulerit: abiectoq; longius, inuile gregis sui ociun, ea ratione castigauerit. Auctores eius rei, Aristoteles primū, qui in nouo grege, & si gregis dux id fecerit, euenire dixit. Post eum Plutarchus, pluresq; alij. Quo magis miretur aliquis in huiusmodi re Plinij silentium, qui similia his pleraq; alia de candida Erynge tradiderit. Hic enim, ut herbarium decebat, necessarias medicinae Eryngij uires tantum tradere debuit. Cuius numerantur plures ab hoc scriptore, modo etus sint, appellationes: sed tam incertæ, & ex alijs plantis tam obscure repetitæ, ut nulla hæcenus earum coniectura uti potuerimus. Id tantum monemus: quæ a prima statim sequitur, solo genere in declinatione a priore differre: neutro enim, & foeminino declinatur. Neutro hic, & Græci alij usi sunt: Plinius foeminino, uicesimo secundo uolumine capite septimo his uerbis de ea agens. Et clara in primis aculeatarum Erynge est, siue Eryngion. &c. Idem etiam, quam hic Hispanis Centumcapita tribuit, Romanam suæ ætatis appellationem fuisse testatur, sed candidam tantū ea uoce uocari solita. Græci etiam eadem ratione *ἑκατονκέφαλον* a numero capitum dicunt. Quæ deinde Myracantha inter alias numeratur, a ui & radice odore facta est. Nihil enim aliud q̃ odoratam spinam ea significat uox. Cæteræ quales illi leguntur, tales alijs relinquuntur. Notum nunc etiam Eryngium est, pluribusq; locis in Italia antiquum seruat nomen & usum: melleq; seruatur radix eius, nec habet ingratum in cibis saporem.

A

Pli. l. 21. c. 16.

VERG.

B

De Aloe.

CAP. XXIII.

ALOE ALIQVIBVS. Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloë dicitur. Cuius folium Scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia utrinq; gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuiâ. Caulis emittitur non dissimilis Anthericus. Flos albus. Fructus Hastulæ regiae cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice una, cœu palò in terram depacta. Plurima, præpinguisq; in India gignitur, ex qua cœctus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia, & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis, ut in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda uulnera sane q̃ utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera. Quoddam harenosum, quod fidens crassamentum purissimæ esse uidetur. Alterum ad iocineris imaginem uergit. Eligi debet sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, caliculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facile liquefscens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant, quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore. Eoq; argumeto, q̃ digitis friata non ad minima usq; fru-

Aloë

Csta resoluitur. Nec defunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exicare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Purgationis perfectæ causa tribus drachmis sumitur. Alijs purgatorijs medicaminibus ammixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sicca glutinandis uulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;. Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iungit. Condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. Hæmorrhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad cicatricem ducit. Liuores & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabras, lippitudines, pruriginemq; angulorum permulcet. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum uino. Tonillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit harenosissimum, tanq; inutile subsidat, & leue ac pinguiusimum assumatur.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 42

Aloe laudatissima ex India, post ex Syria Cœle, ut Galeno placet, & Arabia. Improbatur e Syria, quasi multo dilutior & languida. Serit eam Asia, in turbinibus cadore, ut Sedum maius. Caulis eius tener rubet medius. Inuenitur & per selachryma adhærens: ob id pauimentum, ubi sata sit, præcipiunt; ne lachryma quæ manat, absorbeatur. In Iudæa super Hierosolyma, fossilem gigni, & metallicam, fuere qui traderent, omnium deterrimam, humidissimam, nigerriam. Negarid huius operis præfatione Dioscorides. Familiare tonstrinis Aloem, nemo ignorat, Virentem semper, propter Semperuiui marinum, appellatam uulgo. Aloidarium uero, medicina dicitur ex Aloe, ad uentrem soluendū, in Orbasio, Philagrio, Aetio.

E X M. V E R G. C O M M.

ASpinis, quas communes Aloe cum Eryngio habet, Eryngium & ipsa ab aliquibus dicta est, sed mala similitudine: quando in cæteris nihil dissimilius q; Eryngium & Aloe uidetur. Fuerit etiam qui Amphibion hanc dicerent: quod nisi eadem illa ratione dicatur, qua in genere animalium Amphibia a græcis aliqua dicantur, incertam nobis causam habet. Sunt autem græcis Amphibia, quæ communem & ambiguum in utroq; elemento, terra, scilicet & aquis uitam degunt: qualem hic Castora secundo uolumine descripsit, & quales multæ aues ubiq; sunt. Proueruntq; aliqui sic Aloem uocasse, q; procul a mari, & maritimis locis, ut hic ait, pariter nascitur: & si ut Amphibios diceretur, non satis discrimen id fore uideri possit. Neq; enim diuersa elementa sunt maritima, & quæ procul a mari distant. Orminion ab aliquibus dicta Aloe pariter fuit, q; utraq; altiore caule est: & quemadmodum Aloe in folijs aculeatas eminentias magis q; spinas habet, sic & Orminium, ut in historia eius cæritus patebit. Tragocerotha postremo eandem Aloem certiore similitudine aliqui appellarunt: ab hircorum cornibus facta appellatione, quibus folia eius quantitate, longitudine, figuraq; apposite respondent. Est & inter appellationes has illud animaduertendum ex antiquissimorum græcorum fide, non dixisse nos in foliorum Aloes historia, habere eam utrinq; folia ex obliquo spinosa, sed utrinq; spinulas. In melioribus enim legitur *κυνδύρια*, id est, spinulas, non *κυνδύρια*, quod commune nobis cum Barbaro est, & si naturæ rei q; id non magnopere interfit.

De Absinthio.

CAP. XXV.

A

ἐπισιον

ABSINTHIUM aliqui Bathypicon, Aegyptij Soma, Romani Absinthium. Hærbæ uulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhæsit. Vrinam cit. Crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum fefeli & nardo gallico potum. Fastidia discutit. Arquatos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, cotidie tribus cyathis haustum. Menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur Ixiæ uenenis cum uino. Item cicutæ, & muris aranei moribus, & draconis marino. Anginæ eò cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad fugillata, & oculorum caligines ex melle illinitur. Item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum, uaporis suffitu compescit. Decoctum in passô, dolentibus oculis oblinitur. Item præcordijs & iocineri, tritum cum cærato cyprino. Stomacho quoque longa ualitudine laboranti cum rosaceo. Cum ficis autem, aceto & Erui farina, aquæ inter cutem lineosisque subuenit. Vinum ex eo fit, quod Absinthiten uocant, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta utuntur, cum febris carent. Alioquin in æstate propinant, & acceptam huic uino incolumitatem referunt. In parsum arcis Absinthium, uestes ab erodentium iniuria uindicat. Culices eò, & oleo perunctis abigit, & a corpore arcet. Atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosionem tuetur. Existimatur liquamentum eòdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat: quoniam stomachum male habet, & capitis cit dolorem. Sunt qui cocta Amurca liquamentum adulterant.

B

BARBARI COROLL.

ABsinthii frigidis prouenit. Latinarum ferijs certabant in Capitolio quadrigæ, uictorque Absinthii bibebat: sanitatem interpretantibus in eo præmio maioribus. Poetæ Græci sunt, qui Absinthium quandoque dixerint. Hippocrates, Absinthium Cyprium commendat.

Pli. li. 27. ca. 7
Theoph. li. 9.

De Marino Absinthio.

CAP. XXVI.

RBSINTHIUM Marinum, quod aliqui Seriphum, Latini Centonicum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliuæ ramo utuntur. Hærbæ est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit. Id per sese, aut cum Oryza coctum, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiectio melle enecat. Alium laxiugat. Cum edulio autem, uel lenticula decoctum, eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tercium genus Absinthio assignatur, quo Galatia Alpibus finitima scætet. Id patrio nomi-

ἐπισιον βα-
λάνιον

Cne Santonicum uocant, regionis in qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum subamarum est, non adeo seminis fecundū. Eadem quæ Seriphium potest.

B A R B A R I C O R O L L.

Absinthium Seriphion, siue Seriphon, angustius priore, minusq; amarū. Absinthij genera plura. Vulgare, siue Ponticū, de quo diximus. Seriphium, id est, marinū, de quo hic agitur. Ponticum a Ponto ueniens, ubi pecora pinguescunt illo, & propterea sine felle reperiuntur, neq; aliud præstantius, multumq; Italico amarius, sed medulla dulci. Tertium Santonicum a Gallicæ ciuitate appellatum. A Columella uero Santonica herba dicitur.

De Santonico, proxime dictum est. Illud notatu dignum arbitror, Santonicum Absinthio similis describi, quam Seriphium, aut quod idem est, marinum: quoniā marinum Abrotoni potius, q̃ Absinthij figura demonstratur ab Dioscoride ac Plinio, ut prædixi. Recentiores contrarium decernunt. Et sane uidentur haud falsa dicere: Marinum, siue Seriphium docentes Absinthio q̃ Abrotono similis, Santonicum Abrotono, q̃ Absinthio. Marinum certe, id quod passim in littoribus, & secus mare nascitur, sapore falso, & folio albicāte, notum omnibus, nihil fere commune cum Abrotono. Galenus quoq; Seriphium inquit, & conspectū & gustū Absinthio simile est, præterq; q̃ minus linguā adstringit, q̃ Absinthium, sed plus exalfacit, & cum quodam salis gustu, amarum sentitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Tria diuersis locis a Plinio etiā Absinthij genera numerantur, Ponticum, Santonicum, & quod Seriphion, siue Marinū a cunctis uocatur, religioni in Aegypto consecratū, cōmune & ubiq; pro ueniens. Ponticum est, a regione, in qua optimū nascitur, bonitatis magis q̃ naturæ merito inuenta appellatione. Hoc in Dioscoride legitur Rusticum a Romanis uocari: sed nullā habet ea appellatio rationē. De Santonico hic cerussime egit, quondāq; in honore & nota Absinthij gentis nomen id fuit, ut cum cecinit ille, Santonica medicata dedit mihi pocula uirga.

DQua parte autē Santones in Gallia ultra Alpes quondā fuerint, & adhuc sint, omnibus patet. De Seriphio, quod & Marinū dictum quondā est, duobus locis Plinius egit lib. 17. cap. 8. his uerbis. Est & Absinthium marinum, q̃d quidam Seriphium uocant, probatissimū in Taphosiri Aegypti. Huius ramū Isiaci præferre solēne habent, angustius priore, minusq; amarum, stomachoq; inimicū. Iterumq; lib. 33. capite. 1. quo loco de eo sic ait. Nascitur & in mari Absinthium, quod aliqui Seriphium uocant, circa Taphosirum Aegypti maxime, exiliis terrestri. Quæ id eo repetita a nobis hoc loco sunt, ut quæ a principio capitis huius incerta, aliundeq; repetita, & mixta simul difficilē habent intellectum, legentibus certiora fierent: intelligerentq; omnes, ex Pontico Absinthio ad Seriphium, siue marinū hæc translata esse, quæ in alijs leguntur. Largissime in Cappadocia, & monte Tauro prouenit. Quæ Pontica sunt, & superiore capite, uulgarī Absinthio in censu bonitatis ab hoc ipso dicta. Cum probatissimum in Ponto & Cappadocia nasci ait. Miscere enim diuersa hoc est, intellectumq; rerum adeo confundere, ut nullus possit huius scriptoris usus esse. Qui enim potest Seriphia herba, & ad mare nascens in Cappadocia, & Tauro monte inueniri? Ideoq; nos omnem eam partem, ueluti inutilem, omnemq; illic sensum turbantem expunximus.

De Abrotono.

C A P. XXVII.

ἀβρότονον

ABrotonum alij Abutonon, alij Absinthium, alij Heraclion, alij Cholopceon, alij Absinthiomenon, alij Theliphthoricon, alij Procampylon, Magi Neura phœnicos, alij Cynanchiten, Romani Absinthium ponticum, nonnulli Thelythamnum, alij Glycyn ancona uocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs Seriphi modo minutim incisis. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, tenuissime uti Absinthium. Plurimū in Cappadocia gignitur & Galatia Asia

tica, atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritum & feruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uiuo potum exitialium uenenorū antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu & nidore fugat. Contra ictus eorū cum uino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & Phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commode illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Irinī compositionibus ammiscetur.

BARBARI COROLL.

A Brotonū campestre, ac montanū. Hoc sœminā intelligunt, illud marem. Amaritudo Abinthij in utroq;. Vacuum sponte prouenit, cacumine suo se propagans. Seritur quoq;, sed melius semine, q; furculo, aut radice. Numerosum eius semen. Radix una, quæ alte descendit, ceteris in summo terræ leuiter hærentibus. Floret cum Fraxino. Siculū laudatissimū, dein Galaticū. Pamphilus, Abrotonū a Romanis Santonicū appellari credidit, a Galenō reprehensus. Græcū uulgus, a contrario Melitinē uocat Abrotonū, sicut semen acrius, & ab interitu tinearum Helminthobotanom, Dioscorides a quibusdā Thelyphthoron, & Thelythānon, & Glycyna Aconina dicit appellari. Saneq; uidetur ij ad historiā, & uetus prouerbij respicere. Ea est huiusmodi. Lydi gens in libidinē effusissima, sœminas ingenuas constuprare in hortis, ad hoc flagitiū questis, amoenitatibus excultis, aliquādiu impune solita est. Demū Omphale mulier, dominatione haud magno negotio, effœminatis & luxu disfluentibus excussa, imperitare cœpit ipsa: ubi eos cruciantibus uarijs affectos, ulta est, in uxores eorū defauit: inclusas enim eas, eisdem seipis prostituit seruitijs. Inde uiridario nomen, Glycys ancon, quod & Thelyphthori, & Thelythamni uocabulo significatur, cœu Abrotono consitus fortasse locus esset is.

Pli. li. 27. ca. 7.

De Hyssopo.

CAP. XXVIII.

HYSSOPUM aliqui Later uocāt, alij Cassialam, Aegyptij Pesaleim. Harbā nulli non cognita. Duū generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. Decoctū cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq;, peripneumonicis, diuurnæ tussi, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluū cum ficis uiridibus detritis manditur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione, deijcit. Colorem in corpore fouet. Lienī, & aquæ intercutem, cum fico, nitroq;, inflammationibus quoq; ex uino illinitur. Cum feruente aqua impositū, sugillata discutit. Cum decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat. Inflationes auricularū uaporis suffitu discutit.

BARBARI COROLL.

HYSSOPUM, siue Hyssopus. Præfertur Hippocrati Cilicium, sed ē Tauro monte, Dein Pampphilum, & Smyrnæum.

Pli. li. 27. ca. 11.
lib. 26. ca. 11.

EX M: VERG. COMM.

Non negligendi usus in medicina Hyssopus est: quā inter cætera hic ait aluū multo efficacius purgare, additis Iride, aut Irione: aut ut cæteri interpretes uerterunt, Cardamomo: ut autem nos ueterū codicum fide admoniti, Nasturcio. Multa enim, quoniam facilis lubricusq; est lapsus a Cardamomo ad Cardamum, quod Nasturcium est, duarum huiusmodi uocū in se in scriptoris huius, nouis & antiquis codicibus commutatio & alternatio est. Nobis præ-

Cter meliorū codicum fidem, aptius ad deſciendā aluum Naſturtium q̃ Cardamomū etiam uſum eſt. Sigdem in Cardamomi decretis nihil q̃d ad hunc uſum p̃tineat, in Naſturtio aut legi-
tur, & inter cæteras eius uires numeratur aluū turbare, q̃d a deiectione eius non longe abeſt.

¶ De Stichade.

C A P. XXIX.

σιχάδα

STichas, quā aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pancration, nonnulli Styphoniā, Aegyptij Suphlo, Magi Pythonis oculū, Romani Sciolebinam uocitant, iuxta Galliam in inſulis eiufdem nominis, e regia one Maſſiliæ gignitur, unde cognomentū accæpit, Herba tenui ſemine, coma Thymi, longiore folio, ſubamara guſtu, & aliquātum acris. Cuius decoctū Hyſſopi modo ad pectoris uitia efficax eſt. Antidotis miſcetur. Viſcera omnia, & uniuerſum animantis habitum extenuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 17. ca. 12.

STœchas, odorata herba Hyſſopi, aut Thymi coma. Conſudere quidam recentiorum Stœchaden cum Stachye, Item cum Santonico Abſinthium.

B A R B A R I C O R O L L.

Maſſiliam incolentibus cunctis notiffima Stœchas, eiufq; gentis mulieribus poſt puerpe-
riū in quotidiano uſu eſt. Siquidem incenſæ, Stœchadis ſuſſitu a partu ſtatim adhuc confirmat præterid puerperij laxamenta, omnemq; corporis infirmitatem. Quæ eius uires in græcis ali-
quot non legiuntur. Veritamen reſtituendæ huic capiti fuerūt, propterea q̃ in antiquioribus &
melioribus adhuc legiuntur. *ἡ σιχάδα λεπτή, ῥιπὴν καὶ ῥιπὴν. Quinetiam Paulus Aegineta in. 6.*
has illi uires præcipue tribuit, *σιχάδα λεπτήν, ῥιπὴν, ῥιπὴν: τὰς αὐτὰς καὶ ἄλλας τοῦ ῥιπὴν ἔχει.*
Quod eſt. Occludit Stœchas, abſtergit, confirmat interanea, & totum animalis habitum. Quo-
rum aliqua in impreſſo non leguntur: ideoq; cum pleriq; alijs a Barbaro relictæ, quoniā quod
Dioſcorides codice ille utebatur, nihil huiufcemodi habebat: ſed ex meliorum codicum fide,
& Paulo Aegineta reſtituenda erant. Quod nos fecimus.

D

¶ De Origano.

C A P. XXX.

ὀρίγανος ἡρακλεῖο
ῥιπὴν καὶ ῥιπὴν

ORiganum Heracleoticum, quod & Cornelion uocant, ſolum
habet Hyſſopo non diſſimile, umbellamq; non in rotæ ſpeciem
orbiculatam, ſed uelut multifidam, ſemine in ſummis uirgis haudqua-
quam denſo. Excalfacit. Vnde decoctum cum uino potum demorſis a
ſerpente conuenit. Si cicutam, aut meconion hauſerunt, ex paſſo: ſi gi-
pſum, aut ephemeron, ex aceto mulſo propinatur. Ruptis, conuulſis,
hydropicis cum fico eſui datur. Aridum acetabuli menſura potum in a-
qua mulſa, atos humores per aluū extrahit. Menſes ciet, & tuſſi cum
melle linctum medetur. Ad pruriginem, pſoras, regiumq; morbum de-
cocti ius, in balneis prodeſt. Succus uirentis tonſillas, uuam, & oris ul-
cera ſanat. Et per nares ex oleo irino inſuſum trahit. Aurium dolores
cum lacte mulcet. Conſicitur ex eo & cepis & rhois frutice quo ad obſo-
niā utuntur, uomitorium medicamentum, hiis omnibus in cupreo uafe
per tricenos dies inſolatis, dum caniculæ ſyſtus ſagrat. Harbæ autē ſub-
ſtratu ſerpentes fugantur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 10.
lib. 20. ca. 14.

ORiganum, nigrum, & candidum. Priori nullum ſemen, candido perq; minutum. Id autē
cui odor eſt, Creticum uocatur. Negant in Arcadia erumpere, quo ſtatu a mari non accedit.
A ſatu non ante trigefimū diem emicat. Folia ei cadunt a cacuminibus. Aemulus Thymbrae,
hoc eſt, Cunilæ uocatæ ſapor. Nunq̃ utrumq; additur, quippe ſimilis effectus. Origanū ei ta-
men dumtaxat Aegyptiū præfertur, De Cunilæ tribus generibus, in Thymbra diſputabitur:

sicut de Cunilaginis quatuor in Conyza. Origanum tam pertinaci cum Brassica dissentit odio, ut arefaciat, fugatque aduersum. Origani multa sunt nomina. Heracleoticum, quod a nostris Cunilaca, siue quod magis probo, Cunila Gallinacea uocatur, ab Heraclea Ponti dictum, uel Plauto teste in Triumuo.

In Ponto inquit, ubi Absynthum sit, & Cunila Gallinacea.

Sub qua tam Cretici, quam Aegyptium intelligunt, de qua praesens mentio. Deinde est Origanum Onitis, de quo proxime differendum est. Tertium Heracleoticum syluestre. Quartum Tragoriganum. Eius duae species a Dioscoride redduntur, quae a Plinio tribus sunt Heracilio. Non est autem omnino idem, Heracleoticum, & Heracium. Prius inter Cunilas accipitur a nostris, posterius pro Tragorigano sumptum uidetur a Dioscoride, Origanum, & Origanus dicitur, producta quae ante ultimam est syllaba. De syluestri & Tragorigano statim prodetur.

EX M. VERG. COMM.

Prima Origanus illa ab Heraclea Ponti ciuitate, bonitatis notam & laudem nominis eam inuenit: dictaque Heracleotica est, ut gentis cognomine illo, a syluestri, & ab Onitide distinguere-
tur, & prima probaretur. Quae eadem causa fuit, ut Heraclos eadem diceretur: quod Plinius 20. uolumine, cap. 17. indicat: & hic uideatur tertium illud, & agreste genus potius Heracium uocare. Deerat in aliquibus graecis Heraclij illa uox: nosque eam ex meliorum codicum fide huic scriptori restitimus. Fedimusque id auctore Nicandro in Theriacis suis: qui non tantum πανδ-
κτυον κοινον eam uocari tradidit, uerum ἡρακλειον ὀρίγανον. Versiculi eius sunt. πανδκτυόν τε κοινόν, ἡν τι καὶ ἡρακλειον ὀρίγανον ἐμμενέτω. Adiecitque antiquissimus eius interpret ex autoritate Dios-
clis, Cunilam ab aliquibus Heracium uocari & Origanum, ab aliquibus autem syluestrem Origanum: & Panacem, siue Panactiam, quod omnibus morbis medeatur: nihilque Onitidis eius, quae secundum genus huic scriptori facit, aut Nicander, aut interpres eius meminerunt. Vocauitque Diosc. Panacem agrestem illam tantum, quae sibi tertium genus facit, cum tamen Nicander prior eam ea laude ornauerit. Quae omnia, quod paulo ante dictum a nobis est, indicant, non posse in tam diuersa de Origano tradentibus antiquis scriptoribus, certum aliquid constare. Nihil enim in Plinio, multis locis, minus certum Origanos et Cunilas plures quam hic, Theophrastusque, et aliter tradente, graecisque aliquando nominibus, aliquando latinis, nulla certa ratione utente, praefertim quod in Cunila. Quae graeci uoc κοινον, pene eadem multis locis legentes, merito suspenderit. Ob eam causam nos nihil censere ausi, nihil maluimus quam quod nesciremus dicere. Eam hic feriptor ait μέλαινα κατὰ κοινόν ὄσιν, quae si uerbum de uerbo uertas, nihil significabunt aliud, quam per alium nigra ducere Origanum. Plinius de Origani uiribus & medicina libro. 20. cap. 17. agens, extenuare eam ait crassiores pituitas & nigras: eumque imitatus Barbarus, extenuare per alium, & ipse pituitas nigras dixit. Nos alios omnes secuti, nigra illa ad atram bilem tantum contra-
ximus, nullibi pituitam nigro colore tradi simpliciter inuenientes: in quo posterioribus medicis subscribentes, qui omnes melancholicos humores purgare Origanum dixerunt, certius rem docere arbitrati sumus.

De Onitide. CAP. XXXI.

Quae Onitis appellatur, candidiore est folio, non dissimilis Hypophiso. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multo inefficacior.

BARBARI COROLL.

Origanum Onitis, siue Prasion. Quidam & Ornithis, quasi Gallinaceum dixere, sed genus illud Heracleoticum uocari cerno: quemadmodum proxime indicatum est.

De Syluestri Origano. CAP. XXXII.

Syluestre Origanum aliqui Panaces Heracilion, alij Cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est Origani, ramis tenuibus palmum altis, in quibus umbellae Anethi insunt. Flores cadidi. Radix ten uis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente, folia & flores ex uino poti auxiliantur.

BARBARI COROLL.

In primo genere quod Heracleoticum uocatur, Galenus Origanum syluestrem, Panaces He-

C racion, & Cunilam quoq; dici solitum affirmat.

De Tragorigano. CAP. XXXIII.

τράχινος

Tragoriganum tenuis frutex est, syluestri Serpyllo, aut Origanum similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis uirentius inuenitur, & latoribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prassium uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio, Cœoq; proueniens. Omnia excalfaciunt. Vrinam cient. Aluo accommodatur. Decoctio potu bilem deijciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumoniciis, iussentibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ructanti, imbecilloque traditur. Item si a maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores uero cum polenta discutiunt.

BARBARI COROLL.

De Tragorigano dictum est in Origano Heracleotico.

EX M. VERG. COMM.

Possimus autore Paulo Aegineta, de tam multis Origanis dicere, quod de tam multis antiquorum Dijs sapientiores quondam dicebant: nominibus tantum distingui Deos, unam tamen omnium potentiam esse. Simul enim de omnibus lib. 6. is egit, complexusq; cunctas, incidere, extenuare, siccareq; & calefacere in tertio ordine Origanos omnes dixit: quod parum ab eo abest, si quis dicat nominibus distingui Origanos, omnium tamen similes & easdem vires esse. Quo sensu intelligenda sunt quæ ab hoc ipso scriptore hoc capite dicuntur, ὅτι πάντες αἱ ἀρωματικαὶ αἱ ὑπερπικραῖ αἱ ὑποπικραῖ, &c. Quod est, ut nos reddidimus, Omnes calefaciendi uim habent. &c. Plinius tamen

DTragorigano privatim vires quaspiam alias tribuit, quas poterunt uolentes in eo uidere quod diximus uolumine & capite.

De Pulegio. CAP. XXXIII.

πύλεγιον

Glichona Græci, aut Blechron, alij Arsencantho, Latini Pulegium uocant, Galli Aluolū, Aphri Apoleium, Quidam Galiosopsum. Hærbæ uulgaris noticiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eiecit. Pulmonis uitia ex melle & aloe potum extrahit. Conuulsis auxiliatur. Nauseas, stomachicq; intercessionis, ex posca per mulcet. Atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta, inflammationes omneis sedat. Podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus. Cum carato uaros extinguit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat. Conuersas uulvas corrigit. Contra inflationes duriciasq; uulue, in deflectiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona: quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 20. ca. 24

Pvlegium, ipso brumali die germinat in carnarijs, refloretq; Ramulis etiam a parentibus functis ut Scylla. Nascitur hoc etiam non satum. Semel uero satum, diutina ære durat. Magna cum Nepeta & Mētha Pulegio societas, Formina in eo efficacior. florem habet purpure-

um, Mas candidum. Vtriusq; recens incensus pulices necat; unde nomen Pulegio. Habetur & Pulegium sylvestre, Origano simile, folijs minoribus q̃ satiuum, & a quibusdam uocatur Dictamnus: occasiōe hinc orta, Dictamnū Crēticam Pulegium sylvestre nominātum. Pulegium græci Gleconā, & artice Blechōn, sed & Blechiron quoq; uocant, ut inq̃t Dioscorides. Ego Blechiron Hippocrati, pro legumine quodam accipi uideo apud Galenū. Pulegium (ut dixi) brumalis herba dici potest, quemadmodum & solstitialis aliquæ dicuntur. Plinius, Condundō inquit, solstitialis herba, flore rubro, suspēsa in collō cōprimū furmas; Plautus q̃q; in Pseudulo, Quasi solstitialis, inquit, herba paulisper fuit, Repente exortus sum, repentino occidi.

E X M. V E R G. C O M M.

Q VAS Plinius uigesimo uolumine, cap. 14. de hoc ipso Pulegio agens, intercisiones uocat, non satis certa nobis indicatione, priuatim ne labem aliquam eius partis sic appelleret, an late patentes in hoc scriptore & alijs *ἀσχυρῶς*, idest, morsus & erosiones. Intulit contra coniciendi castigationis graui amaritudine græcus sapiens idem Pulegium, quo tempore dissidentibus & lasciuientibus ciuibz suis, in pulpitem progressus, nihil locutus aliud, uerum sola prolata pulte, cum eam Pulegij ramulo identidem miscuisset, e concione abiit: humili quidem, & facile contemnendo præcepto, nisi intellexerit aliquis, nullas comitari frugalitatem ciuium infamia-
tiones, quod cum polenta Pulegium stomacho præstat; nec lasciuie petulāterq; aliquid acturos homines, qui paucis contenti, ex horto & agro, non ex macello & foro uitam sibi quæserint; et quas Pulegij cū posca stomachi erosiones sanat, frugid uitę genus, nihil male cogitantes ciues, cōcordiā et cōmunē dignitatē amare cōegerit. Erat, ut ex his cōficere licet, Quidianus in sanitatis usu Pulegij cibis. Seruabāq; id fale aliorū Salgamonū mō, ut auctor ultimo sui opis uolumine Columella est. Neq; inmerito rā multos habet in medicina usus, qbus & in sanitate utile etiā est.

De Dictamo. C A P. XXXV.

D Ictamnū, aliquibus syluestre Pulegium uocatur, alijs Embastron, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibusdam Ephemeron, nonnullis Eldia, aliquibus Belotocos, aut Dorcidion, aut Helbunion, Romanis Vstilago rustica. Cretensis hærbæ est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. Præstat omnia quæ satiuum Pulegium, sed efficacius multo. Non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus ejicit. Prodrunt in Creta capras sagittis percussas, huius hærbæ pastu, eas excutere. Purgandi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hærbæ impactos pedibus, reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis dolorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cū uino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tanta hærbæ facultas est, ut olfacta abigat bestias quæ uenenato ictu sæuiunt, appensaue exanimet. Vulneribus ferro illatis, & uenenatis moribus, infusus succus præsentaneo est remedio, si etiā ab instillatione statim in potu assumatur.

B A R B A R I C O R O L L.

D Ictamnū, nō Dictamnū ex Theophrasto, & Virgilij quodā uersu lego. Ramis hoc prætenu, Pulegio etiā gustu simile. Caulis nullus, radix gracilis & superuacua, & in Creta quoq; nō spaciōse nascit: nec nisi in asperis, quæ uera Dictamnus sit, minimo pōdere, accendēs os: quo argumento a falsa protinus discernitur. Qui legere eam, manipulos in ferula, uel harundine condentes præligant, ne potentia euanescat. Mire a capris expetitur, Dictaminum legitimam in Felicis horto Patauij uidisse crederem, folijs interpūctis, quemadmodum & pingitur, nisi q̃ non

E ij

A

Δικταμό

B

The, li. 9, ca. 16

C alibi q̄ in Creta prouenire scribunt. proinde Pseudodictamnium potius eam fuisse, q̄ Dicta-
mnium arbitror.

ψευδοδίαμνον

QUOD Pseudodictamnium uocant, multis in terris nascitur, an-
tedicto simile, sed minus q̄ illud acre. Eisdem effectus præbet,
sed inefficacius multo.

PBARBARI COROLL.
Pseudodictamnium, folio simili, ramulis minoribus, a quibusdam Chondris uocatum,
in pinguibus agris nascitur.

DE Cretensi Dictamo. CAP. XXXVII.
Esfetur a Creta alterum Dictami genus, folijs Sisymbrij, ra-
mis maioribus. In quibus flores syluestris Origani, nigri, mol-
les. Odor foliorum inter Sisymbrium & Saluiam iucundissimus. Effi-
cax ad eadē, sed uehementius nares ferit. Miscetur emplastris, & medica-
minibus quę aduersus serpentium iniurias confingunt, Theriaca uocāt.

BARBARI COROLL.
Dictamnium hoc neq̄ facie, neq̄ effectū simile uero est.

QUÆ DESYDERARI POSSE IN hoc scriptore uidentur, quęq̄ nobis prima fuit causa, cur omne
Theophrasti de Dictamnis historiam commentationibus his nostris adijceremus,
quibus quod ad eius appellationes pertinet, addendum adhuc est. Artemidion, s. didi Dictam-
num a uenatrice dea Diana, quam Græci Artemida uocant: qm̄ uulneratē ab ea in uenatione
caprę & ceruę, eius herbę pastu sanarentur. Quod erat numini inprimis gratum, sine malefi-
cio & nature iactura, studium & uoluptatem suam amanti. Eademq̄ de causa Dorcidion, qua
si cerualem (doreada enim gręci Inulum, & in ceruorum genere minores) uocāt: quod animal
Plinius ait Dictamnium hanc ostendisse: uulneratis eo pastu, statim decidentibus telis. Fœmi-
nino genere hic Dictamnium ueluti herbā, Theophrastus. Iureq̄ alij neutro tradiderunt. Quę
generis mutatio multa in plantis est: non tam quia sexu aliq̄ue a ueteribus discretę fuerunt, q̄
quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit: interpositaq̄, n, litera Dictamnus,
non Dictamus dicenda est. Indicant id gręcorum codices omnes Theophrasti, huius, aliorūq̄
omnium qui forte Dictamini meminerunt. Indicat & poeta noster in. 12. Aeneidos suę canens.
Tum Venus indigno nati conctissima dolore, Dictamnium genitrix Cretęa carpit ab Ida, Puberi
bus caulem, folijs, & flore comantem Purpureo: non illa Seris incognita capris, Gramina cū
tergo uolucres hēere sagittę. Nisi enim producta sit eius uocis penultima syllaba, stare uersus
non possit. Quod bene, & ex antiqua Dictamni appellatione feliciter dictum, eandem in homi-
ne totius naturę aliq̄n peritissimo diligentiam desiderari sæpenumero nos cōegit: & in Dicta-
mni pictura, quam ille æternam in suo carmine faciebat, tria eius nō miscuisse gr̃a. Quod em̄ in
eo est, Dictamnium genitrix Cretęa carpit ab Ida Puberibus folijs, ex uera ueri Dictamni histo-
ria est. Siquidē in Creta priuatim nascitur: & ut hic ait, γναφαιδίων τὰ φύλλα ἔχει. καὶ ἰσχυρὰ τὴν
ἐπιφύειν. Quę enim hic ait, tomentosa folia, & lanosam adnationem, ille ab hominis lanosa pu-
bertate, felicissime indicauit. Quod uero statim ait, caulem & flore comantem purpureo, non
ex ueri Dictamni, sed ex eius historia est, quod Theophrastus tradidit, solo nomine Dictamnū
esse Sisymbrij folio maioribus ramulis, nec eiusdem usus, aut potestatis. Quodq̄ hic præterea
ait, agrestis Origani flore esse medio inter Sisymbrium & Elidiphacō odore, Dictamnū em̄ ere-
tensem herbam omnes sine caule, sine flore, & ob id sine semine, excepto Theophrasto, descip-
serunt: q̄ quo diximus loco, semen Dictamno tribuere uidetur: & si semen, prius etiam florē,
quando hic naturę ordo est, ut in cunctis semen ex flore aliquo fiat. Verba eius sunt, χρῆται δὲ
τοῖς φύλλοις, ὅν τοῖς κλωνίς, ὅνδ' αὖ τῷ καρπῷ. quod est. Vtuntur autē folijs, non ramulis, nec semi-
ne. Negat Theophrastus seminis usum: qui negandus non fuerat, si natura illud negasset.
Ceteri oēs caulem & florem, & semē in Dictamno negauerunt. Potuitq̄ Maro hunc sequi, & si
contra aliorum historiam dixisse uideatur. Non tñ ideo ignorantē omnino dammandus poeta
gansus erit, qui aliorum exemplo, in fabulosa re uoluptati magis q̄ utilitati legēdum cōsuleret.

Nec nos aliam ob causam locum indicauimus, q̄ ut legētes moneremus, aliam ex professo ali quid scribentibus, q̄ poētis in tradendo rationem esse. His enim suā artis priuilegio agentibus sibi concessio, licuit, semperq; licet, non quā optima & ex re, sed quē speciosissima sint dicere. Est & illud in Dictamno animaduertendum, quod hic ait, facere Dictamnū quācūq; & sati uum Pulegium, non ad omnium malorum remedia referendum esse, sed ad menses, secundas & partus: quā omnia hic Pulegium ducere dixerat. Indicatq; id quod sequitur statim. Non em̄ potum tantum, sed subditum & suffitum eneōs in utero fetus pellit. Quod itidem ab hoc di citur, Habet & succus purgandi uim, a Theophrasto sic tantum traditur, Habet Dictamni suc cus aliquid Pulegij succo æquale: nihil aliud intelligens, q̄ qd hic in Pulegio dixit. *ἔνι δὲ κατὰ κελύαν μέλανα*, quod uersum a nobis est, per aluum nigram trahere bilem. Et hæc satis pro Dictamnīs omnibus dicta hætenus a nobis sint.

De Saluia.

CAP. XXXVIII.

Eleliphacon, alij Elaphoboscon, aliqui Phaçon, alij Ciosmin, a= *ἐλελίσφακος*
elij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiam uocant. Frutex *ἐλαφόβωσκον*
est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, & canas. Folia mali *εφάγνον*
cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quā sensim attrita= rum quasi uestium scabriciem referant, hirsuta, subalbida, perq; iucun= do odore, sed graui. Semen summis in caulibus syluestri Orminio simi le gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ra morumq; potum. Partus extrahit. Pastinacæ maris icibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulnerū sanguinem cohibet. Tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedant rami, foliaq; si decocto eorum foueantur.

BARBARI COROLL.

Eleliphacos, ut Theophrastus inquit, differt a Sphacelo: q̄ altera minor est, altera syluestri or. Sphacelo folium breuius, & leuius: Eleliphaco squālidius & scabrius. Sed aliter fere Plini us. Syluestris inquit lens est Eleliphacos, a Græcis dicta, satia lente leuior, & folio minore, at q; siccior & odoratior. Est & alterum genus eius syluestris, odore graui, hæc minor: nostri q nunc inquit sunt herbarij, Saluiā appellant, Menthæ similem, canam, odoratam. Eleliphacon fuit qui Hieram botanen, hoc est, sacram herbam cognominent, ut Agrippa, salutare ad mul ta, præsertim ad fecunditatem: ut inde Saluia fortasse a nostris dicta esse uideri possit. In Aegy pti Copto, multis pestilentia sublati, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad cōceptū uti.

EX M. VERG. COM.

Magnæ litis nostra ætate Eleliphacos, quam quondam Plinius Saluiam dici testatur, cū simili & quasi congenere fruticosa herba est, cui a claritate oculorum, quibus pro fit, nomen in gente nostra factum fuit. Consentibus alijs, quam hic Saluiam uocari a Romanis inquit, alterā illam mutato in uicem nomine esse. Alijs cōtra nitentibus. In quorum numero non pudet nos etiam numerari. Neq; em̄ turpe nobis fore aliquando credimus, autoribus Diosc. Plinio, Apu leio, Serapione, totq; alijs, credidisse id, & constituisse. Siquidem non uerisimile solum, sed pau lominus q̄ necessarium est, testantibus idem tam multis, antiquā plantæ eius eam appellationē per manus traditam, continua eiusdem rei significatione ad nos peruenisse. Quid enim, ut cete ros omittamus, aliquando Plinius apertius docuit dicens: Nostri qui nunc sunt herbarij, Elelif phacon græce, latine Saluiam uocant. &c. Aut quis Apuleio non credat, Saluiam tot, q̄ quot, Diosco. nominibus indicanti, & in medicina iubenti, ad pruritus uerendorū decocto eius infe riores partes fouere: Quod ultimum hic scriptor etiam iubet, dicens finire genitalium prurigi nes foliorum, ramorumq; Saluæ cum uino decoctum, si eo abluantur. Accedunt his deinde caulīs, foliorūq; tam p̄sentes notæ, ut suspicari nemo aliud facile possit. Fruticis nō adeo p̄cra alitudo, fruticosus, ramosusq; habitus: quadrangulæ uirgæ, in his & in folijs albicans color: foliorum tam multis additis exceptionibus similitudo: & quod præcipue contempletur, & ad hanc rem amet aliquis, attritæ uestis modo aspera: quarum alteri illi aliq̄ congruunt, huic ue ro omnes. Egit Theophrastus libro. 6. de plantarum historia de Eleliphaco hac: simulq; de congenere illi alia, quam Sphacelon nominauit.

C

¶ De Mentha.

CAP. XXXIX.

ἡδυόσμος μίνθη

Hedyosmon satiuū alij Mintham, alij Calaminthan, Latini Mentham uocant, alij Nepetam, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Macetho. Cognita hærba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccãdi uim habet. Sistit sanguinem, pote ex aceto succo. Tineas in uentre teretes enecat. Venerem stimulat. Singultus, uomitiones, cholerasq; sedant, ter ni ramuli cum acidigranati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammæ si tendantur, aut lacte turgeant, compescit. Cum sale, canum morfibus illinitur. Aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit. Vuluæ ante coitū admota, conceptioni resistit. Linguae scabriciem confricta læuigat. Coire lac, densariq; in caseū non patit̃, si folia potionibus lactis imergant̃. In summa, stomacho utilis est. Et in condimētis peculiarem gratiā habet.

BARBARI COROLL.

The. li. 7. ca. 7
Pli. li. 19. ca. 2.
lib. 20. cap. 14.
& de planta.
caus. li. 2. & 5.

Mentha æstate uiret, hyeme flauescit, humido minus gaudet, semel sata pluribus annis restitibi fertilitate durat. Menthæ nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit (hoc enim significat Hedyosmos) cum alioquin Mintha uocaretur: unde ueteres nostri Mētham appellauere, aut fortasse quoniam odore mētem excitat. Theodorus Hedyosmon in Theophrasto Mentha strum interpretatur, ut a Mintha in eodē autore separaret. De Mentha stro statim proderet. Galenus porro Mintham quæ sit odorata, Hedyosmon, idest, Mentham uocari tradidit, Mintham uero quæ sine odore sit, Syluestrem esse Mintham, & pprie Calaminthā appellari uoluit. Strabo in Achaia montem esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine, a Plutonis pellice in hā herbam conuersa, Proserpina inuidia, quæ uocatur inquit a quibusdam Hedyosmos. Ouidius, Feminæos hortos in olentes uertere Menthas Persephonæ licuit.

D

Quarrit Aristoteles in problematis, quamobrem dicatur, Mentham in bello nec edendam, nec ferendam? Soluit. Qm̃ inquit refrigeret, absumendo genituram: sed cum alij oēs excafcioriam uim Menthæ ascribant, fieri potest, ut per se calfaciat, per accidens refrigeret: quod & in alijs pleriq; conspicitur.

EX. M. VERG. COMM.

Solo nomine in græcis Mentha cōmendatur: nec quisq; est qui eo auditio, suauitatem odoris in notissima omnibus herba non amet. Id enim Hedyosmus græcis est. Quod ambitiose nescio, an molliter ab eis factum fuit: qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam conuersæ honorem haberet, parum contenti, nouo, & quod uitæ tantum delicias indicaret, uliginosis locis feliciter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, uoluptatis suæ magis q; alieni nominis ambitiosa, libentius & frequentius q; antiquiore illo usa est. Theophrastus enim nō alio q; Minthes nomine, pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum tota Græcia, præsertimq; Arcadia: in qua non procul a Pylo nobilis Minthes cognomine mons fuit: quā Plutonis pellicem poetarum fabulæ, & a Proserpina, ut solent pellices semper odifese uxores, in hortensem Mentham transformata fuisse narrant, æterno in æterna planta hominis monumento. Quam uocem Romani magis amantes, q; in ea male habitæ ob amorem puellæ memoria seruaretur, una tantum & altera mutatis literis græcorum, Minthen, Mentham suam fecerunt. Quotidiani in sanitate usus, & præsentis in medicina contra tot mala remediij, Quam cum Calaminthe, quæ Nepeta est, miscere non decet. Sui enim generis Calaminthe herba est, a Mentha stro statim a nobis dicenda: quæ ab imperitis alijs Menthæ appellationibus importune adiecta est.

¶ De Mentha stro.

CAP. XL.

ἡγρεν ἡδυόσμος

SYLVESTREM Mentham Latini Menthastrū uocant, hirsutiore folio, et, prorsus maiore q; Sisymbrij, grauiore odore. Quare

minus ad sanorum usum expetitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Menthastrū, hoc ē, sylvestris Hedyosmos, aliter a Plinio describitur, foliorū specie a sativa differens, quasi figura Ocimi, colore Pulegij propter quod quidam sylvestre Pulegiū uocant: Dioscorides hoc non Menthastrū, sed Calaminthæ genus unū (ut arbitror) existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

Sylvestris Mentha Menthastrū est, in hortēsi & rustica re cūctis notissimū, satis a Dioscoride descriptū, & quale passim ab oībus & quotidie uidetur. Inter cætera maius & procerius Sisymbrio ab hoc scriptore dictū fuit: q̃ multa inter Sisymbrium & Mentham similitudo est: mutaturq; & degenerat in Menthā neglectum Sisymbriū, quemadmodū secundo & quinto uolumine de causis plantarū testatus Theophrastus est. Quæ fuit huic scriptori causa, ut procerius co Menthastrū esse diceret: ne multæ similitudinis inter se plantæ uidentes fallerēt, haberentq; herbarij certā ex proceritate notā, qua Menthastrum a Sisymbrio discerneret:

¶ De Calamintha.

C A P. XLII.

EX Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam sylvestre Pulegium ideo appellarunt, q̃ odore ipsum æmuletur. Nepetam Latini uocant. Tertia Menthaastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus q̃ superioris, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & urinas expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnææ, torminibus, cholæræ, rigoribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit. Tineas, cæteraq; interaneorū animalia, cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudaue si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa, aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut concretum humorem euocet, summam cutem exurens. Verum mes necat succus auribus instillatus.

B A R B A R I C O R O L L.

Calaminthā, nostri fere Nepitā appellant, etiā si Dioscorides spēm eius unā priuatim Nepitā uocari tradat. Prorsus tāta inter Menthā, Mēthastrū, & Nepitā societas est, ut mirū non sit misceri quicq; ab auctoribus earū & spēs & noīa. Alioq̃n & q̃d modo Pulegiū officinis & ruribus uocat, haud plane scias Calaminthæ genus sit, an uerū Pulegiū. Nepita etiā non satis nascit. Calaminthā græce Cæta quocq; dictā fuisse, testis est Strabo, q̃ nō nullos scribit existimare, Lacedæmonē ab Homero nō cetoessam a magnitudine, sed cetoessam a Calaminthæ copia uocari.

E X M. V E R G. C O M M.

Congenerem aliqui, similem tantū aliqui Menthæ Calaminthem, quā nos Nepetam diximus, in græcis fecerunt. Subscribitq; illorum sententiæ, nomen quod coniunctam sibi habet Mentham. Habent contra posteriores illi figuram, quā Menthæ similem faciunt: naturā uerō & uires, qui sui generis herbam esse dicūt. Triplitem hanc Dioscorides ait: diuersisq; notis inuicem separat, sed nō facile cognoscendis: tanta trīum generū similitudo est. Plinius unū tantū constituit genus lib. 20. cap. 14. Nepetāq; id uocat. Nicander in theriacis suis duo tantū, & aliter Calaminthes gñā cognouisse uidetur, aquaticā, palustreq; alterū: montanū uero alterum: haud sane, quia montanā Calaminthē ille dicat, sed cum aquaticā & riguis gaudentē dixit, pro

A

Pli. li. 20. ca. 4.

καλαμίνθα

B

Cprium signasse genus uidetur: cui diuersum montanum, & in ficcis nascens fit. Versiculi eius sunt. τικωρ δὲ ποταμοὶ πολλὰς ῥαγάς καταδίναν ὑδράκην καλῶμενον ὅπως χαράσσαν. πολλὰ γὰρ ὑδάτι παρὰ ῥαγὰς ἀμφοτέρωθεν ῥέειν ἴστανται, ἀρκυόεσιν ἀγαλλόμενοι ποταμοῖσιν. Quorum sensus est, Summo tunc circa resonantis fluminis uortices comosam frondentem Calaminthem. Copiosa enim prope aquarū scatebras, & circa labra earum nascitur, luminibus gaudens. Ex quibus pro comperto habendum est, Nicandro duo hæc tantū genera esse, locis in quibus nascuntur distincta. Hic tamen ex foliorū, ramulorum, florum, & odoris uulgaris notis sua genera separat. Non facile, ut diximus, inuenienda & cognoscenda: tanta est naturalī mixtura, & naturæ cognatio. Apuleius, quicūq; ille fuit, in cōmentario, qd de aliquot herbis reliquit, Nepetā hanc at montanā Mentham à græcis dici, a Magis sanguinem Hammonis, ab Italis Nepetam montanam.

¶ De Thymo.

C A P. XLII.

Thymon quidam Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum, Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam. Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs & angustis circumdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis, Gracili folio & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelantioribus. Tineas uentris exigit. Menfes, partus, & secundas pellit. Vrinam etiet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum. Concretū sanguinem dissoluit. Verrucas Thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit. Ischiadicis cum uino & polenta impositum subuenit. Hebetibus oculis in cibo prodest. Perq; utile pro condimento, dumtaxat ad usus eorum, qui recte ualent.

D

T B A R B A R I C O R O L L.

Plin. lib. 21, cap.
10, & 21.

1 Hymū, siue Thyna pluratio numero, siue Thymus, in mari quoq; nasci traditur, extra
Herculis columnas, quod eiectum in pumice defurescat. In Hercoo linus, color etiam nū floris in
eo est, ceu nondū absoluti peris. Quae aequi extat, duricia lapidis aspicitur, similis tamē uire
ti. Sero floret Thymū, per solstitia fere cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est. Seritur flo
re, in quo semen intelligitur: etiam si oculis deprehendi non potest. Coalescere quidam Thymū
negant, nisi afflatu maris feratur. Ideoq; translatū ex Attica non durasse in Arcadia. Nunc pro
uincia inquit Narbonensis Plinius, lapidei campi Thymo scatent. Flos Thymi perit imbribus.
Duo autem sunt genera eius. Candidum radice lignosa, in collibus nascens, quod & praefer
tur. Alterum nigricans, florisq; nigri. Colligunt in flore Thymum, & in umbra siccant. Epidy
mum quidem pluribus uidetur flos eius Thymi esse, q. & durius sit, & similitudinem Cunili
nostratis habeat. Sed de Epithymo posterius. Thymum e Thyna laudatur ab Hippocrate. Est
autem, ut inquit Galenus, Thyna in terra Thracie locus.

E X M. V E R G. C O M M.

Prima Thymo laus in antiqua plantarū hīstoria græcis a Theophrasto est: quī a principio statim fexti de plantarum hīstoria voluminis longiore descriptione totā eius naturā fortunāq; complexus est. Post Theophrastum latinis a Plinio, & ante Plinium plerisq; alijs, quī Romanorum, Italiq; hortos & mellationem intruxerunt, Omnīū uero maximā & æternam æterno carmine Maro illi fecit, cum in Georgicis fuis cecinit. Redolentq; Thymo fragrantia mella, Romana breuitate, & poetica dignitate, omnē plantæ huius honorem & usum in ruris & apīū disciplina complexus. Quæ licet præcipui saporis, & egregij odoris homini mel dederit, in quo extremā suauitatis lineam natura clausit; nec secus q̃ in humana fortuna totum in regibus, ætate Pindaro, fastigiū definit, sic mellis extrema in saporibus dulcedo feniatur: non tamē tantā illi gloria hæcenus fuit, aut posthæc erit, suauitate mellis suauiorī hominī scisse cecinit, & multiplici remedio sanitate eius, & uitā instruxisse, cuius nullū obrepi hominī quacunq; ætate fastidium, κοπος δ' ἔχεται ἡμῖν, ut lyricorum maximus Thebanus poeta cecinit. Quæ ad Thymi hīstoriā, factiq; ex eo mellis bonitate pertinet, Theophrastus quo diximus loco, Plinius ab illo accepta omnia, 21. uolumine capite decimo, Columella quo loco de apium pabu-

lo & cibarijs agit, in mellificio tandem, ne longiores simus, iam pridem plerique alij profecti sunt: possuntque uolentes ex tam multis auctoribus ea repetere. Nobis satis est, locos, & auctores legentibus signare. In quibus monemus, quaecumque a Theophrasto dicta fuerint, a Plinio totidem uerbis reddita ciuibus suis fuisse, nec desideranda Plinium legentibus quæ Theophrastus tradiderit: qui Thymum in duo genera diuidens, candidum, & nigrum, monuit nos quod in Dioscoride legitur, ab aliquibus candidum Thymum dici, non appellationem, sed alterum genus eius esse, a Theophrasto ad hunc scriptorem importune translatum, qui nulla huiusmodi diuisione usus est. Coloris autem discrimen id Theophrastus in folijs tradidit, in altero genere albicantibus, in altero nigrescentibus. Florem enim hic *πορφυρίστρον*, id est, purpurascentem tradit, inter purpuram, & candorem medium: qualis etiam passim uidetur. Sunt Thymi appellationes aliæ, Epithymis, & Thymon, solo declinationis genere diuersæ: antiquæ & ipsæ. Siquidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: sic feminino genere Epithymida alij herbam, scilicet intelligentes. Potuerunt Aegyptij accepta a græcis uoce, quoniam forte eo coronarentur, Stephanem, id est, coronam appellasse. Quemadmodum & græci Thyrsion, quoniam Bacchicas hastas, quas in orgijs eius dei Thyrsos uocabant, pro Hederris, ramulis Thymi forte inuoluerent. Suspitiones tamen, seu malis dicere, coniecturæ hæ sunt. Quod postremo est *κισθακρόν*, quod capitatum significat, certam ex figura floris capitulorumque eorum in quibus hic florem Thymi purpurascere dixit, rationē habere potest.

De Satureia.

CAP. XLIII.

Satureia nota est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymus similis, minor tamen & tenerior. Desert spicam florum plenam, diuque permanentem. Eadem potest quæ Thymum, si modo con- simili sumptitetur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quedam satia, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

BARBARI CÖROL L.

Thymbra post trigesimalū diem nascitur in maris afflata sata, nec ut quidam putant aliter. Hæc apud nos & Cunila uocatur, & (ut arbitror) transmarina Cunila est. Apud Columellā Thymbra est condimentarij generis. Satureia quoque a nonnullis Thymbra dicitur, Columella Thymbrā a Satureia diuisit, & Cunilā nostratem esse docuit: quā rustici Satureiam nomināt, colore floris purpureo, ut Thymbrā herbaceo. Quintus Serenius spēm Thymbræ Satureiam intelligit, ut Satureia sit non Thymbra simpliciter, sed Thymbra cephalote, quā Plinius Cunilam capitatā semel tantū, quod meminerim, opere toto nuncupat, intra hæc quæ in Cunilagine dicuntur. Cæterū Cunilæ præter satiam plura sunt in medicina genera, fortasseque hanc Hippocrates intelligi uoluerit, ubi Origanum Cephaloides appellat. Bubulam appellant, semine Pulegij, Origanum ab Aristotele putatam, cuius pastu Testudines cum Serpētibz pugnatu- ræ, uires suas recreant: quamque in hunc usum nonnulli Panaceam uocant. Quidam falso Ligusticum interpretati eam sunt. Corrupta est in L. Columella dictio, ubi cuniculabula, & interim culabula, pro eo, quod est Cunila bubula, inter pecoris medicinas legitur. Plinius Origanum multis locis, non aliter quæ Cunilam bubulam conuertit. Est & Cunila gallinacea, de qua in Origano Heracleotico dictum est. Non omitendum, aduersa dicere hoc loco Dioscoridem, & Plinium. Omnia inquit syluestria fere sunt, & folijs minora, & caulibus succo aciora: sicut Cunila, Origanum, Ruta. Dioscorides contra hic prodidit de Thymbra. Sunt & græcis utique præceterioribus, qui non Thymbram, sed Thymbra neutro genere, plurali numero pronuncient. Et nos quandoque seruamus in Satureia. Ouidius, Sunt qui præcipiant herbas Satureia nocentes, Sumere. In Thymbra Paulus Epithymbrum uocari tradit id, quod in Thymo Epithymū. Ridentur merito grammatici fere omnes, in herbarum exponendis, iudicandisque nominibus, in quo & Seruius honoratus sepiissime decipitur, & in hac ipsa Thymbra Pacidus Lactatius is, qui Papinij Thebaida interpretatus est, Thymbram, a qua Thymbræus Apollo cognominatus sit, latine dici Possum affirmans.

EX M. VERG. COMM.

Habemus antiquissimū & probatissimæ fidei scriptoris huius codicē, in quo plures Thym

A

Plin. l. 19, ca. 8.

B

Plin. l. 19, ca. 8.

Chræ a principio appellationes aliæ leguntur, Clinopodion, Probation, Ageratum, Origanus agrestis: & post barbaras, nulliusq; intellectus plerasq; alias, a Romanis Cunilam rusticā appellari Thymbrā. Id ueterum latinorū decretis additū facile confirmauit, quod constitutū iam pridem a nobis fuerat, in Cunilarū genere Thymbrā esse. Si quidem Columella decimo suoperis uolumine de apium passionibus agens, inquit. Eademq; regio sit fruticis exigui, fœcunda, & maxime Thymi, aut Origani, aut Thymbræ, uel nostratis Cunilæ, quā Satureiam rusticici uocant. Plinius item .19. uolumine capite .7. inter Cunilas Thymbrā his uerbis numerauit. Thymbrā uero quæ sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulū, & aliud Satureia dicta in condimentario genere. Estq; quod Columella ait, sic intelligendū, ut ultima illa disiunctio, uel nostratis Cunilæ, &c. non herbas, fruticesq; duos, sed unius duas appellatiōes alternet: indicetq; autor ille, non Thymbrā, & præter eam nostratē Cunilam, sed hac, aut illa appellatione unā tantum significari: & quā antiquus Dioscorides hic noster a Romanis Cunilā rusticam uocari dicit, Columella nostratē peregrinitatis ratione in alio genere dixerit. Transmarina enim Cunilæ etiā quondā numerabatur. Sicq; bifariam a duobus scriptoribus idem dictū: a Columella nostras, ut eo pronomine a transmarina distingueret: a Dioscoride rustica, ut a satia separaret, inuili & minoris efficaciz. Fuisse aut satiuam Satureiā, & condimentariā idem, in carmine suo testat Columella, cum cecinit serendū in hortis Nasturciū, Et Satureia Thymi, referens Thymbræq; sapore. Quæ quoniā multo minore acrimonia q̃ rustica illa esset, ideoq; medicinz inuiliis, mutato nomine a græcorū Thymbra, & latinorū Cunila, Satureia dicta est. Eadē quidem, sed diuersis locis nascens, & ex eo diuersæ bonitatis, nō isdem ubiq; appellationibus indicata. Quod Plinius aperte ostendit, dicens. Thymbrā uero quæ sit Cunila, hoc apud nos habet uocabulū, & aliud, Satureia dicta in condimentario gñe. Nihil certius ex his est, q̃ unam & eadē Thymbrā Cunilam dici, habereq; in Romana gente id uocabulū: mox aliud Satureiā. i. in condimentario gñe; quod nihil aliud est, q̃ satiuā Satureiā dici. Cunila itaq; Thymbra sit Columellæ nostras, ut a peregrina & transmarina discernat: Dioscoridæ uero rustica, ut a satia separetur: Plinio Cunila, incultis & asperis locis: Satureia, in hortis nascens & satia. Hoc nos de Thymbra, Cunila, & Satureia sentimus, qd a floritantibus, ueteriq; indicij alijs multis confirmari poterat. Sed breuitati consulentes, cetera oia relinquimus, pserim uno Satureiæ nomine totū hoc genus, ubiq; nascatur, indicatibus ætate nostra herbarijs oibus: qbus nullū Cunilæ alicuius nomē est: uināq; agrestem Origanū, Thymbrā, & Thymū non simul misceret. No uerūt nunc rura oia, asperis & incultis locis, montibusq; plærūq; nascentem Satureiā, isdem oibus notis, ab imperitijs etiā cognoscendā. Omnem hanc cognoscendarū ex antiquis appellationibus plantarū difficultatē, non tam similitudo, eadēq; multarū uires & notæ, q̃ in fecernendis diuersa appellatione similibus herbariorū negligenter fecerunt: eoq; res perducta est, ut tres toto genere diuersas plantas, una appellatione monstrari aliquādo audierimus.

De Serpillo.

C A P. XLIIII.

Σερπίλλος

Serpillum aliqui Zygin syluestrem, alij Polion uocant, Aegyptij Meruopyum, Latini Serpillum. Duorum generum est. Hortensium odore Sampsuchū imitatur, atq; in coronas addi solet. Cui a serpendo nomen inditum est, quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In macerij multo procerius assurgit. Syluestre Zygis appellatum non serpit, sed in altitudinem increscit, ramulos ædens tenuis, furculosos, folijs refertos longioribus q̃ Rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustati acres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris satiuo efficacius, atq; magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit. Urinam potu ciet. Torminibus, ruptis, uulsis & iocineris inflammationibus auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Maxime uero Phreniticis & Lethargicis conuenit. Cruentos uo-

mitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

BARBARI COROLL.

Serpillo radix multifida, sublimis, retorrída. Crescit in altitudinem quamcūq; adminiculo, aut sepibus aptisum. Aqua ei modica satiffacit. Fimo, præcipue iumetorum gaudet. Sed & demissum in puteos, & circa piscinas, & stagna lætissimū prouenit, obnoxium squalori. Translatum uehementer ituat, autumno fere feritur. In montibus plerisq; copiosissimū, ut Thraciæ. Seritur autem Sicyone. Athenis quoq; ex Hymeto deferentibus auillos ex ijs ramos aquis. In montibus natum, Satureiæ odorem habet, uehementissimū illū quidem, sed gratum atq; mollem. Satuum non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increfcit. Voluntariū, id est, syluestre, serpit in petris maxime: hoc & pinguius, & candidioribus folijs atq; ramis: Dioscoridi contra serpit satuum, non syluestre.

EX M. VERG. COMM.

Serpillum nouerunt, quæ urbes & agros incolunt gentes omnes. Pauci tamen syluestre a satuo discernere didicerunt: tam paratū ubiq; satuiū est, humana opera a syluestri & horridiore illius aspectu, ad mitiorem & speciosorem habitū translaturū. Quo uno habitu, & ramulorū infirmitate, a syluestri differt. Fit enim in satuo Serpillo, quod in urbanis & elegantioris uitæ hominibus, ut per ferigentibus ramis itare nequeat, sed hortorum delitijs, & nimia humoris copia uireat quidem speciosius, infirmius tamen per terram serpat. Qua fortuna in urbibus omnia fere sunt, quæ comparata agro sanitatis, uitium, patientiæ, aliorumq; uitæ laborum, & munerū minus habere ubiq; deprehenduntur. Neq; Herpillum a Græcis, & ex eo Serpillum a latinis dictum est, q̃ per terram simpliciter serpit, quæ satui nostra ætate fortuna est, sed q̃, ut Theophrastus ait lib. 6. de plantarum historia, proprium quoddam est ramulorū Serpilli iucremētum. Priuatim enim possunt in quantā uoluerit aliquis longitudinem trahi, adiecto illis pedamento aliquo; aut si prope sepes plantetur: aut ex altiore loco aliquo deorsum dimittatur. Sic enim in longū protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, q̃ in longū Serpillum latini & græci olus hoc nominauerūt. Syluestris contra illius quod Zygyda hic ait uocari, nulla est nominis eius inuenta nobis ratio. Nisi forte a truidna, quā græci Zygon uocant, rectitudineq; eius ad rectitudinem ramulorū in syluestri Serpillo translata ea uox sit. Aut quia ramulis his natiuo lentore ad uinciendum, & uiliū usum aptis, in re rustica forte uteretur antiquitas, Zygis hoc Serpillum dictum fuerit: & q̃ eo iugarentur uitæ, quod *ζυγόν* græci aliquando dicunt, in eadem significatione, in qua ligare & uincire passim latini utuntur. Syluestris Serpilli huius, quod tacuit hic scriptor, duo genera numerauit Theophrastus. Alterum Thymbreæ, quod Thymbreæ parem acrimoniam habet. Alterum quod odoratius & mollius sit. Hic autem nullā forte in medicina eorū diuersitatem sentiens, unius generis syluestre Serpillum dixit, & ex præcipuo discrimine a satuo discerni monuit. Multa alia Theophrastus etiā de Serpillo dixit, qualia sunt. Longissime & speciosissime frondere satuiū, si in puteum descendere dimittatur, podio eius impositū, nec aliud quodpiam genus eius est: plantariq; Serpillum autumno plerūq; plantari etiā uere; amare domos & hortos: gaudereq; aquis & stercoreatione: præsertimq; ex iumetorum fimo: & meliorescere sæpius translaturū.

De Sampfuco.

CAP. XLV.

Sampfuchum aliqui nomināt Amaracum, aliq̃ Triphyllon, aliq̃ Agathides, aliq̃ Cnecion, aliq̃ Acapnon, Pythagoras Thramben, Aegyptij Sopho, Armenij Myrō, Magi Ichrei alinū, aut Hecigonon Isidis, Romani Maioranam. In Cypro & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Siculo & Cyzicena appellat. Hærbæ est ramosa, per terram repetis, folijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinæ difficultas, aut tormina exeruciant. Illi ta ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subditi in pecto tra-

A

Pli. li. 19. ca. 2.

B

αμαρυχον
αμαρακον

C hunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusq; cærato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmatisq; calfaciendi gratia commiscetur.

S **B A R B A R I C O R O L L.**
Sampfuchus in Syria & Aegypto dicitur, Amarantus uero & Amaracus a Siculis. Item a Theophrasto. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus. Radix arida, tellure summa hærens, mulvisida. Floret ætate, non omnis, sed quam Phrygium cognominant. Semine & auulsione prouenit. Transfert & plantæ solent.

Plin. lib. 21. ca
pit. 11.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine, cum de Sampfuchino & Amaracino unguentis ageretur, de Sampfuchino & Amaraco ex Plinii historia, quæ satis ad eam rem tunc fore credidimus: distulimusq; in hunc locum, quæ alia tunc ex aliquot græcis scriptoribus ornitenda alioquin non erant, nisi ea nunc repetenda fuissent. In quibus præfari illud inutile non fuit: Magni in plantarum historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur: & quæ diuersis locis hîdem, aut alijs nominibus appellerentur, obseruasse. Nisi em id fiat, geminari aliquando & augeri in numerum continget, quæ unum sunt: & quod idem natura, aut paulo diuersum ubiq; fecit, aliud uideri: eaq; ratione confundi intellectu, & misceri rerum historia. Quod in Sampfuchino hac fit in qua si Galerum, hunc ipsum scriptorẽ in unguentis, & Paulum Aeginetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco uidebitur. Siquidem omnes scorum de utraq; egerunt, aliasq; in medicina uires alterutri assignantur: Amaracum calefacere in tertio, in secundo uero ordine siccare dicentes. Sampfuchum extenuadi, discutiendiq; uires habere: & in tertio ordine calefacere & siccare, & in unguentis a Dioscoride diuersa, multa in utroq; numerari, quæ tractata suis locis iam pridem a nobis fuerunt. Si Theophrastum, Plinium, poetasq; latinos, Lucretium, Maronemq; & Columellam, eandem Sampfuchum Amaracum omnes intelligunt.

D Nihilq; certius Plinii decretis in hac re est. Primũ lib. 11. capite. 11. quo loco auctore Dioscoridẽ ait, quod Aegyptus & Syria Sampfuchum uocat, Siculos Amaracum appellare. Mox eodem uolumine iterũ, sed capite. 11. Sampfuchum, siue Amaracum in Cypro laudatissimũ & odoratissimũ. Nec multo post, Fit ex eo oleũ, quod Sampfuchinũ, aut Amaracinum uocatur. Maro, quod pueri omnes nouerũt, super alta Cythera per Venerem auiam Afcanium transiit, ubi mollis Amaracus illum, &c. Lucretius idem. Aut Amaracini blandum Staetiq; liquorem, Columella etiam in carmine suo Romanorum hortos excoleas ait, Grataq; iam ueniant hilari Sampfucha Canopo, peregrina uoce Romanam Amaracum expellans, Et ne longiores simus, hic ipse etiã hoc capite, in Sicilia Amaracũ uocari Sampfuchum dicit: nec esse inter Sampfuchum & Amaracũ, nisi appellationis discrimen. Graues contra, græcorũ medici illi, quos paulo ante nominauimus auctores, ad hanc rem sunt: nec nostrũ est, ut in Buccolicis legitur, tantas componere lites. Non tacebimus tamen, uideri nobis aliam historiam, q̃ medicinæ rationẽ in multis esse: fieriq; posse, ut, quod idem & congener sit, non tam quia diuersis locis aliter atq; aliter nominetur, q̃ q̃ diuersis locis natũ, diuersas uires habet, diuersum in medicina & historia censet: duplexq; Sampfuchũ, scilicet & Amaracũ fecerint græcorũ medici, quod unũ idemq; genere est: quoniã non idem uiribus & natura diuersis locis proueniens esset, diuersisq; genitũ appellationibus, ad constituendas diuersas eorũ uires, usi fuerint: non duas in natura plantas, sed in una diuersas nominibus illis uires intelligẽtes: duplexq; Sampfuchinũ & Amaracinum unguentũ hac ratione a Dioscoride in primo traditum fuisse: nunc autẽ in plantæ scorum, ab unguentis historia & medicina, solum Sampfuchũ tradi disse, & de Amaraco id solum testatum fuisse, a Cyzicenis & Siculis Amaracum Sampfuchũ dici: quod & in Amaracino unguento etiã dixerat, in Cyzico probatissimũ fieri: quoniã in ea gente, quod alibi Sampfuchũ uocabatur, Amaracum nominat. Quod & Plinius fecit lib. 13. capite. 11. scorum de Amaracino et Sampfuchino & ipse agens: Esseq; idem Dioscorid. Sampfuchum & Amaracũ illud, in hoc capite præsertim indicat, qd̃ hic ait, probatissimũ in Cyzico & Cypro. De Sampfuchino agebat, & nihilominus in Cyzico, in qua Amaracini probatissimũ unguentũ fiebat, nasci testat. Manifesto argumẽto, eandẽ Sampfuchum Amaracũ, & Amaraco Sampfuchũ esse: quodq; Plinius torlocis ait, nihil aliud indicat, q̃ in Aegypto & Syria Sampfuchũ, in Asia deinde, tota Græcia, Sicilia, & ut in uicino sit in Italia Amaracum uocari. Nec si quis ueterũ græcorum, latinorũq; historiam

& medicinam diligenter erascabit, aliter iudicio nostro, de his colligere, rationariq; poterit, præsertim nullam ex professio Amiaracum docente Dioscoride, quod relinquendum in quoti-
diani usus plantæ, tamq; ob odoris suavitatem amabili, diligentissimo homini non fuerat. Cui
a principio adiectæ in Sampfuchum tam multæ appellaciones, nullam habent nobis rationem,
aut causam: nec nos ab eo commentarijs suis additas credimus, sed per tempora illi accreuisse:
quodq; hic proposuerit, Sampfuchum tantum fuisse, tum in bonitatis censu Cyzicenu & Cy-
prium cæteris omnibus anteposuisse, mox ab eo Aegyptium laudasse, & a Cyzicenis & Sicu-
lis Amaracum uocari. Hæc enim in vetustissimo quem habemus latino Dioscoride tm legunt.
Quo fit, ut miremur in hoc etiam Barbarum, qui a Cyzicenis & Siculis non Amaracum, sed
Amaranthum uocari Sampfuchum dixerit: præsertim docente id tam multis locis Plinio.

De Sertula campana. CAP. XLVI.

SERTULA CAMPANA laudatissima in Attica, & Cyzi-
co, & Carthagine nata. Cuius color uicinus est Croco, boni odo-
ris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum langue-
scente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem o-
mnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erupat,
si ex passo cocta illinatur. Interdum autem addito oui luteo assato, aut
scenigræci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis Papaueris, intybo
ue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, il-
lita cum creta chia, uino, aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda &
cocta cum aliquo ex antedictis leuat. Doloribus auriu mitigadis cruda
ex passo instillatur. In aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorē lenit.

BARBARI COROLL.

Melilotos, alij Sertulam campanam, Cato Sertam campanicam, quia folium eius corona
menus sit dictum, in Campania Italiæ cõmendatissima, ut nostri uolunt, odoratorq; & can-
dida: deinde Attica in Sunio, mox Chalcidica, ubicurq; uero asperis & syluestribus nata, re-
cens, nec candicans, & Croco q; simillima. Melilotos arida, diutius odorē continet: qui et Cro-
co uicinus est, quemadmodum & flos. Ipsa cana, placet maxime, folijs breuissimis atq; pinguif-
simis. Inter aromata, quibus deservitum condiri solet. L. Columella Cripam pampinacam no-
minat. Deprauatum esse locum arbitror, & Sertam campanicam, non cripam pampinacam le-
gendum. Nec ignoro & Crepin, & Crepulam haberi herbas, sed quibus ad unguentum & aro-
mata nihil sit opus.

EX M. VERG. COMM.

Campana Sertula Plinius & Celsus Romani sermonis candidi autores, Melilotum appel-
lant. Cato nulla diminutione usus, Sertam Campanicā dixit, ab usu & narali solo tota appella-
tione hac illi facta. Nosq; his autoribus græco nomini, latinā uocē in titulo capitis addidimus.
Nec ratiocinantes facile, quo referenda uox illa *κροκισωρ* esset, quæ Croci aliquid habentem si-
gnificat, ad colorem contraximus, qui tñ nullibi q; in flore uideri potest. Virescūt em folia. Fed-
musq; id auctor Plinio, qui de ea lib. 21. ca. 9. agēs ait. Odor eius Croco uicinus est, & flos. Ne-
q; em ad odorē referri & cõtrahi uox illa in hoc scriptore poterat. Sequebatur em statim *ὑπόλευρ*
quod odoratum significat. Nisi forte *κροκισωρ* qd; *ὑπόλευρ* eodem pertinēt: dixeritq; hichis quod
ad odorem pertinebat: quod tamen parū uerisimile est. Quod erat etiam *ἡ κροκιδόνη*, quæ uox
Carthaginem significat, ad Calcedonem detorsimus: qm in græcis aliquot & latinis omnibus
sic legitur. Nisi forte neutrum eorum legendum eo loco sit, sed in Chalcide. Siquidem Plinius
ibidem ait. Est enim in Campania Italiæ laudatissima: græcis in Sunio: mox Chalcidica, & Cre-
tica. Et hæc pro Sertula Campana notissima nunc etiam omnibus planta, satis hæcenus di-
cta sint.

De Maro. CAP. XLVII.

MARV M aliqui Origanida, aut Hysobrion uocant. Hæc
ba cognita uulgo, furculosa, flore Origanī, folijs multo candi-

μαλίστωρ

Pli. li. 21. ca. 22.
& 22.

μίσρον ὑσώβριον

Cdioribus, flore odoratiore. Vim habet Sisymbrio consimilem. Substringit enim, & modice caescit. Qua de causa illitu, serpentina ulcera sistit. Et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Traleis copiosissima gignitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 24.

DE Maro Plinius inter odoramenta sic loquitur. In Aegypto inquit nascitur Marum, peiusque Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, odorata. Lydium Marum Plinio fortasse fuerit, quod Dioscoridi Magnesium: cum sit Magnesia Lydia ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria est, in qua Tralles, ubi Marum quoque nascitur. Est & Magnesia penes Mæandrum, et Tralles in Caria: non tamen ut Lydium propterea decernam idem esse quod Carium, gentis suæ, ut Plinius ait, appellatum nomine, cuiusque principale, ut in Cario demonstrabitur. Habent & Arabes suum Marum, siue Maru, sed penitus diuersum, & magnis ambagibus impeditum: inter quas illam sitis indicasse, quæ species eius sunt Mellisophyllon, Matrubiæ, & Buglossa: quo nihil dici poterat ineptius.

E X M. V E R G. C O M M.

Semel tantum Mari (modo illud huic idem sit) Plinius meminit. 12. volumine cap. 24. tantaque breuitate, ut quale id sibi fuerit, non facile intelligatur. Nihil enim ultra tradidit, quæ nasci in Aegypto Maron peiusque Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, minuta, ac odorata. Nihil enim de Maro in censu medicæ materiæ Paulus Aegineta docuit. Et qui nobis sunt græci & latini uetustissimi Dioscorides, nullum hoc loco, neque alibi Maron ostendunt. Ex eo nihil in peregrina planta, & ad Meandrum in Lydia nascente, præter pauciora illa ex Plinio accepta, dici a nobis potuerunt. Non tacebimus tamen, uideri nobis in eius historia non satis inter se conuenire, scriptorem hunc nostrum, & Plinium. Hic herbam omnibus notam, surculosam, flore Origanis: ideoque Origanida, quasi minorem Origanum dictam, cædioribus Origanis folijs, & multo odoratiore flore describit: inter nostrates præterea, & si ad Magnesiam & Tralles nasci dicat, nostrique orbis odoratas alias numerat herbas Melilotum, Acinon, & Baccareum. Ex quo credendum, similem, & natura congenerem illis esse. Plinius contra, suum Maron inter peregrinos odoratos frutices numerat Ligustrum, & Aspalathum: & ab historia Aspalathi statim in Aegypto nasci Maron dicit: non absurda penitus suspitione, si quis dubitet, non esse Plinii & Dioscori idem Maron. Nobis ob eas quas diximus causas, in dinat animus, diuersa esse. Acceditque opinioni nostræ, quæ Plinius in Aegypto nasci Maron tradit: licetque peius Lydio, in quo poterit Magnesium hoc, & Trallianum forte intelligi: quoniam ad Meandrum in Lydia utraque ciuitas illa fuit: hic tamen Aegypti non meminit, quod relinquentum in censu bonitatis non erat, sed simpliciter ad Magnesiam & Tralles nasci dixit. Plinius præterea folia Lydiæ Mari, hic flores odoratos esse dixit. Sed quod ratiocinari in tota hac re & animaduertere aliquem oporteat, hic floribus utriusque scriptoris est: quorum alter inter herbas Maron numerat, & Origanon comparat: alter fruticibus coniungit, nec aliter quæ de frutice omnia tradit.

Dioscori, flore Origanis: ideoque Origanida, quasi minorem Origanum dictam, cædioribus Origanis folijs, & multo odoratiore flore describit: inter nostrates præterea, & si ad Magnesiam & Tralles nasci dicat, nostrique orbis odoratas alias numerat herbas Melilotum, Acinon, & Baccareum. Ex quo credendum, similem, & natura congenerem illis esse. Plinius contra, suum Maron inter peregrinos odoratos frutices numerat Ligustrum, & Aspalathum: & ab historia Aspalathi statim in Aegypto nasci Maron dicit: non absurda penitus suspitione, si quis dubitet, non esse Plinii & Dioscori idem Maron. Nobis ob eas quas diximus causas, in dinat animus, diuersa esse. Acceditque opinioni nostræ, quæ Plinius in Aegypto nasci Maron tradit: licetque peius Lydio, in quo poterit Magnesium hoc, & Trallianum forte intelligi: quoniam ad Meandrum in Lydia utraque ciuitas illa fuit: hic tamen Aegypti non meminit, quod relinquentum in censu bonitatis non erat, sed simpliciter ad Magnesiam & Tralles nasci dixit. Plinius præterea folia Lydiæ Mari, hic flores odoratos esse dixit. Sed quod ratiocinari in tota hac re & animaduertere aliquem oporteat, hic floribus utriusque scriptoris est: quorum alter inter herbas Maron numerat, & Origanon comparat: alter fruticibus coniungit, nec aliter quæ de frutice omnia tradit.

De Ocimaastro. CAP. XLVIII.

ACINOS, aut Aconos a Græcis dicitur, ab alijs sylvestre Basilicum. Latinis Ocimastrum, tenui siccoque ramulo herba, Ocymo similis, odorata, sed hirsutior. Qua coronæ faciuntur. A nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita paruos, ignemque sacrum sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 15.

Differt Acinos ab Acono: quæ Acinos Ocimastrum est, siue Ocimi sylvestris genus: Aconos spinosa, breuis & lata herba, Eryngio a quibusdam contributa, spinis latioribus. Acinos familiaris Aegypto herba, coronarum & ciborum gratia obseritur: sponte uero nascitur æquinoctio. Hanc et Acinoen, & Acinean Plinius appellat, & Epipetron, nuncque florentem. Acquinoctio inquit nascuntur Aphace, Achine, quam Epipetron uocant. Ut nesciam tamen, legendum ita sit, an illo modo potius, Acquinoctio nascuntur Aphace, Acinos, & quam Apipetron uocant, quæ nuncque floret. Ut duo genera faciamus, Acinoen, et Epipetron. Alioquin Theophrastus, unde Plinius, ea mutatus est, Epimetron quidem (ita enim ipse nominat) nuncque florere scribit. De Acino

mentionem nullam habet. Hippocrates Epipetron ad tumores & inflammationes cōmendat, illi
tu folijs eius decoctis & impositis. Hancipiam propriatē. Acino Dioscorides adscribitur
coniectari liceat, Plinij verba quæ prætexit, legenda esse in hunc modum, Aequinoctio nas-
cuntur Aphace & Acinos, quam Epipetron uocant. Mirum grauissimos auctores Plinium, &
Dioscoridem in huius herbarū medicinis cōtraria præcipere, alterum cieri ea posse menses & uri-
nas, altero contineri. Nec illud mihi abierit idictum, primo & uigesimo libro, priore mentio-
ne (bis enim loquitur ibi Plinius de Acino) in uteruis aliquot codicibus, non Acinon, siue Aci-
nōen, sed Chenopos legi, quo nomine asnerino pedi similis herba significatur. Sed corruptum
locum suspicor, etiam li Chenopos quoq; celebratur herba.

E X M. V E R G. C O M M.

EX M. VERG. COMM.

Quod hæcenus legerim, nulla Theophrastus in plantis suis Aminos eff. Plinius pluribus locis Acini meminisse, sed ut modo Acinum, modo mutatis aliquibus literis Acinoen, Ilbarij magis scripserint, quæ ipse nihilque certius his quæ ab hoc scriptore accepta lib. 11. cap. 27. his uerbis tradidit, Acinon & coronarum caula, & ciborum Aegyptij setunt. Eademque erat quæ Ocimum, nisi hirsutior ramis & folijs esset, & admodum odorata. Quod foliū non est illi cum hoc scriptore idem, mentes & urinæ sunt, quos hic sistere, Plinius dicit Acinum testatur. Dioscoridi tamen subscribit Paulus Aegineta in 6. mediocres adstringendi uires habere Acinon, dicens, ideoque potâ mentes & aluum sistere. Nunquid florere Acinum, idem Plinius eodem uolumine, sed cap. 17. ait. Qua floris priuatione & nota, non male forsitan suspicetur aliquis, quæ Theophrastus, s. de plantarum historia uolumine Epimeton uocat, hisque uerbis tradit, *ἡν αὖτε ἡ ἀμῖνος ἡν αὖτε, κατὰ μέρος καὶ τὸ ἐπὶ μῖνον*, quod est, Quædam etiam omnino non florent, ut Epimeton, Acino huc eandem esse, & quam Plinius eodem loco Epipeton dicitur, ut in alterutro u. uis literæ tantum utrum sit, Plinij uerba sunt. Et æquinoctio nascens Aphace, Aminos, quam Epipeton uocant, quæ nunquid floret. Serii in hortis Acino a quibusdam hac ait, Aegyptios intelligens: qui ad coronas & cibos ea passim uteretur. Ocimo notissimo cunctis olei similis Aminos est: ob eamque similitudinem a posterioribus addita huic scriptori uox illa est. A quibusdam syluestre Basilicum dici Acinon: quoniam quod grecis & latinis Ocimum fuit, nobis ex multo tempore Basilici in quotidiano sermonis usu est. Non multi tamen facienda uox ea est.

¶ De Bacchare. C A P. XLIX.

BACCHARIS hærba fruticosâ, quæ in coronas addit. Cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verbasci magnitudine. Caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendicibus aliquantulum asperis, flore purpureo subalicante, odorato. Radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proximus. Asperum, squallidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsiis, præcipitatis, spirandi difficultati salutaris. Item diurnæ tussi, & urinæ difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus utilissime datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in deflectionibus prodest. In diapsmata utiliter inseritur, iucundus odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. Oculorum inflammationibus, mammis tumentibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliant. Odor somnû gignit.

B A R B A R I C O R O L L.

B A R B A R I C O R O L L.

Baccharis, quæ & Baccar dicitur, qua fascinum depellitur, radicis dumtaxat florif. odorati effra quibdam uocata Nardum Rusticum falso, cum Nardus Rustica fit Afari. Oleum, & unguenta ex ea radice fieri soliti, Hippocrates, & Cephisiodorus, & Aristophanes poetæ testes sunt. Vnde quidam errore ducti, Barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodorus, & pedes eo lini consueuisse, ut Aegyptio manus, Sisyphino brachium, malas & papillas Palmeo, Amaracino comam & cilia, Serpillino ceruicem & genua: quod & in comœdia cecinit Aristophanes. Baccharis inquit Galenus, Hippocrati unguenti quoddam Lydium significat. Simili

F Ǳ

Cinum Bacchari Combretum, sed pcerius, & foliorū exilitate usq; in fila extenuatum. Bacchari Plinius Asarū, Dioscorides a nostris appellari uolūt Perpensam, Aretij, & in Illyrico nascētem, cōmendatissimam ad calculos: si modo eadem est cum Perpressa: utroq; em̄ mō legitur, & alterutrum lēctionē deprauatā esse duco. Sunt exemplaria, in quibus nec Perpenfa, nec Perpressa, sed sperfa, siue sparsa scriptum sit. Nō defuere, qui Baccharē genus esse floris existimaret: quem mō Caryophyllon uocamus, sed syluestris: nunc alules ijs spectantur, ab odore ita cognominati, tāta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosę pares, nō inferiores uideri possint, cū eaq; de principatu certant: quando nec colore superantur purpureo, uermiculato, candido: nec odore, nisi q; a longinquo plus olet recens Rosa, iam nihil Rosa fugacius. lōgissima namq; decerpis mora dies. Caryophyllō in triduū, & amplius uita, uigorq; durat. Aliqbus tanta magnitudo, Patuinārum p̄cipue matronarum cura, ut orbem utraq; manu complecti fere nequeas. Folia quaterna, quinq; nonnullis Rosę mō numerosa, mirabili quorundā alabaastro culturę ratione: q; dehiscens, ipso staminiū loco alabastrum ostendit alium, pandentem se paulo post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos Caryophyllon ueteribus fuisse Caltham. Sed cum Virgilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam, nec Plinius a Virgilio dissentiat, nondum uideo qui possit ita statui. A Caltha porro Calthuē uestis genus dicitur, ut a Croci similitudine Crocorula. Quā sit autem Barbarica, cuius mentionem supra modo fecimus, non constat. Nam Sylua barbarica, idest, Confeminea omnino aliud est: quippe quæ ager sit glandibus, & quæ sunt ijs similia, manu conlitus. Nam & uineæ Confeminales dicuntur, in quibus diuersa uitium genera consueverint, autor Columella. Nam sylua Ciminia, cuius omnes fere mētionē habet, Strabo, Plinius, poeta Virgilius, & Silius, in Ethruria monstratur inter coloniam Tusellanam, & Viterbium, & ubi nunc uici lacus dicitur. In ea sylua loca sunt, in quibus depacta in terram non extrahūtur. Fuisse quidem inter Romanum Sabinūq; agrum quæ Sylua diceretur, scio autore Stephano. De Sylua quoq; populi Romani propria, seu hæc, seu alia Cicero in actionibus suis contra Rullum Tr. Pl. meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine cum de Asaro ageremus, multa quæ ad Baccharē pertinerēt. Illudq; p̄cipue tunc legentes monuimus, non illic, sed hoc loco priuatim de ea nobis agendum fore: quod reddere modo nos decet: & si non adco multum sit quod in notissima omnibus planta repeti ex antiquis possit, aut debeat. Satis eam descripsit Plinius libro. 21. capite. 6. satis & rura omnia uolentibus eam ostendunt. Nosq; utriusq; Plinij scilicet, & ruris auxilio, qd erat in scriptore hoc, amare Baccharē aspera loca, & *ὑγρὰ*, idest, uliginosa & humentia, in cōtrarium habitum detorsimus: diximusq; rati antiquam fuisse lēctionem, *ὑγρὰ*, nec humidat: propter ea, q; Plinius ait, Gracili, nec humido solo prouenit: & in quibus ea nascitur locis, aq; & humore omni plerumq; carent.

De Ruta. C A P. L.

ῥύγιον

Ruta duplex, Montana, quam aliqui Rhyten montanā uocāt: & hortenſis, quā Aegyptij Epnubū, Syri Armala, alij Besafa. Aphri Churma. Mōtana syluestrisq; acrior est, & in cibis damnata. Satiua uero quæ sub arbore Ficus enascitur, magis in cibos admittit. Vtraq; urit, calfacit, exulcerat. Vrinā ciet. Mēstrua pellit. Aluū sistit potu, ciboue. Lētalium medicamentorū antidotū est, si semen ex uino acetabuli mensura ebibatur. Folia per se p̄sumpta, aut cū nuce iuglādē, aridifq; ficis, inefficaces uenenorū uires reddūt. Cōtra serpētes simili mō sumere cōuenit. Geniturā cibo, potuue extinguit. Cū Anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pētoris laterūq; dolores, difficultatē spirandi, tusses, pulmonis inflāmationē, coxendicū articularūq; cruciatus, & rigores febriū circūitu repetentes, pota ut antedictū est. Item ad inflāmationes coli, uuluae, rectiq; intestini, decocta & imposita. Fœminas uuluae strangulatu liberat, si a generali sedetenus cum melle subiiciatur,

Feruefacta ex oleo & pota, uētris tineas excutit. Articularijs doloribus **A** ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxilia-
tur, decocta in uino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda, conditaq; ci-
bo, uisus aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Dolori-
bus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus
sanguinem sistit, trita et indita. Testium inflammationibus cum laureis
folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cærato pro-
dest. Cum pipere autem & nitro affricta, albæ utiligini medetur. Cū
eisdem illita fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repre-
sentant. Contra impetigines cum alumine & melle utilissime imponi-
tur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter in-
funditur. Hebetudinem oculi qui sensere, Ruta cum Fœniculi succo
ac mellē peruncti iuuauit. Ignem sacrū, ulcera quæ serpunt, aut in ca-
pite manant, cum aceto rosaceo & cerusa persanat. Mansa Alliorū, Ce-
parumq; acrimoniā domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum
florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, et rubore quodam
inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. Oportet itaq; eam un-
ctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pul- **B**
lis insparsum feles arcerē. Adijciūt eam quæ in Macedonia circa Olci-
mū annem prodeat, comedentes interimere. Montosus aut is locus, ui-
peris scatet. Semen eius potū cōtra intestina uitia efficax est. In antido-
ta cōmode additur. Contra incontinentiam urinæ, tostū semen septe-
nis diebus potui datur. Radix huius montanum Moly uocatur. Sylue-
stris Ruta fatiux similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum do-
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Acrior est uiribus q̃ horten-
sis & ualidior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Rutam, ut alia quoq; olera, quæ diu uiuunt, unitas caudicis, & p̃grandes ramī, quos Acré-
monas, & Cremonas quandoq; Græci uocant, arborem uideri faciunt. Latiora fatiux folia,
Rami fruticosiores. Cicuta Rutæ aduersa, probabili argumento: quoniam colligentes Rutam,
manus Cicutæ succo muniūt sculptores, pictoresq; Ruta in cibo utuntur, p̃pter uisum. Mustel-
la cum serpente dimicatura, in murium uenatu, Rutam prius edit. Pythagoras marem minori-
bus & latioribus folijs, & coloris herbacei, discreuit a fœmina & odore. Humorē, simū, hyemā
Ruta odit: apricis gaudet & siccaneis, terra q̃ maxime lateritiā, & cinere: qui & miscetur sementi
ti, ut careat erucis. Mustū Rutarum populo Romano dari solitum, non ignotum est.

Pli. li. 10. cā. 14.

¶ De Syluestri Ruta. C A P. LI.

Rutam syluestrem aliqui appellant Hypericō, alijs Androsēmō, πύραρον ὑγρίον
alijs Coron, alijs Chamæpityn, Romani Hederalem, aut Cento-
nalē, Aphri Churma semmaced. Odor seminis resinofus est. Ideo Cha-
mæpitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens. Folia
Rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant. Vn-
de Androsæmon uocitarur. Ramuli subhirsuti. Siliquæ teretes hordei
effigie, in quibus semen nigrū resinā olens. Gignitur in cultis & aspe-

Cris. Vrinam ciet. Menses appositu trahit. Pota cum uino, quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitu medentur. Et diebus quadraginta epota ischiadicos sanant. Vocant etiamnum hoc modo syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae caucitima Moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos. Folijs multo quam alterius Rutae longioribus, tenerioribusque, odore graui, flore candido, capitulis in cacumine paulo maioribus quam fatiuae Rutae, quae tribus maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruffum, gustu amarum recluditur. Cuius est usus. Semen autumnio maturefcit. Quod cum melle, uino, croco & sceniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Armalam uocent, Syri Besaffan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In collibus & laeto solo prouenit.

Rutae syluestris proprium genus est. Montana haec, & uulgaris. Sed & Hipericon nonnulli ad Rutam syluestrem referunt: de quo inferius.

Ruta Galatica haec est, quam Plinius intelligit praecipuam in antidotis.

B A R B A R I C O R O L L.

De Moly. CAP. LII.

MOly aliqui syluestre Leucoion appellant. Folia habet graminis, latiora, humi sparsa, florem albae uiolae similem, sed minorem, lactei coloris. Caulem candidum, quaternum cubitorum. In cuius cacumine inest aliquid quod Allij speciem referat. Radix parua, bulbosa, quae mirum in modum ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum irino unguento in pello subiiciatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 4.

MOly Homericum, Phineo & Cyllene Arcadiae uernaculum, radice nigra, Cepae magnitudine, rotunda, folio Scyllae. Negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, diffculter effodit: affirmat Plinius. Hanc uates ille a Dijs uocari putat Moly, Mercurium inuentorem fuisse, Vlixique contra Circes ueneficia monstratam, Ouidius. 14. Metamorph. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum.

Aliqui florem eius non candidum, ut Homerus, sed luteum pinxere. Plinius in Campania effossam, aegre inter difficultates faxeas & allatam sibi meminit, radice triginta pedes longae, ac ne sic quidem solidae, sed abruptae. Tale uerum est Moly. Dicitur & Moly Ruta Galaticae, de qua diximus: quod solum aetate nostra medici nouere, Harmela uocantes: quemadmodum & Dioscorides & Galenus a Syris dici eam testantur. Differt ab hac Molon, quam & Syron dici tradit Plinius, etiam si Oestron, non Syron in exemplaribus quibusdam legitur, scapo striato, folijs paruis, mollibus, radice quatuor digitorum, in qua extrema Allij caput est: anhelantibus, & stomacho pedesse credita.

E X M. V E R G. C O M M.

QUOD in graecis & latinis poetis passim auditur, & celebratur Moly, Homericum, illud est, quod contra Circes ueneficia Vlyx Mercurius armauit: & in quo describendo poeta ille pluries decima Odysseae Rhapsodia cecinit uersus. *ὡς ἔρα φωνήας πέρι φάρμακον ἀρριφόντης, ἡ γαῖος ἱστῶς, ἔχθ' μοι φέρειν ἀνθρώτ' ἰδούσιν. ἥ μιν μύθων ἔπει γάλακτι δὴ ἔμυλον ἄνθος. μέλαν δὲ μιν καλοῦσι θεοὶ, καλεῖσθαι δὲ τ' ὀφίαιται. ἀνδράσιν γινώσκουσι θεοὶ δὲ τε πάντα δυνάσασθαι.* Quodque Naso in Trans formationibus suis dixit. Pacifer huic florem dederat Cyllenius album, Moly uocant Superi, nigra radice retentum. Et quod in Priapeis carminibus auditur. Hinc legitur radix de qua flos lacteus ex it, Quam cur Moly uocant: mentula Moly fuit. Omnia nullam habent, nisi ex Homericis illo

figmēto causam & rationē. Quam tamē graues græcorū & latinorū scriptores, honorem hunc principi omnium poetarum, ut nos credimus, habentes, tanti fecerint, ut Theophrastus libro nono de plantarum historia Moly describens, Homero, præterquam in radice, subscripserit: testatus in Phæneo & Cyllene Arcadiæ nasci, quale Homerus cecinit, radice rotunda, ceposque, folio Scyllæ: usumque eius contra ueneficia & excantationes esse: non tamen difficulter, ut Homerus dixerat, ex terra effodi. Et post Theophrastum Plinius libro uigesimo quinto capite quarto, omnia a Theophrasto dicta Romanos docens, hæc amplius tradiderit, nigro colore radicem eius esse: nec candido flore, sed luteo ab aliquibus græcis describi: nascique in Italia, & ab herbarum peritis medicis sua ætate allatum sibi ex Campania, inter difficultates saxæas natum, radicis triginta pedum: quæ nec tota effossa esset, sed abrupta. Ex his tam multis, tantæque auctoritatis ad hanc rem testibus, ratio cinari, colligereque necesse est, proprium habere genus inter herbas Moly: nomineque hoc non syluestrem Rutam, sed sui generis herbam communiter indicari: in Galatia tamen & Asia priuatim syluestrem Rutam eo appellari. Quod manifeste in sexto Paulus Aegineta indicat, de eo his uerbis agens. Moly, quod agrestem Rutam aliqui. &c. Et præter Paulum in græcis & latinis omnes fere alij in agresti Ruta hoc nomine utentes, non aliam ob causam, quæ in Cappadociæ & Asiæ Galatia syluestris Ruta, ut hic paulo ante testatus est, eo indicabatur. Neque ætate hac nostra Moly aliud, quæ syluestrem Rutam significat: eam scilicet quæ Plinius in Galatia nascentem, in antidotis præcipue laudauit, Galatiam appellans. Dioscorides tamen aliud a Ruta Moly esse intelligens, cum de agresti Ruta testatus esset Moly a quibusdam uocari: de eo quod priuatim Moly ab Homero & Theophrasto dictū, egit, ex proprijs notis eum legentibus ostendens. Vidimus nos undique scriptoris huius historiae, præterque in flore, respondentem plantam: quem luteo, non candido, & ut hic ait lacteo colore ostendebat: ex quo non penitus uanum opinati sumus quod a Plinio dicitur, tradidisse quosdam luteo flore Moly esse. Verum tamen contra Homerum & Theophrastum temere quispiam aliquid dixerit: neque ego id ausim: cum similitudo naturæ in huiuscemodi late pateat, & ea multiplici uarietate solita sit suos diuersis locis flores effingere. Non relinquendum illud etiam, quod parum uerisimile est, proferre Moly hoc caulē altitudine cubitorum quatuor: suspicamurque nos in cubitorum numero uitium esse: neque enim herba, fruticisue, quale Moly nunc ostenditur, sed arboris legitima altitudo ea est.

De Panace.

C A P. LIII.

PAnax nonnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi solet. Plurima ex parte in Beotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur. Ibiq; compendij causa studiose colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, hærbacei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis. Caule, ut Ferulæ altissimo, qui lanugine quadam incanescit. Folijs etiam minutioribus obsitus. Muscaris ceu Anethi in cacumine. Flore luteo, & semine odorato, feruenteq;. Radices habet multas ab origine una candidas, graue olentes, crassi corticis & amari. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excusato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus albæ, rigidæ, & siccæ, ingustabiles, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media Ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quam amarissimus, interne albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, læuis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliquescent, græ-

Cui odore. Niger improbat ac mollis. Adulteratur Ammoniaco, aut Cæra. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febriū rigoribus, uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra uesicæ scabiem ex aqua mulsâ, aut uino bibitur. Menses trahit. Fœtum enecat. Inflationes quæ uuluum male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. Acopis, & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum uua passa illitus, subuenit. Dolor dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & Pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramenta radices uulvæ admota, partus extrahunt. Ad uetera ulcera efficac est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit. Cum Aristolochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum ei aculantur. Contra uulvæ strangulatus in uino bibitur.

Plin. lib. 25. capit. 4. & 11.

B A R B A R I C O R O L L.

Panaces generibus continetur pluribus. Syriū nascitur unguētis: quod & in Psophide Arcadiæ, circaq; Erymanthi fontes gignitur. Ferula sui generis quinque cubitorum, folijs quaternis, mox senis, humi stratis, ampla magnitudine, rotundis in cacumen, oleagineis. Radix autumno, caulibus messibus inciditur. Precium succo, in libras bini asses, erant candido. Laudatur enim in primis candor eius coacti: sequens pallido statera, Niger colos, & mollicia improbat: id quod ex Macedonia affertur, Bucolicon uocant: quoniā armentarij succum excipiant erum pentē sponte. Hoc celerrime euanescit. Secundū genus Asclepion. Tertium Heradion. Quartum Chironion. Quintū Centaurion, & Pharnaceon. Theophrastus primū genus Heradion uocauit, folio magno & lato, undiq; sesquipedem. Radice digitum crassa, bifida, trifidaq; sub salsa, odore turis. Idem auctor & Panaceam noiat, circa Clitorium nascentem in Arcadia. Nec constat, an hæc idem sit habenda, quod Panaces Arcadicū, de quo per huius capitis initia disferui. Panaces ipso nomine morborum omnium remedia promittit: ob id & medicamento ad uina quæ corrumpi nolunt, Panacæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsa, religio erat, impleri scrobem eius uario frugum placentarumq; genere, in mercedem uidelicet & piamentum terræ. Panaces, & Panax, Galeno teste dici solita.

E X M. V E R G. C O M M.

Libeter in Herculeo Panace hoc, & alijs quæ statim sequuntur, Asclepio scilicet, & Chironio, ut in bonorū uirorū arbitrijs quotidie sit, tertium aliquē dari mihi uelim, qui diuersa, contrariâq; de omni Panace sentientibus duobus maximis auctoribus, scriptore hoc, & Theophrasto, alteri accedens, non leuē dirimeret litem, & certiore aliqua nota, ex tam multis unū saltem Panaces nobis ostenderet. Turpiter em̄, nec sine graui iactura ignoratur, quod solo audito nomine, malorū omnium medicinā, & remedia homini pollicetur. Licet ad hanc rem Plinio uti: sed alienæ potius historiæ interpres, q̄ suæ assertor ille est: miscensq; duorū sæpenumero simul scriptorum dicta, difficiolora omnia, & minus certa legentibus facit: nunc peregrinā Italiæ plantam, & unguētis utilem in Syria nascentem, nunc in hortis nostris constam, & in uitæ quotidiano usu receptā: nunc ex tam multis eius generibus unum tantū docens, modo multa & plura q̄ hic & Theophrastus numerās. Quo fit, ut in tanti nominis apud ueteres planta, nostra uero ætate non satis nota, difficiolora omnia futura sint.

Panax Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus q̄ sceniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aureo flore, acri, odorato, ex muscarijs dependente. Radix parua est & tenuis.

C A P. LIIII.

Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedænas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant, alij Cunilam: de qua in Origani mentione diximus.

PANACES Aſclepiō, dictum aiunt, quoniā is filiam Panacīa uocauerit. Huius radicē Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit: quod quidē priorū gñi a Dioscoride tribuitur. Est & Heraction appellatū, Herculi ascriptū inuentori, quod ab alijs Origanū Heracleoticum syluestre accipitur. Quidā Heracion intelligunt genus id, qđ mentione proxima descripsimus.

BARBARI COROLL.
Quæ hic Aſclepiū Panaces, folia Feniculo similla habere dixit Theophrastus li. 9. de plantarū historia, Thapsiæ nulla diuersitate cōparauit. Sigdem Thapsia Feniculi folio est: ut hic in eius historia non multo post dicit. Idē radicem Panacis huius crassam, & candidā esse dixit. Verba eius sunt. τὸ δ' ἀσκληπιον πῶς ῥίξαν μῆκος μὴ ἔσιν ὡς αἰσθάμην, λευκὴν δὲ καὶ παχύναν σφῶδρα. Eiusq; nos accedēte testimonio pbauius, qđ in uetustissimo & oim. pbatissimo mihi codice legebat, ῥίξα δὲ μικρὰ λευκὴ, qđ est, breuis & candida, Multus, & paulominus q̄ ubiq; in impresso codice hic error est: ut λεπὸν, & λευκόν, quorū alterū tenue, alterū candidū significat, in uicem cōmurent. Quāq; alij tenuē uerterūt, nos Theophrasti et melioris codicis fide adiuti, candidā diximus. Non posse autē tenuē legi, idē Theophrastus indicat, dicens, σφῶδρα παχύναν, i. ualde crassam esse. Superest, ut de longitudine eius etiā aliquid dicamus. Theophrastus αἰσθημαῖαν, i. do drantalē dicit: hic μικρὴν, i. parua, & si in melioribus græcis μακρὴν, i. longā legatur.

PANACES Chironiō. **CAP. LV.**
Folium eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua, quæ non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma eadem præstat.

BARBARI COROLL.
Panaces Chironion, & hoc ab inuēto. Folii Rumicis Theophrastus & Plinius ei reddūt, maius tamē & hirsutius, radice parua. Nascitur locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoq; amplius q̄ supradicta prodest. Est & genus aliud Panacis ab eodem Chirone inuentū, & Centaurion cognominatū. Sed & Pharnaceon in controuersia inuentionis a Rege Pharnace deductum. Seritur hoc longioribus q̄ cætera folijs, & serratis. Radix odorata, in umbra siccatur, & gratiā uino adjicit. Huius duo genera fecere, alterū leuioris folij, alterū tenuioris.

EX M. VERG. COMM.
Discrepant toto genere in historia foliorū Chironij Panacis Theophrastus, & hic scriptor. Ille em̄ Lapatho, quæ latinis Rumex est, eā comparauit. ἔχει δὲ τὸ μὲν χειρῶνιον φύλλον μὲν ὁμοίον λαπθῶ, μῆλον δὲ καὶ διαστῆρον. Quibus uerbis, nisi uitiosa sint, certius aliquid audiri non potest. Hic, φύλλα δὲ ἔχει ἀμαράνθιν ὁμοία, quæ id indicant, quod nos paulo ante diximus, folio Amaraci est: quod in tam grauibz, antiquisq; scriptoribus merito aliquis demiret: multoq; magis, q̄ uterq; habet antiquos alios scriptores idem in cōmentarijs suis testatos. Hic scriptor Nī candrū in Theriacis suis, qui de Chironio Panace hoc agens, ait, πρῶτον μὲν χειρῶνος ἰακθῆα ῥίξαν ἰαλὴν, κενθῶρον προνιδάο φερανόμενον ἢν ποτὶ χειρῶν, πελιδνὸν ἐν νιφάτοι μὲν ἰσχυρῶς διηρῶ, τῷ μὲν ἀμαραντίασιν ἡπιότα χυτὴ περὶ διδραμοὶ χαίται ἄνθη. &c. Quorū is est sensus, qui non multo ante in Herculeo Panace dictus a nobis fuit, idq; amplius. Quod Amaraco similis fusa: circūuoluitur coma. ἀμαράνθιν enim ille Amaraco similem dixit. Ille Plinium, qui lib. 25. capite. 4. de Chironto Panace ait, folium eius Lapatho simile, maius tamen, & hirsutius. Quæ licet iisdem uerbis ex Theophrasto reddita ab eo fuerint, nec maior ob id fides huic historiæ accedat, antiquam saltem Theophrasti eam fuisse lectionem testantur. Graues utrinq; scriptores stant, nec leui auctoritate utrinq; pugnat: & in re non satis nostra ætate certa, difficillimum est censere aliquid: inuenisq; quomodo Rumicis & Amaraci folijs, quorū grandius alterum, alterum breuius est, comparari eodem tēpore folium aliquod possit. Nisi forte dixerit aliquis, in altero figurā, in altero quantitatem in comparatione æstimari. Verū in tanto discrimine parum uerisimile id

C est. Solent enim cognomines plantæ, quales hæ sunt, maiore sui parte inuicè sibi similes esse. Idque in Origanis, Vellicarijs, utroque Elleboro, alijsque huiuscemodi manifeste deprehenditur. Neque ego is sum, qui facile persuadear. Si Herculeum Panaces, quod hic ait folia habere *πρὸς τὰ τῆς οὐκίας*, quod est, ad ficulnei folij figuram, multoque magis magnitudinè: & Theophrastus *φύλλον ἵχθυμίδα καὶ πλάτυ καὶ τριωιδωμένον πανταχῇ*, quod est, habere Herculeum Panaces folium grande, latum, & in omnes partes trinis dodrantibus, Chironium hoc ob similitudinem Panaces, itidem appellatum folio Amaraci esse. Inclinat ob eam causam animus in Theophrastum, qui Rumi-
cis folio Chironij huius Panacis folia comparauerit, quæ grandia Panacum omnium folijs magis congruent. Quodque a Nicandro & scriptore hoc de Amaraco dicitur, odoris, coloris, aut figuræ tantum rationem habere. Legentibus tamen & herbarum peritioribus liberum & arbitrium hoc, quemadmodum & multa alia, relinquatur.

De Ligustico.

C A P. LVI.

Λιγυστικόν

Ligusticum, quod alij Panaciam, alij Panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino. Unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant. Quoniam & radice & caule Heracleotico Panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Cignitur in altissimis asperisque montibus, ac umbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculum fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circumitu folia Sertulæ campanæ molliora, odorata, prope uerticem graciliora, & longe magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblongum, sceniculo proximum, gustanti acre & Aroma olens. Radix candida, Heracleotici Panacis similis, odorata. Radicis
D seminisque uis excafactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgat. Et contra serpentium ictus. Vrinæ, & menses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus ammiscetur. Stomacho perque utile. Quare pro pere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alij semen Foeniculi, aut Seselis ammiscentes, Ligusticum dolo uitiant.

Pli. li. 19. ca. 8.

B A R B A R I C O R O L L.

Ligusticum syluestre est in Liguriæ suæ montibus: sed seritur ubique, quod & suauius est, quam sine uiribus. Crateias apud Græcos, Cunilam Bubulam eo nomine intelligit falso. Cæteri fere Cuntzaminem, Cunilaginemque. Ligusticum Galenus unius inuersione literæ, Li-
bysticon appellat.

E X M. V E R G. C O M M.

Pro Piperis Ligustici semine utebatur ubique antiqua & rustica plebs, serebatque in hortis suis: licet non adeo efficax, ut in montanis Liguriæ per se nascens: non tam quia Piperis eam nondum copia miserat India, quàm nostra ætas, peragrato omni Indico mari, habet: quando, quia peregrinis mercibus libenter abstinentes, non minus sibi, quam alijs in obsoniorum conditis liberalem fuisse naturam indicare uoluerunt. Ideoque quibus regio hæc nostra abundat, libenter utebantur. Sentiebant etiam, quas habet nimias Piper in calefaciendo & siccando uires, parentisque illi, ex montibus, hortisque suis ad coenam saporem, uiresque eius alias quærebant. Præstabant id multa quondam in herbarum & seminum genere, sed Ligusticum præsertim: quo Columella ultimo ultimi libri capite ad Oxypora uti docuit. Frequens peculiarisque Apennini montis ad Alpes planta hæc est: a gente inuento nomine, quod etiam a græcis omnibus receptum fuerit, idque ex Galeno scriptore hoc, cunctisque alijs patet, in Liguria nasci testantibus: & si ut paulo ante diximus, in hortis seri postea coeperit: ne ex India, longinquisque locis repe-

tendum esset, quod sapore Piperis obsōnia & pulmentaria eorū temporū cōmēdaret. Cre-
dimusq; nos, esse hoc quod Columella lib. 12. Panacis nomine autumnō, & vere feri iubet, leni
& subacta terra, raris interuallis, quo maius incrementū capiat. Idem quo diximus paulo ante
loco Oxyporis misceri Ligusticū iubet; & qualia antiquis Oxypora essent, & quo modo confi-
cerent, longissime etiā docuit: sic dicta, q; aceto condita ad intinctus feriantur.

De Pastinaca.

CAP. LVII.

Pastinacam syluestrem, aliqui Ceraconiam uocant, Latini rustici
cam Pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babubyrion, Aphri
Sicham. Folia Gingidij habet, latiora, subamara, caulem rectum, sca-
brum. Umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in
medio purpurcum quiddam, ferme croceum. Radix digiti crassitudi-
ne, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen porum uel impo-
situm menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinæ difficultas
torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit. Serpen-
tium moribus ictibusq; prodest. Præsumentes eam, nulla affici iniuria
a serpentibus traduntur. Conceptus adiuuat. Radix urinam pellit.
Venerem stimulat. Partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle im-
posita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, ineffica-
cior tamen, & cibo aptior.

BARBARI COROLL.

Pastinaca syluestris, siue quod idem est Erratica & pratensis, ad differentiam satiuæ dicitur.
Præfertur satiuæ syluestris in medicina, magisq; in petrosis nata. Pastinacæ omni radicibus
calens natura, sapor uehemens, ob id Venerem ciere creditur, & propterea Philtron uocari.
Cartilaginei omnis generis. Satiua in cibum utilis esse incipit annicula. Bima uulior, gra-
tior autumnō, patinisq; maxime, & sic quoq; uirus intractabile illi est, ut inquit Plinius. De
Hibisco & Dauco, quæ simillima existimantur Pastinacæ, dicemus suis locis. Diximus & de
Sisere, cui cum Pastinaca uicinitas eadem est. Pastinacam Diocles medicus non Staphylinum,
ut cæteri, sed Astaphylinum uocauit, duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulis,
crassitudo palmorum quatuor.

EX M. VERG. COMM.

DVplex genus Pastinacæ, satiuæ, scilicet & agreste. Rursusq; agrestis multiplex. Potius di-
uisio q; genus suspitionē quorundā merito auxit, sit ne agrestis Pastinacæ idē Daucus, an alteri
us generis herba: præsertim duobus capitibus, diuersisq; locis de utroq; tradente scriptore
hoc. Verum ex his, quæ in græcis & latinis obseruata diu a nobis fuerunt, sciendum illud est,
Staphylinum a græcis simpliciter Pastinacam dici olus, & oleris notissimam, & quotidiani
us radicem: nullaq; adiecta nota alia, satiuam semper intelligi. Sic Columella in carmine
suo cecinit. Læturet, mollemq; sinum Staphylinus inumbret. Serperea enim in hortis tunc
numerabat. Idem libro decimo capite quarto, Tunc agrestis Pastinaca, & eiusdem nominis
Edōmita, quam Græci Staphylinum uocant: Edomitam satiuam intelligens. Sic rei rusticæ
& hortensium scriptores aliq. Plinius, quoniā utriusq; quotidianus esset usus, satiuæ, agrestis
ue addito discrimine, alterutram plerunq; indicat. Habet satiuæ hæc, ut fere in plantarum genere
omnia, diuersam sibi syluestrem nascentem ubiq;: multi usus & ipsam, & in medicina præfer-
tim. Nam satiuæ illa præcipuum habet in sanitate inter olera usum. Syluestris uenit & ipsa qui-
dem in quotidianos cibos, sed ob multas, quas habet medicas uires, a medicis celebratur, &
expetitur magis. Hanc Græci nuncq; nisi addito syluestris discrimine, appellant, *σταφυλίνον* &
γρη uocantes, id est, Pastinacam syluestrem. Intelliguntq; eam, quæ locis incultis nascens,
Satiuæ pariter frondeat & floreat, sed minore radice, & magis fibrata sit. Syluestrem hanc
idem Græci, ut certiore uocis discrimine a satiuâ illa separaretur, Daucum dixerunt. Testis
pluribus locis Galenus: qui de utroq; Staphylinio agens, ait, ὁ δὲ σταφυλίνος ὁ ἀπὸ τοῦ σταφυλίνου ὁ δὲ γρη
ὅς ἐστιν ἀπὸ τοῦ σταφυλίνου, Quod est, Satiua quidem Pastinaca ignauior: agrestis uero, quâ Daucū uo-

A

σταφυλίνον γρη

Pli. li. 19. c. 17.

B

Cant. &c. Agrestem Staphylinū, Daucum tantū nominis auctor vocari tradidit. Testis Paulus Aegineta lib. 6. de simplicibus agens. *Δαῦκος ὁ καὶ σταφυλίνος*, quod est, Daucus, qui & Staphylinus. Sed manifestius primo volumine capite de his quæ edendo radices habent: in quo cum plures alias numerasset radices, *σταφυλίνον καὶ Δαῦκον*, ait: quod est: Staphylini autē & Dauci, sativam, & sylvestrem Pastinacā intelligens. Plinius præterea multis locis, & ipse congenerū duarū radicū discrimina aperte indicavit. Nec dubitandū cuiuspiam sit, quin Staphylinus græcis, & Pastinaca latinis simpliciter dicta, in hortis consistant non significet, longiorem, crassio rem, nec fibris capillamentisue torquor sylvestris in terra hærentem: Daucus uero illis, nobis agrestis Pastinaca, sylvestrem illam significet in arvis, pratis, & incultis locis per se nascetum. Cuius radix per hyemem satis grata in cibis etiā sit. Estur enim cruda in acetarijs, sed cōcta suavius responderet & sapit. Rura nostra sativā illam Pastinacam, Sylvestrem non multo diversā uoce, mutatisq; tantū aliquot literis appellant: ut ex hoc etiā congeneres herbas esse cōnectere liceat. Superest modo, ut dicamus, si sativa tantū, & agrestis Pastinaca sit: illaq; simpliciter Pastinaca, hæc Daucus quondā, aut sylvestris Pastinaca dicta fuerit: cūr duobus capitibus, diversis locis, primūq; sub titulo agrestis Pastinacæ, mox sub Dauci uoce de eadē planta hic scripsor egerit. Quod ex Theophrasto, Plinioq; novisse difficile non fuerit. Neq; em̄ hic, quia diversi oīno generis sunt, sylvestris Staphylinus, & Daucus duobus locis, & duplici historia de eis egit: sed q; uariatē in diversis gentibus earum herbarū natales & vires naturā, testari in medicina seorsum id oportebat. Plura em̄ Daucorum gēna numeravit antiquitas, non gēne, sed natali solo diversa. Indicatq; id Plinius lib. 19. cap. 4. qui cum agrestem, sativāq; Pastinacā numerasset, moxq; tertiam, quā ille Hibiscum noīat, statim subiecit. Est & quartū genus in eadem similitudine Pastinacæ, quā nostri Gallicā uocant, Græci uero Daucon. Ex quibus cōnectere facile est, quondā in græcis non omnē sylvestrem Pastinacā Daucon, ut postea factū est, sed propriū, priuatimq; aliquod eius genus uocari fuisse: quale Theophrastus lib. 5. de plantarū historia his uerbis indicavit. *Δαῦκον δὲ πρὶς τῷ σταφυλίνῳ τῷ ἑκατέρῳ διαφέρει θερμότητιν φύει, ζῆλον δὲ τῆς μήλων.* quod est, Egregiā bonitate autē Daucus in Achaia: Spartensi agro, calefacit natura, & nigrā habet radicem. Qui color in sativa & agresti Pastinaca nescio an in Italia uisus aliquādo fuerit. Ex eo nō fuerit in hoc scriptore absurdū, bis de eadem plāta diversisq; nominibus actū fuisse. Primū, ut quas habet in medicina vires agrestis oīs Pastinaca, ubiq; nascens indicaret: mox Dauci appellatione Cretica, ut ille in Dauco ait, & certis locis nascens doceretur: cuius propriæ vires propria sibi etiā historia exigerent. Potuit & illud in causa esse, q; quo tempore hic medicinā suam cōmentabatur, Dauci appellatio non oībus sylvestribus Pastinacis respondebat, sed Creticæ tantū. Quos em̄ nos testes citauimus Galenū, & Paulum Aeginetā, cum offenderemus paulo ante eundē illis esse Daucū, & sylvestrem Staphylinū, huic scriptori posteriores fuerūt: & quod certe prius ante eos æstimationē habuerat, mutata ut in cæteris humanis rebus sit uocū fortuna, aliud significare potuit. Quotidie em̄ fieri uidemus, qd Flaccus ait, perire multas, renasci multas subinde uoces, si uel sit usus, Quē penes arbitriū ius est & norma loquendi. Nobis, ut tā multa colligamus, pro cōperto est, agrestem Staphylinū, & Daucum græcis eandē radicem ex multo tempore esse, & a latinis Erraticam Pastinacā uocari: & in hoc scriptore non dammandā eiusdem plantę duplicem historiā. Factum em̄ id est, uel ob diuersas vires & notas, quas Cretensis & in Achaia nascens Daucus haberet, ob quas hic a cōmuni Staphylinino hac uoce separauit: uel in quā partem nos propensiores trahimur, quoniā Dauci uox, antiquiore illa ætate, priuatim inter sylvestres Staphylinos, aliquē indicans, a posterioribus ob similitudinē ad totum eorum genus translata fuerit: pertinetq; eo quod Plinius ait. Est & quartū genus in eadē similitudine Pastinacæ nascens, quā nostri Gallicā uocant: Græci uero Daucon. Ex his em̄ ratiocinaretur, Daucum similē Pastinacæ erraticæ esse, non eundē: & a Romanis nomine gentis distinguī, quemadmodū in græcis a Staphylinino agresti alio noīe distinguebatur. Hunc, siue sylvestrem Staphylinū, siue Daucon appellet aliquis, hic κέρας, id est, cornu uocari ait. Quod & græcorū Lexica testantur, in quibus legitur *σταφυλίνῳ ἄριστος ὅν ἔχει κέρας καλοῦσι*. Credimusq; nos, quod paulo ante dictū est, a cornu forma & longitudine sic dictum a Græcis fuisse. Potuit tamen & alia rōne sic uocari, a fibrata & capillata radice, quā habet. κέρας em̄, ut testatur Plutarchus in libro bello, cui titulus est, Vtrobi, in terrestribus, f. an aquatilibus maior prudētia sit, antiquis græcis τρήξας, i. capillū significabat. Cuius significationis indicium est κέρας & uerbū, quod tondere est: & κενρά nomē, i. tonsura: & qui apud Archilochū *κεροπλάσας* legebat ὁ πρὶς ὑμῶν καλλωπίζων, i. qui in ornāda coma occupat. Quæ snia melior & probanda magis uidet, ob id quod statim sequitur. Sunt qui & comā Staphylinū agrestem, ob eandem scilicet causam uocent.

¶ De Sefeli. CAP. LVIII.

A

Sefeli Massiliense, quod nonnulli Sphagnon uocant, folia Fœni-
culi habet, crassiora, caulem uegetiorem. Umbellā Anethi, in qua
semen oblongum, angulosum, degustanti acre. Radix longa est, iucun-
di odoris. Semen & radix excalfaciendi uim habent. Potu stranguriæ
& orthopniciæ medentur. Suffocationibus mulierum, comitialibusque
profunt. Menfes & partus trahunt. Ad omnia interna mala pollent.
Tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum concoquit, & tormi-
na discutit. Epialis febribus utile. Contra perfrictiones in itineribus, cū
pipere & uino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quo
facilius suos foetus enitantur.

BARBARI COROLL.

Sefeli Massiliense optimum. Lato enim grano & fuluo est; quo & Vultures uescant, & Cær-
uæ pariturae. Sefeli & Sili dicitur, & Seli apud Hippocratem, unde orta confusio Siler pro Sefe-
li uocantiū Arborescit porro Siler, ut baculos rustici ex eo quæ faciant, in aquaticis nascens,
Molle Siler

Pli. li. 20. ca. 9.

a Poeta dictum neutro genere, quod per se rarum sit in arboribus latina lingua. Refugiunt hoc
serpentes. At Sefeli frutex non est aquaticus; quod quidem aliqui distinguere putantes, non Si-
ler, sed montanum Siler appellauerunt id, quod Massiliense est Sefeli.

EX M. VERG. COMM.

ASeminis figura latum Cyminum in græcis, Massiliense Sefeli aliqui ut uidetur appellaue-
runt. Ea uox in antiquis eorum codicibus adhuc seruatur; nec nos eā negleximus, dicente Pli-
nio optimum Massiliense; lato enim grano, & fuluo est.

B

¶ De Aethiopico Sefeli. CAP. LIX.

AEthiopicum Sefeli, quod Aegyptij Cyonum phricen uocant, αἰθιοπικὸν κύων
folia habet Hederæ, minora, & ad Periclymeni modū oblon-
ga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipe-
dalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morem denso, nigro, ama-
ro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suauī.

BARBARI COROLL.

Sefeli Aethyopico dignitas secunda. Hoc & nigrius est, & nascitur hodieque apud nos; sed fru-
stra, medicis officinisque incognitum.

¶ De Peloponnesi Sefeli. CAP. LX.

Peloponnesi folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulem su-
pra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum in cacumi-
ne capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eis-
dem uiribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inue-
nitur etiamnum in Ida monte.

¶ De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

Tordylum, quod aliqui Creticum Sefeli uocant, iuxta Cilici-
am in Ameno monte nascitur, hæbula surculosa, semine du-
plici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ diffi-
cultatem bibitur. Potu cit menfes. Succo seminis caulisque uirentis, ter-
tis obolis ex passio decem diebus hausto, renies sanantur. Efficax est ra-
G

τὸ ὄρδινον

C dix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

BARBARI COROLL.

Tordylon, & Gordylon, & Tordilon & Tordyle dicitur, & Sefeli cognomēto, Creticum inter omnia genera odoratissimum. Tordylen porro, alij semen Sefelis dixerunt, alij herbā per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse Plinius fatetur, q̄ q̄ in montibus nascitur. Paulus non Tordilon, sed Gordylon appellauit.

EX M. VERG. COMM.

Non habet certum in antiqua medicina Tordylon hoc nomen, nec certam penitus historiam: aliter alijs id appellantibus, & de eo tradentibus. Plinius non satis cognouisse rem uidetur, diuerfas ante se scriptorum sententias tantum referens. Paulus Aegineta in sexto, Gordylon, non Tordylō uocat: facile tamen & lubrico in una tantum litera ad uisum lapsu, quo loco eadem huic scriptori uires illi adscribit. Alij foeminino genere Tordylem uocauerunt. Alij Sefelis semen hoc nomine censerī uoluerunt. Alij sui generis herbam Græciæ & Italię peregrinā, ideoq̄ parum notam. Nec nos quod pro ea dicamus aliud habemus, q̄ Sefelis genus esse credere nos: ex quo hic statim ab omni Sefeli eā descripsit: propriūq̄ & priuatim ab illis aliud a gente in qua nasceretur nomen sibi inuenisse. Fecit rei incertitudo hæc etiam, ut in fine capitis ab alijs quo qui deprehendisse Tordylon se crederet, accreuerint aliqua quæ in impresso & plerūq̄ alijs leguntur, ab alijs interpretibus continuata sermonis serie reddita. Nos ea reliquimus indigno huic scriptori uerborum ductu tractata, & in uetustissimis græcis latinisq̄ nūq̄ inuenta.

De Sifone. CAP. LXII.

Sifon exiguum semen est in Syria natum, Apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur. Urinæ difficultatem potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in condimentis cum Cucurbita & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

BARBARI COROLL.

D Sifon, siue Sinon, & Senon Hippocrati, & quandoq̄ Silion uocatur, quaternis constare ramis scriptum reperio.

EX M. VERG. COMM.

Cognouit Hippocrates Sinnon, sic enim eum appellat. Cognouit & Paulus Aegineta, qui calidū, & subamarum esse testatus est: ideoq̄ concoctiones adiuuare, menses pellere, & interanea, quæ græci αλδχικα dicunt, laxare. Latini scriptores, quod hæcenus legerim, aut meminerrim, nihil de eo egerunt. Hic etiā exiguum semen in Syria nasci dicens, importune relicta herba historiam eius incēpit. Fuisse rem & usum eius satis Hippocrates, Paulus, græciq̄ omnes & latini huius scriptoris codices testantur.

De Aniso. CAP. LXIII.

Anisum semen paruum est in Syria natum. Apio simile est, magnum, feruens, oblongum. Contra lienem et urinam quæ ægre redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ ad condimenta usurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta assunt. Anisum in summa exalfacit, exiccat. Oris halitum iucundiorem facit. Doloris leuamentum præstat. Urinam ciet. Aquam quæ subijt cutem dissipat. Potū sitim cohibet. Animalium uenenis aduersat. Valet ad inflammationes, aluumq̄. Alba foeminarū profluuiā sistit. Lac ad manias elicit. Venerē stimulat. Dolores capitis leuat, suffitiū narib. Cū rosaceo triū, instillatūq̄ fractis aurib. medet. Melius semp recēs, plenū, non fursuro suū, odore p̄stans. Inter prima laudatū est Creticū. Proximū Aegyptiū.

BARBARI COROLL.

Anisum culinīs gignitur, crūdum, decoctum, uirens, aridum, panis etiam crustis inferioribus subditum. Succis quoq̄ laudatur additum cum amarīs nūcibus comēdādo uino. Ani-

cetum & hoc uocatur Anethi modo, quoniam appetentiam præstet ciborum. Aegyptium Ligu-
fici uicem præbet in condimentis. Efficacius semper recens & nigerrimum, & Stomacho tamen
inutile est, præterquam inflato.

¶ De Caro. CAP. LXIII.

C De Caro. CAP. LXIII.
Arum semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit. Vrinam conci-
tat. Stomacho utile. Os commendat. Concoctionem adiuvat.
Mistum antidotis & oxyporis Anisi uicem præbet. Radix cocta Pasti-
nacæ modo manditur.

C. B. A. R. B. A. R. I. C. O. R. O. L. L.

Caros arbitror hoc esse, quod Plinius Carum, siue Careum gētis suę nomine appellatum dixit: ab aliquibus Careosem, & Caroum: culinis principale, in quacūq; terra ferendum ratum, nequa olus atrum. Laudatissimum in Caria, proximū Phrygia. Caros Græci, ut Pathos neutro genere pronūciāt & inflectūt, Dicitur & Carou, ultima produā. Caron Athenæus Pastinacam maiorem esse putat, & multo præstantiorem sapore, q̃ Pastinacam uulgarem. Est & radix Cara, de qua in rebus gētis a Cæsare mentionem facit Hirnius. Hac lacti admixta, multum leuasse dicitur inopiam, similitudine representata panis. Meminit & Plutarchus, sed nomē herbarum non reddidit.

E X. M. V E R G. C O M M.

E X. M. V E R G. C O M M.

Medicinam pluribus subinde remedijs instruens hic scriptor, Cari semen præcipue cõmen-
dauit. Athenæus contra, ganem cibofq; Dipnofaphifas illos fuos non fuo fui operis cõmenta-
rio docens, radicem celebrauit, Maiorem Pafinacam appellans, uulgarì hac & quotidiana me-
liorem. Idem Paulus Aegineta libro primo capite de radicibus quæ edendo funt, tres has uelu-
ti congenereis iis uerbis coniunxit, *σαφνόνιον δι' υγῆ, δαύκον καὶ κάρην, αἱ μὲν ῥίζαι ὀλιστροφώρται τὸ
χαρυνκίδιον ὑπὸ, ἑρμαιὸ δὲ καὶ ἀρωματίζονται σαρδὸς καὶ θυρητικῶι, &c.* Quod est, Pafinacæ uero, agre-
stis Pafinacæiudem, & Cari radices minus q̃ Rapæ nutriunt: calent tamen, odoratæq; funt, &
manifeste urinam cient. Ex quibus ratiocinari & colligere licet, aut Pafinacis congener, aut il-
lis non diffimile Caron hoc esse.

¶ De Anetho. C A P. LXV.

¶ De Anetho. CAP. LXV.

A Nethum quod estur, aliqui Polygida uocant, alij Anicetum, Magi Cynocephali genituram, aut capillos, alij Mercurij semē, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adracum. Daci Pulpum. Aridi Anethi comae seminisq; decoctum, potu lac euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum uomitionesq; sistit. Vrinas ciet. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram restinguit assidue potum. Foeminis uuluae malo opportunis ad defectiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

B A R B A R I C O R O L L.

BARBARI COROLL.
Anethum, culinis Anisi modo gratum, Coronabantur hoc & in conuiuio recenti, atq; ro
 fido, ad conciliandum, ut uidetur Galeno, somnum.

¶ De Cumino fatiuo. C A P. LXVI.

C De Cumino satiuo. CAP. LXVI.
Vminum satiuum ori gratum est. Sed multo magis Aethiopis
cum, quod Hippocrates Regium appellauit. Secundum locum
tenet Aegyptium. Reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Ci-
licia, & Therentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exic-
cat. Ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum,
aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca. De-
morsis a serpente in uino, Testium collectionibus auxiliatur, imposi-

Etum cum uua passa, aut lolij farina, cæratoue. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis, pfluuia sistit. Colorem bibentium, aut perunciorum mutat in pallorem.

B A R B A R I C O R O L E.

Pli. li. 10. cap.
14. & 15.

Cumino semen angustum, nudum, canaliculatumq; facile inarescens frumenti modo, ubi plane accreuit, defluū atq; lubricum. Peculiares Cumino morbi, scabies, & falsilago. Nascit in summa tellure, uix hærens, & in sublime tendens: in putribus & calidis medio serendū uere. In Carpentania maxime laudat; alioquin Aethiopico, Africoq; palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippocrates in segetibus inquit triticeis, præsertimq; in Aegypto nascitur semē Aethiopico simile Cumino, uehementis acrimoniæ, ad conceptus feminarum utile, si uuluis apponatur. Hoc ego Cuminum Aegyptiū interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hippocratem, pleriq; interpretantur Ammi.

E X M. V E R G. C O M M.

Meliore scire feliciusq; prouenire Cuminum, lib. 8. de plantarū historia testatus Theophrastus est, si in serendo maledicant, imprecanturq; illi mala qui id serunt: nec minus gaudere maledictis his & imprecationibus, q̄ laudibus & blanditijs in spem honoris erigantur homines.

¶ De Syluestri Cumino. C A P. LXVII.

ΣΥΛΕΣΤΡΟΝ ΚΟΥΜΙΝΟΝ

Syluestre Cuminum, siue syluaticum, plurimum efficaciusq; in Lycia & Galatiæ Asia, atq; Carthaginæ Hispaniæ gignitur. Frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti serratis, & Gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. Nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq;. Item cōtra uenenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat. Somacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle et uua passa illinatur. Testium inflammationibus, adiectis cisdem medetur. Est & aliud syluestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod a singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est Melathio simile. Quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & ijs qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. Sed Apij semen feruefactum postea bibendum est.

Cuminum syluestre est, quod & Rusticum & Thebaicum appellat. Acutius Cuminum inquit syluestre, hoc est quod modo Aethiopicum uocari cepit.

¶ De Ammio. C A P. LXVIII.

Ammi, LATINI Ammii Alexandrinum, nonnulli Aethiopicum, quidam regium Cuminum appellant. Plerique diuersarum naturarum esse Aethiopicum Cuminum, & Ammii existimant. Vulgo notum est, semen exile, multo minus Cumino, Organū respiciens. Eligendum est purū, minime fursurosum. Vis ei exaltatoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, serpentium ictus cū uino potū. Menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ Ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu, aut illitu

mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat. **A**

BARBARI COROLL.
Sicut Cumino simillimum quod Græci uocant Ammi, tantum candidius & exilius Cumino. Similis autem & huius usus: nam & panibus alexandrinis subigitur, & alimentis interponitur. Herbam quoque ipsam græci uocant Ammi.

EX M. VERG. COMM.
Peregrium semper Græciæ & Italiæ fuit, siue sui generis herba & semen, siue Cymino cō-gener Ammi sit, meliusq; & efficacius in Aegypto nascat. Eamq; ob causam usa eo antiqua medicina est, aliunde inuecto. Fuit in Aegypto quondam domesticus Amos huius, & quotidianus usus: panibus em cōpinsebant, & alimenis miscebant. Calefacere, siccareq; in tercio ordine ueteres græci id dixerūt, maioreq; in extenuando ui q; Cyminū esse. Quæ aut a principio statim leguntur, uocare quosdā hoc Aethiopicū, & regium Cyminum, ex aliorū opinione, nō huius scriptoris decreto intelligenda sunt. Neq; em ipse id probat, sed a quibusdā sic uocari em testat. Siquidē Aethiopicū, e regij uoces, bonitatis a gēte in Cymino notē fuit, nō generū diuersitates.

De Coriano. CAP. LXXIX.
Corium, aut Corianum Aegyptij Ochion uocant. Vulgaris est notitiæ. Vim refrigeratariam habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt medetur. Epinyctidas cum melle, uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat. Cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. Tineas interaneas expellit, semen cum passo potū. Geniturā adauget. Largius tñ sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copiosio **B**re usu abstinentium. Succus cum cerusa, spumaue argenti, necnon acetato & rosaceo illitus, ardentis summe cutis inflammationes emendat.

BARBARI COROLL.
Coriandrum, Corion, & a Theophrasto Corianison uidetur appellatum, siue ut magis pabo Coriannon. Ita uocari solitum a ueteribus, testis est Galenus & Dioscorides. Seritur maiore & contumax prouentu scribitur. Radice breuiuscula, nec admodum fibrata: caulibus ramisq; multis, nudo semine, ac firmo & diutino. Sub canis ortum nascit. Inter syluestria Coriandrum nō est. Huic subitico cum acetō, uis tanta, ut carnem incorruptam seruet æstate. Xenocrates tradit menstrua cōtineri uno die, si unum granum biberint foeminae: biduo, si duo: & totidem diebus, quot grana sumpserint.

EX M. VERG. COMM.
Crediderūt Coriandro aliqui in Græcis nomē fecisse Cimices, q; folia eius & caules olent. Eamq; insectū id græci Corin uocēt, ideo olentē eos plantā Corion nominauerint. Sunt contra, qui q; Corian nō græci frequentius q; Coriō Coriandrum uocent, nō a Cimicibus, sed quasi Coriamblon. i. hebetantē oculorū pupulas dictum fuisse uelint. ^{uolunt} em oculi pupulā, & ^{hebetantē} hebetare iidem græci dicunt. Qd q; uerū sit, peritiores intelligent. Ab hoc em nihil qd ad oculos pertineat priuatim in Coriandro decernitur. Omnium eius appellationū prior illa in hoc, & alijs medicinæ scriptoribus frequentior est. Alterā illā in cōmuniore sermonis usu fuisse, indicat in egiptus suis Aristophanes. Quocūq; aut nomine uocetur, nota omnibus planta est, semēq; pceptis: ideoq; nō ultra a nobis tractāda. Numerat ab hoc ipso scriptore. s. uolumine inter uenena: odoreq; pferum deprehendi, q; similis uiuenti Coriandro toto corpore sentiat. Meminit & Nicāder in Alexipharmacis suis, q; loco interpret eius syluestri Coriādro ueneni maleficiū inesse ait: qd ab eo describit laetioribus longioribusq; folijs, multis adnatis, & nūerosa radice, copiosaq; flore. Quod nescio an uerum sit: restantē Plinio. 20. uolumine eiusdem numeri capite, non inueniri inter syluestria Coriandrum. De eo iterum in. 6. agendum nobis erit.

De Hieracia. CAP. LXX.
Hieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Pœnis Si-
 thileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum, **G iiij**

uolunt

Plin. 20. ca. 20

177

C folia, ex interuallis rariuscule diuifa, fimilia Soncho per ambitum, lutei os flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice sub stringendi. Vnde illita, ftomacho æftuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem forbitione mitigat. Hærbæ cum radice illita, uibratis a fcorpione ictibus auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 84. ca. 11

DE Hieracio inter Lactucas fylueftres meminimus: quoniam Romani Lactucam folio rotundo & breui Hieracion intelligebant. Dicta eft ex eo, qd accipitres scalpendo eam, & oculis fucco tinctis obfcuritatem cum fenfere, difcutiunt.

De Hieracia parua. CAP. LXXI.

Ἱερᾶκιον ἢ μικρὸν

Hieracia parua, quam aliqui Sonchiteti, alij Entimō agrion, Romani Intybum fylueftre uocant, folia ex interuallis habet diuifa in ambitu. Cauliculos teneros, uirentes, in quibtis lutei flores orbem circinantes emicant. Vim fuam ad eadem quæ fuperior impendit.

B A R B A R I C O R O L L

Hieracium. & hoc fuperius etiam Hieracia dicitur Aetio atq; Horo, cuius fucco palpebræ reglutinant. Idem autor eodem loco, Anacollia inquit appellantur, quum lachryma incōmodantes pilos corrigit. Quid autem fint Anacollia nō cōpi: nec fimplex, an cōpofita fit facultas fcio.

E X M. V E R G. C O M M.

Accipitres, quos græci Hieracas dicunt, Hieracio quondam nomen fecerunt: fcalpentes eā, fi Plinio credimus, fuccoq; oculos tingentes, ut eorum obfcuritatem cum fibi obrepiffie eam fenferunt, difcutiant. Apuleius, quod fabuloſum uideatur, his addidit, Aquilam in altum alis fe tollentem, ut rerum naturam certius contempletur, Lactucæ filuaticæ (Hieracium hancintel ligens) folia euellere: fuccoq; fibi oculos tingentem, optatam eorum claritatem acquirere. Sed quodecunq; id fit, ab his auibus græci Hieracium dixerunt. Sæpe enim a brutis, naturæ neceſſitate impuſis, ignotum aliquid nobis fit. In quo eorum fenfus ignari homines, quod uero fimilius, non quod uerum fit commiſcuntur: quemadmodum longius in utroq; Echino dictum ſecundo uolumine a nobis eſt. In Lactucarum ſponte naſcētium cenſu ab omnibus propter ſimilitudinem Hieracion hoc numeratur. Plinius. 20. libro, capite. 7. ultimam hanc in eo genere deſcribit, folijs rotundis, & breuibus. Apuleius in agreſti Lactuca Hieracion uocari dicens, meminit eius. Hic Lactucam erraticam dici a quibuſdam tradit: quæ uox & appellatio quoniam in ſcriptore hoc perierat, ex melioribus græcis a nobis inſtaurata eſt. Non meminit eius in medicæ materiæ cenſu Paulus Aegineta: credimus, qd nullas hanc forte intelligeret, diuerſas ab agreſti Lactuca ures habere. Multa ſiquidem in Lactucarum cenſum & nomen uenerunt: Tithymallus, quæ ab aliquibus Caprina, ab aliquibus Marina Lactuca dicta eſt. Vtraq; Ifatis, quam Glaſtum, ſiue Luteam uocari diximus. Hieracia poſtremo hæc. Omnium eadem ratio & cauſa fuit, qd latiore. ſ. & ampliore folio, quali Lactuca eſt, omnes ſunt, & omnes lactis liquorem aliquem ſectæ reddunt. Et nihilominus, quoniam priuatim aliquid ſingulæ habent quod Lactucæ & alijs non congruat, alijs appellationibus dictæ, & in alijs generibus conſtitutæ fuerunt. Sonchitem maius Hieracium uocari a quibuſdam hic ait, manifeſta ratione, quoniam

Dam & hæc & illa concauo, & lactem ſuccum remittente caule eſt. Foliorum enim quantitate longius interuallo diſtat Sonchus ab agreſti Lactuca, & ex eo ab Hieracio hoc: eamq; ob cauſam in uenientes in melioribus græcis, quo loco hic ait habere folia Hieracium per interualla incuſuris diuifa, Soncho ἱερᾶκιον, id eſt, æqualia, non Soncho, quæ noſtris Cicirbita eſt, ſed ἱερᾶκιον, id eſt, Betæ naturam et rem ſecuti, Betæ folio, non Sonchi Hieracij folia comparauimus. Lactucæ em Beta uerius qd Sonchus in foliorum quantitate comparatur. Quemadmodum & minus Hieracium illud quod ſequitur, agreſti Intybo in foliorum quantitate exæquatam pariter eſt. Omnia enim eo pertinent, ut Lactucæ ſimile Hieracion ſit. Eius unum tantum caput, Maioris ſcilicet in melioribus græcis legitur. Nec Plinius niſi unus meminit: Quo fit, ut ſuſpicemur alterum hoc, & minus Hieracium priori illi accreuiſſe ab aliquo, qui inuentum forte breuius, & ut colli terræque uis poteſt huiusmodi uariare, alterum crediderit a ſuperiore illo eſſe. Indicatque id, quod neque in hiſtoria, neque in medicina poſterius hoc a ſuperiore illo diuer-

sum aliquid habet. In censu & genere sylvestrium, & sponte nascentium Lactucarum; sine unum, siue duo sint, Hieracia hæc numeranda sunt. Ostenduntque id Paulus Aegineta, qui nihil de his in medica materia egit. Indicant & latini omnes, in quibus Hieraci nulla historia est. Et quem nos habemus antiquissimum Dioscoridis latinum codicem, nihil quod ad Hieracia hæc pertineat, ostendit: cui in huiusmodi antiquitatis uestigijs, & ueræ lectionis coniectura, ob uetustatem suam, nos multa deferimus.

De Apio.

CAP. LXXII.

Satium Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarum duriciam reprimat. Vrinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. Aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit. Contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammifcetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

BARBARICOROLL.

Apium & Apium Græci Selenon uocant. Durat biennio. Prouenit crispus, pedibus, aut cylindro, pilae pulsatum, quinquagesimo a satū die, quadragesimo cum ocyllime. Apium aliud folio spisso, hirsuto, crispo. Aliud raro, expanso, caule item maiore. Item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uersicolore. Syluestriora hæc, ut Theophrastus inquit. Proprium Apio, quod colorem mutat. Rami eius per iura quoq; uulgo innant: & in condimentis peculiarem uoluptatem præbent: Pisces quoq; si ægrotant in piscinis, Apio uiridi recreantur. Honos ei in Achiaia, coronare uictores sacri certaminis Nemeæ. Apud eruditos, non aliud erutum terra in maiore sententiarum auctoritate est. Distinguitur sexu. Fœmina ut sit crispioribus folijs, atq; duris, crasso caule, sapore acri & feruido. Mas folijs nigrioribus, breuioris radicis, uermiculosisq; gignens. Neutrum ad cibos admittebant, Nephastum existimantes, quoniam defunctorum sit epulis feralibus dicatum: & ut Plutarchus inquit, coronentur Apio sepulchra: unde uetus illud, indigere Apio, de ijs qui profligata ualitudine uruntur. Vermiculos & fœminæ caulibus innasci: propterea eos qui edunt, sterilecere utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibo comitiales fieri, qui ubera infantes hauserint. Innocentiores tamen esse matrem, eaq; causâ est, ne inter Nephastos fructus damnetur.

EX M. VERG. COMM.

Quæcunq; a Plinio de Apijs lib. 19. capite. 7. eorumq; folijs, caulibus, coloribusq; dicuntur, multo ante a Theophrasto de plantarum historia octauo uolumine dicta fuerant: Differre scilicet Apiorum inter se genera, folijs & caulibus: Esseq; hoc denso, crispisq; & hirsuto folio, illud raro & lato: hoc maiore caule, illud minore. Et in hoc genere rursus aliud candido, aliud purpureo, aliud uersicolore: totumq; hoc genus sylvestri simillimum esse. Rursusq; eodem libro. Quod grande, palustre, montanumq; appellatur, inter se & a satiuo differre: quonia palustre prope aquarum riuos, & in palustribus nascatur, raro folio, nec hirsuto: simile tamen Apio esse odore, succo, & figura. Quod grande, folio palustri simili, hirsuto, & altiore caule, radiceq; Raphani crassitudine, colore nigro, semine itide nigro, maiore q; Erui: duosq; hæc contra urinæ angustias, calculosq; credi uim habere in albo dulci uino pota. Nasci hoc ubiq; concresecereq; in eo lachrymam Myrrhæ odore, quam ueram esse Myrrham aliqui crediderunt: Montanum maiores adhuc, & certiores habere differentias. Cicuræ enim folio est, radice tenui, caule Anethi; uerum minore. Vsum huius esse ad muliebria, id est, menses in uino austero. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Quæ omnia a Plinio qua cætera breuitate consueuit, antedicto uolumine numerata, & descripta fuerunt. Columella libro. 12. in hortorij proliuorū discrimina hæc, quæ a Theophrasto natia numerantur, cultura & artificio humano facere his uerbis docuit. Apium quoq; possis plantis serere, nec minus feminæ. Aqua precipue lætatur, & ideo secundum fontes commodissime ponitur. Quod si quis id uelit lati folij facere, quantum possint tres digiti seminis comprehendere, raro linleo illicet, & ita in areolas dispositum religer. Vel si crispæ frondis id fieri malueris, semen eius inditum pilæ, & saligneo palo pinsitum, expoliatumq; similiter in linleolis ligatum obruas.

G. iij

obitus

Pli. li. 20. c. 11.
lib. 19. c. 7. 8.

B

C Potest etiā citra hanc operā fieri crispum qualitercūq; satū, si cūm est natū incrementū eius, superuoluto Cylindro coēceas. Quæ omnia de satiuo intelligenda in eo scriptore sunt: ideo longius a nobis repetita, ut sciant, meminerintq; legentes: si natiuā foliorum Apij Theophrasto discrimina illa sint, licere, sperandumq; homini labore, diligentiaq; sua non imitari, quod multæ aliæ possunt artes, sed in ruris disciplina naturā etiam æquare.

¶ De Eleoselino.

CAP. LXXIII.

Ἐλεοσέλινον

Eleoselinum, quod a quibusdam Pedionon, ab alijs Hydroselinon agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In humidis nascitur. Satiuo grandius, & ad eadem efficac.

BARBARI COROLL.

Eleoselinon, Paludapium, ficto ut solet nomine Theodorus appellauit, quia in paludibus nascatur, secundumq; aquæductus, folio raro, nec hirsuto, simile Apio sapore, figura, odore. Homerus Apium Eleothrepton uocauit, hoc est, palustre.

EX M. VERG. COMM.

Satis ex Theophrasto superiore capite dictū est, quale hoc Apium sit, & quæ a satiuo & ab alijs discrimina habet: caules scilicet & profluentes aquas prope quas nascitur, rarius foliū, sed non hirsutum: satiuo Apio odore, succo, & figura simile. De eo Palladius in Aprili sic ait. Eleoselinon molli folio, & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

¶ De Oreoselino.

CAP. LXXIII.

Ὀρεοσέλινον

Oreoselinon, quod aliqui Petroselinon syluestre appellant, Aegyptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui exeunte. Ramis & capitulis Cicutæ, multo tamen tenuioribus, semine Cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosils & montibus. Vrinam ciet semine ac radice, in uino potis. Menfes trahit. Antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus, & excalfactorijs inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in saxis prouenit. Aliud enim est Petroselinum.

BARBARI COROLL.

Oreoselinon, a quibusdam Orthoselinon: quia frutice recto nascitur. Caule Anethi exliore tantum, folio ut Theophrastus inquit cicutæ, nisi quis deprauatum in eo locum putet. καὶ τὰ ὀσάλα ἔχει κότυψ ἑμπερῶ, pro eo quod est, καὶ ὀσάλα ἔχει μακρόν ἑμπερῶ. hoc est, capitula Papaueris similia, ut Dioscoridis uerba sunt.

EX M. VERG. COMM.

Diximus in satiuo Apio, quæ Theophrastus in montano discrimina ab omnibus alijs numerasset: ea superuacaneum & inutile repetere nunc fuerit.

¶ De Petroselino.

CAP. LXXV.

πέδιλον καὶ τὸ πετροσέλινον

Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis. Semine Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua. Contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest. Laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Ammifcetur antidotis urinam cientibus.

BARBARI COROLL.

Petroselinon, hoc est, Apium in saxis natum. Addidere quidam Bufelinon, differens breuitate caulis a satiuo, & radicis colore ruffo. Galenus Petroselinon in Ciliciæ Amano montanum Smyrnion potius, q̃ Petroselinon uideri sibi tradidit.

EX M. VERG. COMM.

Indicat uox ipsa, in petris & saxis natū Apium, Petroselinon a Græcis quondā dictum fuisse. Hic tantū in Macedonia natale solū illi assignat. Palladius in latinis nihil aliud de eo, q̃ locis asperis maxime prouenire ait. Nec nos credimus, alia q̃ nataliū ratione a satiuo differre. Mede-

ri inter cetera saxatile Apium crassioris intestini, quod colon dicunt, inflationibus, hic scriptor ait, non totā, neq; ex quacunq; causa factā colicam affectionē intelligens, sed quā priuatim ex crasso & quasi peditu efflatur, non transeunte ill hac spūitu sēpe fit.

A

De Olusatro.

CAP. LXXVI.

Hipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quāvis aliud sit, quod proprie Smyrnion dicitur, ut paulo post referemus. Est autem maius, & satius Apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas. Folijs latioribus, in puniceum uergentibus, coma Roris marini. Dependētibz in cacumine corymbis, anteq; deflorescat. Ea semine turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur tenuis, odorata, candida, quā os commendat. In umbrosis & palustribz enascitur. Olerum generis ut Apium. Radix cruda, coctae estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso uino menses ciet. Rigentes calfacit potu, aut illitu. Vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eodē præstat effectus.

ἐν ποντικῶν

Hipposelinon Theodorus ab equis dictum, Equapitū uocare maluit, cum latine Olusatrum, & Olus pullū dicat. Viret ei foliū cacumine perpetuū, palustri simile, sed pilosum, caule grādi. Radice crassa, mō Rhapsani, sed nigra, fructu Erui maiore, atro. Nascit ubiq; e lachryma sua: quā nihil differre a Myrrha dicit. Auctorq; est Theophrast. Myrrha fata natū. Serit & radice.

De Smyrnio.

CAP. LXXVII.

Smyrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amalno monte gignitur. Caulem habet Apij, & stolones multos, folia latiora, pinguis, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescēte. Capitibus caulium orbiculatis, ut anethi. Semine Brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore: ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoq; odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis & collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, hærbae & seminis, excalfacere. Folijs muria maceratis, ad obsonia utuntur. Aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. Tussēs & orthopnoeas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Recentes tumores, collectiones, duriciasq; discutit. Illita uulnera ad cicatricem perducit. Partus abortu uitiat, si seruesacta subijciatur. Semen, lienis renum, & uesicæ uitijz prodest. Menses & secundas pellit. Commode datur ischiadicis in uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores ciet & ructus. Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circūitus.

B

ἐν μύρῳ

Smyritū, caulē habet, q̄ æstate incipiente arefcit. Cortex radice intus, & pallēt cortice arido. Ad obsonia utunt, cū Mulso, & Oleo, & Garo, maxie in elixis carnibus. Radix sapore Pipi similima. Odor herbę Myrrhę, unde nomē. Hoc & Petroselinō syluestre uocari scribit Galenus.

C Sentiebat iam tum cum hæc scriberet Dioscorides a grauissimis plantarum & hortensium scriptoribus confundi cum Olusatro Smyrniū: misceriq; simul cōmunicata inuicē appellatione, similes quidem, & congeneres; non tamē easdem plantas: ideoq; in Olusatro, cuius superiore capite tractata historia & medicina est, aperte omnes monuerat, aliud esse Olusatrum ab eo quod propriē uereq; Smyrniū diceretur. Et in Smyrnio eas numerauit nataliū, uirum, seminis, foliorum, aliarumq; partiū notas, ut his qui Olusatrū nouerunt, nihil facilius posthac sit, q̄ alterum ab altero secernere, præsertimq; ex Myrrhæ gustu, ideoq; pari & promiscuo alterutrius usu. Quod in nostri orbis Olusatro sentiri, deprehendiq; nequit. Misceuisse autē ueteres inuicem similes & cōgeneres plantas, in latinis Columella testis est lib. 12. capite. 1. scribens. Atrum olus, quod quidam græcorum uocant Hippofelinon, nōnulli Smyrniō. Testis Theophrastus. 9. de plantarum historia uolumine, Hippofelinū nominans quod hic Smyrniō, & quæ Smyrni in hoc scriptore sunt Hippofelino tribuens. Locus est, ubi de excipiendis plantarum liquoribus ille agit, inter quas Hippofelinon numerat. Suntq; eius hæc uerba. *ἵναι δὲ ἐν ταῖς ῥίζαις ὡσπερ τοῦ ἱπποελίνου*, quod est, Aliquorū etiam in radicibus quemadmodū Hippofelini. Paulocq; post. *τὸ μὲν οὖν τοῦ ἱπποελίνου παρέμεινεν τῇ σμύρῃ, καί τινος ἀνούσαντος ὅς ἐν ταύτῃ ἡ σμύρνη, ἡγούνται βλαστάνειν ἐν αὐτοῖς ἱπποελίνον*. Quorum sensus est, Hippofelini autē lachryma Myrrhæ similis est. Audientesq; aliqui hinc esse Myrrham, nasci apud eos Hippofelinon existimāt. Ex quibus facile ratiocinari est, a Theophrasto Hippofelinon dici, quod ab alijs Smyrniō uocatur: peregrinamq; Græcæ fuisse plantam, & lachrymam odore & sapore Myrrhæ habere, quod hic semini tribuit. A Myrrha enim, quā Græci Smyrnen uocant, Smyrniō nomen Græcia fecit. Testis Nicander etiam in Theriacis suis: qui Smyrniō uocat, *ὡς ἂν καὶ σμυρνή* *ἀνδρῶν*, &c. adiectiua forma *σμυρνή* Hippofelinon uocans, hoc scilicet, ut ab illo separaret: addiditq; interpres eius, magno Aplo, id est, Hippofelino simile esse Smyrniū: uocariq; Smyrniū, quoniā Myrrham odore refert: uocari & Coptium, auctore Anacreonte in cōmentario de radicum sectione. Similitudo hæc miscet, & in ueterū historia confundi cogit, quæ alioquin diuersa sunt: ut hic, & alijs græcorū medici docent. Poterūtq; qui certius nouisse id cupient, colatis inuicē duobus capitibus, duarum plantarū multa inuenisse discrimina: nec natali solo tantum differre, quod ad faciendā naturæ diuersitatē magnas habet uires, sed ex uniuersæ plantæ notis & partibus congeneres quidem, diuersas tamen penitus cognoscere.

D *ἐλαφοβοσκόν* **¶ De Elaphobosco. CAP. LXXVIII.**
G Ræci Elaphoboscon, aliqui Elalphicon, alijs Nephriōn, alijs Ophigeniōn, nonnulli Ophioctonon, aliqui Herpyxen, alijs Limen uocant, Romani Cerui ocellum, Aegyptij Chemin, Aphri Aschancam. Fœniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis, geniculatus, folijs duum digitorum latitudine, ut Terebinthi prælongis, aliquantum asperis, circumfractis. Adnata multa caulis habet, ferentia umbellas Anethi similes, & semina eiusdem, florem subluteum. Radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis unius. Candida, dulcis, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est, hoc pabulo ceruas serpentium morfibz resistere.

E **BARBARI COROLL.**
 Laphouoscon, ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine. Semen in corymbis dependentibus similis effigie, sed non amaris. Folia oleris atri.

Q **EX M. V E R G. C O M M.**
 Vē Elaphobosci, id est, Ceruiocelli (modo id Romani sic appellauerint) a principio tam multæ numerantur appellationes, unā eandemq; causam & originem habent, & eam quā hic ipse non procul a fine capitis, & Plinius. 22. uolumine eiusdem numeri capite indicauerunt: quoniā scilicet fama sit, hoc pabulo ceruos resistere serpentibus. Eo siquidē perinet, quæ prima illic auditur Elalphicon, id est, ceruina herba. Mox Nebrium, ex eodem euen-

tur? *νέφρις* enim ceruorum inulos Græci uocant. Ophigenium idem, & Ophioſtonon: quæ altera ab enectis serpentibus manifestam habet significatiōem; altera, q̄ serpentes aliquo huiusmodi malo uexet. Corrupta enim est: nec licuit eam instaurare, quemadmodū & eam quæ sequitur Herpyxem. Suspiciari tamen in ea licet, *ἡ τῶν ἰππιῶν*, quæ græcis reptilia & serpentes sunt, in ea aliquid fuisse.

Fœniculum, si herba edatur, aut semen cum ptisana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum, in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium ictus in uino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus nausæam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem cōmmodè temperantur. Extrahitur etiam semine uiridi, ramulisq̄, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia succum reddit gummi similem. Caulem medium dum hæba floret rustici demetunt, igniq̄ ad mouent, quo facilius ui caloris exudans gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

Fœniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimū, cōdimentis prope omnibus inferitur. Quin & crustis in panificio aptissime subijcitur.

EX M. V E R G. C O M M.
Fœniculū, si Nicandro in Theriacis suis, q̄ mox subiiciemus, scribenti credimus, nobilitatiuere serpētēs, gustatu eius senectā exuendo, oculorūq̄ aciem succo eius rescicendo. Versiculi potest eius sunt, *τῆμος δ' αὖ αἰώνος φολιδῶν ἀπιδύναται γῆρας. μῶλις ὑπὸ σιλήων βῆι φολιδῶν ἱερὸν φέρον. ἔμμοισιν ἐκδύσσει, μαρδύρου δὲ ἐνέχυντος ὀρεγέξ, βοσκῆτις δ' αὖ πάντα καὶ ἀνθρώπων τρέφειν.* Quorū sensus ille est. Quo tēpore relicta arefcentium squamarū senectute, torpidus & segnis ingrediens, uenatq̄ tempestate cauū suum fugiens, hebetibus oculis cecurrit; uersū depastus Fœniculi comosus ramus, celerem, & claræ lucis eum effecit. Nobilitauit & homines, toto anno quondā uiridi, sicco, seruatoq̄ sale, totaq̄ mensa, non ut nostra ætate fit in secunda, et ad augendā sitim tantū, nec semine solū, sed coma & caulibus urentes. Neq̄ immerito tā multæ in sanitatis & medicinæ usū dotes illi sunt; quas hic scriptor profecutus, labori huic parcere alios uoluit.

Graci Hippomarathrū, aliqui Marathin, alij Marathrū agrion, Aegyptij Sampsoth, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculū erraticū, aliqui Mion, Galli Sistrameor. Syluestre est Fœniculū, magnū. Fertatū semen Canchry simile. Cuius radix iucūde olet, potaq̄ stranguis medet. Menses iposita ciet. Ventrē sistit, radice, aut semine potō. Contra serpentū morsus auxiliat. Calculos cōminuit. Regiū morbum expurgat. Lactis abundantia facit. Decoctum foliorū haustum, scēminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus, longo, exili & angustō folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturā habet, & uiribus Fœniculo respōndet. Ad omnia infirmius.

Hippomarathrū, a magnitudine uidet appellatum: q̄d aliqui Myrsinē uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, radice candida. Nascit in calidis, sed faxosis, tātæ amplitudinis in Mauritania, ut caulis, 12. cubitis assurgat, crassitudine palmorū q̄tuor.

C Hippomarathri aliud hoc est, quod tradidit Diocles: foliū habet angulosum, atq; longū.
EX M. VERG. COMM.

Grande est erraticum Feniculum. In cuius appellationibus quæ feminino genere Marathris dicta est, solā habet ex sexu a superiore illo discriminis causam: qualia in hoc opere multa alia audiuntur, quemadmodum agreste Marathrum eandem Hippomarathro significatio- nem. Ferre erraticum Feniculum hoc semen Cachryi simile Dioscorides ait, Cachry id intelli- gens, quod ab eo in Libanotide mox describetur, & quod in umbella eius fruticis concipitur et maturatur: cui erraticum Feniculum hoc similem suam habet.

Δαυκος
Διερκεϊον

D De Dauco. CAP. LXXXI.
Aucum aliqui Dircaum uocant. Creticum, folijs Foeniculo si- mile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, umbella cori- andri, flore albo, semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in man- dendo. Radix digitali crassitudine, & palmi longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri Apio si- mile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Cre- ticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario Pastinacæ, semine oblongo ceu Cumini, acri. Omnium semen exalfacit potum. Vrinam, menses & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tussim mitigat. Phalangiorum morfibz potum in uino auxiliatur. Tumores illitu discutit. Seminis dumtaxat in alijs generibz inualuit usus. In Cretico etiam radicis. Quæ maxime con- tra uenenatorum iniuriā in uino bibitur.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 25. ca. 9.

D BARBARI COROLL.
Aucus, quæ a nostris Gallica Pastinaca dicitur, specie Lauri, colore Croci, radice nigra Theophrasto. Dauci quatuor nonnulli fecere genera. Dioscorides & Plinius tria persequuntur. Probatissima in Creta. Mox in Achaia, Patrensi & Spartano agro, & ubiq; in siccis. Priori ge- neri folia etiam hirsuta, caulis rectus, radice suauissimi gustus & odoris. Reliqua genera passim nascuntur, terrenis collibus, limitibusq; nec nisi pingui solo, folijs Coriandri, caule cubitali, capitulis orbiculatis, sæpe plurimis q̃ ternis. Radice lignosa, & cum inaruerit superuacua. Semen Cumino simile: prioris Milio. Album, acre, odoratū omnibus, & feruēs. Secundū priore uehemētius est, eoq; parce sumi debet. Tertium genus simile Staphylino, semine oblongo, ra- dice dulci. Omnia hæc, & hyeme & æstate, quadrupedi sunt intacta, nisi post abortus. Quidā, ut Paulus, & Galenus prior eo meminit, Daucū nihil aliud esse uoluerunt, q̃ Staphylinū syl- uestrem: q̃q̃ uidetur a Dauco aliud genus esse Daucos herba cognominata, apud Galenum duas Daucos seorsum indicantem. Nisi quis librarior accuset, q̃ quæ Galeni non sunt, adiece- rint. Hippocrates Daucum Aethiopiam laudat.

M EX M. VERG. COMM.
Masculino genere, & neutro Daucum dici in antiquis obseruauimus. Nos hunc scripto- rem secuti, masculino eum semper indicauimus. Quodq; inter appellationes eius male, Dirca- on legebatur, ex Nicandro in Theriacis Daucion emendauimus. Sic enim ille appellauit. *Δαυ- κων ἵψας τετρώνυς*, quod est, Daucium, & Bryoniæ uitis radices. Fuerunt etiam in antiquis, qui Daucum scriberent, duosq; eius tantū genera facerent, Creticum, & Asiaticum: hic tamen tria, Plutarchus uero plura Daucorum fecit genera. Illud etiam a principio statim quod hic ait, habere Creticum Daucum Feniculo similia folia *μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα*. Quorum nisi uti- tium sit, sensus est, minora tamē & tenuiora: Plinius & Plinium secutus Barbarus, candidiora dixerunt, quasi *λευκότερα*, non *λεπότερα* legendum sit.

Δελφίνιον

D De Delphinio. CAP. LXXXII.
Delphinium Græcis Diachysis, alijs Diachytos, alijs Paralysis, alijs Camarus, alijs Hyacinthus, alijs Delphinias, alijs Neriaz

dion, aut Sofandrō, aut Cronion, Romanis Bucinus minor uocatur. **A** Surculos emittit a radice una sesquipédales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ Delphinorum effigiem representant. Vnde tractum nomen est. Flos uiolæ albæ non dissimilis, purpureus, & semen in filiquis, milio proximum. Quo non aliud utilius bibi potest ab scorpione percussis. Aiunt enim, obiecta hærbæ, scorpiones resolui, atq; ignauos torpescere. Semota uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis.

De altero Delphinio. CAP. LXXXIII.

Alterum est Delphinium, quod Romani Bucinum uocant, superioris simile, sed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

E. X. M. V E R G. C O M M.

Quam nostra ætas Senam officinis omnibus & uulgo notā uocat, antiquitas, ut opinati aliqui sunt, Delphinion appellauit. Posterioris & quo nunc medicina utitur nominis incerta ratio nobis & causa: antiquioris notissimi nautis in mari pisces autores sunt: repando dorso, repandas Delphinij huius filiquas, non folia a se uocari & indicari gaudentes: ut non tantum maris honor Delphinus esset, sed haberet nutrix & parens omnium terra quod ex eo pisce in suis opibus etiam numeraret. Vtq; in mari beneficus homini semper Delphinus fuit, multisq; salutem humanitatis nostræ sensu quodam attulit, sic etiam in plantis aliqua esset quæ Delphinorum figura, repandoq; filiquarum suarum inflexu salutem homini faceret. Eiusq; beneficii merito Sofandros etiam diceretur. Id enim ea uox significat. Dictumq; Delphinium hoc Sofandros est, q; τὸν ἀνδρῶν δαΐτυν, id est, uirum & roboris firmitatem seruat. Fuerunt qui mutata tantum declinationis forma, Delphinia, s. herbam uocarent, & qui a floris figura Hyacinthum. *in xiv. 10* *solus* enim a græcis, id est, Hyacinthinus flos eius describitur. Legitur postremo inter appellati ones has a Romanis Delphinium hoc Bucinum minorem dici, quod nullibi hætenus comper tum nobis est. Facilis tamen nominis coniectura. ut enim græci a Delphinis & ex mari nomen illi fecerunt, sic posteriores etiam latini potuerunt ex eodem elemento, sed ab alijs piscibus etiam indicasse. Sunt enim Bucini in purpurarum genere, sed non repando dorso ut Delphini. Quod mirum q; in Delphinio hoc illud est, nihil agere de eo Plinius: nec Delphinij aut Sofandri, quod hætenus legerim in tota eius historia, sub his nominibus unquam meminisse. Nihil etiam Paulus Acginetam: qui cum medicam omnem materiam lib. 6. per capita numeraret, quotidiani in medicina usus herbam, remediumq; relinquere non debuerat. Dubitamus ob eam causam, latere in antiqua etiam medicina Delphinium hoc sub appellatione aliqua alia.

De Pyrethro. CAP. LXXXIII.

Pyrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton, aut Pyrothron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani Saluareum uocant. Folia caulemq; emittit ut Daucum syluestre, & Fœniculum, umbellæq; Anethi circinata rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficax. Contra perfrictiones membrorum, resolutionesq; eximie conducit.

B A R B A R I C O R O L.

Pyrethro depictum coloribus umbraculum, purpureo, cædido, luteo, porraceo, ut scripserit quidam. Sunt qui hanc interpretentur, quam uulgo rustici & olitores, Draconem Acetarium uocant, ut aliubi notauimus, omnino dissimilem eius quam Dioscorides hoc capite demonstrat. Sed æstimanda res tota diligentius.

πυρεθρον

Pl. li. 28. ca. 9

C Non dedit ut forte opinabatur aliquis in græcis Pyrethro nomen ignis, sed qui in ea similis igni feruidus sapor est. Qui tantus adeoque uehemens in ea sentitur, ut plures in gentibus ab eadem ut appellationes inuenerit. Quæ enim in hoc scriptore numerantur ἀπὸ τοῦ πυρός incipientes uoces, eandem omnes habent causam: & quæ Romanorum appellatio fertur Saliuaris herba, a feruidi saporis eius euentu causam & originem duxit. Commāducatum enim copiosam oris saliuam proritat: quia potestate plerumque sunt feruida omnia: ideoque ueteres græcorum medicum dici, ad purgandas capitis pituitas eo utebantur. Præcepitque id inter cæteros Paulus Aegineta lib. 1. capite quo de purgantibus caput apophlegmatissimis agit: qui græcis sunt medicamenta omnia quibus per os capitis pituita purgatur. Hanc ipsam non Pyrethron, sed Pyrethida Nicander in Theriacis suis uocauit. Versiculus eius est, δάπτει δ' ἡ ἐκλύει τοῖς πυρεθίδος ἐκχέει πόλλα. Cur autem Dorycnion uocari etiam feratur, incertum nobis est. Inter uenena enim Dorycnion numeratur, ut sexto uolumine priuatim dicitur.

¶ De Rosmarino.

CAP. LXXXV.

Nervitio

Duo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus Zea, aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in Rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis comæcauum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix Tus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylium odoratum, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum plane similitudinem refert. Sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluuiâ sistit. Sedis inflammationes, & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Sicque radices cum melle ulcera purgant. Torminibus medentur cum uino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & urinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radices quam hærbæ succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. Si comitialiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus, cum uino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum lolilacea farina, & aceto tritum illinitur. Purgat uirilgines, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum Erica nasci, folijs Lactucæ syluestris, asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus autor est. Potumque id ipsum alterutra parte purgare.

¶ De Canchry.

CAP. LXXXVI.

adyxpu

C Anchrys uim habet exalfaciendi & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluctiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluat.

BARBARI COROLL.

Libanotidis uocabulo, multa genera feruntur. Vnum inter Cunilaginea a nobis dicendū. Alterum, de quo hic, in species ternas diuisum. Tertium coronariæ: quam Rosmarinum proprie uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro, de quo præfens caput loquitur, radicem habet Olusari: locis putridis, macris, saxosis, & roscidis prouenit: feritur semine, quod quidem fertili Rosmarino, scabrum & oblongum a Theophrasto redditur, folio palustris Apji, minore multo, sterili, folium Lactucæ syluestris & amaræ, candidius & asperius, radice breui. Vestibus interposita Libanotis, abigit tineas. Carpitur per mensem fertilis. Caulis quoque, non modo semen, resinaceus. Folijs & radici odor Turis, unde nomen. Libanotidem cum Erice lætissimam nasci Theophrastus inquit. Theodorus locum, non ubi Erice, sed ubi dictum est, conuertit, pro eo quod est *ἐν τῇ ἰσθμῷ*, legens *ἐπὶ τῇ ἰσθμῷ*, libanotidum græcorum sane culpa.

EX M. VERG. COM.

Plures quondam non Dioscoridi tantum, sed cæteris græcorum herbarijs & medicis omnibus Libanotides fuerunt: ut eodem Turis cognomine omnes, sic non eodem eius odore insignes. Vna enim, & quæ Canchry fert, primo & per se, quæ radix eius Tus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ aut congeneres, aut aliqua parte illi similes, in censum et nomen eius uenerunt. Satisque certæ earum diuisione hic usus, posteriores græcorum medicos & herbarios alios subscribentes sibi habuit. Siquidem omnes, excepta Coronaria, quæ statim ab his describitur, tria eius genera fecerunt. Fecundam, fructumque ferentem. Et hanc dupplicem. Tum sterilem nuntiantes: peregrinas, ut nos credimus, Italiæ plantas, & quarum omnis misceatur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figura. Quæ palustri Apio in primo genere, in sterili uero amaræ Lactucæ similia ille facit. Cum hic Fœniculo comparet, & crassiora tantum, latioraque esse dicat: quæ una foliorum forma, uulgarem nostratam & coronariam Rosmarinum eognumen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa, cur quo ndam Libanotis, & nunc tota græciâ Dendrolibanon coronaria Rosmarinus diceretur: nihil enim simile, commune uel illi aliud habet. Quodque facile ex historia earum intelligat aliquis tota, & undique diuersa. Siquidem coronaria Rosmarinus frutex magis, quam herba, ramos habet: illæ caulē, & quæ fructum inter eas ferunt, umbellam etiam. Hæc a terra erigitur, illæ per terram folia spargunt: & ne longiores simus, plures habent illæ notas quibus a Coronaria separantur: quinetiam in folijs prius illud genus suas habet itidem differentias. Quo autem maxime differunt Canchry, est: quod in secundo utroque illo genere in summo caule simile arborum Canchry surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quid autem Canchrys sit, & quomodo in arboribus nascitur, dictum iam pridem a nobis est. Quæ una nota a coronaria Libanotide, reliquum omne hoc genus præcipue separat. Nec Nicander aliter eam signat in Theriacis suis, *ὅσον γυκαρβύλαιαν ἔλαιον περιβαλλομένην*, quod est. Sumito & calidam radicem *καρχυβύλαιαν*, i. e. canchry hoc ferentē Libanotidis (secundum illud genus significans) Rursus *ἄμμιγα καρχυβύλαιαν καὶ αἰσώτιδι*, quod est. Simul cum Libanotide canchry ferente. Vna autem hac nota Libanotis præcipue discernebatur, quæ in medicina carchyos huius, i. seminis tamen usus esset. Eaque ob causam seorsum a reliqua plâta Paulus Aegine ta de eo egit, fructum, seu semē Libanotidis uocans: uiresque illi exterendi, discutiedi, & calefaciedi tribuens. Vt si illo etiam est ex oleo contra febrium pfrictiões, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex canchry hoc dictum est. Tertiū enim quia eo caret, ideo *ἄκαρπον* sterile & sine fructu a græcis nominatur: prioribus præterque in hoc simile.

R De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.
Rosmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, et circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, superne uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoque unguento ammisceri solet.

BARBARI COROLL.

Libanotis Coronaria, differt quidem folio a prioribus, sed comprehensa forte a Plinio est inter fertiles. Nisi quis hanc pro Cunilagine accipiat. Ea quæ Libanotis uocatur, & in coronas admittitur, Paulus, & Galenus, Dioscoridem secuti, quatuor Libanotidis genera connume-

A

Plin. 19. c. 13

B

Crat. Vnam sterilem. Fœcundas duas, Quartam generis coronamentarij: quam a Romanis præuatim Rosmarinum dici uolunt, etiam si priora quoque genera Plinius ita uocari prodant.

E X. M. V E R G. C O M M.

Coronaria quondã uulgaris hæc nostras Libanotis fuit: nec certiorẽ habuit hic scriptor notã qua legentibus eam indicaret. Quotidianus enim hic usus eius erat: necessebanturque in coronis ramuli eius non aliter quã Serpillum, & quæ alia Theophrastus *σπρίγγιν* uocat, toto corpore odorata. Nunc alius eius usus est. Descripsit eam satis Diosc. nihilque in tota foliorum figura desiderari potest. Vnaque hæc foliorum similitudo, quæ omnibus in se paræqualisque est, et qualẽ paulo ante in coronaria hic descripsit, in Libanotidum nomen et census eam asciuit. Quæ licet in priore illo genere fœniculacea sint, ut hic ait, eamque ob causam *τρίχυνδρ*, i. comosa & capillata: nihilominus quoniam in comoso illo habitu latiora & crassiora Fœniculo sunt, ad formam foliorum Libanotidis huius, i. coronariæ nostratiseque Rosmarini accedunt. Fitque hæc illis eatenus tantum si milis. Quatenus enim Tus Libanotides aliæ olent, nihil huic simile habent.

¶ De Sphondyllo. C A P. LXXXVIII.

σφονδύλιον

Sphondylium aliqui Arangen uocant, alij Phalangion, alij Astereion, nonnulli Nesyryn aut Sphondylin, quidam Chorodanon, aut Oenanthen, Romani herbam Rutinalem. Aegyptij Apaphæar, Magi Osirin. Folia Platani & Panacis habet. Caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex Sefeli simile, sed latius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris. Flores eius albi, aut pallētes. Radice Rhaphani candida. nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocineris uitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uulnarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat. Cum oleo comode infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus. Cum Ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris uitia. Circumrasa eadem, callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accõmo datur. Qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

B A R B A R I C O R O L L.

Sphondylii succus qui exprimitur, mire appetitur a muscis, & quæ sunt illis similia. Sphondylium ferula est, differens a Panace folijs, quia sunt minora & Platani diuifura. Non nisi in opacis gignitur, in palustribus Patauini agri sæpe uisum. Huic semen eodem nomine medicina tantum utile.

¶ De Ferula. C A P. LXXXIX.

φερίουλα

Ferula di Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excreationes, Ecce liacosque. Contra uiperarum morsus in uino datur. Erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxilatur. Sudores ciēt, uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum sæpe cubitorum, folia Fœniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab immo caule uulnerata, Sagapenum efficitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 13. ca. 22.
lib. 20. cap. 27.
lib. 24. cap. 11.

Adescribitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum. Propterea Clearchus inter quæstiones luforias, quas nostri Scirpos, Græci Gryphos, & Aentigmata uocant, Ferulam dicit esse, lignum non lignum: sicut Pumicem, lapidem non lapidem: & Noctua, uolucrem non uolucrẽ, Calidis Ferula nascitur locis, atque trans maria, geniculatisque

uices nodata scapis. Duo ei genera. Narthecem Græci uocant, assurgentem altè. Nartheciam uero semper humilem: quæ ab aliquibus Ferulago dicitur. Quanq̃ et Thapsia Ferulago appellari solet. Est & instrumentum medicinale Ferula, siue Narthex. A genibus folia exeunt grandia, mollia, multifida, maxima, ut quæq̃ terræ sunt proxima: caulē amplectanda ut Harundines: sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei & semen Ariethi paulo maius insidet, sed quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Germinat uere primum folio, cū caule: qui annuus ei est. Radice singulari, profunda. Ferulæ lignum omne corticis loco habet, hoc est, forinsecus: ligni autem uice fungosam intus medullam, ut Sambuci. Nonnullæ inanitatē, ut Harundines. Nulli fruticum leuitas maior. Ob id senectuti Baculus. Semen Ferulæ. Thapsiam uocauere aliqui falso. Hoc in Italiâ cibus est. Conditur quippe, duratq̃ anni spacio in urceis. Caules quoq̃ decocti eduntur. Commendanturq̃ melle & melle. Corymbiam nominant: sicut racemos eius quos item condunt Corymbos: quibus & in coronas utebantur. Ignem Ferulis optime seruari certum est, easq̃ in Aegypto præcellere. Natura Ferularum Muris infestissima. Moriunt ea tactæ. Asinis gratissima sunt in pabulo. Ceteris iumentis presentia ne ueneno: quæ de causa id animal Libero patri assignatur: cui & Ferula. Ferulâ nō minus a feruendo dictam uideri facit Hippocrates: qui eam Plectinga uocauit. Inter fortunatas insulas, Noron uocatur. In qua Ferulæ tanta crescunt amplitudine, ut arbores fiant. Earum nigra succo amarissimo damnantur: candidæ probantur, adeo, ut poculentus quoq̃ sit.

EX M. VERG. COMM.

Condebatur quondâ, seruabaturq̃ sale ad cibos Ferulæ coliculus toro aîo: si huic scripto ri primū, mox Columellæ credimus. 1. operis sui uolumine, cap. 7. subenti cum plerisq̃ alijs oleribus & hunc condī. Nec fuit hic usus parum in ea laudandus: & si copiosior eius cibus capitis dolores faciat. Primas enim mensas in acetarijs, secundas uero cū obsonijs cocta multa frugalitate instruebat. Eadem senectuti, & a longa ualitudine se recolligentibus auxilio fuit, et adhuc est: quoniam nulli frutici leuitas maior, et cum leuitate ligni firmior duricies, & rigor. Quæ etiam ob causam Libero patri, Sileno, alijsq̃ numinis eius comitibus dedicata & concessa est, ut infirmos in ebrietate pedes leui hoc pedamento regerent.

De Peucedano.

CAP. XC.

Peucedanum aliqui Agrion uocant, alijs Agriophyllon. Magi bonum demonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum, Fœniculo similem. Comam habet statim ab terra foliosam, spissamq̃. Flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq̃ e plaga succus, umbræ mandatur. In sole siquidem confectum euanescit. Colligit capite prius & naribus rosaceo persusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatnr. Assata radix utilior fit. Tam lac, q̃ succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inueniuntur lachryma Turis similitudine, caulibus, radicibusq̃ adherens. Præferunt succus e Sardonîa, & Samothrace, colore ruffo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitū, pdest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. Omnibus in uniuersum uitijis neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant uiuulæ strangulatus, & ueternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. Cauernis dentium inditum, mitigat dolorem. Contra tussim efficacissime ex ouo assumit. Suspirijs, torminibus, & inflammationibus subuenit. Ventrem leniter emollit. Lienem absumit. Dis

D I O S C O R I D I S

C ficiles partus mire adiuuat. Facit ad uescicæ cruciatus, & renum distentiones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est. Sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In cærata & calfacientia malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmum, odoris plenum. Succus ad potiones amaris nucibus, aut Ruta, aut pane calido, aut Anetho resoluitur.

Pli. li. 25. ca. 9
lib. 26. cap. 5.

B A R B A R I C O R O L L.

P eucedanum, siue Peucedanus nomen a Pinu inuenit, ut Myrtdanum a Myrto, quanq̃ & amaritudinem uocabulum id significat apud poetas, celebrata inter primas herba. Laudatissimum in Arcadia Plinius existimat. Foditur exiru autumnu. Placent tenuerrimæ, & altissime radices. Hæ conciduntur in digitos quaternos ossis cultellis, funduntq̃ succum. Probatur hic & crassitudine mellea, & odore suauiter graui. Peucedanum officinæ ostendit quale Dioscorides in cætera tantum, radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo. Quod nos admonitionis causa dictum uolumus.

E X M. V E R G C O M M.

F ecit Pinus, quæ græcis Peuce dicitur Peucedano nomen: non congener congeneri, aut simili similibus planta, sed speciosa & procera arbor, parem folio tantum sibi humiliorem fruticem, ut inter homines quoddie sit, sola eius partis similitudine in genus & nomen suum sibi adoptauit: quod posteriores intelligentes latini, Pinastellum eam uocauerunt. Cuius uocis autor Apuleius est. Sic enim emendanda est quæ corrupte in impresso codice Pinastellum legitur. Idem quod in Diosc. simpliciter agrion nominatur, ab eo Sison agrion dicitur, quasi ex similitudine Peucedanus hæc Sison etiam diceretur, de quo non multo ante actum est, sed syluestre. Nobis uero ab re non fore, siquis suspicetur, deesse uoci illi agrion, quæ syluestre significat Marathrum: ut quoniam similes illi caules, & capillata folia habet, syluestre Marathrum diceretur. Quem admodum quod sequitur Agriophyllum, agreste Feniculi potuisse quondam legi. Suspicionem tamen hæc sunt: nec nos aliquid mutare ausi sumus, præterq̃ ex Apuleio agrion .i. agreste Sisonem uocari Peucedanum inter alia dicentes. Quæ non tamen a Peuce arbore dici in græcis potuit, q̃ ab amaritudine, quæ in eadem gente eadē illa uoce indicatur. In Arcadia nasci Peucedanum Theophrastus ait. 9. de plantarum historia uolumine. Verba eius sunt *γινται δὲ ἐν Ἀρκადίᾳ*. Quem autorem secutus Plinius lib. 35. cap. 9. laudatissimam in Arcadia nasci tradidit: tam aperte, tamq̃ uetusto autore, ut non dubitandum fuerit, in Arcadia ne, an in Sardinia legendus locus sit.

D Theophrastum enim secutus Plinius est. Neq̃ obstat q̃ hic dixerit, expressum in Sardinia et Salmothrace liquorem, probatissimum esse. Hic enim succum in his gentibus expressum laudauit, illi plantam in Arcadia nasci laudatissimam dixerunt. Eius in antiqua medicina multus fuit usus. Tradiditq̃ hic inter cætera, mederi Peucedani liquorem conuulsis: Græci *καταμύει τὸν σπασμὸν* uocant, Romani græcæ uocis imitatione, conuulsa appellauerunt.

De Gith, seu Melanthio. C A P. XCII.

μελάνθιον

G ith ex Græcis aliqui Melanthium, alij Mecona agrion melasna, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est, sæpe binos palmos excedens. Folijs ut Senecionis minutis, sed multo tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu Papaueris oblongo, intercurfantibus intus membranis. Quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illium fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex Iris no, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias, tumoresque uetustos cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum uetere uiuo impositum. Dentium doloribus decoctum cum aceto & tecta

prodest. Teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. De stillatione laborātes adiuuat, tritū in linteo & olfactū. Vrinā & menstrua ciet, multis diebus sumptū. Et lac extrahit. Difficultatē spirandi cū uino potū leuat. Phalangiorū moribus ex aqua drachmæ pondere haustū auxilia. Inceso serpentes fugant. Tradunt largius epotum enecare.

M B A R B A R I C O R O L L.

Elanthion, qd & Melanspermon, & Melanthe interim ab Hippocrate uocatur; & a Theophrasto, ut Theodorus existimat, Anthemon, siue Anthemion, Nigellam interpretatus. Quæ Anthemon oīno alia species est, q̃ Melanthion, siue Git, siue ut Palladius, Giddi. Nam & Melanthemon Chamemilon est, Melanion uero nigra Viola. Optimum Git, q̃ excitatissimi odoris, & q̃ nigerrimū. Culices suffitu necat, & mulcas, Succum eius largius sumēti, uenēnū esse, mirari licet: cū semen ipsum, inferiorē crustam panis, cereali sapore condiat gratissime. Aliud oīno genus uidetur esse Git, qd in segetibus passim nasci cernit: & Pseudomelanthion uocari potest, & Gitago, folijs fere Porri oblongis, flore purpureo, semine ac toto frutice maius q̃ Melanthium, nec odoratū. At uerum Git, de quo præsens Dioscoridi mētio est, folium habet Fœniculi, Senecionisue, florem ceruleum. Odor semini iocundus, nec ubiq̃ provenit. Hippocrates Cyprum cōmendat. Alia est herba Melandryum, in segete pratisq̃ nascens, albo flore, odorata, cuius cauliculum iocineri tritum, ex uino uetere probant.

Pli. li. 30. cā. 173
& 22. ca. 211

V E X M. V E R G. C O M M.

Ident Maio & Iunio mensibus in pratis, sepibus, limitibusq̃ oībus nascentē rura oīa Nigellā: nihilq̃ eo frutice frequentius, simul & uilius. Quondā grato sapore panē Nigellæ semen cōmendabat. Insupergebatur em̃ ante cocturā illi tritum, quemadmodū & Papaueris: non aliter q̃ & nos modo dulcarijs potius q̃ panī Anisum miscemus. Quod in Nigella merito miretur aliquis, sagacis naturæ artificij est, in conformandis eius uasculis: quibus concipit, maturatur, & seruat semen, colore nigrū, Panici seminis magnitudine. Sunt ea uascula longe papaueraceis minora, nec in mensura sua, ut illa longa. Nullā præterea habent qualē Papauera in summo stellā, sed latiore umbilicū: neq̃ intus eodē modo discurrentes membranas seminū locos dissepientes. In Papauere em̃ fulcorū modo intercedente, quasi aggere quodam canales sunt: in Nigella per mediū transeuntes, quasi parietes, quibus loculamenta illa seminū diuiduntur. Est illud discrimen etiā, quod singula in singulis Papauerū caulibus uascula sunt, in Nigella numero rosiora: ut quod numero seminū in singulis uasculis deest, uasculorū numero expleat. Solaq̃ hæc uasculi forma fecit, ut syluestre & nigrū Papauer a quibusdam Nigella diceretur. Græci a colore seminis Melanthion, & eorum exemplo latini Nigellam nominauerunt.

B

De Laserpicio, & Lasere.

C A P. XCIII.

Lasericium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem Maspetum uocant. Folijs Apio similibus, lato semine. Radix excalfacit. In cibis ægre concoquitur. Vesicæ noxia. Sugilatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cærato, medetur. Ischiadicis conuenit cum Irino, aut Cyprino cærato. Excrecentibus circa sedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta. Venenis pota resistit. Os commendat, cibis aut sali permista. Laser e radice, atq̃ caule scarificatis colligitur. Præfertur autem ruffum translucent, Myrrhæ æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu. Quod dilutū facile albescit. Syrenaicū si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo, ut ne os quidem gustanti, nisi paululū spiret. Medicum & Syriacū minus uiribus ualent, & grauiorem reddunt odorem. Laser omne antequā siccescat adulteratur sagapēno, aut sabæ lomento. Quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, uisu.

H iij

D I O S C O R I D I S

- C** & madefactione. Caulem aliqui Silphion, radicem Magudarín, & folia Maspeton uocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. Inflationes facit. Perunctas cum aceto, pipere, & uino, alopecias sanat. Oculorum aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Ture in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, Ficis coctis in posca, os colluitur. Iis prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immixtum. Valet aduersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus eiaculantur, potum, aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænis præcoërcitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, uel per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrasos uellit. Carato, aut aridorum ficuum carne præmolitum, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrecentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabrics opitulatur. Grauem, subitoq; irrauescentem uocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuam illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua mulsa utilissime gargarizatur. Vescentes eo; latiore colore mangonizat. Tussi commode in forbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis Ficis. Rigores discutit cum uino, pipere, & Ture potum. Neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lacintus coagulatum bibitur. Comitialibus ex aceto mulso proficit. Menses ciet cum pipere & myrrha potum. Coeliacos adiuuat in acino uuæ sumptum. Cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resolutur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expellendam arteriam, maxime cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicem Erucae. Fertur & altera Magudarís in Libya nasci. Radix Laserpicio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus, Eiusdem cum Lasere facultatis.
- D**

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 19. ca. 3.
lib. 12. cap. 23.

Silphio, id est, Laserpicio, radix crassa, multaq;. Caulis annuus, altitudine & crassitudine quasi Ferulæ. Foliis simile Apio: quod ineunte uere profilit, deciduūq; est, eximium purgando & saginando pecori. Carne mirabilem in modum iocunda. Folio amisso, caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni manditur, hominēq; diebus quadraginta purgat omni uitio. Semen ei latum, foliaceum. Succus duplex e scapo, Caulias uocatus. E radice Rizias, uiliior ac putrescens. Radici cortex niger, qui & detrahitur ad mercis adulteria. Preparatur uero succus admixto surfure, aut farina. Subinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatem perducant, id est, quatenus sudare desinat, & colorem suū capiat. Ita inueteratum a situ uendicant & carie, Laser uocantes. Perlucidior hic & purior a radice, dulcior a caule: ob id farina inditur, ut coeat. Natum ferunt Silphium hymbre crasso & piceo, repente madefacta tellure circa Hesperidum hortos, Syrtinque maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarū conditum. Vim autē illam, quatuor stadio-

rum spacio in Aphrica ualuisse, rem ueram & contumacē, atq; si coleretur, in deserta fugientē. Quidā radicem Laserpicio maiorē fuisse cubitali perhibent, e cuius medio caput sublime conspiciedumq; tuberet, unde primū succus ceu lacteus erumpat. Supernasci caulem Magydarin uocatum. Qzq; & semen eius quoq; Magydaris ab aliquibus dicitur, ut Galenus scribit, folio aurei coloris: quo seminis uice, austruinis flatibus decusso, a canis ortu Laserpiciū nascatur: eodemq; anno & scapum, & radicem aboleri, solū circumfodi subactum, glutumq; fieri. Radices eius recens præfectas ex aceto mandj. Pecora non purgari eo, sed si ægrotant, aut sanari protinus, quod ferē consequitur, aut emori. Prior opinio uidetur perfico Silphio congruere, multo infra Cyrenaicum nascenti. E Syria quoq; importari maxime solebat, Parthico, siue Persico deterius, Medico præstantius. Aetius Laser a Cyrenaico lacte separauit, siue quia Laser succus ipse Silphij, non lac esse: siue quia Lascriis appellatione Persicum, aut Medicum, ut cognobiliora, non Cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarij pendebatur, multo iam annis, ut Plinius ait, non inuenitur. Cum comedit ouis caulem, protinus dormit, capra sternutat, Tauros inflammatur naribus illitis. Serpentes audivissimas uini admixtum rumpit. Præcipit aut se quidam ex alto, cum in densum dolore cauis addidisset inclusum cæra. Laser Græci Opon uocant. Et quancq; Opos manantem herbæ cuiusq; succum, ex uulnere significet, Cyrenaicum tamē absolute pronuntiatus indicat, ut Varro placet: qui coagulari lac eo tradit. Post Cyrenaicum auctoritas deinde Medico, & Syriaco, ut Galenus inquit. Hippocrates, Phyllon Libyon, & Aethiopicum uocando ipsum Silphij semen significat Galeno: ut qd præ sua latitudine foliaceum sit. Interim Phyllon uocat hoc, nec adijcit Libycum. Radicem huius proprie Silphion appellat. Caulon uero, & eccaulema, scapum, id est, colem, ut Herodotus. Solini quoq; uerba de Silphio subiiciam. Apud Cyrenenses inquit Syre gignitur, odoratis radicibus, uirgulo herbido magis quā arbusculo: cuius e culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum, idq; pascentium hircorum inhæret barbulis: ubi cum arefactum inoleuit, guttis steriacis legitur ad usum mensarum, uel medelæ potius. Dicitum est primum inquit Syriacum, quia manat in modum lactis. Deinde usu deriuante, Laser nominatum. Paulo post Asbiæ inquit, uiuunt Lasere, hoc aluntur, hoc illis dulce est. Ex his uerbis Solinus satis indicat, se de Silphio loqui uoluisse quidem, sed parum nouisse quid diceret, ita salebrosus & desuetus in genere sermo eius est. Plautus in Rudent.

Speras inquit tibi multum hoc anno futurum Syre & Laserpiciū.
Sed cur Varro Draconon appellari dicit ipsum lac Cyrenaicum? An non Draconon, sed Diaconon legi potest: quia odorem intantum & uehementem habeat: & an Draconon a colore rubro. Talis enim præfertur, nam & herba Rubia, quādoq; apud Græcos Cinnabaris, & Draconon uocata est, auctore Dioscoride.

Magydaris siue, Magudaris, a Laserpicio differt teneritudine. In Syria & Parnasso monte plurima. Theophrastus & Plinius in Libya eam nasci pernegāt. Sunt qui & hanc Laserpiciū appellent. Periti uero facile discernunt uel aspectu.

E X M. V E R G. C O M M.

Longissime omnium Theophrastus de Silphio in sexto de plantarū historia egit. Licetq; Plinius, & præter Pliniū plures alij plantam, partesq; eius omnes longiore historia illustrauerint, nihilominus quoniā cuncta alij ab eo acciperunt, singuliq; aliquid, quod dixisse oportebat, reliquerunt, operæ precium erit, ex eo scriptore iisdem uerbis omnia semel reddidisse. Quæ huiusmodi sunt. Habet Silphium numerosas radices, & crassas: caulem qualis in Ferula est, & crassitudine illi æqualem. Folium, quod Maspeton uocant, Apio simile. Semen latum, foliaceumq;. Caulen non ultra annū prorogat, quemadmodū & Ferula. Vereq; primū folia & Maspeton hoc profert: quo oves mirifice purgantur, & pinguedine, egregia odoris suauitate carnes cōmendans. Post hæc caulē profert cibis quocūq; modo aptum. Tostus siquidem, & elixus estur. Feruntq; quadraginta diebus corpora purgare. Desiliat duplicem liquorem Silphium: a caule alterum, ab radice alterum. Vocantq; hunc a caulibus Cauliam, illum a radicibus Rhiziam. Habet radix nigrum corticem: auferuntq; in usu eum. Sunt & radicum, sectionisq; mensuræ quædam, quibus quantum oportet, cedunt, reliquum ad sectiones seruantes. Nec enim in secundo errare, necq; ultra q; constitutum sit secare oportet. Conrumpitur enim, putrescitq; si aliter fiat. Curant autē in Pyrexæo, Athenas ferentes Silphium hoc modo. Cum in uasa coniecerint, farinam illi miscent, multoq; tempore cōmouent: eaq; tractatione colorem contrahit, rationeq; hac curatum incorruptum permanet. Quæ igitur in secundo, curandoq; Silphio seruanda sunt, sic se habent, Libyæ latos occupat campos: siquidem spacio ultra sta-

C diorum quatuor milia nascitur: copiosumq; prouenire ab Hesperidum hortis ad Syrtim. Proprium illi est, cultos odisse locos: & si colatur, in deserta fugere, uelut id quod ferum sit, & cultura non indigeat. Narrant Cyrenaci, septem ante conditas Cyrenas annis apparuisse. Ex quo autem ædificata urbs est, trecenti intercesserunt anni, magistratum gerente Athenis Simonide. Et hæc quidem sic ferunt aliqui. Alij radicem Silphij ferunt cubitalem, pauloue ampliorem nasci: tumereq; in medio ueluti caput, qd sursum in sublime fertur, pauloq; minus q; supra terram emergit. Ex qua erumpit quod Lac uocatur. Tum caulis. Et post hunc quod Magydaris, & folium dicitur, quod semen est. Cumq; ualidus spirauerit Austro post caniculares dies, uentus id spargi: ex eoq; nasci Silphium. Eodemq; anno radicem fieri, & caulem. Verum non est hoc Silphij proprium. Habent enim & alia. Nisi hoc forte dicunt a sparso semine statim nasci. Quod uero priuatim, & ab alijs diuersum Silphium habet, illud narrat. Oportere annum fodi. Si enim relinquantur, semen totum, caulemq; proferre, deteriusq; ea ratione fieri & hoc, & radicem eius. Narrant præterea, fieri meliores circumfossas radices: quoniam renouetur terra. Sed hoc contrarium illi est, quod dicitur odisse culturam Silphium. Narrant & comedidi radices recentes in acetum concisas, & folium colore auri esse. Contrarium his etiam, purgari oues folium comedentes. Ferunt enim, hyeme & uere in montem exire oues, uesciq; eo, & alio quod Abrotono simile sit: & quod utrunq; calefaciendo est, non purgare, uerum siccare, & concoctionem adiuuare: ideoq; fieri, si morbosa, maleq; affecta ouis aliqua accedat, conualescere statim, aut mori: uerumtamen sæpius conualescere. Hæc autem utro modo se habent, considerandum est. Quæ uero Magydaris dicitur, aliud a Silphio est, rarius, & minore acrimonia, succoq; carens: discernitur a peritis solo aspectu. Nascitur in Syria & Cyrene. Narrant & in Parnaso nasci copiosam: & hanc Silphium esse. Si uero culta fugit loca, uelut Silphium, considerandum erit. Similiterq; an simile, æqualeue aliquid in folio & caule habet. In uniuersumq; si lachrymam destillat. Et hæc Theophrastus longius forte q; legentium aliquis æquo animo ferre potuerit ab eo & a nobis dicta: sed non inuilia, ut quæ a Dioscoride dicuntur, certius intelligi possint. Siquidem & ille de foliaceo semine, de Maspeto, Magydari, alijsq; omnibus pariter egit: & ut tunc ferebat fama, totam Lasericij historiam tradidit, quod Cyrenaico agrò probatissimum nascebatur. Tantumq; illi ex eo laudis & honoris accreuerat, ut Catullus una hac nota Cyrenem illustrauerit, Lasericiferas in epigrammate suo Cyrenas uocans. Nouerant enim tunc omnes, quod ubiq; nunc ignoratur. Eratq; in quotidiano ciborum usu Lasericium, quos grato sapore & odore commendabat. Miscebatur id, ut indicat Columella, oxyporis: & ut plures alij testantur, Lasericiatum acetum in multo usu erat. Longior erit commentatio hæc nostra, si quor usus Laser habuerit (sic enim Plinius etiam uocat) numerare uouerimus. Illud dixisse satis sit, quod Martialis de simila ait. Nec Lasericis dotes poteris numerare, nec usus. Cum medico totiens, cum sit & coquo totiens aptum. Vtebatur eo passim antiquitas, ob egregiam calefaciendi uim quam habet. Nunc autem tantum abest, ut nostrorum temporum Lasericio uti, ganea, aut medicina possit: ut rem ipsam utraq; ignoret, nec coniectura saltem ostendere possit. Nouerunt quidem nostræ ætatis medici Opon Cyrenaicum, sed nomen tantum, & in eo nomine, quod longissime ab antiquo Opo Cyrenaico differat. Idem em Opos Cyrenaicus, & Lasericium hoc quondam fuit: nunc autem in fetida Asa ea uoce utuntur: quæ retri & ingrati odoris sensu, tantum a Lasericio differt, quantum uersimile est quondam discrepasse eorum usus. In medicina sane infinitus pene fuit eius usus: indicantq; græcorum medici omnes, qui adhuc supersunt. Indicât Plinius uigefimos secundo uolumine capite uigefimo tertio, longissimeq; omnium hic scriptor. Ex cuius remedijs nos tantum signabimus, quæ nobis non sunt cum Barbaro eadem, duoq; præsertim. Quorum id primū est, quod ille ait, mederi Lasericium neruorum contractionibus: contractiones neruorum uertens, quod Dioscorides tetanicos dixit, longe ab illis diuersos. Qui quales sint in Sampfucino unguento dictum longius a nobis est. Alterum uero, quo loco uertit, dari Lasericium his qui lactis coagulū biberint. Quod γαλακτορρημωμίν hic scriptor uocat, in uenenorum censu ab eo libro sexto numeratum.

¶ De Sagapenio.

C A P. XCIII.

σκαγάνιον

Sagapenium ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter Laser & Galbanum redolens, gustu acri. Prodest la-

terum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, contulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & februm circumitus in potu. In unguenta probe admittitur. Menfes pellit. Sed foetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino haustum serpentium icibus. Olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesque detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

B A R B A R I C O R O L L.

Sagapenum medicinae tantum feritur in hortis. Dicitur & Sacopenium. Quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Illud enim Hammoniachi lachrymae simile Sagapenum uocant, fruticis sui nomine, ut Galenus inquit, per abusionem.

E X M. V E R G. C O M M.

Estati sunt ueteres Graeci, Ferulam Sagapenum ferentem, nullos habere in medicina usus: quodque in ea expetitur, liquorem solum esse: nec ultra id historiae eius aliquid addiderunt. Hic etiam Graeciae peregrinam fecit, in Media nasci dicens: & ex quo ferulaceam herbam dixit, genus, formam, partesque eius ignorasse uidetur. Plinius in Italia nasci Sagapenum testatur, dicens. 10. uolumine capite. 18. Sagapenum quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Nec ipse etiam ferentis id fruticis, aut herbae naturam tradidit. Ob eam causam, nec nos longius de eo agemus. Et si Plinius, ut paulo ante diximus, Sagapenum Italiae plantam dixerit, & praeter ea quae paulo ante ex eo citauimus libro. 19. capite septimo, in hortis, sed medicinae tantum feri dicat. In qua separarunt alij interpretes, perfrictiones a circularibus febribus: cum tamen ab hoc scriptore dicatur, dari Sagapenum contra perfrictiones quas circularium februm accessiones faciunt.

Pli. li. 19. ca. 8.
lib. 20. cap. 18.

De Euphorbio.

CAP. XCV.

Euphorbia Libyca arbor est, Ferulae speciem habens, quae in monte Atlante iuxta Mauritiam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolae, ouillos uentres elutos, arbori circūligant, & eminus caulem contis incidunt. Confectimque est plaga perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, praeter id quod sparsi in humum, uulnus ei aculatur. Duo succi generata. Vnum Orobī magnitudine, Sarcocolae modo emicat. Alterum in uentriculis concreuit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur Sarcocollae, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum. Quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur plane Euphorbium resipiat. Eius inuentio tempore Iubae regis Libyae cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli, collyriisque pro acrimoniae ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum eo utentes necesse est linamentis, aut caeratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriae prodiderunt, percussos a serpente nihil molesti passuros, si incisa ossetenus capitis cute, intritus succus infundatur, uulnusque postea conuatur.

Euphorbia

D I O S C O R I D I S

C A P. XCIII. B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 26. ca. 11.
lib. 25. cap. 13.

Evphorbium, & Euphorbiam, Iuba Ptolomei pater, in Atlante gigni herbā scribit, dicatō priuatim uolumine, folijs acanthinis, appellatam nomine inuentoris eius medici sui, & fratris Musæ. Suscipitur lac non omni uentriculo, sed hædino. Qui colligunt clarius uident. Siccatur Conto, ut effigiem Turis habeat. Adulteratur hædino lacte. Sed discernitur igni. Quod enim syncerū non est, fastidium odorem habet. Multū infra hunc succum est, qui in Gallia fit ex herba Chamælea, granum Cocci, ut Plinius inquit, ferente. Fractus, Hammoniaco similis est. Accendit os semel gustatū, & magis ex interuallo, donec fauces quoq; afficeret. Galenus & Paulus Phorbion, siue Phormion herbam quandā nominant, longe ab Euphorbio diuersam; cuius folio & semine, ad albugines utantur cum melle: spicula quoq; corporibus extrahi persuasum est. Græci codices Euphobion, pro Euphorbio fere scribunt.

χαλκήνη

Galbanū succus est nascentis in Syria Ferulæ, quod nonnulli Mesopotii uocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merū, Thuris effigiem præbens, minime lignosum, retinens, nonnihil adiecti feminis aut Ferulæ, graui odore, neq; humidū, neq; aridū. Adulteratur faba fresa, & Hammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit. Menses ac partus trahit, appositū, uel suffitu. Lentigines aceto & nitro peruncias tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatē spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersā toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sumptum, mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis. Comitiales, & uulvæ strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si uratur, fugat nidore serpentes, & peruncias feriri non patitur. Serpentes

D cum oleo & sphondylo circumpositū necat. Dentiū dolorem oblitū, aut cauernis inditum, mitigat. Urinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut rita, aut calido pane, mulsæ. Alias meconio, ære usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius fordes fluitabūt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum in fictili, aut ærea pixide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat. Operteq; uase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncærum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 25.
lib. 24. cap. 5.

Galbanum, Chalbanen Græci uocant, & ferulam, & lachrymam. Item Stagonitū, & Mesopotion. Laudatur simile Hammoniaco. Adulteratur Sagopno. Permutatur in libras quinq;. Medicinæ hoc tantum Galbanon a colore dictum candido existimant: a quo & uestis nomen Galbanum Iuuenali. Vulgo quoq; nautica operimenta sic uocamus. Nam Galbeum, ut Tranquillus ait, remedia sunt lanis inuoluta.

E X M. V E R G. C O M M.

Satis fore legentibus credimus, quod in Galbano natura ostendit: q; in Syria nascens, odoramentorum omnium focunda genitrix, ut auctor Theophrastus est, ingrato odore retrum, regionis eius hanc felicitatem turbauit. Nisi forte quæ in agendo sagax natura est, Galbanum Balsamo, Casiæ, Cinamomo, odoratisq; Calamo & Iunco ideo miscuit, hisdemq; locis nasci uoluit: ut quātum ingrati odoris ex terra Galbanū in se traxisset, tantū purioris odoris illis relinqueretur: damnareturq; una Galbani ferula, ut felicius cætera agerent. Quod illi, & hortos conferentibus consilium aliquando est, male & grauiter odoratis plantis, eodem loco confitis, aliarum odores augere. Nihil tamen sic etiam a natura damnatum, inutile homini penitus genitum est. Habet enim, ut cætera relinquamus, suas uires & laudes Galbanum. Solum aucto-

re Theophrasto, grauiter odoratum in Syria nascens, Potestq; præter alia quæ illi in morbis ab hoc scriptore, & ab alijs tribuuntur, ingrato agitare graues nidore chelidros: ut Maro cecinit. Et Nicander. *ταῖμιν καὶ βαρύνουσιν ἐπὶ φλογὶ μυρμηδῶνα χαλδάν, κακὰ δὲν ἔχει καὶ φύσιν οὐδ' ἔμνην*. Po-
tuit quondam etiam, ne bellorum & fortunæ gloria, & honoribus careret, oppida expugnare: illiusq; liquore suo facibus, Hispaniæ oppidum frustra diu oppugnatum, succendere: eaq; uictoria Romanis ciuibz gentile nomen ex se dare: quod non multo post a Domitij Neronis turpi & funesto principatu, inter Cæsares coleretur: essetq; a Galbano, quo usi in incendio oppidi in Hispania fuerant, Galbæ Romana gens, per Cæsarem suū toto orbe clari. Ex eo non paruum Galbano honoris accessit incrementum. Nosq; hæcenus a fortunæ gloria laudatum, ad haturam transferimus. Primumq; illud legentes monemus, non Turi tantum, sed Hamoniaco liquori simile Galbanū ceteros dicere, Pliniumq; præsertim. Quo fit, ut deesse huic scriptori id suspicemur. Quod præterea in impresso Diosco. legebatur, toxicis mederi *ἐν ἔξῃ*, quod est, cum aceto, ex ueterum meliorumq; codicum fide, cum uino uertimus. Persuasitq; id Plinius lib. 24. cap. 1. aduersari uenenis, maximeq; toxicis, cum Myrrha & uino dicens. Fecit eiusdē scriptoris autoritas etiam, accedente ueterum codicum eadem fide, ut quod erat *ἀνὰ τὴν ἀνταρρύθμιν πνεῦμα*, significaretq; uidebatur, facere ad urinæ angustias, ad contrarium sensum deflueretur: indicaretq; urinæ nocere, & eius angustias facere, Plinius enim eodem loco ait, No-
cere urinæ existimatur.

De Ammoniaco.

CAP. XC VII.

Ammoniacum hæba est, ex qua Amōniacum fit suffimen qd *ἄμμωνιάκον* Tymiana uocant, aliqui Agazyllon, alij Criotheum, alij Helizustrum, Romani Guttam appellant. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. Cuius fruticem cum radice Agasyllim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, Turis similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Trausma, id est, friatam appellant. Quod uero terram & calculos collegit, Phyrama, quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciâsq; discutit. Potum aluum soluit. Partus extrahit. Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendiciumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pituiæ succo sorbeatur. Cruentam urinam pellit. Albugines oculorum abstergit. Genarum scabriciam absumit. Tritum autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perūgi uile est, cū nitro et cyprino oleo uice acopi.

BARBARI COROLL.

Hammoniacum dicitur, quoniam stillat in harenis, iuxta Iouis Hammonis oraculum resinæ modo, aut gummi ipsum Thrausma, siue Thraustum. Turis habet masculi similitudinem. Phyrama uero pingue, resinofumq;. Adulteratur harenis uelut nascendo apprehensis. igitur q̄minimis glebis probatur, & q̄purissimis. Precium optimi in libras asses quadraginta. Metopion arbor ipsa dicitur, ut Galbani a Solino Metops.

EX M. VERG. COMM.

Habet salem, habet liquorem medicina Hamōniacum. Vtrūq; ab harenis, sed diuersa ratione dictum. Illū, q̄ sub harenis concrecat, et inueniatur. Hunc, q̄ in harenosa Libya ad Hammonis Iouis templum ex Ferula in harenas destillet, & ut in Ture sit, concretis grumīs inter eas

Pli. li. 12. cā. 29.
lib. 24. cap. 6.

C inueniatur, Græci ab harenis, quas *ἁμυνε* dicunt, utrumq; indicauerunt, sed illum salem, hūc liquorem Hāmōniacum, quasi harenosum uocantes: graui periculo miscendi simul diuersa, nisi eorum exemplo discrimen aliquod ex rei substantia addatur. Quod nos timentes, ut illū salē suo loco uocabimus, sic hunc autorem Diosc. guttam uocauimus: quasi & hic quemadmodum Tus Stagonias aliquando dictus fuerit: quæ uox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Hāmōniaci lachrymā eiusdem rei significatione appellat. Græci Hāmōniacō simpliciter, ut tunc erat eius uocis æstimatio, uocant. Fugientesq; nos æquiuocæ appellationis periculum, guttā Hāmōniacam diximus, lachrymam liquorēq; significantes Ferulæ, quæ priuatim in Libyā ad Hāmōnis Iouis tēplū tūc nasci ferebat. Quæ siue ab harenis, siue ab Hāmōnis Iouis templo uocari dicat, eandē rationē habet: qm̄ & Deus q̄ in eas harenas colebat, mortalibusq; respōdebat, ab iisdē harenis nomē a græcis inuenerat. Ideoq; Criothēos a forma eius, q̄ arietino capite pingebat, eadē hęc Ferula, liquorq; eius parit dictus est. Satīq; hic natale solū illi assignauit, dicens primum nasci in Lybiā ad Cyrenem: mox in Libyā ad Hāmōnem, Iouem illum intelligns qui in templo inter Libyæ harenas coleretur. Ceteræ eius appellationes barbaræ sunt, ideoq; nunc omnibus incognitæ.

De Sarcocolla. CAP. XCIVIII.

σαρκοκόλλα

Sarcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollini Turis similis, ruffa, gustu amara. Vulnēra glutinat. Oculorum fluctiones inhibet. Emplastris inseritur. Adulteratur ammisto gummi.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 24. ca. 14

Sarcocolla uetustate nigrescit maxime. Melior, quo candidior. E spina reddi putant, cum quadam acrimonia dulcem.

EX M. VERG. COMM.

Dinter gummi genera numeratur a Plinio Sarcocolla: eodemq; nomine arbor, & ex ea destillans gummi appellatur: quod ex ui, potestateq; sua nomen inuenit. Carnes enim, quas græci *σάρκα* dicunt, in uulneribus glutinat: quod eiusdem gentis uerbum *κόλλα* significat. Pictoribus idem Plinius utilissimum etiam dixit.

De Glaucio. CAP. XCIX.

γλαύκιον

Glaucium succus est hærbae quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs fere corniculati Papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usq; dum flaccescant. Deinde contulis succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorū medicamenta. Vtpote cum inter initia refrigeret.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 10. ca. 19
lib. 27. cap. 10.

Glaucion & in Parthia nascitur, folijs densis, minoribus q̄ Papaueris sordidioribusq; gustu amaro, cum quadam astrictione. Granum habet croci coloris. Hinc temperatur collyriū: quod medici Diaglaucion uocant, in quod recentiores Papauere cornuto utuntur, aut etiam Chelidonio maiore: ut nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione Papaueris illius, cū alioquin magno periculo hac parte hallucinentur, q̄ Chelidoniū & Papaueris eius natura erodendo sit, Glaucij multo mitior, & refrigerando fere. Propterea collyrium ex illo fumentorum oculis adhiberi solet, ex Glaucio humanis.

EX M. VERG. COMM.

Sunt Plinio, & Dioscoridi in Glaucij medicina & historia eadem fere omnia. Hic ad Hierapolim Syriæ, ille in Syria & Parthia nasci tradit. Ambo humilem herbam, sed ille simpliciter folijs Papaueris, hic cornuti Papaueris priuatim describit. Hic pinguioribus q̄ Papaueris, Plinius sordidioribus dixit: magno discrimine inter fordidum, & pingue. Diuersitatis ea potuit esse causa, ut quod nunc legitur *λιπαρότερα*, certa pinguedinis significatione, tunc *συνπαρότερα*, i. sordidiora legeretur, facillimo & lubrico, ut in Galbeano paulo ante diximus, in unius literæ si gura, & sensu ad contrariā & alterutram significationem lapsu. Locus in Plinio est, 17. uolumine cap. 10. Nobis aptius uisum est, Dioscoridem, q̄ Plinium sequi.

¶ De Glutino. CAP. C.

A

Glutinum quod Xylocollan, alij Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiæacum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrum uero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, lepræq; cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

BARBARI COROLL.

Glutinum, siue Gluten, Græce Colla. Præstantissimum fit ex auribus taurorum, & genitilibus. Sed adulteratur nihil æque, quibusuis pellibus inueteratis, calciamentisq; etiam decoctis. Rhodiæacum uero fidelissimum, eoq; & pisiores, & medici utuntur. Lignosum improbat. Contexi par est et reliqua Glutinum genera. Auro Glutenum est Santerna, ferro Argilla, gris massis Cadmia, laminis Alumen, Stagnum æramentis, stagno Argentum, marmor, & plûbo Resina, Plumbum nigrum albo, album ipsum sibi oleo. Est & Glutinum auri cum inducit ligno, Leucoporon, siue Leucophaeon uocatum, ex pluribus compositum, Sinopidis ponticæ selibra, Silis lucidi, pix, & melini græcienfis duobus mixtis, tritisq; una per duodecim dies. Est & Litho colla Glutenum ex lapidibus, sicut Ichthyocolla ex piscibus. Habetur et Gluten libarium ex simila & polhne. Nam Gluten Atticū pro gummi ex amygdala quadoq; accipitur a Chymicis.

Pli. li. ii. ca. 39

¶ De Glutino piscium. CAP. CI.

Gluten piscium, uenter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, carens squamis, & quod celerissime liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ eum faciei erugant & extendunt.

BARBARI COROLL.

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. Idemq; nomen Glutino eius: qd alij ex corio, alij ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dædali. Laudatur carens uenis, squamisq;. Madescere debet concisa in aqua, uel aceto nocte & die; mox tundi marinis lapidibus, ut facilius liquecat.

ixθύκαλλα

EX M. VERG. COMM.

Notum cunctis piscium Gluten est. Indiget enim eo uita quotidie & utitur: nec possunt sine eo peius felicitate in artibus tractari multa. Ob eam causam nihil ultra de eo agitur.

Pli. li. 32. cap. 7
B

¶ De Visco. CAP. CII.

Viscum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, qd asperi nihil, aut fursurosi concæperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxeo fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoq; in malo, pyro, & plæriscq; alijs arboribus. Quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæterasq; collectiones, ad maturationem perducit: Cū resina autem & cæra pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera, suppurationesq;, quas cacœthe uocant, ex Ture mollit. Lienem cum calce, Gagete, aut Asio lapide, impositum absument. Cum sandaraca, aut auripigmento illitum, ungues extrahit: Mistum cum calce & uini faciem suam uim intendit.

BARBARI COROLL.

Viscum Græce Ixos; & Ixiæ sturex ipse, ut Athenæus ait. Porro Viscum illud, quod inter

Pli. li. 16. ca. 44

C uenena ponitur a Dioscoride, Galenò, Plinio, Ixiám Græci uocant, & Vlochon, siue Vlophonon: quibus nominibus Chamæleontem quoq; dici constat: radicemq; affirmant esse hoc genus Visci, quod interficit: unde orta dubitatio est, Viscum hoc pro Chamæleontis, an pro sui generis, aut pro fruticis ipsius radice capiamus, ex quo Viscum conficit: Paulus, & Aetius in uenenis Ixiâ a Chamæleonte separant, alias & notas & medicinas reddendo. In Quercu, Illice, Pruno syluestri, Terebîntho, nec alijs arboribus adnascit. Dioscorides addit Malo, & Piro, Copiosissimū in Quercu. Pleriq; putant, quod Dryos, Hyphear uocat, Ion poeta sudorē quercus: namq; quod in Abiete & Larice fit, Stelim Eubœa dicit. Hyphear Arcadia nō Viscū. Viscū porro gñā bina, uel terna faciunt, & in omni arbore, excepta Illice, & Quercu, Differentiā cōstituit odor uirulq;, & folium, non iocundi odoris. Viscū coloris, ut poeta inq; aures, amari & lentū, e Robore præcipitū. Hyphear uero, ad faginanda pecora utilius, q̃a & alimentū plus & pinguetudinis in Larice et Abiete fit. Vita purgat primū: dein pinguefacit, quē suffecere purgationi ut Silphium. Quibus sit aliqua tabes intus, negant durare. Edendi ratio ætatis quadragenis diebus. Adhuc ut aliqui discrimen in hīs, qbus foliā decidunt & Visco decidere. Cōtra inhærere nato in æterno fronde. Omnino autē satū nullo mō prouenit: unde Maroni dictum, Quod non sua seminat arbor,

nec nisi per aluum simo redditum, maxime palumbis & turdis. Siue ut quidam ex Theophrasto, picis, *κίττα* pro *κίττα* legentes: cum alioquin Plautus, autore Seruio grammatico, de turdelis intellexerit: cum inquit, ipsa sibi auis mortem creat. Est autem Turdela, Turdi genus alterum, quod in Venetia prouincia, Drexanos uulgo nominant. In Liguria prius nōmē renerant maiores: Turdo sunt pennā subtus uaria. Græci Cossyphos modo appellant, ut quibdā uideat. Drexanos porro, quasi Dryxanos, hoc est, quercus arrodētes uocatos existimāt. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit, item Cortyphos, Palūbos Græci Phattas, siue Phasias uocat. Sed genus eorum unum, cuius simo Viscum nascatur. Athenæus Oenadem appellari tradit: quam Theodorus noster, in Aristotele Vinaginem interpretatus est. Altitudo eius nō exceedit cubitale, semper fruticosi ac uirentis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando nō fert. Viscum fit ex acinis imaturis, hoc est, uiridibus, nondum candidis, quod eis p maturitātē contingit. Hi p menses collecti, siccant, atq; tusi, deinde putrefacti aqua, duodenis fere diebus, mox in profluente rursus malleo tustuntur, amissis corticibus, interiore carne lentescentes. Quidā decoquunt in aqua tufum, donec inq̃atet. Nonnulli cōmanducantes acinos, expuunt cortices. Optimum est quod sine cortice est, quodq; leuissimū. Quidam efficacius futurum promittūt, detractum prima luna e robore sine ferro. Visco nihil est glutinosius, pennis maxime uolucrū ligandis, iuglādium oleo subactum, cum libeat insidias molliri. Druydes in Gallia nihil habet Visco & arbore in qua gignatur, si modo sit Robur, sacratius, nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid hīs adnascitur, e coelo missum putant. Inuentu rarum, magna religione petitur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas, sub arbore sacerdos ueste candida, falcē aurea id demetit, genus excipiente fago: taurosq; duos coloris candi, tum primū cornibus uinctos imolant, precātes ut suum donum deus prosperum faciat. Fecunditatem eo potō dari, cuiuscunq; animalium sterili arbitrantur, contraq; uenena omnia esse remediū. Fit & ex alijs quoq; rebus Viscum in Syria. Ex acinis, quos ab Augusti honore, ut coniſco, Sebastos appellaue runt. Hęc Myxa ueteribus fuisse interpretor: quē per diminutionem quoq; Myxaria dicuntur. Arbuti eius ligno, cortex albus, ramis uirens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuæ siccatur. Hic in medicina uentrū soluit, destillationesq; comprimit, & rofiones Vesicæ, & intestinorum animalia. Damascenum inde Viscum paratur, commendatissimum aucupijs, præterq; aquatiliū uolucrum. Fingitur & ex radice quadam Viscum Lātane dicti fruticis, æque ueteribus incogniti, folio hirsuto, molli: flore candido, odorato: quem sustinet umbella. Viminibus lentis ad nexū acinis ut uua, primo rubentibus, post nigrantibus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Q uale solet siluis brumali frigore Viscum, Fronde uirere noua, qd nō sua seminat arbos, tale & suum Dioscoridi describitur, nulla appellationū eius addita diuersitate. Quales in secundo de causis plantarum numerauit Theophrastus, Hyphear, Stelida, & Ixon, siue Ixiám, eandem rem aliter alijs in Græcia uocantibus. Et si non deessent tunc etiam, qui in diuersis arboribus nascens Viscum diuersa appellatione ostenderent, nasciq; Hyphear & Stelida in abiete & picea dicerent: Viscum uero in quercu, terebîntho, alijsq; multis. Fuerunt etiam, qui in diuersa parte eiusdem arboris nascens, diuerso nomine indicarent: hincq; Hyphear, illinc

Viscum; & Stelida natum appellarent. Quæ nos, nouisse ea uolentibus legenda in Theophrasto relinquimus, & præter Theophrastum in Plinio. 16. uolumine; capite. 45. quò loco reddita ipsè uerbis ex eo scriptore a Plinio omnia fuerunt.

A

De Aparinè. CAP. CIII.

AParinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, nonnulli Philanthropon uocant; ramosam hærbam & quadrangulam, ex interuallis orbiculatò foliorum ambitu, ut in Rubia. Flos albus, semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figurà, asperitate uestium tenaci. Ea pastores colli uice utuntur, ad eximendos è lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum succus, potu cõtra uiperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur. Infusa aurium dolori medetur. Hærbacum axungia trita strumas discutit.

ἀπαρίνη

BARBARI COROLL.

AParinè, quàm nostri & Lappam uocant, Hippocrates Philistion, & Phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euidens, sed occultus in ea flos maturefcit, & intra se germinat semen: uelut animalia quæ in se pariunt, ut uiperæ. Nasctur in frumentario agro; inter Lentem præcipue; item pratis, hortisq;. Ramosa hæc & hirsuta, quinis sensq; in orbem circa ramos; folijs per interualla, Semen subdulce, Omphacocarpon a Plinio, Galenò, & Paulo Aegineta dicitur. Nisi quis Omphalocarpon ex Dioscoride legi mallet, ab umbilici similitudine, quam semen præfert, Philanthropos uero dicta est hæc a nouulis herba, quia uelut amici solent, cõmeantium lacinijs obhæreare. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphum appellatum, ex argumento, qd rami eius ex interuallo sponte cõeant, ceu amantes: post digrediantur, concipiant, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatim compositus; atq; ita confitis, hortorum septa impenetrabili compage fieri.

Pli. li. 27. cã. 5.

EX M. VERG. COMM.

B

Cognitum & inuentum facilem, inter legumina & in frumentaria segete Aparinè sua descriptione Theophrastus & Diosc. fecerunt; ipsa etiam tenaci nexu prætereuntium uestibus hærens, & quale hic descripsit semen ostendens in medio umbilicatum, ad cognoscendâ se, suisq; cõtemplationem nolentes etiam couertit. Persequuntur eam quòtanis Maio & Iunio mensibus manui, messoriaq; falce agricolæ, pestem satis suis eam sentientes, nihilq; apricis & pinguibus agris frequentius nascitur. Copiosior tñ inter legumina q̃ inter frumenta inuenitur. Nouerunt calamitatem suam rustici. Nomen tñ, & malefici eius causam ignorant. Et ut in similibus sit, quorum ignoratur nomen, Lappam uocant. Qua uoce non in Aparinè tñ, sed in cunctis quorum matura semina uestibus prætereuntium inherēt, ignari utuntur. Quæ sane multa sunt; & inter alia Eupatorium etiam, de quo suo loco dicemus. Ex quo factum est, ut noni ærate nostra tñ, sed antiquis etiã temporibus parum certa in huiusmodi fuerit nòminum ratio. Arcioniq; Lappam tñ aliq; dixerint, alij Aparinè hanc, alij plures alias quarum semen aut qd asperum, amarum ue, aut cuspidatum est uestibus hæret: quasi ad faciendũ genus & nomē una hæc nota satis esset.

De Alyffo. CAP. CIIII.

ALyffon, aliq; Aspidion, alij Aplophyllò, alij Accysitò, alij Adeston nuncupât. Fruticosa hærbula est, unicaulis, rotundis folijs fructu duplicium scutorũ effigie, in quo est semē quadatenus latum. In montibus & aspis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febrì potu discutit. Idẽ efficit, si qs eã aut teneat, aut odoret. Cũ melle trita, uicia cutis in facie, et lètigines emēdat. Cõtusa ī edulio, rabiei canis mederi putat. Domib. appesa, salutaris esse credit. Et hominibus, atq; animalib. fascini, amuletum. Pupureo linteo circumligata pecorũ morbos abigit.

ἀλυσσόν

BARBARI COROLL.

ALyffon, distat a Rubia, folijs tantum ramisq; minoribus, ita dictum, qd rabiem canum de-

Pli. li. 24. cã. 11

C fendat. Saniem conspecto eo ficari tradunt. Autor est Aetius, quosdam existimare hanc herbam nihil differre ab Sideriti Heraclea: quæ tertia est inter Siderites, a Dioscoride monstrata. Sed & Photion grammaticus, folio eam subpurpureo describit: quod & Siderites habet tertia: ut Dioscorides est autor. Ego Alysson ab hac Sideriti plurimū differre nihil dubito. Alysson & poculi genus est, uerū scriptura separat, q̄ & per simplex, s, & per, u. scribitur: at p̄ herba captum per, y, & per duplex, ff. Sunt qui Cruciale herbam uulgo dictā, pro Alyffo demonstrant. Sed interest, q̄ Alyffon quinis per interualla folijs ostēdimus, Cruciale quaternis, unde nomē, & minus hirsutis. Exilius & huic semē q̄: Alyffo est, minus etiamnū, anguloso caule. Flos Alyffo candidus, Cruciali uero luteus. Cæterum impudentius falluntur, qui Alyffon p̄ ea capiūt, quæ Liliago, siue Liliarca, et Martegonia rustice uocat, folio quadatenus et flore Lili purpureo.

E X M. V E R G. C O M M.

Fecit sibi ex re nomen Alyffon, & ex pluribus quas habet in medendo uires, eam unde uocaretur elegit, quæ grauiori hominis malo succurreret. Et qm̄ rabidi canis morsus sentire non patitur, ideo Alyffon passim dicta est. Celebrauit eā symposij sui tertio uolumine Plutarchus: numerauitq̄ inter eas quæ solo contactu, halituue, aut aspectu prodesse homini possunt: non tamē contra rabidi canis maleficiū, sed contra singultum. Verba eius sunt. τὴν δὲ ἄλυσσον καλοῦμεν βοτάνην, καὶ λαβόντες ἕως τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσέχοντες ἀπαλλάττονται λαγμοῖ. λέγεται δὲ καὶ ποιμῖνες ἀγαθὴ καὶ κτηόδια παραφρονεῖν ταῖς μένδραις. Quæ uerbū de uerbo sic uertat alijs. Quin etiam herbam quam Alyffon uocant, alijs in manus accipientes, alijs conspicientes solum a singultu liberantur. Fertur eadem ouillo & caprino pecori salutaris esse, prope caulas et septa eorum confita. Quod ab hoc ipso primum & ultimum inter uires & remedia eius numeratur. Quemadmodum quod ad rabidi canis morsus pertinet, a Paulo Aegineta in quinto traditur, quo loco Cataplasma contra rabiem canis quoddam instituit, iubetq̄ decocto eius uti, his uerbis. μετὰ ὑπερήματες ἐλαιοσφάνον, ἢ τῆς σιδερίτιδος τῆς ἱρακλίας ἢ καὶ ἄλυσσον καλοῦσι τινες. Quorum sensus est. Cum decocto Saluæ, aut Hieraciæ Sideritidis, quā aliqui Alyffon uocant. Ex quo dubitari cōgit, sit ne hæc sui generis herba, an Sideritidi re ipsa eadē, nomine uero tm̄ diuersa.

D Hic propriū genus habere Alyffon, separata ab illa eius historia et medicina ostēdit. Plinius hoc ipsum lib. 24. cap. 11. confirmat, Rubiæ similem his uerbis describens. Distat Erithrodanus ab eo quæ Alyffon uocat, folijs tm̄ & ramis minoribus. Verūtm̄ huic nō cōuenit, q̄ folio rosido, cōtra q̄ in Rubia est, Alyffon describit: & præter folia singularē caule Alyffo tribuit. Fruticosa aut Rubia est. Alyffo semē est in latitudine se explicās, Rubia rotundū habet. Et ne lōgiores simus, nihil qd̄ certā similitudine faciat nobis in Rubia inuenitur. Credimus ob eā causam, posterioribus his scriptoribus nō satis certas fuisse Alyffi huius historiā & notas: ex quo alijs Sideritum eā crediderūt: & alijs Rubiæ, p̄ter q̄ iu folijs & ramis simile fecerunt. Nos Diosco. descriptione, & Plutarchi testimonio contenti, sui generis herbam antiquis fuisse dicemus.

De Asclepiade. C A P. CV.

ἄσκληπιός

Asclepiadem aliqui Ciffion, alijs Cissophyllon nominant. Ramos emittit longos, folia Hederæ, radices numerosas, tenues, odoratas. Floris uirus graue. Semen Securidacæ. Nascitur in montibus. Radices ex uino potæ terminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulua mammarumque ulcera, quæ cacœthe uocant, illinuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

Habēt Ciffios, & Cissophyllos, aliæ Asclepiadis appellationes, manifestam ex foliorū forma, quemadmodum & nos diximus, causam. Omnes enim qualis et ea est Hederæ folio debent. Cura aut Asclepias primum dicta sit, coniecisse etiam difficile non fuerit. Vt enim ab inuentoribus suis plures aliæ nomen inuenerunt, sic & ab Asclepio faciendū homini medicinā antiquo autore Asclepias nominata hæc est. Non parū hoc uno argumento laudanda, et in honore habēda, cui p̄ter ea quæ a Diosco. dicta hoc capite sunt, plures in historia notas, & in medicina uires græcorū herbarū alijs tribuerunt. Nepetæ similem caule, & toto frutice esse dicētes: & Hederæ quidē folia habere, uerū lōgiora & lanuginosa. Habere idēdē, ut hic ait, florē graueolentem, sed Rosæ figura, nasci q̄ nō simpliciter in montibus, uerū in aquosis montib. In medicinā aut

tradiderunt posse radicem eius tantū derasam, ut nihil asperitatis habeat, in fistulas demissam callos earum absumere & implere: Nec folia tantū, uerumetiam flores maleficis māmaram, & muliebrium locorum uitij prodesse. Quinetiā eandem radicem siccatam, moxq; in puluerem tusam, & cum axungia coactam, malagmatis modo impositam, inflammationes discutere, & nervos mollire. Flores præterea, foliaq; siccata, mox trita, in summa cute uulncribus utiliter in spergi. Sordida purgare ulcera, & ad cicatricem perducere, genitaliumq; uitij egregie mederi. Quæ omnia ex antiquis græcis collecta, a nobis historia & medicina huius scriptoris libenter addita sunt, ne quid relinqueretur, quod legentibus prodesse aliqua ratione posset: Quam deinde nos Securidacam diximus, cuius semini simile Asclepiadis semen hic ait, ea est quam Theophrastus, pluresq; alij Pelecinum, a securis forma dixerunt.

De Atractylide.

CAP. CVI.

Atractylis, quam aliqui Amyron uocant, alij Cnicon sylvestrem, alij Aspidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon, Romani Præsepium, aliqui Fusum agrestem, alij Colum rusticam, spina est Cnico similis, folia multo longiora ferens, in summis uirgis, magna parte nuda, asperaq;. Quæ sceminae pro fufis utuntur. Capitula in cacumine spinis horrent. Flos luteus. Quibusdam in locis purpureus inuenitur. Radix tenuis, superuacua. Coma, semen, & folia cum pipere & uino teruntur utilissime contra scorpionum ictus. Percussos traidunt, quamdiu ea teneatur hæba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

στρακτύλις

BARBARI COROLL.

Atractylis aculeata est, sed & acanacea, hoc est, & conceptu & floris sede, aut etiam semine, fructuq; spinoso: laborantibus Græcis uno uerbo, tres affectus & qualitates includere: idem erat, quod Acorna, siue Acarna, nisi candidior esset, & nisi decrepta, cuteq; adhibita sanguineum succum funderet. Quæ de causa Theophrasto Phonos, & Androsomon quoq; uocatur ab Aetio, odore grauis, pestemq; denunciāns. Sero maturescente semine, nec ante autumnum. Quanquam hoc de omnibus spinosis dici potest. Acornæ spina, pro folio, ut Theophrastus inquit. Cneco Urbano similis, colore tantum rufus, pingui succo. Atractylis Cnecum est sylvestre. De satiuo dicitur in mentione sua. Sylvestre iterum secatur, una minor & satiuo similior: caule rectiore, ac rigido exilis. Itaq; & pro colu antiquæ mulieres utebantur: ex eoq; hanc proprie Atractylida nominabant, semine candido, grandi, amaro. Altera hirsutior, torosior caule, quasi Sonchi, & qui pene humi serpar, semine minuto, amaro, frequenti, piloso.

Pli. li. 21. ca. 115.

B

EX M. VERG. COMM.

Cogimur ex Theophrasto, pluribus locis de plantarum historia, certius eam nouisse: qui primum inter genera agrestis Cnici Atractylidem numerat. Dico autem Cnicum, quem nunc medicina Carthamum, & rura nostra Crocum saracenum uocant. Suntq; post multa de Atractylide libro sexto uerba eius hæc, ἀτρακτύλις δὲ τις καλῆται καὶ λευκοτέρα τούτων. ἰδιὸν δὲ ἔχει τὸ φύλλον, ὅτι ἀφαιρούμενον καὶ τῇ σαρκὶ προσφαιρούμενον αἵματός ἐστι ποτὶ τὸν χυλόν. Αὐτὸ καὶ φέρον ἔστι καθεύει τὰ ἀκάνθια ταύτων. ἔχει δὲ πᾶν ὅμοιον δυνὴν καὶ φονάδῳ ἐπὶ δὲ καὶ τιλοῖσι τὸ κερπὸν πρὸς τὸ μύσπερον. Quod est. Vocatur & quædam Atractylis, candidior his: cuius foliis priuatim id habet, ut a uulsum, carniq; confricatū, sanguineum reddat succū. Eamq; ob causam phonon. i. e. idem aliqui spinā hanc uocant. Habet præterea grauē & sanguinis in cæde odorē. Sero, nec nisi per autumnum fructū absoluit. Idem libro. 9. de plantarū historia a principio statim, de liquoze succoq; plantarum & eius diuersitate agens, sanguineū succum Atractylidi tribuit. Quæ causa fuit, ut a quibusdā Androsomos uocaretur: quoniā & illa sanguineo succo est, ut certius in ea docebitur. Quemadmodū & Cnicos agrestis: quod a Theophrasto dictum libro sexto paulo ante testati sumus. Cur aut præsepium (modo integra ea uox sit) Romani eā uocarent, incertū nobis est. Cur aut Colum rusticā, & agrestem Fusum, ex herbæ figura factū est: quæ glabro, nudoq; penitus caule surgens, & cum aruit in flexili duriciē rigente, aliquando cubitali altitudine,

I iij

D I O S C O R I D I S

C plærung; autē minor, nec nisi in summō foliosa & aculeata, in maiore illa altitudine colum, in minore fusos rusticiis forminis ad lanificium dedit. Vidimus nos, licetq; omnibus per astatem uidere, locis incultis & nemoribus nascentem spinis suis, in summō sic dispositis, ut impositos lanarum peniculos, sine uinculo, nexuue alio quopiam sustinere facillime possint. Numerauit eam Paulus Aeginetalibro primo inter olera, carduisq; his uerbis coniunxit, τὰ δὲ ἀκύνθωδιν πάντα διὸν ἐκώλυσεν ἢ δὲ ἀτρακτύλιν ἢ δὲ τὰ τριᾶντα. Quod est. Aculeata uero omnia, quales Carduus, & Atractylis est. Credimusq; nos, Atractylidis nomine hoc satium Cnicum intellexisse: in cuius genere Theophrastus eam numerauit: & natura praesenti similitudine constituisse uidetur. Ob quam, ut paulo ante diximus, agrestem Cnicum hanc aliqui uocauerunt: & inter eos Theophrastus quo diximus loco.

De Polycnemo.

CAP. CVII.

πολύνεμον

Polycnemon quidam Clinopedion, alij Polygonaton, alij Iouis colum, alij Echeonymon uocant. Frutex est surculosus, folijs Origani, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus adglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad urinæ stillicidia, ruptaq; cum uino bibitur. Edocuit experientia contritos in uino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ Violentiae uocantur, magno esse praesidio.

B A R B A R I C O R O L L.

Polycnemon, & Cusilæ bubulæ similis appingitur, odoratis corymbis, acri & dulci odore.

De Clinopodio.

CAP. CVIII.

κλινωπόδιον

Clinopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij Zopyrion uocant, fruticem folijs Serpyllo similem, surculosum, duum palmorum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores Marrubij, ex interuallis speciem lectipedum praebent. Bibitur hærba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menses & partus pellit. Et pensiles uerrucas, quas Acrochordonas uocant, eijs cit aliquot diebus potum. Alium sistit, decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiant ex aqua. Alioquin ex uino.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 15.

Clinopodion, non desunt, quibus herba Orbiculata uulgo dicta, Serpyllo similis etiam si non serpit, aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum ambitu a Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio, dicentis, ex interualllo Marrubij similitudine flores in ea cerni: quod quidem in ea, quæ Orbiculata dicitur, non est: sed continua florum series subalbertium, acinis in summo ternis, quaternisue, radice fibris multiplici.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex tridinijs suis quondam in agrum exeuntes graecorum herbarij, pedumq; lectorum suorum imaginem animo seruantes, facile inter alias quaerētium oculos fallentem, Clinopodion herbam inueniebant. Quodq; illis quotidianum, fabrica spectaculum fecerat: diligentius & speciosius elaboratum, natura locis incultis ostendebat. Nunc mutata artium & fabricæ ratione, si quis nouisse id cupiat, herbam inuenisse prius oportebit: tum ex floribus eius in antiquorum lectis, pedum quibus fulcirentur formam didicisse. Veruntamen, ut illud ratione cecebat (natura enim artibus exempla in cunctis ex se proposuit, neq; ab artibus ad naturam motus est) sic nostra etate difficillimum, in tam multa florum naturæ uarietate, tam multisq; eorum formis, hoc uno argumento herbam deprehendere. Et si Plinius. 24. uolumine capite. 15. non parum ad hanc rem contulerit, orbiculato florum ambitu eam describens. Cuius formæ

adiectione satis descripsisse rem uidetur. Omnes enim nouimus, quid orbiculato, quid florum, & quid ambitu significetur: plures scilicet simul surgere flores, circulum per ambitum facere, & ex eo orbiculum describi: in quo relictis inter eos flores medijs spacijs, inane aliquid & uacuum relinquatur: quam Pedum in antiquis lectis fuisse formam, facile conijcere est. Siquidem his exemplis pictores, statuarij, architectiq; sua opera adhuc exornant. Nihilq; non una hac ratione in uentum ab illis, & tractatum semper est.

De Leontopedalo.

CAP. CIX.

Leon topedalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontion, alijs Doris, aut Dorideris, alijs Lychnis agria, alijs Pardale, alijs Horybethron, alijs Rhapeion, Romanis Patabelclon, aut Semen leoninu dicitur. Caulem emittit dodrātalem, aut altiore, plurimis alis concauū, & in cacumine semina duo aut tria, in siliquis ciceris modo. Flores Fremio similes, punicei coloris. Folia Brassicæ, sed Papaueris diuisura. Radicibus nigris Rapæ similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex uino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

BARBARI COROLL.

Leon topetalon radice grandi. Vocatur & Dorypetron a Plinio.

EX M. VERG. COMM.

Descripsit Leon topetalon libro. 27. capite. 11. Plinius iisdem uerbis, Rapeion alijs uocari dicens, folio Brassicæ, caule semipedali, alis multis, semine in cacumine in siliquis Ciceris modo. Radice Rapo simili, grandi & nigra. Nasci eam in aruis, & omnium generum serpentibus in uiu non potam radicem aduersari, nec quicq; celerius proficere. Quæ omnia ab hoc ipso scriptore multo antea dicta fuerant. Nomen a ferocissimo & generosissimo omnium animali in antiquis Græcis inuenit. Quid autē illi cum leone conueniat, non satis certum nobis est. Si nominis origo expendatur, nihil Leon topetalon erit q̃ leonis folium. Sed quæ leonis partem, uerbi causa pedem, aurem, linguam, aliamue huiusmodi folium referat, non satis pro comperto nobis est: præsertim uariantibus alijs appellationibus Leontio, scilicet Leontopodio, & Leonino semine. Quæ omnes a Leone causam nominis, sed non eodem modo habent. Siquidem Leontion leunculus est, Leontopodion leonis pedem significat: & leoninum semen causam nominis in semine, non in folio esse ostendit. Cur autē agrestis lychnis diceretur floris figura in causa, est: quæ Anemonem & syluestre papauer dici etiā Leon topetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaq; figura similes, aut non dissimiles saltem inter se sunt.

De Teucrio.

CAP. CX.

Teucrion, siue ut alijs placet, Teucris, hærbæ est uirgæ refrens effigiem, Trisaginis similitudine, tenui folio, non multū a Cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Sciffademy uberim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruefactæ ius, potu lienem potenter absumit. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium morsibus ex aceto solo, siue ficis.

BARBARI COROLL.

Teucrion hoc (ut puto) & ramis Hyfopi describitur a Plinio: surculosa, folio fabæ. Colli florem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeq; ex Cilicijs & Pisidijs montibus commendant. Dicitur eadem Teucria. Quidam & aliam Teucrion uocarunt, de qua in Hemionitide scribendum nobis est.

EX M. VERG. COMM.

Miscet, confunditq; aliqui Teucriū hanc cū Aspleno, & Hemionitide. Non ob aliā, ut credimus cām, q̃ q̃ eadē potestate sunt, Oēs em lieni medent: sed nullas habēt cōes alias notas, ut ex earū historia cognoscere oib; facile est. Diuersa sunt noīa, discrepant partes, seorsumq; ueteres Græci de singulis tradiderūt. Plinius, qd paulo ante diximus, uirgas Teucrij luncos uo

A

Leon topedalon

Pli. li. 26. ca. 8.

B

Teucrion

Pli. li. 25. ca. 6. lib. 26. cap. 6.

Cauit, lentore & tenacē flexurā uirgarum in Teucrio contēplatus: & ex pluribus luncorū notis eā elegit, q̄ multis alijs in plantarū historia cōgrueret: nec priuatim, pprieq; iunctū genus faceret. Quod em̄ luncū indicat, nomēq; & genus illi facit. Nudus glaberq; furculus est. Cetera em̄ cōmunia illi cū plerisq; alijs sunt, sed hoc primū illi mox per eū alijs natura dedit. Dico aut̄ fo liorū totis caulibus, & uirgis eius priuationē, quā in Teucrio sunt in uirgis eius pendētia, nati uo lentore utiliū modo flexilibus. Ob quā naturā & formā, non defuerit qui Teucriū hanc agresti Sedo & Portulacae similē dicerent, & eorū nominibus etiā indicaret. Volumus & illud legentibus significare, q̄ ab hoc remedium lienosis instituitur, cum ficis ex aceto illini Teucri on, & c. credere nos non simpliciter ficos, sed caricas intelligendas esse.

¶ De Trifagine.

C A P. CXI.

χαμαιδrops
χαμαιδροφ

Chamædrys Græcis, alijs Chamædrops, Latinis Trifago dici tur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quā cum Teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & alperis. Frutex do drantalīs, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus. Flore penē purpureo. Carpitur semine prægna ns. Recens in aqua decocta, po tu tussibus, indurato lienī, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis au xiliatur. Cit menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota cōsumit. Ad uersus serpentū uenena ex uino, potu, illitūq; efficacissima. Trita digerit ur in pastillos ad supradicta. Purgat uetera ulcera cum melle. Cum oleo illita, caliginem oculorū discutit. Natura eius est calfacere.

B A R B A R I C O R O L L.

lib. 24. cap. 15.

Chamædrys, quæ & Serrata dicitur, q̄ ab ea ferram inuentam putent, folia habet magnitu dine Menthae. Fit & uinum ex ea medicis.

E X M. V E R G. C O M M.

DCoactæ bræuitatis Quercus quædā Trixago est: & inde illi in græcis nomē. Neq; em̄ Cha mædrys aliud, q̄ humilē & terrestrem Quercū significat. Ab eadem breuitate aliud Chamæro pis nomē illi ab aliquibus factū est. Sic em̄ ex ueterū græcorū & latinorū fide legendū esse existima mus. Est hic Chamædropa uocari tradat. Plinij em̄ codices oēs ante Barbari castigationē Cha mæropem, non Chamædropē uocari Trixaginē dicebāt. Eam uocē scriptoris huius lectū ille emēdauit. Is etiā quē nos habemus longobardis literis scriptū latinū ueterē Dioscoridē, Cha mæropa, non Chamædropa Trixaginē dici testat. Nec nos rationē, aut cām habemus, cur hoc magis, q̄ illud dici oporteat. Et si excogitāda aliqua sit, nulla uero similior erit, q̄ quoniam humi serpat sic dicta quondā fuerit. Et si id recipias, tuac Chamærops dicenda potius erit. Nos inam biguo plures uelut testes secuti, Chamæropē potius diximus. Cur aut̄ Teucrion hæc etiā dice ret, cām hic ipse ostēdit: ideoq; a nobis relinquēda est: qui multo labore quæsitā Romanæ appel lationis originē nondū inuenimus. Nihil em̄ Plinius aliud inquit, q̄ Trixaginē latine dici Cha mædryn herbā. Descripsit tñ eam, & q̄ hic folia parua dixit, ille Menthae magnitudine: & quæ hic figura & incisuris quernis similibus, ille colore & diuisura Quercus. Adiecit p̄terea Serratā ab alijs hæc herbā dici: & ab ea. i. ab incisuris illis, q̄s per ambitū habet, eodē quo nūc modo in Serra uident dentes, inuenta fuisse Serrā. Theophrastus cum lib. 9. de plantarū historia eius me minisset, de notis partibusq; eius breuiter egit. Sed quas habet in medicinā uires multas, nume rauit alias ab hoc scriptore: ideoq; repetēdas hoc loco a nobis: quæ huiusmodi sunt. Trixa ginis aut̄ folia ruptis, uulneribusq; p̄sunt: in quē usum ex oleo trita imponunt. Profut̄ & depa scentibus ulceribus. Purgat semē bilem, cōfert idē oculis, oportetq; tritum foliū ex oleo illis ad mouere. Habet Trixago quernis similia folia, totūq; eius incrementū dodrantale est: q̄d a no bis in Dioscor. expansa manus mensura significatū est. Adiecit p̄terea Theophrastus odoratā, suauēq; Trixaginē hanc esse, faciliē inuētū, & ubiq; ex his notis cognoscendā herbam.

¶ De Leucade.

C A P. CXII.

λευκα

LEucas montana, latioribus q̄ urbana folijs, semine acriore, amar iore, ori ingrato. Efficacior tamen q̄ satiuā habetur. Vtraq; ex ui

no contra animalium uenena, præcipue marinorum, opitulatur.

BARBARI COROLL.

Lucas, eadem fortasse fuerit cum Leuce, ut Plinij uerba usurpem. Verum Leucadis inquit speciem, auctores non tradunt. De Leuce uero Mercuriali herbe similem dicunt, nomenque ex causa accepisse, per medium folium candida transcurrente linea, quare Mesoleucon quidam uocant. Leuce dicitur & ipsa radix, Armoracia: Itemque Androsaces. Est & arboris nomen Leuca, hoc est, albæ Populi.

Pli. li. 19. ca. 5.
lib. 27. cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Suspecta omnia. Siquidem Plinius nihil certum de Leucade hac tradidit: nec dubitasse tantum, sed sub hac appellatione ignorasse eam uidetur. Hic ipse etiam parum certe historiam ex his, quæ modo leguntur eius tradit. Fuisseque quondam certioris eius descriptionem, indicio est latius Dioscorides, & eius præcipue qui apud nos uetustissimus codex est. In quo a necessaria diuisione caput hoc, & his uerbis incipit. Leucæ duo sunt genera. Vna est montana, & altera hortiuæ. Mox sequitur quod nunc in Dioscoride legitur, Montana latiore, quæ satiuæ folio est. Videturque hic ordo necessitatem habere, ut facta prius diuisione, Alterius generis historia, & uires tractentur. Sunt præterea in medio capite, quæ manifeste in impresso Dioscoride, & alijs grecis desint: quæ poterunt uolentes facile inuenire. Nobis paulo minus quæ pro comperto est, nullibi incolume esse hoc caput: & quod restitui in integrum non potest, quasi desperatum uelut relinquitur.

De Lychnide.

CAP. CXIII.

Lychnis coronaria, quam aliqui Athanaton uocant, alij Acylonia, alij Ballarion, alij Geranopodion, quidam Corymbion, alij qui Taurion, alij Sceptum, aut Malbion, Aegyptij Semeon, Magi Sanguinem Apocathemenes, Romani Genucularem, aut Balariam, Flore est albæ Violæ similis, quo corollæ faciuntur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur.

doxio

BARBARI COROLL.

Lychnis æstate floret. Lucernulam Theodorus conuertit. Plinius quodam loco Flaminiam cognominat, alibi Rosam Græcam. Non nisi in humidis locis prouenit, nunquam excedens quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Et hæc ab altera Græcula uocata differt, de qua diximus inter Rosas. Differt & a Lychnitide: de qua in Phlomidibus. Amerias Rhizotomus Lychnin & Veneris labro natam putauit, cum a Vulcano compressa lauit se: præstantissimamque haberi in insulis Cipro, Lemno, Strongyle, Herice, Cytheris. Lychnin hanc & Taurion dici scribunt. Alia tamen est quæ Taura uulgo nominatur, siue Tora, flore ceruleo, folio rotundo, radice Polypodij hirsuta, & uermis nigri effigie. Venehosa herba: cui per antipathiam naturæ alia occurrit herba Antitauræ, & Antitora eodem nomine, folio rotundo.

EX M. VERG. COMM.

Quo argumento nautis in mari sæpe uisum piscem Lucernam ueteres Romani appellauerunt, ignea per os exerta lingua, tranquillis noctibus relucens: eodem in humidis nascentē magnitudine Violæ, sed figura Rosæ, florem Lychnida, ut fertur, ueteres Græci dixerunt. Noctibus enim hic etiam fulgere creditur, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam uidentium oculis in se conuertere. Non aliter quæ & Felium oculi flammæ modo in tenebris fulgent, & putres in humidis caudices eodem tempore ignis speciem quandam uidentibus afferunt. Quorum & si diuersa materia sit, communis tamen omnibus causa humoris copia est. Nisi forte in Felibus, quod ab Aegyptijs obseruatum fuerat, non in humore, sed in lunæ luminibus lucis eius causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augentur, dilatenturque in eius animalis oculo pupula: & cum toto orbe mortalibus fulget id sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domus ficos parietes animalis eius nobis oculus splendeat. Quemadmodum secundo uolumine in Muscula longius testati sumus. Verum tamen alterius questionis est, & huius, & eorum quæ paulo ante dicta a nobis sunt causas & rationes inuenisse. Nunc quod herbarium & scriptoris huius

C interpretem deceat, floribus omnem naturam dixisse satis sit. Nascitur locis humentibus hic flos, a Theophrasto ad extremum sexti de plantarum historia voluminis primus inter aestiuos flores numeratus. Habet enim haec naturae pars sua discrimina. Nec difficile est in ea, eiusque scriptoribus uernos, aestiuos, autumnales & hyemales obseruasse flores: & in aestiuis Lychnidem hanc, quam Plinius flammeam aliquando ex eo quod diximus argumento, aliquando a gente graecam Rosam nominauit, colore purpureo, quinque folijs tantum: & si in satia obseruauerint quidam senis florere aliquando folijs, agrestem quinis semper. Magnitudo illi est Violae, quam hic non multo post matronale uocat: eam scilicet quae prima uer nunciat, omnesque alios praue nit flores, & quod proprium eius est, multa uno pediculo pendet. Figura Rosae est, folijs Rosarum modo dispositis & pendentibus. Nullum habet odorem: quod demeret aliquis: ex quo coronarius flos est, & coronarii nominis honore ab agresti distinguit: deficienteque eo, uerisimile est solam floris spem in coronis amata fuisse. Ob quam causam in magno nominum & appellationum ambitu in gentibus fuit: alijs Athanarum, i. immortalis appellanibus, quod longissime a prima aestate ad extremum autumnum floret: alijs Bellarion, quae uox licet incerta modo habeat in graecis significationem, antiquam tamen fuisse in lexico suo Isidorus indicat: Ballarin trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicquam de ea testatus est. Plinius lib. 21. capite. 26. radicem Lychnidis non coronariae & satiae, sed agrestis Asianos Bolicis appellasse tradidit. Potueruntque haec simul misceri, & in duabus uocibus quae principij similitudinem aliquam haberent, in diuersam penitus librariorum incuria sine euasisse. Verum ut saepe alias testati sumus, non multifacienda haec sunt: eaque ob eam cetera a nobis relinquunt.

De syluestri Lychnide. CAP. CXIII.

λυχνίς ἡγρία

LYchnis syluestris, Tragopoton, alias Atocion, alias Hieracopodion, aut Lampas uocatur. Aegyptijs Semura, Magis Apothemenes Taurus, Romanis Agreste Intubum. Omnia urbanae similibus. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto. Ictus a Scorpione subuenit. Aiunt huius herbae appositu, scorpiones torpere & inertes prorsus reddi

D BARBARI COROLL.

LYchnidis syluestris radicem Asiani Boblitem uocant. Hanc a nostris Accipitrinum pedem appellari scribit Dioscorides, quod Accipitrinus pes apud nostrum uulgus est, quae Corneola quoque dicitur, folio Salicis fere pusillo, flore sublueto, cum filiquis Ciceri similibus, & in his semen in ficere capillos dicitur, colore rubro. Qualis autem sit Pes milui, siue Pes miluinus, dicta Columellae inter herbas, quae in usum colligi & reponi oportet, ipse non explicauit.

E X M. V E R G. C O M M.

Communes satiae, Coronariaeque Lychnidis agrestis & rusticae appellationes similitudo fecit. Et quam hic agrestem Hieracopodion, id est, accipitrinum pedem uocari ait, illic satiam Grinum nominari dixerat, nulla, aut exigua diuersitate. Credimusque nos, foliorum herbae, non floris notam hanc esse. Quemadmodum certa floris est, quam hic Lampada dixit, manifesta significatione a luce, fulgoreque illo, de quo in Satia dictum longius est. Foliorum item, non floris nota habent agreste Intybum, & Seris. Ceterae a peritioribus docendae relinquuntur. Agrestis Lychnidis tantum in medicina usus est. Nec refert, quod hic satius semen scorpionibus aduersari dixerit. Id enim primum & efficacissime agrestis potest. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante eum Nicander in Theriacis suis. *δαδ τινυχνίς ἡγρία*. &c. Quo loco interpretis etus de agresti hac intelligi tantum iubet, unamque hanc *ὀφιοειδέα καὶ σκορπιειδέα* mederi.

De Lilio. CAP. CXV.

λίριον

GRaeci Crinon Basilicon uocant, alij Crinanthemon, alij Calirion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili, Aegyptij Simphaphon, quidam Tialon, Latini Lilium, aliqui Rosam Iconis, Syri Sasa, Aphri Abiblabon. Lilia coronamentis se dedunt, Lyria a quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alij Susinum appellant. Neruos, & priuatim uuluae

duricias emolliens. Folia hærbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur. Feruefacta, ambustis proficiunt. Aceto condita, uulneribus opitulantur. Succus adiecto melle, aut aceto, in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni, ambusta sanat. Vuluam emollit. Menses ciet. Vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita, neruis præcisis, luxatiscq; medetur. Vitilignes, furfures, & lepras emendat. Vlceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem, & erugat. Teritur in aceto, cum Hyoscyami solijs, et farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum, moribus serpentium aduersatur. Ignibus sacris semen, & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ, efficacissima unguentis nascuntur.

BARBARI COROLL.

Lilium Græci Crinon, sed fruticem eius Crinoniam, quasi Liliarium, ut uiolarium, & rosarium appellant. nam Lilieta, rosata, uioletaq; aliud sunt, ut constat. Lilium e lunonis lacte natum, Græci perhibent, resperfa terra, dum Hercule dormienti uberibus admoto, mox post suctum digresso, late fluxit. Ob id Lilium a nostris lunonia rosa dictum uideri potest. Philinus a quibusdam non uocari quod sit Lilium existimat. Ambrosiam Corinthi Nicander, & Aphrodites Charma, hoc est, quasi Veneris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. In Consula, ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosia, Carystius, quæ nihil aliud sit q; Liliū, memorie proditum reliquit. Nascitur e lachryma sua Liliū, inarescente cum defluxit, uelut Olufatium. Liliū quadruplex genus in Theophrasto. Primi, flos Vere cum Viola sepe alba, pauloue postea erumpit. Hoc ab eo proprie Crinon, hoc est, Lilium uocatur. Alterū genus Liriū appellat, uere quidem omnino florens, uerū serius cum Narcisso. Forteq; hoc sit quod a Plinio Liliū trans maria nuncupatum est. Tertium æstate floret, & Cerinthum priuatum uocari puto, q; et alias res Cerinthus significat: ut inferius liquebit. Quartū genus, qd itē Liriū Græci nominat, Autumno floret; emicatq; primis hyemibribus. Est & rubens Lilium, differēs (ut arbitror) a purpureo, uisum a nobis Patuuij in Felicis horto. Probatissimum in Antiochia, & Laodicea Syriæ; mox Phaselide: quartum locum obtinente: qd in Italia nascitur. Hoc genus pprie Crinon a Græcis uocari, & florem eius Cynorhodon, auior est Plinius. Hoc & Hippocrates accepit, cum rubentia Cynorhoda feminarum purgationibus cōmendat in uino. Lilia purpurea & arte sunt, maceratis in fece uini scapis antequam serantur mense Martio, & in scrobe circumfusus eadem fece: in quem usum scapos arecentes colligunt Iulio mense, Lilia in fumo suspendētes. Caule gemino Purpurea uisuntur aliquando, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix herbaceus. Post ærturum & æquinoctium autumnū florent Purpurea: quorum genus unum uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Calices, ut diximus herbacei, cetera eadem quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos saepe nutriendi bulbos. Lilium Rose nobilitate proximum. Ideoq; lunonis rosa dicitur. Nulli florū proceritas maior, in terim cubitorum trium: languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius, solijs eius foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim se laxantibus, calathi effigie, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio croceis. Ita odor, colorq; duplex: alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in Lilio. Singulis caulibus Lilia modo singula, modo plura sustinentur: quod & rarius est. Pandit se, uel detractum parerit, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed solijs copiosis, colore admodū uirētib; diffusis, et quasi uno uersu cōditis, ad mulierū profluita, & fracturas medicis questū. Cerinthus, de qua scribere distulimus, & Rhitacē, siue ut Aristoteles, Crithacē significat: quæ & Sădaraca appellat, & a Dioscoride Cerāthemus, libro quinto, ex arborū succo, gummi mō genita & uerū rose. Vnde Vernigini quoq; uulgo nomen. De hac & in Propole nō nihil diximus, africū statū minor, austri, nigrior, aquilonibus melior, et rubēs. Plurimū in Græcis nucibus, apud cibo aptissima dī operatur: q; sepe inuenitur in sauiorum inanitibus sepositus, amari saporis, & humore plenus. Menecrates, sed nemo præter eum, ut inquit Plinius, auior

Pli. li. ii. ca. 5.
The. li. 6. ca. 6

B

Cest, Erithacem, aut Cerinthum florem esse futuræ mellationis indicium. Est & Cerinthe quæ uocatur herba propter apes ferenda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis succum habente: cuius gramen Virgilius esse dixit ignobile. Quæ nominum uicinitas, fortasse Menecratem fecerit. Nam & Aristoteles Cerinthi florem ad hunc usum citat in libro de animalibus: quanquæ in eo non Cerinthus, sed mendose scribitur, calyinthrus.

EX M. VERG. COMM.

EXigebat floris maiestas, ut Iogius de eo ageremus: sed tã certa in Plinio, Theophrasto, et in his quæ eos scriptores cõmentationibus suis miscuerunt, historia est, ut nihil dicendũ nobis relictu fuerit. Nõ tacebimus tñ quod hic ait Liriu a quibusdã Lilium dici a Theophrasto uolumine, scilicet de plantarum historia, non magis Lilio quæ Narcisso tribui. Verba eius sunt, ὁ δὲ γάρκιστος τὸ λεῖπτον, ὃ μὲν γὰρ τὸ αἰ δὲ κύνα καλοῦσιν. Quod est, Narcissus uero, aut Lirium. Hi enim sic, illi eo nomine uocant. Verum certius suo loco Narcissi tractabitur historia.

De Ballote, seu Marrubio nigro. CAP. CXVI.

βαλλωτά

BAlloten, nomine alio nigrum Marrubium, aut magnum uocant, aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nosprasson, alij Nothera, alij Nochelin, aut Nostelim, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Uicerariam, aut Marrubium nigrum, alij Canthurinum, Aegyptij Asphon, Magi Isionis sanguinem. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice. Folijs maioribus quæ Marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graue olentibus, Apiaastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam uocauerunt. Caulibus albis, orbiculato florum ambitu, qui Rotæ speciem præbeat. Vis eius effica

Dficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut cõdylomata reprimat. Purgat & sordida ulcera cum melle.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 9.
lib. 24. cap. 15.

BAllote, fruticosa est herba. Nec uideo qui possim tueri Plinij, qui ait, Græci Porrum nigrum uocant. Et infra. Ballote inquit folijs est Porri maioribus, nigrioribusque. At Græci non Porrum nigrum, sed Marrubium nigrum Ballotem, sine ulla controuersia cognominant. Nec folia est sunt porracea, sed Marrubij & Citraginis. Deceptum affinitate nominum constat Prasion, melian, pro prasion legentem. Est autem Prasion Porrum, Prasion Marrubium. Idem error a Plinio committitur in herba Stachye.

EX M. VERG. COMM.

Deprehenderunt iam pridem & alij turpem Plinij in Ballote lapsum lib. 27. cap. 9. Porrum nigrum eam appellantis. Diuque iactatus contra eum scriptorem hic error est: quæ nulla ratione excusari in homine potest, tam apertam culpam, & ex culpa facilem criminationem habet. Id nos relinquimus, quod semel in iudicium delatum fuerit, ad nouam reuocare censuram asperius existimantes. Nec aliud bonarum artium, præsertimque græcarum literarum cupidos momentum, quæ nullam fore unquam satis in earum professione illis diligentiam, ex quo in unius tantum literarum mutatione, adiectione, detractatione uel tantum uersatur periculum: ut pro Marrubio, Porrum aliquis alios doceat. Nota omnibus modo etiam Ballote est, a foliorum similitudine Marrubium, a coloris diuersitate Nigrum dicta. Siquidem candidus Marrubio, Ballote uero niger caulis est, reliqua omnia similia & æqualia habentibus: ut ex utriusque historia cognouisse facile est. Hanc Marrubium, alterum Marrubium, id est, secundum aliqui manifesta indicatione dixerunt: quoniam illud prius, hoc posterius sit: non naturæ ordine, sed hominum honore & appellatione. Habet & ulceraria appellatio alia certam ex usu & uiribus causam: quemadmodum & Marrubium Cantherinum a Romanis dici potuit, quod eo pascerentur cantherij.

De Apiaastro. CAP. CXVII.

μελίσφυλλον

Melissophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænam, alij Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrum, aut Citraginem, Galli Merisimorion uocant. Id sibi nomen usurpauit, quoniã apes ipsa

herba delectantur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante diximus, similia essent, nisi minora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum uino pota, aut illita, profunt contra ictus phalangiorum, scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. De cocto eorundem gratia, foueri prodest. Defectionibus foeminarum ad ciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxilianr. Torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiant. Vlcera purgant, Articularios dolores illita sedant.

BARBARI COROLL.

Melissophyllum, siue Melinon, Apiastrum ab Igin o uocari cepit, eruditissimo alioquin uiro, sed quæ omnes hac in parte damniunt. Et quod magis mirere, sequantur tamē. Nam & Dioscorides, & Varro ita eam uocant. In coronamenta folio & hæc uenit. Adeo autem nullo magis flore apes gaudent, ut si perungantur aluearia eo, non fugiant, & in copia eius examina facillime continentur. Citraginem a nostris uocari & hanc Dioscorides affirmat, ab odoris similitudine. Palladius uero q̄ recte, nescio, Melissophyllum aliud a Citragine, siue quod idem est, Citreagine uideatur intellexisse, in mentione apum.

Pli. li. ii. ca. 20
lib. 20, cap. 11.

EX M. VERG. COMM.

Omnēs Apiastrī in græcis appellationes, exceptis barbaris, latinisq;, a melle & ab apibus sunt. Satisq; indicādis his, ne tot alios numeremus, Nicāder in græcis, Maro in latinis est. Quorum alter fame pressis, aut morbo laborantibus apibus apponi iussit trita Melissophylla, &c. Alter in theriacis suis longius descripta re cecinit, τὴν ἄντι μελισσῶν ἰπικλίνουσι βοτάνῃς οἱ δὲ μελιστὰς τῆς γὰρ περὶ φῶλα μέλισσαι, ὅθι μὴ διγύρονται μέλισσες περὶ τοὺς ἰπικλίνουσι. Quin etiā Plinius. 21. uolunt mine & capite uicelimo Melitænā uocari Apiastrū dixit. Omnibus, ut testati paulo ante sumus, mellis, aut apium ratio & significatio coniuncta est.

B

De Marrubio. CAP. CXVIII.

PRASSIONE Græcis aliqui uocant, alij Eupatorium, alij Phyllophares, alij Tripedilon, alij Camelopodion, Aegyptij Asteropen, Magi Tauri sanguinem, aliqui Aphedron, Latini Marrubium, aliqui Labeoniam, Aphri Auerberziam. Frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro. Semen in caulibus, & ex interuallis flores uerticillato ambitu asperi. Nascitur propter ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus, datur cum melle suspiciosus, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam, cum sicca Iri efficit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. Item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut a serpentibus demorsi sunt. Vesicam, renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus conuenienter instillatur, per se, aut cum rosaceo.

ἡπιδίων

C **M**arrubium duplex, folio herbaceo, & incisuris altioribus serrato, unguentarijs, ut Theophrastus ait, quæstio ad quædam. Hoc & candidum appellauerim. Alterum folio rotundiore, uehementer squalido, ut Saluia, & obscurius serrato: quod quidẽ ego, aut Ballotem ipsam, de qua diximus, aut ei ualde similem interpreter. nam & medicinæ congruunt in Plinio.

Fecit Theophrastus libro sexto de plantarum historia Marrubij duo genera. Alterum quod magis herbaceum, magisque incisuris diuisum folium haberet: quo qui pharmaca & morborum remedia tractant, in aliquibus uterentur. Alterũ quod rotundiore & squalidore folio esset: quale in altero Saluia genere, quod Sphacelum nominant, uidet & in eo tenuioribus incisuris. Videturq; diuiso hæc in hoc tantum Marrubij genere facta ab eo fuisse. Quam uero Plinius, autore Castore, in nigrum & candidum tradidit Ballotem, paulo ante descriptam, & hoc manifeste complectitur. Nisi forte quod hic colore tantum discreuit, Theophrastus incisuris fortiorum indicauit, & præter incisuras herbaceo colore & squalore: ut ex his niger color, & candidus intelligeretur. Siquidem nigredo in plantarum folijs, plenior & obscurior uiredo intelligenda est: & in squalore cinereus et albicans color in plantis plerumq; uidet. In quam partem inclinat animus nobis: nec aliud, sed aliter a Theophrasto & Plinio dictũ fuisse de utroq; Marrubio existimamus. Fuit hoc olus in multo nominum honore apud ueteres, quemadmodum multus in medicina etiam usus, præsertimq; in laxandis liene & iccore, curandisq; tot alijs morbis & uitijs, quæ hoc capite a Dioscoride numerantur.

Stachys frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Stachys, folijs colore in luteum inclinante, nec Porri, ut Plinio placet, sed ut Dioscoridi, qd & nos uidimus, Marrubij similibus: quod & in Balloide idem autor peccauit. Vidimus eam Romanæ, ubi & Nauiculam, & alij Coronatam herbam uocant.

Inominis in Stachy hac ratio expendat, spicatus credetur frutex: quales pleriq; alij, & herbe quotidie uident. In frugibus em̃ primo Stachyn græci adhuc Spicã uocant. Sed nullũ Spicę uetustum in eo deprehendit. Hic nihil qd eo pertineat dixit. Nec Plinius lib. 24. cap. 15. de eo agens Spicæ aliqd simile in eo ostendit. Græcorũ medici nihil addiderunt, præterq; amaro sapore esse Stachyn, tertium in calefaciendo ordinem habere: nec solũ menses et secundas pellere, sed abortuum etiã esse. Quod uero omnibus cõmune sit, Marrubio simile oēs fecerunt. Quia una similitudinis ratione, nullam in eo Spicam cõjicere licet. Habet qdem græcorum Stachys præter primam illam Spicę significationẽ plerasq; alias. Nam & in medicina nexus, uinculiq; modus & ratio quædam Stachys dictus est. Et in nauium fabrica, alijq; aliquot artibus nomen hoc inuenitur: sed ubiq; a Spicis translatus. Fecit rem minus certam Plinius etiam, qui contra hunc scriptorem colore in luteum inclinato folia describit, quæ hic candida tradit.

Phyllitis, quam aliqui Phyllin, alij Acaulon, alij syluestre Lappathum uocant, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sena, aut septena, quæ parte anteriore læuiã cernunt, a tergo aut em̃ pensiles quasi uermiculos ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorũ ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulẽ, neq; semẽ p̃fert. Folia in uino pota serpentiũ moribus aduersant. Quadrupedibus p̃ os infusa auxilio sũt. Et si dysenteria, aut resoluta aluus exercet, potui danẽ.

BARBARI COROLL.

Aliud uidetur genus Phyllitis esse, q̃ Phyllanthion. Est aut̃ Phyllanthion cognomento Dy-
ticon apud Democritum, ad purpuram tingendam satis celebre, nec præterea quale id sit mon-
stratur. In Theophrasto ac Plinio legitur & Phyllanthies herba, inter spinosas, sed mitior acule-
is, & ab radice tantum foliata.

EX M. VERG. COMM.

Foliosus cespes potius q̃ planta Phyllitis est, ubiq̃ ad parietū radices nascens. Ob quam cau-
sam ex antiquis græcis & posterioribus latinis aliqui, non Phyllitida tantum a folijs, sed Pyrgi-
tim a turribus etiam, q̃ ad radices earum nascitur eam dixerunt. Viret diu herba, contra geli-
cidia hyemis contumax, nullo unq̃ prolato caule: ex quo Acaulos etiam dicta fuit. Id enim ea
uox græcis significat. Feliciq̃ similitudinis comparatione usi sunt, qui Rumici eam, ut est, simi-
lem uidentes, syluestrem Rumicem appellauerunt. Rigent recta in altum surgentia eius folia.
Ex quo hic interiorem eius partem appellauit, eam scilicet, qua se inuicem folia spectant multo
lauiore nitentia, extrinseca autem qua parietes & terram. Negauit hic ultra caulem, flores & se-
men ferre Phyllitid: nec nos aliter obseruauimus. Dubitandum tamen, & querendum de se-
mine est, cum copiosa, & quibus locis antea non fuerat nascatur. Paulus Aegineta nihil de ea
aliud tradit, q̃ acerbis sapore esse, ideoq̃ potam fluores alui compefcere.

De Phalangio. CAP. CXXI.

Phalangium a quibusdam Phalangition uocatur, ab alijs Leu-
cantha. Ramuli sunt ei duo, pluresue, in diuersa tendentes. Flos
candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine nigro, lato ad
Lenticulę dimidiatę figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, hæ-
r bacei coloris, dum a terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folio, se-
mine, flore cum uino poto, auxiliatur contra scorpionum, phalangio-
rumq̃ ictus. Tormina quoq̃ discutit.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

Phalangion, & Leucanthemon, & Leucacantham uocant. Flos Lilio rubro similis.
Omittimus quæ Paulus Aegineta libro. 6. de ea dixerit, *φαλαγγίτης ἀνέμαται μὲν ἀπὸ τοῦ τοῦ*
φαλαγγίου βοτάνῃ. Plinius enim satis unus est idem testatus lib. 27. Huius folio, uel flore, uel
semine contra scorpionum, phalangiorumq̃ & serpentium ictus auxiliantur. &c. Tantaq̃ illi
& tam presens contra Phalangiorum morsus uis est, ut uno hoc salutis humanę auxilio cla-
ra inter alias plantas semper fuerit. Nec tantum illi ad gloriam nominis profuit Lilio similis &
candidissimus flos, ob quem Leucacantha dicta etiam est. Candorem enim floris utraq̃ ea uox
indicat, quātum a ueneno insecti illius per eam seruata homini salus. Habet Phalangites notas
ubiq̃, & adhuc omnes illas quę a Diosco. & ab alijs in historia eius illi tribuuntur. Nec diffi-
cile est locis incultis eam inuenire. Nosq̃ ex obseruatione eius, non sine ratione persuademur q̃d
nunc in Diosc. legitur, flores multas habere incisuras, non de floribus, uerum de folijs rectius
intelligi posse. Plures enim quales in quercu folium eius incisuras habet, idq̃ mediocri Betę
quantitate est: nihil tamen in communi græcorum omnium lectione mutatum a nobis est. Eo
dem modo quod *παχὺ*, idest, crassum in cunctis legitur, *πλατὴ* latum legi debere. Plinius enim
lato semine eam describit: & hic dimidia Lentis quantitate dici esse: pauloq̃ post Lente graci-
lius, quod crassitudini non respondet.

De Trifolio. CAP. CXXI.

Græci Triphyllon, alijs Oxyphyllon, alijs Menyanthes, alijs As-
phalzion, alijs Cnición uocant, Romani Trifoliū, aut acutum,
aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habēs
tenues, iuncea & nigra, e quibus ramulares enascuntur appēdiculę,
quę in terna singulis germinationibus exeunt folia. Loto arbori simi-
lis. Lis recenter enatis Rutę odor inest. Vbi autem adoleuerunt, bitu-
K iij

A
Pl. li. 21. ca. 16.φαλαγγίον
φαλαγγίτιον

τρίφυλλον

C men olent. Florem ædit purpureum, semen quadamtenus latum, sub-
hirsutum, ex altera extremitate exertum, ueluti corniculum gerens. Ra-
dix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ
difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt,
scemini quoque uulvæ uitio opportunis, auxiliantur. Menses cit, ternæ
drachmæ e semine dari debent, e folijs uero quaternæ. Contra serpen-
tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt
aliqui totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum fotu dolores eorum
finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua huiusmodi sana-
tus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perina-
de afficitur ut a serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in
tertianis, cum uino potui dedere, & in quartanis quaterna, ut quæ fe-
brium circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

Pli. li. 23. ca. 6.
lib. 21. cap. 9.

T RIFOLIUM tribus generibus. Minyanthes, siue Asphaltiō, siue Asphalticis, ut Archigenes,
maior folio: quo utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine. Tertium ex
omnibus minutissimum. Herba optima in prato Trifolij est. Præfagia tempestatum habet. in-
horrescit enim, & subrigitur contra eas. Sophocles poeta uenenatū id existimat. Serpentes in
Trifolio nunquā spectantur. Columella Trifolium Simonianum, & acutum quoque dici hoc na-
dit, fragosis locis inueniri, longis, hirsutisq; folijs uirere, caulemque robustiorem facere, q̄ Trifolium pratense.

E X M. V E R G. C O M M.

D QVæ in scriptore hoc a principio capitis huius statim numerantur Trifolij tres appellatio-
nes, Oxytriphylon, Memanthes, & Asphaltion, non satis certam in antiquis scripto-
ribus rationem habent: nec constituisse ex illis facile est, sint ne diuersorum Trifolij generum di-
uersæ notæ, an eiusdem plantæ diuersarum gentiū diuersæ tñ appellationes. Nicander in The-
riacis suis unum esse Trifolium quod pluribus nominibus censeatur, his indicat uerbis. *οὐ μὲν
χρὲ τριφύλλον ὀπάσσει. &c. τὴν ἄντι μινιανθὲς ὁ δὲ τριπίπλον ἴνισσι, χαίτην μὲν λατὴν ποτὶ γὰρ μὲν ἄλλαν
ὀδμήν.* Quod est. Sumito & Trifolium, quod Menianthes aliquis, aliquis uero Tripetaton uo-
cat. Pro quibus interpretis eius a Dionysio herbario Trifolium Menianthes uocari ait: habet-
que Loto simile folium, odorem uero Rutæ cum nondum creuit: postquā uero exoleuit, deflu-
entibus iam folijs, odore bituminis sentiri. Quæ omnia huic scriptori eadem sunt. Qui, modo
integra in eo pars illa sit, non aliter de Trifolio sentire uidetur, q̄ unū, idemque omne esse, diuer-
sisque his nominibus ob diuersas censerī causas. Nec aliud Paulus Aegineta etiam libro sexto
de Trifolio tradidit, *τριφύλλον* dicens *ἢ δὲ ἀσφάλτιον, ἢ δὲ ὀξυτρίφυλλον, ἢ δὲ μινιανθὲς.* Quod est.
Trifolium, quod alij Asphaltion, alij Oxytriphylon, alij Menianthes uocant. Plinius contra
uicissimoprimo uolumine, capite nono diuersa genera his uocibus indicari tradidit. Folio co-
ronat & Trifolium, Tria eius genera, Menianthes uocant græci. Alij Asphaltion maiore folio,
quod utuntur coronarij. Alterum acuto, Oxytriphylon. Tertium ex omnibus minutissimum.
Manifesteq; Menianthes, & Asphaltion illi idem est: Oxytriphylon autem diuersum. Colu-
mella grauis & ipse autor, lib. 7. ca. 15. de Trifolio hæc ait. Vel simonianū Trifoliū, q̄d inueniuntur
fragosis locis efficacissimū tradit, odoris grauis, neque ab similibus bitumini, et cicirco græci Asphal-
tion appellant. Nostri autē propter figurā uocant acutum Trifoliū: nam longis, & hirsutis folijs
uirer, caulemque robustiorē facit q̄ pratense. Quæ Plinio contraria sunt. Ille enī Menianthes, &
Asphaltion idem facit: hic Asphaltion & Oxytriphylon. Theophrastus semp̄ sere Menianthes
Trifoliū omne uocat. Ex his non facile censere in Trifolio est, quæ nā eius gñā, & generū appel-
lationes quādam fuerint. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, in eam partem inclināt animus,
ut duo sint Trifolij genera. Cōmune et pratense hoc, omnibus norū. Et acutoris folij alterū, q̄d
græci Oxytriphylon dixerunt: & hoc Menianthes & Asphaltiō uocari. Factaq; illi primā apel-
lationē, q̄ flore suo se indicet: id enī ea uox significat. Secūda uero, cū iam ab integra ætate dila-
bi cœperit, & bituminis odorē cōtraxerit, inuenisse, Suum tñ unicuique iudiciū & arbitrium erit.

De Polio.

CAP. CXXII.

A

πένον

Polium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidion, alij Achamenin, alij Ebenitin, alij Melosmon, nonnulli Belion, quidam Leontocharon uocant. Duo genera eius. Montanum, cui Teuthrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quendam corymborum speciem præ se ferente paruo, canis hominis simili, grauiter olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usque adeo ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium ictibus. Hydro picis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. Substratum, suffitumue serpentes abigit. Illitum uulnera conglutinat.

BARBARI COROLL.

Polium carnosum, ut alia multa, folio, uestibus interpositum, arcet animalium nocentia. Culi ces ab eo, caprifici modo generari, Theophrastus scribit. Herba indyta Hesiodi, & Musæi, laudibus ad oia utilem prædicantium, & ad famam quoq; dignitatis perungi, tractari, coliq; iubentium. Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cerulea spectant: quod quidē a Dio scoride Tripolij floribus ascribitur. Theophrastus certe modo Poliū, modo Tripoliū eandem uocauit herbam. Ideoq; a Tripolio differre quidam negarunt. Folia Polij, canis hominis similia, a radice protinus nunq; palmo altiora Plinius existimat. Quidam folia Thymi reddunt, nisi q; molliora sunt, & lanatiore canicie. Nulla magis herba conuenit medicamēto, quod Alexipharmacum uocant: in quod minore, ut Galenus inquit, utimur.

Pli. li. 31. ca. 7.
26. cap. 7.
Théoph. li. 1.
de hist. plant.

EX M. VERG. COMM.

Non potest, Polium cum Tripolio diuersi generis plantas, tam multis locis miscens, defendi Plinius: nec eius scriptores auctoritate excusari, qui cōmentationibus suis, dissimulato hominis errore, eadē illa ut erant, adiecerūt. Contra Pliniū enim scriptor hic, Theophrastusq;, & quod pluris merito faciendū est, res ipsa stant. Polium siquidē uidere passim licet, nullas Tripolij notas habens. Obseruauit multo ante hæc tēpora in Plinio, qd dicimus, & cōmentario quodam suo declarauit Leoniceus, uir nostra ætate huiuscemodi doctrinarū peritissimus. Eaq; ob causam, nō erimus nos in his ultra longiores. Satisq; græcarū literarū imperitis nouisse fuerit, caniciem Polio nomē fecisse, quæ in summo plantæ cacumine pendens, canos hois capillos præfenti quadā imagine ostendit: consueuissetq; Græcos scriptores, cū maioris amaritudinis indicatione aliqua uti uellent, a Polio hoc rationem & exemplum sumere: semperq; βαρύτερον, quod est grate olens, appellare. Theophrastus primo de plantarum historia uolumine, quod ad seruandam rem domesticam pertineat, Polio tribuit, ut uestibus interpositum ab insectis, quæ eas erodendo dehonestant, incolumes seruet. Verba eius sunt. τούτο δὲ καὶ πρὸς σῆμας τοῖς ἐν τοῖς ἰματίοις θηράσιν. Meminit eius & Nicander in Theriacis suis, ἡπείδιον βαρύτερον ὅλην φύσιν ὀνόμαζεν. Laudauitq; præcipue contra uenenata.

B

De Scordio.

CAP. CXXIII.

σκόρδιον

SCORDIVM aliqui Scorbion, alij Pleuritini, alij Dysofinoni, alij syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithridation, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Romani Trisaginem palustrem appellant. In montibus & palustribus nascitur, folijs Trisaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum Allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus. Quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Herba uim excelsatoriam habet. Urinam ciet. Cocta recens aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. Ad stomachi quoq; rōsiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, bis

K iiiij

Cnis drachmis cum hydromelite. Crassamen purulentum pectore expellit. Facit aridæ farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modice præcordia cerato excepta, recreat. Cum aceto acri, aut aqua, podagris conuenienter illinitur. Menses imposita mouet. Vulnera conglutinat. Vetera ulcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrecentias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;

Pli. li. 35. ca. 6.
26. cap. 2.

Scordion, item Scordotis Mithridati ascripta est: cuius depictâ manu Crateias medicus uidit, magnitudine cubitali, ramosam, folijs lanuginosis. Reperitur in Ponto, campis humidis, pinguibus. Est & alterius generis lauioribus folijs, Menthastro similis. Alia est a Mithridate similiter inuenta, quam Mithridationem uocant. Huic folia inquit Plinius, duo a radice Acantho similia, caulis inter utraq; sustinens roseum florem. Hanc ipsam puto est, quâ idem Plinius Chamaeropa uocauit libro sexto & uigesimo, ijs uerbis. Eosdem inquit effectus habet, lateris doloribus Chamaerops, myrteis circa caulem geminis folijs, capitibus græculæ Rosæ.

B A R B A R I C O R O L L.

VERG.

Habet certas, & cum scriptore hoc cunctis alijs easdem, quibus inueniri & inuenta cognosci possit palustris Trixago notas: odore, qui illiberalis, nec Allio absimilis illi est: & post odorem serratam foliorum formam: quibus primo & per se dictam totam Trixaginem refert. Habet & quæ numeratæ a Dioscoride non sunt, in summis caulibus roseos flores, & in quibus uariant antiquis scriptores proprios & natales eius locos: censente hoc in montanis, Plinio autem in campestribus nasci herbam. Cuius ob diuersas, multasq; has notas plura fuerunt quondam nomina. Scordion, quæ uox ab Allijs facta illi est: cuius odore sentitur. Scerodon enim Græci Allium uocant. Quo etiam Scordotis pertinet a Plinio dicta, & ab hoc Dylosmon mali & ingrati odoris sensum indicauit. Quemadmodum agrestis Nepeta, a Plinio autem Menthastrium dicta, generis nota magis quàm appellatio alia est. Siquidem Plinius, 35. uolumine capit. 6. ait. Est & alterius generis lauioribus folijs Menthastro similis. Ex quo factum est, ut quæ diuersi generis nota quondam fuit, inter appellationes ab imperitis numerata fuerit. Ut autem Trixago appellaretur, similitudo fecit, & Mithridanes Ponti rex, medicinæ tantopere fauens: ut inuentione eius Crateias herbarius illi adscripserit. Habet post omnes palustris Trixago Romana uox, certam ex superioribus causam. Trixagini enim similis eodem nomine dicta est. Palustris uero, quoniam ut Plinius, & hic dixerunt, humentibus locis nascitur. Cōueniuntq; in hoc omnes, discrepant autem in reliquis. Hic enim *επισπαστή*, id est, montanis, Plinius campis humidis, pinguibusq; nasci dixerunt: non leui discrimine, inter campestre, & montanum terreni genus. Nobis in Plinii sententiâ magis inclinatur animus. Vidimus enim in incilis margine campestris agri nam tam rubet roseo flore, certissimo Alliorum odoris sensu. Multi in medicina usus palustris Trixago hæc quondam fuit. Nosq; inter cætera diximus, purgare quæ in pectore hæserunt, crassa purulenta. Non purulentas excrecentias illas intelligentes, quas Græci empyemata noiant, sed pituitâ, crassosq; humores qui frigore, gelicidiorq; aliquo in pectore puris modo albescentes concreuerint. Id enim significare nobis uidetur *πύκνον πύκνον*.

D

πύκνον

Bechion Græci, quidam Richion, alij Petrinam uocant, alij Pegaton, alij Pithion, alij Pagonaton, alij Chamaeleucen, alij Procheton, alij Arcophyton, alij Chamægiron, Aegyptij Saarthan, Latini Tussilaginem, quidam Pharphariam, aut Pustulaginem, Bessi Asa. Folia ei sunt maiuscula quàm Hedera, sex, aut septem a radice, subalbida a terra, superne uirentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus. In uere flore & caule confestim exuitur. Inde nonnulli his uacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua. Nascitur in a-

De Tussilagine. C A P. CXXIII.

mœnis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammacionibus illitu medetur. Aridæ fumus per infundibulum hianti ore rap-
ptus, hos sanat qui sicca tussi, atq; orthopncea infestantur. Pectoris uomi-
cas rumpit. Eundem effectû præbet suffita radix. Decocta in hydromeli-
te, & pota, emortuos partus eijcit.

B A R B A R I C O R O L L.

Bechion, siue Bechicon, duo habet genera. Sylvestris ubi nascitur, subesse aquas credunt. Et hoc habent signum aquilegi. Describitq; hanc Plinius aliter, q̃ Dioscorides, folia eius tra-
dendo superne pallida, subalbida a terra, sine caule, sine flore, sine semine. Altera a quibus-
dam Saluia dicitur, similis Verbasco. Hanc a Dioscoride Verbascum sylvestre dici puto, ita
scribente. Habetur inquit & Verbascum sylvestre altum, uirgis arboreis, folio Saluiae, orbi-
bus uirgas cingentibus, ut Marrubium, floris lutei, fulgore auri. Quidam priorem Arcion,
& alio nomine Chamæleucen putant. Est autem Chamæleuce, quam nostri Farfugium uo-
cant, folio Populi, sed ampliore, nascens iuxta fluuios; unde Populago dicta sit a nostris.
Hanc & Farfariam uocari Dioscorides testis est, a fluuiio fortasse Farfaro, quem Virgilius Fa-
barim appellat. In Sabinis Plautus,
Dissipabo inquit te ut folia Farfari,
Itemq; in Penulo.

Pli. li. 16, ca. 6.

Prosternebam inquit eos, ut folia Farfari.

E X M. V E R G. C O M M.

Haec est Tussilago illa, quam hic in totius operis præmio dixerat, falso credidisse quos-
dam, nec caulem, nec florem, nec semen ferre: & quam ignorantiae eorum causam tunc reli-
querat, legendam uolentibus hoc loco tradidit: ferre quidem illa aliarum plantarum modo te
status: sed tam brevis uitæ cuncta esse, ut obseruari facile non potuerint: quodq; obseruatum
non fuerat, negatum naturæ imprudenter fuisse. Quæ si ad Hypanim fluuium, qui ab Euro-
pæ parte in Pontum influit, in animalium censu bestiolas genuit, quæ unum diem uiuunt:
in plantis multo facilius eandem potuit ostendere fortunam: herbasq; aliquas esse, quæ pro-
lato caule statim decaulescerent, & pandente se flore deflorescerent. Qualis Tussilago hæc est,
a Græcis Bechion ideo dicta, q̃ tussi & tussientibus medetur: non omnibus, sed his qui tantum
tussiant, nihil autem pituitosi excrementi simul extussiant. Quod genus hic, siccam tussim di-
xit: Plinius ueterē nominauit. Ex quo factum est, ut Plinij uerba exscribens in Dioscoride Bar-
barus, quod *ἐπὶ τῷ βῆχῳ*, id est, siccam, siue aridam tussim hic dixit, ueterem ille dixerit. Sis autē
sicca, & uetus tussis eadem, an inter se discrepent, medici censebunt.

De Artemisia.

CAP. CXXV.

ARTEMISIA RAMOSA, Græcis quibusdā Monodor-
anos, alijs Toxitesia, alijs Ephesia, alijs Anactorios, alijs So-
zusa, alijs Lycophryx, Magis hominis Sanguis, alijs Crysanthemom,
Romanis Hærbæ regia, aut Artemisia, alijs Rapium, aut Tertana,
Gallis Pona, Dacis Zuoste dicitur. Magna ex parte in maritimis nas-
citur. Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ra-
misq; Tenuior autem flore est paruo, tenui, candido, graue olente.
Æstate floret. Sunt qui in mediterraneis Vnicaulis nomine appellant,
tenuem hærbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente, nudo co-
lore. Hæc iucundiorē q̃ præcedens efflat odorem. Vtrq; exalsa-
cit, extenuat. Feruesfactæ conuenienter in muliebres desectus adijciun-
tur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;. Item præclusio-
nes uulvæ, & eiusdem inflammationes. Calculos comminuunt. Re-
moratam urinam cient. Menses pellunt pubi illitæ, Succus uulvæ ina-

ἐπὶ τῷ βῆχῳ

Cditus ex Myrrha eadem quæ incessio trahit, Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Pli. li. 25. ca. 7.
& decimo.

B A R B A R I C O R O L L.
Artemisiam, & Lachanon Basilicon, hoc est, olus Regium nonnulli uocant. Dictam putant ab Artemisia uxore Mausoli; quæ sibi hanc herbam adoptauerit, cum antea Parthenis uocaretur. Sunt qui ab Artemide cognominatâ putent: quoniam priuatim medicatur foeminarum malis: quibus Artemis, hoc est, Diana præsit. Secundo generi teneritudine tribuunt, non nisi in maritimis nascenti. Tercio minima folia florenti, cum uua maturefcit: quod quidam Botryn, alij Ambrosiam uocari tradunt: qualis in Cappadocia proueniat.

E X M. V E R G. C O M M.

In multo nominum ambitu & honore quondam Artemisia fuit, Parthenis, id est, uirginis primo dicta, quæ uirgo Dea scilicet nomen illi dederit. Mox βασιλικὴν λεχάνον, id est, regium olus. Tum ex eadem causâ, Anaclonium. Anaclæ enim Græci uocant. Ephesia a regione dicta eadem est. Quemadmodum a præsentî remedio & ope, Sozusa, id est, salutaris. Romani Regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit a similitudine, Serpyllum maius dixerunt. Et hæc antiquioribus Artemisiam nomē clatura fuit. Ex posterioribus alij in Cannabis genere Artemisiam numerauerunt: congenerem illi facientes, & eodem illi nomine eam indicantes. Alij Matricariam, notum omnibus olus esse Artemisiam testati sunt. Quod non aliunde, ut credimus, quæ ex duplici eius genere factum est. Quæ enim ab hoc scriptore Monodinos, a Plinio aut simplicis caulis nominatur, non dissimili penitus figura, præsertimque ob singularem, quæ profert caulē, a Cannabe describitur. Quæ contra Absinthij modo fruticosa ab hoc, & ab alijs traditur, facile ob quas habet uires ad nostri orbis, & nostre ætatis Matricariæ transferri potuit. Quod & si Græcorum de Artemisia historiæ oïno non respondeat, nec certo aliquo auctore confirmari possit, non reijciendum tamē penitus est. Egregia enim in mulieribus. Dico autē nunc muliebria, quæ Græci γυναικία uocant. Longius in Acoro a nobis tractata Artemisij uis est. Credendūque, non aliunde quæ a matricibus posteriori Matricariæ nomē fecisse posteriores.

D
ἀρtemisia

¶ De Artemisia tenuiore. CAP. CXXVI.

Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus nascitur. Cuius flores & folia contrita, Sampsuci odorem reddunt. Si quis stomacho laboret, hærbam cum amygdalino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum dolore cruciantur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

B A R B A R I C O R O L L.

In quibusdam exemplaribus Artemisiam hanc multis nominibus inuenias. Toxitesiam, Ephesiam. Parthenicon. Hypolysson, Anaclonium, Sozusan, Lian, Leucophryca: Prophetæ Sanguinem hominis, Romani Valentiam, nonnulli Persepollentem, alij Herbam regiam, Galli Ponem, Daci Zonustem.

E X M. V E R G. C O M M.

Desyderatur, sed sine iactura aliqua, in uetustissimis Græcorum, latinorumque codicibus hoc caput. Accreuisseque huic scriptori in utiliter multa indicat. Phrasis primū, sermonisque forma: quæ in Græcis a scriptoris huius indole longe absunt. Mox nulla eorum quæ in eo iubenē, necessitate.

ἀμβροσία

¶ De Ambrosia. CAP. CXXVII.

Ambrosia, quam Romani Caprum syluaticum uocant, quidam Botryn, alij Apium rusticum, Aegyptij Merseon. Tenuis frutex est, ramosus, trium fere palmorum, folijs Rutæ, circa imum caulem exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, nunquam florem pariunt. Odore uinoso, suauis. Radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius, reprimere ac repellere, et illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Ambrosia, uagi herba nominis, & circa alias quoq; fluctuans. Athenienses in dedicatione Iouis Cretsi, Ambrosiam in cado ferendam iubebant. Non herbam intelligentes eo nomine, sed ut Athenæus inquit, fruges omniū iugas, et oleum, & latices.

E X M. V E R G. C O M M.

Non inter herbas aliquas fluctuans & uagum nomen tantū quondam Ambrosiæ fuit, sed quodcunq; odoris, aut cibi suauitate placeret in poetis scriptoribusq; alijs, eodem hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem utentibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequeus & notum ubiq; nomen, ignota tamen res, & inter herbas non facilis inuentu; alijs aliter eam ostendentibus, & cum Artemisia nascentibus fere cunctis, Audent tamē nostræ ætatis herbarii eam ostendere, trium do drantum altitudine, & altiore aliquatido herbam, ut hic ait, ramosam, semine per totum caulem racemoso, sed longe maioribus q̃ Rutæ folijs: & quod hic ait, nunq̃ florentibus racemis, lanuginosis, papposisq; nullo nec uini, nec alterius rei odore. Quo fit, ut in peregrina Italiæ, ut nos credimus, herba nihil pro comperto constituere audeamus. Plinius. 27. uolumine capite. 4. integrum scriptoris huius caput commentationibus suis inseruit: cum tamen non multo antea libro. 25. capite septimo de Artemisia agens, dixisset. Sunt qui in mediterraneis eodem Artemisiæ nomine uocant simplici caule, minimis folijs, odore non iniocondo, quam quidam Botryn, alij Ambrosiam uocant. Ex quo manifeste deprehenditur, quod paulo ante diximus, uagum per multa Ambrosiæ nomen esse plantas, cibos, & pocula: eo usq; ut Athenienses hoc nomine omnigenas fruges, oleum, uinum, laticesq; alios, quos Dijs in ara offerrent, Ambrosiam nominarent. Nobis inclinatur animus; ut peregrinā nostro orbi, peculiarēq; Cappadociæ herbam existimemus: nam quæ a nostris herbarijs hoc nomine ostenditur, uulgaris, & ubiq; nascens, inuentu facillima est, præsertimq; ex capitulorum racemis, quos habet pappi plenos, nunq; a nobis florere uisos.

¶ De Botrye.

CAP. CXXVIII.

Botrys fruticosa hæba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. Semen circa ramulos prouenit. Folia Cicorio similia. Tota suauem odorem spirat. Quare uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis. Pota Orthopnceas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant, alij Artemisiam.

B A R B A R I C O R O L L.

Botryn Cappadoces & Ambrosiam uocant. Alij Artemisiam.

E X M. V E R G. C O M M.

Totidem, ipsdemq; uerbis genti suæ quondā Plinius cognoscendā Botryn tradidit, quos quibusq; antea grecis Diosco. eam descriperat. Verba eius sunt. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis. Semen circa totā nascitur. Folia Cicorio similia. Inuenitur in torrentiū ripis. Medetur Orthopnoicis. Hoc Cappadoces Ambrosiā uocant; alij Artemisiam. Quæ collata Dioscori, eandem in utroq; medicinā & historiam faciunt. Posteriores etiā Græcorū medici, qualis Paulus Aegineta est, nihil ab hoc scriptore traditis addiderunt. Eius uerba sunt lib. 6. *Βότρυς ἐστὶ δὲ ἀμπεροῦ ἢ δὲ ἀρτεμισίας φύτον ἐν τῷ ὄρει Ἰκαρίας. ἐν τῇ οὐν γαῖᾳ πινέμενον ὀρθοπνοικοῖς ἀφιδνί.* Quod est. Botrys, quam aliqui Ambrosiam, aliqui Artemisiā dicunt, planta est ualde odorata. Hæc cum uino pota, orthopnoicis medetur. Sunt de Botry hac totidem, & eadē a cunctis dicta; nec nos habemus, quod eorum decretis & historiæ addamus.

¶ De Geranio.

CAP. CXXIX.

Geranion aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogeronta, Romani Vchinastrū, Aphri Lescen appellant. Folijs Fremij, diuisuris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulux inflammationes discutit.

B A R B A R I C O R O L L.

Geranion, & Myrtidō uocatur Genus primū. Geranion uera creditur a quibusdam, sed & secundum utiq; si descriptionem græcorum sequare, non latinorū; ut mox docemus.

A
Pli. li. 27. ca. 4.
& 25. ca. 13.

Botrys

B

geranion

C

De altero Geranio.

CAP. CXXX.

Geranium alterum, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Cardamomum, alij Origanum uocant, Magi Hierobryncas, Latini Gruinam, aut Pulmoniam, aut Cicoriam. Caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluae. In summis alijs sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 16. ca. 11.

Geranium secundum medicis inutile, aliter a Graecis, aliter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Graeci, folijs paulo candidioribus q̃ Maluae, ramosum ex interuallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Galliae transalpinae uulneribus & fistulis in potum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo, subpurpureoq̃, ac caeteris notis omnibus: quae hoc loco a Dioscoride Geranio redduntur, etiam si ab eo medicinae aliena existimetur. Quid enim prohibet, ignoratas eius vires fuisse olim? Nostri, ut inquit Plinius, Geranium ostendunt Cicutae folijs minutioribus, & caule breuius, rotundo, saporis & odoris iocundi. Verum haec proprie Geranium non est, sed Myrrhis: de qua post agemus: confusione orta, q̃ Geranium a quibusdam Myrrhis etiam dicatur; unde natum & illud sit, ut Geranium in latino Cicutaria nomen habeat: cum aliqui Cicutaria proprie Myrrhis esse uideatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Geranium haec est, in qua Gruini capitis imaginem in summo eius plantae capitulo contemplati Graeci, nulla similitudine aptius rem indicare potuerunt. Vidimus nos alteram Geranium, paucis statim a radice prodeuntibus Maluae folijs, ut hic describit. Tum nudo surgente caule, dimidij cubiti altitudine: crassoq̃ in caulis illius cacumine, folio inuolucro tumentē, ex quo per longitudinem ex altero latere dimidiati digiti longitudine acutus prodebat apex. Erantq̃ in folliculo illo cum uiridi colores alij plures, praesertimq̃ cinereus: tam praesenti totius colli, ca pitiscq̃, & rostri Gruini imagine, ut apud pictura ostēdi a peritissimo pictore animalis eius tota ea pars non potuisset. Alteram, quae Cicutae folijs est, ipsi non uidimus. Obseruauimus tamen in antiquis scriptoribus, Plinioq̃ praesertim, utriusq̃ huius herbae misceri historiam. Nec satis cognosci in eo posse, Gruino ne collo et capite utraq̃ sit, an altera tantum. Id certe ex Dioscoride collegisse facile est, Cicutae folijs alteram earum esse: ideoq̃ Cicutariam dici, & Myrrhida: quonia & Myrrhis Cicutae folio sit: quemadmodum hic quarto uolumine docebit. Cur aut priorem Romani Echinasrum dixerint, non satis pro comperto nobis est. Quemadmodum in altera per se patent Cicutaria & Gruina ex foliorum & Gruini capituli forma factae appellationes. Longissime de utraq̃ Plinius uolumine. 16. capite. 12. agit. Poteruntq̃ in eo uolentes uidere, quam nos paulo ante diximus, utriusq̃ Geranii historia uarietatem.

Pli. li. 17. ca. 10.

De Gnaphalio. CAP. CXXXI.

Gnapthalion, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij Anaphalin, Aegyptij Semeon, Galli Gefalonen, Latini Centunculum uocant, quidam Tucularem, alij Albinum. Cuius folijs mollibus minutisq̃ pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 17. ca. 10.

Gnapthalion, alij Chamazelon uocant. Gnaphalio porro dicitur, quasi herba fullonia, siue Tomenticia. Quemadmodum & piscis quidam Gnaphus, hoc est, fullo dictus est, quonia oēs maculas decoctum eius eluat. Hanc puto esse, quae ab Aegeo poeta Gnaphos appellatur: aut eam quae Hippophanes nomen habet. Nam & illa fullonibus est propria. Est apud Aristotelem & auis dicta Gnaphalus, quam miror a Theodoro praetermissam, imo uero cum altera, quae uocatur Helea confusam ab ipso. Tomentum a nostris dici quidam putant Gnaphalio. Lomentum certe in Plinii codicibus impressis legitur, Tomentum in scriptis manu: qui tamen non Lomentum dici,

sed pro lomento esse scribit: quod & Dioscorides quoque affirmat. Etenim Creta, qua fullones in albandis & poliendis uestibus utuntur, Lomentum a nostris, Gnaphalion & Gnaphalis græce dicitur: ut in Ceruleo notauimus ex Plinij sententia. Sed & fabacea farina Lomentum est: quod Aetius Fabam nominat quandoque. Ego Tomentum potius quam lomentum dixerim hoc loco, ut tamen sciamus, Gnaphalion utrumque uideri significare, tam Lomentum, quam Tomētum. Adde cor eo, quod Dioscorides Centunculum uocari hanc Romæ, prodat. Est autem Centonibus cum Tomento maxima cognatio. Nam & folia Distamni, quod mollia esse uideantur, tomentitia, & lanæ dicuntur a Dioscoride, hoc est, Gnaphalide. Sed & pars Cucurbitæ interior, quæ semen complectitur, ab Aetio Gnaphalides esse dicitur, ob candorem cum mollicia.

EX M. VERG. COM M.

Verisimile est, rusticæ plebem diu hac usam fuisse: quemadmodum & adhuc in Alpibus, ubi frondium copia est, fieri passim uidemus. Græci enim γνάφαλον inter cætera Tomentum uocant. Est autem latinis Tomentum omne id, quo culticæ ad molliorem & calidiorē quietem infarciunt: siue id lana sit, siue pluma, siue quod uoluerit alijs excipiedis molliet & fouēdis calore corporibus nostris aptum. Sic Suetonius, sic in latina plures alij indicauerunt. Græci etiā, ut hic ipse in Distamno dixit, γνάφαλον quasi Tomentitia huiusmodi omnia appellant. Quam ob causam nos Tomentum herbam diximus: & præter Tomentum, autore hoc ipso, Centunculum. Est diuersum quadamtenus usum Centones, & Tomena habent. Vulgaris herba hæc est, candicans semper, preferimque in maturitate. Folia eius non adeo magna sunt. Flores minimi, & ipsi albescētes. Cum creuit, sternitur per terrā. Nascitur pingui solo, preferimque in marginibus itinerum, in hortis, & inter uitēs. Nullus nostra ætate usus eius est: nec quicquam in herbarum censu uilius modo, & neglectius uiuet, & cum aruit minus cognoscitur.

De Typha. CAP. CXXXII.

Typha folium ædit Cyperidi simile, caulem album, leuē, æqualē, florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod lanuginē aliqui nominant. Huius herbæ flos, sullo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

BARBARI COROLL.

Differre Typham a Tiphā, quæ frumenti genus est, & per litteram iota scribitur, existimo: sine geniculis, scirpi modo nascens, radicibus multis, ut triticum ordeumque, folliculo multiplici, culmo simplici, leuissima frumentorum, solo etiā gracili facile proueniens, tritico persimilis ut Zea. Pistam serunt, qui mutari uolunt in triticum, idque anno demum tertio procedit. Theophrastus sine folio gigni Tiphē uocatam prodidit. Orchomenium circa lacum, parte radici proxima, esu præcipue pueris tenera. Idem, an diuersum genus faciat cum prædictis, æstimandum relinquo.

Pli. li. 13. ca. 2.

EX M. VERG. COM M.

Palustrem esse plantam Typham, satis unus testari posse uidebatur Plutarchus cap. 2. de naturalibus causis, inter plerasque alias palustres his uerbis eam numerans. ἀλλὰ ἵσται τὸν λαῖτον ὅτι καὶ τὰ λιμνία φυτὰ τύφην καὶ φλίωσιν καὶ θρίον ἀναγνῆναι καὶ ἀβλαστὴν μῖνον. Quærebat enim, cur celestibus aquis magis quàm profluentibus proficerent ad generationem & incrementum semina & disputans contra laicum quandam, qui diceret, cadentibus pluuijs aperiri terram: pulsusque illo apertam citius ad radices per se aquam transmittere. Cōtraria ratione a palustribus his plantis ratiocinabatur, ad quarum radices non transit aperta terra hymber. Numerabatque eas quas paulo ante diximus. Esse autem palustrem, & præter id caulem habere enodem Theophrastus indicat: qui primo uolumine de plantarum historia, de fruticoso & farnentofo genere docens, & quales in caulibus ramulisque suis differentias hoc genus habet, totam his uerbis rem docuit. περί δι τὰ θρυγάνικα καὶ θαμνάδι καὶ ὄλωσ τὰ κλίματα καὶ ἄλλας τίς ἐν λαβοῖ διαφράσ. ὁ μὲν γάρ κλέμεται γονατώδης ὁ δὲ βάτος καὶ ὁ παλῖνρος ἀκανθώδης. ὁ δὲ τύφην καὶ ἵνα τὴν ἱλύν ἢ λιμναίων ὁ μοῖον ἀδιδρακτα, καὶ ὁμαλὴ καθάπερ χρίνος. Quorum sensus hic sit. In surculosis autem & fruticosis, in uniuersumque Viticulis alias constitutere differentias aliquis poterit. Harundo enim geniculata, rubus, & palustris aculeati. Typha autem, & aquaticorum palustriumque aliqua nullo intercedente nodo qui partes dissepiat, per totum æqualia sunt: qualis pinguis est. Folia postremo an-

C guloso, odorato Iunco similia hic fecit, qualia ea etiā sunt. Intelligitq; in Iūcorū gñe Cyperū, de quo primo uolumine Iōgius actum est. Quem gñe foeminino Cyperida hoc loco uocauit, qm̄ eo nomine radix eius appellatur: ut in cōmentariis nostris tūc longius dictū fuit. Non aliā ob causā, nisi quia radices eius tm̄ usus est. Et quemadmodum Iūni Iunci radicem plantam uocant, sic gr̄ci Cyperida ex radice genere foeminino Iuncum ipsum aliquñ nominauerūt.

C De Circaea. CAP. CXXXIII.
nipucia Circaea, quam & Dircaam aliqui uocant, folijs est hortensis Solani. Agnatis crebris, flore nigro, pusillo, copioso. Semine Miliij nascente in quibusdam corniculis. Dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciente. Nascitur in apricis, saxis & uento perflatis. Radicis tusc̄ triens, in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo uulvas expurgat. Semē forbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

B A R B A R I C O R O L L.
Circaam a Circe dictam, nonnulli uetis simile putant. Quæsitum est autem a nobis, quid esset apud Columellam Circea. Nunquid pro Circea deprauatus esset locus? Respōdi, non Circea, sed Cymam legendum.

E X. M. V E R G. C O M M.
D Sūt in gr̄cis qui neutro genere Circeon hanc uocent, notam, ut ex cōmentarijs eorum ratiocinari licet, tunc omnibus herbam. Nunc quod uiderim, aut audierim, nulli nisi in ueterū Plinijq; præsertim cōmentarijs auditam: qui uolumine. 27. capite. 3. non ips̄dem omnibus cū scriptore hoc in historia notis, neq; in medicina obseruationibus eam descripsit.

C De Oenanthe. CAP. CXXXIII.
ōirvāthā Oenanthe, quam aliq; Cerascomiō, aliq; Leucanthon uocitant. Folia habet Pastinacæ, florem candidum, caulem crassum, palmi altitudine. Semen Atriplicis. Radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius & folia, cū melle & uino pota, secundas eieciunt. Radix e uino urinæ stillicidio conuenit.

B A R B A R I C O R O L L.
Pli. li. 12. ca. 28
lib. 21. cap. 24.
Oenanthe a Theodoro Vitisflora dicitur, post Narcissum uere floret. Plurimum durat, si diu uulsa crebro prohibeatur semetescere. Flos ei candidus in racemis, ut Labrusca: odore germi nantis uuæ, unde nomen. Nascitur locis tepidis, obseritur semine. Habetur & altera Oenāthe, inter uites dicenda.

E X. M. V E R G. C O M M.
A Lia hæc Oenanthe est ab ea de qua quinto uolumine agetur. Illa in uitium genere Labruscæ flos est: hæc in herbarum censu a Theophrasto inter coronarias plantas & flores, qui secundi per uer florent numeratur. Illa primo & per se Oenanthe est, uinum & florem ipso nomine indicans. Hæc, ut sit, deficientibus proprijs, indicationem & nomen floris & odoris sui similitudine ab illa facile impetrauit. Nec ideo Oenanthe dicta est, quia Labruscæ flos sit, sed q; candidus illi flos, racemi ut in Labrusca specie sit: & præter racemosem florem illum, odor qualis in pubescente uite floreq; eius sentitur. Amat hæc tepidiora loca. Quondamq; ad coronas in hortis etiam serebarur: in quibus non tantum odore, sed longiore florum suorum uita placebat. Hanc Dioscorides ait Cerascomen uocari: qua uoce Staphylinum, id est, Pastinacam a quibusdam nominari dixerat: cui quoniam hæc folio similis est, ideo & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Cerascome significet, in Staphylino & Pastinaca quaerendum est. Eandem Leucanthum uocari hic ait, manifesta a florum candore significatione. Neque enim alia eius uocis uis est. Quæ deinde hic dixit, habere Oenanthem hanc in radicibus numerosa & rotunda capita, tubera sunt, & ueluti tumores gbus ea inæqualiter tumet. Plinius ad radicū copiam id retulit: radice magna, numerosa dicēs: cū tm̄ grādi radice hic Oenanthē dicat, et in radice illa multis rotundis capitibus, quæ ad radicū copiosiore numerū, referri posse non uidentur.

De Conyza magna. CAP. CXXXV.

A

Conyza magna ab aliquibus Cynozematitis, alijs Danais, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos, Magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Aegyptijs Creti, Romanis Militaris, aut Febrifuga, alijs Franginosa nuncupatur.

BARBARI COROLL.

Conyza, quæ a nostris Cunilago dicitur, et Plinio Cunila quandoque libro decimo, & a Theodoro Pulcaris, quia pulices necat. Folio coronat, & maior & minor appellata. Maior dicitur esse mascula, folio aspero, pinguiore quæ minoris, et imbricato, torosiore caule, magisque ramofo, radice lignosa: quæ a quibusdam ut herba quoque ipsa, Libanotis dicitur, autore Plinio. Manipulo eius abiecto, omnes etiam a rota domo blattæ conveniunt ad eam. Vtriusque genus ferodinus, ut quod post arcturum germen, floremque mittat. In summa Cunilaginis appellatione, quatuor herbarum veniunt: mascula, et femina. Et quæ tertio loco ponitur foetidissimi inter omnes odoris. Quarta reddit Plinius: quæ appellatur fatiua Serpyllo similis, et Cunilagine motana facta. Est & quinta eius species Hippoc. ut dicitur paulo post. Cunilago dicitur et ipsum Ligusticum ab aliquibus, sed falso. At Cunilæ tria sunt genera siue nomina. Capitata et nostratæ, quæ Satureia fit, uocamus Gallinacem quæ Origanum, Heracleoticum: Bubulæ, quæ quæadmodum a Grecis dicitur, aliud non capi, quæ quæ Plinius, per Origanum accipere multis locis videtur, in qua significatio uocabulo eo et nos uti sumus.

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

De Conyza parua. CAP. CXXXVI.

Conyzæ duo genera. Quæ parua uocatur, odore præstantior est. Maior uero frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulibus binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squalidus, lutei, aut fului coloris. Quin in pappum abit. Radices superuacue. Suffitu, substratuque frutex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flos cum uino ad menses partusque eiciendos bibitur. Item contra urinæ stillicidia, arquatum morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur uuluarum malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblituitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

conyza parua

BARBARI COROLL.

Conyza minor eadem femina, Hippocrati Cunilago semper mollis uocatur. Folia huius tria, mellis odorem habent, digitis tactu coherentibus. Hanc Dioscorides Libanotidem appellat, cum Plinius masculam ita nominet. Pilosiora minori folia & rami: qui & aculeati sunt. Flos squalidior, odore acriore, qui tamen grauior sit masculæ.

Pli. li. 21. ca. 10
lib. 26. cap. 15.

De Altera Conyza. CAP. CXXXVII.

Est & tertium Conyza genus, quod aliqui Paruam, alij Panion, alij Libanotidem. Magi Cronon uocant. Caule crassiore, ac molliore. Folijs quæ Paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

BARBARI COROLL.

Hippocrates Cunilaginem, siue Conyzam, præter supradictas, aliam describit. Apio crispo similem: in maritimis, sabulosisque nascentem, odoris teterrimi, & maxime fastidendi: quam cum

Cum melle atq; uino fœminarum locis, quæ fœtum non recipiant, admoueri præcipit, libro de muliebribus causis secundo.

E X M. V E R G. C O M M.

Confundit, miscetq; Plinius pluribus locis cum Origano Conyzam. Nec facile est eodem nomine duas diuersasq; plâtas ab eo sæpius appellatas, in historiæ medicinq; gratiam & usum fecerere. Longior fuerim, si omnia quæ tam multis locis de Conyza, Cünilagine, & Cunila ab eo dicta sunt, coaceruare hoc loco cogitem. Superuacaneum id etiam fuerit, qm signanda non multo post & repetenda a nobis omnia, aut plura saltè ex illis erunt. Aliud itaq; prius agemus, & ut nouerint omnes, non esse Conyzam Origano eandem, neq; ediuerso utriusq; proprias numerabimus notas: ut propositis his, quæ a Plinio miscentur certius pateant. Incipimus autem ab Origano, quam hic ait folium Hyssopo simile habere, umbellâ non comosam, uerum diuisam, & in summis uirgis semen. Et quod ad alia Origani genera pertineat Onetida candidioribus folijs, sed magis Hyssopo similibus esse: semine uero corymborum mō: & quæ agrestem Origano dicunt, folia priori Origano similia habere: uirgas dodrantes, in quibus Anerhi modo umbellæ sint, & candidi flores. Et itæ omnium Origanorum in hoc scriptore notæ sunt. Conyza uero, quas pauloante diximus folium oleaginum, non Hyssopi, hirsutum, pingueq; caules bicubitales: flores lutei, fragiles, subamari, & qui in pappos euolent. Quorū nihil habet Origani aliqua. Plinius autem lib. 19. cap. 7. autore herbario Crateia, Ligusticum primo seu Panaces Cunilam bubulam uocari tradit: ceteros hanc Conyzam græce appellare, & ab eodem Cünilagine dici. Idem non multo post uolumine. 20. cap. 17. Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera. Que Bubula appellatur, semen Pulegi habet: utile ad uulnera cōmanducatum, impositumq; ut quinto post die soluatur. Contra serpentes quoq; in uino bibitur, ac tritum plagis imponitur. Vulnera ab his facta confricantur. Item testudines cum serpentibus pugnantur, hæc se muniant. Hic ipse Plinius sequenti capite etiam ait. Est alia Cunila appellata a nostris, a græcis Origani Heradeoticum. Totoq; hoc capite nihil, nisi multiplex Cunila ab eo tractatur: manifesteq; Conyza hæc Cunilæ nomine censetur, cū ait. Pulices etiam contritæ cum aqua sparæ necant. Quod priuatim Conyza habet. Poterant & alia repeti, sed ad eam quam cogitauimus rem satis hæc sunt. Nec nobis aliud modo propositum est, q; monere ex his quæ pauloante dicta sunt, toto genere differre inter se Origani omnem, & Conyzam omnem, Pliniumq; Cunilæ nomine in utraq; passim uti. Omittimus quod primum ille ait, Ligusticum, seu Panaces Cunilam a quibusdam dici. Falsum enim non multo post esse id ipse testatur. Quod autem lib. 20. cap. 17. ab eo dicitur, Cunilæ præter satiuam plura sunt genera. &c. ad Origanum manifeste pertinet: præsertimq; quod de testudinibus cum serpentibus pugnantibus eo loco tradit: si Plutarcho credimus in naturalibus causis dicenti. ἡ δὲ χυλὴν φαρμακὸν τὴν ἀρὰν τῶν ἰχθύων ὀρίανον ἵππεθις, quod & si idem penitus non sit, eandem tamen rationē habet. Quæ deinde statim ab hoc loco descripta ab eodem sunt. Est & alia Cunila a nostris appellata, a græcis Origanum Heradeoticum, ad Origanū similiter pertinent. Cumq; plura Cunilæ genera fecisset, uni ex his omnia Conyzae huius tribuit. Tamq; uagus in hoc Cunilæ nomine, incertusq; est, ut nihil nos ex decretis eius certum asserre audeamus. Quod autem coniicimus, huiuscemodi est. Origanum græci uocant notam omnibus herbis: & ut sit in gentibus, quibus semper & ubique non fuerunt eadem rerum nomina, eandem Conilam uocauerunt. Testisq; hic ipse in Origanis, sed multo certius in Theriacis suis Nicander dicens. κέρχρον ἡ μένιντα πανόγκτιον τικονίλιν, ἢ τε καὶ ὁράκλιον ὀρίανον ἀμφίπουνι. Quorum sensus est. Et corderi clauso folio, & omnia sanantem Conilam, quam Herculeam Origanum appellant. Nihil aut quorum duorum scriptorum, ut uidetur, certiore fide cōfirmari poterat. Pro cōperitoq; est, Conilam antiquis græcis Origanum fuisse. Potuitq; Plinius eorum autoritate Origanum Conilam uocare. Nescimus tamen, an Cunilam, quæ si latinis est quæ græcis Conyza, misceri totiens ab eo non debuerat. Suspiciamusq; nos, quod est minimum inter duas has uoces discrimen (una siquidem litera uariant) causam Plinio dedisse, ut diuersas plantas eiusdem Cunilæ nomine totiens misceret: cum tamē Origanū græca uox, Conila per, latina uero Conyza, modo hæc illi respondeat, per, u, scribenda sit. In græca illa uoce certa omnia sunt in latina facile est ratiocinari, Cunilam, siue malis Cunilaginem appellare Conyzam hanc, aut illi similem fuisse. Est enim non Plinio tantum, uerum Columellæ, alijsq; scriptoribus frequens hæc uox. Pliniusq; priuatim græcorum Conizam Cunilā manifeste appellauit libro decimo, capite. 70. cum ait. Non potest petris a uell polypus. Idem Cunila adnota, ab odore pro tinus resilit. Acceptum id ab Aristotele est libro quinto de historia animalium his uerbis idem docente.

D

ἡ δὲ οὕτω πολλὰ ποδὶς ὅν τω μῶν προσέρχονται ὥς καὶ ἀπομαρτυρεῖται, ἀλλ' ὑπεμένειν ἀποτεμένον. ἵασι δὲ τὸ
 κοινὸν προσηλόν ὡς φασὶν ὑδὸν ἐσθραίνεσθαι ἀφ' ἑαυτῶν. Quod ab hoc scriptore relatum, alterius au-
 toritate & testimonio addere placuit. Et ut meminissent legentes, non posse Conyzam teterri-
 mi & grauissimi odoris herbam, cum Origanis misceri: neq; si diuersarum gentium uoces for-
 titus concursu eundem sonum reddant, ideo eandem in illis rerum esse significationem. Fiunt
 enim in græcis & latinis multa huiuscemodi: suum tamen in sua gente inlectum omnes ha-
 bent. Dicimus id, quoniam si latinis Cunila est quæ græcis Conyza, non debuerat uicinitate no-
 minis ad Origanum, quæ Conila græcis est, transferri, & cum illa misceri. Nec dicimus, p. cō-
 perto habere, lannam Cunilam græcam Conyzam esse. Verū illud testatur, ex quo tam mul-
 tis ea uox in usu est, in eam partem propensiores esse, & per, u. in principio scribendam; quem
 admodum cum Origanū ostendere uolumus, per, o, illam Cunilā, hanc Conilā dicentes. Pul-
 cariam simpliciter in Aristotele quo diximus loco Conyzam uerūt Theodoros gaza: factū ex
 euentu illi hoc nomine, quia. f. pulices enecat: alioquin in nomine nulla est pulicum ratio. No-
 bis Conyzam hanc magis placuit uocare: ut quarto uolumine descriptam, & Psyllion appella-
 tam herbam, certius ex græco nomine Pulicariam appellemus. φύλλα enim græcis pulex est: &
 ἄλλαν herba a pulcibus uocat: q; infectis his similis semina habet parua, nigra, & tota pulicē
 figura. Erit ob eam causam duplex in hoc opere nobis Pulicaria, altera præcedente Conyze no-
 mine signata, altera simpliciter a pulcibus nominata. Quemadmodum tunc etiam iterum a
 nobis dicitur. Habet Conyza hæc pulicaris, quo in græcis modo leguntur, numerosas appel-
 lationes, fereq; omnes incertas: ideoq; non tractandas a nobis, præterq; Dinofmon: quæ uox
 a grauitate odoris illi facta est: & Pissam, quæ pix græcis est, a glutinoso lentore dictam: qd Plin-
 ius significauit dicēs. Trita mellis odorem habet digitis tactu eius coherētibus. Tria eius gēa
 Diosc. numerat, maiorem, minoremq; & tertiam inter utraq; mediam: crassiore mollioreq;
 caule: folijs maioribus minore, minoribus uero maiore. Theophrastus alijs nominibus duo
 genera tantum Conyza facit, s. de plantarum historia uolumine, his uerbis. Conyza duo ge-
 nera, mas altera, foemina altera. Differentias inter se habent, quemadmodum & alia quæ sic di-
 uiduntur. Foemina tenuiore folio, & constrictiore est, in uniuersumq; minor. Mas maior est,
 crassiore caule, ramosior, & folium maius, pinguiusq; habet, & præter hoc florem magis splen-
 dentē. Semen fert utraq;. In uniuersumq; sero germinat & floret. Nec nisi circa, aut post æstū-
 rum. Grauis masculæ odor, foeminae acrior. Quam ob causam contra uenenata utilis. Et hæc
 a Theophrasto dicta sic se habent. Quæ cōmentationibus his nostris placuit addere, ut duorū
 scriptorum concursus eademq; historia Conyzae cognosceretur: & si non ἴσδεν uerbis, neq; eo-
 dem modo ab utroq; omnia dicta fuerint. In Dioscoride autem quod ad floris colorem perti-
 net, qui duplex in cōmuni græcorum lectione legitur, μῆλεν ἢ ὑπόκισσον luteus & subrufus, mu-
 ratum a nobis est: secundamq; illam uocem ὑπόκισσον, quod est, subamarum fecimus, luteum
 & subruffum diuersos colores male coniungi, & misceri lentientes: mox momentibus uetustissi-
 mis græcis & latinis codicibus, in quibus amarum adhuc manifeste legitur.

De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

Graci Hemerocallen, alij Hemerocatalacton, alij Crinon agri-
 on, alij Crinanthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæ-
 maticon, alij Anticantharō, Romani Bulbum, aut Lilium syluestre, aut
 marinum, Aphri Abiblabon uocant. Foliū & caulem habet Lilij, por-
 raceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni ex-
 rumpunt, Lilij diuisura, quoties dehiscere cœperunt. Colore perq; pal-
 lido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota, aut cum melle & lana
 in pello apposita, aquam educit et sanguinem. Folia trita, mammarum
 inflammationes a partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
 Radix & folia igni ambustis utilissime illinuntur.

BARBARI COROLL.

Hemerocalles, Elium a Theodoro dicitur, q; in Dioscoridis exemplaribus deprauatis Eli-
 um marinum dici, a nostris eum florem legisset. Ego Lilium marinum, non Elium in Dioscori-
 di in

A

B

ἡμεροκαλλίς

Pli. li. 21. ca. 21.

C de legendum arbitror: nam & græce Crinon a quibusdam, & a nostris Liliū idem autor uocari tradit. Coronamētis folio tantum dicata hæc est. Pallidum hoc e uiridi, & molle habet, radicem odoratam. Seritur semine. Antiquus grammaticus Theodorus, cognomine Panages, Hemerocalles Athenis dici prodidit, non florem, sed uellus, aut lenniscum puniceum, & uersi colorem, quo in sacris utebantur. Dioscorides & hanc & Liliū a ueteribus Crinanthemon uocari tradit. Hippocrates quoq; Crinanthemon duplex haberi significat: cum alterum ingesse in ædibus nostris proueniens.

E X M. V E R G. C O M M.

Serebatur quondam in hortis ad cōtōnās Hemerocallis, æmulus cum tota planta Lilio flos. & quasi rudimentum naturæ Lilia facere cōdiscētis: nunc tōtis agris, & inter segetes præsertim pallore suo se indicat: longe Lilio minōr, figura penē illi idem. Differt tātum, q̄ in Lilio floris folia cum tota se int̄ calathūm ap̄eruerunt, resima a superiore parte se inuertunt: in hoc dum deflorescat, recta diu riget. Vnāq; hac nota maxime legentes fallere non potest. Color enim nō tam diuersus: licet in Lilio candoris superbia, in Hēmerocallide palloris tristitia sit: ut non similis, et paulo minus q̄ idem facile uideatur. Eamq; ob causam, a Lilio, Lilioq; similibus alijs floribus pleraq; appellationes inuenit. Agreste Liliū, Crinanthemon, quæ Lilio uox etiam adiecta est. Porphyranes, & Bulbus uomitorius: quæ Narcissi nomina sequenti uolumine erunt. Liliū marinū, & Antictharon: quæ uox aduersari scarabeis hunc florem significat, quemadmodum & Rosæ: quibus obrutum id animal perire naturales aliqui dixerunt. Breuissime Plinius libro uicesimo primo, capite eiusdem numeri de Hemerocalli hæc egit: quodque hic dixerat, folia caulemque Porri modo uiridia habere, ille pallidum e uiridi dixit, thedium Porri inter uiredinetū palloremq; colorem ea ratione indicans. Nobis ex uerbis scriptoris huius rem demonstrare placuit.

De Viola alba. C A P. CXXXIX.

Aluolū

Leucoion ex Græcis aliqui Basilion uocant, Latini Violam albam, aliqui Augustiam, nonnulli Violam autumnalē, aut Passarinam. Vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam. Nam q̄ aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteæ uero præcipui in medicina usus. Huius aridi flores seruati in deflessionibus, ualent contra uulux inflammationes. Et menstrua expellunt. Saniant oris ulcera cum melle. Cum cgrato rimas sedis. Seren duum drachmarū pondere ex uino potum, aut cum melle inditū, menses, secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt, & podagricos iuant.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 11
lib. 6. cap. 19.
The. li. 6. ca. 7

Leucoion, & si candidam Violam ipso nomine significat, tamen & pro lutea, & cerulea, & purpurea sæpe capitur. Hinc apud Columellam candida Leucoia, quasi & nigra quædam sint. Hippocrates certe, nigra inquit, Leucoia quærantur. Paulus, Ioron inquit oleum, hoc est, Violaceum, modo ex purpureis, modo ex candidis, modo ex croceis confici solere Violis. Sciendum & illud est, Dioscoridem hoc loco scribere Violam, quæ græce Leucoion dicatur, a Romanis Ligustriam quandoq; nominari: etiamsi codices sunt, in quibus non Ligustria, sed Augustia legatur: ut fortasse Colnabella in horto suo intelligat de Viola cum cecinit, Nigro cōmista Ligustro.

Nam Ligustrum candidum, pro Cypri flore capitur. Ceterū de purpurea, siue nigra, seorsum post dicitur. Cerulea quæ sit, non constat, nisi quis Cyanū hāc intelligat. Est aut̄ Cyanus flos, rosam excipiens: cuius color honorem, nomenq; dederit ceruleo. Cyanū Amarāthūs excipit. Triuialis, ut qdā existimauere, flos est Cyanus, in frumētario nascēs agro, & hortis q̄q; ruficorū & puellarū corollis, calice Rosarum, sed squarroso, atq; tristi, sine odore, uerū summa coloris gratia, q̄ & Baptisecula rubus dicatur: qm̄ secantibus & metentibus officiat, reusa in occurſu eius falce, nam & Seculā ueteres dixere falcē. Florū porro prima se ostendit alba Viola, nec diū exacta hyeme. Sub idē fere tempus, exit & Viola cognomēto flāmēa, quæ Phlogion uocatur: Syluestris tantum ab aliquibus Phlox: ut errare putem, qui Phlogiō eandē esse cū lutea Viola

scribere, quod quidem ex sequentibus apertissime liquebit. Theodorus flammam uocauit, colore commendabili, odore nullo, semine proueniens coronis. Non est hæc autem Iouis flos, aut quod idem est, Iouis flamma, hoc est, Diosanthos. Idq̃ neu dubitem, facit, q̃ Iouis flos, licet sine odore sit, & coronarius, & obseruatur semine, tamen æstate floret, non per hyemem, ut Flamma. Plinius quoq̃, Iouis inquit flos, colore tantum commendatur, odor abest, sicut & illi, qui a Græcis inquit Phlox uocatur. Diximus & Lychin uocari quandoq̃ Flammæam, sed inter Rosas potius q̃ Violas. Aliud est apud Græcos Phlogys. Nam & uestis genus significat, quod nos flammæam, et flammæarios opifices in Plauto uocamus, & carneni tostam, ut est apud Stratidem. Violarum ergo Alba & Flamma plurimum durant. Sed factius maxima auctoritas Luteolis: qui colos in nuptialibus Flammæis quæsitus, ritu antiquissimo & fœminis totus concessus traditur: ideoq̃ fortasse nō numeratur inter principales, hoc est, communes maribus & fœminis: quoniam coloribus societas principatum dabat. Genera Lutearum Tusculana, & quæ appellatur Marina, folio aliquanto latiore, sed minus odorato: in totum uero sine odore, ac minuto folio. Calathiana, munus autumnii. Cæteræ ueris. Proxima ei Caltha est, concolori amplitudine, uincit numero foliorum Marinā, quinque folia non excedentem. Eadem odore superatur. Est enim grauis Caltha, non leuior ei, quam Scopam regiam appellant. Quamq̃ folia eius oleant, non flores, ut inquit Plinius. Quod autem genus ei sit inter Violas Scopæ regia, parum liquet. Dioscorides Scopam regiam Naporum generi connumerat. Plinius alio loco Sideritin, quæ latissimo folio sit, Scopam regiam a nostris dici uult. Violæ odor e longinquo suauior, propinquus hebetatur. Vita longissima Candidæ, triennium. Ab eo tempore degenerat & minuitur: floresq̃ assidue candidiores affert. Minor uis est recentibus. Ideoq̃ aridis utuntur post annum. Honor Violis apud antiquos post Rosam & Lilium. Violam iccirco dictam Ion Græci putant, q̃ cum Io in uaccam a Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Nostri quoq̃ Violam, quasi uitulam, imitatione græca uideri possunt, appellasse.

E X M. V E R G. C O M M.

DEtulit candori multum in hoc flore antiquitas, nec leuem splendoris sui gratiam illi habuit, una ab eo facta appellatione tres alios colores indicans: qui in toto hoc Violarum genere a scriptore hoc numerantur, & uno excepto a cunctis passim quotannis uidentur. Leucoiorum enim nomine in græcis omnes indicantur Violæ hæ, quæ primæ flores suos proferunt, ubi minor & tepidior aër fuerit ab hyeme statim: ubi asperior & frigidior, postea: ubiq̃ autem per uer primæ noui anni aduentum nunciantes, pluresq̃ non uno ramulo tantum, sed uno pediculo florentes: quæ causâ fuit, ut a quibusdam Polypheræ inter alias appellationes dicerentur. Id enim ea uox significat. Florent hæ passim triplici colore, candido, luteo, & purpureo. Qui quartus deinde ab hoc numeratur, ceruleus in Violarum genere hoc, quod sciam, in Italia nullibi uidetur. Ex eo oborta nobis suspitio est, posse in græcis abundare eam uocem, & si in cunctis pariter legatur: is etiam quem nos habemus egregiæ antiquitatis, & fidei latinum Dioscoridem, longobardis literis scriptum, tres tantum colores illos notos omnibus numerat: quartus hic ceruleus nullus in eo est. Nec nos tantum illi deferimus, ut unum uelimus pro cunctis alijs nobis esse, sed accedente rei naturæq̃ & suspicioni huic nostræ hoc ueluti teste, qualiscunq̃ illi est, non fore credidimus inutile hoc etiam legentes monere. Præsertim nullibi, ut paulo ante diximus, ostendente in hoc flore eum colorem naturæ. Alioquin oportebat, quæ primo uolumine in Iasme dicta a nobis fuerunt, meminisse: & quæ longius illis de Violis docentur, in hunc locum referre: opinariq̃ in ceruleo colore hoc, aut alijs locis nasci hunc florem. Late enim pater naturæ uis, & admirabilis eius maiestas: quæ potest multa ubiq̃ uariare, & quæ nobis, & nostro orbi negauit, alijs dedisse: aut Violarum appellatione alia etiam censerî florum genera. Quales Iesiminos omnes tunc esse diximus, modo magnitudine & forma pares & similes illis sint: & intellexisse in Dioscoride necesse erit, florem quempiam alium cerulei coloris: qualis uerbi causâ Cyanus est, sic à Græcis a colore dictus, uulgaris flos, omnibus notus inter segetes, Maio & Iunio mense nascent. Quem rura nostra florem Alysum uocant, triplici & ipsum colore, candido, purpureo, plæruncq̃ autem ceruleo. Nobis tamen in priorem illam sententiam inclinat animus. Credimusq̃ quartum illum colorem huic scriptori temere accreuisse. Vidimq̃ ea ratione præcipue, q̃ non uerisimile est, misuisse diuersa simul genera Dioscoridem: & cum de Leucoijs certo scilicet genere priuatim ageret, de cunctis Violis, quæ Græci *ῥα*, non *λευκοῖα* uocant,

Cagere cogitasse. Obseruauimus enim τῶν ἰωv, id est, Violarum latius patere appellationem, pluresq; completi flores: Nigram, seu malis ferrugineam Violam, lesiminos omnes, Calathianam, & quam Græci Phloga, Plinius Flammeam uocat, pluresq; alios qui figura, quantitate, foliorum positura, aliq; huiusmodi ratione aliqua proprie dictis Violis similes æqualesue sint. λινκοίων autem triplex tantum hoc genus, quod solo colore differt, quodq; nos paulo ante ex Theophrasto descripsimus. Solæ enim hæ Violæ Leucoia dicuntur. Accedit & illud, q; si Cyanus in hoc genere intelligendus erit, ex qua uoce nos credimus irrepsisse eum colorem in has Violas, uidebitur temere miscuisse Dioscorides, quæ non eodem tempore florent. Ille enim ab hyeme statim aliquibus locis, ubiq; autem & semper uere florent, Cyanus autem prima æstate tantum. Ille sponte sua in parietibus, & murorum pinnis aliquando, illi inter segetes passim nascuntur. Possunt quidem ambo in hortis conseri, sed nos simplices naturæ natales & notas, non coacta artis opera tractamus hoc loco.

¶ De Cratægono.

C A P. CXL.

αρκτικόν

Cratægonum, siue ut alijs placet, Cratænon, folijs tritico simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū. Semine Milij. Nascitur in opacis & frutetosiss, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibat ieiuno ore, ter in die post menses purgatus, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptionem quadraginta diebus, & uir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 26. ca. 10.

D

Est & alia Cratægon, siue Cratægonos, siue Crategonos, quæ Theligonos uocatur. Differentia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates Polycriton appellat: quam Cratægonon cæteri. Plinius Cratægonon, spicæ tritici similem demonstrat. Dioscorides Melampyro. Theophrastus lino triticeo, id est, λινῷ πυρίνῳ. fortasse hoc intelligens, quod Plinius culnum, siue spicam tritici. Theodorus nescio q; diligenter lini modo rufum uerit: quia πυρρόν, non πυρίνόν in Theophrasto legerit. In Theophrasto arboris etiam genus est Cratægos, siue Cratæгона: quam Italia uocat Aquifolium: neq; magna ualde, neq; crassa, ligno robusto, uersicolore, flauo, cortice laui, ut Mespilo, folijs item Mespili, hoc est, promissis, uerum latitudine ac longitudine maioribus, nec ad eundem modum ferratis, fructu plurimum rotundo: qui maturescens siccatur, nigrescitq; gustu & succo Mespili: fereq; Mespilus syluestris fuerit, ut Theophrasti uerbis utar. Aquifoliam porro, siue Aquifolium, ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo, q; Illicem, Illex porro duo habet genera, minus, & prolixius.

E X M. V E R G. C O M M.

Tota stat gentium uulgiq; fama & fide Cratægoni in scriptore hoc & Plinio medicinarum neq; in historia, quod sciam, ex antiquo illo tempore a quoquā additum illi aliquid est. Nos etiā quod præter dicta a duobus his Cratægono adiciamus, non habemus. Monuisse tamē obiter legentes inutile non erit, ideo Cratægonon a græcis dictam fuisse, q; ui, potestatemq; sua κρατὶ τοῦ γένου, euincit scilicet, superatq; & genituræ dominatur. Potestq; humani seminis naturam ad mares conceptus cogere.

¶ De Phyllo.

C A P. CXXI.

φύλλον

Phyllon aliqui Elæophyllon uocant. Nascitur in saxis, sed quod baccæ coloris. Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine Papaueris simili, maiore. Sed Arrhenogogon cætera huic simile, solo fructu distat. Habet enim uuas deflorentibus oleis non dissimiles. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut Thelygonon feminei proditur. Horum Crateuas author est. Sed huiusmodi historiatus, mihi produxisse uidetur.

BARBARI COROLL.

Phyllon radice parva. Differt ab hac Phyllitis : de qua diximus . Differt & Phyllandriom, siue ut alij scribunt, Phellandriom : de quo nihil aliud proditum inuenio, q̃ q̃ in palustribus nascitur, folio Apij : q̃q̃ semen eius propter calculos, & incōmoda uesicæ bibitur. Ab hoc sunt qui Phellandriom, eandem esse cum Helioselino, id est, Apio palustri censeant. Herbam quoq̃ illam; quæ a Plinio Silaus appellari traditur in glareosis, ac perentibus riuus, Apij folio nata; quam ad uesicæ incōmoda coquendam præcipit. Sunt qui pro Phellandrio Heleoselinoq̃ accipi p̃uēt. De hoc in Sio plura diximus & Lauere. Non Silaum scribi posse, cum inibi, tum in Apologia quoq̃ nōstra ostendimus.

EX M. VERG. COMM.

Descripsit Folium hanc, s. de plantarū historia uolumine Theophrastus his uerbis, *ἡνία δὲ ἵναι τις τὸ ἄσπενγοντιν ἢ θυλυγοντιν. διὸ καὶ καλοῦσι πολλοὶ τὸ ἵναι ἄσπενγοντον τὸ δὲ θυλόνον, ὅμοια δὲ ἄμφω καὶ μορφῇ ἔχοντα δίκλινον. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ ἵναι θυλόνον καθάπερ ἰλαίας βρύου ὡχρύτερος δὲ τοῦ ἄσπενγοντον, διότι περ ἰλαία ἔστιν ἄρτι φύσκει καὶ τοῦ βρύου. δίσχρον δὲ ὡσπερ ὄρχις ἀνθρώπων.* Quorū sensus sit. Quædam præterea esse inaribus, aut alterius sexus concipiendis sc̃ibus apta, eamq̃ ob causam Folium aliam mares, aliam fœmineos conceptus facientem dixerunt : sibi inuicem similes, & Ocimi figuram habentes ambas. Est tamen alterius quæ fœminarum conceptus facit, semen muscoso flori Oleæ simile, pallidiusq̃ q̃ alterius, figura nuper ex muscoso flore incipientis Oliuæ, cohærens sibi, geminumq̃ Testiculorum hominis modo. Et hæc quidem Theophrastus eadem huic scriptori, si diligentius omnia expendantur.

De Testiculo Canis. CAP. CXLII.

TESTICVLVS Canis, quem Græci Orchin, aut Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis, Oleæ similibus, in terra straus longioribus, angustis, læuibus. Caule dodrantali, floribus purpureis, radice bulbosâ, oblonga, Oliuæ modo angusta, duplici ordine : superiore, quæ plenior est : inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbî. Ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur. Si minorem, fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulos coitus. Aridam uero, ad inhibendos. Et alterum alterius potu resolui. Nasctur in petrosos & sabuletis.

BARBARI COROLL.

Orchis, qui priuatim Cynosorchis, id est, Testiculus canis dicitur, inueniri solet fere in uineis, folijs ternis, paruis, semipedalibus, radice ad formā testium hominis, alternis annis intumescente ac residente. Atq̃ hic mas est & fœmina eiusdē nominis; quæ distinguitur internodijs, & ramosiore frutice, radice fascini. Nasctur fere iuxta mare Cynosorchis, & Satyrion uocatur, minus proprie. Aliud enī genus est, quod proprie Satyrion appellant, ut paulo post monstrabitur. Est & Orchis cognomine Serapias, de qua modo prodendum.

EX M. VERG. COMM.

Aliter potius q̃ aliud de utraq̃ Orchis, id est, Testiculi huius radice docuit Theophrastus nono de plantarum historia uolumine. Quo loco cum de nouis, & uix credendis plantarum quarundam uiribus ageret, numerassetq̃ fabulosa etiam aliqua de sterilitate, fœcunditateq̃ ad conceptus & partus agere incipientes, subiiecit. *καθάπερ ἐπὶ τοῦ ὄρχιδος καλονμένου. αὐτὸν γὰρ ὄντιον, τοῦ ἵναι μέγανον, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸ μὲν μίαν ἐνὶ ἑνὶ γόντον ποιεῖ πρὸς τὰς ὁμιλίας, ἐνὶ γὰρ αὐτῷ τὸν δὲ ἰατρῶν εἰνεται καὶ καλῶν. ἔχει δὲ τὸ ἵναι πολλὸν σκυλλάδιον, λευότερον δὲ καὶ ἰλαίον, τὸν δὲ καυλόν, διωδύτατον ἐπὶ αὐτῷ.* Quorum summa & sensus est. Quemadmodum in ea quæ Orchis, id est, Testiculus uocatur. Qui cum duo sint, maior aliter, minor uero alter, Maior ad Venerem efficaciorē hominem facit, in lacte capræ, in montibus pastæ sumptum. Minor autem nocet illi & impedit. Habet planta Scyllaceum folium, minus tamen, & minore læuore nitens. Caulē postremo agresti Raphano, quam Græci Apion dicunt, simillimū. Et hæc Theophrastus de Testiculo herba: quam hic petrosos & sabulosos locis nasci tradidit, contra q̃ græcorum & latinorum aliqui testati fuerunt, ad mare nasci affirmantes.

A

Pli. li. 22, ca. 16.
27. cap. 12.
Theoph. li. 9.

ὄρχις
κυνὸς ὄρχις

B

Pli. li. 26, ca. 10.

C De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

Testiculus, qui alio nomine Serapias, Andrea auctore, uocatur, quoniam radix inter pauca utilis sit. Folij est Porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus pene purpureis. Radice Testiculis simili. Quæ illita tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas. Et illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhihent. Sanatq; oris putredines, & ulcera cacoëthe. Aluum sistunt e uino potæ. De hac, eadem quæ de Testiculo canis produntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Orchis Serapias, quæ Triorchin cognominat Aetius, solum habet Scillæ, ut Theophrastus & Plinius testatur: non Silphij, siue Laseris, ut Theodorus cõuertit, Silphiodes, pro Scillo- des in eo legens. Etenim Silphio foliū est Apij, non Scillacei, aut Porracei, ut Serapiadi. Spinosus huic herbæ caulis, & Apio, i. Raphano syluestri, non ut Theodorus inquit, Piro similis.

E X M. V E R G. C O M M.

Priori Testiculo cõgener posterior hic est, radicum numero diuersus, & alter ab illo dictus. Duabus enim, & quales descriptæ sunt, ille niti. Hic a Diosco. minimis Testiculis, nullo eorū de creto numero similes radices habere traditur. Ab alijs tñ Triorchis noīatur; manifesto ex ea appellatione argumēto, non duabus, sed tribus testiculatis radicibus niti in terra. Sic enim posteriores medici appellauerūt, præsertimq; Paulus Aegineta ultimo suæ medicinæ libro, capite de sordidis ulceribus, *σαραπιάδος τῆς καὶ τριόρχως*, id est, Sarapiadis herbæ, quæ & Triorchis dicit. Mox lib. 6. de simplicibus *ὄρχις ἢ σαρκίνια ἴδιὰ τριόρχιν*. Quod est. Orchis, aut Sarapias, quæ quidam Triorchin uocant. Sic etiā Aetius, sic posteriores alij. Ex quibus uidere licet, non uiribus in medicina tantū, sed historia etiam a priore illo hunc differre. Cur aut Sarapiada hic uocari dixerit, quoniā multos habet radix eius usus, non satis certum nobis est.

D De Satyrio. CAP. CXLIIII.

εὐρύριον

Satyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta. Rumici, aut Lilio similia, minor tamen, ac rubra. Caulem cubitalem, nudum. Florem Lilij effigie, candidum. Radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut ouū candidam, gustanti dulcem, & ori non ingraturam. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dum concumbendi incescit cupiditas. Siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

B A R B A R I C O R O L L.
Satyrii primū genus, caule leui, radice gemina, hoc est, duplici ordine, a Plinio describit,

De Satyrio Erythronio. CAP. CXLV.

εὐρύριον τὸ ἔρυν-
θρονιον

Satyriū Erythronion, aliqui Erythræicon, alij Melion aqueum, alij Entaticon, alij Priapicon, aut Satyriscon, aliqui Satyri Testiculū appellant, Latini Molorticulum Veneris. Semine lini, maiore, duro, læui, splendente. Quod fertur, non secus atq; Scincus libidinē excitare. Corticis radicis gracili, ruffo. Intus aut album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si oino manu teneatur radix, stimulat. Eoq; magis si bibatur in uino.

B A R B A R I C O R O L L.

Satyriū hoc notum pastoribus, quoniam arietibus & hircis segnioribus in potu datur, &

in Sarmatia equis ob affiduū laborem pigrioribus in coitu: quod vitium Profedamū uocant. In totū quidem Græci con citationē hanc uolentes significari, Satyrion, & Satyrifmon, & Satyrifmon appellat, ideo & Aristocholia genus unum, quod Polytrizon cognomināt. Satyrion ex facto uocari cenſeo. Herbam quoq; illā Satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatā ex India: cuius contactu libidine durare ſeptuageſimo coitu meminerit, nec ſpeciem eius, aut nomen aliud reddiderit. Habēt hodieq; Syri herbam ſimili effectū, Bucheidenq; nomināt, & Indicam Satyrion: fortasſe cum ea, cuius mentionē Theophrastum feciſſe diximus, eandem radice candida & dura, cōmendatore quo craſſior & ruſoſior, & albi or, podagris utili. Eſt & alia Satyrifmi ſignificatio Hippocrati, pro tuberculis prælongis, qualia Satyrionū pingūtur, ſub ipſas aures, quæ a quibuſdam & Theres, & Pheres appellantur, ut inquit Galenus.

E X M. V E R G. C O M M.

Omnes Satyrionū huius appellationes, aut ex colore radice, aut ex uiribus, impetuq; eius ad Venerem factæ ſunt. Neq; enim Erythron, & Erythrocozum aliud ſignificant, q̃ rubens ſim pliciter, & ueluti cocco infectum. Quæ deinde uox Entaticos ſequitur, non aliunde q̃ ἀντι τοῦ ἰρρύτου eſt. Græcis enim intendi, & arrigere ea uox ſignificat. Quemadmodum Priapiſcus, Satyrifcus, & Satyrion Teſticulus. Omnes enim a ſalacitate Veneris ad hanc herbam tranſlatæ ſunt. Priapum quōtidie in hortis ſuis uidebar antiquitas ad Venerem ſemper paratum, & qualem in Priapicis carminibus audire adhuc licet.

¶ De Hormino.

CAP. CXLVI.

HORMINVM ſatium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia dicitur. Folij eſt Marrubio ſimilis, caule ſemicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ ſiliquis ſimiles prodeunt, quæ ad radicem ſpectant, in quibus diuerſum ſemen recluditur. Siquidem in ſylueſtri rotundum, fuſcumq; inuenitur. In altero nigrum, & oblongum: cuius eſt uſus. Ad Venerem ſtimulandam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argema, albugineſq;. Illitum ex aqua tumores diſcutit. Eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus eſt illitæ hærbæ. Sylueſtre magis uiribus pollet. Quare unguentis præſertim gleuſcino permiſcentur.

B A R B A R I C O R O L L.

HORMINON amarum, nigrumq;, nec Cumino penitus aſimile, dodrantali Plinio altitudine: medicamentis annuerant dum potius, q̃ inter fruges. Diſtum ita, quia Venere extimulet. Seritur cum ſefama & Irone, omninoq; cum æſtiuis, hoc eſt, cum ijs quæ æſtate ante Ver giliam exortum ſeruntur. Eſt & Horminiū, ſiue Hormienon, & Hormenion, ſed illud Cor ruda intelligitur. Plinius huic folium Porri tradidit. Ceteri Marrubio ſimile fecerunt: qui error fatalis fere Plinio eſt, ut in Ballote & Stachye.

E X M. V E R G. C O M M.

FRUGUM generi adnumerat aliquot locis de plantarū hitoria Horminon hoc Theophrastus. Idem Theophrastum ſecutus decimo octauo uolumine Plinius tradidit capitibus. 10. & 7. Quinetam poſt hæc. 22. uolumine, capite ultimo duorum generum, & ipſe Horminum fecit: alterum nigrum, ut hic ſemine: alterum candido, contra q̃ Dioſcorides, qui quidē dixit: quæ uoce Græci indicant, quæ nigrefcunt magis, q̃ quæ nigra ſunt. Alij inter medicamenta, & fructes potius, q̃ inter fruges numerare Horminum thaluerunt. In quam partem & nos propen ſiores ſumus. Neq; enim antiquis in uſu ciborum fuit, & ætate hac noſtra uix ab agricolis cognoscitur. Deſcripſerunt ſatis id antedicti ſcriptores, Cuminoq; ſimile, præſertim ſemine ſecerunt. Ob quam cauſam nihil ultra de eo nos agemus.

¶ De Securidaca.

CAP. CXLVII.

HEDYSARON unguentarij Pelecinum, id eſt, Securidacam uocant. Fruticosa eſt, folij Ciceris. Semeti ruſſum in ſiliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem ſecurim æmulatur. Vnde noſ

A

ἐρμινον

B

Pli. li. 18. ca. 17.
lib. 22. ca. ulti.

ἡδυσάρον

C men accepit. Amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nas-
citur in fegetibus & hordeis.

Theoph. li. 9.
Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.
Hedyfaron, quoniam Pelecinon a Græcis dicatur, a nostris Securidaca nomen habuit, fructu-
cola cauliculis, semen filiquis ternis, quaternisque, quale Git nouimus amarum. Nas-
citur in fegetibus. Hac Lentem necari, Plinius, & e Græcis aliqui recentioribus existimant. Theophras-
tus Aphacen. Lentem uero ab Aparina, quæ Lappa sit, strangulari complexu scribit. Ita saepe
fallit uocabuli similitudo. nam Græci Lentem Phacon uocant, non Aphacen. Sciebant & hoc
discrimē illi quod dubitat: sed liberariorū culpā, ut sapenūro cōtingit, hallucinādo suā fecere: quod
quidē & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere nō dubitamus. hoc em̄ est hominē esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Nasci Securidacā in hordeacea & triticea segete hic ait. Secutusque eum Plinius, in fegetibus
inueniri lib. 27. cap. 12. tantū testatus est. Theophrastus tamē octauo de plantarū historia uolu-
mine, Lentibus noxiā & pestilentem dicens, non aliter quā tritico lolium, & auenā uerisimile fe-
cit, illic potius inueniendam ubi magis grassetur. Hac enim malorū, noxarumque omniū natu-
ra plerūque est, ut ubi maleficiū suum exercere possint, illic libentius agant, & frequentiora in-
ueniant. Pelecinus ab antiquioribus dicta in græcis diu planta hæc fuit: nec nos, præterque in no-
tissimis scriptoris huius codicibus alio noīe descriptā in Dioscor. hætenus inuenimus. Is etiā
quē nos egregiæ antiquitatis habemus latinum Dioscoridem, Pelecinū, non Hedyfarum legen-
tibus proponit. Quo sit, ut suspicemur posteriorem hanc esse plantā huius appellationē, & a
suauitate odoris, usque unguentariorū factam huic scriptori a posterioribus græcorū medicis
acceuisse. Dico autē posteriores, qui Theophrastum, & scriptoris huius tempora secuti sunt.
Paulus Aegineta utroque nomine eam in. 6. his uerbis indicauit. Hedyfaron, quæ & Pelecinus.
Eius semen ante coitum ex melle appositum hic ait ἀπόκλον esse, id est, sterilitatem facere. Bar-
barus autē aliter penitus uerit, dicens cū melle appositū ante consuetudinē prohibere partus.
D Nos unam eandemque uocis significationem semper secuti sumus: ille quod alijs locis abortiuū
dixerat, hoc loco contrarij penitus sensu partus prohibere dixit.

De Onosmate.

C A P. CXLVIII.

ὄνοςμα

Onosma aliqui Osmaden, alij Ononin, alij Phlonytin appellant.
Oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine
quattuor digitorum, & duū latitudine, mollia, in terra iacentia. Sine cau-
le, sine semine, sine flore. Radice nititur longa, tenui, infirma, rubescente.
Gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnās si eam
supergradiatur, abortum facere dicitur.

Pli. li. 27. ca. 12.

B A R B A R I C O R O L L.
Onosma, & Oenoma, & Onoma, & Onomis, & Ononis, & Phlōitis, & Phlomis potius,
& Hyperbaton nōcatur. Folia eius non ad quatuor, sed ad tres digitos longa Plinius scri-
bit, strata in terram, tria, in cisque. Quid sit Hippocrati Oxosma, quo Lichenes tolluntur, haud
comperi: nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censeat. Acetum sane
contra Lichenas pollere nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

Breuis, & præter a Dioscoride dicta nulla est Onosmatis huius in alijs scriptoribus historia.
Plinius. 27. uolumine cap. 12. eadē huic scriptori oīa reddidit. Quā solū foliorū longitudinē hic
quatuor digitorū, ille triū fecit. Paulus Aegineta etiā nihil addidit aliud, quā acrem amarāque esse:
eamque ob eā folia eius in uino pota enecare simul, & pellere ex utero humanos foetus.

νυμφαία

De Nymphæa.

C A P. CXLIX.

Nymphæa nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs ci-
borio minoribus, & longioribus. Alijs in summa aqua, alijs de-
mersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore Lilio simili, albo, & in me-

dio crocos habente. Cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est læuis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Radix nigra, scabra, clauæ similis. Quæ autumno secatur. Sicca cum uino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur. Lienem absumit. Radix stomachi ac uesticæ doloribus illinitur. Vitilignes ex aqua emendat. Imposita cum pice, alopecijis medetur. Eadem contra ueneris infomnia bibitur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genitale infirmit. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in Anygro amne, & in Beotiæ Haliarto.

BARBARICOROLL.

Nymphææ radix dulcis: quam & in sole siccant. Nata fertur a nymphâ erga Herculem zēlotypa, proptereaq; mortua: quare Heracleon uocant aliqui. Alij Rhopalon, a radice clauæ simili, laudatissima in Orchomeno & Marathone. Sed & in Creta quoq; ut Theophrastus putat. Bœtij Manodion, siue Madon, ut idem Theophrastus indicat, appellant, edentes semen.

Theo. lib. 9.

EX M. VERG. COMM.

Non comparauit Theophrastus nono de plantarū historia uolumine Nymphæam describens, folia eius Aegyptiæ Fabæ folijs, uerum simpliciter grande folium sub aqua habere dixit. Addidit præterea, sistendo sanguini utilia esse folia eius, ideoq; trita uulneribus imponi. Quod q; hic non testatur uesci radice eius gentes in Orchomeno Bœtiæ, Marathone, & Creta, quibus locis copiosam nasci Nymphæam tradidit. Numeraturq; ab eo inter radices dulces, qualis Scythica est, pluresq; aliæ. Satis hic nominis causam declarasse uidetur: & si ex ueteribus fabulata aliqui fuerint, a Nymphâ priuatim nomen herbæ factum fuisse, quæ claua ab Hercule interfecta sit, uel ipsa zelotypia eius intabuerit, in palustrem hanc plantam mutata. Vulgaris & nota omnibus herba, qua nihil in palustribus speciosius nascatur & uluat. Facileq; est ex folio eius, quale Aegyptiæ Fabæ folium sit ratio cinari. Hoc enim illi comparat Dioscorides. Nec præter q; figura simile illi facit. Grandius enim illud est, & quale secundo uolumine in Aegyptia Fabæ ex ueterum monumentis & historijs descriptum a nobis est.

B

De altera Nymphæa. CAP. CL.

Et altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictæ. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosæ simili. Huius semen & radix, contra sceminarum profluuia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne Peneo.

BARBARICOROLL.

Nymphæa alia caput habet Rosæ magnitudine.

EX M. VERG. COMM.

Quam habet nominis causam Nymphæa, eandem & Nymphon. Folia hæc superiori similia habet. Quod discrepat, radicis color, & floris, & præter colorem floris figura est: quæ in illa Lilij, in hac Rosæ describitur. Non facile inuicem discernuntur, nisi quis a primo ex aqua earum emerfu, dum deflorescant, utranq; obseruauerit.

De Androsace. CAP. CLI.

Androsaces, sunt qui Picrada appellant, alij Leucen, alij Thalassiam. Herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herbæ decocto. Po-

Androsace

C dagris utiliter illinitur.

EX M. VERG COMM.

Sapor Picrida, color Leucem, ortus Thalassiam Androsaces uocari fecit. Prima enim uox illa amaritudinem, altera candorem, tertia mare & maritimum significat: quæ tota fere eius historia est. Amarefcit enim, albescit, & maritimis locis in Syria nascitur: unde repetenda alia essent. Sed nimis a nostro orbe distat regio illa: ob eam causam Dioscoridis & Plinij in Androface historia contenti, Asplenon nostro orbi cognitam, neque inuentu difficilem tractabimus.

De Asplenio. CAP. CLII.

Πεντακτύς

ASPLENIUM aliqui Scolopendrion uocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitum, alij Aturion, alij Phrygiam, aut Phrygium, aliqui Philrodoten, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animalis similibus, ab radice uel na prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis. Nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutaq; superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto feruescunt, ut per dies quadraginta pota, lienem absument. Quibus etiam contritis, lienem ex uino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest. Singultum sedat. Calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.

D

Asplenon, folijs trientalibus, radice limosa, cauernosa sicut Filicis, candida, hirsuta. Gaudet humidis. Laudatissima in Creta, ubi & repertam Viétruius affirmat, circa Potereum amnem: qui duas urbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pectoribus sine liene inuentis: quia herbam eam roderent, ex altera parte quæ ad Gnosum est, lienem habentibus: quia ibi herba illa non apparet. Theophrastus Hemionion hanc appellat. Theodoros Mulam uertit, folio Scolopendrij, radice multiplici, mortuosas petrosasque planities amat, delectari cibo eius Mulas, & ob id datum ei nomen. Fœminas sterilesce quæ hanc herbam in cibo sumperint, admixta Mulsæ ungula, & corio, aut semine: prout alij non derma, sed sperme in Theophrasto legunt. Quod autem Scolopendrij folio describit eam, uidetur aliud genus quæ Scolopendrion, siue quod idem est Asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi quæ ab eo Scolopendrium, & Scolopendra sumptum intelligat.

EX M. VERG. COMM.

Hemionion Athenis Theophrastus, quod muli libenter ea uescuntur, uocari Asplenon tradidit. Cretes Asplenon, quod primi in ea insula Cortynæ obseruauerint, ad Potheriæ fluuii pascetiam hanc herbam pecora sua, lienes iminuerunt. Vulgus ubique Splenion, quod longitudine latitudineque sua fasciæ, & ut sic loquamur, emplastelli formam habet. Posteriores usque ad ætatem hanc nostram, Scolopendriam, a Scolopendrarum similitudine & figura, quam habet, foliosum magis cespitem quæ plantam uocauerunt. Indicata alijs etiam appellationibus est, sed non adeo certa rei indicatione.

Πεντακτύς

De Hemionitide. CAP. CLIII.

Hemionitis, quam aliqui Splenion uocant, folium emittit Dracunculi, lunatum. Radicibus cohaeret multis, tenuibus. Nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absument.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.
lib. 26. cap. 7.

Hemionitis, uidetur esse quam Plinius Hermion, & Teucrion, ab inuentore Teucro uocatum perhibet, uigesimo quinto historiae naturalis uolumine, natam in asperis, austero gustu, nec flores ferere, neque semine, huiusmodi medentem: quæ omnia et Hemionitidi a Dioscoride tributa sunt. Nam quod

Plinius Iuncos tenues spargentē describit, Diosc. radice multiplici, & exili demonstravit: q̄ ille folijs parvis, hic folijs Dracuntij, lunæ modo incuruis deliniat, idest, *μυνοιδίς*, proindeq; non folijs parvis, sed folijs curuis, in Plinio scribendum censeo locum eum. Inuentam sic affirmat, cum ex ta super eam proiecta essent, adhæsissetq; leni, eumq; exinanisset, propterea & Splenon uocatam. Sues quoq; qui radicem eius ederint, sine illo uiscere compertus;

EX M. VERG. COM.

Non temere penitus suspicati sunt ex antiquis & posterioribus medicis aliqui, eandem Afpleno Hemionitē hanc esse: nec duplicem, sed unam utriusq; historiam & medicinam in scriptore hoc legi. Vtraq; enim a multis factio nomine indicatur. Vtraq; nec caulē, nec florem, nec semen fert. Vtraq; in petris nascitur, Vtraq; lienes minuit: & quod in folijs alterius differre uideatur, idē facile esse potest. Longitudine enim & figura non adeo differt a Scolopendria Dracunculus, ut non potuerit alterutro aliquid comparari: diuq; nos in suspitione hac ancipites, autoribus antiquissimis, & optimis græcorum medicis, præsertimq; Paulo Aegineta, seorsum de utraq; agentibus, seorsum tandem de utraq; egimus: illam Afplenon, hanc priuatim Hemionitē uocari tradentes: congenerem illi quidem, foliorum tamen aliqua diuersitate dissimile. Nec uiribus æqualem. Siquidem extenuat Asplenos, non tamen calet, Hemionitis adstringendi uires cum amaritudine habet: ut testati de utraq; meliores græcorum medici fuerūt. Magna inter eas foliorum similitudo: quæ non satis fuisset, simpliciter lunata dixisse a scriptore hoc *μυνοιδίς* appellata. Habet enim id sidus plura luminum incrementa: eademq; luna, non eadem luce semper fulget, sed est cum toto orbe fulgens, totam illustrat noctem. Est cum utriusq; gibbosa, quam ueteres græci *ἀμφικυρτε*, ut illam *παρελάναν* uocant, maiorem noctis partē copiosa impleat luce. Est cum dimidiato globo splendens, *λεχόμανισ* a græcis dicitur. Est tandem cum a sole digrediens usq; ad quartam diem, non multa luce adhuc fulget: eoq; tempore græci plerumq; *μυνο* uocant. Et in hoc lunæ intervallo Hemionitidis folia sideri illi comparauit hic scriptor. Alioquin si lunatum simpliciter eius folium dixerit aliquis, incertam ex incerta eius si deris quantitate & specie figuram significabit. Veritq; nos, ne quod in lunæ amoribus fabulati aliqui sunt, nobis accideret, pluribus græcam uocem *μυνοιδίς* uertimus: diximusq; lunę nondum tumentis in globum, ex Hemionitidis folio lunæ lumina describentes.

De Anthyllide. CAP. CLIII.

Anthyllis, quam quidam Anthemida uocant, alij Eranthemini, alij Leucanthemon, alij Soranthini, alij Campestem florem, Romani Solastrum, duplex est. Quædam enim Lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Nascitur in salis terris, & a sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulisque Trifagini similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus. Flore purpureo, odoris admodum grauis. Radice Cichorij. Porta drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibusq; plurimum prodest. Tritæ, uulvæ pituitas emolliunt, cum rosaceo & lacte impositæ. Vulneribus medentur: quæ autem Trifaginis similitudinem refert, pota cum aceto mulso comitiales sanat.

BARBARI COROLL.

Anthyllis, & Anthyllion, & Anthycellion uocatur. Genus eius primum in fabulosis. Alterum nascitur in saxosis. Est & in Aegypto fructus non quidem Anthyllion, sed Anthaliō uocatus, a Theophrasto Malum Anthali, magnitudine & rotunditate Mespili, sine nucleo, sine cortice, folijs Cyperii: haud procul a Nilo, etiam si Plinius scribat longius a flumine. Decoquitur ibi hæc in Bryto hordeaceo, uehementer iocunda & dulcia, & quæ bellariorum uicem in secundis mensis impleant.

Pli. li. 21. ca. 29
lib. 26. cap. 8.

De Anthemide. CAP. CLV.

Anthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoniam am uere floreat, alij Chamæmelon, quoniam mali odorem ha-

ἀνθίμις

- C** beat, nonnulli Melanthemum, alij Chrysocomam, alij Calliam, Romani Mallium, Aphri Asteriphen appellant. Genera eius tria, tantum flore distantia. Rami palmum non excedunt, fruticosi, alis multis, concaui. Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio aureis, foris fecus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine foliorum Rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur uere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandiq. Potu & infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq. Aduersus inflammationes, & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Locinorum uitia sanant. Decocto earum uesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie Heranthemum uocant. Ea cui Leucanthemo nomen est, item quæ Crysanthemum dicitur, uehementius urinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur. Comanducata, ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur. Teruntur in farinam ad abigendos febrium circumitus. Flores & folia recondi debet, & priuatim tusa, in pastillos digerî. Radix quoq. sicari, dūq. ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo floris aut radicis pars una, modo contra, floris partes duæ & herbæ una, permixtatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in uinomulso diluto.
- D**

Pli. li. 22, ca. 21
The. li. 7, ca. 13

B A R B A R I C O R O L L.

Anthemis, quæ & Leucanthesis uocatur, p ea quæ Chamemilon uulgo dicitur, magnis est ab Asclepiade celebrata laudibus. Theophrastus Anthemon, & Anthemion appellat, quā Dioscorides Anthemida, & Hippocrates (ut arbitror) Euanthemum. Duo genera constituens. Vnū eius, quæ ab radice dūtaxat foliata sit. Alterum quæ caule tm. Desflorere incipit utrūq. cacuminibus, cū ceteræ ab imo incipiant. Flore candido, in orbem medijs herbaceo. Semini colos q. flori. Decidere hoc sicut & spinosis, cōceptaculo inani relicto. Theodorus Anthemō p Melanthio uidetur intellexisse, ut qui Nigellam interpretatus sit. Reponuntur Anthemidis flores in coronamenta, sed collecti uere. Est & saltationis apud Athenæum cuiusdam popularis nomen Anthema, cum illo ioculari numero. Vbirosa, ubi Viola, ubi florens Apium? Vbi hæc rosa? ubi hæc Viola? ubi hoc florens Apium?

E X M. V E R G. C O M M.

In Anthemide hac nulla est ex tam multis appellationibus, quæ non certam & rei coniunctam significationē habeat. Omittimus quas hic ipse declarauit Eranthemum, q. uere floreat: & Chamæmalum, q. pomi odorem habet dici. Ceteræ etiam ex floris colore, odore uel cōsensu aliquarum gentium factæ sunt: quæ ut interiorem, exterioremue floris colorem magis amauerant, sic Leucanthemon a colore albo, aut Chrysanthemon, Chrysocomenue a flauo auri colore eam indicauerunt. Vtroq. enim modo in scriptore hoc legitur. Quemadmodum ab odore Mali quæ habet, Malanthemon. Mali enim florem ea uox significat. Libet his addere a Theophrasto libro de plantarum historia octauo, sæpius genere neutro Anthemon dictam fuisse. Et qui passim in grecis modo leguntur, dodrantes ramuli, in uetustissimis utriusq. gentis codicibus, duorum dodrantum altitudine herbam describunt. Nec multo post, ubi passim legitur, *κλωνία μικρά λεπτά φύλλοια*, legi oportere, non ramulos, sed foliola. Prius enim de ramis actum fuerat, tunc autem de folijs herbæ agendum erat. Indicant id uetustissimi græcorum codices, & antiqua Dioscoridis interpretatio: quorum ope nos quæ miscuerant alij interpretes, redire in sua loca cōegimus: diximusq. foliolis paruis, tenuibus, numerosisq. &c. Cætera in Chamæmalis satis nota per se sunt, ideoq. a nobis longius non tractanda.

De Parthenio. CAP. CLVI.

PArthenium aliqui Amaracon uocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camemelon, alij Chryfocaliti, alij Melabathron, nonnulli campeftrem florem. Romani Solis feculum, aliqui Millefolium, Ethrufci Cautam, Aphri Thamathi. Folij est Coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum cum aceto mulfo, aut fale potum, non fecus atq; Epithymum, & bilem & pituitam detrahit. Suspiciofis prodest, & melancholicis. Herba sine flore a calculosis, et anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad infedendum in duricia uluarum & inflammatio- nibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

PARBARICOROLL. Parthenij flos odorem habet Mali. Nascitur in sepibus: Matricaria dici ea multi putant. Sunt qui Cotulam appellat. Nam & ipse Dioscorides testatur ab Ethrufcis uocari Cautam, unde Caula deducitur, ac deinde Cotula. Sed & Leucanthem, & Tamnacum Plinius hanc appellat. Nisi librariorum menda sit, Tamnacum p. Amaracon scribentium. Nam & Amaracus a Diosc. uocatur: nec aliter a Galeno, atq; Paulo. Celsus apud nos Pallacium. Nam & Amaracus a Diosc. uocatur: intelligit. Ego Celsum de alia Parthenio Muralium dixisse autumio: quæ non in sepibus, sed in muris, parietibusq; nascitur: ob id & Parietaria uulgo nominata, ut in Helxine docuimus. Est & Parthenis pro Artemisia: quanquam sunt qui Artemin legant, non Parthenin, castigando protinus errore medicorum: quæ Parthenion, de qua modo loquimur, Artemisiam esse uoluerunt. Apud Hippocratem quæ sit herba Parthenion cognomento Microphyllon, hoc est, Paruifolia, dubitatur a Galeno: qui Dioscoridem pro Helxine, aut etiam Mercuriali capiedum existimasse scribit. Sed quid si eam pro Artemisia secundo genere Hippocrates intelligit, cuius minuta folia traduntur: aut etiam pro Matricaria, de qua hic agitur, quæ folijs Coriandri describitur?

EX M. VERG. COMM.

Alia hæc Parthenion est ab ea quam Celsus lib. 3. Perdicionem uocari etiam tradit, reprimereq; simul, & refrigerare. Illa Elxine muralis, & Perdicion dicta: hæc pluribus ab Anthemide inuentis appellationibus, similis congenerq; illi credenda est. Illa a Nicandro in Theriacis uenenis mederi prodita: hæc sanandis suspicijs, atræ bili, calculosisq; inflamatibus, duratisq; muliebris locis apta. Hæc Chamemalo similis, flore per ambitum candido, in medio luteo, illa Mercurialis herbæ folijs descripta: & ut longiores simus, notis omnibus inter se diuersæ, solo eodẽ nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine, sed re Parthenion, tam similis Chamemalo, ut pro ea sæpius ab impetis carpatur. Habet enim illi similem paulominus quæ in cunctis florem. Differt magnitudine, quæ in Parthenio amplior undique est. Differt et figura, quæ coloribus in utriusq; flore paribus Chamemali flos in medio tumet, & in altum erigitur: folia uero ad terram inflexa descendunt: in Parthenio folia medio exequata per ambitum stant. Nobis ex his quæ diu obseruauimus, inclinatur animus, Chamemalo cõgenerem esse: & ut in plerisque alijs sit, nota aliqua priuatim ab alijs dispesci, quæ in Parthenio hac uirosus odor est. Quemadmodum in Bo mis oculo, quæ uox dicenda erit, sola magnitudo, qua a Parthenio hac illa distinguitur.

De Bupthhalmo. CAP. CLVII.

Bupthhalmon quidam Cachlam uocant, alij Balsamenam, Magi Hamoran, alij Mercuriij genituram, alij Aphthitis semen, aut Mnesitheum, Romani Cappacoraniam, Aphri Narat. Tenuis emit tit cauliculos, mollesq; folia Fœniculi, luteum florem Anthemide maiorem, oculi similitudine. Unde nomen traxit. Circa oppida nascitur, et in campestribus. Flores cum carato triti, tumores duriciasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptus, colorem

A

παραθίνον

Pli. li. 22. cã. 17
lib. 21. cap. 301

B

Βούφθαλμος

C tractu temporis reddere.

Pli. li. 27. ca. 9.

BARBARI COROLL.

Buphthalmos, siue Buphthalmon, siue ut Hippocrates Buanthemon, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti. Flores huius maiores multo, acrioresq; sentiuntur, q̃ Anthemidis. Differt a Butomo frutice palustri, Orchomenio lacu pluritrio, caule inoffensissimo, peculiari quodā Igore, folio harūdius angulari, fructu nigro, Mali amplitudine, sexu duplici. Mas fecundus, fœmina uiliūm ad nexus uili, Pars ab radice tenera manditur, puerorum cibo grata. Buphthalmon uero eandem esse cum Chrysanthemo uocata, puro, de qua sequenti libro Dioscorid. hæc ipsa repetit. Facitq; quod Alcmæon poeta, Calchan, siue Cachlan, hoc est, Buphthalmon, ita nominat, ut aureum torquem ex huius constare floribus ostendat, χρυσεὸν ὄρμιν ἰκὼν ῥαδιάν πετάλοις κάλλαν. Nicolaus Damascenus, lacum sub Alpes esse scribit. Multorum stadio ruū circuitu, ubi toto fere aīo flores suauissimi odoris & coloris prestantissimi per ambitum uisuntur, similes Buphthalmo. Nō uidetur hæc Buphthalmos esse, quam rustici Bouis oculū, & Corullam cognomento, fœtidam ab odore appellant, pratenfam herbam, q̃ eius candidi flores sunt, Buphthalmi uero lutei, ut Dioscorides & alij restantur: etiam si cætera satis cum ea congruāt. Est & alia Buphthalmos, de qua in Cucumere syluestri diximus. Buphthalmon Dioscorides & Hæluron dici meminit. Ego & Hælurion uocari quandam stirpem lego apud Photionem: diuersa, nec ne sit, haud constat. Porro Hæluos animal est, quod nos Felem appellamus, uulgo, ut qdā interpretantur, Cartus: quod & Aegiluros quoq; dicitur a poetis. Inuenio & Chalcan uocari purpurā, & herbę genus, quo purpura tingit, apud Photionē grammaticum.

E X. M. V E R G. C O M M.

Quæ Solis oculū Parthenion uocari causa fecerat, per ambitū floris radiata folia, & in medio discus colore luteo, eadē similē illi Buphthalmon nominari fecit. Figura floris em̃ in utraq; paulo minus q̃ eadē: sola magnitudo discrimen facit. Eamq; ob causam, nomen hæc sibi a maiore maioris quadrupedis oculo inuenit, Bouisq; oculus dici uoluit: & si a magnitudine oculi simpliciter potius dictā forte aliquis non male credat, præsertim dicente hoc ipso simpliciter esse ὀφθαλμοειδῆ, quod tantum figura & specie oculi significat. Plinius tamen, 25. uolumine, capite, 9. his uerbis eam descripsit. Est & Buphthalmos similis bouis oculis, Quem nos secuti, Bouis oculum interpretati sumus.

Pæonia mas, siue Glycyfide, Græcis aliquibus Pentoboron dicitur, alijs Orobælion, quibusdam Orobax, alijs Hæmagogon, alijs Pefgeden, alijs Monogeniō, alijs Meniō, alijs Pgoniō, alijs Panthice ratos, alijs Idei Dactyli, alijs Aglaōphotis, alijs Theodoniō, alijs Selenion, Magis Selenogonō, alijs Phthifis, Romanis Casta. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitātibus multis stolonibus. Huius duo gña, Mas folia luglandis habet. In fœmina uero Smyrni morē diuiditur. Summo caule siliquas emittit uelut græcas nuces. In quibus quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherant, ut in Hastula regia. Fœminis a partu non purgatis, sicca radix datur. Ciet menses nuncis græcæ magnitudine pota. Sic uentris doloribus cum uino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicę dolores. Decocta in uino, aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem; uel duodecim pota in uino austero & nigro. Stomacho & erosionibus eius esse prodest. A pueris pota, initia calculorum eximunt.

ὀφθαλμοειδὴς
παιονία

De Pæonia. CAP. CLV III.

Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulua strangulationibus, & matricis doloribus, quidecim numero pota, in aqua mulsā, aut uino. Nascitur in altissimis montibus, & promontorijs.

V B A R B A R I C O R O L L.
Etrusissima inuenta Pæonia est, auctorisque nomen retinet. Theodorus apud nos Dulcissimam uocauit: quia Glycyfidem Græci quoque dicerent. Nascitur opacis, syluosisque montibus, Caule palmorum duum. Inuenio & digitorum quatuor, ab eodem Plinio descriptā, cute Lauri subrutila, agnascentibus duobus, aut tribus, ferente in cacumine, uelut amygdalis quatuor aut quinque, folio nucis pinguiore, rotundioresque ac minore. Inherent & radicibus maris glandulae, sed plures quæ octo: quoniam non una radice nituntur. Fœminæ folia myrrham redolent, & densiora sunt. Radices, fructusque legi noctibus præcipiunt: quia Picus Martius interdum facere dicitur impetum in oculos: alioquin effodientibus radicem Pæoniae, sedes procidit, si Theophrastus credimus. Conficitur id ad uenditationem rei Plinius existimat. Hanc & Ephalium uocabant antiqui, ut pote contra suppressiones incuborum, fauorūque nocturnas ualentē. Seleucus Glycyfidem, pomi genus, specie sic tradit, quod mulieres maxime deuitent, insatiationis metu. Ita enim μεταίμεν interpretor. Glycyliða porro dicta est Pæonia, quæ acinos Mali punicī similes habere uideatur. Nam Sidan, Malum punicū a Boëtis uocari, supra docuimus.

Pli. li. 27. ca. 10

E X M. V E R G. C O M M.

V Num Pæoniæ genus tantum tradidit Theophrastus libro. 9. de plantarum historia, quo lo eo, nisi a Plinio ipsam uerbis redditum esset, quod ab eo traditur, non diceremus. Id huiusce modi est. ἀλλὰ τὰ ταῦτα ἕως ἐπίστα καὶ πόσῳ. οἷον τῶ πικριανὸν οἱ δὲ γλυκύδιον καταῖσι νύκταρ κίλινον ἐρῶντι, ἰὰν γὰρ ἡμέρας, καὶ ὅθῃ τις ἐπὶ ἀρυκελάπῳ τὸ πῶ καρπὸν ἀπελῶν, κινδυνεύει τὸ ἐφθαλμοῖς. Quorum sensus sit, ut Plinius etiam reddidit (uerum adiiciuntur hæc, & ex longinquo) Quemadmodum Pæoniam, quam Glycyfidem uocant, noctu effodi iubent: quoniam si per diem fodiatur, uideaturque Picus aus, qui semen legit oculis periclitatur. Vidimus nos, renascentemque aliquot annis utramque Pæoniam obseruauimus: & ex his, quas habebant ambæ præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina, nihil scriptoris huius historię aptius respondere uisum est.

B

De Lithospermo.

CAP. CLIX.

L I T H O S P E R M O N alij Aegonychon uocant, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalitin, alij Diosporon, Romani Columbam; Daci Gonoletam, alij Heracliam. A seminis duricia nomen accepit. Folijs est Oliuæ longioribus, & latioribus. Iacent humi, quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, duricia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo poto, calculos frangat, pellatque urinam.

B A R B A R I C O R O L L.

L ithospermon, herba quincuncialis, fere folijs duplo maioribus quæ Rutæ. Gerit iuxta folia singulas ueluti barbulae, & in earum cacuminibus, lapillos uelut aurificum arie, inter folia eius alternos, candore & rotunditate margaritarum: ipsi qua pediculis adhæreant, cauernulas habent, & intus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta: lacere, atque humi serpere auctores tradunt. Plinius uisum, non hærentem uidisse meminit. Hanc a Theophrasto Diospyron, quasi Iouis triticeum appellatam arbitror, ut in Ceraso commonui. Lithospermon, & Aetonychon, nonnulli dixerunt. Est & alia Lithospermon, nihil à supradicta differens: nisi magnitudine: ut quæ non serpat, sed arbuti modo fructet.

Pli. li. 27. ca. 11.

E X M. V E R G. C O M M.

T heophrastus Diospyron inter segetes nascentem herbam, aut hanc, aut huic similem indicat. Fecit eadem soliditatis ratio, ut Herculeæ etiam diceretur: facili inuētu herba: tamque certis

M. iiij

C notis, ut nullibi legentes possit fallere. Nos sæpe uidimus, sed multo minore semine, q̃ Plinius tradiderit: qui libro. 27. capite. 10. magnitudine Ciceris semina eius describit. Quæ aut̃ nos uidimus, magnitudine grandioris Milij erant. Cætera eadem illi & naturæ sunt. Nec quicq̃ felicius in descriptione eius a Plinio dictum est, q̃ cum dixit: tantus est decor, uelut artificum arte inter folia indicantibus margaritis. Illis enim duricia, læuore, rotunditateq̃ optime comparata fuerunt. Color tamen liuescens in his feminibus est: qui in margaritis candidus passim uidetur. Sed hæc terræ, cœliq̃ bonitas uariare facile potest.

P **De Phalaride.** **C A P. CLX.**
Halaris cauliculos emittit, quales Zea, e minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos. Semen candidum, oblongum, Milij magnitudine. Tunditur, & in aqua, aut uisno succus ad uescicæ cruciatus utilissime bibitur. Semen cochleari mensura potum, ad eadem efficax est.

P **BARBARI COROLL.**
Halaris, caulem habet longum in summo flore, qui spicaceus a nobis uisus est, inclinat, semen simile Sefamæ.

O **EX M. V E R G. C O M M.**
Stenderunt nobis herbarij aliquando uno tantū culmo magis q̃ caule, aut calamo, ex terra surgentē Phalarim. Verioremq̃ Plinij q̃ scriptoris huius historiā fecerunt: qui thyrsum habere tenuem, longū ceu calamū eam ait. Hic tamē numero multitudinis καυλία πολλά, quod est, coliculos multos illi tribuit. Cætera omnibus eadem erant. Erant & in ea quam uidimus folia alternis hinc & hinc per interualla toto caule disposita: & in summo ceruleus spicatus flos, sed raris in spica illa floribus.

D **De Rubia.** **C A P. CLXI.**
Rythrodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnabarim, Latini Rubiam, Ethrusci Lappam minorem, Aegyptij Sophobi uocant. Radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte prouenit. Altera feritur, ut in Thebana Galileæ, & Rauenna Italiæ. In Caria inter oleas, ut in aruis solo creditur. Hanc non sine quæstu ferunt. Namq̃ maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi, Aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo maiores. Folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematuruit nigrum. Radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciēt. Qua de caussa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsā. Item Ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamq̃ urinam pellit, nonnunq̃ & sanguinem. Bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsum, succum ex uino bibere prodest. Semen ex acetopotum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus; menses, secundasq̃. Albæ utiligini, illita ex aceto medetur.

E **BARBARI COROLL.**
Rythrodanum, & Ereuthodanum dicitur, folium Hederæ, sed rotundius, serpit humi, ut gramen, locis umbrosis conspicienda, quinis per genicula caulium folijs. Laudatissima Italica, & maxime suburbana, & omnes pene prouinciæ scātent ea. Radice amara, & Anchusæ modo rubicunda, uelleribus tingendis, & pellibus persciendis utili, præsertim Italica, ut Democrito placuisse dicunt: ob id a quibusdam appellata Byssos. Cæterum Byssos proprie Lini genus est, de quo Plinius. Honor inquit proximus Byssino, mulierum maxime deli-

ens, circa Elin in Achaia genito, quaternis denarijs stipula eius permutata quondam, ut auri. Pausanias, Byssus inquit, non alia Græciæ parte nascitur, q̃ in Elide, tanta tenuitate, ut ne Iudaicæ quidem Byssus cedat: etiamsi colore minus ruffet, q̃ Iudaica. De Byssu Iudaica pleni sunt sacrarum literarum codices.

EX M. VERG. COMM.

Vestigal rustice plēbi non contēnendum, tota Ethruria, Florentinoq; præsertim agro ex non multo tempore Rubia est: noueruntq; eam pueri oēs per hyemē, quo tempore a rustico omni alio opere cessant, radices eius paruo ligone in sepibus eruscantes, inuentasq; & effossas tingendis lanis utiles uendentes. Radices eam lanariæ officinæ simpliciter in gente nostra uocant. Reliquū uero uulgus, q̃ asperitate sua tractata manibus picis modo hareat, manus Piceantē noiant: nihilq; modo notius est, in sepibus, & ut passim uidere licet, umbrosis locis ubiq; nascentem. A rubore radices, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi nomen est. Quemadmodum & a latinis ob eandem causam Rubiam dici rationari facile est.

De Lonchitide.

CAP. CLXII.

Lonchitis, quæ Cestron, aut Medusa alio nomine dicitur, latine Venerea, aut Lanceola, folia habet latioris Porri, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrā procumbentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis personis similes, nigri, & uelut e rictu albam exerentes linguam, quæ ad labrum inferius semen promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi cognomen tum arrogauit. Radix Dauci. Nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet.

BARBARI COROLL.

Lonchitis, non ut pleriq; existimauerunt, eadem est quæ Xiphion, & Phasganion, q̃ se mine cuspidaceo, radicibus prælongis.

EX M. VERG. COMM.

Gregius & speciosus Lonchitidis huius flos est, & qualem hic describit in uerso pileolo similis, colore in purpura nigrō: qui theatralis laruæ, & histronicæ personæ rotunditate sua formam referat: ex cuius medio, quasi ex aperto & hiantē ore, candido colore se profert, ueluti lingua. Ob quam causam aliqui Medusam, & florem, & ex eo plantā dixerunt, Gorgonis desecto capiti similem. Qua specie in antiquis monumentis, monstri eius caput adhuc uidetur, q̃ maxime potest aperto ore linguam exerens. Cur autē Romani Veneream dixerint, non satis certum nobis est: nisi forte folijs Acoro, quæ Venerea dicitur, quādamtenus similis hæc sit. Quemadmodum quodam latius seminis, aut fructus Porri hic dicat: cui Lonchitidis folia a principio statim comparat. Nullum enim huiusmodi Porri genus in plantarum historia, aut medica materia auditur. Nisi forte capitatum ea uoce intellexisse oporteat.

De altera Lonchitide.

CAP. CLXIII.

Altera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin, Latini Longinam, aut Calabrinam dicunt. Folia Scolopendrij emittit, sed asperiora, maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prædest. In eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

De Althæa.

CAP. CLXIIII.

Althæa, quā alij Althiocon, alij Ibisū uocant, in syuestriū Malua rūgnē est, cui folia ut Cyclamīno rotūda, lanugine canescūt. Flore rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, intus alba. Althæa appellat, q̃ inter primas sit utilis, et plurib. polleat remedijs. Decocta em̃ in uino, aut aqua mulsā, in potu efficax ē cōtra uulnera, parotidas, abscessus, māmariū

A

Λογχιτις

Pli. li. 16. ca. 8
lib. 25. cap. 11.
B

τραχυτέρα
λογχιτις

αλθαία

Conflāmationes, attritus sedis, inflatiōes, neruorū rigores. Siquidē discutit, & excoquit, rumpit, et ad cicatricē perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uuluae inflāmationes, p̄clusionesq; in p̄ssis subdita. Decoctum eodem fungitur munere. Onera uuluae, reliquiasq; a partu extrahit. Decoctae succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccūq; tritum, uutiligines in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo peruncti, a uenenatis non feriunt. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesparum, apum, similibumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus & igni ambustis illinuntur. Constat, aquam trita radice addita, sub diuio addensari.

B A R B A R I C O R O L L.

Medicī Althæam uocādo, ut Theophrastus inquit, Maluam syluestrem intelligunt, ab excellentia effectus. A quibusdam Aristalthæa dicitur, Anadendromalache a Galeno. Item Hibiscus, siue Ibsiscus. Quod Plinius Althæam ab Ibsisco separauit, in medicinæ usu. Ibsiscus inquit, a Paltinaca gracilitate tantū distat: damnatus in cibis, & medicinæ dumtaxat utilis: quā Græci μαλάχην inquit ὑρίαν uocant, & aliqui Pistolochiam. Althææ folium Maluæ a Theophrasto redditur, sed grandius & pilosius, cauliculi molles, flos luteus, radix alba, neruosaq; semen Maluæ, gustus quoq; caulium, ut Maluæ.

E X M. V E R G. C O M M.

Dihil Althæa græcis aliud est, quā si a medendo Medicām simpliciter dicas: quibus ἁλτήν in medicina pharmacum, remediumq; & ἁλθαίνει uerbū inderi est. Nec aliter in Theriacis suis Nicander ἁλθίντα aliquid sæpe appellat. Hanc Palladius in Octobri mense Hibiscum dici, his uerbis testat. Althæe, hoc est, Hibisci folia, &c. Vtiturq; ea, ut uerbis eius utamur, ut ex molli forte uinum fiat. Theophrastus syluestrem esse Maluam libro. 9. de plantarum historia confirmat his uerbis. ἡ δὲ ἢ ἢ ἁλθαίαν ἑκείνην αἱ μαλάχην ὑρίαν καλοῦσι. Quod est. Et eam quam hi Althæam, illi uero syluestrem Maluam appellāt. Galenus Anadendromalachen uocauit, quasi arboream, siue arborecentem Maluam. Plinius diuersis locis. 19. 20. & 21. uoluminibus, plura Maluarum genera describens, non satis certam earum historiā tradit. Nos Græcos, & hunc præsertim scriptorē secuti, præcipua duo Maluarū genera fecimus, alterū secundo, alterum tertio hoc uolumine tractatū. Non ignorantes, hæc ipsa a quibusdam iterum diuidi, & in utroq; genere satuiam, & sponte sua nascentē numerari. In priore illa hortensem, qua in cibis pro oleo uterentur, & locis incultis nascentē: ut tunc in Maluæ cōmentationibus nostris longius diximus. In posteriore hæc syluestrem esse, quæ duabus illis undiq; procerior sit, altiusq; a terra erigatur, & in hortis consita arborefcit, multoq; maiores flores, nec minore ambitu Rosarū profert. Verūtamen quæ artificio & opere humano meliorescunt, diuersi generis ob id censenda non sunt. Descripsit Althæan hanc Theophrastus eodem libro. Quodq; in nullo Maluæ flore, quod hæcenus ipse uiderim, aut ab alijs audierim, luteum illi florem dedit. Nec nos scimus, quomodo naturæ, & alijs scriptoribus in Malua color illi respondere possit. Ostendit quotannis in omni Malua natura inter ruborem & purpuram splendētē florem. Hic etiā Rhodoides, quod est, Rosæ simile dicit esse, necq; ad formā magis, quā ad colorē referri id oportet. Quo fit, ut peritoribus dirimendā inter Theophrastū, scriptoresq; alios tam grauē litem relinquamus.

¶ De Alcea.

C A P. CLXV.

Alcea

Alcea syluestrium Maluarum generi assignatur. Folia habet diuisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice canabino uestitos. Florem Rosæ, paruum, radices albas, latas, quinque

aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dy- A
sentericis, ruptisq; medentur.

B A R B A R I C O R O L L.

Alcea caulibus foliosis. Nascitur in pingui solo, nec secco: quam & Perisereon cognomi- Pli. li. 19. ca. 5.
nant, a similitudine foliorū, ut conijcio. Ipsam quoq; Leonis caudam, qua multum pollet a- lib. 20. cap. 15.
nimal id Homero, Catullo, & Plinio testibus, appellant Græci Alceam. Differentia in eo, ut
quibusdam placet, q; herba diphthongum non habet in penultima. Dicitur, & Cercis cauda
eius, Qz q; & herba quædam Cercis est, e qua radij fiant textoribus, unde & nomen.

E X M. V E R G. C O M M.

BReuis in antiquis græcorū medicis Alceæ huius historia & medicina est. Nec Plinius ali-
ter a Dioscoride lib. 27. capite. 4. de ea agit. Nos etiā, quod illi adijciamus, non habemus. Illud
tantū tacuisse nolumus, in antiquissimis latinis codicibus coniunctā superiori hanc esse, unoq;
capite de utraq; agi. Quod fecisse congener earum natura uidetur.

De sylvestri Cannabe. C A P. CLXVI.

Sylvestris Cannabis, quam aliqui Hydrastinam, Romani Termi-
nalem uocant, uirgas fert Althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiuæ, nigriore & asperi-
ore, flore Lychnidis, subrubro semine, & radice Althææ. Decocta radix,
illitu inflammationes mulcet. Tumores discutit. Tofos articularū dissi-
pat. Huius cortex, torquendis funibus accommodatus;

καρυάτις ἀγρία

De satiuæ Cannabe. C A P. CLXVII.

Satiuā Cannabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij Aste-
rion appellarunt, plantam magni in uita usus, ad robustissimos fun-
nes faciendos. Folijs mali, graui odore, caulibus procæris, inanibus, se
minerotundo. Quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea re-
cente, conuenienter aurium doloribus instillatur.

B

B A R B A R I C O R O L L.

Fynes Cannabini præferuntur in secco, ferulacei generis. Hæc herba optima Alabandi-
ca, plagarum usibus præcipue. Tria ibi eius discrimina. Improbatur cortici proximum, aut
medullæ: Laudatissimum est e medio, quod & Mesa uocant. Secunda commendatio Mi-
lase: nam quod ad proceritatem attinet Rosea, agri Sabini arborum altitudinem æquat. Se-
ritur a fauonio ubiq;. Quo densior, eo semen eius, cum est maturum, ab æquinoctio autu-
mni defringitur, & sole, aut uento, aut fumo siccat. Ipsa Cannabis, post uindemiam carpi-
tur, & lucubrationibus decorticata purgatur. Varro, Gellius, & Palladius, Cannabum, non
Cannabim appellant. Sane Cannabus, græce lignum illud gracile significat, in quod pileum
uisilibus, aut centonibus intexitur, ob id Samyrionē poëtā itatis Cannabum uocabat, pro-
pter macilentiam, ut inquit Pollux.

Pli. li. 19. ca. 9.
lib. 20. cap. 25.

*

De Anagyris. C A P. CLXVIII.

ANAGYRIS, quam aliqui Acopon, alij Anagyrion, alij A-
gnacopon uocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs
Agni, uirgisque, flore oleris. Semen in corniculis non breuib; gignit,
subrotundum, firmū, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit per
messes. Tenera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hæreat, & secun-
dæ, mensesq; morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic & su-
spiriosis dantur, & cōtra capitis dolores in uino. Difficulter parientibus
adalligantur, ita ut a partu statim auferantur. Radicis cortex con-

ἀνάγυρις
ἀνάγυρος

Coquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum, uomitiones uehementer ciēt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli.li.27.ca.4.

ANagyris, odore tetro prouerbium peperit, contra eos, qui offutura sibi cōmouent. Dicitur & Anagyros. Hanc sunt, qui a Plauro Nauteam uocari putent in Asinaria, sed auctorem non habent. Nauteam porro herbam grauem esse scribit Festus, qua coriarij utantur: a nauīdētām, quasi nauſeam.

E X M. V E R G. C O M M.

Foret Maio & Iunio mensibus grato inter alios frutices per syluas spectaculo Anagyris: multoq; flore, quem flauum ex longinquo ostendit, prætereuntium oculis facile in se conuertit: & si abesset ingratus odor, quo merito spretus, damnatusq; est, antiquorum coronas primus nobilitasset. Fruticosa stirps magis q̃ arbor est. Nos tamen uidimus tonsura, putationeq; coactam ad legitimam arboris altitudinem crescere: nullumq; florente ea lætius spectaculum, aut syluæ, aut agri, si forte conſita in eis fuerit, ostendunt. Respondent naturæ omnia, quæ in historia a Dioscoride illi tribuuntur.

¶ De Cepæa.

C A P. CLXIX.

κίπρις

CEpæa Portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus, opitulantur. Maxime id præstat, si cum decoctio radicū Asparagi bibatur.

B A R B A R I C O R O L L.

CEpæa, quasi hortensianam uoces, radice nigriore q̃ Portulacæ inuili. Nascitur in litoribus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius, etiamsi deprauata in eo habetur lectio.

E X M. V E R G. C O M M.

DHortense olus Cepæam esse, uox ipsa, & Portulacæ similitudo indicauit: & si Plinius libro 26. capite. 7. in harenosis litoribus nasci tradat. Nullibi in græcis, præter q̃ in scriptore hoc de ea legisse memini. Non potest incognita aliter a nobis describi: eapropter qualem in græcis inuenimus, eam legentibus tradimus: illud tantum monentes, scribere Plinium quæ ab hoc non dicuntur, nigriore radice q̃ Portulacæ esse, eaq; inuili: & præter id gustu amaram, simpliciterq; cum Asparagi radice uescicis plurimum prodesse: & præter Plinium, Paulum Aeginetam stillicidijs uescicæ utilem dicere: uerum non omnibus, sed his tantum quæ sunt, ut ille ait, in τῇ ἐκφράσει, id est, opplente urinæ iter obice aliquo.

¶ De Alismate.

C A P. CLXX.

ἄλisma

ἀλμωδώνιον

ALisma, alij Alceam, alij Damassonion, alij Acyron, alij Lyron appellant. Folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, connexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus Thyrsi. Flore tenui, candido, palleſcente, radicibus tenuibus, ut Veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus. Aquosos amat tractus. Rarè dixi si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem maris num deuorant, aut a rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt. Torminibus, atq; dysentericæ, per se, aut cum pari modo Dauici, potuida tur. Conuulsis & contra uitia uulvæ prodest. Hærbæ sistit aluum. Menstrua pellit. Tumores illitia mitigat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli.li.27.ca.01

ALismatis, siue Damascenij huius folia magis laciniosa, q̃ Plantaginis uidentur. Alioqui similiter uenosa, radicibus densis. Alterum genus eiusdem in syluis nigrius, & maiori-
bus folijs. Plinius hanc herbam uidetur quodam loco appellasse Caucalin: sed mendosam in eo lectionem monstrauimus.

DAmasoniū Plinius, 26. uolumine, capite qnto Alisma appellat: & si corrupta illic ea uox sit. Idem, 25. capite, 9. eandem Alisma uocat: additq; Dartiasonion & Lyron uocari, eandem ap-
pellationem ceteris modo preponens, modo subiiciens, nec alijs notis q̄ Diosc. eam descripsi-
t. Quod tñ hic *supra* dicit, quæ uox thyrsi figurā tñ significat, ille capite thyrsi ait, duo breuius for-
te cōplexus q̄ exigeret sibi rei non satis nunc certę intellectus: & thyrsi formā in caule eius, &
in summo caule capitulū. Thyrsum autē hic intelligit uirgam potius q̄ hastā frōdibus uestitā: quæ
in orgijs & cœtu Bacchi a comitibus eius gestaretur. Nos etiā quod a Diosc. torminibus & in-
testinorū torminibus cum pari Dauco prodesse Alisma dictum est, cum pari semine eius dixi-
mus ex eodem hoc scriptore, qui in Dauco semine tantū eius utitur contra tormina.

De Onobrychide. CAP. CLXXI.

Onobrychis, quam e Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschas-
menem, alij Corion, alij Chamapityn, Romani Opacam, alij
Brichilatā, alij Loprā, alij Iocinalē, Daci Aniaffexe appellāt. Folia habet
lentis, lōgiora paulo, caulē dodrantalē. Florē purpureū, Radicē paruā.
Nascitur in uliginosis. Hærbā suapte uī, si trita illinaē, tubercula diffi-
pat. Cum uīno pota, strangurias sanat. Illita ex oleo, sudores mouet.

BARBARI COROLL.

Onobrychis, radice grādli nascitur circa fontes.

EX M. VERG. COMM.

Nihil in Onobrychidis hystoria Dioscoridi Plinius addidit, isdem notis & uerbis, 24. uolu-
mine, cap. 16. eam describens. Nihil etiā in medicina Paulus Aegineta, aimboq; ex hoc scripto-
re tñ eam tradiderunt. Neq; ex tam multis eius appellationibus, unam saltem cōmentarijs su-
is adiecerunt. Ex eo conijcere licet, nouas esse omnes, & ex similitudine adiectas illi pro tempo-
re fuisse. Nec nos quod pro cōperto cōstituere de ea ualeamus. q̄q; habemus. Herbarij q̄ aliqui
nobiscū egerunt, uicinitate nominis decepti, cū Onochile, quæ ab asinorū labris dicta est, mis-
cent: quemadmodum in Anchusis quarto uolumine non multo post patebit. Si uocis rationē
nouisse aliquis amet, nihil q̄ alini rudimentum Onobrychis significabit. Verum ut paulo ante dixi-
mus, nihil neq; ex hac, neq; ex alijs causis de re & nomine pro comperto nobis est.

De Hyperico. CAP. CLXXII.

Hypericum alij Androsæmon, alij Corion, alij Chamapityn
appellant, quoniam semen odore resinam imitatur. Surculaceo
frutice, dodrantali, rubente. Folio Rutæ, flore albæ violæ simili, qui dis-
gitis tritus, sanguineū succū remittit. Quæ ex causa Androsæmon cō-
gnominat. Subhirsuta siliquā, et tereti, hordei magnitudine, semine in-
tus nigro, resinosi odoris. Gigniē in cultis & asperis. Vrinam cit. Men-
strua pellit appositū. Tertianis, quartanisq; cū uīno potū liberat. Semen
xxx. dieb. haustū, ischiadicis medet. Folia cū semine illita ābusta sanāt.

BARBARI COROLL.

Hypericon, frutex est oleaceus et tenuis, acri odore, cubitali, nigro semine, cū hordeo matu-
rescente, ut Plinius demōstrat. Caput hoc ad uerbū in syluestri Ruta supius a Diosc. repetitur.
Breuitati consulentes, monemus solum duo Hyperici genera facere Pliniū lib. 26. ca. 8. Pri-
mū hoc qd Corion uocari ait: & quartum in hoc ordine, quod mox a nobis tradet Corin-
dici, ab eo traditum: contra ea quæ a scriptore hoc docentur: dicente palam Ascyron Hyperici
genus esse, & Androsæmon ab Hyperico & Ascyro differre tantum, &c.

De Ascyro. CAP. CLXXIII.

Ascyrum, quod a quibusdam Ascyroides nominatur, Hyperici
ci genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens

ὄνοβρυχίς

B

ὄνισκον
ἀνδρῶσαιμον

Pl. li. 26. ca. 8.

VERG.

ἀσχυροειδής

C ramos, rubētia folia, tenuia. Flores luteos, & fructum resinofum, Hyperico non abfimilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androsæmum uocauere. Vfus feminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario, biliofa recrementa ampliffime detrahit. Sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur et ambustis efficaciter.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.

A Scyron, & Ascyroides similia inter se sunt, ut inquit Plinius, sed Ascyron maiores habet ramos, Ascyroides uero ferulaceos, omninoq; rubentes. Semen utriq; in caliculis nigrum, pusillum. Comæ Ascyritæ, uelut cruentæ apparent.

BARBARI COROLL.

Separat Plinius Ascyron ab Ascyroide, duo eiusdem plantæ genera faciens. 27. uolumine, capite quinto. Describitq; priuatim & ex proprijs utranq; notis. Hic tamen unum, quod bisaria uocetur Ascyron. f. & Ascyroides esse tradit. Nec alibi, quod haftenus inuenierim, Ascyroides aliquod Dioscoridi est. Plinij tamen historia diuersitatis huius causam indicat. Ait enim ille. Ascyron & Ascyroides similia sunt inter se, sed Ascyros maiores habet ramos, qui Ascyroides uocantur, ferulaceos. &c. Similia inter se Plinius duo hæc ait esse, & sola magnitudine differre: quæ quoniam potest bonitate cœli terræq; fieri, a Dioscoride neglecta est. Vnumq; genus fecit, quod forte ante se herbarij alij duo fecerant: quos secutus Plinius, diuersam ab hoc uidetur Ascyri historiam tradidisse, quæ tamen una in utroq; est.

De Androsæmo. CAP. CLXXXIII.

Androsæmon
dionysias

A Androsæmon, siue ut alij appellauere Ascyron, aut Dionysiasdem, ab Hyperico, Ascyroq; differt: quod furculosum ac tenue sit. Rubentes rami, & folia Rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita, uinoso succo manant. Complureis alas habet in cacumine, in uersus utrinq; digestas. In quibus flores pusilli, lutei, & in calyculis semen papaueris nigri, insigne lineis. Huius comæ trita, resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, biliofa excrementa pellit. Ischiadicis medetur, sed a purgatione aquam exsorbere oportet. Herba ambustis illita medetur. Vulneribus sanguinem cohibet.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 5.

A Androsæmon, non abfimile Hyperico est, cauliculis maioribus, densioribusq; ac magis rubentibus. Folia alba. Gignitur in uineis, fere medio autumnio effoditur, suspenditurq;. Galenus Androsæmon duplex inquit est: Ascyron, siue Ascyroides, de quo supra uidelicet locutus sumus. Alterum Dionysias priuatim appellatum ab aliquibus. Vtriq; par effectus.

De Cori. CAP. CLXXV.

uopio

C Oris, quod aliqui Hypericon uocant, frutex est folio Ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, suauis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit & urinas. Cōtra Phalangiorum morbus ex uino potum auxilio est. Rigoribus ex pipere, opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur. Radix uino decocta, potaq; defectis, opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandū q̄optime coōperiri licet. Si quidē corpus totū desudabit, ex qua re pristina agilitatē recuperabit.

BARBARI COROLL.

C Oris sub Tamarice nasci dicitur, folijs minus rubentibus, leniter aculeatum. Hippocrates Corē hanc uocauit, ut Galenus inquit, argumento feminis, q; Pupulæ similitudinem præsentat: quanq; sunt recentiores, qui Pupulam, siue Pupillam dicendo, herbam a Dioscoride siue appellatam significant.

EX M. VERG. COMM.

A

Vndiq; totoq; corpore rubentē Corin hanc nobis aliquot herbarij ostenderunt. Dico autem undiq; & toto corpore, folijs, ramulis, & florum doliolis. Hic tamen rubere tantum folia ait. Natura Corin rubentem totam fere ostendit, uerum inæqualiter, aliquaq; parte magis: aliquaq; uero minus. Ob quam causam credimus & hunc, & Plinium ex ruboris abundantia, rubere tantum eius folia dixisse.

De Aiuga. CAP. CLXXVI.

GRæcis Chamæpitys, alijs Pitysofrysis, alijs Orizelon, ijs qui Pontum incolunt Olocyron, alijs Bryonia syluestris, Athenis Ionia, Euboicis Sideritis, Magis Mineruæ sanguis, Latinis Aiuga, aut Cypripum, Dacis Dochela appellatur. Herba in terra repens, incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis. Odore Pinus, flore tenui, luteo, uel candido, radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicis sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum uitij. Torminosi profunt. Ea apud Heracleam ponticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum pòntena iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excapta melle cum æris squamma & resina purgat. Apposita ex melle, uulua uitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnera glutinat. Ulcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet.

χαμηλόν

B

BARBARI COROLL.

Chamæpitys, & Aiuga, siue Abiga dicitur a latinis propter abortus. Inuenio et libigam uocari: quod nomen fere seruant hodieque Illyrici, nostrum uulgus luam. Est ubi appelletur, ut inquit Plinius, etiam Tus terræ, tria eius discrimina reddēdo. Vnum sesquipedalibus furculis, flore Pinus, & odore. Alterum breuius & incuruū. De tertio dicemus paulo post, sua mentione. Recentiores aliam Chamæpityn nouerunt, eiusdem (ut ipsi arbitrantur) effectus, folio Saluiae rimoso, angustiore tñ, & ad radicē maiore, flore subcādido, ac luteo, e folliculis schæreg. i. cristæ gallinacæ similibus, sapore Pinus, in maritimis mōtibsq; nascentem, nigro semine: quæ non serpit. Chamæpityn Athenis, alijs Dionysiam, alijs Didoniam, alijs (qđ uerius existimo) Ioniā uocari scribunt, ut Apollodorus, & Athenæus. Item alijs Holocyron, ut Dioscorides, & q̃s mō nominauimus. Alijs Holoderon, ut Paulus. Credo libariorum culpa uariatū fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est. Nicander Ionida quandam herbam nominat, fortasse Chamæpityn significare uoluit, pumilam & humilem eam dicendo.

Pli. li. 24. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Plinium imitati ante nos interpretes alijs, quocūq; loco nos Piceam in hoc capite diximus, ubiq; Pinum dixerunt. Ille enim. 24. uolumine, capite. 6. Chamæpityn describens, flore Pinus, et odore esse dixit. Idem non multo post Pityusam pariter describens, Frutex est similis Piceæ ait, eandem in duobus nominibus græcorum Pityn diuersa interpretatione ostendens. Per cuius uestigia ingressus Barbarus, eadem uarietate quam Pityn primo uolumine Piceam dixerat, hoc loco Pinum dixit. Nobis quod semel primo uolumine dictum probatumq; fuit, serua re hoc loco etiam placuit: potenter cupientes ex nostra Piceæ commentatione causas, rationesq; nominum huiuscemodi cognoscere. Quia Piceam olent folia eius, Chamæpitys dicta herba hæc est. Quæ etiam causa fuit, ut Tus terræ uocaretur: qm̃ totius Pinorum generis resina Tus olet; hæc autem Piceam. Triplex Chamæpityos huius genus est, diuersis inter se partibus alijs, sed eodem Piceæ odore: ob quam causam creuerunt per tempora tam multæ eius appellationes, alijs plantis, alijs eas comparantibus herbarijs, & ex his, illisue notis eas describentibus.

N ij

C ¶ De altera Aiuga. CAP. CLXXVII.

Alterum est genus Aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc Pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspo, cādido, luteis florib. semine iuxta alas. Resipit hæc Pinū. Vīm eandē obtinet, sed nō usq̃ adeo efficacem.

BARBARI COROLL.

DE Chamæpitye secunda dictū est in prima.

¶ Chamæpitys tertia folijs scabris, caule digitalis crassitudine aspicitur.

¶ Finis LIB. Tertij.

PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quartus,

IO. RVELLIO interprete.

D



N superioribus libris, amātissime Ari, tradidimus de odoramentis, oleis, arboribus, unguētis, animālibus, frumentis, oleribus, radicibus, succis, herbis, seminibusq̃. In hoc autem Quarto differemus de radicibus, & eis quæ restant hærbis.

¶ De Betonica. CAP. I.

κίσρον
ψυχότροπον

Cestron Psychotrophon uocatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Hærbæ est, caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiore, quadratū, folia Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicē maiora. In fumis caulibus, semē uelutī Satureiæ spicatū inest. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nitē ut Veratri tenuibus. Quæ ex hydro melite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus uulue malo opportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, drachmæ unius pōdere cū hydromelite. Tres in uini sextatio drachmæ, contra serpentū morsus ebibunt. Hærbæ magna utilitate illatis a serpente uulneribus illiniē. Aduersus etiam uenena, drachma ex uino pota conuenit. Præsumpta ea, si uenenū hauriatur, nihil nocebit. Vrinam ciet. Aluum subducit. Medetur comitialibus, & insaniis, pota ex aqua, & iocineris lienisq̃ uitij, drachmæ pondere in aceto mullso. Concoctionē adiuuat, si qs ea fabæ magnitudine secundū cœnā cum melle cocto deuorarit. Modo consimili acide ructantibus, ppinaf.

Stomachicis eam manducare, & succū deuorare proderit, si postea di-
lutum uino sorbeat. Datur sanguinem exscreantibus tribus obolis,
cum dilutū uini, aut lactis cyatho. Ischiadicis, renum & uescicæ dolori-
bus ex aqua. Aquæ intercutem binis drachmis ex hydromelite. Regio
morbo laborantes recreat, Menses pellit, drachmæ pondere cum uino
pota. Alium purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitīs decem
cyathis. Facit cum melle ad tabem, & purulentam exscreationem. Folia
sicca, tritaq; fictili uase reconduntur.



HERMOLAI BARBARI

Patricij Veneti, & Aquileiensi, Patrlarchæ Co-
rollariorum LIB. Quartus.

Estron a Vetonibus inuentam in Hispania, Betonicam in Gallia nominari cœ-
ptam putant. Alij Chironem, aliq; Comistem, prophetæ Hieracæ, Thusda Indi-
cem, aliq; Pendouiam, Syri Periponion, aliq; Sidentin, aliq; Theriopauon, aliq; *thiay jilay*, hoc est,
radicem diuinam, in Italia Serratulam uocauere. Caulem habet interm cubitorū duum, a ra-
dice spargens folia fere Lapathi, ut Plinius inquit, serrata, femine purpureo, ut idem autor est,
seu stamine purpureo, ut Dioscorides, qui hoc dicit in altera mentione Betonicæ. Fit uinum ex
eā, & acetum medicis. Multum differt specie, non effectu alia Betonica, ut Paulo Aeginetæ pla-
cet, unicaulis, ramulos habens Pulegij, tenuiores, & gustu fatuos, in petrosis fere proueniens.

Pli. li. 25. ca. 8.



MARCELLI VERGILII

in Dioscoridem ANN Orationes abbreviatæ.

Vod forte desiderauerit aliquis, non relinquemus. A uarietate & copia remedio-
rum Cestron a græcis dictam fuisse, qui multa alia una hac appellatione indicaue-
runt. Telum primo, quod persico bello inuentum fuerit. Opus inter punctum, acue pictum.
Veneris & foeminarum ornatum, & si priuatim Cestos hic dicatur. Libri præterea a uarietate
subiecti, ab aliquot græcis hoc titulo inscripti sunt. Sic etiam Plinius aliquando Ebur Cestru,
id est, picturatum dixit. Latini ab inuentoribus cognominatā Vetonicam semper uocauerūt.

B

De Britanica. CAP. II.

Britanica, aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi, sed ni-
griora, & densiora, gustu adstringentia. Radicem tenuem et bre-
uem. Caulem paruū emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole
cogit. Vim habet adstringentē. Priuatim depascentibus oris, et tonsilla-
rū ulcerib. cōmodatā. Valet etiā ad reliqua, qbus adstrictiōe est opus.

BRITANICA
VETONICA

Britanica, in insulis Oceani, aut in confini Britaniæ Oceano reperta est, folia habens oblon-
ga, nigra, & radicem nigram, succusq; eius exprimitur & ex radice. Florem Vibones uocant:
qui collectus, anteq; tonitrua audiantur, & deuoratus, securos in totum reddebat milites Cæ-
saris germanici a morbis, quos medici Stomacien & Sceletirben dicebant. Siquidem in Ger-
mania trās Rhenum, castris ab eo promotis, maritimo tractu, fons erat aque dulcis solus, quā
pota, dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur: quibus incōmo-
dis in Arabia quoq; Romanas legiones tentatas fuisse Augusti Cæsaris principatus, Helij Galli
ductu, Strabo refert. Sed quærun nonnulli, quamobrem Vibones dicant huius herbæ flores.
Diuinare non ausim. Ceterū Strabo autor est, apud Vibonem in Brutijs repertū, coronis flo-
resnectere, in eum quoq; locum propter flores ē Sicilia migrasse Proserpinā, Propinqua est &
Viboni Petilia: quæ nomen Petilio flori dedit in Lucanis autumnali, et circa uepres nasceti: tū
colore cōmodatā, q est Rosæ syluestris: mirumq; in eo flore inflecti cacumē, nec nisi intorto
folia nasci, paruo calice, ac uersicolore, luteum semen in cludente. Hunc dixi ab oppido Luca-
niæ uideri appellatum. Nisi q̄s a Petilio Romæ lucō, itemq; Petilino altero existimet. Alioq;
Petilus, pro exili capitur Iulillio. De hac itaq; Britanica Dioscorides in præsentī loquitur. Est
& Cantabrica in Hispania, per eundem Augusti tempora a Cantabris inuenta, nascens ubiq;

Pli. li. 25. ca. 9.

Strabo lib. 6.
geographiæ.

C caule iunceo, pedali; in quo sunt flosculi oblongi, uelut calathi, & in his semen per q̄ minutum.

E X M. V E R G. C O M M.

Scelotybe malum, quo Plinius ait compages in genibus solui, Galenus in diffinitionibus suis his uerbis descripsit. Resolutionis genus Scelotybe est, qua recta totus ingredi homo nequit, sed aliquando sinistrum latus in dextrum, aliquando dextrum in sinistrum circumfert, aliquando crus post se trahit, non aliter q̄ ualde acciues locos ascendentes. ¶ Sequitur Britannicam in cunctis fere grecorum codicibus alterum Vetonice caput, superstitiose & imprudenter huic scriptori adiectum. Id in antiquissimis, quos habemus Dioscoridis grecos latinofq̄ codices, nullibi legitur. Nec uerisimile est, post tractatā semel totam Vetonicam, intercedente alio capite, de eadem iterum agendum huic scriptori fuisse. Accedit his quod in plerisq̄ alijs etiam diximus, nihil in hoc scriptore maiestate eius indignius, nec cui minus credere oporteat, q̄ ubi superstitiosum aliquod, & ad religionem nostram pertiniens ab eo docetur. Poterunt legentes quod dicimus, ex his quæ alij interpretes reddiderunt, censere. Nobis non placuit religionem naturæ miscere, & quæ tam longo interuallo distant in scriptore hoc eadem facere. Vana hominum mortalitas hæc primum infert; mox imprudentia & salutis studium excipit exceptaq̄ per manus diu feruntur. Nisi prudentior aliquis, quod sapientes præcipiunt, de genere in genus non transeundum esse alios monuerit.

ΒΥΤΤΟΝΙΚΗ

¶ De Vetonica. C A P. III.

Vetonica nascitur in pratis, & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta. Grauibis somnis resistit. Ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratā, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis uulneribus capitis indita, **D**olorem finit. Vulnura glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum persanescant. Dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Caput hoc, non in omnibus codicibus inuenias. Illud mirum quibusdā, q̄ Plinius Betonicæ folia Rumici scribit similia; hoc Britanicæ Dioscorides assignat, cum Betonicæ querna potius uisantur. Nec illud minus licet mirari, quam obrem mentides duas Betonica meruerit. Nisi quod duo quoq̄ gñæ Betonicæ demonstrata nobis a Dioscoride contenderit. Duas & Paulus Aegineta Betonicæ facies intelligit, effectū parili, ut prædiximus.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΟΥ
ΛΥΤΡΟΝ

¶ De Lysimachia. C A P. IIII.

Lysimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresque, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus, flore ruffo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem supprimit. Dysentericis potui datur, aut infunditur. Mensium abundantiam sistit, in pello. Sanguinis profluuiō subuenit, si nares ea hærbā obturentur. Vulnura cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit. Qua de causā serpentes fugat, & muscas interficit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 7.

Lysimachio, & Lysimachios, & Lysimachia uocatur. Inuenit hæc Lysimachus. Folia eius uiri dia, ramuli erecti, odore graui, flos purpureus, fruticosusq̄, ut Pli. uerbis utar. Vis huius herbæ

ita, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitate cohibeat. Patauij demonstrata nobis est:

A

¶ De Sanguinaria, seu Polygono.

CAP. V.

Polygonum Arrhen, aliqui Polygonatum appellant, alij Cynochalam, alij Heracliam, alij Asphalton, alij Chiliophyllon, alij Clema, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Teuthalida, alij Myrtopetalon, alij Cnopodion, alij Zaritheam, alij Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stemphin, Magi Genituram herois, aliqui Vnguem muris, Latini Sanguinariam, aut Seminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt. Folia Rutæ, sed molliora, planioraq;. Semine sub omnibus folijs turgescente. Vnde marem appellari uolunt. Flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ exsiccationi, cholerae, alui fluxionibus, & urinæ stillicidio. Urinam aperte ciet. Cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horam ante significationes. Foeminarum profluvia impositu sistit. Idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximie ad genitaliū ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus uulneribus folia illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Polygonon, & Caligonon appellatū uidetur à multitudine seminis, propterea Seminalis in latino dicit: quæ & Sanguinalis, & Sanguinaria uocatur. Alij a densitate fruticis, alij a frequentia geniculorū arbitrant. Quidā & Halmada noiant. Inueniunt, qui foeminā esse hanc contendunt, mare aut maiore, minusq; nigrū, & geniculis densiore. Herbarij nullā magis aridā, quæ Polygonon non seruat. Dioscorides Polygonon quibusdā locis uocari tradit Pedaliū. Plautus quidē ita in Gurgulione appellat odoratæ genus herbæ:

Tu Rosa, tu Crocus, & Casia es, tu Pedaliū:

Aut certe unguetū nomē est in ea fabula Pedalion. Forasse uerō hō Pedaliū, sed Bdelliū in poetā eo legeris. Polygonon Actius & *indistinctum*, hoc est, solis herbæ dici meminit, uulgo Centinodia, & Corrigiola. Proserpinacā in Plinio, sunt qui Polygonon accipiāt, dicēte uulgarē herbam esse Proserpinacā, eximij aduersus scorpiones remedij, & lassitudinē, si lingua subiciatur: si deuoret, uomitionē sequi salutarē, ut corrupte legat in Diosc. hoc loco, si opinacā pro Scorpianaca, siue Proserpinaca: quādo utrūq; nomē Polygono tributū uideas in eo libro, qui. L. Apuleij fuisse credit a multis. Illud mirari subit, quod Plinius eodē cap. Proserpinacā, & Polygonon, quasi diuersas herbas demonstrat, & utrūq; ad anginas cōmendat. 17. uolumine.

E X M. V E R G. C O M M.

Sanguinariam Plinius Sanguinalem, Columella græcam Polygonon uocat: ille. 17. uolumine capite. 12. hic libro. 7. capite. 10. Nec fuit Romanis scriptoribus alia nominis ratio, quæ ex uij & usu eius, qui sentientes sanguinē expuentibus, cruentisq; intestinorum terminibus eam mederi, ex meliore hac potestate nomen illi fecerunt. Græci contra, a seminis copia, uel geniculorum, quos habet frequentia, cognosci eam uoluerunt. Vtrumq; enim Polygoni uox significare potest. Siquidem genti illi gonos, genitura, & semen: gonū uero genu, & diminutiuū forma geniculus est.

¶ De Sanguinaria Foemina.

CAP. VI.

Sanguinaria Foemina fruticatino caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus articulorum eminulis, torulisq; cingentibus. Folijs Picæ. Radicis nullus usus. Na-

N unj

πιδύπνον

Pl. li. 17. ca. 12.

B

C scitur in riguis. Huic quoq; spissandi, refrigerandiq; natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

P **B A R B A R I C O R O L L.**
Polygoni quatuor genera Plinius existimat, Marem, & Fœminam, Tertium Oreum, hoc est, montanum, quod & describit eadem forma, qua Dioscorides hic Fœminā. Quartū genus Polygonaton priuatim appellatur: de quo protinus indicandum nobis est.

Q **E X M. V E R G. C O M M.**
Vot quor hæcenus uidere Dioscoridis græcos codices licuit, in extrema capitis huius parte eodem intellectu, & hsdem uerbis ostendunt, fœminam Sanguinalem herbam in cunctis mascula minus efficacem, & ignauiozem esse. Plinius etiā eodem libro & capite, historiam, & medicinā eius tractās, inefficacius q̄ superiora (plura em̄ Polygoni genera ille fecerat) hoc genus esse ait. Solus Paulus Aegineta in. 6. Polygoni uires numerās, contra & his uerbis decreuit. τὸ δὲ δῶν τοῦ ἄρρεος ἰσχυρότερον, quod est, Fœmina aut̄ Mascula ualidior, & efficacior est. Quo fit, ut oporteat, quemadmodū & Plinius indicat, credere diuersas ex sexu Polygoni notas omnibus locis, & gentibus non fuisse easdem, sed uariatis appellationibus, quæ græcis uerbi causa Mascula Sanguinalis erat, latinis Fœmina esset: sicq; diuerso, Plinij, cuius æta re uaga hæc nomina, etiā erant uerba, hac in primo genere sunt. Qui plura genera Polygoni faciunt, hanc Marem intelligi uolunt. Idq; Dioscoridi cōuenit. Mox paulo post. Nemon inueniuntur, qui hanc Fœminā esse dicat: quod Paulo Aeginetæ cōuenit, qui Fœminā potentiorē Mascula dicens, sexus notam hanc, ex aliorum indicatione tradidisse uideri debet. Eamq; ob causam, nihil in huiusmodi, nisi factō prius periculo, certū constitui modo potest: tam multis locis & gentibus res aliquando, nomina autem semper variant.

P **De Polygonato. C A P. VII.**
Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs Lauri, latioribus, & læuioribus, sapore mali Coronei, aut Punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorū exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incæpta a radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ uulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

P **B A R B A R I C O R O L L.**
Polygonaton Diosc. montanū Polygononi, syluestre Plinius intelligit, etiā si descriptio fortasse dissonat in plerisq; Arborēs inq; pene mō fruticat radice lignosa, stirpe Cedri rubicūdo, ramis Sparti, binū palmarū, nigris, geniculorū ternis, quaternisq; articulis, odore quodā, siue gustu fastidiēdo: q̄ ne explicari quidē recte possit, ut Paulus Aegineta scribit, & eo prior Gale.

I **E X M. V E R G. C O M M.**
Nter Polygoni genera, quæ a Plinio plura ex aliquorū historia numerantur, Polygonatos hæc refert. Nobis tamē toto genere differre hæc ab illa uidet̄. Iacet em̄ (quod præcipuū inter eas discrimē sit) & graminis modo per terrā spargitur Polygonus: Polygonatos autē cubitali, & fere semper prociorē caule erigit. Vidimus nōs, quinto, & sexto deinceps foliorū ordinē eam altitudinē surgentē: quæ a radice statim exiguis interuallis, per caule usq; ad summū uirebant laurinis, ut hic ait, similia. Flores ipsi non uidimus. Iampridem em̄ Augusto mense desloruerat herba, quæ nobis prolata est. Nulloq; magis indicio, q̄ radice Polygonatum se ostendebat: quæ longitudine pedali, colore albescente, frequentioribusq; q̄ in gramine geniculis turgēbat. Vtq; coniungere licuit, nihil Polygono cōgenerē multis hanc fecit, q̄ geniculorum par similisq; in utraq; frequentia. Verumtamen, ut paulo ante dictum a nobis est, exceptis his, d̄ uersa in Polygonato, & alia a Polygono cætera nobis uisa sunt.

C **De Clematide. C A P. VIII.**
Lematis Græcis, alijs Phyleterion, ab alijs Daphnoides, ab alijs Smyrnoides, aut Polygonoides appellatur. Læto, pinguiq; solo

πολυγόνατον

Pli. li. 27. ca. 12.

λεματίς

prouenit, iuncos spargens exiguos. Folia Lauri figura & colore, multo minora. Folia cum caulibus in uino pota, alui profluuiâ, & dysenterias sedant. Subdita in pello, cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulnâ medentur. Dolores dentium commanducata finit. Imposita serpentium moribus, iuuamentum prestat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pora optulari. Gignitur solo inculto.

CLEMATIS hac, siue Clematidis Aegyptia cognominatur, quoniam Aegyptus hanc maxime gignat, prælonga, tenuisq; in prouerbiū usq; cessit, *κλεματις αἰγυπτία*, ita nominâdo eos, qui procero & nigro sunt corpore: ut est apud Phalereum Demetrium,

Pli. li. 24. c. 17.

De altera Clematide.

CAP. IX.

EST & altera Clematis, quam aliqui Epigetin, Aegyptij Philaerion, Romani Ambuxum uocitant. Viticulos emittit rubescens, lentos. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. Repit per arbores, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua, aut hydromelitis potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum Lepidiodio conditur ad cibos.

CLEMATIS secunda, siue Clematidis, Smilaci, hoc est, Hederæ Ciliacæ similis effingit, geniculata & ipsa, repensque per arbores. Hanc, aut non dissimile (ut puto) Plinius est ubi Echitein, & Laginen uocant, & tenuem Scamoneam: quia pedales, foliosos, non dissimiles Scamoneæ: ramus habeat, nisi quod minora, nigrioraque sunt folia. Inuenit in uineis, aruisque: parat cibis, ut olus cum oleo & sale. Sic hic frutex, qui Conuoluulus a nostris dicitur, cuius flos Lili rudioris figuræ præbet, ob id & Liliastrum quoque nomen habens: & uulgo etiam Ligustri (quod Ligustrum proprie cyprius est) æstimatur iudicent. Nam & foliū ei pinnatū est, ut Scamoneæ, nec Smilaci dissimile, Volubilis maioris noie. Semē nigrū, triangulū, in folliculis acinorū specie, qui nūero tres habent, in uinetis, aruisque. De hoc Plinius uerba subiicimus. Est inquit flos, non dissimilis Lilio, in herba quæ Conuoluulus uocatur, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candore tantū referens, & ueluti rudimentū naturæ Lilia facere condiscens. Inuenio qui Peridymenton uocent Conuoluulus, atque ita pictam in Græcis codicibus uidi. Sed uera Peridymenton alia est, ut post liquebit. Habetur & Clematis tertia, Centunculus a nostris appellata, rostratis folijs, ad similitudinē capitis penularū, iacens in aruis. Dioscorides & Gnaphalion herbam, Centunculū a latinis dici meminit: quod non habeo compertū, eadē sit, an diuersa Gnaphalion, a tertia Clematide, quādoquidē & medicina congruunt: & apud nos utraq; Centūculi nomē habet. Sciūsus Galeno teste, Dioscoridē hoc loco de prima tantū Clematide locutū: quæ non simpliciter Clematidis, sed Clematidis Daphnoides, aut Myrsinoides, aut Polygomoïdes appellāda esse uideatur. De secunda uero Clematide, quæ & absolute Clematidin uocari tradit, in quarti huius libri sine scriptū esse, non hic existimat. Addidere tamē librarij utroque loco eam, quod & in alijs herbis fecere. Pamphilus duas Clematides in unū confudit. A Galenoque ob id incessitur iure. Idem uidetur & Plinius fecisse, medicinas aliquot prioris, secundæ tribuendo.

B

*

Pli. li. 27. c. 12.
24. cap. 10.

Fuisse quondam plures Clematidas, Plinius manifeste. 24. uolumine capite, 14. indicat. Sed exceptis duabus his, non ueras fuisse Clematidas alias, sed sola uiticularū rōne hoc nomen uenisse, testes in græcis, hic scriptor primū, qui nullā aliam in medica materia stirpem hoc nomine describit: mox Paulus Aegineta lib. 6. his uerbis utraq; describens. Clematis, quæ alij Daphnoides, alij Myrsinoides uocant, uiticulā habet longam crassitudine iunci, quem Oloschænum dicunt: folium uero Lauri. &c. Altera autē quæ arboribus Smilacis Hederæ modō aduoluitur. &c. Fuerunt qui posteriorem hanc Conuoluulum crederent. Cuius flores Lilia candore, & amplitudine æmulantes, certare cum nobilissimo flore uoluisse uidentur: quos etiam Plinius aliquando dixit Rudimentum naturæ esse, Lilia facere condiscens, ubique & omnibus notissimos. Verum ex huius historia, in quarubentes uiticulæ illi assignantur, Conuoluulo conuenire non uidetur, Tacuisse præterea de floribus, qui tam egregia specie in Conuoluulo

VERG.

C florent, aliam ab illo Clematida esse arguit. Nobis inclinatur animus Smilaci congenerem Clematidem hanc esse. Non tamen pro comperto hoc decernimus. Quod autē hic ait, uocari Epigetida, humilem terrestremq; significat, facto a terra, quam Græci *ἐπὶ γῆν* uocant, nomine; quasi terraneā mi dicās, quoniam scilicet nisi alias scandat surpēs, per terram spargitur.

Πολύμωνιον
Φιλετηρίον

¶ De Polemonia.

CAP. X.

Polemoniam alij Phyleteriam, Cappadoces Chiliodynamin appellant. Ramis exilibus, in uersus utrinq; digestis. Folijs paulo q̃ Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ, aut Sanguinariæ proximis. Quibus in summis corymbis dependent, nigro semine. Radice cubitali, albicante, radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus urinæ difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmę ponderē lienosis. Eadem scorpionis plagę alligatur. Tradunt, eum qui radicem gestauerit, a scorpione non teriri, eumq; si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 25, ca. 6.

Polemonium, siue Polemoniā, alij Phileteriam, a certamine regum inuentionis appellatur. Radice crassa, nigro semine. In Plinio & Melemoniu uocari herbam quandam inuenias, uomituris utilem; tamen haud certus sum, ecquid corrupta sit in ea uoce lectio.

EX M. VERG. COMM.

Officiosa certe uoluntas nō deest, urgetq; in Polemonia hac, ut moneamus legētes. Quā hic, & Plinius dixerūt in Cappadocia a multitudine uirum *χίλιον δύνειν*, quod est, mille uires habentem uocari, in antiquissimis Græcorum & Latinorū scriptoris huius codicum, qui mihi sunt, non Chiliodynamin, sed Chelidoniam manifeste legi. Non cōuellenda tamen ob id duorum scriptorum tam certa auctoritas & fides. Ob eam causam & nos ex cōmuni lectione uocem uertimus. Illud contra in dubio est, dissidentq; Dioscorides & Plinius in radicis historia. Hic ait *πυχρίαν* esse, quod est, cubitalem; Plinius, 25, uolumine capite. 6. Polemoniā describens ait, Cappadoces Chiliodynamin uocant, radice crassa; quasi non *πυχρίαν*, sed *παχρίαν* legerit. Nos neq; in græcis, neq; in latinis aliter q̃ cubitalem legimus. Plinius tamē uel sic forte persuasus, uel uocis uicinitate decēptus, pro cubitali, crassam reddidit. Nisi forte, qd hic ait, Lanariæ herbæ radici similem ad crassitudinē ille retrulit. Diximus id, quoniā non parui refert, in deprehendenda Polemonia, cubitalem, aut crassam radicem obseruasse.

Σύμφυτον

¶ De Alo.

CAP. XI.

Symphyton petraeon, id est Alus, nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, Origano similibus, capitulis Thymī, furculosum totum, odoratū, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subrussa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsā, & potum, pulmonis uitia purgat. Sanguinem reiicientibus, & renum malis ex aqua datur. Ad dysenteriam, rubraq; foeminarum profluuiā in uino decoctum. Ad conuulsa uero & rubra, ex aceto mulsō bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat. Faucibus asperis subuenit. Vulnēta recentia, enterocelasq; conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum Symphyto decoctæ cōalescunt.

BARBARI COROLL.

Pli, li, 27, ca. 6.

Symphyton Petraeum, nos Alum gallice uocamus, folijs paruis, ramis tribus, aut quatuor a radice. Nascitur in petris, ideoq; Petraeum cognominant. Symphyto autem Græci nomen imposuere, quoniam cōsolidet. Hanc Veneti Coroneam appellant, ut inquit Plinius, Rosæ radicis, alibi albæ, alibi nigrae.

QUæ est constipandi, consolidandiq; egregia utriq; Symphyto uis, nomen illi in græcis id fecit. In posterioribus autē latinis inconcinne quiderit, sed aperta significatione Consolidam uocari eandem persuasit. Et quoniam duo saltem genera eius sunt. Alterum, de quo nunc agimus, quoniā in petris nascitur, Petræum antiquitas nominauit. Alterum uero simpliciter Symphyton. Iactant tamē præter hæc nostræ ætatis herbarij plura alia Consolidæ genera se inuenisse, quæ medicis, & illis censenda relinquimus. Dioscori idem enim latinū facimus, non omnium aliorū dicta & decreta cōacruamus: præsertim dūo, & hæc tantū gēna Symphyti tractante etiā Paulo Aegineta, qui habere hoc Symphyton ait aliquid, qd incidat, ideoq; purget, quæ in pectore & pulmonibus purulenta concreuerūt: habere etiā aliquid qd adstringat, qua ui sanguinis excreationibus medeatur: habere humiditatē, qua firm arceat: discutere præterea, constipareq; corpora: & ne longiores simus, ex contrarijs aliquibus uiribus constare.

¶ De altero Symphyto.

CAP. XII.

Est & aliud Symphyton, quod aliqui Pecton, Romani Soldagium πικτόν nem uocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, inanem, quasi fungosum: circa quem breuī interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguæ Bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secūdum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & uerbasci semina emicant. Tam caulis q̃ folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, uiscosæ. Quarum est usus. Tritæ et potæ, cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia uulnera illitæ conglutinant. Carnes quoq; si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus, præsertim sedis, cum Sennationis folijs, utiliter illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Hoc Galenus Symphyton mega, id est, magnum cognominat, nec gustu dulce, nec odore, ut superius. Herbarij recentiores tria Symphyti, seu Consolidæ genera constituunt, præter Petræum: quod ne cognoscunt quidem. Magnum, de quo hic agitur. Minus, sed radice inatus & foris alba, fere bulbi effigie rotunda. Minimum; flore in spicam purpureo, ac folio quidem Origanī, ut Petræum, sed in humidis genitum, radice lignosā, superuacua, nec odorata, nec dulci, nec saluam ciente: quæ sunt in Petræo omnia.

¶ De Holosteō.

CAP. XIII.

Holosteon quadrantalē hærubula est, humi repens, folijs uiticulis ὀλόν liscq; Coronopo, aut Gramini proximis, gustu adstringentibus. Radice alba, prætenui usq; in capillamētī speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad rupta in uino potata. Nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

B A R B A R I C O R O L L.

Holosteu sine duricia est herba, etiā si ab osse nomē habuit, per antistrophen uidelicet, hoc est, ex aduerso a Græcis appellata, sicut Fel dulce, folijs angustis. Nascit in collibus terrenis.

E X M. V E R G. C O M M.

Ex aduerso græcis Holosteon herba hæc dicta est. Toto corpore em & undiq; ossatū uox illa significat: cum tamē tenerior, & fragilior ea sit, longeq; ab ossium duricie discesserit. Quærendum in ea, quo nam modo trium, aut quatuor digitorum altitudine eam hic dicat a terra extolli: & an digitos per longitudinem continuatos, an ut in antiquorum palmo erant, per crassitudinē coniunctos, & sibi suppositos indicet. Nobis in posteriore hanc partē inclinatus. Nā quatuor digitorū per longitudinē mēsurā, alijs poterat, et debuerat uocibus indicari.

C

De Stœbe.

CAP. XIII.

501 G

S Stœbe, quam alij Tobion, Romani Stipam uocant. Vulgaris est noticiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter decoctum dysentericis infunditur. Auribus quoque purulentis infillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt. Erupentis sanguinis impetus cohibent.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 15.

lib. 22. cap. 11.

Theoph. li. 1.

& 6. plant.

Strabo. li. 16.

S Stœben Theophrastus & Plinius Phleon quoque dici tradidere. Pollux Philun, cuius lanugine mulieres ad lixiuū utantur. Molle inquit Theophrastus, & plantaceum est Phleon, colore subrubido. Meminit & Aristoteles, sed a Theodoro Flaus uertitur. Fœminā in eo accipi, quæ sit sterilis, & ad nexus utilis. Vnde Phœinas uestes in Herodoto quæ legat & Pausania, quibus aues in Arabia Symphalides, ut uisco ceteræ capiant: cum alia materia non resistat earum rostris. Nam et in Aethiopia Arabiæ aduersa nasci Phleon testis est Strabo, flumine præsertim, quod Cinnamo semina discernat. Orchomenio lacu numerosum id haberi: a quo & nomen Phleons: etenim Græci φλεων, pro eo quod est fœcundū esse capiunt. Hinc & Bacchū ueteres Phleonta cognominabant, auctor Helianus. Partem huius herbe teneram ab radice, pueris in cibo gratam esse. Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam, nec in profundum actam, folio & caule aculeatis. Stipam a latinis dici auctor est Dioscorides. Illud notauerim, si Stœba idem sit quod Phleons, errare quos Stœbam pro ea herba capiunt, quæ uulgo Scabiosa dicitur, folio Erucæ hirsuto: non tamen aculeis horrente, cerulei floris, ex qua & scopæ fiunt. Sit autem Scabiosa, quæ ab Aetio Psora dicitur, cuius usque fumō arborum Erucæ moriantur, non habeo compertum. Phortion lini genus tradit, Stypion uocatum. Alioquin Stypos inquit Piceæ caudex est, itemque prædurum & solidum lignū quodcunque. Interdum & humilis stipex ita dicitur potius. Est & Stybion & Sybye, de qua diximus in Hypophæe. Nam Stion calculus est marinus Hippocrati. Festus linum impolitum, Dorice stuppam dici meminit.

E X M. V E R G. C O M M.

D

P Phleon duobus locis uocari a quibusdam Stœben hanc Plinius testatus est: primum, in uolumine capite. 11. his uerbis. Quædam in folio habent, & in caule, ut Phleos, quam aliqui Stœben appellauere. Mox iterum uigesimo secundo uolumine capite undecimo, Stœbe, quam aliqui Phleon uocant. Videturque nobis Theophrastum ubique appellare. Is enim inter aculeatas Phleon, 6. de plantarum historia numerat, & inter eas quæ folia secundum spinas pice sunt quales in palustribus Tribulus, & in arida Ononis est. Et Stœben libro primo de plantarum historia inter fructifera, & quæ carnosum solum habent.

13. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

De Volucro.

CAP. XV.

G Græci Clymenon uocant, alij Calycanthemon, alij Peryclymenon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatitin, alij Milacem, alij Anatolicon, alij Dyticon, alij Merginem, Latini Volucrum, aliqui Volucrum maius. Aegyptij Oxioni. Clymenion, quod & Agonon, id est, sterile nuncupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia Plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, Iridi, & poliporum Cirris non absimilibus. Probatissimum est e monibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Coeliacos, rubraque fœminarum profluvia, refrigerando infrenat. Sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impostitæ, ea ad cicatricem perducunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 12.

Theoph. li. 9.

C Clymenos appellata a rege dicitur, describi aliter a nostris, quæ a Græcis Plinius affirmat, hoc est, Hederæ folijs ramosam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui & semine Hederæ, syluestribus montosisque nascentem. Sterile scere pota ea etiam uiros, sextario eius in triginta dies diuiso, Theophrastus auctor est. Quod quidem Dioscorides Periclymeno uocatæ tri-

buit. Nam & descriptio nostrorum de Clymeno quā prætexui: Peridymenō fere conuenit.

EX M. VERG. COMM.

Regia dignitatis herba Clymenos est, & ab inuatore rege sic appellata: non aliter q̄ & pleræq̄ alia a Diosc. hæcenus, & a Plinio diuersis locis ex antiquorum historia descriptæ fuerūt. Eam pluribus indicauerunt ueteres appellationibus: inter quas ex plantæ ipsius natura, notis, & antiquorum in ea obseruationibus factæ aliquæ sunt. Qualis Calycanthemōs est, significat enim, quæ in Calyce floreat. Dixerunt autem in floribus antiqui Calyces, in uolucra illa quæ in Rosis sunt, quibus dehiscenētibz in sua folia se flores pandunt. In Clymeno autem hæc calyces folliculos eos intelligebāt, de quibus hic paulo post egit: Peridymenōs uero, confuso mixtoq̄ ob similitudinem cum ea quæ sequitur nomine.

De Peridymenō. CAP. XVI.

Peridymenon aliqui Aeginam, alij Cyllenon, alij Carpathon, alij Splenion, alij Epetitū, alij Axinam maiorem, nonnulli Clematitū, alij Myrcinen, alij Calycanthemō, Magi Polion Veneris, Aegyptij Turcon, Romani Volucrum maius, Aphri Lanath appellant. Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea. Inter folia furculi exeunt, in quibus baccae, Hederæ similes. Flos fabæ, candidus, aliquantulum rotundus, et quasi in folium procumbens, semen durum, & quod difficile euellatur. Radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter assidentibus. Semen eius postq̄ ematuruit collectum, & in umbra siccatur, drachmæ pondere dat in uino quadragenis diebus, ut lienem absumat, ac molestiā discutiat. Sed urinā ciet, statim a sexto die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest. Partū accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita. Quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur. Perunctis ex oleo febrū rigores abigunt.

BARBARI COROLL.

De Peridymenō dictum est in Glymeno. Nūc Caprifolium, & Matersylua dicitur uulgo: quanq̄ Dioscorides Matersyluam pro Hedera capit, cui Peridymenon simile est.

De Tribulo. CAP. XVII.

Tribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis Tribulus aquaticus dicitur. Tribuli genus unū terrestre, folijs ad effigiem Portulacæ, tenuioribus uiticulis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & domicilia nascitur. Est & alterū genus aquis familiare, qd in fluminibus natū comā exerit, aculeos cōdēs. Folijs latis & pediculo lōgo. Caule parte summa q̄ ima crassiori. Capillamēta quædā indidem exorta spicant. Semen durū, ab altero non abhorrens. Vterq̄ refrigerantis & inspissantis est naturæ. Ideo inflammationes omneis cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasq̄ perfanat. Succus ex his colligit ad oculorū medicinas. Semen dum recens bibit, calculosis iuuamentū affert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitaue, ictos a uisera recreat. Contra uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctū eius sparsum, pulices necat. Thraces, qui ad Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo eq̄s

Α

περιδύμενον

B

tribulus

C faginant, & e dulci semine & esculento panem quo uescuntur faciūt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 18. ca. 17
lib. 21. cap. 16.

Tribulus, siue Tribulum, in segetibus madidis & palustribus nascitur, non excedente quina fere cubita, gurgitum altitudine, ut in Strymone amne. Capillamenta in eo quaedam inter se contraria, eo breuiora, quo propius ad radicem sunt, adeo, ut in ea quasi desinant, ac procumbat, a lateribus terna & quaterna germina: ut amplissimum sit quod minus ab radice distat, et reliqua pro suo cultusq; numero. Exit a parente soboles, omnino similis folio, fructusq; sed gracilior. Semē nigrum, praedurum: quo cadente, ipsum se propagat. Folium habet secūdū spinā. In semine quoq; gerit aculeus. Radicē eius alij annuā, alij diuturniore esse putāt. Duo gñā eius. Vni Cicerculæ folium: alteri aculeatū. Vere germinant, serius tñ: cui in folio aculei: magisq; hoc septa uillarum obsider. Semen habēs rotundius, et nigrū in siliqua: qđ aliteri, hoc est, praecoci arenaceum & Sesamæ figura cernitur. Nihil Cicere infestius Tribulo est. Nascit & in hortis Tribulus. Dira res alibi, sed iuxta Nilum & Strymonē amnes, in cibos recipit. Panis ex eo sit praedulcis, & comprimens uentrem. Hippocrates genus Tribuli Parathalassion, hoc est, maritimum appellat, idem cum terrestri: quod & minus est aquatico. Ex aquatico sane panes fiunt: ob id & Ferrariensem Castaneam, Gallia padana Tribulum uocat.

De Sarxiphago. C A P. XVIII.

saxiphagum

Sarxiphagon, aliqui Sarxiphragon, alij Empetron, Romani Saxifragiam uocāt. Frutex est furculosus, in petris & asperis locis nascens. Coctus in uino, mox potus, febricitantibus opitulatur. Stranguria prodest. Singultum sedat. Calculos uescica frangit, & urinam ciet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 27. ca. 9.

Saxifragum, et Saxifraga latine dicitur, item Calcifraga (si modo hæc est) quam et Plinius et Dioscorides alio loco Empetron appellant. Paulus Sarxiphages. Empetrū inquit Plinius, fere in saxo nascitur. Recentius uires sunt. Vetusstate perdit eas. Lapillos qui sufferere hanc, una rumpi affirmant. Habetur & Saxifragi genus alterum, in Adiantō nobis explicandum. Corrosi & ambusti sunt hac parte Græci codices, nec quale sit huius herbæ folium animaduerti ullo mō potest: et in ipso uerborum textu, spaciolum inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturā huius herbæ uidi, non plus folijs, q̃ Ciris minutis, per ramos ex intervallo conditis, nec frequentibus: in cacumine furculorum flocci ceu arentes potius q̃ flosculi, subrubida radice, nō sine fibris. Romæ talis ostendit in maritimis, ac montosis tantum, non rubida radice, sed candida: flosculis quoq; candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit. Alij Tritici foliorū figurā, alij marinæ Bati similem dixere, alij Tormentillæ uulgo dictæ. Est autē (ut uolunt) Tormētilia, Quinquefolio herbæ similis, nisi q̃ septem fere habet folia, nō gnq;. Quarti herbā, quæ florem Caryophyllon uocatum ferat, de quo aliubi dictum est. Quinti Saxifragā eādem esse, aut proximam ei quæ Pampinula, Pimpinella, & Bipēnula, & Sanguisorba ruri dicitur: qm̃ uulneribus iniecta ferrū & spicula facile ac citra sensum doloris exigit. Folio paruo, orbiculato, & extremitatibus serrato: qđ et mandi soleat, paratū oleo, sale, aceto, furculis ab eadē radice plurimis atq; densis, rubentibus cū radice, ut ferunt. Quibusdam locis uermiculus eruit, q̃ curatus, fericis præcipue tingendis, Purpuram facit incomparabilem, ceteros colores splendore quodā & hilaritate superans. Inuentus, ut alia quoq; multa casu, excrementis gallinaceorū, ita coloratis. Nam & ulus Purpuræ, ut est apud Iuliu Pollucem, ab Hercule uidet institutus, cōspecto canis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igif Purpurissum, ex hoc uermiculo Carbasinū a præstanti amphitheatralium uelorum (utarbitror) colore dicitur. Quidā Carbasinū appellat colore, qm̃ uermiculus is, punica lingua Carmes appelletur, quemadmodū & Coccus. Potest & ab urbe Charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse color is, quod lanas inficere Sardibus coepit sit, ut ingit Plinius. Nā Carbatinis in Aristotelis secūdo de animalibus uolumine legendum, non carbasinis est. Sunt autē Carbatinæ, quas Catullus Carpatinas crepidas uocauit, calcamenti genus e Caria translanum, quod hodieq; uulgo sic uocatur, detractis utiq; posterioribus syllabis, &, l, litera principio adiecta, ut assolet. Nam et Carpisculus calciamēti genus est, ut Flauius Vopiscus ait, in Aureliani Cæsaris uita. Quidam tamen Carbasa etiam nunc uocāt boum coria: quæ Cæsar Alutas appellauit, nam, ut Suidas scribit, ubi defecissent calcei, Carbatinis utebantur, ex crudis boum tergoribus recens detractis, ut illud Virgilianum.

Vestigia nuda sinistra;

Instituere pedis, crudus regit altera pero.

De hoc uermiculo, nihil apud ueteres inuenias. Nam Sandix indica, de qua in Aureliani Gesa-
ris uita legit, preciosas Purpuras fecisse, aliud tincturæ genus puto. Hieronymus i sacris literis,
nemiculū, & uermiculatas uestes nominat: granū (ut opinor) Aquifoliæ significans: qđ auto-
re Plinio quibusdā locis uermiculi similitudine conspicitur. Hinc deriuatum arbitror, ut Cocci-
nea uestis, Scoletidata, hoc est, uermiculata uulgo dicere, siue quasi qđquiliata (etenim granū
Cocci, etiam Quisquiliū uocatur Plinio) a Quisquilijs opinor. Sunt em̃ Quisquilijs, ut Festus ait,
quicqd exarboribus in uirtū cadit. De uermiculo purpureo, Democritus qđq meminit tinctu-
ris utili, sed e purpuris, ac murice, ut conijcio. Nam et de uermiculo Galatijs, hoc est, iligno* me-
minit, Pampinulę similis est, folio tantū minore, ac magis serrato & lentiusculo, quā nostri her-
barij Eufragiā appellāt, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad oīa uitriā oculorū:
ueteribus incomperatam existimant: quemadmodum & illam, quæ Carosilago dicitur a uul-
nerarijs. Nos Ceratophylacen uocandam putamus: quia partem oculorum Ceratoiden, hoc
est, corneam defendat, salutiq; percussam restituat, folijs Seriphij, uel potius Roris marini, aut
Lini quoq; capitulis arentibus, cirris subluteis.

De Limonio. CAP. XIX.

Limonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, λεμόνιον
alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Mysijs Mendruta, Syris Meu-
da, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosemata, alijs Scyllion, Magis
gis lupi Cor, Romanis Viarum nigrum, quibusdā Ticinabulum ter-
ræ, Gallis Iumbarum, Dacis Dacioa. Folia habet Betæ, tenuiora & lō-
giora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, ut in Lilio æqualem,
feminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex ui-
no acetabuli mensura potū, dysentericis coeliacisq; prodest. Rubra fœ-
minarum profluuia sistit. Nasçitur in pratis & palustribus.

BARBARI COROLL.

Limonium Beta est syluestris, densioribus folijs. Aqua e radice cocta, maculas uestium, &
membranarum eluit. Aliud genus est a Limonio Limania, ut in Scolymo notauimus. Limoni-
um Aetius etiam Cynoglosson, hoc est, linguam canis uocari scribit.

EX M. VERG. COMM.

Syluestrem Betam Plinius, qđ eius folio sit, uolumine. 10. capite. 8. Limoniam uocat. Nume-
ratq; eam in Betarum censu non male, si palustrem potius, qđ syluestrem a natalibus eius appel-
lasset. Creditur idem a multis eandem hanc, quoniam in riguis & aquosis pratis nascitur, & ab
eis nomen in grecis inuenit. is, uolumine, cap. 6. pratensem herbam nominasse. Theophrastus
in sexto de plantarum historia ad finem Limoniam gñe fœminino, inter Anemones genera de-
scripsit syluestrem, & inter ea quę tertium ordinem inter uernos flores antiqua ætate habuerūt.
Nobis pro comperto non est, diuersum ne, an idem utriusq; genus sit. Hic enim floris Limonijs
huius non meminit. Neurodes Plinius uocari etiam Limonium ait: sed nulla ab alterutro dicta
nominis eius causa est. Cur autem Potamogetona aliqui eam dicerent, in promptu causa est.
Palustris enim planta, fluminibus uicina, qđ Potamogeton significat, merito dici potuit. Priu-
tim tñ eo nomine alia quondā indicata est, hoc ipso uolumine declaranda. Ab Elleboro nomē
illi etiam factū in grecis est, & a latinis Veratrum nigrum: qm̃ folio simile illi est Limonium: qđ
in Elleboro describitur Plantaginis, aut syluestris Betæ. Quibus & hoc simillimū est, & eousq;
æquale, ut palustris Beta Limonium dictum fuerit. Differunt in historia Limonijs non leuiter
scriptor hic, Pliniusq;. Hic decem, et pluribus aliquando folijs in caule uirere dicit: ille undecim
fæpe caulium herbam esse testatur. Quod peritiores uideant.

De Lagopo. CAP. XX.

LAgopus hæriba, quam aliqui Leporis cuminum appellant, si-
stit aluum in uino pota, aut in febrī ex aqua. Eadem inguini ad-
ligatur, in inflammatione. Nasçitur in segetibus.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Lagopus, quasi pes leporis dicat. Sane & similis est ei aspectu. Proinde haud probarim eorum sententiam, qui Caryophyllatam uulgo dictam rentur, in opacis motanis gigni solitam, non in fegetibus, ut Lagopus. Hippocrates nominat & Lagopyron, quasi leporis triticum intellis, surfuribus cum inaruit simillimam; folio paruo, quasi oleagineo, longiore tantu, cruentis uulneribus imponens. Hanc Galenus Leporariam inquit herbam esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Discrepant grauissime in leporini Pedis herbae natalibus hic scriptor, & Plinius. Alter enim in fegetibus, quae in relatina manifestam ex Varrone significationem habent; alter in opacis motanis gigni solitam, ut inquit Theophrastus nasci tradiderunt. Quae graecis sunt quadratae hortorum ad consuetudinem olerum dispositae areae. Nos graecorum lectionem secuti, qualem inuenimus uocem uertimus. Barbarus ex Plinio in fegetibus nasci tradidit, magno inter segetes & hortorum areas discrimine. Qualis autem haec nascatur, non erit difficile leporino Pedit similem Paniculam in ea obseruasse.

¶ De Medio. C A P. XXI.

μέδιον

Medion aliqui Medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nonnulli Osmon, quidam Trigonon, alij Cybellion, alij Polyphyllon, Romani Trifolium odoratum, Aegyptij Epaphon. Medion in faxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureū, rotundū, semine Cnici minuto, radicē dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quae trita, in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum menstrua pellit.

B A R B A R I C O R O L L.

DEdion. Exemplaria sunt in quibus folia ei non Seridis, sed Iridis reddantur: Plinius quoque Iridis satiuæ scripsit. Sed cum satiuæ adiecerit, non de Iride, quam nemo legit satiuam esse, quando, ut inquit Theophrastus, Iris cultum nullum desyderat, sed de Seride uidetur intellexisse: cuius constat duo esse genera, satiuum, & syluestre.

The, de Iride.

E X M. V E R G. C O M M.

Discrepant in similitudine foliorum eius ueteres graeci. Alij enim Iridi, alij Seridi, quae Clechorij genus est, secundo libro a nobis tractati, similia dicunt. Plinius quoque Iridis satiuæ dicens, scripsisse Seridis credi potest: quando satiuæ discrimen Seridi proprium sit: Iridis autem nescio an haecenus aliquando hic dixerit. Scimus quidem, syluestrem Iridem dici in plantarum censu, sed ea proprium habet Xyridis nomen, de qua mox dicitur. Nobis inclinatur animus, ut Seridis potius quam Iridis folio Medium esse opinemur.

¶ De Epimedio. C A P. XXII.

ἐπιμέδιον

Epimedium, ab alijs Erineos, ab alijs Tryas, a nonnullis Polyrthizon, a Romanis Vindicta nominatur. Caulis est non magnus, Hederae folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mañas crescere non sinunt. Radix conceptu adimit. Folia quinque drachmis, post menstruas purgationes quinque diebus in uino pota, praestant mulieribus ne concipiant.

E X. M. V E R G. C O M M.

Avet quae Medio in plāta hac addita graecorum praepositio ἐπι est. Significat enim Epimedio, quod Medio accesserit. Id autem est foliorum magnitudo, quae in Medio satiuæ Seridis sunt, in hoc Fido. Ideoque Caprificu a quibusdam hic uocari eā tradit: & eadē significatione Thriada. ἐπιον enim graeci fulcra foliū uocant. Sunt tamen in quibus non ἐπιον per, i, sed θριον per, v, legitur. Quod si recipiatur, tunc dictam intellexisse oportebit, a palustri planta, quam Thyron idem graeci dicunt.

De Gladiola. CAP. XXIII.

A

Xiphion, aliqui Anactorion, alij Phasganon, alij Machæronion, alij Arion uocant, Romani Gladiolam, quidam Genitalem. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatū, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant. Rotundo semine, radicibus geminis, una bulborum modo super alteram insidēte. Quarum inferior gracilis est, superna uberior: Nasctur in aruis. Pars superior radice cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit. Panos cum lolsij farina & hydromelite discutit. Qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiorem radice ex uino pota, Venere stimulari, & inferiore sumpta sterilesce tradunt. Superiorem quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

BARBARI COROLL.

Xiphion, a Theodoro dicitur Pugio. Floret uere, cum Viola nigra. Falso plerique arbitrantur Xiphion eandem esse, quæ & Lonchitis. Sed illa in siccaneis, hæc in humidis nascitur. Sunt & alia discrimina, quæ notari possint uolentibus. Habet hæc & radicem ad nucis æuellanæ similitudinem fimbriatam, quæ effodi ante messes oportet, & in umbra siccari. Videtur hæc & Phasganon, & Machæronion, hoc est, Ensis uocari: radice, ut Theophrastus inquit, dulci, decocta, & comendata panificijs, si trita farinæ admisceatur. Vnde Machæronij pastilli fortasse ortū habere, quos tertio Kalendas octobres uulgus esitat. Item rotunda, & sine cortice capillata fibris, ut Gethyum. Scolopendre in herbæ eam frequentes conueniunt. Est & compositionis cuiusdam in medicina uiridis nomen Machæron, ad morbos articulares, & Ischiada. Habet & Xiphias piscis, quem Gladiolū interpretantur, duo, ut inquit Aristoteles habēs rostra, sed dentibus carēs.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Gladiolus illa, cultellato folio herba, cui a principio statim Iridis folia hic comparauit: princeps in hoc foliorum genere, & quæ prima huiusmodi similitudinis notam ceteris dederit: ideoque tot gladiorum appellationibus diuersis locis indicata. Florere hanc uere cum Oenæthe, nigra Viola, Helychryso, Limonia, Anemone, & Hyacintho Theophrastus ait. Vocaturque & ipse Xiphion, Plinius multis locis Gladiolum: quo tamen loco expressio de ea agit. 25. uolum. capit. 11. Xiphion, & Phasganon græcis nominibus eam appellat. Nec de folio eius aliud tradit, quæ cum primum ex terra prodit gladij ostendere speciem. Hic ultra addidit, Iridi simile esse, breuius tamen & angustius *ἡ ἀκρὸς ὡς μακρότερον*. In quo uidendum est, an in mucronem definens dicendum sit, an decurtati mucronis: quales cultelli aliquando in incidendi tamen usum fabricantur. Viri quoque enim *ἀκρὸς* significare ex diuersa propositionis eius uis potest: & quod *ἀκρότερον*. i. in acutum derasum est, & cui ex acumine suo ablatum aliquid fuerit: ut *ἀκρόν* Thucidides ait, & in græcis multa alia inueniuntur. Pro duabus deinde radicibus eius reuocanda legentibus in hunc locum erunt, quæ in Testiculis duabus plantis superiore uolumine dicta a nobis fuerunt. Nec aliter in Gladiolo hæc duas inueniri radices, quæ in bulbosis plerisque alijs, in quibus præteriti anni bulbos & radix inferior semper est: genitaque ex se alia cedit ipsa, donec tertio, aut quarto anno tota pereat. Auellanus Plinius eas comparauit: hic naturæ notas magis secutus, bulbulos paruos uocauit. Discrepant in natalibus eius Dioscorides & Plinius magnopere. Hic in aruis, ille in Pumidis: alter in genere *ἀρουραίων*, quæ qualia sunt superiore libro dictum a nobis est, posuit: alter in aquosis & palustribus. Potest tamen uterque quod uerum sit dixisse: nam possunt arua humida esse. Dioscorides præterea in aruis maxime nasci dicens, non negauit penitus posse etiam in aquosis nasci.

De Sparganio. CAP. XXIII.

Sparganion aliqui Xiphidion, alij Bolon uocant. Folia Gladiolæ, sed arctiora & in terram magis procumbentia. In summo caule piceo

σπαργάνιον

O ij

Culæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena radix cum uino datur.

EX M. VERG. COM M.

IN decursu, & ueluti ad alia festinans Plinius, de Sparganio hac. 25. uolumine, capite. 9. egit: nihil ultra de ea testatus, q̃ aduersus bibi radicem eius quam Sparganion uocant, ex uino albo. Nec nos quod illi ad h̃ciamus aliud habemus, q̃ esse in græcis qui ἀπὸ τῶν σπαραγίων dictam putent: q. f. folijs eius satis, & uutilium modo lentis, pro fascijs his uterentur: quibus nutrices infantes suos uinciunt, quas græci σπαραγία dicunt: & σπαραγίων uerbum, in infantium uinculis & fascijs his notissimum.

De syluestri Iride.

CAP. XXV.

εὐρίο

XYris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gladiolus, aut Iris agrestis, a Dacis Caprus dicitur. Folia habet Iridis, latiora, & in turbinem mucronata, quorū medio caulis erumpit, crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares depēdent. In quibus pureus flos, in medio puniceus. Semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acre. Radix longa, geniculata, ruffa. Contra capitis uulnera, fractaq; efficax est. Aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris aeris tertia parte, & radicis Centaurij, ac mellis quantitate. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui profluuia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit, & cum aceto lienem absūmit.

BARBARI COROLL.

Pl. li. 21. ca. 20

D

XYris, & Xeris, aut Xyrida, Galeno teste, dicitur. Scelus herbariorum quorundam aperit hoc loco Plinius, partem eius seruandum, & quarundam aliarum herbarum, & Plātaginis, & Iridis substituentiū, si parū mercedis tulisse arbitrat̃ur: rursusq; ut plus operis acquirant, partem eā quā seruauere, eodē loco infodiūt. Credo ingt, ut uitiā, quæ sanauerint, faciāt rebellare.

EX M. VERG. COM M.

Posteriores de syluestri hac Iride docuerunt, quod nos nunq̃ non in agrū astate discedentes, in sepibus uidimus: cultellato ut hic ait, folio inter uepres & saxa nascentem herbā, multo foliorū cespite, acuminato mucrone, multo breuioribus q̃ Iridis, & ut hic ait latioribus: duob. tribusue, & aliqui quatuor caulibus, in qbus tument oblōga ueluti capitula: quę suo tpe puniceo magis q̃ purpureo colore florēt: et cū defloruerūt, folliculos relinquētia lōgitudine digitali triquetros, in qbus tria, quatuorue semina ex oscillis suis pendent priuatiim, nec aliē q̃ in Faba locis distincta: colore rubro cū maturuerūt: quę nō sunt ipsa uere semina, sed latentium intra se seminum pericarpia & inuolucra: qualia licebit uolentibus quotannis obseruare. Saxosas lepes, & quasi macerias agrorū amat: luctaturq; inter saxa exiēs. Hos eius natales, & has plantæ notas nos obseruauimus: poteruntq; aliē ex his facillime cætera deprehendere.

De Anchusa.

CAP. XXVI.

εὐχρη

ANCHVSAM aliqui Cantanchusam uocant, aliē Libycam, aliē Archibeliōn, aliē Alcibiadiōn, aliē Onophyllon, aliē Porphyrida, aliē Mydusam, aliē Calyca. aliē Noneā, Aphri Bunefath. Anchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onoclia appellatur, folia habet Lactuæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquouerū sum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ ætate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Lato solo nascitur. Radix adstringit. Ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cęra efficax est.

Igni sacro cum polenta medetur. Lepris & uiliginibus illinitur ex ace-
ro. Partus extrahit, uulua indita. Eius decoctum renum uitrijs, lieni & bi-
le suffusis datur, & si febris sit, ex aqua malsa. Siftunt aluum folia in uino
pota. Radice pigmentarij utuntur ad spissamenta.

A NCHUSÆ caulis, non ut aculeatarū multispens, sed stans. Funditur Papyri modo. Radix
insiciendo ligno, cærisq; apta, præparans & lanas preciosis coloribus, Laodicea maxime. Ut
Democrito placet, liquari non potest in aqua ad medicinas; oleo resoluitur: idq; syncera expé-
rimentum est. Habetur & alia similis, Pseudanchusa, ob id appellata a quibusdam Enchusa,
aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior, & minus pinguis; tenuioribus folijs, &
languidioribus, radice oleum non fundente, sed rubentem succum: & hoc ab Anchusa discer-
nitur. Anchusæ primum genus, Onoclea cognomen habet, & Chærospelethos in Paulo. Se-
cundum Onochelos, siue Alcibiadios. Tertium pusilla, fereq; innominata. Quartum Lyco-
pfos, Anchusam poetæ sunt, qui & Enchusam uocant: q̃q; Enchusa pro Pseudamchusa po-
tius, q̃ pro Anchusa capitur a nonnullis, ut prædixi. Hippocrates Anchusam uidetur intel-
lexisse, cum Schedida nominauit, ut Galeno placet.

Pli. li. 31, ca. 6.
Theoph. li. 3.
plant.

N Vmerauit, coniunxitq; Anchusam Theophrastus libro octauo de plantarum historia
Coronopodi, quam cornicis Pedem uocauimus: Chamæmalo: & plerisq; alijs, quæ *ἰπυρίδι*
φυλλὰ ille uocat, id est, folia per terram spargentia: quod hic ait *προσπιπταμένα τῷ γῆ*, quod est,
per terram sparsa. Nicander, quod & ab hoc dicitur, Lactuæ similia ostendit. Versiculus eius
est. *ἀλ γὰρ ὅτ' ἀρχαῖος θριδαυρίδα λάβο χαιτην*, quod est, Lactuæ similia. Plinius inter aculea-
tas numerat, a cæteris in foliorum positura discrepans. Locus est. 21. uolumine capite. 16. Acu-
leatarum caules aliquarum per terram serpunt, ut eius quam Coronopon dicunt: & ex diuer-
so stans Anchusa. Stantem Anchusam dicit, quam Theophrastus *ἰπυρίδιφυλλον* uocauit. Nec re-
fert, q̃ Plinius caules dixerit. in caulibus enim folia. Omnes postremo sanguinei coloris ha-
bere radicem testantur, non toto quidem anno, sed æstate tantū, quo tempore colorem illum
natura in ea decernit. Ex qua tēporis nota, quod passim in cunctis græcis legebatur, *ἢ τῷ θίρι*
γενωμένην, id est, æstate nascentem, ex antiquissimi codicis nostri fidē *γενωμένην* instaurau-
mus, & uertimus. Quod enim hic ait, eo pertinet, ut per æstatem tantū eo colore sit, tuncq; co-
gnosci, & deprehendi tuto possit. Fuisse autem colorem ex Anchusæ huius radice in precio
& honore quondā, nihilq; non eo colorare ueteres consueuisse, græci latinisq; passim omnes te-
stantur. Pliniusq; quo diximus loco, insiciendo ligno, cerisq; radice apta. Nec multo post. 22.
uolumine, capi. 20. Manus insicit sanguineo colore, lanasq; præparat preciosis coloribus. Hic
ipse in rosaceo monuit unguentarios, ad bonitatē coloris Anchusam illi addere. Et ne longio-
res simus, nihil nō Anchusæ radicis sanguineo succo colorabatur. Eamq; ob causam iniectus
mihi scrupulus est, quod in extremo capite legitur, ad unguentorū spissationem, non ad hoc,
sed ad colorem potuisse quondam pertinere. Rara hæc in alijs plantis coloris nota: eamq; ob
causam diligentius in hac eruscanda. Nobis hætenus uidere eam non licuit, & præter ab an-
tiquis dicta, nihil oculati testes addere illi possumus: eadem in tribus alijs eius generibus for-
tuna etiā utentes. Audiuimus tamen, in pascuis quæ ad Populoniā amplissima sint, nasci
herbam, quam gregibus suis noxam pastores uident, omnibus ijs notis ab eis descriptā, præ-
sertimq; sanguineo radicum succo: sed nihil pro compertō nobis aliud de ea est.

B

E **De alia Anchusæ.** **C A P. XXVII.**
St & alia quam aliqui Alchibiadion, aut Onochiles appellarunt.
Hæc a priore distat, q̃ minora habeat folia, sed simili modo aspera,
ramulosexiles, florem purpureum, radices rubras, oblongas. Quæ mē-
sibus sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq;
inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime Vis-
perarū auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquā man-
dens in serpentis os inspuat, eum necabit.

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Anchusa Onochelos, alij Thexiam, & Archeuion, multi Enchryson : paruo frutice, radice præterq̃ mellibus nigra: tunc cū sanguinea est, uiresq̃ habet. Folijs tritis, odor Cucumeris.

¶ De alia Anchusa. CAP. XXVIII.

Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hyssopo & Cardamomo pota, lassas uentris tinea excutit.

E X M. V E R G. C O M M.

Quattuor fuere antiquis Anchusæ. Tres dictæ hætenus : & quæ statim sequitur cognomen ro Lycopsis : etsi postremâ hanc priuatim aliqui, & per se docuerint. Omnes cōmune aliquid, & in quo cōueniant habent, ideoq̃ cognomines : id autē maxime, rubēs radicis succus est: alioquin in medicina uires diuersæ & inæquales illis sunt. Siquidem quæ Onoclea dicitur, prima in earū censu, adstringente, & subamarâ habet radicē: ideoq̃ lienosis, & cū urina malo aliquo doloribus mederi dicta est. Eadem cū polenta, emplastri modo imposita, sacris ignibus accommodata credebatur. Eiusdem folia, q̃ minus q̃ radix refrigerat & siccant, cōtra fluores alui, q̃s diarrhiā uocant, quondā bibebant. Quæ uero Lycopsis dicta est, de qua mox agē, maiore adstringendi uis q̃ illa, sacris ignibus magis accommodata erat. Quæ Onochelos, siue Alcibiadios dicit, maiore reliquis oibus in medendo uiperarū moribus in cibo, potuq̃, & alligata in usu erat. Quarta omnium aliarū breuior, sine nomine, maiore q̃ Alcibiadios illa amaritudine pellendis uentris animalibus in usu fuit. Et hæc in antiquis græcorū medicis Anchusarum omnium decreta fuerunt, omnia ut uideatur ab hoc scriptore accepta.

D

diuo-fis

¶ De Lycopsi.

CAP. XXIX.

LYCOPSIS, quæ a nonnullis Anchusa uocatur, longioribus q̃ Lactuca constat folijs, asperioribus, latioribusq̃, crassis, ad radicis caput recidentibus. Caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus, flore paruo, purpureo. Radice rubra & adstringente. Nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur, & cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

E X M. V E R G. C O M M.

Priuatim, seorsumq̃ a reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac uigesimo septimo uolumine, capite decimo egit. Nihil tamen illi tribuit, quod ab hoc scriptore acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit, post Anchusam Lycopsidem cum plerisq̃ alijs numerans. Antiquiores autē Græci Anchusæ congenerem fecerunt, secundamq̃ in eo censu numerabant, hic ultimâ docuit : licetq̃ Anchusam esse non dicat, sed ab aliquibus uocari, hystoriæ tamen ordo, & quæ illi tribuuntur notæ, Anchusis alijs congenerē merito faciunt.

Exiit

¶ De Echio.

CAP. XXX.

EChion aliqui Aridam, alij Alcibiadiōn, Romani Alcibiacum nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, Anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos, minutaq̃ utroq̃ latere folia, in uersus digesta, nigra, in summo caule minuscula. Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti Viperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo a serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non patitur. Folia &

semen idem præstant mnnus. Lumborum dolores sedat. In uino aut A
forbitione sumpta, lac extrahit.

BARBARI COROLL.

EChios, etiam Dorias a Paulo uocatur. Plinius, Echios inquit, utriusq; generis Pulegio si-
milis est, coronata folijs: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula sunt Viperæ. Qui
dam Echion pro Personatia inquit cœpere. Dioscorides hoc loco unum facit genus Echij, non
geminum. Sed Nicandrum uidetur sequutus esse Plinius, in theriacis dicentem, Echios duas
esse, contra bestiarum ictus utiles. Alteram humilem, folio Anchusæ spinis horrido, sed exili.
Alteram altiorē, maiore folio, flore paucio, per ambitū purpureo, capitulis Viperæ, cacuminē
aspero, alstricq; lanugine. Idem poëta paulo supra, quasi tertiam eiusdē nominis reddendo,
Echios inquit, cognomine Alcibios, herba est spinosa, coma sustinente flores, radice alta & ex-
li: quā ad serpentes, & iniici uulneribus, & cōmanducari quoq; præcipit. Folia quoq; ipsa non
multo post, eiusdē Alcibij commendat, quantū manu cōprehendi possit. Plinius. 27. uolumine.
Alcibios inquit herba, qualis esset, apud auctores non cōperi: sed radicē eius, & folia trita, ad
serpentis morsus bibi & imponi iubent, folia quantū manus capiat, trita cum uini meri cya-
this tribus, radicem drachmarū trium pondere cum uini eadem mensura. Ideo autē qualis es-
set Alcibios apud auctores comperisse negat, quoniā præter Nicandri uerba illa, & pauca, &
alijs cōmunia quæ prætexui, non legitur qui descriperit. Alteram uero esse Alcibion Nican-
dro q̄ duas illas priores Echios, scilicet, ostenditur: & q̄ Echis hæc, non Echios ab ipso dicitur.
Et q̄ eandem herbam uno loco bis depingi opus non erat.

Pli. li. 29. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

DVo Echij, siue Alcibij huius genera antiquiores fecerunt, præsertimq; Nicander utrunq;
his uerbis describens. ἡθα δὴν ἔχεια πικράκιον, τὸ δὲ τὸ μὲν πον ἀρχαῖον προσείκειν ἀναθῆναι πικράκιον
παῖρον ἐν δὲ τὴν ἑτέραν καὶ ἑτέραν τὴν αὐτὴν, ἢ δὲ ἑτέραν πικράκιον, καὶ ἐν καλῶναι ἑτέραν ἑτέραν. ὅλας
δὲ πικρὰ πορφυρίζεται ἀνθὺ βλάσιν δ' ὡς ἔχει ἐπιδανόν δ' ἐρύπειρε κάρηνον. Quorum sensus sit. B
Esse duo Echias, habereq; alterum spinosa Anchusæ modo folia, uerum parua, et per terram sparsa.
Alterum maioribus folijs, & purpureo flore esse, aspero, lanuginosq; caule, capitulis Vipe-
rarum figura, quod Plinius ait. Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa: cui & capitula
sunt Viperæ similia. Nicandri interpret ex Numenij antiquissimi scriptoris Theriacis, duo E-
chij genera itidem facit: uocariq; alterum, quod breuius est, Ocimoides: quoniā Ocimo simi-
lia habet folia: Alterū uero spinoso folio, priuatim Echion. Quod primū a Dioscoride descri-
ptum est: mox autē describetur alterū, non sub Echij, sed Ocimoidis nomine.

De Ocimaastro.

CAP. XXXI.

O Cymōides aliqui & hanc Echion uocant, alij Scorpiuron, alij
Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probathæam,
alij Elaphion, alij Antiminon, alij Porphyriada, alij Agion, alij Nemesis
on, alij Phileterion, alij Hyænopsolon, alij Thyrsiun, alij Themutin, alij
Misopathos, Latini Ocimastrum. Folia fert Ocimi, & ramos dodrantæ
les, hirsutos, siliquas Hyoscyamo similes, semine ut Gith nigro prægnan-
tes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum, cæterarumq; ser-
pentium moribus medeatur. Datur ischiadicis cū melle, uino, myrrha,
& pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

συμμενίδης

BARBARI COROLL.

DE Ocimoide, nonnihil in Ocimo dictum est.

EX M. VERG. COMM.

QVo syluestris ad satium discrimine Mentastrum, Apiastrumq; latini ueteres dixerunt,
eadem naturæ, & nataliū analogia Ocimastrum ab hsdem dictum fuisse, uerisimile
est. Plinius tamē syluestre Ocimū cōtētus dixisse, paucis medicīnā & historiam eius absoluit.
Hic in maiore honore ueteribus fuisse Ocimastrū, ex tam multis eius appellationibus indicat:
quarū plures ex alicuius partis ad alias herbas similitudine illi a gentibus per tempora accreue-

C runt. Nec difficilius hoc tēpore quicq̃ est, q̃ earū multiplices huiuscemodi rationes inuenisse: præsertim non bene semper similia inter se cōparantibus imperitis herbarijs, aut ex una, altera ue simili parte neglectis maioribus, & quæ magis ex re sint differentijs, medicā materiam alijs, atq̃ alijs appellantis. Cur autē Echion Ocimoides diceretur, satis superiore capite dictū est. Cur autē Scorpion, Sparganion, Althæa, Amaranthis, & Philetæron, quæ omnes in scripore hoc plantæ sunt, ex earū similitudine uidendū est. Probata deinde, & Elaphios, ut conijcere licet, ouilla & ceruina herba dicta est: uel q̃ quadrupes hæc libenter ea uescantur: uel q̃ natura docuerit, uel homines inuenerint, uenenatorū maleficia hoc remedio ab illis arcere. Porphyris mox a colore floris, quemadmodum & Augion ab eius splēdore, Thyrsitis postremo ab hirsutis ramulis, quos thyrsorum figura profert.

¶ De Erino.

C A P. XXXII.

E Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides uocant. Nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus, parte super na diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus furculis, flore candido, semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorū fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

B A R B A R I C O R O L L.

F Rinus herba cognominis arbori Caprifico est, ob id a Plinio inter Ficos, Caprifiscosq̃ red dita, non naturæ, sed gentilitatis respectu. Lac eius dulcis. Galenus hanc non Erinon, sed Echion uocare maluit. Vetusiti quoq̃ Dioscoridis sunt codices, in quibus non Erinos, sed Echinos scriptum sit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio.

E X M. V E R G. C O M M.

D Secutus græcorum nomen Plinius, aquatici Ocimi huius historiam & medicinam inter Ficos libro. 33. capite octauo tractauit. Longeq̃ a congeneribus suis herbam inter arbores descripsit: contra scriptoris huius præcepta & leges, qui in totius operis proœmio grauius damnauit, qui literarum ordinem sequentes, cognata a congeneribus suis diuellerent: manifestum argumento, in tractanda medica materia, indicibus librorum magis, q̃ totis commentarijs usum fuisse eum scriptorem. Posteriores rem magis, q̃ nomen secuti, inter Ocima de eo tracta uerunt: neglectaq̃ lactei, & qualis in Fico est, liquoris una nota, ex qua Plinius Ficus id adnumerauit, ex alijs quæ multæ inter herbas describi herbam cogeant, aquaticum Ocimum, aut Ocimoides, quod Ocimo simile significat, appellauerunt. In quo habent grauissimum testem hunc scriptorem, qui inter congeneres herbas, & statim a uero Ocimoide eam tractauit. Nec si Græci a ficulnei lactis liquore eam appellauerant, ideo separanda a congeneribus suis erat. Illi enim non, quia Ficus, arborue sit, Erinon, id est, Caprificum eam uocauerunt, sed quoniam Caprificorum modo lac sectus eius caulis, & expressa folia stillant. Laudauit aquaticum Ocimum hoc contra uenena in Theriacis suis Nicander, quod in scripore hoc non legi, demiretur aliquis, præsertim testante id Plinio. Versiculus Nicantri est, *καὶ ὁ θρόνος ἐν ἀρκυρίαις ἐρίνον*. Quod est. Et uirentis ad radices montium Erini. Tradidit Dioscles, a quo Plinius multa accepit, Ocimo simile esse: nasci prope flumina & fontes, & præter id apricis locis, & ad radices montium. Est illud etiam animaduertendum, credere nos quod in extremo capite est, finire aurium dolores instillatum succum, de lacteo liquore illo intelligendum esse. Is enim eius herbæ succus est. Nos tamen *καὶ ὁ θρόνος* inuenientes, ex instituta a principio in his nominibus a nobis lege, nihil detorsimus, in corruptam in hoc scriptore uocum, & eam dem semper significationem seruantes.

¶ De Gramine.

C A P. XXXIII.

A Grostin aliqui Aegicon, alijs Amaxitin, Aegyptij An uphi uocant, Latini Gramen, aliqui Asphyllion, alijs Sanguinaleni, alijs Vniolam, Hispani Apariam, Daci Cotiatam. Aphri lebal. Gramen geniculatis serpit ramulis, a quibus crebro radices spargit dulces, articulis

præcinctas. Folia dura, & ut harundinis parua lata, in exilitatem fastigi-
antur. Ea quæ iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu, uulnera conglu-
tinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultati-
bus. Calculosa etiam uesicæ excrementa comminuit.

BARBARI COROLL.

Gramini ab internodijs ramorum, & cacuminibus radices nouæ pullulant. Sunt quæ & a-
culeatum Gramen inuehant, trium generum, Dactyli cognomine. Vnum, cuius in cacumine
aculei sunt plurimum quini. Alterum Aizoo simile, Dactylon priuatim uocatum, quoniam
digitis medeatur. Tertium genus tenue. Nascitur in parietinis, aut regulis. Nulla herba gra-
tior iumentis Gramine, siue uiridis, siue in fœno siccata. Tunditur aspersa aqua. Radix adhuc
tenera mandendo est. Gramen Marti consecrauit antiquitas, quod ex humano cruore procreatum
crediderit. Quæque & omnis herba Gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant, quod ab eo
satum primo perhibent, Glaucum uero immortalitatem, huius herbæ cibo consecutum, Athe-
næus ex Aeschilone poetæ uersibus existimat.

Pli. li. 24. ca. 19.

EX M. VERG. COMM.

Vulgatissimū inter herbas Gramen est. A capris Aegicon; a iumentis Amaxitim antiqui-
tas noiauit; quod capræ scilicet, & iugo, carpētis quæ seruiencia iumēta eo passim uescant. Sanguina
lem uero, quod humano cruore procreari ueteres falso crediderint. Angustius urinæ opitulari hic
ait: cōuenitque in eo antiquis medicinæ auctoribus, qui inter diuretica simpliciter id numerat;
ultra quod hic lapidosa etiam uesicæ excrementa frangere ait. Extrema tamen hæc pars in all-
quibus græcis aliter legitur, *ἰσχυρὸν*, scilicet *ἰσχυρὸν ὑπὸν*, quod est, facere Gramen ad urinæ an-
gustias, uesicæque ulcera, & calculos frangere. Quæ omnia a Plinio. 24. uolumine capite deci-
monono, totidem, & iisdem uerbis reddita fuerunt.

De harundinaceo Gramine. CAP. XXXIII.

Est & harundinaceū Gramen, priore multo maius, quod iumenta ne-
care tradiť, præsertim in Babylone. Idque iuxta uias nascitur.

ne λυγρὸν ποσιον

B

BARBARI COROLL.

Alamagrostis, a Plinio Gramen simpliciter uocatur. In festum camelis. Quidam Babylo-
nium Gramen cognominant.

EX M. VERG. COMM.

Contraxit Plinius ad Camelos, quæ hic iumenta dixit, enecare Gramen in Babylonis regi-
one iuxta uias nascens. Nec facile est nobis modo ratiocinari, camelos ne ille dixerit, quia mul-
to hoc, & quasi solo ad uesturam iumento semper usa ea regio fuerit; an quia Gramini illi, &
animali huic ex naturæ antipathia discordia sit. Huic idem, aut simile uidetur esse, quod a Par-
naso Gramine statim hic ait: natum in Cilicia Gramen, in cibo sumptum boues exurere: fa-
cereque id alter ex interpretibus ait impositum, alter uero in Sicilia: cum tamen antiqua & uera
lectio sit, *ἰν ἀλυσία*, & *ἰν Ἰσουλία*, id est, in Cilicia, & in cibo sumptum. Plinius longissime de omni
Gramine, quo diximus loco paulo ante longius egit: neque ab hoc scriptore adeo diuersus, ut
de his ultra agere nos oporteat.

De Gramine Parnasi.

CAP. XXXV.

Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederæ
ceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inuiti. Radicibus
quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, &
mirū in modū dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ di-
midio decoquat, adhiçiaturque piperis & turis tertie portiones, probatissi-
mum erit oculorū medicamentū. Id in area pixide recondit. Decoctū ra-
dicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinā impellit. Al-
uum, uomitionesque sistit. Natū in Sicilia Gramen, quod incolæ Cinnā
appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

D I O S C O R I D I S

C B A R B A R I C O R O L L.

C Ramen Parnaso monte, folium habet Hederæ, densius quàm fruticans, cum in reliquo orbe folia in exilitate fastigient. Succū huius excipiunt propter ubertatē, qui & dulcis est. Gramen Ciliitū, hoc est, Cinna. Sunt qui & Medon uocent; nec amburi eius recentis passu boues, sed pinguescere contendant. Nāto alterutris errore, quod alij πίμπρησι τοῦ βίου legebāt, alij πίμπρησιν.

De Siderite.

C A P. XXXVI.

sidaritis

Sideritin aliqui Heracleam uocant, Magi Genitiram, aut sanguinem Titani, alij Scorpionis urinā, Pythagoras Parmiton, Andreas Xanthophanea, Osthanes Bcephthalmon, Aegyptij Sendionor, Romani Vertemnium, alij Soleastrum, Aphri Vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluix accedentia, minora tamen, & hirsuta. Caules ædit quadratos, palmum saepe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentis. In quibus per interstitia, orbiculatæ uertebrae, ut in Marrubio spectantur. Et semen in eis nigrum. Nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulnera sine inflammationis periculo iungunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 32. ca. 17.

Sideritin primam, aliqui ueram Achilleum cognominant, alij Sideriten. Odoris foedi cum teritur, tradunt. Nostri Sideritin eam, quæ est laudissimo folio, Scopam regiam appellant, medentem anginis suum peculiariter.

De alia Siderite.

C A P. XXXVII.

D Lia Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu utraq; parte diuiso, pediculo longo, pdeuntibus e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quàm Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis foliorumque ad uulnera præcipua.

B A R B A R I C O R O L L.

Sideritis secunda, ramulos habet triangulos.

E X M. V E R G. C O M M.

Ingenue fatemur, in tanta ueterum & iuniorū diuersitate, nihil habere nos de Siderite, quod pro comperto tradere ualeamus. Quæ Plinius multis locis nunc de toto Sideritidum genere, nunc priuatim in hac, aut illa tradiderit, facile est omnibus uidisse, & cum uiderint censere. Nolumus nos labori eorū parcere; neque ingenij, iudicijque sui gloriam illis auferre. Quod autē nos in melioribus græcis obseruauimus, tacendū non est. Duo esse illis præcipua Sideritidis genera: Heracleam, id est, priorē illam; & Achilleam, quæ mox dicenda erit. Nec aliter Paulus Aegineta in. 6. tradidit. Eam Græci a ferro Sideritim dixerunt, quoniā glutinādis uulneribus apta, percipui in bello haberet usum; quod saepe ab eo metallo in græcis scriptoribus indicat, ex eadem scilicet caussa, ex qua quæ sequit Achillea militaris etiā dicta fuit. Dubitamus nos in priorē Sideritide, quo loco hic ait, habere Marrubij folia, longiora in, ad Saluix, aut Quercus. &c. abū dare earū notarum alterā fuisse; ex alio Sideritidis genere ab imperitiorē aliquo additā. Non enim possunt Querna Saluix folijs in cōparatione alterius coniūgi: tam dissimilia inter se sunt.

De alia Siderite.

C A P. XXXVIII.

Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in macerijs & uineis nascentē, folijs Coriani, a radice numerosis, dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & uiscido. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulneri imposita, sanguinem supprimat.

S I D E R I T I S tertia, similis Achilleo est, mox prodendæ, sed candidioribus folijs, & pinguioribus, tenuioribus cauliculis.

¶ De Achillea. C A P. XXXIX.

ACHILLEA. CAP. XXXIX.
alij Chiliophyllon, alij Strationicon, alij Heracleon, Latini su-
percilium Veneris, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefoli-
um, Aphri Afterchillos, & aliqui Achilleam Sideritum. Dodrātales, aut
maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circunda-
tos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, sub-
fuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato, & uiscido. Umbella
in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum annulanti-
bus. Prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab in-
flammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, &
cruenta uulnæ profluuiā in uellere. Decocto quoq; insident scēminæ
fluxione uulnæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

ἀχίλλεος

B A R B A R I C O R O L L.

B A R B A R I C O R O L L.

Sideritis Achilleos dicitur, quoniam inuenit eam Achilles, discipulus Chironis, qua uulneribus mederetur, & Telephum sanauerit. Alij primum Aeruginē inuenisse tradunt utillissimam emplastris: ideoque pignitur, ex cuspidē decutens eā gladio in uulnus Telepho. Alij utroque usum medicamento uolunt. Hanc nonnulli Panaces Heracleon appellauere. Nosri proprie Millefoliam, cubitali scapo ramosam: minutioribus quā Feniculi folijs, uesitam ab imo. Alij uerū Achilleon esse dicunt, scapo ceruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis eleganter circidatā. Alij primū genus Sideritis Achilleō uerū, ut diximus, acceperūt. Ethuria Millefoliā uocat, herbā in pratis tenuem, a lateribus capillamentis mō foliosam, eximij usus ad uulnera. Boij neruos absfoluit uomere, solidari ea, rursusque iungi, addita axungia, affirmant. Achillios, et Achillion uocatur quarra Sideridis, ut dictum est: et a latinis quibūdā Lumbus Veneris. Dioscorides Supercilium Veneris, non Lumbum dici uoluit, alterutro errore orto, quod Græci ὀφρύν lumbum, ὀφρύν supercilium appellant.

 $\text{Pli.li}_{.25}; \text{Ca}_{.5}$

B

¶ De Rubo. C A P. XL.

B A T O S a Græcis, ab alijs Cynosbatos, ab alijs, Selino-
rition, ab alijs Syntrophos, a Magis Titani sanguis, ab alijs I-
bidis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Sentes, a quibusdam Mo-
ra baticana, a Dacis Manthia, Aegyptijs Hæmōos, alijs Ametros ap-
pellatur. Rubus notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi.
Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & foemina-
rum profluuium. Præsteris morfui accommodatissimum. Gingiuas firmat.
Oris uitij folia commanducata medentur. Cohibent ulcera quæ ser-
punt. Vlceribus in capite manantibus, oculisque procidentibus remedio
sunt. Condylomatis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, &
stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum fo-
lijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari reme-
dio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in Rubo nascentis, q̃-
optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistit aluus præ-
maturi cibo, necnon flore in uino potus.

Cátreo

Pli. li. 24. ca. 15

CRubi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine. Chamæbaton uocant humilem Rubum, qui protinus quæ paulo accreuit, retro uergit in terram, atque ita radicatur, & Humilrubus a Theodoro dicitur. At Rubus inter arbores aquaticas statuitur. Rubi unum genus fert mora, quæ & manduntur. Huius radicis spongiolæ, duricia lapidis uisuntur. Alterum rosas: de quo in Cynosbato dictum est. Flos mori candidus, per menses colligitur. Locus Rubis confitus, quem nos Senticetum & Dumetum uocamus, Græci Bariam, & Apobaton appellant.

E X M. V E R G C O M M.

Commune græcis Batos Ruborum omnium nomen est; quo in toto hoc genere utētes, ad dictis notis aliquibus; species eius distinguūt. Chamæbatū uerbi causa, Cynosbatōue, aut Idæū batum uocantes; quæ tria sunt uniuersi generis huius discrimina. Latini mō Rubum, ut Plinius, modo Sentem, ut Columella appellant, Idæum rubum, uel Sentem, Canisq; sentem, & simpliciter sentem seu Rubum; quem autore Theophrasto libro. 3. de plantarum historia Chamæbaton, id est, humilem & terrestrem uocauimus. Verba eius quo diximus loco hæc sunt.

ἔτι δὲ καὶ τοῦ βάτιν πλείω γίνεσθαι. μάλιστα δὲ ἔχονταίς διαφέρειν, ὅτι ἐν μὲν ἑστειότεν καὶ ἴσως ἔχον. ὁ δὲ ἔτι πλεονάζει καὶ ἔνθε καὶ αὐτὸν ἔχον. καὶ ὅταν συνάπτῃ τῇ γῇ ἰσχυρότερος παλιν ὅν δὲ καλεῖται τινὲς χαμαίβατον. ὁ δὲ κυνέβατος ἔν καρπὸν ἐπὶ γῆρας ἔχει, καὶ παραπλήσιον τοῦ τῆς ρόσας. ἔστι δὲ ἰδιότροπον καὶ ἑμῶν μεταξὺ καὶ παρόμοιον τοῖς ρόσας, τὸ δὲ πολλὰν ἀγνώστου.

Quorum sensus est. Ruborum item plura genera. Præcipuam uero habent differentiam, quæ alter recta & in altitudinem erigitur. Alter deorsum & in terram uergit; & cum primum terram attigit, iterum radicatur. Vocantque hunc aliqui humilem, seu terrestrem Rubum. Qui uero Cynosbatos, id est, canis Sentis dicitur, fructū fert rubentem, punicæ cytino similem. Estque inter fruticem & arborem medius, punicæ similis, folio uitis. Et hæc Theophrastus de duobus Rubi generibus; quorum alter primo uoluntate a Dioscoride descriptus est, alter modo docei. Estque hic Chamæbatos, id est, humilis ille Rubus, Sentis, uel Rubus a latinis simpliciter appellatus. Cuius mora extrema æstate maturescencia, auius grato, & hominibus non inutili cibo in sepibus nigrescunt. Quæ inter Romanas Rubi appellationes in Dioscoride nunc leguntur; Vaticanaque dicuntur, augustiore unius Romani colitis, quæ ex reliqua Italia nominis nota.

De Idæo Rubo. C A P. XLI.

Batos idæus

D

IDæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proueniat. Est autē longe tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quamquam & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ supradictus. Cæterum flos cum melle, oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignē sacrum extinguit. Stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubus Idæus, in Ida, non alias nascitur, sub arborum umbra, rarioribus aculeis, & minus aduncis.

E X M. V E R G C O M M.

IDæus Rubus hic dictus est, quoniam in Ida, nec alibi copiosior nascitur, tenerior, paruis aculeis, & aliquando, ut hic ait, nullis. Tertiū genus in superiore illa diuisione nostra faciens. A loco græci appellauerunt, ob eam quam diximus causam.

Idæus

De Helxine, id est, murali hærbæ. C A P. XLII.

Helxinen aliqui Elirim uocant, alij Canocersæam, alij Amelxinē, alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sucotachos, alij Psychuacos, alij Psychouacos, alij Melampelon, alij Cittampelon, alij Cissamethon, alij Anatetamenon, Romani uolutum Lapparon, Aegyptij Apap, alij Parthenion, alij Sideritin, alij Heracleam, nonnulli Agriam, quidam Clibodion, alij Polyonymon. Nascitur in sepibus, uinetis, macearijs, et segetibus; Folia ei Mercurialis adsunt, hirsuta, cauliculi leniter rubentes, & circa eos ueluti semina aspera, adherentia uestibus. Folia refri-

gerandi spiffandiq; naturam habent. Qua ex causa sanant illitu ignes sacros, adusta, condylomata, incipientes panos, tumores, inflationesq;. Succus eius cum cerusa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt apud sine illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircino seuo, aut carato cyprino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonillis inflammatio ne turgentibus, utilissime & gargarizatur, et illinitur. Succus in aurium dolore infusus, iuuamen præstat.

BARBARI COROLL.

Helxine duplex Dioscoridi, & omnino autoribus. Altera Partheniō, altera Cissanthemos ab Hederæ folijs uocata. Plinio item duplex, sed alter. Altera de qua hic agitur Parthenij & Perdicij, siue Perdicidis cognomine: qm̄ perdicēs hac præcipue uescantur. Folia tamē ei non Mercurialis, ut Dioscorides, sed mixtæ similitudinis, Plātagini & Marrubio tribuit, cauliculis densissimas infici, semina in capitibus lappaceis adhærescentia uestibus: a quo & Helxinem dictā uolunt. Hanc Aeliæ gentes, & Aegyptij edunt. Crassas, plurimasq; habet radices, ut inq; Plinius. Altera idem autor inq; uerior est Helxine, cui radix foliosa, ex qua similis malo carduus feminis plenus extuberat. Seminalis Acanus a Theophrasto dictus, cuius inciso summo uertice, lachryma erumpit iocundi saporis, Acanthica Mastiche uocata, proptereaq; adulterium ex ea fit, ut diximus. Germinat, atq; floret æstate folio, & caule, lanugines spinosas habens. Hæc Plinius. Nos hanc non Helxinem, sed Ixinem uocari credimus: ut in Chamæleonte candido dictum est: quanq; porro prior Helxine Perdicion, & Parthenion dicatur. Aliud tamen intelligo, Plinium secutus, Perdicion, quæ a nostris herba Vrceolaris uocatur, ab alijs Astericum, folio similis Ocimō, nigrior tantum, nascens in regulis parietinisq;: ob id & Parietaria, et Muralium, & Muralis uulgo dicta, & Vineago: & Parthenion, qm̄ a Minerua in somno contra præcipitia lapsusq; monstrata est Pericli Atheniensium principi, cū uernula ei charus ex altitudine cecidisset, Splachnopes appellatus. Turtures, columbæ, gallinacci annuum fastidium deducere dicuntur Helxina pasti, autor est Plinius. Triplex igitur inuenio Parthenium. Vnum folio Coriandri, quæ Amaracus a Galeno, Parthenium a Dioscoride nominat, uulgo Matricaria. Alter folio Mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue Plantaginis & Marrobij, ut Plinius, quæ dictæ Helxine, ac de ipsa hic agit. Tertium folio Ocim, quæ Parietaria, & Muralis uocetur: de qua mirum est Dioscoridem nihil præcipere, qd scia. Nisi qd eum dicat sub Helxine hanc qd accepisset: qm̄ hirsutula sit, & adhærescat uestibus, nec a Mercurialis herbæ folijs omnino multū distet, præterq; qd Mercurialis serrata leuiter ea sunt, Parietariæ non sunt. Sunt qui & Mercurialem ipsam Parthenion quoq; dicant Helxinem, ut Dioscorides in Myosotide scriptum reliquit. Eriam Alsine dicta est. quanq; corrupte in Theophrasto legitur Alsine, ubi Theodorus Volucrus interpretatur, arbores amplexu Hederæ modo frangulantem.

EX M. VERG. COMM.

Pluribus, & inter eas aliquot plantis alijs cōmunibus Helxine appellationibus qndam indicata est. Testantur in grecis id Græcorū medici, qui Helxinem primo Perdicium, Partheniū, Sideritum, & Heradeam uocari aiunt. Mox & Cissampelum. Duobusq; capitibus de eiusdem nominis herba agentes, neq; eandem utriq; uires tribuentes, duas manifeste Helxines eodem nomine, sed diuersa natura constituisse uidentur. Præter eos Nicander etiam in Theriacis suis Parthenij primum, mox Helxines facta mentione, utraq; cōtra uenenata laudauit. in *χρ. ιχθ. αν. τινος κλισταιν καλινει*. Quo loco interpretes eius, Clybatim, Sideritum, Parthenium, & Perdicium, & omnibus his unam eandemq; plantam uocari ait: iterumq; *χρ. μὲν παρηνίοιο*. &c. Iterumq; idem interpretes testatus est, Parthenium a quibusdam Helxinem, et Perdicium nominari. In latinis Plinius lib. 21. capite. 17. his uerbis græcos secutus est. Helxinem aliqui Perdicium uocant: quoniam Perdicēs ea præcipue uescantur: alij Sideritum: nonnulli Parthenium. Non licet in tam concordit rotæ testium fide, tam multis appellationibus dictam fuisse quondam Helxinem, non fateri. Non ideo tamen credendum, unam duas esse plantas, notis & uiribus diuersas. Oportet enim in cognominibus unum esse quod primo, uere, & per se nomine illo indicetur: tum ex similitudine ad id nomen alia admitti: quæ genus suum seruantia, in parem nominis tātum societatem, cōmunionemq; adoptione illa ueniant. Esse autem duas Helxines, dissimiles naturæ inter se notæ ostendunt: & post naturam antiquiores græci, præsertimq; Paulus

[illegible]

¶ De Elatine.

C A P. XLIII.

ἐλατίνῃ

¶ De Elatine. CAP. XLIII.
Elatine folia habet Helxinæ, minora, rotundiora, pilosa, semper
 dalibus ramulis, quinis senisue, a radice foliosis, gustu adstrin-

gentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus & in A
 inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis. Eadē
 cocta forbiuionis usu dysenteriam sistit.

BARBARI COROLL.
 Latine, folio Casia a Plinio describitur: cetera cum Dioscoride conueniunt. Corruptam
 in Plinio lectionem esse haud sum dubius, librarijs Casiam pro Helxina substituentibus: quan-
 doquidem Elatina modo uisitur, Helxinæ similis, hoc est, folio Hederae propinquo, non Ca-
 sia: cuius id oleaceum est: ut in Chamaelea dicitur.

Pli. li. 17. ca. 9.

EX M. VERG. COMM.
 Similis Helxinæ Elatine est, non simpliciter, sed ei quam folio Hederae Cissampelon uocari
 diximus: eamque ob causam ab Helxine statim tractata, Eam ueteres graecorum medici medio-
 criter adstringere, & refrigerare dixerunt.

De Eupatorio. CAP. XLIII.

Evporium, siue ut alijs placet Hepatorium, aut Hepatitis, fru-
 ticosa haerba est, unum efferens caulem, lignosum, nigricantem,
 rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem. Folijs per
 interualla Quinquefolij, aut Cannabis similibus, quinquepartito, aut
 amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum serratis. Semen medio cau-
 le erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret.
 Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agre
 cicatricem trahunt, medentur. Haerba, aut semen in uino potum, dy-
 senteria, iocineris uitijs, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui
 aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, ut
 exposuimus.

ἑνπατόριον

BARBARI COROLL.
 Evporium, & Eupatoria quoque dicitur. Regiam & hac auctoritatem habet, folijs plum-
 sis, modo caulis, flore candido, radice superuacua. Mauritani aliud Eupatorium demonstrat,
 officinis penitus diuersum figura, sed effectu par, scapo exiguo, fere cubitali, folio Centauri
 minoris, frutice odorato, sed flore magis, q̃ luteus ei est, radice superuacua. Passim nascitur.

EX M. VERG. COMM.
 Verunt quondam, & adhuc sunt, magnæ inter autores & medicos litis Eupatorium, & Ar-
 gemone. Nec persuaderi adhuc possunt aliqui, nō esse Argemonem Eupatorium: ex tam mul-
 to tempore, tamque antiquæ fidei in medicina autoribus, ea multorum animis opinio insedit.
 Licetq; hic iam pridem in Anemone, & nunc in Eupatorio dixerit decipi plerisque, falsoque crede-
 re Argemonem Eupatorium esse: non desinunt tamen quotidie pro eare uiolenter aliqui cer-
 tare. Verba eius in Anemone sunt, qualia poterunt uolentes cum liberit uidere: ea nunc etiā
 repetita ab eo sunt. Nosq; illorum memores, necessario locum in extremo hoc capite emenda-
 uimus: & pro Artemisia, Argemonem uertimus. Quod enim hic ait, quosdam Artemisiam
 hanc uocasse deceptos, alia enim est ut præmonstrauimus, in Artemisia non legitur, at in Ane-
 mone manifeste id inuenitur. Sunt Diosco. in Anemone uerba hæc, ἡνὶ δὲ μὴ ἀντάμνηται διαρίσιν
 ἀπὸ τοῦ ἑρπιά ἀντάμνηται τὴν λεγόμεν ἄργεμόνην, καὶ τὴν ποσειδά μύκωνα. περὶ ἧς ἐν ταύτῃ μύκωνι ἰσορρο-
 πῆ διὰ τὴν ἀντιπῶν ὁ μόχρον φανικῶν ὑπάρχει πλανῶνται τὴν ἑρμιόνην ἑνπατόριον ὀνομάζοντες. &c.
 Quorum sensus est, qui in Anemone redditus a nobis fuit: cui & hic respondet locus. Neq; Ar-
 temisiam, sed Argemonem falso inquit Diosc. credere quosdam Eupatorium esse. Neglexerūt
 hoc alij interpretes, quod alioquin multifaciendum erat: ut quale uerū Eupatoriū esset aliquan-
 do cognosceretur. Vidimus nos in maioris ciuitatis nostræ Nosocomij hortis natam plantā,
 quæ omnibus a Diosc. traditis notis, ueram Eupatorium se ostenderit: præsertimq; semine in
 teram decliui, & postq; aruerat uestibus hgerente. Nihil in quotidianis multarū plantarū obserua-
 tione certius antiquæ historiæ respondere aliqui mihi uisum est: surculosum genus, singularis
 uirga, lignosa postq; aruit duricies, plumosa undiq; aspitata, color liuens magis q̃ niger, & folia

C per intervalla, sed contrarijs pediculis pendentia. Quod non penitus huic scriptori responde-
re uidebatur: comparatio tantum erat, qua Cannabis, aut Quinquefolij folijs ea comparaba-
tur. Cetera naturæ & Dioscoridi eadem omnia erant. Regiæ dignitatis herba Eupatorium eti-
am est, ab Eupatore rege inuenta. Et quoniam iecori præcipue medeatur, quod græci hepar
dicunt, ideo Hepatorium, & Hepatitis ab aliquibus dicta.

De Quinquefolio. C A P. XLV.

πεντάφυλλον

Pentaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentada-
ctylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, nō
nulli Xylopetalon, alij Asphalton, alij Pentaccenon, alij Thymiatitū,
Aegyptij Orphitebœocen, alij Enotron, Magi Ibidis unguem, alij Ibi-
dis pennam, alij Hermodactylon, Romani Quinquefolium, Galli Peni-
pedulam, Daci Propedulam appellant. Ramulos fert furculaceos, tenu-
es, palmi magnitudine, in quibus semen. Folia Menthae, quina singulis
pediculis, raro plura, in ambitu serrata. Florem ex luteo pallefcemtem,
interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Sub
rubram habet radicem, oblongam, Veratro nigro crassiore. Plurimis
pollet remedijs. Jus radice decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, den-
tium dolores sedat. Putrida oris ulcera, collutione sistit. Arteriæ scabrie-
cias, gargarizatu læuigar. Contra alui profluuia, & dysenterias auxilia-
tur. Item articulorum, coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in ace-
to & illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duricias, absces-
sus, & distentiones discutit. Ignis sacros, reduuias, condylomata, pso-
rasq; sanat. Teneræ radice succus contra iocineris pulmonumq; uitia
prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto
uino, & piperis exiguo bibuntur folia, contra febrim circūitus. In quar-
tana quidem quaternum ramulorum, in tertiana uero ternum, in quoti-
diana unius. Tricena quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus præ-
sunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime res-
igio morbo medetur. Illita cum melle, & sale, tam uulneribus q̃ fistulis
remedio sunt. Enteroceliciis auxilium præstant. Quinquefolium sangui-
nis profluuiâ & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, et san-
guinis eruptiones inciditur.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25. ca. 9.
Theo. lib. 9.
de planta. hi.

Pentaphyllon, & Pentapteron in Theophrasto, Theodorus Quinq;foliam, & Quinq;pen
nam conuertit. Aetius hanc Hermubotanem, hoc est, Mercurij herbam uocari tradit. Aegyptij
etiam Dissylphi cognominant. Daci Drôcila. Itali Psyllitum, Solotam, & Thebeotin: quan-
quam corrupta puto nomina. Nam & Therumbros, & Theonestron quoq; dictam inuenio.
Radice cum recens est, rubente, nigra: cum inarescit, quadrangula: folio uitis pusillo: auge-
tur, definitque cum uite: caulibus tenuibus, crebris geniculis. Nomen a numero foliorum.
Quidam Græci Chamæzeleon, quasi fruticem terræ uocant. Commendari Quinquefolium
fraga terrestria gignendo, Plinius existimat. Ego id, qui uerum esse possit, non intelligo. Nam
herba ea quæ fraga gignit, Trifolia est, non Quinquefolia, flore candido, non luteo, in Rheti-
eis & Vindeliciis alpiibus, etiamnum frequens secus uias. Hippocrates duo uidetur nouisse
Quinquefolia. Candidum, quod & herbaceum, & procerius est a terra. Nigrum, quod humi-
lius. Est & quæ Tormentilla uulgo dicitur Quinquefolio simillima, nisi q̃ septem, non quinq;

habet folia. Potest a nobis Heptaphyllon uocari, hoc est, Septemfolia: ex cuius radice passillos theriacos (si Diosphrastus) officinae pro uiperarum carne subiiciunt: quoniam uiperæ modo, ut ipsi putant, nunquā uisuntur.

E X M. V E R G. C O M M.

Nouerunt rura omnia Quinq̄foliū, soloq; hoc nomine maxime cognitum ubiq; in honore aliquo est. Theophrastus, s. de plantarū historia non Pentaphyllon tantū uocari sua ætate dixit, uerum Pentapetes etiam, factū ab aliquibus illi nomine a pennis autum, ut credidit Gaza: ut autē nos opinamur, quia in quinque folia se pandit, & extendit. Fecit eadem etiā foliorū forma, ut Pentatomon, id est, in quinque partes diuisum diceretur. Sic Pentadactylon, quod ut in hominis manu quinque digiti sunt, sic in ea planta totidem foliorū diuisiones. Pseudoselinon dictum etiā, quod Apium mentiatur, sitq; illi in foliorū sectionibus illis quadatenus simile. Quæ itidem illi a gentibus aliæ appellationes fuerunt, aliquā huiusmodi causam habuerunt. Quales Callipetalon, & Xylopetalon sunt, a foliorum specie & diuicie factæ. Quemadmodū uerisimile est, in barbaris illis latere incognitā modo nobis, ex figura, aut uiribus eius rationē aliquam. De radice, folioq; eius libro, s. de plantarū historia agens Theophrastus, addidit, nigrescere Quinq̄folij radicem effossam, siccatamq;. Quod a Dioscoride ideo dictum, non est, quoniam satis fore sibi hic scriptor credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Post id enim tempus medicis certo loco signatam, seruari relinquebat. Adiecit etiam Vitigineum Quinq̄folij folium esse, non quantitate (pusillum enim est) sed colore & forma, & quasi naturā Vitis sequeretur, augeri simul, & tabescere cum ea, & caules per terram spargi graciles, crebras, habentes, ut ille ait *κνίμας*, non crura, sed a cruris humani forma inter duos geniculos interualla, quæ *κνίμας* ille, qua diximus ratione uocat. Videndum illud etiam, quo modo hic Menthæ, ille Vitis folio Quinq̄folium esse dicat. Nobis male inuicem comparari posse plantarum illarum folia inter se uidentur: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile, ut illud. Videmus enim aliquando in pallore hominis utrunq; colorem illum.

De Phœnice.

CAP. XLVI.

Phœnicen aliqui Rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicopterion, alij Rhonstachyos, alij Osthaleu, Aegyptij Athnon nominant. Folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam Lolio similem, ramus digitorum senuum, radici aduolutos, septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum uirū compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infraenet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere, & suspensam, sanguinem supprimere prodant.

B A R B A R I C O R O L L.

Phœnix a Plinio dicitur herbæ Phœnicæ, inter fruges ab eo posita: quoniam a nostris Ordeum murinum uocetur.

Pli. li. 22. ca. 15.

E X M. V E R G. C O M M.

Herbæ nomē fecit color, q̄ non dissimilis in ea maturis palmulis uidet. Eaq; ob eam Phœnicopterios, a puniceo coloris aue dicta etiā ab aliq̄bus fuit. Nascit hæc in tegulis frequentior, q̄ in aruis. Dico autē regulas nūc a tegedo, oēm qua domus tegit, & hymbriis stillicidia deriuant materia. *σῆμα* enim hic, non *ὑψαυρι* dixit: qua uoce Græci indicauerūt, quæctq; familiā a cœlesti aqua uenit, siue siciles regulæ, siue ex materia tabulæ, siue stramēta sint. Hordeū murinū Plinius uocari a latinis ait: q̄ hordeaceo folio sit, & seminibus eius iter regulas mures uescant: hic Lolium murinū, a spicæ figura: utraq; idē, sed diuersa rōne. Quot ramuli, uel potius culmi illi sunt, tot etiā spicæ. Diximusq; nos, sedigiales culmos illos, lōgitudinē, nō crassitudinē eorū intelligētes.

De Idææ radice.

CAP. XLVII.

Idææ radici folia sunt ea, quæ Rusco. Adherent his, ueluti exigui pampini, in quibus flos. Radix spissandi, cohibendiq; naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota citam aluum,

P iij

Idææ pampini

C mensescq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

BARBARI COROLL.

Idae radix, acerbæ gustu, miseri solita lætantium in palestra pulueri, ad ea quæ repercutere tantum oporteat, ut Paulus Aegineta scribit.

EX M. VERG. COMM.

Radicem Dioscori, Pliniusq; herbæ Idæam uocat; alter a tota natura, alter a potiore eius parte, & quæ sola medicinæ inferuit, eam appellans. Peregrina Italix planta est, peregrinitatq; suam natalis loci cognomine indicat. Rusco, de qua in extremo uoluntate hoc agitur, omnes eam comparauerunt; cuspidatis ideo folijs herbam intelligere oportet, sed non tam solidis, rigentibusq; ramulis, ut Ruscus est: quando Helices secus folia habere hanc Dioscorides ait, Plinius uero eiusdem rei significatione pampinos.

radix piper

De Rhodia Radice. CAP. XLVIII.

Gignitur Rhodia Radix in Macedonia, Costo similis, leuior, inæquabilis. Quæ contrita Rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum Nardo imponatur.

BARBARI COROLL.

Habetur & Radicis Cinthix mētio Hippocrati, fouendis fœminarū locis. Inuenio & Rhodion uocari coloris genus Democrito, Italicū præferente in uellērū tinctura: fortasse id, quod nos uulgari nomine Rosaceum uocamus. Galenus Rhizam, hoc est, Radicem ab eo dici genus quoddam sati scribit, sine caule, sine flore, sine semine, tribus dūtaxat folijs, sed proceris, & in terra stratis, digitorum duorū magnitudine, similibus Anchuse, radicē ipsam prætenue, purgandi uiribus, sed exiliter. Alia tridē herba, quæ uocat Oxysa Plinio, etiam si folia æque terma habet: quippe quæ non purget, sed contra potius adstringat, & ad stomachū dissolutū, & Enterocleas in cibo detur. Proinde sunt, qui Oxyn putent esse, quam uulgo Tauram, & Triada, hoc est, Trinitatē, & Sphragida, hoc est, sigillum Solomonis appellauit, folio triplici, aut uno potius in trina disposito, radice capillamētis multiplici, flore cū maculis quibusdam candidis ceruleo. Est & Ophrys Plinio herba denticulato oleri similis, folijs duobus, quæ capillū inquit denigrat. Est & Mambiras herbulæ cuiusdam radícula, ut Paulus notat, geniculis frequentibus nodosis, albugines, & cicatrices exterens, atq; comminuens.

EX M. VERG. COMM.

Rosæ, quas Græci Rhoda nominant, non Rhodus insula radici huic nomē fecerunt. Quæ autem, & cuius plantæ radix ea sit, legisse me hæcenus non memini. Nec integrū undiq; caput hoc uidetur. Desyderatur enim in eo aliquid: præsertimq;, quo loco hic ait, Imponitur cum Nardo tenuis, & mox fronti temporibusq; inspergitur. Duplex remediū ratio docetur: ut imponatur capiti scilicet, & inspergatur ea frons, temporaq;. Verum in utroq; desyderatur aliquid, quo scilicet addito liquore inspergenda sit fronti & temporibus. *ἡ ὀφρυς* enim participium, quo hic usus est, id exigit.

ἡ ὀφρυς

De Equisetō.

CAP. XLIX.

Equisetum Græci Hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin, alij Cheredranon, alij Phædran, alij Iuandendron, alij Gis, alij Scœniostrophon uocant. Aegyptij Pherphram, Magi Saturni cibum, Romani Equinalem, alij Equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeū inanes, geniculati, in se facti, rubescentes, scabri, & iunceæ circa eos folia, crebra, exilia. In sublime Equisetum attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura: Vis eius spissare. Quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Vrinam cit. Sanguinolenta uulnēra glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim, orthopnoeam, ruptaq; ad

iuuat. Folij in aqua potis, diffeciones uſicæ & inteſtinorum, enteroce
læq; in unum cõaleſcere, cogiq; feruntur.

HIPPURIS, Equiſetũ, & Equiſelis dicit a latinis, inuiſa ſeniſecis, naſcens in pratis. Eſt autẽ pl.
lus terræ, Equinæ ſetæ ſimilis, ut noſtri tradunt. Græcorũ aliqui Pinũ folijs nigricantẽ, eodem
noĩe appellant. Hanc uero, quæ hic deſcribitur, folia habere pauca, tenuia, exigua, iunceas co
mas, ſemen rotundũ, ſimile Coriandro. Naſci in arbuſtis maxime, auctoꝝ Plinius, hanc herbã
Dioſcõrides a Romanis Salicẽ uocari tradit: de qua fortãſſe Verrius, homo doctus apud Feſtũ
intellegerit, cũ diceret, uirgulti gẽnus eſſe Salicẽ: non ridicule, ut idẽ Feſtus carpit, interpiatus:
q; ea celeritate creſcat, ut ſalire uideat: qũ Græci q; hanc & Iteamdendron, & Anabaſin a Salicis
quãdã ſimilitudine, & à ſcandẽdi more uocant. Alio loco Plinius, Ventolo tractu naſci, inq;
ſcanditq; arbores, et ppendentẽ ex ramis, folio nullo cirris nũeroſam, qui ſunt lunci gẽni
culati, radiẽ pallida. Nec mirũ ſit alicui, q; folia modo pauca, modo nulla tribuant. facit hoc
& auctoꝝ, quos ſecutus eſt, et locoꝝ, atq; tempoꝝ diuerſitas. Hanc ipſam Cauũ, ſive Dau
cum uocari legas in aliq; codicibus: uetuiſta tamen exemplaria id uocabulũ non habent.

Pli, li. 26, ca. 13.

EX M. VERG. C O M M.

Suideat naſcentẽ aliquis Equiſetũ herbam, exeuntq; ex terra aliquoꝝ diebus contẽpletur,
nunq; unde futura ſit equina cauda in ea intelliget: tam breui, nudo, concretoq; oritur aſpara
go & ſcapo. Nullibi diſſimiliore natura ſinem, q; in hac planta a ſuo principio fecit. Oritur em
humani pollicis longitudine, craſſitudineq; in acutũ ſaſtigiatũ: mox procedente tẽpore pandit
concretũ ille ſcapus, pandensq; ſe per interualla, & inter ea certis ſpacijs iunceæ folia, & quaſi
capillamẽta quẽdã proferit: quæ dum augẽtur, undiq; ad terrã ſeruntur, eadẽ gracilitate qua in
equinã cauda pili ſunt: quã non poſſet oſtendere, niſi cum aut uiuens prona pender ex alto, aut
ſectã ad terrã inuerſo cãcumine deſcendentibus iunceis & capillatis folijs illis, totã equinã cau
dã imaginẽ reddidit. Nota oĩbus planta, & qua nulla in ſoſſis ppe aquas umbroſas libetẽr hæret.
Charadranon itidẽ, q; in ſoſſarũ faucibus, q; Græci χαράδραν uocãt, ortus & uita illi ſit. Nec mi
nus Ephydrom ob eandẽ cãm, niſi em aliud, q; in τῷ ἑφύδρῳ .i. in aqua Ephydron ſignificat.
Vocauerũt aliqui etiã Schœnioſtrophon, q; iunceæ eius folia illa non aliter, q; Cannabis, aut
Linũ in funes texunt. Græci Salicẽm arbore, & Romani Salicẽ equinã ob hanc ipſam cauſam
uocauerũt. Plinius lib. 18. cap. 27. inimicã ſeniſecis & inutilem pratis dixit: mox lib. 26. cap. 14.
iterum de ea agens, non cõuenire inter græcos, nec cum græcis latinos ait. Vulgaris tamẽ de
ſcripta a Dioſcõride hoc loco herba eſt, oĩbus locis cognitu & inũtũ facillima.

De altero Equiſeto.

CAP. L.

Alterum Equiſetũ, quod aliqui Equition, aliq; Chedran, aliq; Gy
non appellant. Caulis eſt rectus, cubitalis, aut maior, inanĩs. Co
mis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum a
ceto tritum, uulneribus remedio eſt. Eademq; fungitur facultate.

B A R B A R I C O R O L L.

Sciendum Hippurin uocari & piſcem quendam, ſive Hippurea: quem aliqui etiã Cory
phaẽnem cognominant. Diſſert ab hoc, qui uocatur Hippus, ab Epicharmo dictus Iſpidion,
ſive ut legunt aliqui, Liſpidion.

Diſſert a priore Equiſeto poſterior hæc ſola comarum breuitate, candore & mollitiẽ: quæ
maiores in hac, q; in illa noĩe ſunt: ideoq; facillimã utraq; cognitionis: deſyderat ſolũ, cui
æqualem hic caulem emiſcat, congeneris ne ſibi antedictæ, an alterius plantæ alicuius in
certum id eſt. *ἵππῳ* hic tantũ ait, eamq; ob cauſam uitiũ nota ſignatus locus a nobis eſt.

VERG.

De Cocco, ſeu Inſectorio.

CAP. LI.

Coccum quo inſectores utũtur, frutex eſt ſurculõſus, paruus, cui
grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimũ gẽ
gnitur in Galatia, et Armenia. Deinde Aſia, & Cilicia. Vltimus ex omni
bus Hiſpanicus. Viſ huic ſpiſſandĩ, Vulneribus neruiſq; præciſis, con

κόκκος βαφικῷ

Cuenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoq; in Ciliciæ Quercubus, cochlearum exitium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

Pli. li. 9. ca. 41.

DIFFERT Coccus Baphica, hoc est, granū tinctoriū, a Cocco Gnidio, siue Grano Gnidio, ut aperitissime cōstatit Galenū, & utriusq; notas cōtēplantibus, Magnitudo huic, id est, Gnidio Grano, piperis maior, uis ardens, rotundū, rubensq; est colore Cocci. Frutex, qui hoc ferat, Thymælea, siue Chamælea dicit. At qui tinctoriū granū gignit, aut priuatim Coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut Illex est Aquifolia. Granū inquit hoc Plinius, rubens est, prius mūq; ceu specēs frutices paruos Aquifolia Illicis. Quisquiliū uocant, Pensionē alteram, tribu ri pauperibus Hispaniæ donari. Est em Illex gemina, ut Columell placet, Minor, apibus quæsi ta, & prolixior, ab oibus improbata mellificio. Omnes inquit Plinius, roboris dotes, Illex solo prouocat Cocco. Granū hoc Galatiæ, aut circa Emeritā Lusitaniam in maxima laude inquit ha bebat. Gignitur & in Africa, & Pilsidia, Pessimū in Sardinia. Est autē genus ex eo inquit in At tica fere, & Asia nascens, celerrime in uermiculū se mutans: qđ ideo Scoleilon uocabant: im probabantq; Limaci paræ similē: culici, ut Dioscorides affirmat, & Pausanias: qui fruticem hunc in Locride cōpiosum ad Ambrysom Rhamni amplitudine, præterea Lentisco similem, nigriore tantū, & molliore folio describit. Fructū Solani qđem specie, sed Erui magnitudine. Colligendū præcipuū anteq; uermiculus is nascat. Galatæ, qui supra Phrygiā sunt, gentilier Liyg uocant. Eum fruticē Iones & Græcia tota, Coccū, Anniculo itaq; Grano, succus ad pi gmetra languidus. Quadrimo euānidus. Ita nec recentū uires, nec senescenti. Colos inter Princi pales, Imperatorijs tantū paludamētis dicatus: qualis in Rosa micat, & quo nihil aspectu grad us, & in purpuras Tyrias, Dibaphasq; aut Laconicas: etem Tyrio primū tinctas, mox & Cōc co tingere mos erat, aut contra, ut fieret Byssinū. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturaban tur. Vnde noia illa uestiū, monocolos, dicoros, tricoloros, tetracoros, pentacoros in uitis prin cipū. Sit autē granum Tinctoriū, an Phœnicobalanus, atq; Palmula, qđ Hippocrates Phœni cion Coccon, quasi granū puniceum uocauit, æstimaturis relinquo. Illud quoq; hoc loco refe rendū est, Coicina quædam legi apud Græcos texta, quæ nostri ceu Coccina legentes, in Sra bonē rubra, cōuerterunt. Cæteriū Coicina dicuntur a Coice frutice in Aegypto textili: cuius mentio & apud Theophrastum est. Coix inquit, folio Harundinis angulari, ad nexus utilis, a quo & fiscella genus Coix attice, ut inquit Pollux, quod dōrice Cois dicitur.

E X M. V E R G. . C O M M.

Cocum nasci in Illice Theophrastus lib. 3. de plantari hist. dixit, καὶ ἡ πρῶτος τὸν φοινικῶν κόνιον. Et Illex puniceum Coccum. Quē Plinius secutus lib. 24. cap. 4. Coccū Illicis ait. Idem tamē multo antea lib. 16. cap. 3. dixerat, Seruato Illicis genere, priuatimq; ceu specēs frutices paruos Aquifolia Illicis. Ex quo genere hic fruticem paruū, furculosum dixit: qualem & nostra ætas in legendo Coccō, in Romanorū prouincia quotidie uidet. Barbarus, q; græcos codices secutus fuerit, quos nos etiā uidimus, in quibus non legeretur μικρός, eam reliquit partē. Nos ex alijs græcis, Pliniq; historia admoniti, eam seruauimus uocem: Paruos em frutices ille ait, quē hic ὁ μικρὸς ἐν τῷ μεγάλῳ φραγνός dicit. Quod autē Dioscorides ait, hæere Coccū fruticibus his ὁ φραγνός, id est, lenticularū modo, non ad formā Granī, sed hærendi modū referendum est. Nota modo, & uulgaris res, quæ etiā ex alijs nationibus laudetur. Quōd postremo hic ait, in Cilicia nascentē in roboribus Coccum, minimis cochleis similē, ab incolis mulieribus ore auelli, aut excipi, parum certā & uerisimilem nobis habet historiā: neq; intelligimus, in quē usum id fieri opus fuerit. Corruptum credimus esse locum, & pro illo τὸ στόματι, quod ore significat, aliter quoniamdam legi potuisse, pertinereq; ad tempus, quo legendus Coccus esset.

πράγιον

Tragium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco simile, & semi ne, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaç illitū spicula e corpore eijciunt. Omnia quoq; corpori impacta, euocant. Pota stranguriæ me dentur. Calculos uesicæ frangunt. Menses trahunt. Modus in sumptio:

De Tragio.

C A P. LII.

ne est, drachma una. Fama est, syluestres captas sagittis confossas, eius A
hærbæ pabulo spicula excutere.

T Ragon alij similem Terebintho faciunt, alij Iunipero per omnia: succo lacteo, qui spissatur in gummi, nascentem non alibi, q̃ in maritimis Crete. Dicitur & Tragonis.

P EREGRINO Italix, gentibusq; alijs frutici nomen in Creta insula tantū caprinum pecus fecit, ob eam quam hic in extremo capite caussam reddidit. Plinius Terebintho primum lib. 17. capite. 21. innox Iunipero. 27. uolumine, ultimo capite similem fecit. Ex qua hominis diuersa eiusdem rei historia facile est conijcere, modo hos, modo illos delibasse cum auctores: ideoq; multis locis non esse earundem rerum eandem illi historiam. Idem liquorem eius lacteum esse, & in maritimis nasci dixit. Nos in peregrino, & ob id incognito frutice nihil habemus aliud, quod monere legentes ualeamus.

De alio Tragio.

CAP. LIII.

E St & aliud Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, alij Scorpi
on, alij Garganon, Romani Cornulacam, Daci Saliam, Aegyptij
Sober, Aphri Achæosim. Folia Scolopendrij habet, & radicem syluest
ris Rhaphani, tenuem, candidam. Quam crudam, uel coctam esse, dys
sentericis prodest. Folia autumno, hyrci uirus olent: exinde sibi Tragij
nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

BARBARI COROLL.

T Ragon hæc minor est priore, nec in Creta solum, ut illud, sed multis locis nascitur, ut Galenus inquit.

EX M. VERG. COMM.

P Riori posteriorem hanc Tragion cognominem tantū faciunt Galenus, Paulus Aegineta, Græcorumq; alij herbarij omnes, & medici: neq; immerito. Siquidem foliorum figura differt, quæ in hac Scolopendrij, in illa Lentisci sunt. Differt natalibus: q̃ illa natuum sibi solum habet Cretam insulam, hæc ut Paulus Aegineta ait, *φύεται πανταχού*, quod est, multis locis nascitur. Differt postremo uiribus: quæ in illa *ιυκτιμαί*, id est, extrahendi sunt, in hac adstringentes: ideoq; fluidis affectionibus cunctis accommodata. Accedit his, q̃ hæc amariore sapore est, qui in illa non sentitur. Cur autem illi idem factum a gentibus nomen fuerit, hyrcinum foliorum uirus fuit. Hanc ipsam Dioscorides Tragocerota, id est, hyrcinū cornu dictā testatur. Facileq; est ex græca hac uoce, Romanā illam Cornulacā, quæcunq; ea est, factam fuisse, Scorpij deinde appellatio male ex Trago, quæ mox dicenda est, ad hanc translata fuit.

De Trago.

CAP. LIIII.

E St etiam hærbæ Tragos, quam aliqui Scorpion, aut Tragonon
uocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut ampli
or, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis,
ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum ad
stringente. Racemorum grana decem ex uino pota, coeliacis, & scem
nis fluctione uulux laborantibus auxiliantur. Tunduntur a plæriscq; &
in pastillos digeruntur, quibus utuntur.

BARBARI COROLL.

T Ragon Asia fert, ueprem ut Plinius dicit, sine folijs, racemis rubentibus, ad medicinæ dumtaxat usum. Hanc & in littoribus nostris gigni modo perhibent herbarij, Iunco marino si
mitem: a quo & Iuncum marinū multi uocant eam. Tragos alia est, quā nos Hyrculū uocau
mus inter Nardos. Item alia Sitodes, hoc est, cerealis cognominata, inter frugesq; dicta.

EX M. VERG. COMM.

P Eregrina & hæc Italix planta est, si Plinio credimus, qui natale solū Asiam illi assignauit.

C duobus locis, eam describens. 13. uolumine, primū capite. 21. mox. 27. capite. 12. Quæ poterunt uolentes certius in eo uidere. In luncorum genere aliqui eam numerant, nec dissimilem marino Iunco in aliquibus faciunt. Plinius Veprem uocat, sine folijs, ramis rubentibus, semipedem altam, fruticosam, racemis rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, in maritimis nascentem. Quæ eadem fere huic scriptori historia est.

De Iunco.

C A P. LV.

χίονος

Oxyſchinos aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs Solis superciliū, Romanis Iuncus marinus, aut Manualis dicitur. Duo eius genera. Vnū læuis nominati. Alterū acuti, qui in mucronem fastigia tur. Cuius etiā duo assignant genera. Vnū sterile. Reliquū fert semen niggrū, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq; . Tertius est Iuncus, qui uocatur Oloschinos, prioribus carnosior, asperiorq; , qui similem fructū in cacumine parit. Semen utriusq; tostum, ex diluto potum, si sit aluū, & rubra sceminarū profluvia. Vrinam cit. Capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia, tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorū morsus. Aethiopici Iunci semine somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 18.

Iunco palustri, Græcos ad funes usos nomini credamus, quo herbā eam appellant, unde ſu nambuli Schœnobatæ ab ijs dicantur. Qui nauigare in Indos Alexandri milites, Iuncos lapideos uidere per littora simillimos nostratibus. Iunci uterū turgentem quodā cacuminis callo præferunt: mox coherentia quædā, uelut oua pariunt, pediculis circa spicaceis, in quibus uascula rotunda, leuiterq; hiscentia, & in ijs semen nigrū cuspidis effigie, non dissimile Asterisco, dumtaxat exilius, radice longa: quæ crassior multo sit, q̃ maribus cognominatis. Caput huic Cepis, et Gethyo simile, in tegumētis modice rubentibus. Iuncus palustris, hoc est, Schœnos Helios, in multa gñā concidit. Oxyſchœnos proprie is est, quē marinum Iuncū uocamus. Sterilem masculū existimāt, focundū feminam. Is qui semen nigrū habet, Melancranis appellatur, quasi Iuncus atriceps, Melancræna dictus Straboni. Vnde funditoribus Balearicis, Amenta, quod & Phileta meminit. Hic sine alijs generibus nascitur ex suo semine: sicut is quem marem noīamus, ex semetipso, cacumine in terrā defixo. Nam Oxyſchœnon, & Holoschœnon, eodē cespite, contēplatum se Theophrastus, & admiratū scribit. Omnīū radices singulis annis intermori tradunt. Holoschœnon Mariscū a magnitudine (ut putō) nostri uocant: quē admodū & Mariscus ficus: auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficos. Ob id & Sycomora esse quidā Mariscas uolunt. Hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & oīno uicilia utilissimus, quoniā mollis carnosusq; sit. Vfus omnīū ad nallas marinas, nexus elegantī, lucernarū lumina, ꝑcipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut inciso uentre, impleāt pene unciarū latitudinē: in Aegypto uero cribrorū longitudinē, non alias utiliorē: ob id cribrū significaturi, Iuncū effigiant, ut inquit Horus. Idem auctor, in Aegypto scribi Iuncis. nec aliter, assimat. Videtur autē palustris Iuncus idē cum Scirpo esse, nec in fructū inquit Plinius, nec in uepitiū cauliumue, neq; in herbarū alioque ullo q̃ suo gñe numerentur iure. Scirpi fragiles, palustresq; , ad tegulū & tegetes, e qbus detractio cortice candela luminibus, & funeribus seruiūt. Firmior quibusdā in locis etiā rigor. Namq; ijs uelificant, non in Pado tantum nauis, uerū in mari piscator Africo, ꝑpostero more uela intra malos suspendēs. Et mapatia sua Mauri tegūt, ꝑximeq; æstimati, hoc uideant esse, quo papyri usu. Ob id etiā sunt apud nos, qui Scirpos interpretentur, q̃s Græci Biblos, id est, papyros uocant. Sed fruticosi gñis sunt Papyri, enodes, & sine fronde Scirpi, leues, proceriq; , ut Festus ait: unde prouerbiū quoq; natum sit, Nodū in Scirpo quæri. Habent Græci & alterū ex Iunci nomine prouerbiū ^{χίονος} ^{φύλονος} & μυλτωμένον, hoc est, Fugitū funiculū rubrica tinctū. Contra reos desidia, q̃ Athenis, qui nō in tēpore ad concionē uenissent, rubricato fune in foro cōprehensi notabant, & mulcta bant. Huc uidetur alluisse in Penulo poëta Plautus, cum de scortis uilibus diceret, Vēstras schœno delibutas, schœnicolas fordidas,

Quantū & rubricatas, hoc est, fūco litas intelligi uult eas. Est & in uerbo Schoenicola adagiū, *χινὸς ἀσπῶν*, & ut sint quales Græci *χινὸς* uocant, hoc est, spartū rodentes: qđ itē de iner-
tibus & nugarijs, ut Varroni placet, & alienum laborem frustra consumētibus, usurpari solet.
Notum est argumentum illius Oeni, de quo multa in castigatione Pliniana diximus. Scio qđ
dam intelligere, non Shœnum, id est, Spartum, sed Lentiscum, hoc est, Schinum rodi ab legni-
bus: quia prouerbium id contra eos dici scribant autores, qui nimio se comendi studio super-
fluunt, ac dentibus extendēdis & fricandis incubant: qualis in Lentisco Mastiche uis redditur.
Sed schœnotroges tamē in omnibus Græcis codicibus, non schinotroges legas. Sunt qđ Schœ-
notroges a Scilla dictos putent, quā & Aristophanes, & alij Shœnon quoq; appellant, & den-
tibus prodesse constat. Vnde Schoenida Venerem cognominatam Lycophronij sunt qui cre-
dant, qđ cibo eius accendatur libido: ut Shœnotroges, & Schœniculas hinc quoq; dici meretri-
ces autumare liceat. Vel forte Scenicolas ἀπὸ τοῦ σκηνῶς, quasi tabernicolæ. Nam & Alicarias,
& Prostibulas uocabant, qđ circa pistrinulas & stabula uersarentur, ut ait Festus. Scincolas ab
unguento aut pessimo uocaras, quod Græci Schem dicunt. Habetur & Iuncus Euripice uoca-
tus, & Triquetrus, & Odoratus, in suas quicq; mentiones adeundi.

Euripicem non desunt qui Tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eru-
ditionis suæ periculum faciant, uulnus paribus rei latinæ officiunt.

De Lichene. CAP. LVI.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur. Asper
ginosis petris adhæret, ut muscus. Qui illitus sanguinis profu-
uia sistit. Inflammationes arcet. Impetigini medetur. luuat regio morbo
correptos, cum melle illitus. Oris & linguæ defluctiones inhibet.

BARBARI COROLL.

Lichen, siue Lechen est Muscus, de quo hic. Itēq; herba alia nascens in petrosis: nomine utri-
q; inuenio, quoniam contra lichenas, remedijs omnibus anteponuntur. Folium herbæ unum
ad radicem latum, caule uno paruo, longis folijs dependentibus. Vtramq; recentiores herba-
rij Epaticam appellant. Appuli herbam, cuius unum ad radicem folium haberi diximus, Ieco-
rariam, siue Ficatellam cognominant, folio succi pleno, & crasso: ita nominatam, quia iocino-
ris fibræ similis aspicitur. Diuersa est eodem nomine apud nos, in litore passim nascens, & oli-
uorio foro, ieiuniorū tempore uenalis, hederaceo fere folio, flore purpureo, Liliij pusilli effigie.
Cōuoluit herba se quibus appropinquat. Soluit aluum cōcta, & cruda oleris modo accepta.
Sunt & Lichenes sui equis calli, de quibus secundo libro dictum.

EX M. VERG. COMM.

Eodem nomine malum, & mali remedium græci appellauerunt. Lichen enim impetigo si-
mul, & qui impetigines sanat, herbosus in petris herens Muscus ab eis uocatur: magno argu-
mento, nullo magis præsidio contra eas uisuros esse homines. Sciendum tamen, proprium ha-
bere genus hunc Muscum ab eo, quo muscantur in torrentibus lapides diuersum. Hic enim in
aridis nascitur petris, crassior aquatico illo, & procerior, umbrosis plerumq; locis, in saxosis
rupibus herens. Vis illi est, ut ueteres græcorum medici decreuerunt, extendero purgare, me-
diocriterq; siccare, & refrigerare. Idem, quasi pro comperto illis non esset, de cōpescendis san-
guinis eruptionibus, in scriptoribus huius fidem id reiecerunt.

De Paronychia. CAP. LVII.

Aronychia alijs Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion, Ro-
manis Bouinalis, exiguus frutex in petris nascens, Peplo simi-
is, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychijs atq; duricijs
remedio est.

BARBARI COROLL.

Hanc, & Neurada cognominari docent autores. Quid aut sit Neuras muliebribus malis
querela Hippocrati, non liquet plane, πρὸς μὲν τὴν γυναικὴν καὶ ἀνδρῶν καὶ εὐμύραν. Nisi quis
(quod & fere affirmo) non Neurin, sed Nerin, hoc est, Nardum montanum legat.

EX M. VERG. COMM.

Fecerunt & huic nomen abscessus, qui ad radices humani unguis sunt, Paronychiæ a græ-
co

A

luxiv

B

Pli. li. 16. ca. 4.

παρονυχία

D I O S C O R I D I S

Cis dicti. His enim presentis remedio herba est: eamque ob causam honoris huius prærogativa, ab antiquioribus herbariis & medicis ornata, nec alio nomine quondam in uetere medicina cognita est. Describunt, effigiantque eam nostræ ætatis herbarii, petrosi locis nascentem, ut hinc etiam ait, folijs latifoliæ Læuri: duobus, aut cum pluribus quatuor ramulis: inter quæ spicatus flos exit, crassitudine pollicis & longitudine, colore inter flauum & luteum.

De Chrysocome. CAP. LVIII.

χρυσοκήμη

Chrysocome, alijs Chrysitis, alijs Chrysanthemum, nonnullis Amaranthum, alijs Diospogon, Aphris Dubarh, uel Buchumath, Romanis Iouis Barba appellatur. Palmi altitudine fruticat. Coma specie corymborum, Hyssopo simili. Radice hirsuta Veratri nigri modo, tenui, Cyperum æquante, gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosi opacisque nascitur. Radix excalfacit et adstringit. His conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uulvæ, decocta cum hydromelite assumitur.

BARBARI COROLL.

Chrysocome sine folijs, sine semine, solo scapo, comas habet, fulgore auri, unde nomen. Vocatur & Diosgenia, hoc est, Iouis barba.

EX M. VERG. COMM.

Quod hætenus in Plinio, latinisque alijs legerim, nulla inter flores, herbasue Iouis Barbæ nomine planta numeratur. Inter arbores quidem. 16. uolumine, cap. 19. a Plinio his uerbis arbor describitur. Odit aquas, & quæ appellatur Iouis Barba: in opere topiario tonsillis, & in rotunditate spissâ. Inter flores autem in Violarum genere. 21. uolumine, cap. 10. & 11. Iouis flos apte ab eodem uocatur. Coronat folio tantum Iouis flos. Pauloque post. Succedunt illis æstiuæ Lychnis, & Iouis flos, & alterum genus Lilijs. &c. Quinetiam. 27. uolumine, ca. 4. idem Plinius aut eundem, aut alium in Violarum tamen genere florem Iouis Flammam uocat. Qualliter flos quem Iouis Flammam appellauimus in Violis. Dicimus autem alium, aut eundem eo nomine significari a Plinio florem: quoniam Theophrasto diuersi flores sunt *dies æster*, & *spis*, id est, Iouis Flos, & Flamma. Plinius autem sæpenumero huiuscemodi miscet, & in tanta naturæ uarietate non semper illi respondet. Quæ hætenus dicta a nobis sunt, ut ostendatur, quod in Diosco. nunc legitur Iouis Barbam dici, a Romanis Chrysocomon, in antiquis non inueniri. Plinius enim inter arbores manifeste Iouis Barbam numerat, seorsumque a Iouis flore, & flammâ Chrysocomen describit. Negat habere latinam appellationem. Quodque magis animaduertendum sit, Iouis florem, flammamque inter Violas censerî, & sine odore esse: quod & Theophrastus indè testatus est. Cuius floris nota, omnibus figura est longe a corymbis diuersa, quibus hic & alij omnes Chrysocomem florere dixerunt. In Violis enim singuli flores singulis pediculis, & aliqui ramulis nituntur: in corymbis uero uno pediculo plures. Illi singulares, & plerumque grandiores: In his acerius magis, & ueluti grumus florum quæ flos aliquis est. Licetque in utroque genere discrimina hæc passim uidere. Ex his constituendum est proprium, & aliud a Violis genus habere Chrysocomen: quam Plinius Chrysitin uocari etiam ex eo ait, quod comantibus fulgore auri corymbis floret. Et hæc tantum plantæ huius legitimæ appellationes sunt, cæteræ falso, & ab imperitis illi acceuerunt. Qui enim potest Amaranthos, aut Chrysanthemos dici flos, qui auri fulgore comantibus corymbis splendet? Cum Amaranthus spica uerius purpurea, quæ flos sit, & Chrysanthemus alius undique a Chrysocome describatur, quemadmodum nô multo post a Dioscoride tradetur.

De Chrysogono. CAP. LIX.

χρυσογόνη

Chrysogonon, aliqui Chrysospermon uocant, alij Daspin, alij Origanum, alij Arcophthalmon, Romani Arilariam. Densè fruticat, quernis folijs, flore coronarij Verbasci. Radix ut Rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra, quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

EX M. VERG. COMM.

A

QUale Chryfogonon hoc fit, & unde factū illi nomine sic appellet, nullibi legiffe me meminī. Cæteri etiam græci, præfertimq; Paulus Aëgineta, quo libro omnem numerat medicam materiam, Chryfogoni huius ad medicinam nullibi meminit. Plinio itidem nulla inter plantas Chryfogoni uox est: similem tamen Chryfocomæ, & alijs a colore auri appellatis nomen facit. Et ex quo hic ipse ait Chryfospérmon a quibudam etiam uocari, conijcere licet, non in flore, sed in semine auri colorem esse. Idem enim Chryfogonon, & Chryfospérmon est, auri scilicet seminis herbā. Satīs ex historia eius patet, qualis hic frutex sit, & qua notarum obseruatione deprehendi possit.

HELichryson quidā Chrysanthemō, nonnulli & id Amaranton uocant, quo Lymphas coronant. Ramulū habet candidum, uirentem, rectum, firmitum. Folia intercedentibus spacijs angusta, Abrotano similia, comam aureæ lucis, in orbem, umbella rotunda, ueluti siccis corymbis dependētib; radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinæ stilliticia, ruptaq; coma e uino pota opitulatur: Ciet menses. Sanguinem concretum uentris ac uescicæ absumit, pota cum mulso folia. Ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluta. Vestibus inseritur, ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

B A R B A R I C O R O L L.

HELichryfos, & Heliochryfos a Theodoro Aurelia uocatur, ad solis repercussum, comantibus in orbem folijs fulgore auri, a quo nomen. Alij a uirgine Ephesia, quæ hoc flore prima coronauerit Dianam. Coronari eo & Deos Ptolomæus rex Aegypti diligentissime curauit. Vestes odore cōmeidat non ineleganti. Existimationem & gloriam parere coronatis flore credit, si unguento se perfundant ex auro, quod Apyron, hoc est, ignem non expertum uocatur. Floret fere cum Viola nigra uere. Flos auri modo fulget, radix summo terræ corio innixa folio cādidō, caule tenui & duro, non ut Theodorus inquit, semine, qui carpon, non caulon in Theophrasto legerit. G A L E N U S hanc Amaranthi nomine significat, nec aliter uocauit, ob id corymbos eius nunq; marcescere, Plinius scriptum reliquit. Philostratus ex Amarantho coronari sepulturas quoq; solitas affirmat, idq; Thessalos insinuisse primos ad tumulum Achillis.

E X M. VERG. COMM.

HELichrysum Plinius in historia pluribus locis, in medicina lib. 24. ca. 25. Heliochrysum eandem aurei floris plantam appellat. Habetq; utriusq; uocis certam primum ex natura causam, tum ex græcis scriptoribus, Poetas, Theophrastumq; autores: quorum illi Helichrysum, hic uero semper Heliochrysum in plantarum historia nominat. Diuersitatis huius causa est: q; Helichrysum uocant, a quo sis & palustribus locis, quæ græci ἥλιον dicunt, nascentem florem indicant: qui uero Heliochrysum, quoniam ἥλιος Sol græcis est, ad solis repercussum aurea luce fulgentem significant. Quæ illi natura est, non aliter q; multis alijs, quæ accedente Solis luce, colores suos uariant, et eos qui non sint habere uidetur. Quod hic significauit, dicens χρυσοράν, id est, quæ aureo colore & luce se offendant. Sunt tamen qui utroq; modo enunciatum hunc florem a palustribus locis dictum fuisse uelint: neq; ἥλιον χρυσον, in qua uoce Sol est, uerum ἡλιόχρυσον, in qua palustres loci audiuntur, scribendum esse. Quibus literis in Theophrasto scripta etiam nunc ea uox plærumq; inuenitur. Sed nos in melioribus obseruauimus, a Sole id nomen factum. Acceditq; naturæ causa, quæ illi est, ut Plinius ait, ad Solis repercussum aurea luce fulgere: quodq; hic ait χρυσοράν, id est, aureo colore uideri. Cuius euentus nō nisi in Sole causa est. Chrysanthemum eundem hic uocari a quibusdam ait ab eodem auri colore, sed ex alio flore: de quo mox dicitur accepta appellatione. Quod sola nominis, & coloris similitudo fecit. Ad didit præterea, Amaranthum ab aliquibus Helichrysum etiam dici: non quia spicatus flos sit, qualis est qui proprie Amaranthus dicit, de quo in Chryfocomæ dictum paulo ante est, sed ab eadem longioris sine detrimento uitæ natura. Quæ enim proprie Amaranthus a græcis nō minata est, spica, ut præmōstrauimus, uerius q; flos est, colore purpureo, sine odore, augusto meri

C se proueniens, in autumnum durans; & qui, quod mirum sit, postq̃ defecere cuncti flores, ma-
defactus aqua reuiuiscit. Ideoq; antiquis hibernas faciebat coronas. Summa tamen eius natu-
ra in nomine est, ἀπὸ τοῦ μὴ μαρμεῖσθαι, id est, q̃a nō marcescit a græcis appellati. Ex qua natu-
ra, hic etiam ob similitudinem aliquam Helichrysum uocari ait, quia scilicet corymbi eius nun-
quam marcescunt; eamq; ob causam Deorum simulachra ad longioris temporis ornatum hoc
flore antiquitas coronabat: quod cunctis gentibus adeo tunc cōmune erat, ut hic inter notas
eius dixerit esse Helichrysum, quo Deorum imagines in templis coronantur. Galenus Ama-
ranthi nomine, ob eam quam diximus causam, semper hunc uocauit: quemadmodum & spi-
cam illam purpuream: ideoq; diligentius ex uiribus & usu in medicina discernendus in eo uter
q; hic flos erit. Florere Helichrysum Theophrastus uere ait, una cum Viola nigra. Estq; locus
ad extremum sextum eius de plantarū historia uolumen. Idē longius lib. 9. de eodem egit. Que
item a Plinio quoq; reddita lib. 21. cap. 11. fuerunt. Et quōrum sit sensus. Gratiā, & uitæ glori-
am sibi etiam acquirit, qui Helichrysi flore coronatus, unguento ex auro quod ignem non sen-
serit se insperget. Habet autem Helichrysus florem auri colore, candidum folium, coliculum te-
nuem & durum, radicem in superficie terræ, eandemq; gracilem. Vtuntur eā cōtra morsus ue-
nenatorum in uino, Vtuntur & ad ambusta, cinerem eius melle excipientes.

De Chrysanthemō. CAP. LXI.

χρυσάνθεμος

Chrysanthemō, aut Chalcas, aliqui Chalchitin uocāt, alij Chal-
canthon, alij Chalcantemon, alij Buphthalmō, Romani Acan-
than, Ethrūsci Garuleum, Aphri Churfeten. Hærbā est tenera, frutico-
sa, leues proferens caules, & multifida folia, flores supra modum splen-
dentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde nomen traxit. Propter op-
pida nascitur. Cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum cærato
triti, stæatomata discutere produntur. Regio morbo corréptis, colorem
breui reddit, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibatur.

D **B A R B A R I C O R O L L.**
Chrysanthemōs, nec forma, nec uiribus a Buphthalmo superius indicata differt: uerba tan-
tum mutata sunt, eodem manente sensu: ut ne Dioscoridis quidem caput suspicentur aliqui, il-
lud norauero, a Dioscoride quidem uocari hanc etiam Chalchitin, sed an sit eadem quæ Plinio
Chalceton in uineis nascens, & iocineri trita imponi iussit, nescio.

E X M. V E R G. C O M M.

Nos aliquando cogitauimus, quasi nulla esset Chrysanthemus, aut si sit, eandē Buphthal-
mo esse, nullam capitis huius habere rationē: & qd nullū in re esset, nullū in labore hoc nōstro
etiam fore. Sed in contrariā traxere partē Chrysanthemī primū nomē, qd a Buphthalmo aliud
Diosc. & Plinio est. Mox quē in Chrysanthemō alia a Buphthalmo sunt: habere. s. caules eius le-
uorē, folia incisuris diuisa, nō ut illa Fœniculi figura, & capillata. Postremo, olerū mō in cibos
admitti: quod Buphthalmo neq; a scriptore hoc, neq; ab alijs tribuit: et qd in medicina relinque-
dū nō est, Buphthalmi folijs cū cera sanari duricies tumoresq; Chrysanthemō aut priuatim stæ-
atomata. Accessit his etiā, q̃ q nobis est pbauissimē & antiquissimē fidei græcus Diosc. multa ro-
to hoc capite diuersa habet. Quā em̃ ceteri codices a Romanis Acanthā uocari Chrysanthemō
ostēdunt, ille Caltā habet. Et quæ illi πολυχιδν̃ φύλλα, hic προχιδν̃. Quodq; in floris pictura pas-
sim legit̃, καὶ ὀφθαλμὸν κεντρῶν, in eo non est. Sic etiam in medicina & remedijs, q̃ soli flores sel-
le suffusis mederi dicunt̃, in eo folia & flores legunt̃. Tantaq; est uarietas, tantaq; ex uarietate su-
spicio oritur, ut esse Chrysanthemona Bouis oculo aliā trēdamus: et quē ex Bouis oculo illi ac-
creuerint, ab imperitis & ex similitudine diuersas plantas miscenibus, accreuisse. Variantem
in sermonis ductu, rerumq; serie scriptoris huius exemplaria: & quo antiquiora sunt, eo certio-
rem coniecturam faciunt, fuisse q̃ndam per se, & adhuc esse, Chrysanthemona a Bouis oculo di-
tēstam. Accedit his Plin ius etiam uicissimō sexto uolumine, capite octauo, Chrysanthemum
priuatim nominans: perijisseque huic capiti quæ propria Chrysanthemī erant: successisseque il-
lis ex Bouis oculo, quæ eius propria erant, facile crediderit aliquis. **P L I N I V S e-**
nim Chrysanthemō ad uessicæ uitā utitur, quorum nulla in hoc capite inter alia Chrysanthe-
mī remedia ratio habita est. Qualia obseruari a nobis hæc potuerunt, talia etiam docentur.
Cupimus tamen cuncta a nobis hoc capite dicta, suspiciones, coniecturæq; nō decreta haberi.

Nec enim alio consilio dicta longius a nobis fuerunt, quæ ut labore hoc nostro, quicunque is est, adueritatis eruscatione ceteri facilius proficiant. Qui illud etiam meminerint, credere nos cunctas Chrysanthemum adiectas appellationes, a uoce illa Chalca incipientes, alterutram habere rationem & causam. Aut enim ob luteum medij floris colorem, a simili & concolori æris metallo, quod greci chalcon dicunt, factæ fuerunt: Aut, quod nos magis probamus, quoniam Buphthalmum pariter, & eadem Chrysanthemum Chiala a quibusdam credita & dicta fuerit, ex eo nomine ceteræ illæ omnes Chrysanthemum appellationes, corruptæ tamen fluxerunt.

A

De Agerato. CAP. LXII.

Ageraton fruticosa hæba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Helichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. Huius ustæ nidor urinam cit, & uulvæ duriciæ emollit.

ἀγέρων

EX M. VERG. COMM.

In latinis sub hoc nomine nulla, quæ nota nobis sit, plantæ huius historia est. Greci vires discutendi habere eam tradiderunt: & præter id, leniter inflammationes arcere.

De Verbenaca. CAP. LXIII.

Verbenacam rectam, Greci Peristereona uocant, alij Trigonio, alij Bunion, alij Hierobotanæ, alij Philtrodoren, Aegyptij Pem sempe, Magi lunonis Lachrymam, nonnulli Mustellæ sanguinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij Pheriam, alij Trixalidem, alij Exuperam, aliqui Hærbam sanguinalem. Nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbæ circa hanc perçes libenter nersari soleant. Palmi altitudine, & interdum amplius adolefcit. Folia e caule prodeunt incisa, & subalbida. Ea singulari ramo, radiceq; sola constare sæpius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosa ceo imposita, uuluarum dolores finire putatur. Ignem sacrum illita ex aceto reprimunt. Putrida ulcera cohibent. Vulnera glutinant. Vetera q; ex melle, ad cicatricem perducunt.

περίστεριον

B

BARBARI COROLL.

Peristereon a Grecis uocata, quod columbæ in ea mansit. Item Peristerium, unde Columbaris uocatur. Itæ Lucinia, & Lustrago, & Militaria. Sunt qui Peronomo a uolucrum pastu noient, & a colorum uarietate Panchromon, a nostris Verbenæ, & Verbenacæ, siue (ut arbitror) corrupte Verminacæ dicitur. Item Ferraria, non seriat, etiam si Dioscorides ita noiaße uidetur: quandoquidem secundum huius herbarum genus ab ipsomet Dioscoride Sideritis appellatur. Hac & Iouis mensa uerebatur. Verbenam porro & sagmina, Romani, hoc est, gramen ex loco sacro, præsertim ex arce Capitolij, cum sua terra euulsam, in publicis remedijs, & in sacris legationibus, cum ad hostem clarigarumq; mitterentur, ferebant: coronatis ita scialibus & pane parato, uel fœdera facturis, uel bella indicturis. Sed omnes quoq; frondes sacratas, purasq; per abusionem Verbenas uocabant. Dioscorides duo facit genera, rectum, & supinum. Plinius mare, & foeminam. Mari caules reddendo plures & tenues, itemq; cubitales & angulosos: demum quæcumq; Dioscorides supine, nisi quod rariora mari folia quæ foeminæ adscit. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus tradunt. Vtraq; fortunæ galli, & præcunt responsa. Hac perunctos, Magi putant imperare quæ uelint, amicitias conciliare. Colligi circa canis ortum debere: ita, ut ne luna, aut sol cõspiciat, sauis ante & melle terræ ad piamentum datis: circumscriptam ferro effodi, sinistra manu, & in sublime tolli. Sicari in umbra separatim folia, caulem, & radicem. Vtriusq; genus in planis aquosis nascitur. Diuisuræ foliorum utriusq; similes quidem omnino quernis, sed maiores. Rectum erui præcipitur, sole arietis signum meante, Non quidē ad omnia, sed ad me-

Pli. li. 24. ca. 9

C dicamentum illud, quod propterea Criogenes pastillas dicitur.

E X M. V E R G C O M M.

Pl. II. 22. ca. 2

NVlla in toto herbarum censu Romana nobilitatis plus habet q̃ Verbenaca. Vna enim hac domus purgabat, iustrabatur familia, & Iouis mensa ad sacrificium & epulas uerebatur. Vna autoribus Romani imperij, conditoribusq; inensum quiddam dedit. Non aliunde sagmina in remedijs publicis, & in sacris legationibus Verbenae, q̃ ex hac genti illi fuerit: qua coronati ad hostes clarigatiq; mitterent: ideoq; sacra Herba uulgo dicta, & cognita. Romani Verbenaca, q̃ sola & p se uerbenas faceret, dixerunt, Gentium iura, & publicę utilitatis causā secuti. Gręci, quibus nulli feciales erant, nec idem in legatis ritus, naturam contemplati, Peristereona nominauerunt, a columbis, ut hic ait, factio nomine: q̃ hac auis libenter inter eam uersetur.

supra Berden

De supina Verbenaca. C A P. LXIII.

SVpinam Verbenacam aliqui sacram Hærbam appellant, alij Eriogenion, alij Chamælycon, alij Sideritin, quidam Curitin, alij Persephonion, alij Iouis colum, alij Dichromon, alij Callesin, alij Hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptij Penphtheuptham, Pythagoras Eurylisceptron, Romani Cincinallē. Ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia Quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cassio. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitaue, aduersus serpentes pollent. Eadem drachmæ pondere cum turis obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. Veteres tumores, & inflammations mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta consillarum crustas abrupit. Oris nomas gargarisatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, lætiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a terra geniculum, cum folijs circumdantibus, quartanis quartum. Sacram uocant hærbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Peristereon hyptios, hoc est, supina, frequentior est q̃ superior. Latissimus est quorundā error, existimantium Verbenam & Peristereon priorem esse: quam olitores Sclaream modo uocant: de qua ueteres nihil dixisse (quod sciam) uehementer miror. Folium ei Betæ lanuginosum, ferratumq; in modum cristæ: flos spicaceus, e ceruleo purpureus, odorata tota, & uulgaris. Nisi quis hanc Alektorolophon, id est, cristam gallinaceam interpreteretur. Alektorolophos inquit Plinius, folia habet similia cristæ gallinaceæ plura, caulem tenuem, et semen nigrum in siliquis. Mutat colorem, sed ex nigra albicare incipit, & intumescit, ac exit. Vtilis tussitibus & oculorum caligini. Solidum semen coniicitur in oculum, nec turbat, sed in se caliginem contrahit. Hęc Plinius. Hoc quidem ipsum facere uidetur semen eius, quam uocant herbarij Sclaream. Folio cristæ simili, ac nigro semine: uerum non in siliquis, sed in folliculis, siue capitulis post florem. Nisi quis siliquas in Plinio pro uasculis quibuscunq; accipiat.

E X M. V E R G C O M M.

SVperiores Verbenacam gręci, q̃ recto caule riget, Rectam: hanc q̃ deiectis in terram ramulis quasi iacet, Supinam uocauerunt. Nec solum inter eas hoc discrimen obseruatum ab illis est, sed, ut ex utriusq; historia licet cognoscere, plura alia sunt quibus inter se disconueniant. præsertimq; numerus, & longitudo ramulorum. Quod idem ambabus est, & quod cognominis eas fecit, foliorum figura, & in folijs pares incisuræ sunt. Vidimus nos, quā nunc rectā Verbenacam dicunt, multo maiore altitudine q̃ dodrantali: contraq; Supinā longe breuioribusq; cubitalibus uirgis: & in utraq; q̃d in scriptore hoc nō legit, quadragulis ramulis: Rectā itidem: singulari caule, sed non singulari radice: nisi hic unam eius radicē forte dixerit, quę crassior &

lij est: cæteras uero fibras & capillamenta magis q̃ radices esse uoluerit. In utraq; autē quod paulo ante diximus, eadem serrata, & quernis similia folia sunt. Visq; nobis plantæ hæc sunt magis ad Plinij, q̃ ad scriptoris huius picturam accedere.

¶ De Astragalo.

CAP. LXV.

Astragalum aliqui Chamæscycen, alij Gatalen, alij Onyca uocant, Romani Pinum triuiam, aut Ficum terrę, aliqui Glandulam, alij Thium, alij Nonariam. Astragalus paruus in terra frutex, folijs & ramis lupino similis, flore purpureo, paruo, radice rotunda, Rhaphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in uentosis, opacis, & in uallibus. Eo Memphis Arcadiæ scatet. Aluum sistit radix in uis no pota. Urinam mouet. Vetustis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur. Sanguinem supprimit. Aegre propter duriciam tunditur.

B A R B A R I C O R O L L.

Astragalus aliter a Plinio describitur, folio longo, incisuris multis, obliquis circa radicem, caules terni, aut quaterni, foliorū pleni, flores Hyacinthi, radices uillose, implicatæ, rubentes, præduræ. Nascitur in petrosis, & Arcadiæ Penæo, siue ut Galenus & Paulus, Phæneo. Colligitur exitu autumnii, cum folia amisserit. Siccatur in umbra.

Pli. li. 16. ca. 8.

E X M. V E R G. C O M M.

EX Arcadia, si forte adhuc nomine hoc illic cognoscitur, Astragalus reperenda. Italiæ enim aut nulla, aut tam rara modo est, ut a nullo cognoscatur. Nomen illi, ut uidetur, radix fecit rotunda, duraq; & ob id animalij talo similis. Id enim Astragalus græcis est: a quo quibus pueri quondā luderent, non cubi, tesserae dicti sunt, sed tali: quibus Ganymedem & Cupidinē Apollonius sinxit in cælo colludentes: & Plinius Astragalizontas Polydetti opus appellauit, in quo si Apollonij carmen lib. 3. in Medæ amoribus diligenter aliquis, ludiq; genus obserua uerit, uisitoris præmij potius q̃ fortunæ & ludi instrumentum Astragalos esse intelliget. Locus in eo poëta uidendus his, qui in antiquitatis cognitione diligentiores haberi uolunt. Cur autē Astragalum hanc Chamæscycen Græci, Latini uero Ficum terræ dixerint, in Chamæscyce certius intelligitur. Radicis enim similitudo, cognomines, diuersas alioquin plantas, fecit. Vocarunt præterea ab eadem rotunda crassitudine Romani Glandulam, manifesta rei indicatio. ne. Nasci eam nos in Phæneo Arcadiæ, non in Memphi diximus: quoniā nulla est Memphis Arcadiæ. Et Plinius in Phæneo prouinciæ eius oppido nasci testatur: & præter Plinium uetustissimi & optimi græcorum codices in quibus adhuc habent.

B

¶ De Hyacintho.

CAP. LXVI.

HYacinthum aliqui Heloniam, alij Porphyranthes, Romani Valcinum, alij Vlcinū uocant. Folia habet Bulbi, dodrantalem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam, radicem bulbaceam. Quæ ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coëret, & non patitur erumpere. Sistit aluum. Pota urinam impellit. Phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitum. Regium morbum emendat, cum uino potum.

videtur

B A R B A R I C O R O L L.

HYacinthi, cū Viola nigra erumpunt uere, sed ante Rosam, ut fere oīa, quæ in coronas a moribus petunt. Exeunt & cū Gladiolo, sed eximie in Gallia, ubi & Hygini eo tingit. Nā colos in ueste Hyacinthinus, nō ex hoc tantū Hyacintho, ut fere credit, sed e Viola, q̃ syluestris Hyacinthus quoq; dici, traxisse nomē uidet, Plinio utiq;. Nisi q̃s in eo Lanthinū malit, q̃ Hyacinthū le gere, ut Martialis, Coccina famosæ donas, & Lanthina moechæ.

Pli. li. 21. ca. 11.

D I O S C O R I D I S

C De quo in castigatione Pliniana diximus. Hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est, cerulei uisum tur. Nam & lapis frutici cognominis ceruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorē cœli dixerunt Hyacinthinū, de ceruleo uideant accēpisse. Porro tam syluestres, q̄ urbani plurimū dufant. Comitatur florē hunc duplex fabula, luctum præsens eius, quē Apollo dilexerit, aut ex Aiæis cruore editum: ita discurrentibus uenis, ut græci literarum figura ea legatur inscripta. Paulaniās florem qui natus sit extinctio Aiæe apud Salamina, credi refert editum primo, nec Hyacinthinū, sed literis Hyacintho similem uideri ex cādido rubentē, ac Lilio minorē. Idem auctor Cosmofandalon dici florem apud Hermionenses Trœzenis confines, quem ipse Hyacinthū uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa, quæ Chthonia uocāt, agere. De Cosmofandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius Hyacinthum, & Irim, & Gladiolum a similitudine foliorum uocari dicit. Qui Seruium grāmaticum accusant, q̄ Hyacinthum esse dixerit, quē Virgilius Vacinium in carmine uocarit, Dioscoridem accusant, affirmantem Hyacinthum a Romanis Vacinium appellari. Plinius quoq̄, Vacinia inquit, aucupij Italiæ ferūt, Galliæ uero etiā purpurea tingendis seruorū uestibus. Item alibi. Transalpina Galliæ herbis Tyrium atq̄ Conchylū tingit, omnesq̄ alios colores. Item alibi. Mire inquit Hyacinthus in Galliā pro uenit: quo ibi pro Cocco Hyfginū tingitur. Est autē Hyfginus color, a quo Græci uestes Hyfginobaphes appellāt, hoc tinctas colore. Quo fit, ut recte senserit grāmaticus hac parte, Vacinium Maroni pro Hyacintho acceptum fuisse. Nec obstat, q̄ nigra dicat poëta: quando purpuream quoq̄ Violam, est ubi auctores nigram uocare soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Palladius primo sui operis uolumine, capite. 37. Hyacinthum cum Iride his uerbis miscuit. Hyacinthum, quē Iris, uel Gladiolus foliorum similitudine dicitur. Obijciat forte mihi hoclōco aliquis, non esse multum Palladio tribuendum, nec posteriori scriptori, & qui degenerante iam declinūq̄ latini sermonis candore scripserit, contra antiquiorum dicta fidem habendam. Multa enim in eo sunt, præter multa etiam contra Romanorum uocum proprietatem, dignitatēq̄. Fatemur id nos, concedimusq̄. Non tamen adeo negligendus scriptor, nec tam longo interuallo ab antiquitatis candore illo distans, ut non uestigia saltem in eo, & coniecturæ aliquæ supersint, quibus deprehendi antiqua ueritas possit: accedentibus præsertim meliorū, & antiquiorum scriptorum testimonijs aliquibus, & rerum necessitatibus. Cogitādum illud etiam in nominum mutationibus, quæ quotidie a gentibus sunt, sic plæruncq̄ priora nouis cedere, ut aliquæ semper supersint in nouitate uetustatis reliquæ: aut mutationis saltem causæ in illis intelligantur. Neq̄ ut inquit Hesiodus, penitus uanam perire famā illam, quam, ut ipse ait, multæ famigerant gentes. Isq̄ ego sum, qui non facile persuadeat, quæ de Iride & Hyacintho dicta a Palladio eo loco sunt, temere penitus dicta existimari debeant: sed ut in huiusmodi sit, mutata penitus nominis potius, q̄ rei æstimatione, quod fuerat commune Iridi & alteri flori, Hyacinthi nomen aliquando, quo tempore ille scribebat, ad solam Irim. contractum fuisse. Vtrq̄ ad hanc rem huiusmodi coniecturis, Columellæ primum auctoritate: qui eo quo diximus libro & capite de Apium passionibus agens, & quibus floribus præcipue gaudeant, & generosum mel conficiant, inter cætera Hyacinthum numerauit: addiditq̄, cœlestis numinis: quæ duæ uoces in graui scriptore non aliam ut credimus habent rationem, q̄ ut Hyacinthum, quem ille Apibus circa aluearia conseri iubebat, ab alio, uulgarīq̄ Hyacintho, & inutili Apibus, ea honoris nota distingueret: appellasseq̄ Hyacinthum cœlestis numinis, quem Palladius dixerat, Hyacinthus qui Iris & Gladiolus dicitur. Neq̄ immerito maleue Irim Hyacinthum cœlestis numinis dixisse credi potest: quando Iris cœlestis nomen est Iunonis nuncia, & inter cœlestia phænomena ex admiratione hominum diuinitatis particeps. Nec aliud, iudicio nostro, intellexisse ea nota Columella uidetur, q̄ non esse simpliciter Hyacinthum circa aluearia conferendum: sed Hyacinthum cœlestis numinis, id est, is qui a cœlestis numinis nomine etiam indicatur. Ratiocinariq̄ (si sic intelligendus Columella sit) oportet, cōmune Hyacinthi quondam nomen, & Iridi & Hyacintho priuatum dicto fuisse. Nec tantum duobus his floribus, sed figura Iridi similibus, licet colore diuerso plæriscq̄ alijs. Quod ex eodem Columella in carmine suo manifeste cognoscitur, cū ait. Nec non uel niueos, uel ceruleos Hyacinthos. Quo colore flores Hyacinthi nomine indicari proprie non possunt. Siquidem purpureo flore Hyacinthus, non candido, aut ceruleo est. Credimusq̄ nos, in Hyacinthis quondam euenisse quod in Violis: in quibus quemadmodū in lasme primo uolumine testati sumus, figura, florisq̄ forma, non color genus faceret. Sed hoc latius patet, q̄ res nostra modo exigit.

De Papauere erratico.

CAP. LXVII.

A

HAROT 1012P

Papauer erraticum, quod Rhœam uocant, nonnulli Oxytonon, Romani Papaueralem, Aegyptij Nanti, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. Folia Erucae, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra. Iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris Fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ Fremij minus: semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque aut sex, in uicini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mēfura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt. Ad idem præstandum mellitis rebus, & dulciarijs ammiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorundem foru & perfusione, somnus allucitur.

BARBARI COROLL.

Papauer Rhœas, hoc est, erraticū, capite, ut Theophrastus inquit, unguis pollicaris amplitudine. Legitur uiridiusculū ante messem ordeī. Hoc & satiuus ascribitur: q̄q̄ inter syluestria & satia melius fortasse, quasi medium constituas, quoniā sponte quidem, sed in aruis nascatur. Admonendi tamen sumus, Rhœadis cognomen non hoc tantū Papaueris genus uenire solitum, sed & aliā duo syluestria, ut mōx liquebit: hoc quoniā flores eius breui decidant, illa quoniā fluat ex ipsīs, conuulserato scapo succus lacteus, Opion appellatur.

EX M. VERG. COMM.

Comparatur in scriptore hoc inuicem Papauer erraticum hoc, & Anemone, de qua secundo uolumine a Dioscoride, & a nobis actum longius est. Et ut in similibus sit, quorū reciprocae notæ sunt, Papaueri huic eadem dicta & credita Anemone est, Anemoneq; contra Papauer hoc. Illa agreste nigrumq; Papauer, & Meconium uocari dicta est, hoc manifeste syluestri Anemone simile dicitur. Præsentī nec negligenda dubitatione, quales duo hi flores sint, quibus locis inueniendi, quibusq; nominibus priuatim indicandi, & quod tota hæc res modo exigit, quodnā Papauer hoc erraticum sit. Diximus in Anemones cōmentarijs nostris longius, quæ tunc pro illa dici potuerūt. Inter quæ præcipuū illud fuit, non uideri nobis, priuatim Anemones uoce, rubrū Papauer (sic em̄ modo erraticum hoc appellamus) indicari posse: quoniā quæ de Anemone in antiquorum cōmentarijs legeretur, rubro Papaueri non omnia competere: ideoq; credere nos, aliā ab illo Anemone esse. Vsq; post multa alia ad eam rem sumus capitū huius, & in eo erratici Papaueris historia & descriptione. Quæ tota eius esse florīs manifeste cognoscitur, qui rufus colore, & aliquādo candido, paucissimis folijs, sed his amplioribus, quocunq; pulsu & iniuria deciduis, in triticea & hordeacea segete, Maio præsertim mēse floret. Nihil enim naturæ exemplari illi in hoc scriptore deest, qui multa breuitate complexus omnia est: deciduū protinus florem, uernos ortus, natalem locū, arua & segetes, & quæ alia illi ab eadem natura accepta adscribuntur. Quodq; animaduertat aliquis, sponte sua nasci: cum plærūq; Papauer omne satiuū sit. Quod solum afferri contra possit: crediq; utilius, aliquod Papaueris hoc genus esse illud est quod hic ait. Quo tempore etiam colligitur, cuius laboris & operæ nulla est in erratico hoc nostra ætate ratio & usus. Sed non est ex usu hominum ratio in naturā accipienda. Mutantur enim quotidie quæ homines agunt, placuitq; quondam quod nunc in nullo honore est: rursusq; multa in honore modo sunt, quæ futuris seculis, aut nulla, aut inutilia habebuntur. Præterea si seruandum semen eius ad medicinā & dulciaria fuerat, tunc legi oportebat cum maturuisset. Meminisse illud etiam necesse erit, cum ab Anemone diuersum Papauer hoc ostēdere aliquis cogitabit, in toto Papauerum genere florem in purpureo candidum esse, abundareq; in eo candorem, in hoc autem rufum, aut album colorem totum esse: in hoc oblongum caput describi, breuiusq; & minus q̄ in Anemone. Quod si recipiendum est, manifeste indicat, Papauer hoc in aruis, & in segetibus nascens illud esse: Nullum em̄ inter Papauera omnia minore capitulo est. Quod intelligens Theophrastus, ma-

Pli. li. 18. ca. 25.
19. cap. 8. 20.
cap. 18.

B

Cognitudine humani unguis esse dixit. Meminerit etiam, in Anemone plures numerari colores: in hoc autem duos tantum, rufum, & candidum; & ne longiores fimus; plura alia inueniet discrimina, quæ collata inuicem, duorum florum duplici hystoria facillimeprehenduntur. Nos interim ex Theophrasto libro nono de plantarum hystoria, monebimus hysdem notis, omnibus idem hoc Papauer, & his uerbis describi. *ἰτέρα δὲ μέκων ῥοιάς καλονμένη. παρρημία κικλήσκει ἄγριον διὰ τοῦ ἰσθίται. ἐν ταῖς ἁγροῖς. δὲ φύεται, καὶ μάλιστ' ἐν ταῖς κρήταις. ἄνθος δὲ ἵχτι ἱερὸν, καὶ διὰ τοῦ σπινθύνου τοῦ λευκίου. συλλέγεται δὲ πρὸ τοῦ θρισμοῦ τῶν κρήτων ἱμελωροτέρα δὲ μέλλον. Quorū sit sensus. Alterum uero Papauer, quod Rhœada uocant, syluestri Cichorio simile est: eamq; ob causam comeditur. Nascitur in aruis, maximeq; inter hordea. Florem habet rubentem: uasculum quantitate unguis digiti. Colligitur ante demessum hordeum uiridior adhuc. Non potest Theophrasti hystoria hac aptius quicquam ad hanc rem excogitari. Cur autem Græci Rhœada Papauer hoc nominauerint, causam hic attulit: Quia protinus folia illi decidant, non plantæ, sed floris. Nihil enim minus hoc flore tenax est: & ἀπὸ τοῦ ῥῆν, quod est fluere, ῥοιάδα Papauer hoc dictum fuit. Latini, ut hic inquit, Papaueralida diminutiuum in græcis forma appellauerunt. Sed hæc posterior uox est, & in latino nomine a græcis formata. Plinius erraticum Papauer uocauit, eadem ratione qua cætera in plantis erratica a latinis dicta fuerunt, sponte sua passim, incultisq; locis, & nullo humano opere nascentia. In comparatione foliorum deinde, credimus abundare imprudenter ab aliquo plantas aliquas. Theophrastus enim syluestri tantum Cichorio comparauit.*

De Papauere satiuo. CAP. LXVIII.

Papauer satiuum aliqui Chamæscen, alij Oxytonon appellant, Romani Papauer, Aegyptij Nanti. E satiuo genere, quoddam hortensium est, cuius semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. Eo etiam ex melle pro Sefama utuntur. Thylacitin uocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Syluestre uero, caput insidens, demissumq; & nigrum semen. Quod Pithitis nominatur. Nonnullis tamen & ipsum Rhœas dicitur, quoniā eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas ualentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra uigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus amisti, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoq; uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum receduntur. Capita quoq; in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiectio melle, dum humor cōeat in eclegmatis lentore. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluctionibus, & celiacorum affectu, doloris leuamentum præbet. Efficacius tamen redditur, addito Hypocystidis succo, & Acaçia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra citam aluū, & foëminarum profluuiā. In peruigilijs fronti, temporibusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturq;. Sumptum Erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnium allicit. Tussi atq; celiacorum ualitudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit. Igni sacro, & uulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulie

μέκων ἱμαθῶν

eris, & croco. Somnum accersit, subditum sedī pro Balano. Optimū habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod inter colandum non ut cæra cōeat, & in sole diffundatur. Dein admodū lucernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris uim conferuet. Sed Opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit: lactucæ succo fictum exiliter spirat, & asperius spectatur. Gūmi uitiatum, splendet, & infirmū est. Nec desunt qui eo dementiæ deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur, ad oculorum medicamenta, dum mollius, atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est, usum eius damnauit, oculorū lippitudinibus, & aurium uitij infundi uetans: quoniam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illis eo, protinus excæcari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum dumtaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret: alioqui nobis, ut noxiū interdicit. Quæ cōmenticia esse, experimen-
to deprehendūtur. Si quidem effectus uiriū huiusce medicamenti, fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quomodo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa & folia tūdunt, & prælo expriment, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Meconium uocatur multum Opio ignauius. Porro Opij faciendi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro circumdante asterisco, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeun-
tem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, ut concreta inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pilateri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Satiū omne magis rotundat capita: id syluestri longū, ac pusillum, ad effectus oēs ualentissimum. Optimū in siccis, & ubi raro pluit. Papaueris satui tria fecere gēna. Candidum, cuius semini tostum in secunda mensa, cū melle tragematis loco edebatur. Hoc, & panis rustici crustas, ouo affuso cōmendabat. Alterum nigrum, cuius scapo inciso lac exprimitur. Tertium Rhœas, de quo diximus: quod nisi maturuisset, edomitum exstirpāri nullo modo posset. Galeus & Dioscorides Papaueris genera sex enūmerant. Rhœada, Ceratium. Aphrodes, Satiūm, siue Thylactin, & duo alia syluestria. Capite sessili unum: oblongo alterum: quæ & Rhœdas uocant alii: propterea quod e duobus his quæstum lac, scapo inciso fluat.

Differt Meconium ab Opio, si proprie loquaris, sicut apud nos succus a lacte, quod & sapor, & lachryma quoque dicitur. Succus & Meconion uocat, qui decocto, uel crudo Papauere, ut in cæteris exprimitur. Lac uero & Opion, quod caule inciso manat & Papauere nigro, ut Diagoras suadet, cum turgescit, ut lollas cum desorescit. Incidi iubent sub capite & calice: nec in aliquo genere ipsum in ciditur caput. Humor hic, & herbæ cuiusque lana excipitur: aut si exiguus est, ungue pollicis, aut lactucis, & postero die magis, quod inaruit pastilli siccantur in umbrā. Accenditur synceri difficilior, et crebro extinguit. In aqua innatat nebula. Aestiuo sole sudat, et se diluit, donec simile recenti succo fiat. Confictum in posca cōst. Mnesides optime seruari putat. Hyoscyami semine adiecto. Alij in Faba. Adulterat hoc Alexandrie. Thebanū Opium celebrari ad multa uideo: persertit in collyrijs duobus, quod Lynceus, & Proteus, ab Agneta Paulo co-

C gnominaur. Sicut Hermolaus & Antoninus, ab Aetio, in quæ non Opiū modo, sed Acacia quoq; poscit ad repercussum. Achaicū quoq; Asianūq; Opiū auctores Græci noiant.

μηκόν κερκίτις

De corniculato Papauere. C A P. LXIX.

Papauer, Ceratidem, id est, Corniculatum, aliqui Paralion, alij syluestre Papauer, alij Thalassion, Romani Fabulum marinum, Aphri Sifimacam uocant. Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu syluestrium Papauerum more ferrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo Foenogræci, in corniculorum modum inflexo. Unde nomen mutuatur. Semine Papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanat. Prodest his, qui crassa quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsâ potio. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq;. Argemâ ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui Glaucium, hoc Papaueris genere facitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc Papauer hauserit, non alia accidet, q̃ qui Opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radice bibitur cum uino, sanatq; dysenteriam.

E X M. V E R G. C O M M.

D Papauer ceratidis, siue ceraticon, hoc est, cornicularium, syluestre est, cubitali altitudine, folio Verbasci nigri, minus atro. Radice breui & corticosa. Tempestiuum messibus. folia huic minora & tenuiora, q̃ cæteris syluestribus. Nascitur & nitoso loco, & Glaucion a quibusdam appellatur, haud proprie.

E X M. V E R G. C O M M.

Vnus satis Theophrastus est, ut cornicularis Papaueris huius historiam, & tot nominum eius in græcis rationem intelligamus: qui, s. de plantarum historia inter agrestia numeratum his uerbis descripsit. καὶ τὴν τὸ φύλλον ὡς φλόμεν τὸν μετρίως ὅσον δὲ μέλαν. τοῦ δὲ καυλοῦ τὸ ἕρπον πικρὸν. ἢ ἢ δὲ βραχὺα καὶ ἰσχυρὰ καὶ δὲ καρπὸς καμπύλος. ὡς τῶν κερκίων. ἐλλογίται δὲ πρὸ πυροτομίας. δύναται δὲ καθάριον πῶς καλόν. τὸ δὲ φύλλον ἔργμα προβάτερος ἀκριβῆ. φέται δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν ὅν δὲ ἢ παρὰ τὴν χωρίαν. Quorū summa & sensus est. Huius foliū nigro Verbasco simile; minus tamen nigrum. Caulis altitudo cubitalis est. Radix brevis, & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia uocant, similis. Carpitur per messem. Aluū purgat. Pecoris albugines foliū exterit. Nascitur ad mare petrosis locis. Ex his dubitauerit merito, quæsieritq; aliquis, ceratite ne hoc Papauer a cornuū figura simpliciter, ut hic ait Græci nominauerint, An ut in Theophrasto auditur, a ceratijs, quas latini siliquis græcas dixerūt, de quibus primo uolumine actū a nobis est, quæ & ipsæ inflexæ sunt, & cornuū figura per longitudinem incuruatur? Multifacienda scriptoris huius auctoritas, aliorūq; omniū, qui eum secuti, corniculis fructū eius comparauerūt. Non spernendus etiā Theophrastus grauis auctor, & in disciplina plantarū cunctis alijs merito antefereendus. Nobis in Theophrasti sententiā inclinatus animus. Etsi nullū in re discrimen sit: nec si cornibus, aut ceratijs cōparauerit Papaueris huius fructū aliquis, diuersam rem ostēderit. Ambo em̃, cornua scilicet, & ceratia in longitudine producta inflectūtur: nec siliquæ illæ aliunde, q̃ a cornibus ceratia a græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis, etiā agreste Papauer hoc recte dici, cōmuni tamē agrestibus alijs appellatione. In eorum em̃ censu est. Nec minus quoniā ad mare nascitur Paralion: Id enim ea uox significat. Quā naturæ, nataliūq; eius notā secuti Latini, Fabiolū marinum uocauerunt: quoniā ad mare nasceretur, fabacisq; siliquis in longitudine similia uascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia λευκά, id est, candida. Barbarus quasi qui non λευκά, id est, candida, sed λευκὰ, id est, tenuia legeret, folia habere tenuia id dixit. Nescimus nos, an ex suorum codicum

lectione sic uerterit: an potius a Plinio in ea re monitus, candorem ad tenuitatem transtulerit. Verba Plinii sunt. 10. uolumine, capite. 18. Folia minora, tenuioraq; q̄ ceteris syluestribus. Nos communem omnium quorū uidimus græcorum cōdicū fidem secuti, candido colore folia eius esse diximus. Indicare id Theophrastum opinari, cum ait, folio esse hoc Papauer Verbasci nigri, sed minus illo nigro. Sentimus quidem leui argumento hoc niti. In ambigua tamē re, monuisse omnia inuile non fuerit.

De spumeo Papauere. CAP. LXX.

Alterum Papaueris genus, Aphrodes, id est, Spumeū uocatur, ab alijs Heraclium, caule dodrantali, folijs admodū paruis, Radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula albā est, & spu mea tota. Radice in summo cespite. Legitur aestate semen, cum integre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitiōe expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialib; pdest.

BARBARI COROLL.

Papauer hoc Heradeon, siue Aphrodes, hoc est, Herculeum, & Spumosum dicitur: cuius folia herbæ Radiculæ, quam Græci Struthion uocant, similia sunt Dioscoridi, Theophrastoq; ut multi censent: Et quoniam Struthion etiam passerē significat, Plinius hac parte, folijs inquit, si procul intuearis, speciem passerum representatibus. Verba porro Theophrasti hæc sunt. Papauer, inquit Heradeon φάλλαν ἔχει ὅσον σπυρίδι, ὃ τὰ λίνια λευκαίνοντι. hoc est, folium habet quā le struthos, quo lina candefaciunt. Plinius hæc non de Radicula, ut dixi, quæ lanis demum lauandis apissima est, curans eas, & conferens candore molliciaq; ut tradidit ipse Plinius. 19. libro, sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem Papauere lina inquit splendorem trahunt. Quia tñ Plinio contradicere non prius audeo, q̄ si possum, contempler oculis, passerum, an Radiculæ speciem Papauer illud præbeat, uerbum Græcum posuimus in latino: ut liberum esset exgissaturis arbitrium. Semen huic spumeum, Aestate tunditur in pila. Vtilissimum hoc, medicamentum nobili, quod Diaodon, & Asteriacen uocant. Etenim capita Papaueris, & Codias, & Asiæ rificos Græci appellant. Quin & humanum caput Pœtæ interim Codian uocant, ut in gr Poilux. Fit autem huius Papaueris, aut cuiuscūq; syluestris capitibus. 110. in aquæ celestis sextarijs tribus, biduo maceratis, in eademq; decoctis. Deinde siccatis, iterumq; cum melle coctis, ad dimidias partes uapore tenui. Addidere postea drachmas senas croci, hypocistidis, turis, acaciæ, & passi cretici sextarij. Aetius Papauer hoc (ut arbitror) intelligit, cum Mecaphroditon cōmendat, herbam contra uiperas in potu præbens, fortasse quia uomitionibus probetur.

EX M. VERG. COMM.

Heraclium uocari Papauer hoc tantum Theophrastus eodem libro testatus est. Nec nos scimus, ab Hercule ne sic uocatum fuerit, an ex tam multis quæ toto orbe aliquando fuerunt urbes Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alijs a candore & raritate spumæ, quas habet notas, Spumeum nominauerunt. Theophrasti historia de eo hæc est. ἑνὴρα δὲ μέγαν ἡράκλεια καλεῖται, τὸ μὲν φάλλαν ἔχουσα ὁδόντρον ὅσον τὰ δόνηα λευκαίνοντι, ἢ ὡς τὰ λευκὰ ἐπιπλάττειν, τὸν δὲ καρπὸν λευκόν, καθάρα ὅσα ταῦτα ἢ ἴσῃ, χρῶνται δὲ τινος πρὸς τοῦ ἐνιδαντοῦ ἐν μιλίρην. Quod est. Aliud etiam Papauer Heraclium uocatur, folium habens Struthio, id est, Lanariæ herbæ, qua lintea dealbantur, similem: Radicem cæcidam in superficie terre, Fructum itidem candidum. Purgat per superna radix eius. Vtuntur ea aliquando comitiales in mulsa aqua. Quæ non ideo dicta a nobis sunt, ut quæ parū feliciter Plinius ex Theophrasto in hoc Papauere reddidit, redargueremus: iam pridem enim a Leoniceno, & ab alijs deprehensum id est, sed ut concordem antiquorum duorum scriptorum in hac planta historiam & medicinam ostenderemus; simulq; moneremus, quæ mutata ex communi lectione a nobis fuerit, autore Theophrasto mutata fuisse: nec illud etiam relinqueremus, accedere nos eorum iudicio, qui Plinium in descriptione Papaueris huius redarguunt, nec posse a quoq; ita tam manifestā re satis defendi.

De Hypecōo. CAP. LXXI.

Hypecōon, aliq; Hypopheō uocat. Nasci in segetibus aruisq; folijs Rutæ, exilibus ramis. Natura eadē quæ Papaueris succo.

C **D**E Hypocō sunt inter latinos Plinio omnia eadem. Nasci in segetibus enim ait Rutæ folijs, & eandem Papaueris succo naturam illi esse.

H **¶** De Apollinari, & Hyoscyamō. CAP. LXXII.
Hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamō uocant, alij Adamanta, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Atomon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras, & Ostanes, Zaleo, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani Apollinarem, Aegyptij Saphthio, Ethrusci Sabulum, Galli Billinuntiam, Daci Dieli-
am. Prutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis ordine prodeunt, tanq̃ punicorum Cyti-
ni, scutulis septi seminum plenis, ut Papaueris. Tres eius differentiae. Vna semine nigro, floribus penē purpureis, simlaccis folijs, cytinis p̃-
duris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut Irionis. Flores lutei, fo-
lia & siliquae simplices. Ambo insaniam gignunt, & soporem. Ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum es-
set, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris, seminif-
q̃, in maritimis rudibusq̃ nascens. In cuius deficientis uicem, rufum usurpari oportet. Niger ut deterrimus, improbatur. Recēti semine, cau-
libus folijsq̃ tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usq̃ prorogatur. Nam facile corruptionem sentit. Extrahit-
D tur etiā separatim ex sicco semine, in aqua calida tuso, et obrito. Suc-
co autem liquamentū praestantius, & magis dolores finit. Contusa her-
ba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liqua-
mentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyrijs quae doloris sensum auferunt, comodissime inferi solent. Contra acutas, ca-
lidasq̃ fluxiones, dolores aurium, atq̃ tuiluae mala profunt. Cum fari-
na autem, aut polenta, oculorum, pedum, ceterarumq̃ partium inflā-
mationes placant. Semen eadem praebet. Tussi, destillationibus, oculo-
rum fluxioni, & doloribus, efficac. Contra mensitiam abundantiam, &
erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine & aqua mulla bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, mamisq̃
tumentibus a partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoq̃ cataplasma-
tis, quae doloris leuamentum praestant, ammisceri solet. Folia omnibus
medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissime im-
ponuntur. Recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur.
Cum uino ter quaterne pota, sanant algidas febres, quas Hepialos uo-
cant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli metisura manduntur, me-
diocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiens
te infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Alter Dioscorides (ut Galenus inquit) Hyoscyamon apud Hippocratem uidetur interpre-

tatus, id quod ille *ῥίσις κάρπην*, hoc est, fabæ semen appellauit. Hyofcyamon uero Græci uidentur appellasse, hoc est, fabam suillam, propterea, q̃, ut Hælianus ait, pastu eius herbæ, resoluuntur & conuellantur apri. Sed remediū nouere. Aquas eī statim adeūt, et caneros uenant, atq; ita protinus salutē restituuntur.

EX M. VERG. COMM.

Hæc est Hyofcyamos illa, contra cuius maleficium hic ipse scriptor pluribus remedijs, & uolumine pugnabit. In qua non male damnauerit aliquis naturam, quæ humanæ menti noxiā, & in furorem homines agentem herbam, tam sagaci artificio, contra cœli iniurias omnes munierit & ornauerit. Nec minus etiā demirabitur gentes, quæ tam multis, tamq; honestis appellationibus, optabilem ignaris & admirabilem fecerint plantā, quæ alioquin ob eam quæ diximus causā, ableganda ultra Sauromatas fuerat & glaciale Oceanum: ut alsiōsis locis illic nascens, ante maturum semen totā aliquando periret. Nisi forte contra uota hæc nostra intulerit aliquis, tam grauem noxam non minore bono eam rependere: optandamq; in orbe nostro plantam, quæ tam efficaci remedio contra dolores, quibus totā aliquando perit uita hominis, pugnet. Nec quia menti noceat, ideo doloris lenimenta quæ habet, abiicienda. Parum sapienter enim, quia malo coniunctum sit bonum, ex altero utrunq; damnatur: cum liceat distrahis in diuersa contrarijs malo prudenter carere, bono autem feliciter uti. Quod in Apollinari herba, præsertim faciendum. Quam Græci Hyofcyamon, id est, suum Fabam ideo uocauerunt, q̃, ut in historia sua reulit Helianus, pastu eius conuellantur fues, præfenti mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Alij, ut fit, in desyderio salutis, & suauiore uoluptatis sensu, cum opē eius a dolore ad indolentiam quasi diuino quodam beneficio restituti fuissent, non ultra Hyofcyamum a suis, sed a Ioue Dyofcyamum, id est, Iouis Fabam dixerunt. Vbi eadem nominis ratione illi etiā sunt, qui a medicinæ autore deo Apolline, Apollinarem herbam, & Pythonion eam dixerunt. Phoebeum enim & illud a Pythone nomen est. Fuerunt contra, q̃ a maleficio eius Emmanes, id est, in insaniam & furorem agentem eam nominauerint: & a somno quem facit Hipnoticon. Somnificum enim ea uox significat.

De Psyllio. CAP. LXXIII.

Psyllion aliqui Cataphysin, alij Cynocephalion, alij Chrystalion, alij Cynomyan, alij Psyllerin, alij Sicelioricon, Siculi Comidijn, Romani hærbam Pulicarem, aut Silbaciū. Aphri Vargugum appellant. Folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus, sarmento sa in totum hærbula, ramis dodrantalibus. Coma medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis, semine duro, nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis et incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens. Articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur. Siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum, calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Facilis est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida ulcera, & quæ cacœthe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluctione laborantibus, ex melle prodest.

BARBARI COROLL.

Psyllium, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, flores canino capiti, ut Plinius non dissimiles, ob id Cynocephalion uocatur, & Cynoides. Corrigenidū enim locum in Plinio putamus, ubi non floribus, sed folijs canino capiti similibus describi-

Pli. li. 26. ca. 10
& s.

Cur. Alioquin in exemplaribus manu scriptis, floribus, non folijs. Semen in baccis effigie pul-
cis: unde nomen. Prouenit in uitiarijs. Mendosum & illa quoq; parte Plinium existimo, cum
dicit, Psyllibus lacteum succum esse, qui densatus in gummi, & lumpus cum melle, uomitio-
nes faciat, præsertimq; bilem trahat. Quid enim sint Psylles, non comperi.

E X M. V E R G. C O M M.

Reuocanda in hunc locum quæ superiore uolumine de Conyza constituta fuerunt. Cuius
dumq; legentibus, quoniam duæ Pulicares herbæ in hoc opere nobis sunt, ne difficili utriusq;
intellectu, earum simul nomina misceantur. Illa enim Conyza Pulicaris, hæc simpliciter Pul-
caris dici tuæ iussa est. Cur autem diuersas eodem indicauerimus nomine, non leuis fecit cau-
sa. Non poterat huic ex græci nominis ratione nota hæc deesse. Græci enim a Psyllis, quæ pul-
ces in ea gente sunt, Psyllion, id est, Pulicarem uocauerunt. Non poterat græca uox etiam aliter
uerbi. In illa coquebat omnium hætenus scriptorum consensus, qui Pulicarem eam in commen-
tarijs suis passim uocauerant, a pulcibus pariter indicare. Accedebat deinde his, qd utraq; cau-
sam aliquam cur sic uocari posset ostendebat. Illa, qd hærentes sibi pulices enecat: Hæc, qd semi-
ne, ut Plinius ait, puliceo esse; & si uerum sit quod hic ait, uiridem in domum illatam pulicū ge-
nerationem prohibere. Descripsit hanc Pulicarem Plinius lib. 25. cap. 9. Pluresq; & ille ex adie-
ctis his appellationibus numerauit, Crysalion, Sicelicon, Cynomyam, & Cynoides. Quam
aliquæ non satis certam modo causam habent: aliquæ a uiribus notisq; eius factæ sunt. Qualis
Crysalion est, qua indicatur qui ea uis sunt crassescendi defendandiq; uim quam ea habet. Cry-
salium enim glaciem græci uocant: quæ in lapidis duriciem cōcreta, densataq; frigore aqua est.
Illi simile aliquid Pulicaris huius herbæ liquor habet, ut ex eius in scriptore hoc historia, & ex
Plinio patet. Retulit idem Plinius, folijs canino capiti (modo integer locus ille sit) non dissimi-
libus esse: contra qd hic, qui Cornicis pedi herbæ comparauit. Quo fit, ut uicium in Plinio suspi-
cemur. Nec tamen habemus unde Cynocephalium, & Cynomyiam, in quibus uocibus ex ca-
ne aliquid est, dictam fuisse significemus. Sicelicam deinde a Sicilia uocatam, cōjungere facile est.
D Sarmetiosam, quā hic *χαρδάμο* Plinius esse dixit, Nos Feni modo foliosam furculosamq; poti-
us diximus: longo intervallo distare latinorum sarmenta, a græcorum *χαρδύ* scientes: qua uo-
ce illi significant omnes quæ ad Fenum in pratis nascuntur herbas. In uiribus eius etiam nō pa-
rum uariant antiqui scriptores. Hic mollire, adstringere & refrigerare eam dixit. Plinius illi ad
refrigerandum & discutiendum ingentem uim assignauit. **P A V L V S A E-**
gineta in secundo ordine refrigerare, & præter id mediās habere, in siccando & humando ui-
res testatus est. Quæ quoniam non sunt omnibus eadem, signare legentibus placuit. Quem-
admodum, & quo loco corruptæ, nec bene respondentis lectionis notam adiecimus, legentes
monemus: uideri nobis, quod & Plinius indicat, præcipi a scriptore hoc, contra capitis dolo-
res ex aceto, aquaue, aut rosaceo fronti temporibusq; imponi semen. Mox in alijs affectioni-
bus, intestinorum ramcibus uerbi causa, aut procidentibus umbilicis habendum in duabus
aquæ hemiris tritum idem semen: & cum aquam, ueluti in gelu & glaciem densauerit, quod ut
eius fore intelligendum est, tunc cōcreto seminis eius diluto illo antedicta uitia inungere. Sed
parum certus in scriptore hoc sensus hic est. Cui etiā in antiquioribus & melioribus græcis de-
est qd ultimū in hoc capite, & ab eo loco legitur, Eadem in seruente aquā dimissa, &c.

De Hortensi Solano. C A P. LXXIII.

Hortensium, seu urbanum Strychnon, Romani Solanum uo-
cāt, alij Cacabulum, Aegyptij Allelo, Galli Scubulum, Aphri
Astrifrunim. Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concauis a-
lis, folio nigro, maiore qd Ocimi, & latiore, fructu rotundo, uiridi, qui
post maturitatem nigricat, aut fuluescit. Hærbæ innocentis gustus. Na-
tura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sac-
cris, cōuenienter cū polline polentæ illinunt. Aegilopia, capitisq; dolo-
res, trita & imposita sanant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Paroti-
das, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem
sacrum, atq; ulcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spu-

ma, ad ægilopas cum pane, infantium adustioni, quam Syriam uocāt, **A** cum rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aquę uel oui uicem exhibet, contra acutas fluxiones, suffusioneſq̃. Aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantia sistit, in uellere subditus. Succus fuluo galinarum in domibus oberrantium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

BARBARI COROLL.

Strychnon, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan, hoc est, nigrum cognominat, a nostris Solanum dicitur, familiare cibus, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus esse prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Flos huic est candidus, adni, siue pomā potius herbacea, & quadamtenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romæ uidimus in horto oratoris Galli.

Pli. li. 21. ca. 31

EX M. VERG COMM.

Vesicarias in Theophrasti plantis Gaza Strychnos duas appellauit: sopores alteram, furores facientem alteram: quæ huic scriptori in quatuor eius generibus postremæ sunt. Videturq̃ ex Plinio uolumine. 11. cap. 11. cōmune id nomen omnibus fecisse: cum tamē Plinius secundū eius genus tantum cognomento Halicacabum, Vesicariam uocer: causamq̃ afferat, q̃ ueslicę & calculis prosit: in qua ui subscribentem sibi habet hunc scriptorem, qui *δυσπικνόν* ait Strychnon eum esse. Verumtamen dubitari facile potest, an alia nominis eius causa quondam fuerit, qualis in eo mox a nobis dicitur. Vesicarias, ut præmonstratum est, Strychnos omnes ille dixit. Celsus contra, ultimo secundi libri capite, cum numeraret quæ reprimunt simul & refrigerant, post multa his uerbis Solanum Strychnum uocauit. Sifer, apit, solanum, quam Strychnum græci uocant, hanc intelligens, cui & a Dioscoride præcipua in refrigerando uis assignatur. Nosq̃ latine rei antiquum autorem secuti, Solanum, non uesicariam Strychnum horrensem, siue satium diximus, quæ nigris folijs & in extrema maturitate nigro semine ab hoc & ab alijs describitur, pingui cultorq̃ solo proueniens: cuius nostra ætate nullus in cibus usus est: & si hie hortense, satium, edendo esse & in cibo innocens dicar. Quibus cōiungere aliquis merito possit, fuisse quondam in sanitate aliquem eius usum. Solani huius. 9. de plantarum historia Theophrastus duo tantū facti genera, *στρόχινος καὶ μαρινός*, id est, quod soporem, & quod furorem gignit. Suntq̃ de utroq̃ multa ab eo dicta, quę suis locis ex eius historia a nobis reperiuntur. Cæteri omnes, autore ut nos credimus Dioscoride, quatuor Strychnos deinceps numerauerunt, Satium, horrensemq̃ hunc, & cibarium: quem omnes nigrum a colore fructus uocauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quem priuatim nos Vesicariam a Plinio uocari credimus, rubente fructu, uute acini figura. Tertium somnificum, quem fruticosum describit. Postremo insaniam facientem: diuersis in medicina etiam uiribus, quæ ab hoc scriptore statim patebunt. Obseruauimusq̃ nos, ad refrigerandum plerūq̃ usum Solani fuisse, & ex tam multis eius generibus Hortense ad eum usum maxime probasse antiquos. Cæteris enim maleficij periculum magis q̃ remedium inest. Facilis cognitu herba, nunq̃ deceptura incautos, si quas habent tot eius genera discretas folijs, fructu, coloreq̃ notas diligentius obseruauerint. Utitur hortensis huius Solani succo Paulus Aegineta in primo ad refrigerandos in infantibus capitis ardores, quos Græci Syriam uocauerunt.

B

De Vesicaria.

CAP. LXXV.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabō, id est, Vesicariam, aut Phyalida uocant, folijs antedicto latioribus. Cuius caules posteaq̃ adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui. Quo coronarij utuntur, & corollas faciunt. Vim usumq̃ hortensij Solani habet. Vesum cibus nequaquā expetitur. Regium morbum purgat, semine potio. Et urinam pellit. Ex utraq̃ herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens.

στρόχινος ἀλυσία
ῥος

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Strychnon Halicabon folijs Ocimi describitur a Plinio, commendatum quidem & hoc a bis ab aliquibus, licet hortense præferatur. Radicem Halicacabi bibunt, qui sunt uaticinandi callentes, qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt. Aspidum naturæ in tantum aduersa hæc herba est, ut radice propius admota, soporentur.

E X M. V E R G. C O M M.

Coronaria, quod hic, & Plinius testantur Vesicaria hæc quondam herba fuit. Damnarunt tamen ambo eius in cibis usum, nec ad coronas amasse ueteres aliud in ea uidentur, quæ uellicas, folliculosque illos qui per ambitum capitis ex coronis pendentes, grati spectaculo ruberent, turbinati, grandæque, & liliaci fistri, ex quo crepitacula pendeant, imaginem reddentes. Nascitur Vesicaria hæc multa in uincis, in Italia herba uerius quam frutex: præfertque Vesicillas illas Septembri mense colore primū uiridi, mox paulatim rubescere, turbinatas ut Plinius ait: semen Ciceris magnitudine intra se claudentes, rubro colore, nec nisi extremo Autumno maturescens: in nullo nostra ætate honore, aut usu. Vesicariæque nos credimus a uellicis his potius, quam quia profuit uellicæ. Et si Plinius id testetur dicta fuisse, in tantum quædam, etiam ex uellicis folliculisque his factum illi nomen est. Nec aliter herbam intuentibus uidebitur: tam similes animalium uellicis folliculi illi sunt.

De Solano somnifero. C A P. LXXVI.

SOLANVM somniferum e Græcis aliqui Dircon appellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarem minorem, alij Vlticanam herbam, aut Opfaginem, Daci Cycolidæ, Pœni Cacabum. Fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, Cotoneæque mali similitudinē, plenis, flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur. Si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsæ, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

B A R B A R I C O R O L L.

The. li. 7. ca. 14

Strychnon Hypnoticon, id est, soporiferum, ab alijs Morion, ab alijs Moly appellatum, Coronarijs in Aegypto expetitur, inuitante similitudine florum Hederæ. Velocius hoc ad mortem quam Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nostri Vesicariam, a folliculis, uel quia uellicæ profuit & calculis. Theodorus omnes Strychnos Vesicarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto candida, cum inarescit. Semen cocineum, folia mali Coronei, Lactucæ uel caprinæ: sed hirsuta, magno cespite, in rupibus sepulchre: nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabi uocauit. Eademque ad uerbū fere scripsit, quæ nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est, quæ proximo capite superius descripta est, ut Galenus inquit. Laudat hoc a loco* ad fruendū, & Tamariso.

*

De Manico Solano. C A P. LXXVII.

Strychnon, siue Solanum Manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidam Orthogyon. Huic folium Erucæ simile, maius aliquanto, satis ad spinam, quam pæderota uocant, accedens. Caules a radice eximios emit, decem aut duodecim ulnarum altitudine adulescentes, caput in

cacumine Oliua maius, & latius, & ut Platani pillula, hirsutius. Flo- **A**
rem nigrum. Postq̃, eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis;
aut duodenis acinis constans, similibus Hederae corymbis, ut uuae mol-
libus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in mon-
tibus uento perflatis, maritimis foueis, & uagis. Radix drachmae uni-
us pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq̃ non iniucun-
das obuersari: Sed duplicatus hic modus, ad treis usq̃ dies, mentis alie-
nationem affert. Triplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copio-
sius pota, & uomitione reiecta.

B A R B A R I C O R O L L.

Strychnon Manicon, insaniosa herba: qua & Doryon, siue potius Dorycnion uocabat: ga-
euspides in plijs eo tingerent, passim nascente. Alij Petisson appellabant, foliū Erucae maiuscu-
lum, capite Gethyi maiore pilosioreq̃, ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pul-
cherrimos affirmas. Hoc & coronarijs placebat. Erythron dicebat, & Neurita qui nequiter oc-
cultabat, ut inquit Plinius. Frutex est furculosus uentus q̃ herba, ut Plinius tradit: folliculis ma-
gnis, latisq̃, ac turbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

De Dorycnio.

CAP. LXXVIII.

Dorycnion Crateuas Halicacabon, aut Caleam uocat. Frutex **deponitur**
Oleae nuper prodeunti similis. Nascitur in petris non procul a
mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleae similibus colore, minuscu-
lis, firmioribus, praeter modum scabris, flore candido, filiquis in cacu-
mine ceu Ciceris, densis, rotundis, quinis intus, aut senis seminibus, **B**
exigui Eruī magnitudine, laeuius, firmis, uersicoloribus. Radix ad
digni crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum es-
se constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere, qui dice-
rent, semen in amatoria expeti.

B A R B A R I C O R O L L.

Dorycnion, siue Dorychpidion, tam per, c, q̃ per, ch, etiā pro Strychno Manico acceptū a
quibusdā ueteribus inuenio. Dioscorides & Galenus, uidentur aliud ab eo genus existimasse.
Dictum fortasse ita, q̃ cuspidis telorū insicere mos esset illo, ut in Manico Strychno diximus.
Dorycnio gustus lactis est, & contracto emanat.

De Mandragora.

CAP. LXXIX.

Mandragorā aliqui Circeum, alij Xeranthès, aliqui Antimnion, **mandragora**
aut Antimion, alij Bombochylon, nonnulli Minon, Aegyptij
Apemum, Pythagoras Anthropomorphon, alij Aloeten, alij Thrida-
ciam, alij Cammaron, Zoroastres Diamonon, aut Archinen, Magi He-
mionos, aliqui Gonogeonas, Romani Caninū malum, alij Terrestre ma-
lum, quidam Animelon, nonnulli Dircaeā, alij Circaeā uocant, quo-
niam uideatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. Niger,
quae scemina existimatur, Thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac
minoribus q̃ Lactūcae, graueolentibus, in terra sparsis. Mala gerit luteis
ouorum similia, pallida, odorata: in quibz semen uelut pyrurum.
Radicibus inhæret binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, in-
R iij

Etus albis, carnofis, ingētibus. Verum is Mandragoras caule uiduus eſt. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Norion uocitatus. Huius folia magna, alba, lata, laeuiā ut Betæ. Mala t̃p̃ alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opiſtiones ſoporantur. Radix alterius ſimilis, maior, & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radicis tuſo, & prælis ſubiectō, qui terendo coactus, fictili reconditur. Mas lis quoq; ſuccus depromitur, ſed aliquanto ignatior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad uſum ſuſpēditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquant, & defæcatum ius ſeruant. Cyathocq; uno utuntur, in peruiſiſijs, & doloribus, & ante ſectiōnes, uſtionesq; ne ſentiantur. Succus duobtis obolis ex mulſo potus, ut Veratrum, per uomitiōnes bilem atram, pituitamq; extrahit. Verum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, peſſis quoq; emollientibus, ammiſcetur. Semioboli pondere inditus, menſes & parvus expellit. Subditus pro Balano, ſonnificus eſt. Radix ebur emolliſſe fertur, quæ ſenis horis cum eo decocta ſit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipſum facile præſtat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas ulcera citantur, cum polenta illinuntur. Duricias omneis, ſuppuratiōes, ſtrumas, & tubercula diſcutiunt. Stigmata ſine exulceratione deſcunt, ſi quinis ſenisue diebus ſenſim perfricentur. Folia ſeruantur in murijs, eoſdem ad uſus. Trita radix ignibus ſacris ex aceto, & ſerpentium iſtibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atq; tubercula, cum aqua diſſipat. Articulorum cruciatus, cum polenta ſedat. Fit citra coctiōnem uinum e cortice radicis ad hunc modum. Ternæ minæ in uini dulcis metretam conijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui ſecari, aut amburi debent, ut ante dictum eſt. Siquidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed ueterno quodam preſſi, torpeſcunt. Mala ſoporem afferunt olfactu, & etiam ſi mandantur. Item expreſſus ex eis ſuccus. Nimio tamen odore percuffi, obmutescunt. Semen malorum potum uulvas purgat, appoſitumq; cum ſulphure ignem non experto. Rubra ſceminarum profluuiā liſtit. Scarificatis multiphariam radicibus, erumpens lachryma, cauō uafe recipitur. Eſt autem lachryma lacteo ſucco efficacior. Sed non ubiq; ut experientia docet, radices lacteum ſuccum delachrymant. Alium tradunt eſſe Mandragoram nomine Morion, in opacis iuxta ſpecus enatum, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quæ mollis eſt & candida, paulo maior palmo, pollicemq; craſſius dine æquat. Tradunt eam in pane, oſſa, obſoniorum drachmæ pondere deuoratam, non memoriā modo, ſed uſum quoq; rationis interciperē.

Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos, A
ternis quaternisue ex quo data est horis. Hac medici utuntur, cum scin-
dendi, urendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem cum
Manico Solano potam.

B A R B A R I C O R O L L.

M Andragoræ fructus niger, sapore quodā uini, effigie uini: non ut Theodorus putat, race
mi *βερρυχιδος*, aut *βερρυχιδος*, pro eo quod erat *βουχιδος* in Theophrasto legens. Fœminæ folia
hirsuta, radices carnosæ, teneræ, cubitales fere. Mala hæc fert Auellanarū nūcū magnitudine.
Mas Arsen, & Hypoploimion quoq; dictus, folio latiore, ut Lapathi satiuæ. Cauent effossuri
contrariū uentū, tribus circulis ante gladio circūscribentes, ad occasumq; spectantes. Succus
non ubiq; inuenit, sed ubi potest. Circa uindemias quærit. Odor grauis eius, sed radicis & ma-
ligrauior. Succū excipiunt deciso caulis cacumine. Adeo caulē habere non dubitant, etiam si
Dioscorides id negat. Hic & hirsutus fœminæ tribuit. Foliorū succus Roscidorū pectus est, ut
inqt Plinius. Mandragorā condamaui frigoris uenenū esse, nemo non scit. Inuenio herbæ no-
men Andradon, a similitudine uirili dictæ. An eadē hæc sit cum Mandragora, nō legi. Sed est
cur esse sentia: quippe cum & Anthropomorphon dicat. Nisi quis Andradon, quia frangat, &
occidat hominē, dictam putari: cuiusmodi uim multæ habent herbæ. Nam & annus uitæ. 63.
ut est apud Maternū, Andrades uidet appellatus: quia duplici rōne climatericus sit, & maxie
frangat hoies. Alioqn ab hois effigie Andricelon posuiss, q̄ Andradon dici potuisset. In quo &
illud notandū, Andricelon apud Græcos, ut Aristoteles, & Iulius pollux testant, coloris genus
est, quē nōs Purpurissum dicimus: atq; ita placuisse, Theodoro quoq; nostrō liquet.

De Morio Mandragora nihil habeo qd addi possit hīs, quæ a Dioscoride notant. Sed quo
niā mala Terrestria & Carina Mandragoræ fructus appellantur, in mentē subeunt quæ uulgo
Melenzaia uocitamus, hoc est, ut ipse puto, Mala insana: de quibus nihil ueteribus scriptum
fuisse, iam desino mirari, q̄ multa huiusmodi repio. Sicut hercle multa quondā fuere, quæ mo-
do uel ignorant, uel certe non habent. Mala ergo insana e frutice uulgarī sunt, passim nascēte, B
ut melones, & cucurbitæ. Pari quoq; cultu, folijs prope siculneis, flore oblongo, specioso, can-
dido. Manditur uulgo pomū ex oleo, sale, pipere, Fungorū modo coctum.

E X M. V E R G. C O M M.

QVI Mandragoram quotidie circūferunt Agyrtæ, iactantq; tanto periculo effodi huma-
na forma, ignaræ plebi eam ostendentes, ex uno (ut nos credimus) Pythagoræ no-
mine, eius Anthropomorphos mēdacij sui occasione arripuerunt. Neq; enim uox illa aliud, q̄
humanæ formæ plantā significat. Accessit & Pythagoræ Columella, qui ex eadem ueluti no-
minū superstitione ostentatione, in carmine suo cecinit. Quāvis semihominis uesano gramine
fœta, Mandragoræ paria filios, mœstamq; Cicutam. &c. Non desuerunt illis etiam in iactan-
da cū foditur Mandragoras religione, Theophrastus in Græcis, in Latinis uero Plinius. Quos
non puduit, in tanta rerum grauitate quas scribebant, ut quid cōtra cōmunem sensum dixisse
uiderentur, populares, & sine ratione ritus huiuscemodi posteris tradere. Quæ autem Theo-
phrastus pro Mandragoræ fossura docuit, huiuscemodi sunt. περιγράφει δὲ καὶ τὸν μανδραγόραν
ὡς ἔστιν ὅμοιος τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸς τὰς ἀνθρώπων βλάπτωντα. τὸν δὲ ἔτιον κύβω περιεχέσθαι καὶ λίγνῃ τῷ πλείστῳ
πρὶν ἀρραδίσειν. Quorum sensus sit. Circumscribunt & Mandragoram gladio ter: secantq; ad
occasum spectantes. Iubent & alium saltatē tripudio circumagi: multaq; de Veneris usu &
re dicere. Plinius lib. 25. cap. 11. pleraq; eadem Theophrasto, & his non dissimilia quædam. Ca-
uent fossuri contrariū uentum, & tribus circulis ante gladio circūferunt: postea fodit, ad oc-
casum spectantes. His au Astoribus, & quāsi per manus translata huiuscemodi supstitutione, ueris-
simile est, uanis periculorū, religionisq; & humanæ formæ mēdacijs celebrari nūc etiā Mandra-
gorā. Cum tū id potius quærendū fuerit, cur a sapiente illo Samio honestiore hominis nomi-
ne indicata fuerit. Neq; em̄ uerisimile est, quia bina radice, & hominis crura imitante nitatur,
plerunq; in terra sic dictam ab eo fuisse: trinis em̄ aliquādo hæret, multis aliæ stirpes huiusce
modi bifida radices diuisione uidetur. Abstrusiorē ex religione, cuius ubiq; magnus ille auctor
erat, causam habuisse id nōmē oportet. Nos illud ignoramus, relinquiturq; inueniendū peri-
tioribus & docendū: neq; hoc tantū, sed tam multas appellationes alias, qbus Mandragorā
antiquitas indicauit. Quæ em̄ inter eas notiores sunt Circeon, & Thridacias, ab hoc ipso scri-

Pli. li. 25. ca. 11.
Theoph. li. 9.
cap. 9. 13.

B

Cptore declarare, & per se satis patet. Sunt toto hoc capite aliqua per se, & quoniam non sunt nobis cum alijs eade, legentibus aduertenda. Quale est, qd hic ait, poma Mandragorae ouorum uicellis similia esse, a Plinio Auellanae nucis similitudine describi, non leui inter utraq; forma, coloreq; diuersitate. Theophrastus. 6. de plantaru historia, nisi uicellum in lectione eius sit, qd suspicamur, contra utruq; uidet de pomi huius colore, & magnitudine tradidisse. Verba eius sunt. *ἡ δὲ δὴ ὁ καρπὸς τοῦ μανδραγόρου. τὰ μὲν αὖτε καὶ γὰρ ὁμοῖοι καὶ τὸ χυμῷ.* Quod est. Priuatim uero Mandragorae fructus, quia niger, acinosusq; & sapore uinosus est. Colore nigrum, acino uue aequalē, & uinoso sapore pomum Mandragorae Theophrastus describit; Hic aut ouorum uicellis, qui orbiculati sunt, cōparat; & ὀρχα, id est, pallida dicit: quā descriptionē natura magis cōfirmat. Discrepant non leuiter etiā hīdem auctores: q; hic utruq; Mandragorā caule carere ait, Theophrastus contra eodem loco cum Ferulam descripsisset, subiecit. *τῶν δὲ ἁλλῶν τὰ μὲν ὁμοίωτον τοῖς τῶν κανλῶν ἔχει κατὰ μέρος ὁ μανδραγόρας καὶ τὸ κύων.* Quorū uerborū sensus est. In reliquis aliae quidem similiorem huic caulem serunt, qualis Mandragoras est, & Cicuta. Plinius etiā quo diximus loco idem testatur dicens. Succus fit & e malis, & e caule deciso cacumine. Palāq; ambo hi caulem Mandragorae tribuunt, quē Dioscorides penitus aufert. Non ausim ego inter tam graues auctores tertius ueluti arbiter censere. Sensus id faciet: poteruntq; uolētes uel a peritis audire, uel ipsi totam Mandragorae naturā obseruare.

De Aconito.

C A P. LXXX.

ἄκονιτον

Aconitum aliqui Pardalianches, alijs Cammoron, alijs Thelyphoson, alijs Myoctonon, alijs Therophonon uocant. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altum. Radix scorpionis caudam aemulatur, & alabastris modo splendet. Torpescit, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. Qui rursus Hellebori contactu excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloribus gratia adijcitur. Enecat pantheras, sues, lupos, & feras omneis, in carnibus obiectum.

B A R B A R I C O R O L L.

Theoph. li. 9.
cap. 16.
Pli. li. 27. ca. 21

Aconiti primū genus Pardalianches, & Thelyphonon, siue potius Theriphonon cognominatur. Ceterū Theophrastus simpliciter, & sine Aconiti mentione Thelyphonon, & Scorpion, a radicis similitudine uocauit, geniculatū tradens, graminis modo, locis umbrosis, & cetera quae hic a Dioscoride tradunt. Hoc solum genus a Plinio demonstratū est, hirsuta leuiter eius folia prodendo. Vocatur & Myoctonos: quoniam e longinis mures odore necat. Inuentio & Myephonon uocari genus herbae, quā & Sciada quidā noiant: nec quae sit ea docent, praeterq; q; Phantias in lib. de stirpibus, haec habet uerba. Pileari forma sunt, semen Anisi, Fentuli, Coriandri, Caulicidis, Cicuta, Pastinacae, Sciadis, quā & Myephonon uocat. Plinius & Theophrastus, Myophonon, cui neruosus est cauliculus, Aconitū porro Theophrastus in Creta, & Zacyntho nasci maxie putant: de Lycoctono (ut arbitror) locutus. Sed optimū in Pontot circa Heracliam, ubi monstrat Hercules ad inferos aditus, quasi ex spumis cerberi canis ortum. Hoc a Thelyphono, ut testatus modo sum, differre arbitror. Constat enim folio syluestris Intubis: q; Aetius non Seridis (id enim significat Intubū) sed Iridis syluestris accipit. Radice non nucis, ut Theodorus transtulit, sed Gamaris marinis specie: quoniam Caryas pro Caridas, uel Carabidas legisset. In quo notandum, Carabos, qui & Grapsaei sunt, interim pro locustis, interim pro Gamaris a ueteribus acceptos: ut Athenaeus auctor est. Carides uero Squillae sunt, quas & Curidas, & Coridas, & Colybdenas quidā uocant. Etiam si marini gentile, Nicander Colybdenā putauit. Aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed ut Frumeto. Semen ei tamen in spica non est. Nascitur ubiq; nec tantū in cauitibns nudis, quas Aconas uocant, unde Aconitū nonnulli uolunt appellatū. Alij quia in petrosis parte plurima nascenti, nullus iuxta puluis esset. Alij a pago, siue oppidulo, siue portu Perianthynorū ad Heracliam ita noiato. Alij quoniam uis eade in morte esset, q; cotibus ad acie ferri decutiendā, statimq; admota uelocitas sentiretur: Fructū eius & foliū nihil nocere praedicat. Vim mortiferā in radice haberi. Ad erodendā ut ea medicos: pparari uero posse, ut tollat biennio, aīo, mēibus sex, tribus, diobus, uno (rōne etiā pitionibus occulta) miserius perire, q; poto eo diutius uitā extrahant. Differri, celerariq; sumēti

bus exitiſſi, prout ſero, aut ocieſſe collectū fuerit. Debellari peſſe eam nō alia radice, ut quidā ex promptere, ſed aut uino, aut melle ſucceſſu raro. Alſoq̃n reperto in uiceribus ueneno, ceu pari inuēto; nō perimit, ſed colluctat cum eo tantū. Ita duo uenena cōmoriunt, ut anial ſuperſit. Omniū porro uenenorū ocylſimū eſſe Aconitū, ut tactis quoq; genitalibus ſcēminini ſexus animalū, eodem die mortē inferat. quo modo interēptas a Calphurnio beſtias dormiētes uxor-
es M. Caelius obiecit. Fugiūos eo in uinculis uti ſolitos, deſponſo animo Aconitū ſeruanti-
bus, inſitura capitis poena. Quod autē ſit herbæ genus Aconitæ uocari, non reperi. Etenim ut Athenæus inquit, grāmatorū mos eſt, poētās, & auctores alios enarrantiū, cum qd̃ huiuſmo-
di occurrerit, quaſi cōniūendo præterire, nihil aliud teſtantes, q̃ aut lapidis, aut animalis, aut
floris genus eſſe. Quo ſit, ut parū fidei grāmatis in hac eruditōis parte ſemper habuerim. A-
conitū inueniſſe prima dicitur Hecate, uenenorū inſigni crudelitate ſcēmina, quæ Perſam pa-
trem, Solis filium, perinde crudeliſſimū, ueneno ſuſtulit, auctor Diodorus. Propterea q; Oui-
dius in Metamorphoſi cum herbā dixit Hecateida, uidetur Aconitum accepſiſſe.

BARBARI CÖROLL.

Contra Grāmatorum omnium decreta, Poëtarumq; fidem, quorum illi rationem nomi-
nis ſecuti, ἀπὸ τῶν ἀκονίτων, id eſt, a cautibus, in quibus naſcitur Aconitum, dici paſſim teſtan-
tur, hi, præſertimq; Naſo in Transformationibus ſuis cecinerunt. Quæ quia naſcuntur dura,
uiuacia caute, Agreſtes Aconita uocant. Theophrastus, 9. de plantarum hiſtoria ubiq; naſci
Aconitum teſtatur eſt; neq; a cautibus, quas Græci Aconas uocant, nomen illi factum fuiſſe,
ſed ab Aconis Periandynorum pago, qui ad Heradium Ponti eſt, Aconitum uocari. Amare
quidem, & naſci plærūq; in petrolis, non tamen a petris nomen inueniſſe. Verba eius ſunt,
quo diximus loco. *φύεται δὲ παταχῶ καὶ ἐν τοῖς ἀκόνισι μόνον ἀπ' ἐν ἧν καὶ προσκαρίαν. ἀπὸ
δὲ τῶν καμῶν τῶν περιαδύων, πρὶν δὲ μόνον τοῖς περιαδύων τόνον.* Quorum ſenſus ille eſt, quē pau-
lo ante diximus. Duo hic ſcriptori Aconiti genera eodem nomine tradit. Theophrastus tamen
eodem de plantarum hiſtoria uolumine, alterum hoc quod modo docetur ſimpliciter nomine
Thelyphoni tradidit. In his, ut uidetur Theophrasto, & huic, omnia ſere eadē ſunt. Diſcrepant
tantū, q̃ hic Aconitū, ille Thelyphonō primo uocat nomine: neuter tamē manifeſtā nominis
eius aliquā indicat cauſam. Quo ſit, ut ſuſpicari aliquis poſſit, in utroq; corruptā eſſe hanc uo-
cem: nec Thelyphonon, quod eſt ſcēminas, ſed Theriophonon, quod eſt, beſtias enecās, quas
multas in capitis ſine hic numerat, legendum eſſe locum. Niſi quod Theophrastus ait, plantæ
huius radicem genitalibus omnium quadrupedum inditam, eadem die eas enecare, de ſcēmi-
narum genitalibus intelligedum tantū ſit. In quā partem inclināt animus nobis: dicente Plin-
io lib. 17. capite. 2. tactis quoq; genitalibus ſcēminini ſexus animalium. eodem die inferre mor-
tem. Quod magis adhuc miretur aliquis, ſciens neq; In altero Aconito huiuſcemodi aliquid
teſtari Theophrastum. Plinius quo diximus loco, tractata ſimul utriuſq; rei hiſtoria, unū tan-
tum uidetur Aconiti genus ſeciſſe, eiusq; appellaciones aliquot palam indicaiſſe: Pardalian-
chesq; ab enecandis Pantheris uocari oſtendiſſe, cum ait, Tangunt carnes Aconito, necantq;
guſtatu earum Pantheras: niſi hoc fieret, repleturas illos ſitus: ob id quidam Pardalianches
uocauere. Thelyphonon etiam, ut diximus, quoniam ſcēminini ſexus animalia enecet, Myo-
ſtonon aliq̃, ab enecandis muribus, quoniam e longinquo mures odore enecet. Cammaron, a
radicis flexura, quam Carydi, id eſt, marinæ Squillæ ſimilem habet, quam in hiſtoria eius hic
ſcorpionis caudæ ſimilem fecit, & Alabaſtrorum modo ſplendere ait.

De altero Aconito.

CAP. LXXXI.

Eſt & alterum Aconitum, quod aliqui Cynoſtonon, aliq̃ Lycōſto-
non appellant, aliq̃ Cyamon leucon, Romani Colomeſtrum.
Huius genera ſunt tria. Vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in uſ-
um ſuum uertere medici. E quibus tertium, quod Ponticū nominatur,
magna ex parte in Italia montibus Iuſtinis exilit: a priore diſtans, quo-
niam ſolia faciat effigie Platani, crebriore diuiſura, longiora, & multo mi-
griora. Caulēm Filicis, læuē ſtylum, cubitali altitudine, aut ampliorē
em. Semen in ſiliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ
piſcis ſcirrorum nigreſcunt. Quibus ad uenationem luporum utuntur.

D I O S C O R I D I S

C Infertæ siquidem crudis carnibus, & deuoratae, lupos enecat.

Pli. li. 27. ca. 3.

H Vius Aconiti neq; formati, neq; medicinas Dioscorides exequitur. Librariorum (ut arbitror) culpa fuit: tria capita scribentium, cum duo tantum Aconiti summa genera dicantur, Galeno teste, Pardalianches, & Lycoctonon.

De Lycoctono, cuius species treis haberi constat, in primo Aconiti genere differui, Theophrastum & Plinium secutus, Lycoctonos dicta est, quia lupos enecat. Habent & nostri rustici ad eundem usum Lupariam uocatam, folio uitis, multas habente diuisuras, & maculas candidas, flore oblongo, luteo. Aetius, Aconitum inquit sunt, qui Aconistemon, & Irin syluestre, & Pharmaciaden uocent, radícula fere graminis.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vale Thelyphonon Aconitum descripsit Theophrastus, satis superiore capite dictum a nobis fuit, superest modo alterum hoc. Quod quale in scriptore hoc sit, partu nobis constat. Dicimus autem quale, integrum ne, an corruptum & decurtatum. Demiramur enim nihil quod ad hominis salutem, aut maleficium pertineat in eo tradi: praesertim docente multa Theophrasto de maleficio eius & remedijs, & praeter Theophrastum Paulo Aegineta easdem priores uires illi decernente: priuatimq; lupos enecare, quemadmodum illud Pantheras: ideoq; Lycoctonon hoc, ut illud Pardalianches seorsum uocari: & praeter hos Plinio libro. 27. capi. 11. unum tantum genus utriusq; nominibus indicat, multoq; aliter q; Theophrastus, qui. 9. de plantarum historia alterum hoc Aconitum his uerbis descripsit. Nascitur ut ferunt Aconitum in Creta, Zacynthoq; Plurimum autem & optimum in Heradia Ponti. Folium habet Intubi, quod uocant Cichoriū, figura. Radicem figura coloreq; maris Squillae similem: & in hac localem uim esse. Contraq; foliorum & seminis nullas ad mortem uires esse. Herba autem semen est non surculosa materiae. Breuis tamē herba ipsa, nec quicq; egregium habens, tritico similis, non tamen semen illi in spica maturefcit. Non uestitur Aconito ouis, nec aliud quidpiā animal. Adiecit his alia quaedam scriptor idem, quae uolentes relinquimus: ne ultra q; opus sit legentes remoremur. Monemus tamē, in cognoscendis illis non fore inutile eorum laborem. Nobis cum satis est, pro Aconiti historia breuiter haec signasse: ut quod paulo ante diximus, cunctis certius fieret, non euenire penitus in Aconitorum historia Græcos, Latinosq; antiquos scriptores. Qui tamē omnes, excepto Plinio, duo eius gēa fecerūt. Alterū quod Pardalianches a Theophrasto, Thelyphonon priuatim dictū est. Alterū, quod Lycoctonon: illud ab enecandis Pantheris, hoc a lupo. Et haec auctore Paulo Aegineta cognomina utriusq; & notae quondā fuerūt. Siquidem ait. ἀκόνιτον τὸ μὲν παραδιδόχῃ ἐστὶν ὡς διληκτικὸν διονύκειος ἰσὶν: ὅτεν μὲν αὐτὸ οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸν πρὸς τοὺς ἄνθρωποις, τὰν σαρκῶν διαμύειν, ἀλλὰ πρὸς τὰς θηρίας, τὸ δὲ διληκτικόν τῆς αὐτοῦ ἐν τῷ περιττῷ διονύκειος ἰδίως τοὺς λύκους, ἀντιπρὸς ὧν αὐτὸ τοὺς παραδίδωσι. Quod est. Et Aconitū quidem cognomēto Pardalianches exedentē, & localem uim habet. Eamq; ob causam intus cauendum est. Foris tamen in carnibus, quas exedi oporteat, uti licet. Quod uero a lupo Lycoctonon dicitur, easdē priores uires habens, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat. Et haec pro altero Aconito hoc ex Theophrasto & alijs inuenta, & obseruata haecenus a nobis fuerunt.

¶ De Cicuta.

CAP. LXXXII.

κότυρι

C Onion aliquibus Aegynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralysis, nonnullis Aphron, Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs Catechomenion, alijs Abioton, alijs Absedes, alijs Ageomoron, alijs Timoron, alijs Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs Catapfyxis, Ostani Babathy, Aegyptijs Apemphi, Romanis Cicuta appellatur. Caulem aedit geniculatum, ut Foeniculi grandē, in cacumine ramosum, folia Ferulae, angustiora, graui odoratu. Umbellae in summo prodeunt, flores quoq; albicantes, & semen Aniso candidius. Radice non alta, concaua. Cicuta letale uenenū inest, suaq; uire frigatoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusq; semina & comae siccescant, qui sole densa-

tur in pastillos. Præcipuus ad medendi rationem usus est aridi. Miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignēs sacros, & ulcera quæ serpunt, illiti restinguit. Hærbā cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit. Sed genitalē resoluit. Lac puerperarum mammis apposita, extinguit. In uirginitate mammas cōercet, & intrescere non patitur. Pueris præstat, ut eorum testiculū cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Crætica, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

B A R B A R I C O R O L I.

Cicutā Græce Conion, inuisa & hæc, publica Atheniensium poena. Semen habet noxium. Caulis eius uiridis: & urit plerumq; ut in Platanis. Leuis hic est, & geniculatus, ut Harundo, nigricans, altior sæpe, binis cubitis. Hinc & spadium, quod est inter cannarū, ut Seruius existimat, genicula, Cicutā uocari à Marone. Folia Coriandri tenuiora. Semen Aniso crassius, Radice nullius usus, ut Plinio uidetur. Semini & folijs refrigeratoria uis. Quæ si enecat, incipiunt extrema corporis algere. In uino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs, floribusq;. Tunc enim maxime tempestiuus est, & melior, Semine trito expressus, & sole densatus, nocentior q̃ semen ipsum, ut in Thapsia: cum in reliquis contra sit, necat enim sanguinem expellendo. Hæc altera uis est, & ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad dissoluenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fuerit autem Cicutā herba, cuius gustatu exercitus M. Antonij cum fame laboraret, pene sit extinctus in Parthia, non traditur: alioquin remedium, ut Plutarchus ait, in uino tantum erat. Plinius quoq;, Maxima inquit Cicutā uis terræ Parthorum. Mox Læonicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Græcia uero Megaricæ, deinde Atticæ. Thraſyæ, & discipulus eius Alexias, & hæc, & cætera uenena temperabant, ita, ut sine aliqua offensione, aut tabe tollerent, in quantum uis tempus dilata morte. In Cicutā præcipiebant, ut e Susis, aut prægelidis opacisq; locis ad hunc usum reponeretur. Chij, ut Theophrastus scribit, non terebant eam, ut cæteri cum tegmine, sed hoc detractō, tusam & tenui cribro emissam, ex aqua propinabant. In Cæo insulā mos fuit, ut sexagenarij fenes, conuocatis necessarijs, solenni sacrificio Cicutam epulati, & coronati biberent. Strabo autor, ut fere in Theophrasto non facio, sed Cios legendum putem. Cui consuetudini se Valerius quoq; maximus secundo libro; interuisse tradit, in eius insulæ oppido Iulide. Cicutam sunt qui etiam Ephemerōn, a celeritate interitus uocant, ut Photion autor est. Recentiores Cicutā duo faciunt summa genera. Aquaticā, frigentis naturæ. Terrestris, calidæ. Terrestris duo item genera. Maius, et Minus. Sed quoniam autorem nullum proferunt idoneum, uere orne (ut fere solent) hallucinati fuerint. Alioquin Cicutā similem diximus esse Myrrhin herbam, ob id Cicutariam a nostris appellatam, calentis ingenij. Nam uerba illa Plinij, Caulis inquit Cicutæ uiridis, & urit plerumq;, ut in Platanis, quia sensum nullum commodiorem habent, correximus ex Theophrasto ad hunc modum; Caulis Cicutæ uiridis, e Susis plerumq; Athenas perlatus. Quanq; Cicutæ uis est & illa (si Celso credimus libro quinto) exedendi corpora: ut sorte seminibus & folijs frigida sit potestas, cauili feruida. Illud uero minus tolerabile, q̃ Mauritanij, uel eorum interpretes, illud Rutæ genus syluestris, quod Dioscorides & Plinius Armalā uocari scribunt, ipsi pro Cicutā capiunt. Sunt qui (quod Galenus ait tertio libro *ὑποφάρμακον*) Cicutam Sturno cibum, homini uenenum esse, cōuenterint, Hypocyanum esse Turdo cibum, homini uenenum; quo nihil esse potest fœdus, imperitius, absurdus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Auxerunt Cicutā famam Athenienses, succo eius ad mortem in publicis & capitalibus iudicijs utentes. Alioquin indigna erat herbā, quæ in omnium poetarum carminibus & sapientium cōmentarijs inueniretur. Vulgaris, ubiq; fere nascens, & homini præcipue noxia. Sed hæc est omnium fortuna rerum, ut aliquando ex usu gentium honorem, & quam possunt gratiam inuenerint. Factum id tunc in Cicutā est, quæ neglecta modo & incognita multis iacet. Mutatæq; leges, & pecnarum in sceleribus rationes, pecori herbam relinqui cōegerunt, quæ quondā malo hominis fato nascebatur. Et ut testatus Theophrastus est, in quotidianos usus ex Susis frigidissimisq; alijs locis maiore diligentia repetebatur. Non erimus ob eam causam nos in celus historia longiores. Quod enim satis sit, ab herbarijs omnibus cognoscitur, Fœnentili caule,

C folio Ferulæ, alijsq; a Dioscoride descriptis notis.

De Taxo. CAP. LXXXIII.

emina

Smilax a Græcis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdē figura. In Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ cōtermina nascens. Auiculæ quæ Italicæ Taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homines, alui profluuiū corripuntur. Narbone tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiāt sub ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur, & sæpenumero moriant. Quare de Taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 16. ca. 11.

Smilax, siue Taxus, est ubi a Theophrasto & Dioscoride Milos appellata sit, folio æterno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus & Paliuri, & omnino llicis, molliore tantum profundioreq;. Differt & materia ab llice, q̃ soluta & tenera in operibus est Taxo, præsertim in Arcadia: ubi & nigra est ac punicea. Flauet in Ida, tam similis Cedro, ut imponat mercantibus, præsertim medulla. Germen ei maxime serotinum. Floret paulo ante solstitium. Fructificata uergiliarum obitu. Facillime augetur, procera, similis Abieti, minus excelsa, sed alijs * crebrioribus. Folium quoq; ut scribit Plinius, Abietis, sed pinguius, ac minus uiuens. Strigosa, tristis & dira: nullo succo, baccifera. Radices ei graciles, per summa cespitum breues. Circa Idam rara. In Macedonia et Arcadia frequentior. Rotundo fructu, et paulo ampliore q̃ Faba, colore rufio, tactu molli, ueterinis lætifero, non item ruminantibus. Sunt qui eum quoq; mandant suauī cibo, & innocentem prædicent. Vmbrosissimis locis prouenit. Fumus ex eo mures perimit. Mari fructus, ut Plinio uidetur, noxiū. Lætale quippe. Baccis, in Hispania præcipue, uenenum inest. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia facta, compertum est mortifera fuisse. Sunt qui Taxica hinc appellata putent, quæ nunc Toxica uocantur, quibus sagittæ tingunt in Arcadia, ueneni uel præsentissimi. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus æreus adigatur. Conglutinamenta, siue subsedes, ex ea serinijs & subsellijs parantur. Nunc et arcus, & scorpiones. Nec Taxus uulgo, sed literæ prioris immutatio, Naxus, & Naxius quoq; dicitur: quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum uideo, ubi uenena libro sexto numerat, eodem loco, non Taxum, sed Toxum a Romanis dici credidit. Nec Thymalon, ut hic, sed Thymilon scribendum: quod & Aetius quoq; sequitur. Paulus Thymion. Galenus Taxum etiam dici Cacton inquit. Paulus Cacton spinæ genus esse, quam Dioscorides libro sexto uocauit Axon, cuius pappi recentes, in cibo sumpti strangulant, in quibusdam exemplaribus Ixiæ nominati. Verisimile est hanc esse Cacton, de qua Theophrastus & Plinius loquuntur. Cactos inquit, Siciliæ tantum nascitur suæ proprietatis, cuius in terra serpunt cegules & radice, lato folio, & spinoso, quos uocant Cactos, nec cibo desquamatos fastidiunt, gustu amariusculo. Sed & seruati sale uescendo sunt. Vnum caulem rectum habent: qui Pternix dicitur, eiusdem suauitatis, sed uetustatis impatientem. Semen ei lanuginis, quam Pappon uocat: quo detracto & cortice, teneritas cerebro Palmæ similis relinquitur. Vocant Scalam, siue ut Plinius Ascaliā. Alii bi Plinius, Sunt inquit & cæduæ Palmarum quoq; syluæ, quæ minantes, rursus ab radice succi sæ, dulcis medulla earum in cacumine, quod Acrum appellant, exemptaq; uiuunt, quod non aliæ. Vocantur autem Chamæriphe etiam a Theophrasto, folio latiore ac molli, ad utilia uti lissimo, copiosæ in Creta, sed magis in Sicilia. Nunc uulgo Siculum Romanumq; Ciphilionem, mercatu eius frequenti nominat. Aliqui Palmidium ab quadam Palma spadicum similitudine, ut ex quibus scopæ fiant. Margyllion Hispaniæ modo appellant credo, quia baculas rubentes, margaritis similes ferant, Dumulos uocatas, quibus filo inmissis, feminæ supplicationes precēq; suas numerant. Plinius quodam loco, Margarides inquit Palmæ breues, candidę, rotundæ, acinis q̃ balanis similiores: quare & nomina inquit a margaritis accipere. Diuersum tamen genus hoc ab Hispano illo fecerim, q̃ in meridiano tantum orbe Margarides nascunt, et quidem una tantum eius arbore in Chora, ut idem Plinius affirmat. Iam hoc quod dixi Palmidium uocari, non Siciliæ modo peculiare, sed Aegypto, & Hispaniæ. In Italia quoq; nasci perhibent, non procul Terracina. Mirum quod traditur in Aegypto, ipsi etiam Palmarum quarundam innasci truncis, sed minoris operis ad mandendum. In orbe reliquo duorū generum, sed eodem cespite proueniunt, mas & femina. Sexum distingui semine, quod Pappon, ut dixi

mus appellat. Fallit hoc imprudentes, opertum cortice *multiplici*, tunicis ferrugineis interuē stitibus. Cortex Folij modo in latum ex angusto panditur, & armatur aculeis. Ideoq; latū & spinosum a Theoph. dictum est. Ex huius crassitudine in Aegypto charta mō tingitur uilis, ad contegendas inuoluendaq; segestriū usumerces. Ex tunicis quas intercurfare diximus, in eadē provincia, funes, rudentesq; nectuntur. Caulis ipse cēduus quotannis, alioquin adolefcit crassitudine in tantum, ut arboris iustā truncum aequet ambitu.

E X M. V E R G. C O M M.

Cecinit quondam Maro primus idem, maximusq; Bucolici carminis latinus autor, Iuniperi toleresse grauis cantātibz umbra: monuitq; pastore, sub spinosā, densioriq; umbrā arborē uocandas homini non esse musas. Mox pro Apibus præcepit, Et tua Cyneas fugiant ex amina Taxos: nullibi equa malefici dispensatione. Siquidem Taxos fugisse porius q̃ Iuniperos homines oportebat: si ut hic, & aliq; tradiderūt, letalis homini earum umbra est. Plinius. 26. uo lumine, cap. 11. de ea ait. Et esse in Arcadia tam præsens ueneni, ut si qui dormiant sub ea, cibū ue capiant, moriantur. Et præter Plinium Plutarchus sui Symposij tertio cōmentario, quo capite quaerit, Si in conuiuiū florum coronis utendum sit, *ἰσχυροὶ γὰρ οὐτὶ καὶ οὐδὲ σμάλας ἀποκτείνονται ὑπὸ τῆς ἑκασταδερβίτης ὅταν ὀργῇ μέλιτα πρὸς τὴν ἄνθρωπον*. Quod est. Ferunt enim & Smylacis umbram, in ea dormientes perimere, quo tempore præsertim ad nouos flores turget. Contraxitq; umbræ eius noxam ad id tempus maxime Plutarchus. quod ab re nō est, ob eam quam ille tradidit causam, dicens ueluti telis, sagittisq; aliquibus uulnerari cerebrum halitu florum per nares attracto: qui cum in hac arborē semper letalis sit, in noua florum productione, ob acriore maioremq; eius copiam magis nocet. Descripsit Plinius quo diximus loco arborem longins: Barbarus etiam in Corollario suo, ex græcis latinisq; scriptoris omnem eius historiam collegit: & præter eos uulgaris, notāq; cunctis nūc etiam arbor est. Quæ una tantum mutata litera, p. Taxo, Naxus nobis uocat. Durissime materię arbor, & ob id in fabrica expetita, ad ea que diuturniora futura sunt. Balistæ, arcusq; nunc etiam ex ea fiunt. Sed quondam in frequentiore eius reli usū, & ipsa in maiore usu fuit. Fluores alui baccas eius uiscetibus fieri, hic scriptor ait: ex eademq; causa Maronē nos credimus monuisse, fugiendā Apibus esse arborem: ne cita aluo, cui malo obnoxia sunt, perirent. Quia enim ui homini nocet, eadē illis nocere credendū est.

De Apocyno. C A P. LXXXIII.

Apocynon aliqui Cynanchon appellant, aliq; Pardalianches, aliq; Cynomoron, aliq; Cynocramben, aliq; Cynoctonon, aliq; Phaleō, aliq; Cynanchen, aliq; Oligorō, aliq; Hippomanes, aliq; Onistia, aliq; Ophi oscorodon, aliq; Cynaricam, aliq; Elaphoscorodon, Magi Paralytin, Romani Brassicam rusticam, aut caninam. Frutex est paruis uisculis constans, male olentibus, fractu fere inuictis, folio Hederæ, molliore tamē, & per extremum acutiore, uiscoso, graui odore. Id luteo succo turget. Siliquæ ceu Fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecat in cibo data, & prius eorū coxas resoluūt.

B A R B A R I C O R O L L.

Apocynon, semine acuto, diuiso, lanuginoso, graui odore, uirgis minus longis q̃ Hederæ. Quadrupedes necat, si uescantur, omnes. Est & uenenum hominibus. Dicitur & Cynocrambe a Galeno, ab aliquibus Hippomanes. Quancq; & uirus defluens ab equarū inguinibus quo tempore amoris insanīa feruntur, Hippomanes appellant. Apud Hesiodum certe Hippomanes herba est, quam edentes equi, aguntur in furem. Dicitur & Capparis Hippomanes. Est & saltationis genus apud Comicos Apocynon, sed scriptura distinguitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Inutilis medicinæ huic scriptori Canina Brassica est. Posteriores tamen græci calidam, sine sic candi ui eam descriperunt. Eamq; ob causam emplastri modo impositam, discutiendi uim habere. Plinius præterea li. 24. capite. 11. Suspiriosos, pleureticos, & omnes lateris dolores ex aqua semen eius sanare testatus est. Quo loco ipsē notis, & paulominus q̃ ipsē huc scriptori uerbis eam effigiauit. Canes, & omnes quadrupedes necare in cibo datam Diosc. pariter testatur.

A

B

ἀπόκυνον

Pli. li. 24. ca. 11

C Quæ nominis frutici huic præcipua causa est. Pluresq; ex appellationibus eius non aliunde q̃ ex eo usu causam habent. Dico autem, ex eo usu: quoniam sæpe fit a uenatoribus, & alijs qui bus syluas, aut alienas domos ingredientibus adlarrari incōmodum sit, ut cum odisse canes in cœperint, ueneno aliquo cibo eos intercipient: quale Apocynon hoc est: quod Paulus Aegineta in .9. ait ideo Cynocramben, id est, caninam Brassicam, et Cynomoron, id est, canum mortem uocari, q̃ eos celerrime enecat: eadem q̃ ui maleficium & letalis homini sit. Quod pariter indicat Apocyni uox: nihil aliud græcis significans, q̃ qd abesse canes facit. Quæadmodū Cynāgos, qd canes angit & strāgular: & Cynoctonō, qd canes enecat. Quæ oēs eiusdē rei indices uoces, eadē hñt causā. In ceteris nō tā facilis nob, intellectus ē, ob eāq; cām pitioribus relinquunt.

N **De Nerio, seu Rhododendro. CAP. LXXXV.**
B **R** **I** **O** N aliqui Rhododaphnē, alij Rhododendrō, Lucani Iemaneu, Aegyptij Scympham, Pœni Rhododaphnem appellauerunt. Frutex est uulgaris noticiæ, longioribus q̃ Amygdala folijs, asperioribusq; flore in Rosam conformato, fructu Nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandā floccorum speciem ostendit; Hyacynthi pappos representantē. Radice longa, acuta, lignosa, gustāti salia. nascitur in amoenis, maritimis, amnibusq;. Flores & folia mulis, asinis & quadrupedum plurimis uenena sunt, hominum uero contra serpentium morsus præsidia. E uino pota, eo magis Ruta addita, imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maderuerint, moriuntur.

P **li. li. 10. ca. 226** **N** **ERION** Sabina quoq; herba dicitur. Sempiternum fronde, caulibus fruticosum. Mel insanum e Ponto contrahitur, Rhododendri flore, quo scatent syluæ. Hoc ne nomen quidem apud nos inuenit latinum, ut Plinius irradit. Galenus hanc intelligit, quoties Rododaphnen nominat, aut Nerion, duobus eam locis prodens. Photion Rhodoniam quoq; dici meminit. Quodam tamen Rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitam, flauas uuas ferentem. Dioscorides Rhododaphnen a quibusdam uocari Spongon scribit. Aetius Spongitem herbam dicendo, procidentiae sedis uilem, quid intelligat haud scio.

E **X** **M.** **V** **E** **R** **G.** **C** **O** **M** **M.**
Fecerunt græcis Rhododaphnē Rosæ flos, & Lauri folium, quæ fruticis huius præcipue notæ sunt. Fecit idem Rosæ flos & arbor eidem genti Rhododendrū. Sic enim fruticem hunc etiam uocarunt. Pliniusq; hac sæpius q̃ illa pluribus locis uoce usus est. Nec refert q̃ hic Amygdalæ folijs folia eius comparauerit. Lauro em̃ & Amygdalæ non dissimilis magnopere foliorū figurā est: longa eiusdem fere latitudinis & in cuspidem acuminata. In cæteris eius appellationibus parum certa nobis ratio est: ideoq; indecriptæ relinquuntur.

De Fungis. CAP. LXXXVI.
F **V**ngorum differentia duplex. Aut enim mandūtur, aut perniciæ sunt. Multis de causis uenenosi gignuntur. Si enim clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arbore sue, quæ pariunt noxios fructus, erumpat. Continent nescio quod strigmentum, concretamque pituitam, terraque eruti q̃ celerrimē computrescunt, atque marcore uitiantur. Sed qui ueneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. Larcius tamen sumpti, nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida

muria, aut feruefactæ Satureiæ, aut Origanî iusculum. Debellantur eti-
am gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle mul-
to. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum magna ex parte integri in-
psi, cum recrementis alui reiciantur.

BARBARI COROLL.

Vngi cortice, medulla, neruo, uena carent, pediculo admodum æquali: quan-
tæ a græcis uocantur, nec pediculum, nec radicem habent. Fungos græci Myceras uocant:
nec distinguunt. Quanquā Paulus etiā Boletos cognouit, Bolitas appellando: quibus & pri-
cipatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum ipsi qui Amanitæ nominantur. Sunt & Egi-
ritæ, sed industriæ fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto aqua, protinus coalescentes.
Quorundam facile noscuntur uenena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, ri-
mosa striâ, pallide per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam, siccique & Nitri similes, ue-
luti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt. Voluam terra ob hoc prius gignit. Ipsum po-
tea in uolua, seu in ovo est luteum, nec tunice minor gratia in cibo infantis Boleti. Rumpi-
tur hæc primo nascente, mox crescente in pediculo corpus absumit, raroque unquam gemini ex uno
pede. Origo prima e limo, & acescente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferae. In-
itio spuma lentior: dein corpus membranæ simile: mox partus, ut diximus. Deprehendisse per-
nicias, nisi agrestes possunt, atque qui colligunt. Caligaris clauus, & rubigo ferri, aut calybs ue-
nenatos faciunt. Boletis ortus occasusque includitur septem diebus. Fungorum lentior natura,
& numerosa gignit, nec nisi ex arborum fere pituita. Tutissimi qui rubent, callio minus diluto quæ
Boletis rubore. Mox candidi, uelut apice flaminis, insignibus pediculis. Tertii genus suillis ac
commodatū uenenis. Quidam discreuere arborum generibus, Fico, Ferula, & gumiferis. Non ite Fa-
go aut Robore, aut Cupressu. Omnium colos liuidus. Sed ipsi aberit argumentū ueneni, quod similio-
res arbori Fico fuerint. Noxi erunt Fungi, qui in coquendo duriores sunt. Lunocetiores, qui ni-
tro addito coquantur, si utique percoquantur. Imbribus proueniunt omnia hæc: Siccat penden-
tes suilli lunco transfixi, quales a Bithynia ueniunt, Succineis nouaculis, & argenteo apparatu
Fungos ipsæ suis manibus delicias coquebant: unde Græci hos Deorum cibo nasci dicunt, ut Tran-
gulus in Nerone meminit. Porphyrius, non cibum, sed filios Deorum Fungos & tubera uocabant,
quia puenire uiderent sine semine. Nata forte diuersitas, quod uerbum *θεοφόρος*, & eum qui alit, & eum qui
alitur significat, accentu modo comente. Porro Deorum & cibis & alumni ideo uideri possunt,
quoniam & eos quorum pater ignorat, filios terræ dicimus: quod quidem & Cicero in quadam ad
Atticum epistola confirmat de Lica. Recentiores alia quoque nomina, uel genera dedere. Oua-
ros, ab ouis similitudine. Spongiolos, a spōgia. Digitellos, a digitis. Porriginosos, a porrigine.
Pezicas, quasi sessiles & pediculis carætes. Lacinia priuatim dicuntur e castanea, magnitudine
spectabiles, ut singuli sufficiant. Innocentissimi sunt e rubis & carduis uere nati, rotunditate clusi-
li, quos inde Prunulos, & Spinulos appellant, & Cardeolos. Orii & e saxo. i. lapide Lyncurio, si
ue Lyncæ, uulgari uoce dicto Fungus, admirabili natura. Præciditur hic etiam esum, & alius sub-
ditate: nec credidimus, antequam domi natos ita menduicemus. Nouum et hoc uita sibi cōperit
in uicem multa perdit: quanquam est ubi Plinius hoc innuat, ut in castigatione Pliniana. 20. secundi
libri diximus. Sunt & ignari quidam Fungi, & quibus strigilium uice tostrina utitur.

EX M. VERG. COMM.

De tota Fungorum natura, quos tantopere ad cibos & ganæam mortalitas expetit, breui-
ssime & uno carmine decreuit Placius, cum in Sermonibus suis cecinit. Præter sibus optima Fun-
gis natura est: alijs male creditur. O sapientem poetam, qui dum ganæam, multosque eius sapo-
res didicisse uideri uult, humanæ uitæ tam utiliter consuluerit. Græcorum medici etiam, exce-
ptis Boletis, & quos Paulus Aegineta suorum, ut nos credimus, tempororum nomine Ama-
nitas uocat, omnes una sententia damnauerunt, frigidos, pituitosos, & crassioris humoris in
cibo constituentes. Plinius tamen. 21. uolumine eiusdem numeri capite, proximique illi longio-
re historia, bonitatis eorum, uitæque, & totam naturam profecus est. Quæ poterunt uolentes cer-
tius in eo cognoscere. Fuerunt medicorum & sapientiorum de Fungorum natura & ui decreta
quæ paulo ante dicta sunt. Poeta tamen Boletos præcipue laudauit. Et inter antiquos medi-
cos Paulus Aegineta primo uolumine de Fungis, Boletisque sic dicens, *οἱ δὲ μέντοις φυγοῖται τὸ*
καὶ φλεγματώδεις καὶ καὶ χυμοί. τοῦτον δὲ αὐτῶν οἱ μὲν βολίται ἀελαδίστροι καὶ ἀπανοικαλῶς ἐκπύρρις

Cὁ δὲ ἀμανίταις Ἀμανίταις ὕψι τὰς ὥρας, τὰν δὲ ἄλλων μνηστῶν ἀπὸ χροσίου δίδει, πολλοὶ γὰρ ἐξ αὐτῶν θυγατέρες. καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ βαλίσται ἀνεσθότες ἰδιόμονοι κηδόνες παρτίταις πολλάκις γίνονται. Quorum sensus est. Fungi uero frigidi, pituitosi, & mali succi sunt. Omnium minus nocētes Boleti sunt. Ad summū elixi. Qui uero Amanitę dicunt, secūdū post Boletos ordinē habet. A ceteris abstīnēdū est. Plures eīm corū mortiferi sunt. Quinetiā Boleti ipsi si minus elixi comedant, periculi, mortisq; causam hñt. Et hec p Fungorū maleficio, tutoq; usu satis sint. In quibus uidendū, sint ne Pauli Aeginetę Amanitę, Flacci pratenfies, Boletos eīm credimus nos ἀπὸ τοῦ βόλον .i. a bolo dictos fuisse.

De Colchico. CAP. LXXXVI.

καρχηδόν

Colchico aliqui Ephemeron, Romani agrestē Bulbū uocant. Autumni exitu florem addit Croci, candicantem, ab eo tempore folia Bulbi, sed pinguiora, caulē palmo altū, ferentē ruffum semē, radicem foris e nigra ruffescentē, quę delibrata, cādida et mollis spectat. Lacteo succo madet, atq; gustatu dulcis inueniē. Bulbus mediā habet rimā, fissurāq; qua flos erūpit. Plurimū in Messenia, et Colchis enascit. Ea comēsa, Fungorū more, strangulando enecat. Hāc autē depinximus, ne a quoq; imprudenter pro Bulbo deuoreē. Miram eīm incautis uoluptatē affert. Remedia sunt eadem quę Fungis. Bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaq; cū adfuerit, non aliud desyderatur auxilium.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25. ca. 10.
& li. 25. ca. 11.

Colchicon, & Ephemeron, de quo mox prodetur, Hermodactyli genera a neotericis uocantur. Galenus & Paulus Ephemeron duplex faciunt, Dioscoridem sequuti. Vnum delibutorij ueneni ui, de quo hic. Alterum quod Irinsyluestrem cognominant, de quo proxime dicemus. Colchicon sane haberi modo passim prædicat, Ephemeron nesciri. Hermodactyli porro, ex quibus pilulę ad podagras tantopere cōmendantur, ab Aetio & Paulo, Quinq; foliū sit, an Ephemeron, parū mihi cōstat. Alioq; recentiores p Ephemero accipiūt. Dioscorides Quinq; foliū Hermodactylo qđ dicit, & morbis articularib. et coxędici cōuenire p̄dit, Ephemerō minorib.

EX M. VERG. COM.

D Mlseri in antiquis scriptoribus inuicē Colchicon, et Ephemerō aliqui crediderunt, Nican drum in Alexipharmacis suis dicentem audientes. ἢν δὲ τὸ μυδιόν καρχηδόνι ἰχθυόμενον πῦρ. καὶ οὐ ποτὶν δέχεται ἱφόμερον. Quod est, Si uero Colchidis Medea infestum ignem poculum illud hauserit Ephemerōn. Mox Plinium inter uenenas Colchicum, & inter medicas herbas Ephemerōn numerantem. Quinetiam hunc ipsum hoc loco priuatim de utroq; agentem, & inuicem utrunq; Colchicon et Ephemerōn uocantem. Post hos Paulum Aeginetam, Ephemerōn in quo inter uenena constituentem; mox iterum in. 6. Ephemerōn his uerbis describentem. ἱφόμερον δὲ δολιχέρην δὲ ἔχει ἱστὴν καλὴν καλῶν. Quod est. Ephemerōn non quod noxium & letale, sed quod agrestem Irin uocant. Et ne longiores simus, in cunctis gręcis modo uenentū, modo utilem dentibus & tumoribus herbam Ephemerōn inuenientes, præsentī & periculosa semper dubitatione. Nisi cognouerit aliquis duo quōdam Ephemerī genera fuisse: alterum quod Colchicon a natali solo diceret, flore albicante, crocinio simili: radice bulbi, sed pinguiore: caule dodrantali, notisq; alijs quę a scriptore hoc in historia eius numerantur. Quod Colchicon Plinius simpliciter nominauit lib. 25. cap. 10. & Paulus Aegineta in quinto Ephemerō: cuius uerba sunt. τὸ δὲ ἱφόμερον λαβόντι δὲ ἵναι καλῶν καρχηδόνι τὸ ἐν καρχηδόνι φέρεται. Quorum sensus est. His autem qui Ephemerum hauserint, qđ quidam quia in Colchide nascitur Colchicō uocant. Quodq; hic idē scriptor in sexto inter uenena, nō Colchicō, sed Ephemerū uocabit, quo loco cū hic plantā descripsisset, maleficius eius & ueneni notas remediaq; certius illic docet. Alterū qđ simpliciter Ephemerū dicitur innocens, & ut paulo ante nos diximus, dentibus & tumoribus utile. Cuius meminit Plinius lib. 25. cap. 11. his uerbis. Ephemerō folia habet Lilij, sed minora, caulem parē, &c. Qđ hic ipse scriptor mox describet. Et ut rem totam absoluiamus: qđ Paulus Aegineta in. 6. descripsit, habereq; ait repercutiendū discutiendūq; uires, esseq; Ephemerā duo: & qualia nos diximus uenentū alterū, innocens alterū, satis idē Paulus Aegineta indicat: qui de innocente hoc agere incipiens ait, ἱφόμερον δὲ τὸ δολιχέρην. Quod est. Ephemerōn, nō qđ noxiū & letale, &c. Manifestū ex ea ppositiōe, diuisiōeq; argumēto, duplex eius genus

esse, alterum qđ ueneni, & alterū quod remedijs rationem habet. Factum ideo est, dum in anti-
quis græcis uagā appellatione utrūq; Ephemeron dicitur, ne sine causā crediderint aliqui, mi-
seri inuicem Colchici, & Ephemerī appellationes. Verumtamen quantum similitudo aliqua
nominis cōmunionem in illis fecit, tantū natura uiribus ea discreuit: eamq; ob causā in ue-
terum scriptorum lectione obseruanda diligentius ea uox erit, ut noxium ab utili, & uenenum
a medica materia secerni possit. In quo non parū proderit, de quo agatur, & quomodo obser-
uasse. Fuerunt qui maleficum illud Ephemerū dictum putauerint, q̄ hausto eo, una tantū die
superfites sint, qui id hauserunt: & a similitudine eius, deinde alterum illud. Nos tamen pro
ficieri non audemus, utrius similitudo alteri nomen fecerit.

De Ephemero.

CAP. LXXXVIII.

Ephemeron aliqui syluestrem Irin appellant. Folia habet Lilij, sed
tenuiora, caulem parcm, florem candidum, amarum, semen mol-
le, radicem unam, digitali crassitudine, longā, adstringentem, odoratam.
Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto
collantur. Folia in uino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ
nihil adhuc humidi contraxerunt.

BARBARI COROLL.

Ephemeron folijs Lilij, minoribus, semine superuacuo: dictum ita, quod intra diem iugur-
let, ut Theophrastus putat. Sed illud alterū genus est, & Colchicon proprie crediderim, folio
Ellebori. Radicula omnibus nota. Seruorū in desperatione confugiū. Hoc ipsum Colchicon,
& Plinius Ephemerī appellatione intelligit, quotiens medicinas contra Ephemerū impactum
cōmemorat. Ephemerō radix longa, non ut Colchico rotunda. Quidam Ephemerī uocabu-
lo delibutorij ueneni compositionem quandam capiunt, ut Actius testatur.

EX M. VERG. COM M.

Satis in Colchico superiore capite de Ephemero hoc dictum a nobis fuit. Querendum mo-
do superioribus relinquitur, sint ne quos medici & herbarij nunc Hermodactylos uocant, E-
phemeron hoc, an Colchicon, illud paulo ante descripsim. Nihil enim modo superest, q̄ mo-
nere legentes, dicere Barbarum, habere Ephemerō hoc florem ceruleum, quē nos candidum,
ex cōmuni, eademq; omniū quotquot uidimus codicum lectione. Plinium ut uidetur in floribus
eius colore, potius q̄ Dioscoridem, quē uerterebat, secutus ille est. Sunt em̄ in historia Ephemerī
huius Plinij hæc uerba. Ephemerō folia habet Lilij, sed minora: caulem parem, florem cerule-
um. At hic ἡνὶ λευκὴ ait, quæ uoces nisi ad candidū colorem trahi non possunt. Signasse hoc
etiā placuit, ut quibus auctoribus qđ diuersum sit uterq; nostrū uerterit, legentes sciant.

De Alsine.

CAP. LXXXIX.

Alsinen aliqui Anthyllion, alij Myortochon, alij Myrtosplenon;
Romani Muris auriculam, Pœni Labatholabat, nonnulli Myos-
ota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis, opacisq;
gaudet, unde Alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ Helxine, nisi folijs mi-
nor, minusq; hirsuta esset. Cum teritur, odorem Cucumis reddit. Vim
refrigerandi adstringendiq; obtinet. Oculorum inflammationibus cum
polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdæ
omnia quæ Helxine, id est, Muralis hærbæ.

De palustri Lentē.

CAP. XC.

Lens palustris, quam agriam aliqui, alij Epipterōn, Romani Vi-
peralem uocant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus Lentici-
læ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectioni
bus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta. Glutinat &
procidentia puerorum interanea.

C L E N S B A R B A R I C O R O L L.
 Lens palustris, Phacos Epitelmaton a Græcis uocat, sine radice, sine folijs, etiamsi id qd in ea fructificat, simile folio conspicitur, minus habili humore, q̃ ut in eo solum consisti possit. Quidam genus aliud, non quidem in aqua nascens, sed in uliginosis dilutisq; maius contrahunt, carens folio, Agriam Phaceam, hoc est, syluaticam Lentem uocantes.

Q U E M A D M O D U M I N C O G N O M I N E L E G U M I N E S E C U N D O L I B R O I L L U D D E S C R I B E N S D I O S C O R I D I S
 nō ē ἰσθρίδης, id est, Lens quæ comeditur dixerat, ut ab hac, & ab Eleliphaco eam separaret: eadem ratione de palustri hac docens, φάκος ἐν τῷ τεύχεσσι, quod est, Lens quæ in lacustribus inuenitur, dixit. Cognomines enim, sed natura diuersæ, separari discrimine aliquo debuerāt. Id acceptum est in illa ab usu, in hac a natalibus. Secutiq; posteriores omnes hunc scriptorem, in discriminibus his sunt. Muscum, non herbam hic dici inueniri, in aquis non fluentibus. Vnāq; uoce illa satis naturam eius indicauit. Fluitat enim in summa aqua Lentis figura, a cuius similitudine nomen inuenit.

De Semperuiuo, seu Sedo magno. C A P. XCI.
 I zōon maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysispermō, alij Zoōphthalmon, alij Bubophthalmō, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, nonnulli Chrysanthemon, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chrystin, Romani Ceriam cuspiam, aut louis caulem nominant, alij Leapetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuium ideo nominatur, quoniam perpetuo folia uireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirescentes, Characiæ Titimali modo insecti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem: ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus cum polenta, aut rosaceo perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluuiā. Teretes tineas potus in uino excutit. Subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uicio conceptis inungitur.

B A R B A R I C O R O L L.
 I zoon maius, aliqui Iouis caulem, siue oculum, alij Digitellum, alij Spegeton, siue Hypogefon, quod in subgrundijs fere nascitur. Aliqui Amerimnon a sollicitudinis depulso. Sūt qui Trithalles a terno flore. Sunt qui Aethalles, ab æternitate. Sunt qui Erothales, & Erogetton, a uerno tempore, aut quoniam amatoris conueniat. Latini & Sedum maius, alij Sadum. Opilius Aurelius Sesiuium. Nonnulli Semperuium. Vulgus Auricularem, Huic crassitudo caulis plus q̃ pollicaris: folia carnosa, larga, succo, leuia, oblonga. Sedum herbam fuisse putant eam, quæ Glauco immortalitatem dedit, Marino Deo. Fuit & alter Glauco in fabulis, qui Dracone medico monstrante, contactu herbæ, cuius non redditur nomen, reuixerit sub Minœ.

E X M. V E R G. C O M M.
 Iret ubiq; Sedum in tegulis, nec alibi nūc facile inuenitur, inuasitq; iam pridem aliquibus locis plebis animos indigna cælo opinio, non percuti fulmine domum, in cuius tegulis ureat Sedum, frigoreq; suo plātam caelestibus illis ignibus aduersari. Quod minus miretur aliquis, memor, ob eam causam Laurea semper contra easdem iniurias munisse caput Romanos Cæ-

Pli. li. 25. c. 2. 13.
 lib. 28. cap. 17.
 lib. 26. c. 2. 8. 11.

fares. Sed ignaui, nihilq; timēdi ignes illi erunt, si tam exiguae plantae frigore mortalis fiet flammam illarum fulgor. Non tanta coelestibus infirmitas est: nec contra Iouis tela, quibus potest uti Deum ad poenam finxerunt, tam facile praesidium mortalibus est. Inuenit natalem locum sibi Sedum, in quo procul ab alijs plantis caelo propinquior, & soli, cuius radios non timeret, copioso succo ipse abundans, eodemq; frigidissimo terrae humore ad uitam non indigeret. Non aliter q̃ qui in meliore fortuna libiis, ut Lucretius cecinit, ualere & uiuere possunt, nec aliorum ope ad uitam indigent, & ab aliorum iniurijs per se tuti, locundo animi sensu, pereuntes ubiq; alios contemplantur: non quia iactari quenq; sit dulce uidere, sed quibus ipse malis careas, quia cernere suaue est. Quae Sedi fortuna semper fuit: uirensq; ipsum in tegulis, aeterna uita pereuntes quotannis tota terra nunc aestu, nunc frigore, hunc alijs caeli & naturae iniurijs plantas alias spectat. Ob quam causam in tanto nominis ambitu ueteribus fuerit: praesertimq; graecis, qui non contenti a uirae aeternitate Aizoon, & Aeonion uocasse, tot alijs similibus appellationibus id ornauerunt.

De minore Semperuiuo.

CAP. XCII.

A Izoon paruū, alijs Petrophyes appellant, alijs Brotion, alijs Theobrotion, alijs Crobysson, alijs Chimerinen, alijs Cerauniam, Romani Vitalem, alijs Semperuiuum, Aegyptij Etjceltam. In petris, parietinis, & macerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule a medio emicante, palmū alto, umbellam haeridosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus praedita sunt. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui Aizoon paruum, alijs Petrophyes, alijs Aizoon syluestre, Romani Semperuiuum minus appellant. Tertium uidetur Semperuiui genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion uocauerunt, Romani Illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, Portulacae proximis. Vis ei excaustoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

BARBARI COROLL.

A Izoon minus, Herideis, & Heristhales, & Chrysothales uocatur, a quibusdam Treles, siue Trithales, quia ter floreat. Hoc in muris, parietinisq; nascitur & tegulis. Fructicosum a radice, & sursum usq; ad cacumen: folijs angustis, succosis: radice inutili. Vermicularis uulgo dicitur. Sunt qui Iessitin, ut Plinius, aut Hyssitin, aut Isoteos, tribus enim modis scriptum inuenitur, forteq; Gessitin melius. Quando & maius quoq; Aizoon Hypogessum dici ostendimus, hoc est, Subgrundiarium.

Tertium genus Aizoi Andrachne agria, hoc est, syluestris Portulaca dicitur: de qua etiam superius iisdem uerbis a Dioscoride scriptum est.

De Veneris Vmbilicō.

CAP. XCIII.

C Otyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs Cepos Aphrodites, alijs terrae Vmbilicus, alijs Stoechis, alijs Stergeithron, Latinis Vmbilicus Veneris dicitur. Folio est in acerabuli formā tornato, ineuidēter concauo, breuī in medio cauliculo, in quo semen inest, radice Oliuae modo rotūda. Succus cum uino circumlitus, instillatus ue, asperam carnis excrescentiā, constringentē os uuluae, reprimat. Inflammationibus, sacris ingnibus, strumis, pñionibus illitu auxiliat. Stomachi ardorē refrigerat. Folia cū radice comesta, calculos frangunt: urinā cient.

κετυλάδων

C Hydropicis ex melle dantur. Hærbæ utuntur ad amatoria.

Pli. li. 25. ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.
Coryledon parvula herbæ, cauliculo tenero, folijs pinguibus. Nascitur in maritimis, petiolisq; viridis. Non est hæc, ut quidam renturea, quæ vulgo Cimbalaris appellatur. Etiam si Cymbalion a Dioscoride uocetur. Est autem Cimbalaris herbæ, foliotenus anguloso, hederæcæ, flore paruo, purpureo, in muris terræ nascens. Quam quidem non nulli genus alterum Capni dicte faciunt, ut in Capno testati sumus.

E X M. V E R G. C O M M.
R Ara, & nescio an in toto plantarum censu, similis inveniendæ aliæ, orbicularis, & concava foliorum in Umbilico Veneris figura, nomē illi in græcis Coryledonis, in latinis uero Umbilici fecit. Licetq; Plinius græca uoce Coryledona semper uocet, res ipsa tamen, & Apuleius in cōmentariolo illo de herbis, uerisimilem, temporibusq; illis congruam eam appellationem indicat. Persuademurq; facile nos, & his, & alijs indicijs, fuisse græcæ Coryledonis Romanam appellationem Veneris Umbilici: quales in plerisque alijs ea gens habuit Capillum Veneris, Supercilium Veneris, & plerascq; alias. Libenter em ab ea Dea, quæ totius generationis symbolum in gentium religionem quondam habuit, & quæ leporibus & blanditijs uitæ præfecta esset, ad naturæ partes, quæ grata, aut utili aliqua specie nascerentur, nominum auspicia ueteres Romani sumplerunt. Ex qua obseruatione, uidentes in græcorum Coryledone circumacta in orbem folia, leni in concauitate descensu, humani Umbilici formam describere, Umbilicum primo: mox ut rei maiestatem aliquam adderent, Veneris Umbilicum uocarunt. In orbem enim circumagitur, & in concauitatem descendit hominis umbilicus. Eadem, sed non tam honesta ratio fuit in Umbilico terræ. Adiecit hic etiam *κων* *αποδιδω*, id est, Veneris hortum dici Coryledona. Idq; Apuleius ille etiā testatus est. Significat autem *κων* *αποδιδω* græcis in cōmuni significationis æstimatione hortum: eamq; ob causam nos Veneris hortum uertimus. Oborta tamē suspicio nobis est, posse *κων* *αποδιδω* hoc loco non hortum indicare, sed tonsuræ, & ornatus capitis, capilliq; antiquam in Perside rationem, qua forte Venus a pictoribus fingeretur: & quoniā circumageretur in ea ante frontem in orbem capillus, ideo aliqui non ab Umbilico, quæ pars in homine, præsertimq; foemina saluo pudore ostendi non potest, sed a capite honestiore & aperta cunctis parte appellare maluerint. Hoc em nos magis probamus, q̃ si ea uoce significari etiā moneamus mulierum *το* *αποδιδω*. i. pubem, quod græcorum grāmatici docent. Fuisse autem græcis *κων* *αποδιδω* tonsuræ genus, in eius gentis scriptoribus notissimum est. Suspicio tamē coniecturæq; non decretum hoc sit. Eadem causa fuit, cur Cymbalion a cymbalorum consimili forma etiā diceretur. Concava em pariter & rotunda cymbala sunt. Contra autem Scytalion non satis certam habet rationem: nec nobis rōcinari facile est, quo modo Scytale, quæ longior erat, ad rotunditatem per similitudinem transferri potuerit.

¶ De altero Veneris Umbilico. C A P. XCIII.
Est & alterum genus eiusdem, Cymbalion aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem ambitum oculi describentibus, ut in maiore Semperuiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici, radice maiuscula. Facit eadem quæ Semperuiuum.

B A R B A R I C O R O L L.
Coryledon secunda, caule longiore, sed pergracili, gustus asperissimi. Huius usu Hippocrates in cibo foemininum sexum concipit, sicut priore masculinum prodidit.

E X M. V E R G. C O M M.
Non est quod in altera Acetabulo hac legentes moneamus. Satis enim per se patet historia eius, a Plinio ipsædem uerbis tradita. In medicina autem & remedijs eadem illi omnia quæ maiori Sedo hic tribuit, & ex eo repetenda sunt.

ἄκαλυφον

¶ De Vrtica. C A P. XCV.
A Calyphen aliqui Cniden, alij Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selepsion, Daci Dyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui Cniphem, Romani Vrticam mollem uocant. Duo eius genera.

Syluestris asperior, lationibus, nigrioribusq; folijs, semine Lini, sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. Folia utriusq; illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cærato imponuntur. Faciunt ad profluuiâ narium cum succo trita, et naribus indita. Menses ciunt, eadem recentia detrita cum Myrrha, & imposita. Procidentes uulvas, contactu resiliire cogunt. Semen potu ex passio, Venerem stimulat. Vuluam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, & lateris & pulmonu inflammationibus prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. Vrinâs mouent. Inflationes discutunt. Decocta cum pituita, uitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uiam, gargarisatus succus reprimat.

BARBARI COROLL.

Vrtica, ex oibus aculeatis generibus notissima est. Acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus. Sæpe altior binis cubitis. Mitior Fœmina est. Inter syluestres, quæ dicitur Cania acrior, caule quoq; mordaci, simbratis folijs: quæ uero etiâ odorem mittit Herculeæ uocatur. Semen omnibus copiosum, nigru. Mirum, sine uillis spinarum, aculeis lanuginē ipsam noxiâ, & tactu tantu leui, pruritus, pustulasq; adusto similes existere. Notum est remediū olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi solibus reborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere, non ingrato, multis etiam religiofo in cibo est, ad pellendos totius anni morbos. Syluestrium quoq; radix omnē carnem teneriorem facit simul cocta. Quæ uero ex ijs mitissima, & folijs non mordentibus, Lamium, siue Acononium uocatur, a quibusdam Vrtica iners, & mortua. Album hæc habet in medio folio, sacris ignibus uile. Quidam e nostris discreuere genera temporibus, autumnale appellando, & reliquas ad eandem rōnem. Celebrat & marinâ cognomine Plinius ad uelica uitia. Condit claudes Vrticæ Phaniâs phisicus, utilissimâ cibis coctam, in ueteratq; professus. Si quadrupes fortu non admittat, Vrtica naturalia earu fricanda monstrant. In Oeta monte, steriliſſi, nec iniri se patientiū capraru ubera terentes eâ, lac eliciunt. Ex Vrtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi messibus oportet. Alexandrinu maxime laudatur ad omnia; Vrticam Hippocrates Nidâ uidetur appellasse, cum alijs Cnidâ uocent. Est ubi Clidam legas corrupte, ut cenſeo; nisi aliud genus sit. Granâ inquit Clidæ sexaginta, clyſtera uuluis iniiciantur, quas bilis infestauerit.

EX M. VERG. COMM.

Vrtica nihil in censu olerum inuisius nascitur; igneo pruritu urens: & inde factio nomine. Vescabantur nihilominus ea antiqui. Suntq; eius in cibo usus, testes antiqui in latinis poetæ: quibus iocundum erat Ocimo se & Vrtica recreare. Vbiq; & omnibus tam nota herba est, ut nihil monere in ea opus sit. Præterq; a Græcis Cnidem, ab eorum uerbo *κνίσις* dictam fuisse. Significat id cum dolore pungi, uexariq; Vocauit Acalyphas etiam Aristoteles in mari Vrticas tactu eadem in urendo ui. Medetur ea multis in humano corpore morbis, plurimisq; scatur remedijs. Eamq; ob causam non minus ad medicinam, q; ad cibos medicis & olitoribus curanda.

De Galiopsi.

CAP. XCVI.

GALIOPSIS, aut ut alijs Galeobdolon, uel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labæo dicitur. Frutex in totu caulem & folia habet Vrticæ, læuiora, & quæ grauem odorem trita reddant. Flore purpureo, tenui. Nascit circa sepes, edificia, ac semitas, ubiq;. Folia, caules, semen, succusq; duricias & carcinomata dissipât. Strumas,

Pli. li. ii. c. ij.

B

γὰρ ἡ φύσις

Cpanos, & parotidas discutunt. Oportet bis in die tepidū ex aceto catapla
fina imponere, & eius decocto fouere. Ad putrescentia, gangranas, &
nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

GALIOPHIS, & GALION uocaram inuenio hanc.
B A R B A R I C O R O L L.
L E X M. V E R G. C O M M.

Lege Plin. lib.
27. cap. 9.

Totam Galiofis huius medicinam & historiam iisdem huic scriptori uerbis profecutus
27. uolumine, capite. 9. Plinius est, Discrepani solum, q̄ Plinius Galeobdolon uocari ait,
quam hic Galeobdolon dicit: & nihilominus lactis, candoris ue in ea nihil est, quod Pliniana
illa uox significare uidetur. Ignoramus & illud etiam, quod hic Vetricam Labeonem a Ro-
manis dici testatur.

¶ De Galio. C A P. XCVII.

γάλιον

Galion, siue ut alijs Galacion, aut Galerion, nomen ex eo tra-
xit, q̄ in contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. Ramulū, fo-
liumq̄ habet Aparinæ simillimū, rectum: florem in cacumine luteum, te-
nuem, odoratū. Flos igni ambustis illinitur. Sanguinis profluua sistit.
Cærato rosaceo Galion ammiscetur, insolaū usq̄dum albescat. Lassitu-
dines reficit. Radix Venerem concitat. Nasctur in palustribus.

L E X M. V E R G. C O M M.

Lacteo, non luteo flore Galion hanc posteriores aliqui tradiderunt: testati nomen illi lactis
candorem, qui in flore sit, nō in coagulando lacte uim eius, ut hic ait, fecisse. Describuntq̄ eam
binis folijs, per interualla toto caule usq̄ ad summū uestitam, Lauro similibus. Verum tamen
scriptori huic, græcisq̄ alijs in historia eius magis credendū: præsertim his uerbis docente eam
in sexto sui operis Paulo Aegineta. γάλιον ἀνομασται ἴδν ἀπὸ τοῦ γάλα πηγνύν, παραπλάσειν δὲ ἴδν
ἀπαρίν. ἑρπαντικὸν τὸ καὶ ὑπόδριμν. τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ πρὸς ἀμωσάγιον ἀρωματίζει καὶ πρὸς πυρίκानτα. Quo-
rum sensus est. Aui coagulandi lactis dictum Galion est Aparinæ simile. Siccandi uim, medio-
cremque acrimoniam habet. Flore eius ad ambusta, & sanguinis ex naribus eruptiones utun-
tur. Et hoc solum est, quod pro Galio hac dici a nobis possit. Poterit ex notis suis cognosci,
& a pastoribus sicubi pro coagulo lactis ea utantur.

ῥιγίρων

¶ De Senetione. C A P. XCVIII.

Rigeron a Græcis uocatur, a Latinis Hærbulum, aut Senetio,
alias Erechites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continui-
is, diuisura Eruch, sed minoribus multo, luteis floribus, qui celeriter disse-
cti, uanescunt in pappos. Nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores ca-
pillorū ritu uere canescant. Radice superuacua. Nasctur maxime in ma-
cerijs, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant. Quare illita cum
uinī modico, uel per sese, testium & sedis inflammationes sanant. Quin-
& ex manna thuris medentur, cum reliquis uulneribus, tum ijs quæ ner-
uī accæperunt. Illiti cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum re-
centes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui datur, sto-
machi dolores a bili contractos, per sanat

Theoph. li. 8.
plant.

ERigeron, a nostris fere Trislaginis specie describitur, & cum mollicia nasci fertur in tegu-
lis, murisq̄, cauliculis subrubentibus, lanugine qualis est spinæ, inter diuisuras capitis excun-
te. Ob id Galli Xuseam, Callimachus Acanthiden, alijs Pappum uocant. Nec deinde Græcis
de ea constare Plinius affirmat, alios Eruce folijs, alios Roboris, sed minoribus multo dixisse.
Item radice alios superuacua, alios neruū utili, alios potu strangulante. Nec desuere qui alterū

genus facerent, nec quale esset demonstrarent: dantes contra serpentes bibendā, edendam uero comitialibus. Aggredimur medicinas, quia notæ defunt. Nicander uidet aut hanc intellexisse, cum Geraon pogona dixit, nam & nos Senecionem uocamus, aut Tragopogoni similē herbulam, quæ uulgo Barba senis dicitur, aut Chrysocomen, quam & Iouis barbā appellamus. Quamq; & Arbor quædam est quæ Iouis barba dicitur, in opere topiario tonsillis, & in rotunditatem spissa argenteo folio, aquas odit, ut Plinius describit, nec adijcit plurā.

REX M. VERG. COMM.
Romani Senecionem eam uocauerunt, facilem inuentū & cognitū herbam, quæ urbani, et in agro agentes passim in acetarijs utuntur. Nasci eam hic ait ad radices parietum, & in eorum rimis, funturiq;. Verū tamen in cultis locis, et aruis copiosa etiam inuenitur. Theophrastus de plantarum historia, inter *κικυρίδιον* eam numerauit. Sed uidentur in eo, Cichoriodes ne ille plantas eodem modo semper & ubiq; appellet. Etā satiuo Intybo, aut erratico similes ea nota significet. Si Senecionis in scriptore hoc historia expendatur, in qua exigua & longe q; Errucæ minora eius folia describuntur, erratico Intybo similia intellexisse oportebit. Sin contra Cichoriodes Theophrasto erit, quod longo & lato folio, & ob id satiuo Intybo simile, aliā comparationis & similitudinis rationem in eo inuenisse opus erit: aut in alterutro diuersam suspicari plantam. Quale non multo post in hoc capite etiā erat. Quo loco scilicet passim, & in cunctis fere legebatur, *ἢ διὰ τὸν οἶνον*, id est, in exiguo uino. Non enim sic legendum erat, sed in dulci uino. Quod uetustiores, & meliores græci habebant.

De Thalictrō. CAP. XCIX.

Thalictron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem Rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

THALIETRON, cauliculum habet crassitudine Papaueris: ut inquit Plinius, Rutæ ut Galenus: cubiti, ut Dioscorides, librarijs similitudine uocabulorum deceptis. Nos Rutæ, Galenum secuti uertimus.

EX M. VERG. COMM.

SVNT Plinio & huic de Thalictrō, exceptis paucis, eadem omnia. Hic Rutæ coliculū, ille Papaueris habere ait. Ille ulceribus cum melle, hic simpliciter concisa eius folia mederi dixit. Hic contra diuina ulcera, ille ulcera simpliciter sanari eo præcepit. Paulus Aegineta de eo tantum ait, Siccandi sine erosione uini habet Thalictrum. Diuina enim ulcera ad cicatricem perducit.

De marino Bryo. CAP. C.

Marinum Bryon, aliqui Balarin, alij Iranen uocant. Nascitur in scopulis testaceisq; haud procul a mari, gracile, capillaceū, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiōes cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

BARBARI COROLL.

BRyon Thalassion cognominatur, ut a Bryo differat in arboribus nascente; marina herba hæc, sed in terra tantum nascitur & scopulis: folio herbido ac lato, nec Lactucæ dissimili, rugo flore tantum, uelut contracta, sine caule: sed ab ima radice principio alio atq; alio, plusculis exentibus folijs.

EX M. VERG. COMM.

NON facile persuadeor, esse Bryon hoc loco a Dioscoride tractatum, idem a Plinio libro tricessimosecundo, qnto capite descripto. Hic enim capillatum esse hoc suum dicit, ille Lactucæ folijs, quæ grandia & latiora sunt suum describit. Quæ itidem alia in historia huius traduntur. Omnia Musco magis q; herbæ congruunt. Capillata species, gracilitas, natales in faxis & piscium testis. Ob quam causam nobis Muscum uertere potius, q; herbam intelligere placuit. Cætera utriq; eadem sunt, ideoq; a nobis ulterius non tractata.

C

De Fuco marino.

CAP. CI.

φύκος θαλάσσιον

Fuci marini generibus, quoddam latum. Et alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratorium, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatis efficaciter utilem. Verum ijs uti humidis conuenit, priusquæ exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc Fuco quidam putant mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 13. ca. 25

Phycos non habet alia lingua nomen: ut Plinio uidetur. Etiam si Fucus inde apud nos dictus esse uideatur: quoniam Alga inquit herba sit potius, hic autem frutex: quoniam est ubi maris Algam uocet & Fucum marinum Lactuæ similem: qui conchilijs subferuntur. Genus ei triplex. Vnum folio lato, uiridi, ob id Prasson uocatum, ab aliquibus Zoster: radice foris pilosa, intus squamatis compacta, prælonga, & crassa, ut Cepis, & Gethyo. Alterum simile Forniculo: nec uiride, sed pallidum, sine caule: rigens tantum, atque stans: & eo Copten à duricia uocatum. In testis fractis, saxisque nascitur terra, ut mari tamè alluatur. Nam superius inuadit haud procul littore. Extra Herculis columnas magnitudine mirabili. Latitudo quæ manu cõprehendi nequeat. Fertur hoc, fluctu extrinsecus in nostrum mare, Prasson ut diximus uocatum: quia pari fronde sit. Annuum esse traditur. Vtunque præcipiti uerno enasci, per æstatem uigere, autumno flaccescere, emori hyeme. Tertium graminis simile est, radice lōga, obliqua, geniculata: caule harūdinis, longe minus quæ cetera. Alij breuius tria gna folio distinguunt. Primum lato. Secundum longo, quod & rubens sit. Vltimum crispum: quod & Pelagion, & Cretense nominatur: quia spongiarum uiridiores ex alto id petant. Circa Cretā in petris copiosissimum & præstantissimum: quo & tēnias, & lanas, & uestes inficiant, prouocante purpuras, quæ diu recens tinctura est: ita colore alligās, ut elui postea nō possit: ob id & Pseudoconchylion a Democrito uocatur, & flos, siue Coccus marinus, & a Strabone in Arabico sinu Minium, hoc est, ut Nicander utitur, Bryō, Muscūque. Laudatissimum a parte aglonis, quemadmodum & spōgia. Phycos autem marinū, siue Thalassion cognominatur, ut a phyco, id est, fūco metallico distet. Refrigeratis apud Galenum est nature metallicæ, & Cerussæ proximū uiribus, etiam tenuitate penetrandi uincens: de quo nihil Diosco. In Aristotele de animalibus, Littoralem herbam, hoc est, quæ littus oleat, uidetur intellexisse Theophrastum, cum uertit Lintum, id quod ille λεῖτον uocat. Fieri tamē potest, ut littus ipsum, & odor eius in eo uocabulo accipiendus sit.

EX M. VERG. COMM.

Vocauit hoc Plinius plærumque Phycum, aliquando tamen maris Algam. Ideoque nos utroque nomine caput hoc inscripsimus, & si autor ille dixerit libro. 13. quo diximus capite, non habere Phycos alia lingua nomen, quoniam Alga herba sit, ille autem frutex. Nos tamen & Plinij, qui Algam maris aliquando uocauit, & aliorum auctoritatem secuti, non ueriti sumus Algam etiam nominare. Quod deinde hic ait, Nicandrum contra uenenata Puniceo uti, sic in eo poeta se habet, ἡνὶ καὶ φοίνισσιν δὲ καταβάλλει φύκος.

ποταμογετον

De Potamogetone.

CAP. CII.

Potamogeton alias Stachyites, apud Aegyptios Etheuchis, Latine Fatalis dicitur, folium Betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. Folium pruriginibus utile. Et contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quia palustribus & aquosis enascatur.

BARBARI COROLL.

Potamogeton Castor hanc aliter nouerat, tenui folio, uelut equinis fetis, thyrsi leui & longo, in aquolis nascentem: cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur crocodilis. Itaque secum habent eam, qui uenantur eos.

EX M. VERG. COMM.

A

Congrua, et in antiquissimis Græcis a nobis inuenta Potamogetonis appellatio, Betæ foliū etiam est. Nos etiam Fontinalem emendauimus, qd in omnibus fantalis legebatur. Naturā em herbæ oēs hæ uoces sequunt. Quemadmodū & Stachytis, quasi spicata, ob caulē quem ex se mitit, floribus & semine spicatum. Græci aut Potamogetona a fluminū uicinitate prope quæ nascit appellauerunt. Vbiq; in aquosis nascitur Betæ foliū hoc, oleris eius egregia similitudine, in cuius folijs maculæ quædam ueluti puncta intercurrunt colore inter puniceū & luteum.

De Stratiote. CAP. CIII.

Stratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nuncupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Aeluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice uiuit. Vnde cognomentum traxit. Herba Semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit a renibus, pota sistunt. Vulnere quæ inflammationem minantur, intus mescere non sinunt. Ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

SPRTIANT

BARBARI COROLL.

Stratiotes geminus est. Aquaticus: de quo hic agitur. Et Terrestis, Millefolij cognomine, de quo statim post dicetur. Est autem Stratiotes aquaticus, herba Militaris, in Aegypto tantum nata inundatione Nili. Diuersam ab hac Militarem aliā existimo, quam alij eandem quæ & Lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem Lactoris nota uulgo, ut inquit Plinius, plena lactis: qd degustatum, uomitiōis concitat. Hæc & Lactaria, & Anabula nunc dicit, Olæ folio, sed minore: flore luteo. Sed an una aliqua sit hæc ex ijs quæ Tithymali nominant, cōsiderandū relinquo.

Pli. li. 24. ca. 4

EX M. VERG. COMM.

In Aegypto & Nili inundatione nasci tantū Stratiotem hanc, testari omnes alij sunt. Hic, qd non ab re miretur aliquis, in homine qui diu illic fuisse in aquosis, simpliciter prouenire. Nullus etiam, quod hæcenus legerim, causam nominis reddidit, aut ratione aliqua indicauit. Nec quomodo a castis & militaria herbam id nomen transierit, docere nos audemus. Stratiotes enim græcis miles est. Obseruauimus tamen in antiquis græcorum lexicis, non eadem militi penitus uoce eam scribi, sed in quinta græcorum nominū declinatione & fœminino genere Stratiota. Quod licet multifaciendum non sit, in re tamen quæ legentes suspendere posset, non penitus inutilem hanc etiam fore diligentiam credimus. Descripsit Stratiotem hanc Plinius libro 24. capite. 5. iisdem fere huic scriptori uerbis. Variant tantum, qd sanguinis ex renibus fluentis remedio eius ille masculinum tus addit. Verba eius sunt. Sanguinem quoq; qui defluit a renibus, pota cum ture masculo, misce sanat. Quod negligendū in scriptore hoc non est, præsertim congrua turis ad hanc rem ut: & quod uerisimile est, Pliniū cætera omnia eadem huic scriptori docentem, ex eodem fonte etiam illud hausisse. Nec rarum difficileq; est, scriptoribus a librarijs aliquid aliquando perijisse, & Dioscoridi posse id hac parte deesse.

B

De Stratiote Chiliophyllo. CAP. CIIII.

Stratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre Cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabricia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modū Anethi, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

στρατιώτης χιλι-
όφυλλος

EX M. VERG. COMM.

Ostendunt pro Millefolia Stratiote ætatis nostræ herbarij coliculus breuib; & exiguis folijs undiq; uestitum, Respondeatq; historię huius omnia, exceptis umbellis illis, quas hic dicimus circa Anethi modo in summo eius esse. Quas em nos uidimus, flores magis longiusculis pediculis

Cependentes q̄ umbellæ sunt: pediculosc̄ illos credimus nos esse quæ hic καρπία .i. festucas uocat, & qbus umbellâ sustineri ait: sed singuli potius flores q̄ in umbellam plures cōgessi sunt. Cetera ut diximus, historiæ huius egregie respondent. Nulla est, quod meminerim modo, Stratiotes Millefolia hæc Plinio, neq̄ hoc nomine descriptam in eo nos inuenimus. Græci tñ omnes utrūq̄ hoc genus constituerunt, ipsedemq̄ huius scriptori notis discrerunt, Stratiotem aquaticam, & terrestrem: Millefoliā .f. hanc, frigidamq̄ & humidam priorem illam, posteriorem uero hanc præter humorem & frigus habentem aliquid quod adstringat, describentes.

De Verbasco. CAP. CV.

Phlomon Græci, Latini Verbasco uocant. Differentiam duplicem habet, nigrum, & album: in quo mas, & foemina intelligitur. Foemina igitur folia sunt Brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallefcentes, semen nigrum, radix longa, acerbæ, crassitudine digiti. Nasquitur in campestribus. Verbasco qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq̄ constaret folio. Syluestre folia fert Saluicæ, altæ uirgæ, & lignosæ, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auri æmulus. Sunt & Phlomidæ duæ hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, crassis, pinguibuscq̄, apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare, quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuio conueniēter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussis auxilia-
Dtur. Dendium dolorem collutione mitigat. Verbasco, cui flos aureus, capillos tingit. Et quocunq̄ abiiciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcerâ, ex uino & melle illinuntur. Cum aceto quocq̄ uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus auxilio est. Syluestris folia, ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius quam foeminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

BARBARI COROLL.

Verbasco, siue Phlomos, siue ut Galenus Plomos, etiam in niue nasci posse creditur. In albo aliqui Marem, in nigro Foeminam uolunt intelligi. Caulis Verbasco erectus, Semen inutile. Tertium porro genus non nisi in syluis inuenitur, cui herba quæ Romæ Blattaria dicitur, tam est similis, ut sæpe fallat pro ea capta. Est autem Blattaria folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo: hinc forte natum, ut Dioscorides Verbasco syluestri Blattas contrahi prodiderit. Medicinæ huius capitis sequenti mentione collocauit.

Phlomidæ, distingui genera hæc pene superuacuum est, cum sint eiusdem effectus omnia. Thryallida uero & Lychnitis ex argumento appellant: quoniam ad lucernas conueniunt: proinde ipsa luminū ellychnia Græci, & Phlomos, & Thryallidas quoq̄ uocat: ut ingit Pollux.

VERG.

Quale Verbasco omne sit, & quibus notis totius generis cognosci possint, satis ex historia Dioscoridis patet. Plinius etiam lib. 27. ca. 9. nō minus in cognoscendis his præsidij legitibus afferet. Paucis em̄ mutatis, eadē ambobus oia sunt. Paulus Aegineta etiā post hos multiplex Verbasco esse testatus, & inter ea quam græci θρυαλλίδα .i. Thryallim uocant, utriuscq̄ decreta uidetur confirmasse. Longius ob eam causam de Verbasco nō agemus, præsertim uulgari & nota omnibus herba: & in cuius genere quæ foemina dicitur, flore candido, aut pallecente, semine nigro, radice longa, & ut hic ait σπυρίον est.

De Aethiopide. CAP. CVI.

AEthiopis folia habet Verbasco similia, perç hirsuta, densaq; in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concavum alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq; ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Mesenia. Auxiliatur purulenti excreationibus, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegmatis uicem præbet.

BARBARI COROLL.

AEthiopis, caulem habet concavum, semen candidum, radices plenas, molles. Quæ ex Aethiopia uenit, eximia est, illico proficiens. Colliguntur radices autumnino, siccantur in Sole aliquot diebus, ne situm sentiant.

Pli. li. 27. cā. 3.
& li. 26. cā. 4.

EX M. VERG. COMM.

IN Aethiopia probatissimam nasci Aethiopidem hanc, testati alij sunt. Neq; ab resorsan, quæ consueuerint homines multa simili ratione indicare. Hic tñ non magis in Aethiopia q̃ alibi nasci tradit. Ex eo non male alijs suspicabitur a colore, qui in radicibus eius cum aruerunt uidet, uocari sic potuisse. Sunt enim nigri Aethiopes: quales hic eius radices esse dixit. Hoc nos tantum conijcimus, illud autem testantur ex ueteribus aliquot. Eamq; ob causam nos magis illud probamus: quoniam non est par pondus suspicionis & testimonij. Egit de ea Plinius, 27. uolumine, capite tertio, isdemq; omnibus notis indicata ab eo est. Videndum in eo tamen, sit ne hæc illi eadem quam, 26. uolumine, cā. 4. inter magicas uanitates Aethiopida parit uocat: monetq; polliceri & iactare magos, cōiecta Aethiopide herba, amnes & stagna sicari. Addidimus nos locis in quibus ea nascit, Mesene. s. & Ida, eorū locorū regiōes: ut certius historia eius ois pateret. Plures em Ida mōtes sūt, & Plinius ad Idā Trōadis cōtraxit, Mesene aut̃ antiquissima Arcadiæ ciuitas est, lubrico nomine ad Messanā Siciliæ, ideoq; certiore indicatione signata a nobis.

De Arctio. CAP. CVII.

ARction aliqui potius Arcturon uocant. Similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt, caule longo, molli, semine Cumini, paruo, radice tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta, pernionesq; fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam e uino.

BARBARI COROLL.

ARction nascitur in petrosis. Ab Vrso nomen obtinet: aliud omnino q̃: quæ uulgo Branchia ursina dicitur, ueteribus omisā, etiam si Ebisci modo suppuratoriā uim habet, folijs tā diuersis, ut singula eorum multa esse uideantur, radice glutinosa, multiplici, subalbida.

Pli. li. 27. cā. 5.

EX M. VERG. COMM.

ANimaduertit, docuitq; iam pridem Nicolaus leonicenus, miscere Plinium uicinitate nominis, ut creditur deceptum, Arction, quam mō uertimus, cum Arctio, quæ uertēda mox erit, Perfonatamq; appellare: cum tamen Arctij, non Arctij propria sit Perfonatiæ appellatio. Nouis seq; id ex scriptoris huius historia facillime omnes possunt. Diuersæ enim plantæ sunt, diuersis notis & uiribus descriptæ. Ideoq; græcorum medici & herbarij omnes priuatim, seorsumq; uirgines descriperunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbasco similem fecerunt.

De Perfonata. CAP. CVIII.

ARction alij Profopida, alij Profopion, alij Aparinen. Latini Perfonatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiā Cu-

Pli. li. 27. cā. 5.

Curbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulem albicantem, quamq̃
& interdū uidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hęc
drachmæ unius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cru-
enta extussentibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius uin-
ctis illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 26. ca. 9.

Arcion, siue Prosopites, Personatam quidem in latino sonat, sed pro Petasite tamen capi-
tur a Plinio dicente. Folio Personatę nullum est latius, grandes lappas ferentis; quas non in Ar-
cio, sed in Petasite cernimus. Petasiten interpretor, quam vulgo Bardanam, & Lappam maio-
rem uocant: Arcion, quæ Vngula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine tenuem cō-
stituit. Petasiten Personatam, Arcion Persollatam appellādo: Persollatam inquit, quam nemo
ignorat, Græci Arcion uocant: folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq̃
& crassiora, radicem albam & grandem. Quæ omnia fere cum Dioscoridis Arcio conueniunt.
Nominatur & Persoluta, siue Persolyton a Plinio herbæ genus Aegyptiæ, in hortis feri corona
mentis solitum duobus generibus, mas, & fœmina: inhiberi subdita ea, Venerem uirorū ma-
xime prodendo. Illud cōmonuerim, maiora esse Personatę, hoc est, Petasitę ac Bardanę, q̃ Per-
sollatę, hoc est, Arcię & Vngulæ caballinæ folia: radicem Personatę candidam, digitali crassitu-
dine, fastidiendi odoris, Persollatę brachiali, & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus &
hanc, & superiorem eodem Arciij nomine appellat. Quod autem Personata sit, quam Lucius
Columella Personam uocari scribit, ne dubitem, facit, quod utilem pecori, quod Vipera mo-
rderit, scarificationi superpositam commemorat: quod & Plinius probat, & propterea a
nonnullis Echion, quasi Viperam tradit appellari.

E X M. V E R G. C O M M.

Personata hac utebantur quondam ad personas tota Græcia & Italia gentes omnes, quo-
tians in Theatris, alijsue locis, qui cognosci a populo nollent, egisse quidpiam uolebant: facili,
D sed non toto anno ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparatu. Extrema siquidem hye-
me, quo tempore nunc expletis totius anni uoluptatibus, ludis & epulis, a ieiunio & cinere, ali-
am uitam, & alios mores Christiani auspicantur, amissis per gelicidta folijs nullus potest hic
cuius usus esse. Maio, Iunioq̃ mensibus frequentem fuisse palilibus & floralibus uerisimile est:
tribus decerpitis folijs, quorum uno frontem, duobus alijs utrinq̃ malas uestirent, relictis in-
tera amplitudo, ut longe maius quam humana facies est, tribus uestiri spacium possit. Neq̃
immerito hic Cucurbitarum folijs comparauit. Figura enim illis respondet, & si pinguiore
loco nascantur, magnitudine etiam superant. Causaq̃ hæc est, cur græci etiam ab eodem perso-
narū usu Prosopida, & Prosopion uocauerint. Neq̃ enim uoces illæ aliud q̃ personam indi-
cant. Fuerūt præterea, ut in hoc scriptore legitur, qui in græcis Aparinen, in latinis uero Lap-
pam uocauerint: quoniam illi congener est. Nasctur ubiq̃ Personatia: & quoniam desierunt
ut ea ad personas, ob eam quam diximus causam Christiani, nec alios habet in sanitate usus,
parum hoc nomine nunc cognoscitur.

¶ De Petasite. C A P. C I X.

πεταςίτης

PETASITES PEDICVLVS cubito maior, crassitu-
dine pollicis, a quo prægrande folium, galeri modo amplum,
ceu Fungus dependet. Contra phagedenas, & ulcera quæ cacœthe uo-
cant, efficaciter illinitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Petasites, dicta uidetur a Petaso, pileum significante apud Græcos: unde Petasari, hoc est,
pileati. Apud Carullum enim ita Castor & Pollux dicuntur. Nec aliud in Mercurio Petasus est
q̃ galerus: quamq̃ Lactantius grammaticus, & alas & talaria cōtineri credidit in ea uoce, qua-
si petasum pro pinna capiant: cum legendum sit non petasum, sed petalon quocunq̃ loco pin-
na significatur. Ita enim Græci etiam frondem uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multo s
decepit corruptus in Plinio locus. Alcamenes inquit Phidias discipulus, æreum petasum fecit:
qui uocatur Encrinomenos. Alijs petalon, alijs petasum legentibus: cū legen dū sit, pentaditō:

quæ nostri Quinq̃uentionē uocant, ut est apud Festum: quod & codices manu scripti, & primis impressi formis habent. Quod genus & Myronis, & aliorū operibus ascribitur: ut eodem capite Plinius indicauit. Petasones porro dicimus, quas Græci Pternas, & nostri Pernas uocant, ut Athenæus inquit. De Petasite multa proxime diximus, credentes hanc latine Personatiam uocari, & Græce a quibusdam Echion, ut ait Plinius: nisi quis non Echion, sed Arcion scribi, propter similitudinem cum Arcio, contenderit: cui non contradico ipse.

EX M. VERG. COMM.

GRæca uox Petasus est, Mercurij, & Augusti Cæsaris usu in antiquis scriptoribus celebrata. Vterq̃ enim Petasatus describitur. Sed alter, dum coelo precipitem se mittit, aut similis: Alter, dum per diem in sole est, radiosq̃ eius munito capite Petaso hoc toto anno uitat. Est enim Petasus Galerius, cuius forma inter Græciæ ruinas in Mercurij imaginibus adhuc uidetur, ex Homeri & Maronis uersibus descriptis, antiquitatis studiosis nota. Ornauit eadem uox herbam: uocaruntq̃ Græci Petaliten, quasi Galeritam herbam, in qua solum pediculo superpositum non aliter in medio, q̃ in Fungis passim uidetur hæret.

De Epipactide.

CAP. CX.

EPIPACTIS ab alijs Elleborine, aut Borion uocatur. Parua hæba, fruticosa, exiguis folijs. Iocineris uitij uilis, & contra uenena pota.

BARBARI COROLL.

EPipactis, siue quod idē est, Elleborina inter frutices Asiæ, Græciæq̃ a Plinio reponitur.

Pli. li. 17. ca. 20.
Theoph. li. 9.

EX M. VERG. COMM.

PEregrina Italiæ, auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam, ut uolumine, capite. 20. numerauit. Non satis ut cognosci nostra ætate possit, nec cur Elleborine uocauerit eam antiquitas descripta. Si nomen ipsum tantū expendatur, non ab re fuerit Elleboro similem, aut congenerem credere. Si contra Theophrastum aliquis audiat libro. 9. de plantarum historia, pro candido Veratro de ea sic tradentem. *μύβρις αὐτὴν ἴσθαι πρὸς τοὺς ἑσπερίους* *ἐπὶ τοῖς ἰσθμοῖς* *τοῦτο δὲ ἴσθαι πρὸς τοὺς ἑσπερίους*. Quorum sensus est. Milcetum autem in Ellebori poculo, ut uomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis inq̃ hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tant quia Elleboro congener sit Elleborinem dici, sed quod Ellebori uim augeat, coniunctaq̃ illi faciliore uomitiones faciat. Vtraq̃ enim ex Theophrasto colligi caussa potest.

De Capno, seu Fumariâ.

CAP. CXI.

CApnon, aliqui Corydalion, aut Corion uocant, alij syluestre Coridalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Marmariten, alij Capnogorgion, alij Chelidonium micron, alij Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aegyptij Tucin. Fruticosa hærbula est, prætenera, Coriandri similis, folijs candidioribus, undiq̃ numerosis, cineracei coloris, flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemq̃. Vnde nomen traxit. Illius cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata hæba, biliosam urinam trahit.

BARBARI COROLL.

CApnos, siue Capnion, hoc est, Fumus, duplex. Alia hic descripta nascēs in hortis, & legibus hordeaceis: alia & nomie & effectū similis, quas pedes Gallinaceos uocat. In parietibus & sepibus geniti, ramis tenuissimis sparsisq̃, flore purpureo, ut inquit Plinius: quā nonnulli modo Cimbaleum uulgo dictam, nescio q̃ recte interpretantur, folio Hederae prætenui: ut in Coryledone cōmonuimus. Hanc autē Capnon, quæ nascitur in sepibus Chelidoniā Phragmitem uocare moris est Aetiō, ad exinanitiones partium in iocinore curuatiū utilem dictam: ut puto, quoniā succo discutit caliginem, ut Chelidonia: & ob id in medicamenta oculorum additur: ut in Collyrium Mareiani, eam Chelidoniā Capnitida cognominantis. Quod si eadem probetur esse cum Cymbalari, ut quidam conijciunt, etiā illa similitudo confluat, quod

Pli. li. 17. ca. 17.

C folium Hederae habuerit, quale Chelidonio minori contigit. Propterea considerari cupio, nunquid non similis, sed eadem omnino sit Capnos haec, cum Chelidonio minore. Multa certe paria comperio. Ceterum ex eo quod Capnon Plinius a nostris Pedes gallinaceos uocari scribit, magnus plerisque inuasit error, existimantes Capnon a Dioscoride monstratum non aliud genus esse, quam quae uulgo Sanguinaria, & galli Crus dicitur. Pudenda & poenitenda inscitia: nisi frons atrata multis ellet. Quandoquidem ea quae galli Crus uocatur, Gramini est similibus, ut ab eo forte non admodum seungi possit: nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius quam radice nititur. Id autem quod in utroque summo frutice Trifarin, gallinacei Pedis imitationem habet, candidius in hac quam in Gramine conspicitur.

F E X M. V E R G. C O M M.

Fumariae herbae notissima res. Fumus nomen quondam fecit: haud sane, quia tridinioium parietibus eorumque cameris induta, nigredine noceat: aut quia, ut poeta cecinit, suspensam exploret dureque ad fabricam materiam, sed quoniam uis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in Fumo est: ob quam caussam Flaccus lachrymosum in carmine suo Fumum appellauit: & Aristophanis seruus, in scenam redisse se dicebat, Fumo coactum, nec potuisse domi cum caeteris esse, ὅτι ἔλακνεν τὰ βλεφαρὲς αὐτοῦ, quod est, quoniam eroderet palpebras eius & oculos. Quod maximum a Fumo huic parti tedium est: cui potens idem Fumariae herbae succus a Fumo indicata in graecis fuit. Nec tantum Capnon aequali Fumo appellatione eam uocauerunt, sed Capnitum etiam, id est, Fumariam dixerunt. Quemadmodum a similitudine Coriandrum, quae uox in scriptore hoc multifariam creuit. Alijs simpliciter Coriandrum, alijs agreste Coriandrum, alijs diminutiua forma Coriandron uocantibus. Nasci hic in segete hordeacea ait. Plinius tamen adiecit, & hortis: nec male, quoniam frequentior in hortis, quam in segetibus inueniatur.

De Loto urbana.

C A P. CXII.

ἡ ὁτοὺς ὁ ἄμπερος

D Lotum urbanam, alij Triphyllon, alij Libyon, alij Tripodion, alij Tribolion uocant. Nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, caeterasque caligines discutit.

L O T U S A R I C O R O L L.

Lotus fatiua, non nisi post annum ex semine suo nascitur. Est & Lotus syluestris. Itemque Lotus Aegyptia, herbae omnes: de quibus paulo post agendum nobis erit. Nam de Loto arbore iam diximus. Quae sint in Columellae horto Lotae Phrygiae, luminibus gemmantibus, haud scio reddere. Apud Hesperios Aethiopas nasci tradit herbam Lotum uocatam Artemidorus, quae uescentes, quilibet fistuloso & squalenti tractu sitim arceant: ob id & Lotophagi Aethiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

Strabo. lib. 3.

F E X M. V E R G. C O M M.

Diximus primo uolumine de arbore, quam ueteres Romani Celsum uocabant, Lotum a graecis dictam: ex cuius materia fistulae quondam fiebant. Dicendum de herbis hoc loco, quae prima fatiua Lotos est, in hortis quondam uiuens, & in delictis habita: quoniam ampliore longiorisque uita folio in hortis tota aestate uireret. Plinius foliato caule eam tradidit, & antiquiores poetae inter herbas Deorum uoluptati nascentes numerauerunt. Quae omnia hic una ratione tantum indicauit, in paradisis & hortis nasci dicens. Qui deprehendisse eam se iactant, humilem ostendunt herbam, in pratis nascentem, numerofo folio, Trifolio paulo minus quam undique simili. Discrepat, quod in Trifolio longiora, minora, & acuminatiora folia sunt: in Loto tria quidem numero, sed longe maiora: nec in acutis ut in illo desinentia, uerum paulo minus quam in orbem circumacta. Quae si fatiua Lotus sit, uulgaris, & cognitu facilis herba est. Fecit trium foliorum eius numerus, ut Trifolium & Tripodium diceretur.

De syluestri Loto.

C A P. CXIII.

ἡ ὁτοὺς ὁ ἄμπερος

Syluestris Lotus, quam aliqui Libyon, alij Triphyllon, Romani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gignitur, caule cubitali, & saepe maiore, alis multis, folijs Trifolij pratensis, semine Foenigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringen-

di obtinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. **A**
Trita per sese, aut cum Maluæ semine, in uino aut passo bibitur apertissi-
me contra dolores, qui uesciam male habent.

B A R B A R I C O R O L L.
Lotus sylvestris inter aculeatas (ut puto) constituitur, caule foliato, ut Crepis ab ra-
dice. Quæ sit Crepis nondum comperi. Crepulam certe dici quæ sit Acanthos ropiaria,
Dioscorides affirmat.

Pli. li. ii. ca. 16.

E X M. V E R G. C O M M.

Similior communi Trifolio Lotos hæc q̄ antedicta est, facilis inuentu inter nos etiam her-
ba; & si hic plurimam nasci in Libya testetur, ideoq; Libycam a quibusdam dictam. Longo
enim & acuminato folio, quali Trifolium passim uidetur hæc est. Ideoq; a Romanis, ut in Dio-
scoride legitur, Trifolium minus appellata. In qua uoce uitium esse oportet. Quoniam non po-
test nostrati Trifolio respondere duorum cubitorum altitudo, & minus uocari. Nouimus em̄
omnes Trifolium; ratio cinariq; facillimum est, falso minus Trifolio nostro dici aliquid quod
bicubitale sit. Vetusiores Dioscoridis latini codices non minus, sed uirus habent. Quæ uox
certum non habet intellectum: nec nos augurari aliquid in eâ re uoluimus: ob eam causam
quale in alijs erat, tale relictum a nobis etiam est. Folia Loto huic Dioscorides ait simpliciter
pratensi Trifolio similia esse: non ut Barbarus uertit, Loti trifoliæ. Non animaduertit ille,
qui in uerborum cursu in Dioscoride esset. Neq; enim pratensi Trifolium Loton ille uocat,
sed Loti huius folia pratensi Trifolio similia esse testatur.

De Cytiso.**C A P. CXIII.**

Cytisus, quem aliqui Telinen, alij Lotum magnū, alij Triphyl-
lon, Romani Trifolium maius appellant. Frutex est albus in to-
rum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, folia Foenigræci,
aut Loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita, Eru-
cam olent, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter ini-
tia discutunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet.
Nonnulli quod apes alliciat, prope aluearia ferunt.

NITRO

B

B A R B A R I C O R O L L.
Cytisus, siue Cytisum, Hederæ modo uinct & strangulat fara. Contra Cytiso pestis Alt-
mon. Densa Cytiso medulla, Ebumq; prouocans. Non ex alio pabulo lactis maior copia,
aut meliori: in commodum tamen tantisper dum floret, ut inquit Aristoteles, quoniam sit u-
rentius. Perq; modica eius herba quadrupedes pinguescunt: ita, ut iumeta etiam ordeum sper-
nant, nec aliud minoris impendi est. Vel mediocri solo prouenit. Seritur semine & caule. Per-
ficitur triennio. Florere desinit uerno æquinoctio, cum & metitur. Aspectu, si quis breuiter
exprimere uelit similitudinem, angustioris Trifolij. Frutex hic in Cythno insula inuentus, in-
de translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouenit: ut mirum
sit, rarum esse in Italia; æstus, aloris, grandinum, niuisq; omnis demum iniuriæ sine no-
xa patiens. Intactum quoq; hostibus, propter nullam gratiam ligni, ab Andinomacho Aihe-
nensi magnis laudibus extollitur. Apium examina Cytiso eliciuntur: quàmq; Democritus
& Aristomachus eas prædicant, nunquam de flore Cytisi pabulum contingere. Columella
Cytisum, & Zeas, & Carnicin, & Trifarîa uocari scribit. Et esse geminam: hoc est, sati-
uam, & alteram suæ spontis.

Pli. li. 17. ca. 34.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod tacendum huic scriptori non fuerat, lactis copia est, quâ in homine facere Cytisum
testati omnes sunt. Columella ultimo septimi libri capite, his uerbis ad copiam la-
ctis Cytisum laudat. Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, Cytisum, in qua macerari
oportet: & cū tota nocte permaduuerit, postero die expressi succi ternas seminas permisceri mo-
do uino, atq; ita potandū dare. Sic & ipsæ ualebunt, & pueri abundantia lactis confirmabun-
tur. Plinius iisdem lib. 13, cap. 24, de Cytiso hæc ait. Quin & nutricibus in defectu lactis aridū,

C atq; in aqua decoctum potui cum uino dari iubent, & firmiores, celsioresq; infantes fore. Paulus Aegineta eam comā Cythi iubet præcordijs prægnantium, contra uomitiones ex uetere uino imponi. Nec minus q̃ Malua discutiētis & tepidæ naturæ esse. Notissimus quondā fructus hic omnibus agris conlitus, & quo macrioribus, eo citius eum comprehendētibz. Nunc quod sciam, nullibi in Italia est: aut si sit cognitus, sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cytus ex Cycladibus una: & ex ea omnem peragrauit Græciam & Italiam, ubiq; carus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus, non paruum antiqua amantibus desyderium sui reliquit.

Lotus
Ægyptia

E St & in Ægypto Lotus, quæ aquis prouenit, plana irrigantibus, caule Fabæ, flore paruo, candido, Lilio simili: quem trahunt occidente sole comprimi, occludique, ad ortum autem aperiri. Adduntq; caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum, & intus grana ceu Milij, quæ Ægyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet, mali Cotonij similitudine, quæ cruda coctaq; manditur. Decoctaq; lutei oui speciem exhibet.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 17.
lib. 22. cap. 21.
lib. 22. cap. 17.

D Lotus herba Ægypto uernacula est, Caule fabaceo & petasato: folijs densa congerie stipatis, breuifloribus tantū, gracilioribusq; flores ei similes, ut Theophrastus ingit, Lilio: ut Dioscorides, hordeo. Librariorū in alterutro culpa, Crinon, pro Crithe, contrarie scribentū. Copiosij & in te sarcti, comprimētes se ad occasum solis, aperientesq; ad ortū per uices, donec perficiantur capita, & flos ipse decidat. Fructus in capite Papaueris incisuris, omnique alio modo, nisi quod crebriora intus grana. Radicem Corsion uocant, operā nigro cortice, qualis & castaneas tegit: interius candidū corpus: quod decoctū cibo gratius est q̃ crudū, siue aqua, siue purina. Nec aliūde magis q̃ purgantibus eius sues crassescunt. Illud sciendū, auctore Theophrasto, genera huius plura inueniri, distincta flore, fructu, caule, folio, ut nomē fere tantū cōmune habeant, ratio naturæ tota dissentiāt. Loton qui arborem putant tantū esse, de qua uolumine primo diximus, uel Homero coarguitur, qui inter herbas subnascentes, Deorū uoluptati Loton primā nominauerit. Est & Lotometra, quæ fit ex Loto fata: ex cuius semine, simillimo Porri, atq; Millo, panibus in Ægypto pastoralibus maxima aqua, lacteue subactis, negatur quicq; esse salubrius, aut leuius, dum caleant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur, sitq; ponderosus. Eos qui uiuāt pane illo, nec Dysenteria, nec Tenasmo, nec alijs in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa Loti aceruata putrefaciūt: mox separant a putaminibus, lauando, & siccata tundunt: eoq; pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usq; in medias noctes a uespera mergitur, ut ne dimissa quidē manu cōprehendi possit. Vertitur deinde, paulatimq; subrigitur, dehiscente flore ad solis ortū, ut plane a terra absit alte. Hanc Loton in coronas uenire diximus in Myrto: propterea Cratinus eam Stephanonia uocauit: & si Attici omnia folia cea Stephanomata solent appellare. Antinōias uero dicta ab Antinoo: qui e Bithynia fuisse dicitur, per diui Adriani fere tempora, qui & memoriā uiri coluit. In Ægypto, ab eius nomine uocata, delubris etiā in honorem eius dicatis, apud maritimos in Arcadia, quod crimen inde Bithyniam habuisse crederēt. Vt illud tamen quod diximus aliubi, sciamus, Lotum non quæ ceruleum, sed quæ similem Rosæ florem edat, in uentu rarum, Antinōium propriè uocatum, in assentatiōem Adriani principis, poëta Alexandrino: qui finxisset e leonis cruore, quæ Adrianus crassantem in Libya necasset, editum, & Antinoion dicendum, alimentis annuis ex museo constitutis. Huius rei partim Adienæum, partim Pausaniam auctores habeo. Diminutua in Paulo forma, Lotarium rubens legi ad psoras utile. Nisi quis non de Loto Ægyptia, sed de syluestri potius accipiat. Pasillus est, siue orbiculus apud eundem Paulum Dialorion uocatus, ad genitalium, sedisq; uitia.

E X M. V E R G. C O M M.

Longissime Plinius lib. 11. capite 2. & 3. supra decimū de Loto egit: nihil tamē non a Theophrasto antea dictū retulit, Cuius longior etiā q̃ Plinij de Ægyptia hac Loto historia est, Mul-

ta tamē reliquit, quæ nouisse pro Dioscoride necessariū sit. Eamq; ob causam, nos quæ a Theophrasto dicunt, ipsēdem uerbis repetemus, non græcis (longius enī id esset) sed qualia in decursu uertere licebit. Ea huiuscemodi sunt. Quæ uero Lotus in Aegypto appellatur, plurima in eam pis nascit, cum in undata fuerit regio. In ea caulū natura eadem quæ Fabæ Aegyptiæ: similiter & foliorū: quæ ille Petalos, quasi galeros uocat: uerū tamen minora ea, & tenuiora sunt. Nascitur Lotus Aegyptia Fabæ Aegyptiæ similiter. Candidū habet florē, Cuius folia sunt angusta, longitudine liliorū folijs similia. Nascit numerosus, densus, & sibi inuicem confectus flos ille: cumq; sol occidit, claudī, simulq; uasculū sub aqua condit: mox oriente sole aperitur, & supra aquā emergit: agitq; id, donec uasculum perficiatur, & flos defluerit. Vasculi magnitudo est quāta maximi Papaueris, & eiusdem Papaueris modo incisuris intus diuisum. Verū in Loto crebrius semē est, Milio simile. Ferunt in Euphrate hoc amplius uasculū, & flores uespere usq; in medias noctes mergi, descendereq; altius. Neq; enī demissa manu inueniri potest. Cum uero illucescit, rursus surgit, subigiturq; & ad exortū solis supra aquā apparet, ac florē patefacit: patefactoq; edamnum exurgit, ut plane absit ab aqua. Coāceruant in unū uascula hæc Aegyptij, putrefaciūq; tum putrefactis, corticē in flumine lauantes, semē auferunt: siccatisq; & totum in panē pinfunt: eoq; utunt cibō. Corfion uocāt Loti radicē hanc: ea rotunda est, magnitudine Corōnei mali, cortice nigro, foris uestita quali in castanea nuce est: intus candida: quæ rosa dixaq; utellīs ouorū similis sapore est, gustu suauis. Estur eadē & cruda. Et hæc Theophrastus, de plantarū historia pro Aegypto Loto. Ex quibus intelligent facile omnes, male in Dioscoride legi, similē hordeo esse: nec sic, sed Lilio uertendū fuisse, cui manifeste Theophrastus eum comparat. Et Plinius ait, Flos qui cādidus est, &c. quo colore Lilia sunt. Accedit his, quod parū uerisimile est, tam grandis plantæ, & quæ uasculū, id est, papaueraceum uasculum fert, flores hordeaceis similes esse: qui nulli fere sunt. Barbarus in Corollario suo suspicatus id est: & nihilominus in Dioscoride suspitionē illam penitus neglexit. Facilis & lubricus in græcis lapsus fuit, a crithe, quod hordeum, ad criton, quod Liliū significat.

De Millefolio.

CAP. CXVI.

MYriophyllon, alij Melphyllon, alij Stratioticon, alij Achillion. Latini Millefolium uocant, aliqui Supercilium Veneris, Galli Belicandis. Caulis est tener, indiuiduus, unica nixus radice, plurimis folijs, Fœniculo similibus. Vnde nomen accipit. Caulis flauescit, prædensus, ac ueluti ex industria delimatus, Nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione uindicat: si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. Præcipitatis cum aqua & sale datur.

MYriophyllon, quæ fere Millefoliam significat, alia tamen uidetur esse ab ea, quæ inter Siderites, Achilleon, & Millefolia cognominatur: itemq; ab ea quā in Ethruria Millefoliam uocari diximus: & ab ea quæ Militaris. Alioqui Græci hanc Myriophyllon, illas uero Chilio phyllon appellare consueverunt.

B

μυριόφυλλον

Pli. li. 24. c. 2. 16.

MILLEFOLIUM Plinius græcam Myriophyllon uocat: haud sane, quia in græca uocē certa cuius numeri uis & significatio sit, sed quæpius non poterat in latinis nomen fingi: nec referēbāt, in re incerta mille potius quæ decem milia, infinitæ uero folia illi tribuisse: quod mutato tantum accentu in græcis μύρια significant. Quemadmodum nec male penitus dixerit aliquis, mille, pluribusue, aut infinitis pilis constare hominis supercilium. Ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam uocata a plerisque fuit: quoniam scilicet quemadmodum minud, densq; pili eam hominis partem uestiunt: sic Millefolij huius coliculos, minuta densaq; uestiunt folia. Quæ licet hic Fœniculo comparauerit, non tamen eadem longitudine sunt. Huius enim breuitas admodum, Fœniculi uero longiora, & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioticon, & Achilleam uocari fecit. Breuib; enim & numerosis illæ etiam folijs describuntur, & sunt. De Stratiote non multo antedictum in hoc ipso scriptore a nobis fuit: & de Achillea longe prius, reperendaq; legentibus æ illis comparatio ad hanc est.

EX M. VERG. COMM.

C

μυρρην

De Myrrhide.

CAP. CXVII.

MYrrhis, quam alij Myrrham, alij Conilen uocant, simillima est Cicutæ, caule folijsq̃. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuauis. Quæ pota in uino, phalangiorum morfibz auxiliatur. Cit mēstrua & partus. Subuenit & phthificis cocta in forbitione. Aiunt quoq̃ eandem bis die, terue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obfstare.

Pli, li. 16. ca. 11.

MYrrhis, & Myrrha, siue Murrha, ut ego arbitror a nostris appellata, nonnulli Smyrin, Flō rem habet Cicutæ: cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui Chærephyllon, siue Chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem intelligant. Plinius Chærefolium aliud uidetur genus accepisse: cum inquit, feri æquinoctio autumni Chærefolium: quod Pæderota Græci uocant, acerrimum sapore, igneiq̃ affectus, ac saluberrimum corpori. Qz q̃ uerba hæc postrema de Sinapi dicta uideri possunt, de quo statim auctor idem loquitur. Columella hortu suo, breue Chærephyllon appellat. Myrrhis proprie Cicutaria latine dicitur, ut in Geranio testati sumus. Inuenio & Mylam genus herbæ, cuius radix paruo bulbo similis dicatur, cōtrahendi effectui uuluis appositæ cum farina Lolij. Miror hanc in Dioscoride nusq̃ legi, cum tamen & Hippocrates id prodæ, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Aetius radicem syluestris Lapathi, Mylen appellatam prodit, utilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

VERISIMILE EST A MYRRHÆ ODORE MYRRHIDA, & MYRRHAM DICTA FUISSE QUONDAM QUAM MODO TRACTAMUS HERBAM. Nullus tamē, quod hæcenus inuenerim, aperte id testatus in græcis aut latinis est. Odorata tamē radice ab hoc, & a cunctis alijs describitur. Potuitq̃ illi ab ea nota nomē hoc factū fuisse. Cicutæ similem oēs tradiderūt. Eamq̃ ob causam crediderūt aliqui Cicutariā nūc eam didi. Purgare eam *μυρρην καὶ λόχια* Dioscorides ait: quæ uoces tā notas in græcis, & in commentationibus his nostris significationes habent, ut longius dixisse de eis nō oporteat. Quod tantū monemus illud est: factū fuisse, dum alter ex interpretibus Pliniū nimis q̃ in scriptore hoc opus erat amat, & sequit̃, pro græcorū lochijs, partus uerterit. Pliniū uerba sunt, Cit mēstrua, & partus cū uino: cum tñ lochia nihil ad partū pertineant: modo partus, q̃d in cōmuni signifi catōis æstimationē habet significet. Sintq̃ Lochia secūdarū, & deinceps a puerperio socinuarū purgationes: quædamodū, nī fallimur, in Aristolochia diximus. Idē supiore cap. de Millefolio caulē eius indiuiduū uocauit, quē ille *μερσφυ*, non qui diuidi nequeat, sed qui singularis nō numerosus a radice surgit. Hæc nos leuia quidē, sed interpreti non cōtēnenda signamus.

D

MYrrhis, & Myrrha, siue Murrha, ut ego arbitror a nostris appellata, nonnulli Smyrin, Flō rem habet Cicutæ: cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui Chærephyllon, siue Chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem intelligant. Plinius Chærefolium aliud uidetur genus accepisse: cum inquit, feri æquinoctio autumni Chærefolium: quod Pæderota Græci uocant, acerrimum sapore, igneiq̃ affectus, ac saluberrimum corpori. Qz q̃ uerba hæc postrema de Sinapi dicta uideri possunt, de quo statim auctor idem loquitur. Columella hortu suo, breue Chærephyllon appellat. Myrrhis proprie Cicutaria latine dicitur, ut in Geranio testati sumus. Inuenio & Mylam genus herbæ, cuius radix paruo bulbo similis dicatur, cōtrahendi effectui uuluis appositæ cum farina Lolij. Miror hanc in Dioscoride nusq̃ legi, cum tamen & Hippocrates id prodæ, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Aetius radicem syluestris Lapathi, Mylen appellatam prodit, utilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

μυρρην

De Myagro.

CAP. CXVIII.

MYagron aliqui Melampyron uocant. Herba est surculacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedanea. Semen oleosum, collo simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq̃ uirgis ad lucernarum lumina utunt̃. Hoc pingui, scabrias corporis læuigari, atq̃ expoliri constat.

Theoph. li. 8. de plant.

MYagros, siue Melampyros, herba serulacea, ex cuius semine oleum etiam fit. Paulus Aegineta præter hanc genus aliud facit herbæ, quam Myaron appellat, & Melampycon: eiusdem per omnia cum Myagro naturæ. Vt librariorū fortasse culpa euenit, Myaron, pro Myagro, & Melampycon, pro Melampyro scribentium.

SI Melampyro eadem Myagros est, quod Græci omnes testantur, binominē herbam facientes, in triticea segete nasci, auctore Theophrasto cōstituentū est, qui, s. de plantarum historia, uolumine Siciliæ Melampyrū priuatim assignat: & contra q̃ in Avena & Lolio fit innocētē, & Tritico nihil officientem describit; nec uox aliud indicat, q̃ nigri coloris Triticum. Quemadmodum forte Myagros, quod mures uenatur & perimit: in illo niger, in plerisq̃ seminibus color rem certam facit. In hoc rarus euentus, præterq̃ ex historia cōstitui non potest, Quæ no-

bis nulla est; nec nos nisi ex uocis significatione rei coniecturam hanc facimus.

A

¶ De Oenagra.

CAP. CXIX.

οἰνάγρα

Oenagra, siue Oenothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore rosaceo, magno, radice candida, pusilla, cum siccata est uinum olente. Nasctur in montibus, Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigt, & cicures facit. Illitu quoq; tetra ulcera mulcet.

BARBARI COROLL.

Oenagran, & Oenagron, & Oenotherā, & Oenotheram, & Onuthurida, & Oenotheridē uocamus, aliqui Onear. Sic hæc & quæ dicitur Oenutta, qua corui & canes inebriantur, ut Helianus inquit, non affirmarim.

EX M. VERG. COMM.

Discrepant non leuiter in radicis Oenagræ historia Theophrastus & Diosc. Candida hic, ille rubentem tradit. In reliquis eadem ambobus omnia. Et Theophrasto huiusmodi sunt. Radix Oenotheræ mitiores & hilariiores mores facit in uino pota. Habetq; folium Amygdalæ simile, uerum tamen latius. Florem rubentem ceu Rosam. Ipse grandis, ut inter frutices est. Radix illi grandis & rubens, quæ siccata uinum olet. Amat mōtana loca. Ex his multa in impressis scriptoris huius codicibus emendare licuit. Primumq; non γυνήτερη, id est, dulciora eius folia, sed πλατύτερη, id est, latiora legi oportere: Mox in radice non μικράν, id est, paruam, uerū μακράν, .i. longam. Nomen illi ab eueū factum. Quodq; Theophrastus ait, mitiores & hilariiores mores facere, eodū pertinet quo hic ait, potō diluto eius leniri ferocientium omnium animalium feritatem. Nomenq; id significat, siquidem οἰνάγρα, & οἰνόθηρα, siue οἰνόθηριον ex eadem ui capiendi, tenendi & domandi uoces sunt. Significatq; οἰνάγρα quemadmodum & podagra, aliq; huiusmodi, quæ uino capiat, uenetur & domet. ἀρπύριον enim in uenatione capere est: nec min⁹ etiam ἀρπάζειν, a quibus uerbis græci transferentes multa huiusmodi sinxerunt. Et inter cætera οἰνάγραν hanc, & οἰνόθηραν. Egit de ea Theophrastus cum numeraret quæ diuersis locis uiua, aut uinosa alterutram hominis partem, corpus, .s. aut animum mouent. Videturq; Theophrastus non tantum ad mulcendam brutorum feritatem uim illi esse ostendere, uerum inter homines etiam uelur inducta non ebrietate, sed quam græci οἰνωριον uocant, tristitiæ ex uino remissione, usum eius quondam fuisse. Hic tamen ad ferocientia tantum animalia contraxit. Neq; ab re, quando in iuueniorum domitura Columella præcepit eorum tergora tractare, & respergere mero: quo familiariores bubulcō fiant. Idemq; a mellarijs etiam in apibus seruari. Rationem ex natura uini colligere facile est. Theophrastus etiam quo diximus loco, eā breuiter reddidit. Non male in ferocia & tristitia hominis, sine ebrietate & poculorum sumptu radice Oenagræ huius uteremur, si quemadmodum inuentu, sic cognitu etiam facilis esset.

B

¶ De Crifio.

CAP. CXX.

κρίσιον

Crifion aliqui Buglossum magnum uocant, Romani Spinam mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis, anguli spinosi, per interualla molles, folia Buglossi similia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uariis cum sedare, Andreas scripsit.

BARBARI COROLL.

Crifion potius, q̄ ut quidam legunt Crifion, a uaricibus dicta est, quibus utilis existimatur. ita enim Varices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles Ixias uocauit. Huic herbæ similis est quæ Hircina lingua uulgo dicitur, sed caule tamen rotundo, non anguloso ut Crifion. Nec dissimilis huic uidetur quam Porriginem, siue Borraginem olitores nostri uocant, flore interm purpureo, Crifion iuterim ceruleo: quæ si Crifion non est, mirum quam obrem sit indicta ueteribus, quæ sit & uulgatissima, & cibo gratissima; nisi quis Buglossæ generibus contribuat.

Pli. li. 17. ca. 34

V

Aster

Aster ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Astericos, a
 lijs Asterion, quibusdam Hyophthalmon. Romanis Inguina-
 lis, Dacis Rathibis. Cauliculus lignoſus, florem in cacumine habens
 purpureum, lutumue, & in ambitu diuiſum Anthemidis modo capi-
 tulum, puſilla in eo circa caulem folia, ſtellæ modo radiata, oblonga,
 hirsuta. Feruenti ſtomacho, oculorum inflammationibus, procidua ſe-
 di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florem, ſi ex a-
 qua bibatur, anginis, et pueris comitiale malum ſentientibus opitulari.
 Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos ſi-
 niſtra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore libe-
 rat. Stellares huius radij noctu ſplendent: quapropter qui ignari antea
 non uiderunt, eſſe inane ſimulacrum arbitrantur. Medijs ſaxis & aſpe-
 ris exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hæc de
 ea refert, ſi uiridis cum axungia uetere tundatur, contra rabioſorū mor-
 ſus, turgentia guttura proderit. Suffitu quoq; ſerpentes fugat.

B A R B A R I C O R O L L.

D

Aster Articus, ſive Inguinaria, folijs oblongis duobus, aut tribus, paſſim in uepribus na-
 ſcens, ut Plinius ſcribit, Argemonion a quibusdam uocari dicens. De hac Galenus bis uiderur
 ſcripſiſſe medicinas, uno loco Aſtera Articon uocans, altero Bubonion. Qualis autem Pauſa-
 nia ſit herba, quæ in Mycenenſi agro ad Iunonis ſanum Aſterion uocatur, a flumine terram il-
 lam rigante, quia in ripis naſcitur, cuius folia Iunoni ſacra in coronas ſibi neſcunt accola, non
 comperi. Eſt & alius Aſter, nunc uulgo Stella dictus, folio fere Vitis, ſeu Maluæ potius erra-
 ticæ, ad radicem maiore, pluribus, ſed minoribus diuiſuris: florem fert in modum ſtellæ, in lu-
 teo uiridem, puſillum, & herbæ ſuæ ſimilem. Ad herniam puerorum, & uulnera commen-
 dant hanc. Eius decoctum quæ uirgines uideri uolunt, inſident. Veteribus dicta Indicta ſit,
 haud ſcio.

E X M. V E R G. C O M M.

Tanta, tamq; preſens contra inguina, eorumq; dolores uis Inguinalis herbæ eſt, ut adalliga-
 ta ſolum in eo malo, medicinam faciat. Idq; grauiſſimi Græcorum medici teſtati ſunt, Galenus,
 Paulus Aegineta, Plinius etiam, & hic ipſe, cui non minus curæ fuit hæc inuenire q̃ docere.
 Sit ergo illi Aſteris nomen, a foliorum in floribus figura, & ſitu: ſint & Aſteriscos, & Aſterio.
 In cunctis enim ſtellæ uis & ſignificatio eſt, quam græci aſtera uocant. Solach hæc nominis hu-
 ius cauſa habeatur. Non quia noctu & in tenebris ſtellarum modo fulgeat, ut poſteriores græ-
 ci etiam crediderunt: quorum aliqui inuuliter in extrema capitis huius coronide addiderunt,
 quæ in alijs interpretibus leguntur ab eo principio, Naſcitur autem media inter petas, &c.
 Omnia enim ex eo loco, uſq; ad reliquum caput, ex hac opinione illi accreuerunt. Nos ea re-
 ſecimus, nullibi in antiquiſſimis & optimis græcis, latinisq; inuenta. Quodq; nec Plinius hu-
 iſcemodi aliqui non reliſcitur, nec Paulus Aegineta, nec Serapion, nec antiqua huius ſcri-
 ptoris interpretatio oſtendunt. Acceditq; his omnibus, ut cum ſuperſtitioſum aliquid, aut q̃d
 ad religionem noſtram pertineat, in hoc ſcriptore legitur, perſuaderi non poſſumus, eius eſſe:
 ut ſæpe alias teſtati ſumus. Aſter itaq; id eſt, ſtella, ob eam quam prius diximus cauſam dicta
 herba Inguinalis eſt. Adiecerunt illi, ab Athenienſium agro notam ueteres græci, q̃ illic ob ſo-
 li tenuitatem frequentior, aut melior forte naſceretur. Bubonios eadem ab iſdem græcis de-
 inde dicta eſt, quoniam Inguinibus, quæ bubonas illi appellant, tam preſenti remedio mède-
 tur, ut adalligata tantum medicinam in eo malo homini faciat. Hyophthalmos poſtremo, quaſi
 ſuis oculis: q̃ totus eius flos animalis illius oculum reſerre uideatur. In quo animaduertendū
 eſt, quod hic ait, habere Inguinalem herbam purpureum & luteum florem, ad diuerſas floris
 partes referendum eſſe, Sunt enim in eo purpurei coloris folia. Quod uero medium inter ea ſo-
 lia capitulū eſt, Chamæmali mō luteſcit, Et hæc pro nominum & florum hiftoria ſatis ſint.

De Isopyro. CAP. CXXII.

A

Isopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est Aniso simile, in pampinos torquet. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, Melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris uitia, semen ex aqua mûlfa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus utile.

B A R B A R I C O R O L L.

Isopyron, & Phasiolos, & Phasilon quoq; dicitur. Alia uidetur herba esse quam Theophrastus Ision uocat. Theodoros more suo, Aequum. Duplici fastigio, nigrum, & candidum. Flos, fructusq; illis pro ratione discriminis, niger, aut candidus: quancq; & medio inquit colore fructus quandoq; cernuntur, & flores in purpuram inclinantes, uirgis & folio tenuioribus atq; leuioribus. In Aetio Ision dici herbam quandam uideo, cuius cibo pituita detrahitur: nec satis animaduerto an eadem sit cum Iso. Alexander quoq; in problematis, si locus memoria non excidit, Ision herbam inter olera dinumerat.

Pli. li. 27, ca. 11.

E X M. V E R G. C O M M.

Qui Isopyron hancprehendisse nostra ætate uideri uolunt, herbam a radice statim foliosam ostendunt, & ex medio surgentem colicolum: in quo anteq; in ultimū cacumen desinat, qd florem & sub eo plenum seminis uasculum sustinet, utrinq; uolutæ duæ se spargunt phaselorum cirris & clauiculis similes: quas hic *ἰσόπυρον*, ut in uitibus uocat: folijs quādamtenus rubentibus, contractioribusq; Plantaginis, sed eadem latitudine, & in aliquibus maiore. Quo fit, ne credamus Isopyron scriptoris huius eam esse: si Dioscoridi, Plinio, græcisq; alijs credendum est, qui omnes Anisi folio eam describunt. In cæteris non dissimilis species diligentiam eorum probat. Nobis in neutram partem inclinat animus, & quale a græcis traditur, Isopyron tale redditum a nobis etiam est.

B

De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

Violam purpuream, aliqui Dasypodion, alij Priapæion, alij Ion syluestre, alij Cybelion, Romani Violam purpuream uocant. Folium habet Hædera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuant, & oculorum inflammationibus, sediq; procidentibus. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

B A R B A R I C O R O L L.

Violam, Græci Ion pro flore, Violarium Ioniam, pro frutice appellant. Nicandee in georgicis Ion uocatam credit Violam, quia nymphae quædam Ionæ, florem eum Ioui primum dedere muner. Nascitur uitis modo & supernis: quasi e puppi dicas, non prora, ut Ruta, Sisymbrium, Serpillum: eoq; omnes Phrygæa, hoc est, furculi siue cremia Violæ dicuntur: excepta nigra: quæ hoc capite describitur. Viret hæc perpétuo, & ut quidam ferunt, si certo genere colatur, anno toto. Serif plantis ut olus. Vere floret, post Leucoion, & ante Flammæam. Cū Ion Græci dicunt, nigra, seu purpurea fere intelligunt. Humilis hæc, & latiore folio, statim ab radice multa carnosio exente, sine ramis: ob id uulgo loripèdem Violâ uocamus. Hæc nomine a cæteris distinguunt, solè la appellare Græcis: ut ab ijs lanchina uestis, et Viola cea diceretur. Alia Violarum genera in Leucoio reddidimus. Violas sarranas, a colore, cum purpureis easdè esse apud Columellam arbitror. Purpureas, Vaccinias et Hyacinthi dici, Seruius grammaticus existimat. Dioscorides quoq; Hyacinthi latine Vaccinium appellari scribit. Admonendi sunt qui hæc legunt, purpureas Violas duorum generum haberi. Alias inter Loripèdes siue sessiles, de quibus hic agitur: alias inter Leucoia, odoratasq; omnes esse. Sed & candidarū quoq; gemina hæc discrimina cernuntur. Alia Loripedes: alia Leucoia. Leucoia intelligo, quas Mauritaniam Cheiri appellat: Loripedes, quæ uulgo Claudæ nominantur, & Maurice Senephigi.

C Væ ferrugineos Hyacinthos, & nigra Vaccinia uocari a latinorum poetis fecit nigras purpura; uel, ut aptius loquamur, in nigro purpureus color: eadem Theophrasto, græcorumq; alijs scriptoribus causa fuit, ut Viola, quæ nunc tractanda a nobis est, nigra dicere tur: tam frequenter, receptoq; passim in ea coloris discrimine huiuscemodi, ut multis locis Theophrasti in plantarum historia nihil certius intelligatur: ubiq; μέλαν ἰὺν dicenti Violam, quæ nigricante purpura, ad murorum radices, hortorum marginibus, & sepibus florens prima, aut cum primis aduentum Veris mortalibus nunciat: nota uulgo, & ubiq; inuentu facilis: quæ toto anno uiuat, & flores tenui quidem, sed longiore coliculo altius a terra inter folia erigat. Quæ hic merito Hederæ comparatur: quoniam proxime ad eam figuram accedunt. Muraria Violam a latinis uocari in Dioscoride legitur. Nescimus tamen q̄ uetusta ea uox sit: sed quæcumq; ea est, naturæ eius respondet: quoniam ut diximus, ad murorum radices, umbrosis locis frequens & speciosa nascitur. Eadem causa fuit, cur syluestris Viola itidem diceretur: quoniam in locis non cultis nascitur: nec uiolaria in hortis ut cætera illi cognomines habet. Potuit quædam etiã religione aliqua, & numinis gratia commendari: ideoq; Cybelios Viola ab antiquissima dea Cybele dicta, laudem potius q̄ nomē id inuenisse. Sed nobis nulla est eius nominis certatio, aut coniectura. Quemadmodū & reliquæ aliæ penitus ignotæ. Nisi Priapeios non dissimili ratione, q̄ Cybelios ab antiquo ruris & hortorum numine dicta fuerit. Descripsit eam Theophrastus libro sexto de plantarum historia, dixitq; προσήφωλλον καὶ ἀμφύλλον ἴνι καὶ ὡς τινὲς φασὶ ἀνταμύνει διόλου φέρει τὸ ἔνθος ἰαν τροπῇ τινὶ διακρίνεται. Quod est. Exire & uiuere folia eius in radicis capite tantum, perpetuac; uiuere fronde. Id enim uoces illæ duæ significant. Facteq; est uidere foliosum Violæ huius cespitem, nullis caulibus, aut ramulis a terra surgentem, quod cætera habent Violæ: nec æstu anni arescere, aut hyeme, quod alia patiunt, sed post amissos flores, uiuentibus folijs medicinæ toto anno etiam inferūtre. Adiecit præterea, testari quosdam, posse hanc Violam continue toto anno florere, si aliqua ratione curetur: quam tamen ille non retulit, nec quibus locis id excogitauerint homines. Adiecit eodem libro idem scriptor, disferre hanc a reliquis Violis in reliqua natura, præcipue autem ἐν τῇ πλατύφυλλος καὶ ὑγυιόφυλλος καὶ σαρκόφυλλος ἴνι, q. s. latiore folio q̄ reliquæ Violæ sit: intelligitq; reliquas Violas Leucoia ab omnibus appellatas: eodēq; folio sit ὑγυία, id est, terrestri, quod a terra non surgat: & præter id cærnofo & pingui. Quæ omnia longius forte dicta aliquibus uidebuntur. Sed nos rerum certitudini consulentes, obscuriores breuitate nolumus fieri. Quo consilio, in Violæ huius signando colore, a principio statim usi sumus: & contra aliorum interpretum æditiones, nigram, nō purpuream Violam proposuimus. Nesci purpuream diceremus, miscerentur diuersi coloris congeneres flores. Sunt enim in Leuciorum genere purpureæ Violæ, quas Columella Sarranas ab eadem purpura, & Sarrano ostrò appellat, in censu earū & ordine quæ fuculose sunt in parietibusq; & hortis nascuntur, aliter q̄ hæc dispositis in flore folijs, & plures uero pediculo pendentes: quæ proprie & uerius Purpureæ uocantur. In illis enim uera est purpura, quemadmodum in his in nigro purpureus magis color q̄ purpura. Et hæc pro notissimi floris historia satis sint. Quibus adiciemus, mutasse nos titulum capitis huius, & denigra Viola inscripsisse: quoniam res id exigebat: & in melioribus græcis, aut nulla coloris nota addita fuerat, simpliciterq; de Viola caput inscribatur: aut ἰὺν μέλαν in aliquibus legebatur.

κακαλία

De Cacalia. CAP. CXXIII.

C A C Alia quæ Leontice uocatur, folia fert magna, alba. E quibus mediis caulis emicat, rectus, albus, florem ferens Robori, aut Oleæ similem. Radix in uino madefacta ut tragacantha, delinctu, aut manducatu per se tussibus, scabricijs arteriæ medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cū cærato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 25, ca. 9.

Cacaliam putant esse, cuius semen a Plinio margaritis minutis simile reddatur: dependens inter folia grandia, in montibus fere nascentem. Hanc Galenus Cancanon uocauit. Differt ab hac Acacalis, item Caucalis: de quibus ante dictum est. Paulus Cacaliā, non Cancanum, sed Cancanō similem esse tradit.

Cacaliam descripsit Plinius. 35. uolumine, cap. 9. Leonticemq; uocari & ipse ait. Minutis margaritis simile habere semen, inter folia grandia pendens: nataleq; illi plerumq; montes esse: nec ultra in historia eius quicq; tradidit. Nos uero descriptū ab eo florem fuisse optabamus: ut quod in antiquis græcis hoc capite uariet, certius constitueretur. In cunctis enim, uno excepto, q; nobis uetustissimus & probatissimus codex Diosco. est, legitur. *ἄνθος ἔχων τινὸς διπλοῦ ἡ ἰδιαι.* Quod si uerbū de uerbo fiat significat, florem habens quercū, aut oleæ similem. Eamq; lectionem secuti cæteri interpretes, Querno, aut Roboris flori similē fecerūt. Nos musco, aut oleæ uertimus, uetèrum & meliorum codicū fidem secuti: in quibus ut nos credimus, antiqua & uerior lectio est. *ἄνθος ἔχων τινὸς βρωτῆ ἡ ἰδιαι.* Quod est ut nōs diximus, flore candido, musco, aut oleæ simili, Sumusq; ad hanc interpretationem, præter græcorum fidem, latinorum etiā, antiquissimis monumentis usi: inter quæ longobardis literis scriptus Diosco. nobis est, in quo manifeste Bryo similis legitur. Est autem græcis Bryōn, qui in torrentibus, aut arboribus concreuit muscus. Cui in comparatione respondent oleagini flores; quipassim a cunctis muscoli dicuntur. Quæ ratio etiā nōs mōnuīt, muscum magis q; quercum, aut robur hoc loco uertere. Nihil enim muscoso Oleæ flori simile habent quemis, aut robusti flores. At contra bene ad tertij floris similitudinē alternantur muscus, & oleagini flores.

De Bunio Napi genere. CAP. CXXV.

BVnion aliqui Aton, alij Actinen, alij Anemosphoron uocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersfonen, Romani Scopam regiam, Aphri Zigar, nonnulli Thepso. Caulem ædit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proxime radicem Apio similia, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyamo minus. Vrinam ciet. Excalfa cit. Secundas euocat. Lienī, uesciā, renibus uile. Tam humidi, q; sicci, expressiq; succi caulib, folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsā.

EX M. VERG. COMM.

Alterum, & primum in diuisione Naporum genus Bunion hoc facit: describiturq; a cunctis nōdem huic scriptori notis & uiribus. Non tamen in sanitatis usu receptū a gētib, ut alterum & secundum illud est. Quod foeminino genere Buniada græci uocant, secundum uolumine a Rapis statim, quasi eiusdem illis generis, ab hoc scriptore tractatum. Vtriq; radix crassior, sed contra q; in Rapis acuminatæ longitudinis: huic etiā exilior q; Buniadis, & minor. Egit de eo Plinius lib. 20. cap. 4. cum de reliquo Naporum genere ageret: Nomen ambobus factum aliqui tradiderunt *ἄνθος τῶν βουνίων*. Vocant autem græci inter alia Bunios, tumentia, & quæ in amplitudinem creperunt: quæ Naporum radice forma est. Cur autem in Diosco. legatur, Scopam regiam Bunion a Romanis dici, igniotum nobis est. nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: nō furculosam naturam, non usum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum rationem indicet aliquam. Ignoræ aliæ appellationes etiā. Sola Arction ex similitudine facta est: quam nos Pauli Aeginetæ autoritate instaurauimus. Non legitur in Barbari æditiōne hoc caput. Nec nos scimus, relictum ne a librarijs imprudenter in exscribendo fuerit: an potius quia de Napis secundo uolumine actum fuerat, ratus abundare, uolens ipse & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiā nihil actum de Bunio ab eodē est. Verumtamen autoribus græcis omnibus recipiendum, & cum cæteris uertendum fuerat. Qui enim de Pseudobunio agi mox poterat, nisi de uero Bunio actum prius fuisset? Verē enim alicuius oportet falsam & mentientem in plantis esse. Calido temperamento Bunion esse, Paulus Aegineta decreuit: ideoq; urinam, & menses ciet.

De Pseudobunio. CAP. CXXVI.

Pseudobunion palmi altitudine fruticat, in Creta, folia, ramulosq; Napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua. Illiti quoq; cum fa-

Cle & uino, tepentes, anginam discutiunt.

EX M. VERG. COMM.

Quale Pseudobunioni sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosq; alios, qui omnes Bunionem, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset: eaq; similitudine fallens, falsum & mendax Bunion a grecis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim Italiae herba, & ex Creta repetenda est.

De Chamæcisso. CAP. CXXVII.

χαμαίσις

Chamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acarpos, aut terræ Corona, aut Selinitis, Latine Hædera pluuiatica dicitur. Folio est Hæderæ, tenuiore, longiusculo, ramulis quinis senisue, dodrantalibus, foliosis, flore Violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro, radice tenui, candida, inutili. Nasctur in cultis. Bibunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis, quadragenisue diebus. Eodem pota modo senis aut septenis diebus regium morbum purgant.

BARBARI COROLL.

Chamæcisson uocat Hæderam, non attollentem se a terra. Spicata est Tritici modo hæc, et Cissos Epigeos, id est, Hædera terrestris appellatur.

EX M. VERG. COMM.

Similem tantum, non congenerem Hæderæ Chamæcisson sua appellatione greci fecerunt: licetq; terrestre, & humiliterpente Hæderæ ea uox significet, non tamen Hæderam intelligere oportet, sed herbam cultis locis nascetem, hederaceis folijs, neq; his tota figura. Fastigiantur enim in longitudinem: quod in Hædera non fit. Spargit per terram ramulos hæc suos, non plures quæ, aut sex: quemadmodum omnes tradiderunt. Nullos fert corymbos: ideoq; sterilis Hædera a plerisq; dicta quondam fuit. Eadem terræ Corona quondam uocabatur: quoniam ramulos suos per eam spargens, folioso ueluti ferto terram coronare uidetur. Eam ob floris colorem Plinius ait Violam albam existimari posse, cum floret. Cæteri lutei coloris florem illi assignant. Nec male forsitan: quando Luteolorum uox, quibus flores eius hic comparat, nõ album magis q; reliquos eius floris colores indicat. Eamq; ob causam nos, seruata grecorum uoce, uertimus, Violis quas Leucoia dicunt, similes eius flores esse.

De Chamæleuce. CAP. CXXVIII.

χαμαίλευκ

Chamæleuce lumborum doloribus propicia est, hæba uirens, incuruis folijs, furculisq; flore rosaceo.

BARBARI COROLL.

Chamæpeuce, non Chamæleuce, ut fere habent codices, legendum arbitror: quoniã Chamæleuce Populago sit, & Bechion, Chamepeuce uero Laricis folio similis ostenditur: unde non men quasi Larix pumila.

EX M. VERG. COMM.

Null inueniuntur in grecis antiqui scriptoris huius concordēs in hoc capite codices, duo saltem: tam male & infelicitè actū cum illis etiam in bonis artibus, ex multo tempore est. Sed Chamæleucem alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucem habet. In alijs nullum est hoc capitulum: in quibusdam cum Buglossio, quæ sequitur, & in extrema eius parte Chamæleuce miscetur. Et præter id, alijs breuissimè rem, longius alij absoluunt: tam confuso intellectu, & rei inconstantiã, ut quid reddendum nobis esset diu dubitauerimus. Accessit tandem anxij animo Plinius, monuitq; libro utesimo quarto, capite, scilicet in incipiti Chamæpeucem potius legendum esse: quoniam quod hic ait πενί πρός δερμούς ἀλγύματα ἐν ἐλάτλειαν πινόμενα, ille dixerit, lumbos: & spinæ doloribus propicia est, eodem rei sensu & uerborum ductu. Verisimileq; est, ex his quæ Plinius eadem Dioscoridi reddidit, Chamepeucem legisse, & hancuisse eius ætate capitis huius lectionem. Chamæleuces enim alia uires, & alia remedia sunt. De scriptisq; idem Plinius eodem loco Chamæpeucem Laricis folijs, Suspendit animo nos tan-

tum Paulus Aegineta libro sexto nullibi tractata Chamæpeuce, Chamæleucem describens: eamq; in tertio ordine calefacere, in primo autem siccare dicens: quo fit, ne pro cōpōte constitutūre aliquid audeamus. Multis em̄, iisdemq; magnis indicijs, & auctoribus pugnat: nosq; in tanta uarietate id elegimus, quod latini scriptoris, saltem deficientibus, græcis auctoritate se tueretur. Id certe non tacebimus, uidēri nobis non esse integrum Dioscoridis hoc caput. Quale etiam est quod statim sequitur, Buglossum.

B De Buglossō, seu Lingua bubula. C A P. CXXIX.
 Buglossum Magi Aelurigonon, Osthanes Tranochi, Aegyptij Besor, Romani Linguam bubulam, alij Libanium, Pœni Anaph naph uocant. Nascitur in campestribus & uaporosis, Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice tritam, potamq; contra tertianos rigores prodesse, quæ quatuor ad quaternos. Ea in uino decoquitur. Hærbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates auget.

B A R B A R I C O R O L L.
 Buglosson, & Buglossos, & Buglossa dicitur, Caro Linguam bubulam appellat; utilem in litionibus obtegendo cortice, ne imber in librum perianet.

E X M. V E R G. C O M M.
 Diximus non multo ante in Cirso, quid alij de ea & Buglossō hac nostra ætate sensissent: diximus etiam, quid nobis in ea re magis placeret, & quibus coniecturis mutata inuicem duarum herbarum nomina crederemus. Polliciti præterea sumus, in Buglossō hac adductos esse aliqua. Quæ nulla modo alia sunt, q̄ propensiores continue in eam partem fieri, ut credamus, quam ueteres Buglosson dixerunt, nostræ ætatis Borriginem esse. Vtimurq; ad eam rem hac etiam coniectura: q̄ M. Caro. 40. capite operis sui de re rustica, insitionē arborum docens, cum insituisse quatenus, & quomodo furculos inseruisse & circumligasse oporteat, addidit. Insuper Lingua bubula obtegito si pluat, ne aqua in librum permanet: eam Linguā insuper librum alligato, ne cadat. &c. Verisimileq; est, in operiendo trunca & insita stirpis rotunda sectione, rotundiorē potius q̄ longiore folio uti præcepisse. At Borriginis tale est. Eius uero quæ nunc Buglossus habetur, longa folia sunt: ideoq; operiendæ rotundæ stirpi minus apta: Scimus quidem, non posse, nec debere rem certā docentes, tā incertis & ambiguis uestigijs niti: potuissēq; antiquos insitores illa etiā uti: quoniā satis esset insita stirpem quocūq; operimēto a pluuia defendere: & quod primū inserenti se obtulisset, luto, palea, alijsq; huiuscemodi ui Non tamē negligendū, qualecūq; id fuerit, ignota rei uestigiū. Nec nos alio consilio id retulimus, q̄ ut haberent legentes, hanc etiā eruscandæ ueritatis ausam: scirentq; antiquæ Buglossi, quæ Cato, oēsq; alij a boum Linguis, quas imitat, bubulam Linguā dixerunt, hunc etiam fuisse in rustica te usum. In urbana autē præcipuū, quod in scriptore hoc postremū est, deiecta in uinum Buglossi folia, uoluptates animi, & læticiam augere: neq; ultra hunc usum Buglossi aliud faciendum ab antiquis scriptoribus tribui. Plinius. 25. uolumine, capite. 2. sic de ea egit. Iungitur huic Buglossos boum Linguae similis: cui præcipuum, q̄ in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosinon. Mox. 16. capite. 11. Buglossō inarescente, si quis medullam e caule eximat: dicatq; ad quem liberandū febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt a febre liberari. Quod amuleri potius q̄ medicinae rationem habet. Paulus itidem Aegineta in sexto de Buglossō hac tantum mōet. Βουλωσων ορυβρις και θερμὸς ἐστὶ τῆ κρύου ἐξ ὧν τοῖς ὀνόματι βουλωσων. & ὑπερβολὴν ποιεῖν ληγεται. Quod est. Humidum calidumq; temperamento Buglossum est. Eamq; ob causam uino iniectum, læticiam animi facere dicitur. Nec ultra hæc quicquam de Buglossō tradidit. G A L E N V S etiam nihil dictis ab alijs aliud addidit, quā tussibus & faucium asperitatibus utilem esse. Nullusque non ex antiquis, læticiæ & uoluptatis spem in Buglossi usu legentibus proponit: quod in Borragine nunc passim fertur. Verisimileq; est, quali per manus traditam seu opinionem, seu famam ad nos peruenisse, & adhuc seruari. Non utimur ad hanc rem populari omnino sensu, & iudicio plebis; non tamē negligimus penitus, Quodq; nos magis urget, Cirsi historia est, in

Cqua flores *αυροπόρφυροι*, id est, in summo purpurei descibuntur: qui color proprius floris eius est quæ Buglossum nunc passim uocant. Vigent longiora folia quæ in Borragine decurtatè rotunditatis sunt. At dicit aliquis: boum Linguis similior nostræ ætatis Buglossus quæ Borrago est. Non negatius id, Verumtamen illud etiã monemus, nescire modo nos quæ fuerit antiquis Græcis comparationis huius ratio: & quid nam boum Lingua illi comparauerint: uerbi causa asperitatẽ, latitudinẽ, colorem, longitudinẽ. Pro nostræ ætatis Buglossò longitudo præcipue & color est: pro Borragine contra tam multa hæcenus numerata indicia, quæ diligentius ceteri etiã excutient. Nos enim pro deprehendenda ueritate, cogitanda alijs hæc tantum proponimus. Nec laboramus pro re (cunctis enim nota est) sed pro medicæ materiæ antiquis nominibus & historiã: quæ a posterioribus græcis toto hoc capite male habita est. Credimusque nos, ex obseruatĩs hæcenus, non esse Dioscoridis quæ a principio capitis longius legunt, usque ad, Verbasco similia habet folia. &c. Quæcunque enim a Serapione, antiqua scriptoris huius interpretatione, & aliquot græcis Buglossò huic tribuunt, nulla alia sunt, quæ Verbasco similia habere folia. Folio in terrã deciduo esse: eodemque aspero, & uigriore boum Lingua similitudine in unũ coniectum, lacticiã augere credi. Cetera nulla in antiquioribus græcorum codicibus & latinis scriptoribus sunt. Et Plinius, quæ nunc in scriptore hoc legunt, dandam esse scilicet Buglossum hanc quæ tres caules protulerit, ad tertianas: quæ uero quatuor, ad quartanas, non Buglossò, sed Cynoglossò tribuit. Verba eius sunt lib. 25. capite. s. longitur & Cynoglossos caninas imitans linguas: aiuntque, quæ tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodelle: quæ quatuor, ad quartanas. Accedit his etiã carpendi Buglossum hanc Iulio mense præceptum: quæ hic scriptor Romana uoce *ισόλυν* uocat: quod in græcis antiquis scriptoribus nunquam, aut raro inuenitur. Dico autẽ antiquos, nondum penitus obliterata græcorum re: quoniã post Cæsares Romanos, latinis mensuram appellationibus potius, quæ græcis, suadente id fortuna eius gentis & maiestate, usi omnes sunt. Quodque coniunctum huic est, non consueuisse Dioscori, temporis notas ex mensibus accipere, sed ex anni tempestatibus: uerbi causa, solstitijs, uere, autumno, hyemecque, & æstate. Scimus medicinæ hæc nihil, aut parum conferre. Sed nos herbariã tractamus: conamurque in hoc scriptore, minus corruptã saltem latinis eam reddere: quoniã integram in tanta posterioris incuria & imperitiã impossibile est. Effugerat pene nos quod ad Buglossum & Boraginẽ, earumque notas adhuc pertinet. Id huiusmodi est, Cirsij Buglossò hic similia esse folia dixit, mediocriter hirsuta, longioraque, & albescencia, in extremis aculeata: Buglossi autem *πολλὴν χαμαίπικτις, τραχύτι καὶ μελέντιον*, quod est, folium in terram deciduum, asperumque, & nigricans. Conferatur nunc cum naturæ exemplaribus utriusque historia, carptasque ex horto Buglossum & Boraginẽ diligenter contemplerur. Mihi sane prior illa Cirsij historia nostræ ætatis Buglossò respondere, posterior autem Borragini undique uidetur. Sunt enim Buglossi folia longiora quæ Borraginis. Albicant illa, hæc contra nigricant. Illa surgunt, & persestant in altum nitentia: Borraginis in terra iacent. Estque illi proprium quod hic ait *χαμαίπικτις*, id est, humi stratum folium.

D

De Cynoglossò.

C A P. CXXX.

κινόλωσσον

Cynoglosson, alij Phytan, alij Caballation, alij Splinicion, alij Scolymon, Romani Linguam canis, aut caninam appellant. Folia latifolia Plantaginis habet, arcuata, minora, lanuginosa. Caule uacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe ueteri, medentur moribus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herbæ ex uino potum.

CYNoglosson, topiarijs operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

B A R B A R I C O R O L L.

CYNoglosson, topiarijs operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

E X M. V E R G. C O M M.

CAnis Linguam herbam nouit Ethrusca omnis rustica plebs. Vitur enim ad ulcera, & minora uulnera. Ostenditque eam sine caule, & paulo minus quæ cunctis huiusmodi scriptori notis. Nascentur plerumque inter uites, uiretque tota hyeme. Nos eam sæpe uidimus folioso cespite, radice pollicis humani crassitudine, albicante colore, & supercurrente asperitate: quam credi-

mus nominis & comparationis ad caninam linguam caussam fuisse. Est enim cani qualis plerumque alijs animalibus, Scobinæ modo asperior lingua.

A

De Phyteumate.

CAP. CXXXI.

Phyteuma folia habet Radiculæ, copiosum semen, perforatum, radicem paruum, per summam terræ nitentē. Quam ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt.

PHYTEUMA

BARBARI COROLL.

Phyteuma negat se describitur Plinius, quasi superuacua, & ad amatoria tantum utilem.

De Leontopodio.

CAP. CXXXII.

Leontopodion aliqui Zöonychon uocant, alij Aetonychon, alij Cemos, alij Damnamenē, alij Idiophyton, nonnulli Phytobasilā, alij Croffion, alij Croffophthōon, Magi Sanguinē Crocodili, alij Crocomerion, Aegyptij Daphnōenen, Romani Minerciū, alij Palladiū, alij Flāmulam. Digitalis est hærbula, folia ferens angusta, longitudine ternū quaternūue digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore flocco canescūt. Capitula in summo caule, quasi dissecta, flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat. Radice parua cohæret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

LEONTOPODION

BARBARI COROLL.

Leontopodion, si amatoris tantum nascitur, diuersum uidetur a Leontopodio, de quo Plinius ita scribit, ut ab eo aluum sisti, bilem purgari prædiceret, semine lymphatica fieri somnia, campestri & gracili solo nasci, Lithoron & Coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loquutus intelligatur, cum dixit. Silebitur a nobis & Cemos: cum sit usus eius inquit ad amatoria dumtaxat. Quandoquidem Leontopodion & Cemos uocari Dioscorides hoc loco testis. Cemos autem uidetur appellata, ex floribus siue calycis figura: quoniam Pyxidecula Athenis ita nominabatur, per quam suffragia in subiectum uasculum, quod Caddiscum uocabant, demitti consueuerant: quod & Venetijs hodieque seruatur. Pollux auctor, Leontopodion hanc, & in uetustissimo Dioscoride appictam uidimus: simillimam herbæ quam uulgus ex nostra consuetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur: Leonis habere nomen uerisimile est, & illam quam ita carmini suo Columella inseruit,

Pl. li. 27. ca. 9.

lib. 26. cap. 8.

15. 11.

B

Et hiantis seu Leonis

Ora feri.

Et alibi.

Ofcitat & Leo.

Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

EX M. VERG. COM M.

Esse Leontopodio eandem Camon, de qua Plinius. 27. uolumine, cap. 8. negauit se quicquam scripturum, quoniam ad amatoria tantum usus eius esset, pro comperto nobis est. Vidimusque nos antiquissimos & optimos græcorum codices, in quibus non Leontopodion, sed Camos capitis huius titulus est. Habemus & uetustissimum longobardis literis scriptum latinum Dioscori, in quo pariter non Leontopodion, sed Camos est: isdemque omnibus hoc capite alijs, sola in grecis & latinis tituli capitis, & plantæ appellationis diuersitas est. Magno argumento, non differre Leontopodion a Camo, nisi appellatione. Pro fuit plantæ huic binominē esse. Perisset enim tota, nisi amisso altero nomine superuisset alterum quo indicaretur. Infamis amoris ueneficij ea quondam fuit. Credimusque nos, Camon dictam, quasi frænium. Est enim καμὸς græcis inter cætera reticulatum, aut ex uiminibus textum fræni genus. De quo quotidie in Psalmo auditur: In camo & fræno maxillas eorum constringe: quo quemadmodum uinciuntur iumentorum: ora, sic in amore amantiū animi retineantur: eoque nomine magis quam Leontopodij nota ab his qui pro religione, bonisque moribus amoris ueneficia hæc odissent, exagitata, appellatio nem eam in posterioribus amisit. Seruata tamē illi a diligentioribus altera est, auctusque nomi-

C num eius numerus. Sed cuncta nostra ætate parum certam habent rationem. Nec cur Mineruium, & Palladiū a Romanis dici Leontopodion in Dioscoride legat, dicere nos audemus.

¶ De Hippoglossō. CAP. CXXXIII.
Hippoglosson aliqui, & id Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam uocant. Frutex est folia habens Rusci figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas e folijs exeuntes, Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq; ammiscetur.

BARBARI COROLL.
Hypoglosson, & Hypoglossa, dicitur, acinos fert rubētes Rusci modo. Vidimus & hanc. Corollæ genus Hypoglossotidas uocari diximus in Myrto, aut ex hac herba, aut e Lauro Alexandrina, quam & Hippoglossida appellabant. Hippoglossis dicitur & morbus linguæ Hippocrati: quoties tumore obduruī, ita ut salua deuorari nequeat.

EX M. VERG. COMM.
Rusci, quæ syluestris Myrtus est, folia habere Hippoglosson omnes testantur. Ea non adeo grandia sunt, & præter id in cuspidem acuminata desinūt: eamq; ob causam, siue magnitudinem, siue equorū linguæ figurā in ea uoce intelligas, nulla in folijs ratio eius erit. Nec si etiā, ut in Plinio adhuc legitur, græcam præpositionē hippo, coniunctā linguæ, a græcis fuisse credideris, scriptori huius historiæ respondebit. *ἵπ' ἄρου* enim, id est, in summo linguas exire hic ait, *παρὰ τοῖς φύλλοις*, id est, secus & secundum folia. Quæ hic intelligit in caule suprema: qui desinens non folia profert, sed conferat lanuginis potius q̃ foliosæ comæ in latitudinē se aperiens inuolucrum: non aliter q̃ in spicatis aliquibus seminibus & floribus fit. Dissert tamē a Spica: q̃ rotundæ quatuorue plarūq; angulis Spicæ surgunt: in hac q̃d ultimū in caule exit, in latitudinē se explicat. Et quoniā humanam linguā imitatur, ideo factō a græcis nomine, Hippoglosson, quasi grandis lingua dicta est, Et hæc nobis origo noīs & causā est. Quæ licet historiæ Plinij diuersa forte aliquibus uideat̃ (ille em̃ ait. Et in ijs ceu linguas folio paruō exeunte de folijs) meminerint tamen oēs, sequi nos græcos scriptores, p̃cipueq; hunc: & in uertēdis uocibus eius quā debemus fidem illi præstare, qui *ἵπ' ἄρου παρὰ τοῖς φύλλοις* prodire linguas ex Hippoglossō dicens, q̃d est, in summo & secundū folia, nō ex folijs, sed ex summo caule, qua parte desinūt folia exire ea dixit. Id enim *ἵπ' ἄρου* aperte significat. Cæteræ appellationes ex similitudine aliqua, uerū importune illi acceuerunt: ideoq; non tractandæ a nobis.

¶ De Antirrhino. CAP. CXXXIII.
Antirrhinon, alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriam appellat, hærbam caule & folijs Anagallidi similem, flore albæ Violæ, purpureo. Ideoq; syluestris Anagallis nominata est, semine uituli narium. Tradunt peruncōs ea, cum Cyprino oleo, aut Lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gefcet.

BARBARI COROLL.
Antirrhinon, & Anarrhinon, & Antirrhizon, siue Anarrhizon. Similem Lappæ tradunt. Quidam Lino, ut arbitror corrupta lectione, pro Aparina. Radice nulla, siue minima, flore Hyacinthi, Plinio, Galenus hanc & Bucranion, hoc est, bubulum, aut uitulinum Caput dici meminit.

EX M. VERG. COMM.
Plures in græcis Anarrhinon, q̃ Antirrhinon uocant, a uitulorū naribus, quarū figura semen est, factō nomine herbarum: quæ folio paulo minus q̃ hederaceo tota figura est: flore qualis Viola purpurei coloris, ut nostræ ætatis herbarij ostendunt: qui deprehendisse nobis eam uident. Mulis faciendū, & in honore habendū Anarrhinō hoc erit: si quod hic, Pliniusq; & ante eos Theophrastus testati sunt, ad gratiā & uenustatē homini proficiat. De eo Theophrastus libro. 9. de plantarū historia his uerbis egit. *Ἰνκλυαν γάρφασιν αὐτὴ πικρὴ τὸ ἀντίρρινον καλεῖσθαι, τοῦτο δὲ θάσσειν ἐν ἀπαρίνῃ. ἴσα δὲ οὐχ' ἔστιν ὁδὸς ὥσπερ μόρον ῥίνασ' ἔχει τὸνδ' ἀπὸ τοῦτον ἀλεφούδων ἁνέσθαι.* Quorū sit sensus, Gloriā enim ferunt continue Antirrhinon facere. Aparine simile id

est. Radicem non habet. Semen uituli naribus simile: & qui eo ununtur, ad gloriā proficere. Quæ oīa hīdem fere uerbis a Plinio reddita sunt. 27. uolumine, capi. 9. Discrepant tamē Theophrastus & Dioscorides aliquatenus. Ille πρὸς ὑψηλοῦ καὶ ὑψηλοῦ facere Antirrhinon dixit. i. ad gloriā & honorem: hic ὑψηλὸν fieri eo perunctos, qđ ad gratiā tantū pertinet. Plinius uenustiores fieri dicens, Dioscoridē potius qđ Theophrastum secutus hac parte est. Comparauit Plinius etiā Anarrhini flores Hyacintho, non purpureis Leucoijs: magnitudinē eorum seruato colore indicans. Sunt enim Violis illis minores: ideoq; Hyacintho similiores.

¶ De Catanance.

CAP. CXXXV.

Catanance aliquibus Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsion, alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis hærbæ Filicula, alijs Datisca, Dacis Caropithla dicitur. Ex eo genere una folia Coronopi habet longa, radicem lunci modo prætenuē, capitula fena, septenaue, in quibus Erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem unguis milui exanimati. Altera mali parua magnitudinē explet, radice exigua, colore, figura & magnitudine Oliuæ: folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen ut cicer in ramis dependet, multis foraminibus pertusum. Vtramq; narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Catanance, Thessala est herba. Huius secunda specie ab herbarijs nostris inuenitur Bistor: tā nomine.

¶ De Tripolio.

CAP. CXXXVI.

Tripolion aliqui Psychen, alijs Merida, alijs Potamogitona, alijs Stachyten, Romani Callium marem nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq; dimittit, neq; in mari, neq; in secco. Folio Glasti latiore, arido: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradūt, flores colorem ter in die mutant. Manē candidi, meridie purpurei, sero punice conspiciuntur. Radice alba, odorata, callidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urināq; per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

B A R B A R I C O R O L L.

Tripolium, ab aliquibus eadem existimatur quæ Polium, errore manifesto, ut ex earū descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa Tripolio.

E X M. V E R G. C O M M.

A Nimaduertit multo ante nos Nicolaus Leonicens (cuius diligentia, iudiciū & ingenium nunq; satis a quoq; laudabitur) uicinitate hominis decæptū Plinium, Tripolium quod nunc tractamus, cum Polio iampridem dicto miscuisse: & quæ alterius erant, alteri tribuisse. Quod nos modo relinquimus, dictis ab eo id tantum adiungentes, non solum miscuisse ea Plinium, uerum in Theophrasti plantis Gazæ eiusdem lapsus causam & auctorem fuisse. Qui in eo Tripoliū legens, plus latino scriptori, quod miretur aliquis, qđ græco græcus homo detulit. Quodq; in Theophrasto erat Tripoliū, Polii uertit. Theophrasti, de plantarū histōria uolumine ad finē, uerba hæc sunt. καὶ ὡς δὴ φησὶ τὸ τρίπολιον καὶ ἰσχυρὸν καὶ μονοειδὲς ὡς πᾶν πράγμα μονοειδὲς χρῆσιμον ὄναι. &c. Ille autē uertit. Adde Polii, quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad oēm rem seriā, magniq; faciendā perutile prædicat. Estq; Tripoliū, non Polii in Theophrasto legendū, multa indicat: p̄sertimq; qđ p̄cedit de Periaptis, & Alexipharmacis. i. amuletis ab eo dictū. Poterat utriq; qđ dicimus multa ostendere: qđ scriptor hic, f. & quod Theophrastus testatū sunt: sed oīm euidentissime nomē. Neq; em Tripoliū uox aliud, qđ quod ter uersat, mutatq; significat. Quæ rara, & miraculū instar in eo uis est. Fuertq; hoc magis in Theophrasto & alijs opandū, qđ quod ille ait, ἀλλὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ ἀπεικνότερα, τὰ, τὴν πρὸς πῦρ καὶ ὕδωρ τῶν ἀλγίων.

D I O S C O R I D I S

C φαρμάκων μεγάλων τοῖς τιώμασι καὶ τοῖς δυνάμεσι καὶ ὡς αὐτοὶ φασὶ τὸ τριπόλιον καθ' ἑστέραν καὶ μινεῖται ἵππῳ πᾶν πρῶτον ἀποδιδόναι χρήσιμον ὕναι· διὸ καὶ ὀρύσσουσιν αὐτὸ νύκτωρ ἐκνήν. παρ' ἑβραίων. &c. Quorum sensus est. Illa autē minus credibilia, & facti hominis erunt, quæ de amuletis, & quæ ueneficijs aduersantur, tam corporibus, q̃q̃ domibus alligata & appolita. Quemadmodum auctoribus Hesiodo & Musæo, dicunt Tripolium ad omnia quæ digna studio sunt, utile esse. Eamq; ob causam, noctu erecto prope tabernaculo, effodiunt. Et hæc Theophrastus quo diximus loco. Coloris autē mutationem, cuius causam docuisse decebat, ad eas referri cauissas, ut credimus oportet; quæ ab eodem de conuersione foliorum, claudentibusq; se & dehiscentibus floribus quibusdam referuntur. Quorum omnium una in sole causa est: ab eoq; credendum, fieri in Tripolio tertiam per diem coloris mutationem. Quo enim plus, minusue humoris impetu solis ex florē exfusa fuerit, eo obscuriore, diluioresue colore fieri credendum est: mixtionibus enim, exceptis primis, cæteri colores constant.

De Adianto. C A P. CXXXVII.
Adianton, alij Polytrichon, alij Callitrichon, alij Trichomanes, alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron, Aegyptij Epier, Romani Cincinalem, alij terræ Capillum, alij Supercilium terræ, Daci Phithophrithethela uocāt. Pusilla gerit folia, similia Coriandri, serratā. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti, folijs filicis, admodū exilibus, radice superuacua. Neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum hærbæ potū prodest, spirandi difficultati, suspiriosis, lienī, & felle suffusis, & urinę difficili. Calculos frāgit. Aluum sistit. Serpentū moribus auxilio est. Contra stomachi fluctuones in uino bibitur. Secundas diēt & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentū morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Strumas discutit, furfures in facie, & manantia capitis ulcera ex lixiuiō emendat. Defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & fusino, aut hyssopo, uinoq;. Decoctum eius cum lixiuiō & uino infusum, idem præstat. Coturnices, & Gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum. In speluncis, umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Theoph. li. 7.
de plāt. ca. 13.

B A R B A R I C O R O L L.
Adianton, Capillus Veneris a Theodoro dicitur, frutex topiarius. Aestate uiuet, bruma non marcescit. Nomen ei ab euentu, q̃ folium eius persusum mersumq; aqua, simile tamen sic eo uideatur. Radice tam parua, ut possit nulla existimari. Locis opacis prouenit. Perdes in bellum armanetur, huius herbæ cibo. Callitrichon, & Polytrichon a capillo dicitur, quem tingit, crispum, densumq; faciens. Dicitur & Saxifragum: non tam quia nascitur in saxis, q̃ q̃ calculos mire frangit: sed nigrum magis: quod & breuius est: & Trichomanes priuatim appellatur: de quo statim indicabitur. Adianton candidum est, & maius nigro, & Polytrichon proprie cognominatur, & ab Hippocrate Calliphyton. Etiam si est ubi Calliphyton scribatur. Folia utriusq; Filicis inferiora, aspera, ac fusca sunt, contrario inter se posita frequentia. Umbrosas petras, specus, & manantia faxa diligit.

E X M. V E R G. C O M M.
Coronat interiores puteorū parietes, & fontū margines Adiantum: & quasi sitiens, quas tamē odit & respuit, pronus quærit aquas. Non aliter q̃ qui opes sedulus continue quærit, & inuētis miser abstinet. Miraculū in eo Plinius id iactat: quasi non multa alia passim uideantur, quæ naturali corporū dissociatione, misceri simul quacunq; etiā illata uinequeunt. Ex eo nominis illi causa est, quā duobus uersiculis in Theriacis suis Nicander tradidit. Ea est huiusmodi. ἀχραῖς ἵππ' ἀδιαντὸν ὅν' ὅκ' ὕδατος ἰσχυρὸν· ἀπὸ λαλῶν πίπνευα νοτίε πταλέσιον ἰψίσι. Quod est, Purumq; Adiantum, in quo nec descendente imbre, minimū e coelo cadens stillicidium folijs

insidet. Docuit idem Theophrastus, s. de plantarum historia. τὸ τε ἐπὶ τοῦ ἀδινάντου συμβαίνει; ἐν δὲ γὰρ ὑπάρκινται τὸ θάλλον βρεχόμενοι, ὅσα ἐπὶ δὴλον ἐστὶ, διὰ τὸ τὴν ὅτιαν μὴ ἱπμίνιν ὅθεν καὶ ἡ προ-
 ογορία. Quorum sensus est. Et quod in Adianto accidit. Neq; enim madet folium eius aqua cō-
 spersum, neq; humoris aliquod in eo uestigium remanet. Vnde & nomen illi factum est. Plini-
 us etiam. 22. uolumine, cā. 21. Aliud Adianto miraculum. Aestate uiwet, Brumia non marcescit,
 Aquas respuit persusum: mersumq; sicco simile est: tanta dissociatio deprehendit; unde & no-
 men a Græcis. Omnium græcorum, latinorumq; eadem in nominis origine ratio & sententia
 est. Vox ipsa etiam indicat. Neq; enim Adiantum aliud est, q̃ quod ἐν ἀδινάντῳ, id est, non ma-
 dedit. Testatus idem Plinius est Polytrichon, & Callitrichon Adiantum dici: sed diuersa ratio.
 ne. Polytrichon quidem, quia capilli defluuia explet. Callitrichō autem, quia eos tingit, & spe-
 ciosiores reddit; utrunq; enim effectum habet. Theophrastus nihil ultra, q̃ χρῆσιμα ἵναται ἀμφότε-
 ρα πρὸς ἱερῶν κηράδων τριχῶν ἐν ἰαλίῳ τριβόμενα. Quod est. Vtilia ambo genera eius esse ad explen-
 dum capillo caput ex oleo inuncta. Sequitur appellationes has Trichomanes, quæ secundō ge-
 nerī, de quo mox agendum erit, priuatum competit. Succedit illi etiam quæ in cunctis græcis pa-
 riter legitur, Ebenotrichon: ex qua nos credimus in latinis factum nomen, quod in cōmuni usui
 est Capillus Veneris. Id in antiquioribus inuentum hætenus a menō est. Dico autem antiqui-
 ores, Theophrastum, huncipsum, Plinium, & his æquales alios. Ideoq; oborta suspicio est, ex
 corrupta uoce illa Ebenotrichon, Veneris Capillum factam fuisse. Be enim syllabam, græci, ue-
 pronunciant. Faciliſq; potuit lapsus esse ab audito Euenotricho, in Veneris trichas, id est, ca-
 pillum. Suspicionem tamen hanc, non decretum uolumus esse. Alioquin ex Ebēno, quæ ni-
 gro colore est, factum id nomen fuit: & ad Adianti Trichomanisq; nigros coliculos translatū.
 Neq; enim aliud Ebenotrichon q̃ Ebēni capillum, id est, nigrum, & quali colore Ebenus est, si-
 gnificat. Cæteræ Adianti appellationes quæ in Diosco. leguntur, satis certam habent causam &
 originem: ideoq; a nobis relinquuntur. Sed non relinquenda quæ Theophrastus eodem libro
 retulit. γινώσκῃς αὐτοῦ διό, τὸ δὲ ἴδιον λευκόν, τὸ δὲ μέλαν. χρῆσιμα δὲ ἀμφότερα πρὸς ἱερῶν κηράδων τριχῶν ἐν
 ἰαλίῳ τριβόμενα. φησὶν δὲ μάλιστα πρὸς τὰ ὑπεράνω, ὡς δὲ οἰονταὶ τινος, καὶ πρὸς τραχηλῶν τὸ τριχόμανος
 ποιεῖν, ἔχον δὲ τὸν κανὼν ὅμοιον τῷ ἀδινάντῳ, τῷ μέλανι, φύλλα δὲ μικρὰ, φύλλα καὶ πύκνα καὶ πυκνό-
 τα κατ' ἀντικρὺ ἀλλήλων. ἵψα δὲ θυγ' ἵπται, χωρία δὲ φιλιό σκινά. Quorum summa hæc est. Genera
 autem eius duō. Alterum quidem candidum, alterum nigrum. Vtrunq; tamē explendis in ca-
 pite capillis utilis: in quem usum ex oleo conficitur. Nascuntur aquosis locis, & ut opinantur
 multi, facit ad uesticæ fillicidia quod Trichomanes uocatur: habetq; caulem nigro Adianto si-
 milem; folia parua, densaſq; contrarijs inter se pediculis pendenda. Radix illi nulla est: amatq;
 umbrosa loca. Ethæc pro Adianto & Trichomane Theophrastus: quæ a Plinio hīdem fere uer-
 bis reddita sunt quo diximus loco, longe diuersa ab his quæ Diosco. tradit: qui Adiantum Co-
 rian dri folio describit: neq; in eo candidum aliquod genus numerat, sed nigris coliculis & hoc
 & Trichomanes describit. Sed nec Theophrastus etiam in qua parte candidum id genus sit, re-
 tulit. Verum tamen ut obseruasse licuit, & ex his quæ Theophrastus indicat, totius generis no-
 men Adiantum est. Idq; statim diuiditur in candidum, & nigrum. Vocaueruntq; candidum,
 quod comparatum alteri albicantibus folijs sit. Quod enim ad coliculos pertinet, totum ge-
 nus nigras habet: in candido tamen augentibus se coliculis continue minus nigrescunt, deſi-
 nuntq; in summo colore uiridi. Sed certus discrimen in folijs est, quæ in nigro minora, pennia-
 ta, & filicis modo disposita sunt: in candido qualia in Coriandro, incertis interuallis prodeunt
 tia, et in extremitatibus incisuris diuisa. Longius itidem candidum nigro est. Hancq; rationem
 secutus Plinius ait. Duo genera eius, candidius, & nigrum breuiusq;. Id quod breuius est, Po-
 lytrichon, aliqui Trichomanes uocant. Quæ tota est huius scriptoris historia: qui primo candi-
 dum hoc Adianti appellatione, mox nigrum Trichomanis indicat. Non est difficile utruſq; in-
 uenisse. Sed quoniam frequētius illud nascitur, habetq; easdem huius uires, ideo notius & in
 frequentiore usu: idq; tantum Veneris capillum nunc uocant. Facillime in Diosco. omnia in
 telliget, qui oculus testis, fide sensus ad ea utetur. Neq; enim dubitare poterit, qualia in Adi-
 anto Coriandri folia dicantur: & quomō ἐπ' ἀκρον ἵχνηται, quæ alij interpretes serrata & cacu-
 minibus diuisa dixerunt. Cum tamen impares foliorum incisuræ sint, & aliter scē q̃ in serr-
 dentes: neq; in cacuminibus tantum, sed undiq; per extremitates diuidantur. Credimusq; nos,
 qd in Adianti folijs legit, Filicis similia abundare, & ex altero genere ad historia huius translatū
 esse: ideoq; uij nota eo loco adiecta est. Nihil enim Filicis folio Adiantum hoc simile habet: ne-
 q; si tota folia, aut earum segmenta inuicem compares. Fuerat ob eam causam animus, duas
 resue illas uoces tanq; inutiles relinquere: sed in cunctis græcis latinisq; inuentas seruauimus.

C presertim dicte Plinio, Vtriq; ramuli nigro colore nitet folijs Filicis. Verumtā, ut pauloante præmonstrauimus, non possunt simul Coriandro & Filici eiusdem plantę folia cōparari. Suspi-
catiꝫ sumus, & adhuc suspicamur, nō esse integrā primā huius capitis parrem: perijseꝫ uoces
aliquas, quę certiorē totius Adianti historiā facerent: & quę nunc tam incerta leguntur, reli-
quias illius esse: quę truncę intellectum miscent, coguntq; legentes incertis animis inter Adia-
tum & Trichomanes esse. Sed qualē nos diximus pauloante, ut credimus, utriusq; historia est.
Adianti appellatione in toto hoc gñe antiqua medicina usa semper est: & q; generis ea uox est,
& q; omnis Adianti eꝑdem uires ad omnia sunt. Paulusq; Aegineta cum de Adianto egisset, de
Trichomane nihil tradidit, præfatus, in Adianto dictum de eo fuisse.

τριχομανία
ἀδίατρον

T De Fidicula seu Trichomane. C A P. CXXXVIII.
Trichomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capilla-
rem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eam Adianton
appellant. Nascitur eisdem in locis quibus Adianton, Filici simile, sed
exilius, folijs Lenticulę, tenuibus, in ordinem utrinq; digestis, aduersis
in se, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quę & Adi-
anton præstare posse, constat.

T RICHOMANES Adianti genus alterum, Calytrichi cognomine, breuius & nigrius, tenuissi-
mis iuncis, radice minima, gustatu seruens. Primum uero genus Adiantum Polytrichon uo-
carum iuncos albos habet, & folia plura, maioraq; frutice quoq; maior est, ut prædiximus.

B A R B A R I C O R O L L.

S Vspicari ex Trichomanis historia facile diligentioribus erit, quod pauloante dicebamus,
credere nos in Adianto uitium esse, relictasq; a librarijs uoces, membrumue aliquod, quo ille
Theophrasti exemplo rotum Adiantum diuideret, Trichomanesq; hoc non illud Filici similia
habere folia diceret. Huius enim, non illius Iudice sensu similitudo ea est: ideoq; Pterion, quasi
Filiculam a quibusdam dici Diosc. ait. Pterin enim gręci Filicem uocant: cui folia similia, par-
terq; in ramulis nascentia hoc genus habet. Eupteron alij itidem dixerunt: quoniam pennatū
folium eius sit, nec aliter q; in alis auium pennę folia deinceps in eo sint. Eas omnes uoces imi-
tati Romani, Capillarem, quę Trichomani responderet: Pinulam, quę Euptero: Filiculam, quę
Pterio responderet dixerunt. Gręci hoc genus a ui sua Trichomanes uocauerūt, q; rara cute
fluentem capillum explet, & subnasci facit. μανὼν enim ea gens rarum uocat.

ἐάνθιον
φασγάνιον

X De Xanthio, & Lappa. C A P. CXXXIX.
Anthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chascanon,
alij Choeradolethron, alij & hanc Aparinam nominant. Latini Lappā. Nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cu-
bitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. Folia Atriplicis
habet infecta, Nasturtium odore imitantia, fructum grandis Oliuę
modo rotundum, & ut Platani pilula spinosum, qui contactu uestibus
adhærescit. Is ante collectus q; perfecte siccescat, tunditur, & sicili uasē
reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua
madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in uino tūn-
dunt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

B A R B A R I C O R O L L.

X Anthion, & Phasganion uocatur a Galeno & Paulo, Phasganon a Dioscoride, Philan-
thropos ab Aetio, nunc Lappa inuersa, & minor a nostris. Non uidetur quibusdam Xanthi-
on ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscorides & Galenus & ceteri
diuersas habuere duobus locis seorsum de ijs prodentes? Quid q; in omnibus gręcis exem-
plaribus, Aparina ex interuallo stellata pingitur quasi Rubia: Xanthium multo aliter ostendi-
tur folio Atriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam Solani.

EX M. VERG. COMM.

Plura Lapparum genera, folio, semine & natali solo diuersa : obseruatumq; a nobis est, quę cumq; hamatis uncis, aculeatisq; & uestium tenacibus seminibus plantę sunt, in gręcis & latinis eodem aliquando nomine indicari: in illis Aparinēs, in nostris Lappę. Quę ueluti generis uox omnibus his est. Inter eas & Xanthion hæc est, numeratis ab hoc scriptore notis satis cognoscenda: sic dicta a gręcis *ὑπὸ ξανθῷ τρίχας πανί*, id est, flauum capillum facit. Habet & alias appellatiōes, sed nobis parum certas, & ob id alijs relictas. Circa rusticas dōmos, pingui ut hic ait, sed frequentius humido solo nascitur. Idq; est quod hic ait, arefcētibus paludibus. Paludes enim appellat loca etiam, in quibus per hyemem aqua fuerit, æstate uero aruerint. Omnium autem notarum quę Xanthio huic a Diosco. tribuuntur, nulla certior fructu eius est. Dico autem fructum Lappam, in qua semen est: quem figura grandis Oliuę, & aculeatū hic describens, facillimam eius deprehensionem fecit. Sed nihil frequentius præmonstratis nascitur locis.

De Avena. CAP. CXL.

Aegilops aliquibus Sitospelos, alijs Siphon, alijs Bromos, Romanis Avena dicitur. Hærbula folia Tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina, ternaue, rubra, quibus aristę quasi capillacę exeunt. Illita cum farina hærbæ ægilopijs medetur. Durici as discuit. Succus farinę ammixtus, siccatur, & eorundem gratia reponitur.

BARBARI COROLL.

Aegilops necathordeum: in quo maxime nasci amat. Festucago a Gaza dicitur. Plinius Auenam gręcam uocauit. Hęc non nisi post annum, ex semine suo gignitur. Vere pilosum ei folium ut Lolio, non tamen ut illi pingue. Immitis aspectu, solum emaciæ. Radice, culmoq; multiplici, melius in culto erumpit. Remediū, ut arua biennium quiescant; tum plane luxuriantē eam admissum pecus obterat & consumat.

The. li. 8. ca. 10
Pli. li. 21. ca. 27

EX M. VERG. COMM.

Equi uoca in gręcis ad Auenam cunctis notam & ubiq; nascentem frugem, & eam quam modo tractamus herbam Aegylopiis appellatio, latinis aliquot, ut uidetur, præsertimq; Plinio & posterioribus gręcis, miscendi causa fuit, quę alioquin separanda, & in diuerso genere constitutenda fuerant. Idq; non leui periculo usus, & turpiterum incertitudine factum est. Qui enim poterit pro Avena fruge modo cognosci, quę hoc capite a Diosco. describitur Aegylops, duribus, tribusue seminibus in summo rubentibus, & inter ea exeuntibus aristarum modo capillis, quę secundo uolumine ab hoc ipso scriptore Bromos dicta descripraq; est: pendentibus in summo paruulis ueluti locustis, duplici cruore diuicatis, in quibus semen: quę tota Auenę frugis pictura, & presens imago est: Qui etiam poterit idem utriusq; usus esse: cum huius ad oculorum fistulas, quas Aegylopias dicunt, præcipuus usus tradatur: illius ad pultes; quę tussientibus inserviant: Qui etiam poterit non imperitus medicæ materię haberi Paulus Aeginetæ, antiquus & medicinę grauis auctor, seorsum de utraq; agens: Bromonq; similem Hordeo uiribus tradens, Aegylopię uero discutiendi uisum habere: Pluraq; alia, quę longius repetenda modo non sunt. Satis enim est, ut diuersę sint, & constituentur plantę Aegylops, & Bromos historia, & auctoritate eius scriptoris intellexisse. Quemadmodum in hoc ipso uidere facillimum est: qui inter fruges Auenam describens, Bromon eam uocauit: inter herbās autem Aegylopa hoc loco numerans, diuersam ab Avena herbam, nō frugem descripsit. Qualis autem Avena inter fruges sit, facile est secundo uolumine uolentibus cognoscere: qualis autem Aegylops, hoc loco cognoscenda erit: in cuius descriptione nihil est quod ad Auenam frugem pertineat. At Theophrasto Aegylops multis locis nulla alia q̃ Avena est: & quę ab eo illi traduntur, frugi, nō herbę competere uidentur. Nolumus nunc nos in ambigua re tanq; de cōperta agere. Quę enim de Aegylope ab eo octauo de historia & quinto de causis plantarum dicuntur, huiusmodi sunt. *ἂλλ' ἴδιον τοῦτο τοῦ βελβοῦ λίγεται, τὸ μὲν ἀπὸ πάντων βλαστάνει ἅμα τῶν σαρμάτων, ἀλλὰ τοῦ μῦθ' αὐτοῖσι. τοῦ δὲ ἵν' ὁ ὕψους καθάπερ τὸν ἀγρίωπον φασὶ καὶ τὸν λωτόν.* Quorum sensus est, Sed proprium hoc Bulbi est, non nasci simul ex totis seminibus, sed alteram eius partem eodem, alteram sequenti anno: qualem Aegylopiem dicunt, & Lotum. Quod Plinius. 21. uolumine, capite. 17. reddidit, Mirum, Loron herbam & Aegylopa non nisi post annum e semine suo nasci: qd

C aliqui, rusticaq; præsertim plebs Auenæ frugis proprium credunt esse. Idem Theophrastus quo de plantarum causis, cum ageret de pestibus & insurijs frugum, ait, *ἡ δὲ ἀνὴρ ἐν τῇ συγγενείᾳ καὶ ἐκαστὸν αὐτῶν ἴδιον ἵκει καὶ ἀνὰ τὴν φύσιν ἐν πρῶτῳ καὶ κριθεῖο*. Quod est. Et quæcunq; singulis feminibus connascuntur, ueluti Lolium & Aegylops in triticea & hordeacea fegete. Qui locus a Plinio etiam libro decimo octauo, capite decimosextimo his uerbis redditus est. Triticum simili modo æra, & hordeum festuca, quæ uocatur Aegylops. Quam feliciter autem ab eo uersum id fuerit, poterunt uolentes collatis Theophrasti græcis uocibus cum latinis eius uidere. Nos illud mōnēnus, festucam, non frugem Aegylopa a Plinio nunc Auenam dici: quæ nihilominus paulo ante Auenā ab eodem dicta fuerat. Videturq; uagus in græcorum Aegypto, nunc frugem, nunc herbam describere. Suspicitur merito aliquis etiam Aegylopa frugem Auenam esse, Galenum primo de alimentis dicentem audiens: in triticea & hordeacea fruge cum impedimento aliquo infelicitè egerit, in Lolium alterum, alterum in Aegyloperum sæpe mutari: quod passim in rustica & agrorum disciplina iactatur. His, multisq; alijs ueterū scriptorum decretis & autoritatibus facile receptum est, Aegylopa inter fruges Auenam indicare. Nec nos in re, quæ iam pridem tantopere inoleuit, contra niti decreuimus: & si non desint quibus probare id liceret. Sed quod pro Dioscoridis Auenā & Aegypto dicimus, huiuscemodi est, Auenā frugem Bromon illi esse: traditumq; de ea iam pridem secundo nolumine fuisse. Aegyloperum uero herbam omnibus facile cognoscendam esse, si in naturæ contemplatione diligentiores fuerimus: & quas hic illi tribuit feminis in summo coliculo, numeri & coloris notas obseruauerimus. Cubitali fere altitudine coliculus ex folijs, quæ in summa radice sunt, exit Aegylops: primumq; florem in candido rubentem profert: mox cum defloruit, capillamenta potius q̃ aristas molles, prociidū asq; mittit inter grana seminis prodeuntes, duo triaue ut hic ait, sed frequentius tria cum maturiscent rubetia: maiorum locustarum corneis oculis similia semina illa sunt: nec minus nitent: quoq; in punicis grana contactu hērent, eodem & in capitulo Aegylopis semina illa. Nascitur macro terræni genere, frequentissima in uineis. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea q; fegete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenā indicatæ fuerint. Inuenitur tamen & in triticea hordeacea q; fegete: quæ causa etiam fuit, ut eodem nomine & hæc, & Auenā indicatæ fuerint. Plinius post ea quæ alijs locis dixerat, & ex Theophrasto uerterat uicesimo quinto uolumine, capite, u. ex hoc scriptore totam his uerbis descripsit. Et Aegylopas sanar eodē nomine herba, quæ in hordeo nascitur tritici folio, semine contrito cum farina permixta, impositaq; uel succo. Exprimitur hic e caulibus folijsq; p̃gnantibus, dempta spica, & in trimestri farina digeritur in passillos. Et hæc de Aegypto obseruata a nobis in græcis & latinis sunt. Relinquimus autem cogitandum legendibus, an satis ad constituendam inter fruges Aegyloperum Auenamq; existimandam Theophrasti de ea historia sit. Quod enim ad Plinium pertinet, manifeste deprehēditur, frugem in Theophrasto Aegyloperum existimasse: in Diosc. autē herbā paulo ante a nobis descriptam. Non esse autē Diosc. Aegylopa Auenā, historia eius aptissime indicat. Quæ em̃ in summo eius duo triaue grana rubetia, & inter grana illa exeuntes ueluti aristas habet, neq; sunt in Auenā, neq; esse possunt. At in Diosc. legit̃, Bromō dici, & a Romanis Auenā. Impitōr: additamēta illa sunt, ab his hūic scriptori adiecta, q̃ alterā illā Aegylopis significatio nē cum hac miscuerint, & ubiq; eandem esse crediderint: p̃pterea, q̃ hic ait Tritici folio esse Aegyloperum, & Theophrastus ea tradiderit quæ paulo ante longius dicta a nobis fuerunt.

D

ῥῆμα

De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLII.

Bromos hæra quā aliqui Siphonion, alijs Acrospelon uocat, Auenæ similis est, exiccatoriā uim habens. Decoquit̃ cū sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijciē, rursus incoquit̃, dū liq̃di mellis crassitudo fiat. Linteū eo humore imbutū, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliq̃ tritam Alōen addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosas cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

BARBARI COROLL.

Bromos & hæc Auenā est, syluestri fere habitu ut Aegylops. Nascitur inter uitia segetis, spicam ferens. Radice copiosa & multiplici, culmo sparsa. De hac & inter fruges, leguminaq; secundo libro diximus.

EX. M. VERG. COMM.

Sdescripta hoc capite Bromos herba in frugū genere Auena est, ut in Diosc. legitur bis, nec suo loco actum ab eo de ea fuerit: quod in scriptore hoc absurdum, & historia medicinarū eius indignum, si in herbarum genere equiuoca frugi est, non dissimulabo; ignorare me eam palam fateri. Barbarus in Corollario suo syluestris fere habitus hanc esse dixit, multoq; ante inter fruges secundo uolumine dixerat: illic de grano & semine, hic autem de herba tradit: discrimenq; obseruasse in prima eius nominis syllaba ait: quoniam nūc per, nunc per, scriberetur. Nos in ignorare, fidem penes autorem uolumus esse. Non tamen tacebimus, non legi hoc caput in antiquioribus & melioribus græcis. Nec qui nobis est uetustissimus latinus Diosc. hoc habet. Obseruauimusq; nos, eiusdem fidei, concordēs in cunctis & hunc & illos esse magnō argumento, nulla quondam in Diosc. fuisse quæ hoc capite leguntur. Nō uerebimur & illud addere, si diligentius capitū huius phrasis expendatur, ab ingenio & usu uocum Diosc. longissime abesse uidebitur. Quinetiam Paulus Aegineta omnem ex hoc scriptore medicam materiā percurrens, unam tantum Bromon, & eam frugē numerauit. Ob quæ inclinatumus nobis, ut credamus adulterinū esse hoc caput, & a posteriore aliquo huic scriptori additū. Scio forte, ut audactor multis in censura hac uidear: & contra aliorum omnium placita, & codicum fidem petulantius de his censere: sed nihil timere nos persuadet studiū huius nostri fides, & conscientia: quæ sine aliorum criminatione, & rerum iactura, suspicionibus saltem (quoniam forte alia ratione non potest) prodesse conatur.

De Glauce. CAP. CXLII.

Glaux Cytiso & Lenticulæ folijs similis, quæ superne uirent, auresq; candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini se nīue, tenues, ab radice dodrantem alti. Flores ceu Violæ albæ purpurei exeunt. Nasctur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, salē & oleo in forbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

BARBARI COROLL.

Glaux olim Eugalacton ex facto uocabatur. Rami serpunt in terram. Est a quibus non Glaux, sed Glax, & Galax. ut a lacte nominata pronuncientur. Hac descriptione inuenitur herba in nostris litoribus, ad Medocacum omnino similis: nisi quod florem habet aureum, nō purpureum.

EX. M. VERG. COMM.

Eugalacton, a copia lactis quam facit, uocasse ueteres græcos Glaucem hanc testatus Plinius est, isdem, aut parum diuersis notis eam. 37. uolumine, capite, 9. describens. Nec alia figurā nostræ ætatis herbarij eam ostendunt. Relictum in historia eius id tantum ab hoc scriptore est, qd folia in ramulis deinceps disposita sunt bina; contrarijs pediculis, & exiguīs interuallis penatata. Legebat in hoc capite corrupte *κλῶνις διὰ πρὸ γῆς*. &c. Quod est, ut ceteri interpretes uerterunt, Ramuli a terra. Id nos ueterum græcorum fide adiuti, & rei necessitate admoniti, *ἐπὶ γῆς*, quod est, per terram, mutauimus. Fecimusq; id primum autore Plinio, qd ait. Rami in terram serpunt: sed multo magis, qd in concinnum erat, bis idem dixisse: primum a terra, mox a radice ramos exire. Satis enim alterum est: nec differt dixisse a terra, & a radice aliquid surgere.

De Polygala. CAP. CXLIII.

Polygala palmi altitudinem petit. Folijs Lenticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

EX. M. VERG. COMM.

Polygalon, & Polygala dicitur. In caule summo folia, ut diximus, Lenticulæ, gustu adstricto.

EX. M. VERG. COMM.

Quam habet solam potestatem Polygalon herba, ipsum statim indicat nomen, in quo sola est multi lactis significatio. Breuissime & hanc Plinius eodem libro, sed capite duo decimo descripsit. Breuis herba ea est, singulari caule: in q bina folia deinceps figura Lentis, uerum maiora, paruis interuallis prodeunt. In summo uelut spicatum foliosum cacumen est.

C

¶ De Osyri.

C A P. CXLIII.

osyrie

OSyris frutex est niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina senaue, ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescunt. Decoctum eius potum iuuat arquatos.

B A R B A R I C O R O L L.

OSyris, & Osyrias, ramulos habet nigros, & folia item nigra Plinio. Semen quoq; primo nigrum, post rubescens, cognita mulieribus Smegmate, quod a Galeno, & Paulo, & Actio Corema, siue a pupulis, Corema dici putant.

E X M. V E R G. C O M M.

Laxandi iecur in medicina vires habere Osyrim, ueteres graecorum medici testati soliti sunt: in reliquo uitae usu mulieribus cognitam herbam dixerunt, quae ad extendam leuigandamq; cutem ea utebatur. Nominis causam & originem nos ignoramus. Nescimus unde ex Aegypto, in qua gente priuatim Osyris, non contemnendum tunc numen, colebatur, ad herbam transferit. Ostendunt hanc etiam herbarij, modo uera Osyris ea sit: intelligiturq; facile quae hic ait, folia a principio nigra, mutato deinde colore rubere maturitate, & quasi ficitate eum contrahere colorem: quoniam superiora continue nigro colore uirent, inferiora autem quasi huiusmodi destituta rubente colore illo uidentur.

¶ De aspera Smilace.

C A P. CXLV

smilax

Smilax aspera ab alijs Epatitis, alijs Lycantheum, alijs Cynosbaton, alijs Aniceton, alijs Heliophyton, alijs Anatolicon, alijs Dycticon, alijs Helide, Aegyptijs Lyiste, Romanis Mergina, Ethruscis Raddia appellatur. Folia habet Periclymeni, farmenra tenuia, multa, Rubi modo, aut Paliuri aculeata. Arborea scandit, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent Nasceitur in palustribus et asperis, radice dura crassaq;. Folia, et acini & ante & post epoti, uenenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem aeditis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura.

B A R B A R I C O R O L L.

Smilax trachea, hoc est, aspera, Milax a Galeno dicitur, ut a Smilace p Taxo differat. Ergo Smilax Hederis genus est, Cilicia cognomine. importata enim ex ea terra est in Graeciam, folio in acumine pinnato quidem, sed & in angulum depressio, nec tamen anguloso, hederaceo, paruo, & ubi pediculo adalligata fere madido, medullam calli spinarum modo tenuem habente: staminaque non porrecta ex eo, ut in ceteris folijs, sed circa eum coacta in orbem, ab annexu pediculi, ex quo & iulus quidam gracilis, & conuolutus pampini modo emittit, flore candido, Liliis olente, fructu Solani, aut Melothri, aut etiam nati Labruscae, racemis ut Hederis pendentibus, aut Vuae potius. quoniam ab eodem limite pediculi acinorum exeant: acinis colos ruber, complexis nudos binos, maioribus ternos, minimis singulos. Nati sunt nuclei, atque duri. Peculiare habent racemi, quod latera caulium sepiunt, quod unus omnium gradissimum propendet fumo caule: ut in Rhamno, atque Rubo. Flore huius coronarij utunt, quamque syluestri, ut & spinarum acutae. Haecenus Theophrasti de Smilace sententia. Plinius, Folia inquit Smilacis & Hederis in coronamentum se dedere. Smilacem haec, & Aethiophoron, & asperam cognominari uideo penes eum. Coronam ex ea factam impari foliorum numero capitis doloribus mederi. Quidam inquit duo genera Smilacis dixere. Alterum immortalitati proximum, in conuallibus opacis scandentem arborea, comantibus acinorum corymbis, contra uenenata omnia efficacissimum. Huius lignum ad aures letum sonum reddere. Alterum genus culta amare, & in his gignit, nullius effectus, ut mox dicitur. Infausta Smilax omnibus sacris, & coronis, quoniam sit lugubris; uirgine eius nominis, propter amoris iuuenis Croci, mutata in hunc fruticem. Id uulgus ignoras, plerumque festa sua polluit, Hederam existimando, sicut in poetis, aut Libero patre, aut Sileno, quod oino nescitibus coronat. E Smilace Codicilli quoque fiunt. Plurima haec in ipsis Tepe uiret, saxa opacis conspicuo nitore, oculos tenens, ut Helianus inquit. Quaeque de Smilace quae Dolichos sit, uidentur potius

Theo. lib. 7.
de planta. hi.
cap. 16.

est Helianus dixisse. Est autē Dolichos, quam Plinius Siliquam sylvestrem vocauit, id quod tribus Auctoris eius locis inter se collatis, animo. Vnus est libro eius, 18. Siliqua inquit omnis dira adharendo. Alius, 17. & circa inquit, Tempe Thessalica, quæ Polypodium uocatur, & quæ Dolichos, Tertius libro, 31. Circa Thessalica inquit Tempe mirū Siliqua sylvestris amplecti radicibus fontem cum dicitur, semper florens purpura. Virūuius tamen hanc, quæ circa Thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit. In Thessalia inquit fons est profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec beluæ genus ullum propius accedit; ad quem fontem proxime est arbor, florens purpureo colore.

EX M. VERG. COMM.

TRACTATA in Croco fabulosa Smilacis historia a nobis est. Fueruntque tunc ex antiquis aliqui scriptoribus repetita, quæ in Plinij & Nasonis lectione nouisse pro Smilace hac oēs oporteret. Eo labore nunc, & ut poëta ait, fasce leuati, nec habentes quod illi aliud adjiciamus, omnia enim ex Theophrasto, & Plinio Barbarus in Corollario suo coaceruauit, breuiiores in cōmentatione eius erimus. Præsertim nascente ubique inter stirpes, & in sepius Smilace, cunctisque ob eam causam noto sarmentoso frutice, Cuius flos candidus est, & egregie odoratus. Quæ duæ eius notæ in Dioscoride non leguntur, in deprehendenda stirpe non minus tot alijs ab eo numeratis necessariae: quæ aut forte in hoc scriptore perierunt, aut in uulgari stirpe neglectæ ab eo fuerunt. Nihil pro cognoscenda Smilace certius Theophrasti historia est, quam multis toto opere locis, sed longissime ad finem tertij de planta, histo, uoluminis tractauit.

De læui Smilace.

CAP. CXLVI.

Læuis Smilacis folia Hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuoluitur arboribus ut prior. Fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace quadam topiariorum arte tentoria contra æstus molestiam faciuntur. Folia per autumnū decidua. Semine cum Doricnio potō, ternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

BARBARI COROLL.

Smilax, siue Milaxia, hoc est, leuis. Diuersa est ab ea, ut præmonui, quæ Smilax Cepeæ, hoc est, hortensiana dicitur: de qua & alio loco demonstratum est. Equem Plinius amare culta, & in ijs gigni scribit: sed nullius effectus esse. Galenus similes eam uires habere prædicat, quas aspera.

EX M. VERG. COMM.

QUATUOR in scriptore hoc, & in reliquis græcis Smilacis genera numerantur. Verum duo hæc primo, per se, & uere Smilaces dicunt. Quæ enim secundo uolumine a Dioscoride tradita & hortensis dicta ab eo & ab alijs est, ex eadem ui uestiendi sepes murosque, & ut hic ait, scænas faciendi in censum & nomē harū uenit. Licetque hederaceo folio illa etiā describatur, fructu tamē & semine penitus diuerso est. Hæc enim Lupinis, illa Pænogreco comparat. Præterea in censu medicæ materiæ, quæ a Paulo Aegineta sexto sui operis uolumine tractat, quatuor eodē nomine Smilaces numerantur. Aspera hæc, & sine aculeis altera: quas Galeni exemplo Milaces, non Smilaces & ipse uocat: quemadmodū in Croco nos etiā diximus. Tertiam hortensem illā, cuius fructus lobia, id est, filiquas uocari, & hic, & ille ait. Quartā postremo Taxū arborem: quā aliqui per y, discriminis causā scribi uoluerūt. De qua dictū a nobis hoc ipso uolumine fuit: totaque Smilacti omnium in antiquis græcis historia hæc est. Nec contra codicū omnium fidem, ueterūque medicorū auctoritatē nouare aliquid nos audemus. Non tamē credimus, legentibus fore inutile, monere eos, dubitalle nos, & adhuc animo pendere: hortensem illā, lenemque & sine aculeis eandē hanc esse, & pro una duas in hoc scriptore legi. Vt uimque ad hanc dubitationē his coniecturis. Vt quæ hederaceo folio describit. Illa graciles caules & clauiculas, quibus propinquis fruticibus se implicet: hæc uiticulas eiusdē rei significationē habere dicit. Illa multo incremento auget, eo usque, ut scænas & tabernacula faciat: idē hæc facere tradit. Illa semen habet *δυσνύπιον*, id est, insomniofum: hæc *νύπια πολλά καὶ τὰ ταχέως*, id est, multa & tumultuosa insomnia facere dicit. His nos coniecturis & obseruationibus moniti, dubitauimus eandē esse, & pro una duas numerari. Sed tūc apud nos merito est ueterū medicorū auctoritas.

C ut eos sequi potius quā solus importune sapere uoluerim: præsertim uocante Plinio aliquot locis hortensem illā græcorum exēplo Siliquā. Dico autē græcorū exemplo, quoniā illi discernentes eam ab alijs, Smilacē quidem proponūt: sed statim addūt, cuius fructus Siliqua uocat. Verisimileq; est, hortensem illā in Smilacū nomen, ut diximus, sola similitudine transisse. Et hæc pro Smilace omni satis dicta hæcenus sint: meminerintq; legentes, quā nos modo tractamus, frequentiorē esse, & in usu coronarū quondam ob floris speciem & odorem fuisse.

C A P. C X V I I.

De Rusco.

myrsin

S Y L V E S T R I S Myrtus aliquibus, Græcis Myrtacanta, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyrfine, alijs Myacantha, alijs Agonon, alijs Scincos, alijs Mintha, alijs Carangelos, alijs Anangelos, alijs Acaron, alijs Ocneron, alijs Cnicem, alijs Lychene alijs Chamapitys, alijs Chamæmyrte, Beotis Gyrenia, Magis Herculis genitura, Latinis Ruscum appellatur. Foliū fert Myrti, latius, in formā lanceę mucronatū. Bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, offeo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, uutiliū modo lenti, fractu contumaces, foliosi. Radice Graminis simili, acerbæ, & subamaræ. Folia & bacce in uino potæ, urinā cient. Menses pellūt. Vesicæ calculos frangūt. Stillicidio urinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regiū morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radices in uino potū, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorū uice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

D

Pli. li. 23. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
M Y R T U S syluestris, differt a satua, bacis rubentibus, breuitateq; ideo & Chamæmyrsine uocatur. Eadem & Oxymyrfine, atq; Ruscus, siue Brusculus uulgo: sed corrupte. Inter herbas sponte nascentes, idoneas cibo numerat, & ex qua fiunt ruri scopæ. Ruscum inquit Verrius apud Festū, amplius paulo herba est, exilius uirgulto, fructibus non dissimile lunco. Huius colore mulieres uti solitas, Cato meminit. Hanc & Acoron idē Plinius, sed Dioscorides Acaron uocari scribit. Scio fructū huius Cubebas Maurice uocatas credi: quod q̄ uerum sit, diligenter animaduerti cupio, præsertim ab ijs dissentiens qui hoc affirmant. Galenus certe id quod Cubebas medici appellant, ipse Carpesiū uocauit, duorū generum, Ponticum, & Laertium, a montibus Pamphylia: ubi frequens est ita dictū. Inueniri hoc & in Sida copiosum tradit: oppidū id est Pamphylia. Naturam, & effectum ei reddit, quales ipsi Phur: gustum quoq; simile, tenuioris etiānum, hoc est, subtilioris substantia: propterea & plus uirium in eo esse purgandis, & extirpandis intestinis, quæ sint occlusa: non tamē par uirtute penetrandi Cassia, nedum Cinnamonomom, etiāmsi Quinto inquit ita uidebatur. Urinam cit, & renes calculis laborantes liberat: quo argumento Mauri syluestris Myrti baccas Carpesium, & Cubebas esse putauerunt: præcipue, cum nec Dioscorides Carpesium, nec Galenus Myrtum syluestrem usquā nominent. Est autē odoratum semen Carpesiū, hoc est, Cubeba. Fortē syluestris Myrti bacce, dum rectes sunt: offea in ijs duricia. In Carpesio nihil tale. Superuacū existimo, in re confessa quidem, sed a nobis primū comperta, longiorē moram ducere. Illud in transcurso dixerim. Carpesium si ore contineatur, claram uocem facere pronunciantibus: ob id Bernardus Iustinianus, homo in primis doctus, & eloquens, nunq̄ sine hoc semine concionabatur. Sed & illam dotem prædicant: maiore in coitu uoluptatē sentiri ab ijs, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea uisione mens cōmota, nisi doceamur, quemadmodū nos Venus adminiculatior, & uiolentior transuersos auferat. Paulus, & Carpesiam uocauit quādoq; . Nam Opocarpasium, hoc est, lac e Carpaso, siue Carpatho, ut Dioscorides appellat, siue Carpasia, interim, & Carpesia, ut Paulus, ex eodem sit genere, an diuersum non constat. Illud certum est, inter delibutoria uenena poni eum succum, libro huius operis supremo. Est & Carpasium lini genus: quod ut Paulianus ait, solum ex omnibus igni non corripitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Ruscum nouisse omnibus facile etiā, tam certas in scriptore hoc eius notas ruri inter sepes

& rupes obseruantibus. Potuit cuspidatus magis q̃ spinosus frutex in usu medicinae aliquo & sanitatis quondam, ut hic ait, fuisse. Nunc in nullo honore est. Aliquibus locis tamē scopae ad purganda pauimēta ex eo fiunt. Pueri etiā rubentes baccas ex folijs eius decerpentes, seu corallijs perludū se illis ornāt. Rustica postremo plebs in carnario suspenditur: tuncq; eo a murū iniurijs pernas, & casei sui fiscellas. neq; em acuminata in cuspidē foliorū eius cacumina, penetra re anialia illa audent. Quā ob causam Myacanthā. i. Murinā spinam dictā fuisse etiā credimus. Echmura certe modo non aliunde factō noīe appellat. Theophrastus etiā præter hæc lib. 3. de plantarum historia *κντρομύσσην*, id est, cuspidatam Myrtum uocauit.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

Laurus Alexandrina, quā aliqui Idæam, alij Danaën, alij Hypoglotton, alij Zaliam, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracicen, alij Methrion, alij Hypoglossion uocant. Folio est maiore quam Rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, Ciceris magnitudine. Ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores. Radice syluestri Myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. Et stillicidio urinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

B A R B A R I C O R O L L.

Laurus Alexandrina, Carpophyllos quoq; dicitur, quoniam super dorsum folij fructificat. Propria nascitur circa Idam: unde cognomen Idææ, Plurima & circa Heracleam Ponti. Frutextopiarj, & coronarij est operis.

E X M. V E R G. C O M M.

Habet Laurus Alexandrina integrę quantitatis folio supernatum a superiore parte paulo supra longitudinis dimidium minus aliud folium, quod ueluti monstrum aliquid in eo super nascitur & uiuit, eiusdem excepta magnitudine per totum figuræ. Neq; ab re hic utrunq; hoc folium Rusci folijs comparauit: acuminata enim sunt: solaq; ut hic ait, magnitudine, mollietateq; & candore differunt. Habet præterea Alexandrina Laurus hæc aliud, quod Rusco simile sit. *ἡπιφύλλοκαρπος* enim ut Theophrastus ait, id est, in folijs contra aliarum stirpium naturā fructum fert. Quod hic breuius indicauit, dicens, *καρπὸς δὲ ἰν' αὐτοῖς*. &c. Nosq; uertimtis, fructum fert in medijs folijs. In quo animaduertendum est, fructum ferre Alexandrinam hanc Laurum, in medio quidem folio, quemadmodum & Ruscus: non tamen simpliciter ut ille, sed in geniculo alterius eius folij, quod nos maiori folio supernasci diximus. Illic enim hæret fructus; eamq; ob causam potuit hic scriptor *ἰν' αὐτοῖς* dicens, non media folia, sed inter folia medium nasci fructum testari. Quemadmodum Theophrastus libro primo de plantarum historia his uerbis indicauit. *καὶ ἕνα καρποφόρα μεταξὺ περιελαβότα τὸν καρπὸν, ὥσπερ ἡ ἀλεξανδρινὴ Λάρις*. Quod est. Sunt & folia quædam fructum ferentia, & inter se fructum amplexa, qualis Alexandrina Laurus est. Inter se fructum amplexa ait, paucis quod dicimus manifeste indicans. Esse autem Alexandrinam Laurum *ἡπιφύλλοκαρπον*, id est, in folijs ferre fructum, pluribus locis testatur Theophrastus idem: præsertimq; tertio de plantarum historia uolumine. Idæa Laurus etiā dicta hæc, ab Ida monte est, quo loco speciosior & copiosior forte nascitur. Stephanon itidem, id est, coronam, q̃ pro Lauro ad coronas forte uterentur. Credimusq; nos, Alexandrinam Laurum dictam, q̃ Alexander uictor ea usus fuerit: & si Plinius Daphnoidi id tribuat. Sciendum illud etiā, inueniri aliquādo in ea simplicia folia, quæ supernatū alterum illud minus foliū non habent. Sed sterilia ea sunt. Manifesto argumento, superna fci alterū illud folium fructus causa. Hypoglotton, & Hypoglossidion uocari a quibusdā eandem hic ait. Idē monuit & Plinius. Factūq; id nomen a lingua est: nec aliud significat, q̃ quod sub lingua habetur, aut huiuscemodi quodpiam. In quo non facile persuaserit mihi aliquis, a similitudine humanæ linguæ dictam fuisse. Acuminato enim mucrone folia eius sunt: a qua figura longe humana lingua abest. Quo fit ut credamus, potuisse quondam sic dici, quoniam ad siccam linguæ nimiam humiditatem in pueris forte uterentur. Est enim illi acri-

ἡ δὲ φωνὴ ἡλεξάνδριν
λαύρα
ἡ δὲ λάρια
λαύρα
ἡ δὲ λάρια
ἡ δὲ λάρια

B

D I O S C O R I D I S

C monia, & calefaciendi uis. Id tamen in antiquis hæcenus inuentum a nobis non est. Verum-
tamen scimus, Insuæres, aliasq; gentes aliquas in balbutientibus pueris uti eam: iuberiq; sub lin-
gua habere, mares duplex eius folium & fœcudum, simplex uero & sterile illud foeminas. Ve-
rum tamen ut diximus, in græcis nullum eius usus habemus auctorem.

¶ De Daphnoide.

CAP. CXLIX.

Daphnoide

Daphnoides Alypo simile, flos ut Nymphææ, cuius medium
nuci Cypressi non dissimile, in quo semen. Aliqui Chamæ-
daphnen, alij Peplion, alij Eupetalon uocant. Cubiti altitudine fruti-
cat, ramis flexilibus, multis inde sursum uersus foliosis. Cortex supra
modum uiscosus ramos uestit. Folia Lauri, graciliora, & molliora, fra-
ctu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores can-
didi, bacca cum ematuruit, magna, radix inutilis. Nascitur in monti-
sis. Pituitas extrahit folium recens, uel aridum in potu. Menses ciet &
uomitur. Caput inanit commanducatum. Sternutamenta mouet. Bac-
cæ quindecim potæ aluum resoluunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 24. ca. 25.

Daphnoides & ipsa Laurus est syluestris, baccæ e nigro ruffis, sed alij eam Pelasgon, Alij
Cephalon, siue Stephanon Alexandri uocant. Herbarij nostri Laureolam, & hanc & sequen-
tem. Folia huius crassiora Plinio q; Laurus, graciliora Dioscoridi. Nec illud præteribo, Dio-
scoridis mihi uerba non uideri, quibus dicitur, Alypo simile hanc herbam esse floribus Nym-
phææ. Inuenio & qui Alypoides hanc uocent.

E X M. V E R G. C O M M.

Non Laurum, sed Lauri formâ & spem: neq; eam toto corpore, uerû in folijs & fructu tan-
tum habent herbam Græci Daphnoides dixerunt. Plinius præter nomina quæ in Dioscoride
leguntur, Stephanon, id est, coronâ Alexandri uocari etiâ dixit. Nostræ ætatis peritiores her-
barij, hanc priuatim Laureolam uocant; ostenduntq; Laurinis folijs surgentē a terra, furculo-
sum fruticem, cōferctis, coaceruatisq; sub folijs seminibus, quæ laurinarum baccarum figura
sunt, nigris ut hic etiâ ait, in maturitate. Florem uidere non licuit. Eamq; ob causam nihil pro
comperito de eo testatur: sed respondentibus naturæ cæteris notis, uerisimile est, responsum
etiâ & flores. In quibus damnauimus nos, & explosimus quod a capitis principio statim lege-
batur, Alypo simile Daphnoides, & florem Nymphææ habere: & quod sequit, in medio floris
esse cono simile quiddâ, in quo semen: quoniâ non responderent Daphnoidis historia, & nulli
bi in antiquissimis græcis & latinis ea legerent: & paulo post de flore eius legitimo loco agere-
tur. Nasci multum Daphnoides hoc Theophrastus in Arcadia testatus est. Numeraturq; ab eo
inter ea quæ præcipuam purgandi uim habent. Quod hic etiâ indicat, monens per aluû pitui-
tas ducere, uomitiones ciere, mensescq; & commanducatum pituitas oris purgare: quinetiam
sternutamenta facere: quæ omnia eiusdem potestatis sunt.

¶ De Chamædaphne.

CAP. CL.

Χαμαδάφνη

Chamædaphnen aliqui & hanc Alexandrinam appellarunt, æ-
lij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolam, alij La-
ctaginem, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulo
constantes, rectas, tenues, læues, folia Lauri similitudine, læuiora mul-
to, ac uiridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur
capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tōr-
mina cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam
ciet. Idem facit pefso appositus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 21. ca. 27.

Chamædaphne folio tenui, eadē quibusdâ & Vincaperuincia est, herba Topiaria, semper
uiuens, in modū lineæ folijs geniculatim circūdata, ueteribus inopiâ florū supplere solita, cuius

& comedunt asparagi. Porro mihi alia uidetur esse Vincaperuinea, q̃ Chamædaphne; q̃ Vincaperuinea non attollitur, sed serpit, ac se in modum lineæ, ut prædixi, porrigit, flore in purpurâ ceruleo: Chamædaphne aſurgit in cubitalem altitudinē, ut Dioſcorides, & Plinius confirmāt, Poſeſt tamen etiā Chamædaphne dici Vincaperuinea, id q̃d & Plinio placet. Sed ut teſtatur ſit tamē, aliud, nō idem oīno genus eſſe, Alioquin & medicinæ quoq̃ nōnihil uariant. Hydropicis, & auribus, & aluinis prodeſſe Vincaperuinea dicitur, Chamædaphne capitis doſoribus, urinæ, menſibus ciendis, ardoribus ſtomachi, torminibus.

HVmilis & terreſtris Laurus Chamædaphne eſt, ſola foliorū ſimilitudine græcorū adoptiōe in nomē Lauri & honorē adſcita: topiaria herba, ſi Plinio credimus, & a latinis herbæ rijs ſua ætate Vincaperuinea appellata. Quæ ſi ea eſt quam Ethruria nunc Vincam herbā uocat, qua defunctæ uirgines in gente noſtra ad ſepulturam coronatæ efferuntur: & qua familiæ apud nōs aliquæ, gentili iure ſuo, primū ingredientem urbem Archiepiſcopum coronatæ, ad portā excipiunt, ſtipantq̃, & per urbem comitantur, cognitu facillima eſt: in hortis paſſim naſcens, tenuiſſimis uiticulis potius per terram ſerpens q̃ uirgis, ut Dioſcorides ait, a terra ſe extollens: folijsq̃ olæginis magis q̃ laurinis ſimilibus. Verum a Dioſcoridis Chamædaphnes hiſtoria longe ea differt, ob eas quas paulo ante numerauimus, & pleraſq̃ alias notas, quas uolentibus obſeruallē faciliū erit. Meminit Theophrastus Chamædaphnes ad extremū terræ de plantarum hiſtoria uolumen: ſed tam breuiter, ut nihil poſſit ab eo aliud intelligi, q̃ ſerre Chamædaphnem fructum folijs adnatum: quod a noſtræ ætatis Vincæ longiſſime abeſt. Ea etiam in uulſo ciborū uſu modo eſt, quod ueteres græcorū medici in Chamædaphne fuiſſe quondam teſtantur. Siquidem Paulus Aegineta in ſexto de ea agens ait, & *nei loſturai*. Quod eſt. Hæc etiā comeditur. Præterea libro primo quo capite docet de omniū olerum asparagi, cum longius de pluribus egieſſet, ſubiecit, *παρρηλαίως δὲ καὶ τὸ τοῦ χαμαὶδάφνης ἀσπαράγος*, id eſt, Nutrit ſimiliter etiam & Chamædaphnes asparagus. His nos indicijs, auctoriſq̃ perſuademur, non eſſe Chamædaphnem Ethruriæ Vincam herbā, Etnihilominus quæ a Plinio Vincaperuinea, uolumine, capite undecimo deſcribit, noſtræ gentis Vincæ ſatis reſpondet. Siquidem Vincaperuineam ait ſemper uiſere in modum lineæ, folijs geniculatim circumdatam, topiariam herbam, & inopiam ſlorum aliquando ſupplere. Quæ omnia noſtræ huic com petunt: in Chamædaphne autem inueniri nequeunt. Querendum itaq̃, qualis Chamædaphne ſit, folio Lauri, cubitalibus uirgis, fructu rotundo rubentēq̃, & folijs adnato, cuius asparagus in ciborum uſu eſſe poſſit.

De albo Veratro.

CAP. CLII.

Elleborum album aliqui Aſcida uocant, alij Atomon, alij Pignato xariu, Magi ſanguinem Herculis, alij Polyidos, alij Anaphyſton, Aegyptij Somphiam, alij Oure, Latini Veratrum album, Galli La ginum, aliqui Anepla. Fert folia Plantaginis, aut Betæ ſylueſtris ſimilia, ſed breuiora, & nigriora, rubefcentia, caulem cauum, quadrangulem, tunicis conuolutum cum areſcere cœpit. Radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, Caparum modo fibratis. Naſcitur in montibus & aſperis. Radices meſſibus colligendæ. Optimū habetur candidum, friabile, carnoſum, modice extenſū, nec tamen lunci modo mucronatum, quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem habet medullā, guſtu non admodū feruens, neq̃ ſaliuā ſubinde ciens. Huiusce modi aut ſtrangulat. Primatū Cyrenaicum tenet. Galaticum aut & Capadocicum, candidiora, & puluere quodam obſita, celerius ſtrangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs ammiſce tur, quæ caliginem oculorum diſcutiunt. Partus impoſitum necat. Menſes pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cum melle & polenta ſubaſtū. Abſumit carnes, ſi coquat una. Datur per ſe ieiunis, & cum Sea

A

VERG.

B

Vincaperu

C sama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsâ, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime a Philonide Siculo Einnenfi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset in hac præsertim additione, de materia, simul medicam uiuendi rationem exponere. Dant nonnulli in pulte, aut halicæ sorbitione, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus nulla strangulationis suspicio imminet, si nulla ualetudo corpus infirmat. Si quidem dum hæc ita contingunt, deiection nihil periculi minatur, quod non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones con- citant subdite ex eo balani, cum aceto.

Theoph. li. 9.
cap. 10, 11.

B A R B A R I C O R O L L.
Elleborum candidum, hoc est, Veratrum, frigidis gaudet. In Anticyra commodissime purgari fructu eius, quod Sesamæ habet similitudinem, Theophrastus tradidit. Sed hoc Sesamoides uocatur. Coturnicibus semen Ellebori gratissimum, scribit Aristoteles: quæ ob causam antiqui eas damna uere mensis, nunc quaeruntur. Nigrum a candido radice tantum differre arbitrantur plerique. Alij etiam folijs, quæ candidum continuo radici annexa, et humi sparsa habeat, caule ferulaceo, breuioreque: quæ Albuci. Plurimum nascitur in Oeta monte, & optimum uno eius loco circa Pyram. Secundus locus Pontico. Tertius Heleatico: quod in uiribus gigni ferunt. Quartus Parnasio, quod adulterant Etolico, ex uicino. Sunt qui & Massæotici inter hæc laudent. Album cum succidis, caput aggrauat. Ideoque celeriter effodi præcipiunt, & Alium præsumi, & uinum forberit: quod Dioscorides & in nigro seruat. Leguntur autem tenuissimæ radices, breuesque: ac uelut decuratae etiam hæc. Nam summa, quæ est crassissima, Cepis similis, canibus tantum purgandis idonea est. Veteres radicem, corticemque carnosissimum eligebant: quo tenuior eximere medulla, hanc humidis spongij operam, turgescentemque, in longitudinem sindebant, deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes: nunc ramulos a radice sua grauissimi corticis ita dantes. Incidit forficulis Elleborum, & cribratur. Cortex remanet. Hoc submoto, medulla cadit. Album optimum, & quod celeritate mouet sternutamenta. Sed multo terribilius quam nigrum. Durare uim utriusque triginta annis putant. Necantur albo muscæ trito, & cum lacte sparsa. Galli sagittas in uenatu tingunt Elleboro, circumsicis: uulneribus teneriorem sentiri carnem prædicant, Herophilus, Elleborum fortissimo duci æquabat. Concitatis enim intus oibus, ipsum imprimis exire. Ideo errauisse antiquos, parcius id præbendo, cum celerius erumperet, quod largius daretur. Reddi post quatuor fere horas incipit, totum opus septenis absoluitur. Nigrum equi, boues, suesque cauent, cum impune candido uescantur.

Pli. li. 25. ca. 5.
D

E X M. V E R G. C O M M.
Quibus hæcenus nihil auditum de Veratro fuerit, pigeatque Plinium & Theophrastum legisse, paratus cunctis Barbarus erit, collectis, & in Corollarium suum reuocatis, omnibus antiquorum de Veratio observationibus & dictis. Etsi tam nota medicinae res modo sit, ut nulla noua commentatione indigeat. Rarum ubique nascitur Veratrum: aliquot locis tamen abundat: nec difficile cognitum est: discrimen coloris in radice præsertim.

ἡλίκοςος ἡλίκοςος

De Veratro nigro. CAP. CLII.
Elleborum nigrum, aliqui Melampodion uocant, alij Ecstomon, alij Polyrrhyson, alij Proton, alij Melanorrhizon, alij Cyranio, Magi Zomarition, Aegyptij Isæam, alij Elaphine, alij Cemeleg. Latini Veratrum nigrum, alij Saraca, Daci prodiorna. Appellatur Melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus, furces in se Præti filias, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, Platani similia, minora, folijs Sphondylii proxima, subaspera, pluribus diuisuris incisa:

caulis asper, flores purpurei, racematim coherentes, semen Cnici, quod **A** in Anticyra Sesamoides uocant. Quo deiectiones molliuntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, a capitulo Capæ simili confibratis. Quorum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex quibusdā petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq; Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Aetolia natum. Attamen Eliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem. Detrahit bilem, pituitasq; datum per se, aut cum scāmōnia, & tribus obolis, siue drachma salis. Decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumpuntur. Prodest morbis comitiis alibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item cōtra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum, aut etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cēra & pice, & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum uentri utilissime imponitur, factum ex eo farina hordeacea, & uino cataplasma. Constitutum proxime radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparſu domos expiari arbitratur. Quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumq; precantur: ac uitant Aquilæ uolatus. Aduolare enim non sine periculo tradunt. Namq; si auis effossionem Ellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celestiter effodiatur oportet. Quoniam odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcendum fossuri, Allium præsumere, & uinum bibere consueuerunt. Nulli ira noxæ opportuni reddunt. Veratri albi mō emedullat.

BARBARI COROLL.

Elleborum nigrum sunt qui Ectomon Melampodion uocent. Hippocrates certe haud aliter fere q̃ Ectomon appellat Veratrum ipsum, præcipueq; nigrum. Porro Melampodion idcirco dicitur, quia Melampodem inuentorem habeat: quem alij diuinationis peritum, alij pastorem fuisse tradunt: & furentes Præti filias Elegē, & Celænen dato caprarum lacte, quas Elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia, prope fontē Clitorium. Caulis ei similis cādidō. Folia, ut Theophrastus quodam loco tradit, etiam Laurinis similia. Vbiq; provenit. Religiose hoc colligitur. Nam & gladio circumscribit, & ad ortū spectat q̃ eruit, præca, ut id liceat sibi concedentibus Dijs facere. Veratū & nigrū, & candidū ex Anticyra cōmendant scriptores, & poetæ. Anticyra uero hæc in Locride, siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo. Nam & aliubi legit Anticyra, hoc est sinu Maliaco, & propemontem Octam: ubi Ellebori quidem præstantissimum, sed in Phocidis Anticyra melius paratur admisione, ut inq̃t Strabo, Sesamoidis, de quo statim dicemus. Propterea in Phocidis Anticyram, non in Octeam Elleborum poturi secedebant.

EX M. VERG. COMM.

Quæ in extremo capite fabulosa, & ad augendam rei admirationem potius q̃ medicinarum aut historiarum Veratri necessaria a Dioscor. referuntur, omnia ex Theophrasti, de plantarum historia uolumine, paucis mutatis repetita sunt. Et si ab eo innotuit, id est, adiecta, & ob id falsa uideri omnia hæc dicantur. Longiores in opere hoc nostro, præsertimq; in re nota eri-

Pli. li. 25. ca. 6.
The. li. 9. ca. 10
& u.

Strabo. lib. 9.

C natus, si ex eo scriptore cōmentationibus his nostris addere ea uoluerimus. Satis sit græcarum literarum peritis locum in Theophrasto signasse: ignaris uero Plinium lib. 25. capite quinto au dire, eadem illa omnia isdem fere uerbis narrantem. Quæ licet plura, nec penitus eadem huic scriptori uideantur, non ideo tamen ex uarietate uitium suspicari oportebit. Aliter em̄ hicherbariam, q̄ illi fabulosam historiam docet.

De Sesamoide magno. CAP. CLIII.

ἐν ἡμετέροις

Sesamoides magnum, aliqui Sesamiten, alij Sesamin, alij Lycoseyta lio, alij Anticyricon appellant, quoniam in Anticyra albo Veratro in purgationibus misceatur. Simile est Senetioni, aut Rutæ, longo folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera Sesamæ simile. Ventrem purgat. Datur ritum ad bilis pituitæque deiectiones, quātum tribus digitis capitū, addito Veratri albi sesquiobolo ex aqua mulsæ.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 22. ca. 25

Sesamoides maius, a similitudine nomen accipit. Hoc nascitur in Anticyra, nec alibi, quod inuenerim. Hoc & Elleborum a Theophrasto dicitur: ut in candido notauimus.

E X. M. V E R G. C O M M.

Sesamoidi quemadmodum uox, & præter uocem hic ipse scriptor, Pliniusq; testatur, nomē Sesami similitudo fecit. Neq; enim Sesamoides aliud, q̄ quod Sesami speciem & figurā habet significat. Pliniusq; Sesamoides a similitudine nomen accepisse ait: & hic *σάμια ὁμοίον ἐνόςμῳ*, id est, semen Sesamo simile habere. Duorum generum præter Diosc. autore eodem Plinio, & in græcis Paulo Aegineta, planta hæc est. Siquidem Plinius cum primum descripsisset genus libro. 22. cap. 25. subiecit statim. Est etiamnum aliud Sesamoides. & c. Paulus uero Aegineta colore candido alterum indicans, suas illi uires assignauit: mox alterum maius appellans Veratrum passim uocari ait. Nec dubitandum, tam certa ueterum scriptorum testimonia sunt, duo Sesamoides esse. Vtq; hoc constat, sic contra parum certum est, sint ne eorū in colore, an in magnitudine discrimina. Antiquissimi græcorum codices, quos uidere licuit, colore discernunt: uocantq; prius hoc *μύλαν*, id est, nigrum, posterius *λευκόν*, id est, candidum. Qui uero passim circumferuntur, & magnitudine & breuitate notas & discrimina eorum ostendunt, *μύλα ὁρὴ μικρὴ*, id est, magnum & paruum appellantes. Paulus Aegineta alterum *λευκόν*, id est, candidum; alterum *μύλα* id est, grande & maius uocat. Contrariorum tamen ratio exigebat, ut si candido colore alterum signaretur, nigro alterum e diuerso indicaretur: quemadmodum in quantitate faciū in alijs codicibus est: in quibus grande primū, mox breue Sesamoides describitur. Pendemusq; nos in eare animo: tam facilis & lubricus lapsus in græcis est, unius tantum literæ mutatione ex nigro ad magnum: et ediuerso, *μύλαν* nigrum, *μύλα* grande græcis significat. Receptoq; in primo Sesamoide semel huiusmodi uitio, facilis in secundo error fuit. Potuitq; hoc & in Diosc. & in Paulo Aegineta pariter fieri. Egre enim persuademur, proposito candido, non reddē dum illi fuisse nigrum. Et si recipienda a colore discrimina hæc fuerint, ratiocinari tunc oportet, qua parte colores illi in alterutro Sesamoide inueniendi sint. Quod difficillimum erit. Ob eam causam indinat animus nobis in alteram partem: probamusq; ex magnitudine magis q̄ ex colore in Sesamoide sumi discrimina. Duplicem enim colorem illum, Veratri exemplo tributum Sesamoidi fuisse ex eo opinamur: quod quemadmodum duplex Veratrum est, candidū. s. & nigrū, pmiscueq; Sesamoides Veratrū, & Veratrū Sesamoides, ob eā quā mox dicemus causam, quondam diceretur: licet iam ab imperitis rei, creditū fuerit, candidum & nigrū oportere Sesamoides dici: Non quatenus diuersa a Veratro herba Sesamoides est, sed quod illi ob promiscuum ex usu nomen eadem esse credebatur. Fuisseq; usum Sesamoidis in purgationibus Veratro coniunctum, indicant fere omnes. Hic primum dicens. *οἱ δὲ ἐν Ἀντικύρῃ ὠλεῖται καὶ καλοῦσι, διὰ τὸ μέγεθος αὐτῆς καθάρσει τῷ λευκῷ ἰλλεῖσθαι*. Quod est. Qui autem Anticyram incolunt, Elleborum Sesamoides, q̄ in purgationibus candido Elleboro miscatur, appellat. Idē testatus & Plinius est li. 25. cap. 1. In Anticyra insula tuissimè sumitur: qm̄ ut diximus, Sesamoides admiscet. Testatus & Strabo. s. suæ geographicæ uolumine, in descriptione Thessaliæ, priuatimq; Anticyræ, quo loco sic de Elleboro agit. Postea Anticyra, quo nomine & alia est ad sinum latens Maleacum & Oetam montem, illi hic mitem Elleborum nasci ferunt. Hic autē opū

me preparatur. Quo circa frequentes huc aduenæ confluunt, purgationis & curationis gratia. Etenim in Laconica pharmacum nasci quoddam Sesamoides semini perç simile, cui permixtū præparant ceretū Ellebori. Paulus Aegineta tñ certiorē eius rei causam in. 6. attulit. Cuius uerba hæc sunt. *ευσταμυδίο το μίχα υπερ και ποτικυος ιλλεβορος ανωματι δια το εμοιος ιλλεβορος κατασκευαν αυτου το σωριμα.* Qd est. Sesamoides maius, qd palā Elleborus nominat: qā semen eius pariter Elleboropurgat. Ex his ratiocinari facile est, diuersam a Veratro Sesamoides herbam esse: & quia misceretur illi in purgationibus, aut eandem habet uires, Elleborum creditam a multis fuisse: ideoq; nigri & candidi, utriusq; Veratri modo discrimina ab imperitis inuenisse: sui generis tamen herbam, & quia Sesamo simili semine fit, Sesamoides appellatam.

A

De Sesamoide paruo. CAP. CLIIII.

Sesamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon syluestre uocant. Cauliculi ei sunt dodrantes, folia Coronopi, minora, hirsutiora, & in cauliculorum cacumine capitula florum pene purpureorū, medio eorum albo. Semen Sesamę fuluum, amarum, radix tenuis. Detrahit bilem, pituitasq; semē ex aqua mulsā porum dimidio acetabulo. Illitum ex aquā, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

ευσταμυδίο το μίχα υπερ και ποτικυος ιλλεβορος ανωματι δια το εμοιος ιλλεβορος κατασκευαν αυτου το σωριμα.

ARBARI COROLL.

Sesamoides minus, folio minore q̃ Sesami. Nascitur in glareosis. Hoc & Sesamoides candidum, a Galeno dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Sypere est pro Sesamoide dicendum quod superiore capite imprudenter relicū a nobis est. Nasci Sesamoides in Anticyra. Ideoq; ut hic, & Plinius dixerunt Anticyricon uocari. Quæ etiā causa fuit, ut in rei æstimatione miscerentur ab imperitis Veratrum, & Sesamoides: qm̃ idem natale solum haberent. In quō uidendum diligentius erit, quoniam duæ Anticyræ quondam fuerunt: altera Phocidis urbs, altera in Maleaco sinu insula, utrobī Sesamoides hoc nascatur. Ex antiquis enim scriptoribus plures ad purgationes Veratro facendas insula magis laudauerūt in Maleaco sinu, q̃ in Phocide urbem. Alij in Phocidis Anticyra tutius sumi Veratrum dixerunt: quoniam Sesamoides hoc illi admisceretur: manifesto argumēto, in hac, non illa Anticyra nasci Sesamoides. Animaduendum & illud, miscere Pliniū utriusq; Sesamoidis historiam & medicinam: & quæ alterius sunt, alteri tribuere. Quod nominis similitudo, & æquiuoca eorum appellatio uidetur fecisse. Locus est. 22. uolumine, capite. 25. In cuius rei indicatione locus in eo scriptore corruptus adhuc est, grānum Sesamæ dari dicens in uino dulci, ad detractiōnes quantum trinis digitis capiatur. Sesamoidis enim, non Sesamæ legendum auctore Dioscori de illic est: a quo cuncta illa Plinius accepta latinis reddidit. Poterunt uolentes utriusq; scriptoris dicta inter se conferre.

B

De syluestri Cucumere. CAP. CLV.

Syluestre M Cucumin, aliq Elateriō uocant, alij Grynion, alij Balin, alij Syncrifin, alij Bubalion, alij Scorpion, alij Pherombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum, alij Agrestem, Pœni Cusimezar. Fructu solo distat a fatiuo Cucumere, lōge minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilem. Folia atque sarmerta fatiui refert, radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & prope domicilia, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Ischadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius decocto dētes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras, & uutiligines abstergit. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et in facie

ευσταμυδίο το μίχα υπερ και ποτικυος ιλλεβορος ανωματι δια το εμοιος ιλλεβορος κατασκευαν αυτου το σωριμα.

Y ij

C maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deſciunt, præſertim in hydro-
piciſ. Deiectiones autem citra ſtomachi iniuriam mouet. Radicis ſeli-
bra, præſertim in uini Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni
cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

B A R B A R I. C O R O L L.

DE Cucumere ſylueſtri, ſiue anguino, & erratico dictū in ſaturo eſt. Illud hoc loco memine-
rimus, Balidem a quibuſdam uocari, ut inquit Dioſcorides, anguiniuum Cucumerem. Ego Ba-
lin, & Balidem lego dici ſlorem quendam, & alio nomine Ballithum: qui mortuos uitæ reſtitu-
at: ut & de Arione fabulantur. Photonem habeo grammaticum, qui hoc affirmet poſt Pliniū,
demonſtratam a dracone, qui ea herba catulum ſibi occiſum reddidit ſaluti. Cucumerem ſyl-
ueſtrem Bubaliū quoq; dici, autores ſunt Dioſcorides, & Hippocrates. Eſt ubi Caprificum ita
dici legas: errore nato, q̃ Caprificus agria, Hyce appelletur. ſlueſtris uero Cucumis Agrioſi-
cys. Alius q̃q; ſloſ habetur, Bellis nomine, pratenſis, & candidus, & quadātenus rubēſ, aduer-
ſus ſtrumas efficaci: ut Plinio uideſ. Sit autē Bellis idē, q̃ & Bellius, ſiue Bellio, & ipſe ſloſ praten-
ſis, quem Plinius quinquageniſ q̃niſ barbulis paſtillicantibus Coronatum ſcribit, animaduertē
dū puto. Quanq; eim luteus uideſ a Plinio deſcribi Bellio, uolumine primo, & 20. Bellis uero cā-
didus ſexto & uigeſimo, non tñ ita in omnibus Plinianis codicibus luteū eū eſſe legimus. Qui-
dā luteū ei ſemen, nō ipſum ſlorē audiūt: & Paralyſin uulgo dictā interpretant: q̃ & primus ueniſ
ſloſ, & Margarita cognominatur: & hyeme q̃q; tota naſcīt, ex occidente, ut qdā exiſtimant, in
Italiā conuectus. Quinquagenas tñ ei ternas, non q̃nas barbulaſ inuenio. Laudat ad paralyſin,
a quo & nomen: itēq; ad podagras, & Iſchiada. Paralyſi uocatæ ſlorem habet ſimile, pauciori-
bus tñ barbulis. Floſ, qui qm̃ a lōginquo conſpicuus eſt, Paradelos uulgo dicitur: folio em̃ nō
admodū diuerſo: niſi q̃ ferratū eſt huic, non Paralyſi. Sunt q̃ Bupthalmō, & Bouiſ oculū ap-
pellent. nam q̃ Antipatrē uulgo dictū renē eū eſſe, ligdo fallunt: cū ſit Antipater ſurculofuſ, &
ſlore luteo, quaſi Cunilagini� minōre. Folia Roriſ marini latiora, miniuſq; longa: Chriſtophori-
anā, & Oculū Conſuliſ nōnulli uocant. Huiuſ illa p̃prietat, q̃ ſlores poſt naſcentes altius tol-
lunt, q̃ priuſ nati. De cuiuſ rei argumento uideri poſſet aliquibuſ, hanc herbā eſſe quam Plinius
Impiā uocari tradit. Herba inq; Impia uocatur icana, Roriſ marini aſpectu, thyriſi mō ueſtita, et
capitata. Inde aliq̃ ramuli aſſurgunt, ſua capita gerētes. Ob id Impiā appellauere: qm̃ liberifu-
pra parentem extollant. Aliq̃ potiꝯ ita appellatā, q̃ nullū animal eā attingat, exiſtimauere. Hęc
inquit inter duos lapideſ trita ſeruet, p̃cipuo aduerſus anginaſ ſucco. Nec tentari unq; eo mor-
bo qui guſtauerint: itaque & ſuibꝯ dari. Quæque medicamentū id noluerint haurire, eo mor-
bo interire. Sunt qui & in auiū nidis inferi aliquid ex ea putent: atq; ita non ſingulari pulloſ
auidiuſ deuoranteſ. Hęc Plinius. Cæterū quanq; ſimilitudo in ea p̃prietate ſit, multa ſunt in-
ter utrāq; diſcrimina. Primum, q̃ Impia, incana eſt herba: Antipater non eſt. Alterum, q̃ trita
non ſeruet. Tertium, q̃ nec capita, nec thyroſ gerit, ſed ſlores dumtaxat.

De Elaterio. C A P. CLVI.

Elaterium

EFructu huiuſcæ Cucumeriſ, ſit medicamentum quod Elaterium
uocatur, ad hunc modum. Decerpi Cucumeres, qui tacti pro-
nus exiliunt, ſeruantur nocte una. Poſt ridie impoſito ſupra craterem ra-
riore cribro, utriſq; manibuſ præhenſi, ſigillatim ſupino cultro ſurſum
uerſuſ aciem habente ſinduntur, atq; per cribrum humor in ſubiectū
uaſ exprimitur. Simulq; carnoſum quod hæſit cribro, quo faciliuſ ex-
cidat eliditur, quod ita preſſum eſt, reſidere ſinitur, atq; in uicinam pel-
uim demittitur. Coaceruata autem in cribro ſegmina, dulci aqua per-
funduntur, & denuo preſſa, abiiciūtur. Humor in pelui agitur, & lin-
teo opertuſ, ſoli exponitur. Dumq; ſteterit, tota ſupernatant aqua, cum
humore concreto effunditur. Hoc uero identidem fieri ſolet, donec ex-

istens aqua liquefcatur:qua stillatim exhausta sedimentum mortario fuf- **A**
cipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam
ptinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargāt, & mediū
cauātes, triplicatum linteū obtendant, per qđ Elateriū cum sua humidi
tate diffundūt, siccātūq; in pila ut dictū est, cōterūt. Aliq; p dulci aqua
marinam perfundētes, ita eluūt. Alij in nouissima lotiōe, mulsam aquā
respergunt. Elateriū optimū esse constat leue, nō pōderosum, cū cādore
leniter humectū, gustu amarissimum, quodq; lucernarū luminibus ob
iectum, facile flagret. Porraceum tamen, scabrumq; si turbidum spectetur,
atq; erui cinerisq; plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec de-
sunt qui Cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum &
leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est.
Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalcī duo. Si
quidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam alterutra parte
extrahit. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem
moliri, adiecto salis duplo, & stibij, quod colorare sufficiat, ex
aqua erui magnitudine catapotia dato: postea cyathus unus aquæ tepi
dæ forbeat. Ad citandas tamen uomitiones, aqua diluens Elaterium,
subiectas linguæ partes penitissime pinna oblinito. Quod si quisq; dis- **B**
ficilius euomat, oleo, aut unguento irino resolutio. Somnum inhibeto.
Porro his qui eximie uacuuntur, continue uinum & oleum dari con-
uenit. Etenim uomendo restituntur. Quod si uomitiones non finian-
tur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando
corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Partus enecat in
pessō subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Di-
uturnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum unguentum est,
cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

B A R B A R I C O R O L L.

Elaterium, Theodorus Agitatorium conuertit. Nullum medicamentum longiore æuo du-
rat. Ducentum enim aņos tūm eius pollere Theophrastus asserit. Melius, quo uetustius usq; ad
quinquagesimum. Lucernas adhibitum extinguit, hoc enim ueri probatio est: si prius q̄ restin-
guat, scintillare sursum, ac deorsum cogāt. Pallidum prestantius, ac leuiter amarum. Huius cau-
sa maturius secatur. Alioquin semen exilit, oculorum etiā periculo. Harūidine ueteres incide-
bant. Tradūt hoc succo tactis radicibus uitium, non attingi uuas ab aulibus. Ad hunc succum
Cucumis Anguinus autumnō capitur.

Pli. li. 30. ca. 1.

De Satiuo Cucumere.

CAP. CLVII.

Satiui Cucumeris trita radix, & drachmæ unius pondere pota in
Hydromelite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnam uomere
uelit, binis obolis sit contentus.

De Staphide agria.

CAP. CLVIII.

Staphida agriam, alij Triphyllon, alij Stefion, alij Astaphida, alij
Phthiroctonon, alij Phthirion, alij Apanthron, alij Polyides, alij
Pseudopathes, alij Arsenoten, Aegyptij Ibesaceden, Romani hærbā

staphis agria

C Pediculariam uocant. Folia habet Labruscæ, diuisa, et cauliculos rectos, molles, nigrosq; . Fert florem Glasti, & folliculos uirides, similes Ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quina denaue, si trita in aqua mulsâ detur, crassum humorem per uomitum purgant. Sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam potui dare. Quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest. Item prurigini et psoris. Cit plurimâ pituitâ cōmanducata. Decocta in aceto, dentium dolori coluto ore subuenit. Rheumatismum gingiuarū sistit. Ulcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. II. 23. ca. 1.

Staphis, siue Astaphis agria hæc est, quæ Pituitaria quoq; dicitur. Cornelius Celsus uuam Taminiam intelligit falso. Maturecit enim semen huius cum uindemia, nigrescitq; cum Taminia acini rubescant, & in apricis nascatur; & Ampelos agria sit, non Staphis agria. Hæc non nisi i opacis. Paulus Galenus fecutus, duplex genus facit Staphidis, Satiuū, et Syluestre: ut Satiuum sit, quā nos Vuam passam uocamus, quanto uolumine reddendā. Astaphin, qui Attice loquuntur, Ostaphin uocabant; sicut Omintā pro Mintha, siue Mētha; & Ostacū, p. Astaco. Est aut Astacus is, quem nos Gamarum quoq; dicimus. Porro est locus in Aetio ubi legas, Stephanida agria mendose, ut suspicor, pro Staphide agria: quā ad uitia, psorasq; capitis cōmendat eā. Nisi quis Stephanida putet esse, quam a nostris Coroneolam uocari diximus, hoc est, Cynobaron: utiq; si & hæc, ut Rubi manantibus in capite praesidio esse potest.

VERG.

D

Quam greci agriam Staphida, syluestre passam Vuā sua uoce intelligētes dixerūt, Romani Taminā uuā, Pedicularē herbā, Pituitariāq; uocauerūt. Est Plinius contra Celsum alia a grecor; Staphidagria Taminiam latino; uuā esse testatus bis fuerit. Est sane grecis Staphis, & ut Athenienses dicere cōsueuerāt Astaphis passā Vuā. Ex cuius similitudine hæc syluestri tñ habitu ab ea discreta est. Vocarūtq; latini Pituitariā, Pedicularēq; ex uirib, quas habet. Feruore em suo cōmanducata multā pituitā trahit; & eripentibus e corpore pediculos, ex oleo intusta aduersat. Quinetā, ut Plinius ait, in aceto decocta, etiā uestes eo tedio liberat. Facilis cognitu herba, tā certis notis a Dios. describit; parūq; a græca uoce deflexa appellatiōe, gēs nostra adhuc eā indicat. Folia habet plerūq; septē, aliqñ tñ pluribus, nonnūq; etiā pauciorib. incisuris diuisa. Vtebant ea ueteres grecor; medici in aliā in his q Venerē exercere nō ualerēt, ex adipe, cui uuæ huius admixtū semē fuisset, genitalia inuigi tubētes. Vtebant & in purgādo capite, cōmanducandā dantes; eaq; ratiōe pituitas eius partis p os trahentes. efficacissimē em acrimoniæ est. Plinius, quēadmodū pmonstrauimus, falso Taminā uuā, 23. uolum. ca. 1. his uerbis uocari ait, Astaphis agria, siue Staphis, quā aliq uuā Taminā uocāt falso. Suū em genus habet. & c. Idē. 16. ca. 14. Taminie uue uires describēs, quæ Staphidagrie sūt palā illi tribuit. Verba eius sūt. Itē Phthiriasi, qua Sylla dictatōr cōsumptus est. Nascunt q; in sanguine spso hominis anfracta, excursa corpus. Resistit uue Taminie succo, aut Veratri cū oleo peructis corporibus. Taminia qdem in aceto decocta, etiā uestes eo tedio liberat; quæ oia ex ui Staphidagrie huius dicta sunt; quæ pediculos enecantē, & Pedicularē dici in Dios. legit. Monere legentes hoc em uolumus, ut inuenisse & ipsi conent, an de eadē uua Taminia a Plinio duob. locis diuerse traditū fuerit. Cur aut Staphida potius, i. passam Vuā, q Staphylē, i. simplicē uuā ueteres greci dixerint, folliculorū figura fecit; qui rugosam uuam magis q integros uuarum acinos referunt. Ob quā causam & Plinius ait, folliculos magis q acinos eam ferrē.

De Thapsia. C A P. CLIX.

Thapsia

Thapsia aliqui Hypopion uocant, alij Pancranon, alij Scammion, alij Thelyterin, Romani Ferulaginem, alij Ferulam syluestrem, Poeni Boeden. Nomen ideo accēpit, quod in Thapso eiusdē nominis insula, primū inuenta sit. Tota uero natura Ferulæ similis est,

graciliore caule, folijs Foeniculi, umbella Anethi in cacumine a singulis **A** furculis erumpente, flore luteo. Semen quale Ferulae, latum, sed aliquant-
to minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita.
Lactis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe, cortices incidun-
tur, aut radix in fornicis speciem excauata, cooperitur quo merus succus
confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum ex-
trahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum ex-
pressus, fictili crasso insolatur. Aliqui folium una terunt. Sed inualidior
huiuscemodi succus. Hoc autem interest. Quoniam qui ab radice manas-
cit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autē extractus exiccatur,
atq; teredinū iniuriam sentit. Qui succū colligit, stare debet nō obuersus
uento, cum diēs apricus est, & a flatu silet. Quoniam ob uaporis acrimo-
niam facies uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulae.
Ob id prius liquido carato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita
muniti accedunt. Tam cortex radicis, q̃ succus, purgandi uim habent.
Lacteus succus in aqua mulla potus, utrinq; bilem extrahit. Radicis mo-
dus quaterni oboli, cum tribus seminis Anethi drachmis, succi terni obo-
li, lactis obolus unus. Quod eo amplius assumitur, periculosum est. Hu-
iusmodi purgatio conuenit suspiriosis, & diuturnis laterum doloribus,
reiectionibusq;. Datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit uomere. **B**
Tam radix, q̃ succus, omniū maxime quæ pares cū eis uires adepta sunt,
uim habent transconcretiuam, ubi ex imo aliquid euocandū est, aut mea-
tuum laxitas alio transferenda est. Vnde succus illitione, & radix recens
affricu, alopecias explent. Radix, succusq; cum æquis ceræ thurisq; por-
tionibus, sugillata liuoresq; tollunt. Sed non plus binis horis dimittan-
tur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emen-
dat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula discutit, perunctus cum
sulphure. Succus in diuturnis pulmonū, laterum, pedum, articularūq;
ualetudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem, ijs
qui natura, non circūcisione curti sunt. Tumorem enim excitat, qui pin-
guium fotu emollitus, in pene iacturam refarcit.

B A R B A R I C O R O L L.

Thapsiae liquor expressus, efficacior q̃ semen. In Africa uehementissima hæc est. Semen
Ferulae, Thapsiam aliqui uolebant esse falso. Suum enim genus est inani caule, nec excedente
baculi longitudinem. Thapsia ob humoris abundantiam opus suum, ut Galenus auctor est,
sero perficit. Facile corrumpitur. In Theocrito poeta Thapsos legitur, genus herbae, tingendis
lanis utile: qua & capillus flauescat. Hanc & Xylon Scythicon, hoc est, lignum Scythicum, a
Sappho dici putant, uulgo Chrysoxylon. Diuersum porro, an idem sit Thapsos quod Tha-
psia, iudicandum relinquo. In Aristotelis tertio Rhetorico. Hypopion, sunt e Græcis, qui pro
Thapsia, uel alia herba capiant rubente. Nos pro sugillatione uertimus.

Pli. li. 19. ca. 9.

E X M. V E R G. C O M M.

Cognomines diuersis locis Thapsi urbes, insulae, Chersonesiq; aliquot Thapsiae huius quæ
modo tractamus ab earū aliqua primò quondā sic appellatae, diuersos nates & diuersas bo-
nitates laudis fecisse uidentur. Nicander in Theriacis suis ex Sicilia Thapsiam in primis contra

C uenata laudauit. *ἡν δ' ἀντοῖ, ἱππίμετα νόσων ἀλετήρια λίξω, θριπάρην μὲν ρίζαν ἰλὺν γυῖα λήθα βαλόν μίξασ.* &c. Quod est. Nunc age, composita te malorum remedia docebo. Trinacriam sumito Thapsi radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra, 11. uolumine, capite. 12. Thapsiam in Africa uelamentissimā esse ait. Hic scriptor, quæ plures alij secuti sunt, in Thapso insula primū inuentā fuisse ait: nec bonitatis, maiorisq; in ea efficaciz discrimina aliqua numerauit. Ex eo fit, ut credamus primā Thapsiaz inuentionē Thapso, quæ una ex Sporadibus insulis est, deberi: & in ea herbario Crateia, qui primos illic plantam, & eius uires obseruasse dictus est: poruissq; alios ex alijs locis eam potius laudare, q̃ natale solum Africā, Siciliamue, aut alia loca illi assignare. Hanc ueteres Græci Hypopion uocarunt: ancipiti (nisi uitium in Theophrasto sit) & rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare græcis Hypopion, cui in ultima syllaba, i, non, y, fit, sanguinis exitu succuue, aut iniuria aliqua alia, in quampiam corporis partem concursum, integraq; cute in eo loco cessantem, & q̃ extra uenas sit, quasi mortuum. Auditaq; Hypopij huius uoce, nihil aliud Græci intelligunt, q̃ cessante sanguine nigrescentem cutem. Nec dubium est his mederi Thapsiam: & ab eo remedii nomen id factum illi esse. Si quidem hic ait, *ἡπόπια τι ἔρη καὶ πυλώματα*. Quod est. Hypopia & liuores delet. Et Plinius rem augens, eodem libro & capite ait. Nero Cæsar claritatē ei dedit initio Imperij, nocturnis grassationibus uerberatā faciem illinenti sibi cum thure cæraq; & sequenti die contra famā cutem syncerā circumferens. Solus Theophrastus libro. 5. de plantarū historia aliter Hypopia quibus ea medetur intellexisse creditur. Verba eius sunt. *ἢ δὲ τῶ βαφίας ἡμικτὴν, ἡν δὲ τῶ κατὰ χυ κατὰρὶ καὶ ἡν καὶ κατὰρὶ δύνανται δὲ καὶ τὰ πυλώματα ἡφαίρην, ἡπόπια δὲ πούτ, ἀλλὰ ἡλυνασ.* Quorum sensus est. Thapsiaz aut uomitoria uis est. Quod si quis eam retinuerit, per inferna pariter & superna purgat. Facit & Hypopia, uerūtamen candida. Ex his (nisi uitium in eo scriptore sit) maculas quæ in cute albicāt, Hypopia intellexisse oportet. Neq; enī significare aliud potest, qd̃ dicit, Facit & Hypopia, uerūtamen cādida. Estq; hoc qd̃ paulo ante diximus ancipiti, id est, ad utraq; partem significatione Hypopion uocari Thapsiā potuisse. Et si recipiendū in Theophrasto id est, ad aliā Thapsiaz naturā referenda res erit, ad pallorē scilicet a quo Thapfinus color in Phocione a Plutarcho dictus est. Et a Theocrito in Pharmaceutria, καὶ μὴ χρῶς μὲν ὁμοῖος ἔστι το πολλὰν βαφῆ. Quod est. Et corpus meū Thapso simile factū est: nulla alia q̃ palloris significatione, qui color Thapsia fiebat. Confueueratq; ueteres, ad excusandā ualitudinem corporisq; morbos, non aliter, nec alio euentū q̃ cymino Thapsia se inungere. Ponitq; Theophrastus Hypopia candida pallores Thapsia factos indicare. Quod legendibus significasse satis sit. Et si sciamus Theocriti interpretes, & alios græcorū scriptores Thapson Chrysosylon, id est, aurei coloris lignū, non herbā hanc interpretari solitos. Scāmoniū uocari ab aliquibus Thapsiam in Dioscoride legit. Verūtamen nō potuit ad Thapsiam Scāmoniū, nisi ex pari in purgādō uī trahi. Romani ex totius plantæ similitudine, quoniā ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est, ferulaginē & syluestre Ferulā eam uocauerūt. Fœniculi solia habere eā Theophrastus dixit: uertit enī latiora: caulē ferulaceū, radicē candidā, liquorē eius efficaciorē esse, per superna pariter & in ferna purgare. Seminis nullū esse usum. Nasciq; Thapsiam alibi quidē, sed in Attica. Non uesci ea indigenas pecudes: peregrinas aut uesci ea qd̃ē, sed aut perire, aut diarrhia uexari. Barbarus in colligēdo Thapsiaz liquore, quorundā codicū, quos & nos uidimus, fidē secutus, qd̃ in Dioscoride passim & uerius legit, *ἀναιρηθῆ τὸν ἐνδιαιτῶτα ὅπῳν* uertit, succidit eam & tollunt: *ἀνὰ* ut in illis legit, id est, radicē, non ὅπῳν, id est, liquorē interpretatus. Nobis cōmunis lectio uerior & aptior uisa est: quoniā nulla est ad colligendū liquorem succidendā & auferendē radicis necessitas. Præterea non semel tantū, sed sæpius uerisimile est colligi posse liquorē eum: & si colligendus est, ex uiuente adhuc in radice sua planta colligendū esse. Idem qd̃ erat *καρπιδ* scilicet uerit, a quo & fiscella dicta est. Nec male quidē: nisi Fisci uox nostra ætate ad alterius rei æstimationē trāsata penitus iam pridē esset. Monemus id, ne quis discipere nos puer, Nulla enī rei, sola uocis inter nos differentia est. Quodq; organis ille ait exprimendū radicis Thapsiaz succū, scriptoris huius uoces secutus, prælum, torcularue in ea uoce intellexisse oportet.

De Spartio.

CAP. CLX.

καρπιδ

S Partion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex est longas ferrens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens, florem ut albæ Violæ, luteum. Purgant per superna Ellebori uice, circa pericu-

lum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsâ pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tulsis extractus succus, ischia-
dicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clyste-
re. Strigmenta autem elicit cruenta.

BARBARI COROLL.

Spartum, siue Spartion Genistâ nostri uocât: fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus, multiplici tunicarû cortice, sponte nascens, & quæ feri nequeat: proprièq; aridi soli succus, & terræ uicû: quia nihil ibi feri, aut nasci possit, noxiû ani-
malibus, præterq; cacuminû teneritate. In Hispania Spartum & pro fune ipso capitur: ut Me-
rinthus, Merindusq; a poetis. Sint duo Sparti gñâ: Vnum quod Genistam uocamus, Alterû
quod in Hispania, & Africa funibus nascat, leucea, siue lygea potius dictû ab Athenæo, dubi-
tauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe cum Spartôn dixit, Genistâ uidetur intelligere: cu-
sus florê in coronas addebant, Apibus gratissimû. Semen quoq; ipsum, Græci Sparton eodem
nomine appellant. Asia e Genista facit lina piscatoria, egregie durantia, frutice madefacto de-
cem diebus: hac & uites alligat, ut Galenus inquit. Sparti quidê usus, multis post Homerû se-
culis institutus uidetur: quoniâ cum Sparta dissoluta dixit, significauerit potius, lata. In agro
Thebano copiosa: ut Varroni, Plinio, & Gellio quoq; placet. Nec ante Pœnoræ arma, quæ pri-
mum Hispaniæ in tulerit, & cû fuitiles fierent naues: uel Loro, ut in Liburnia: uel Canabo, &
Stuppa, ut in Græcia, non Sparto sutas esse constat. Serilla certe, nauigiû est hisricû ac libur-
nicû, a cõserendo nomê habens: quia Lino Spartocq; stipat, ut Pacuuius cum dixit,
Sparteis suta ferillibus,

funiculos intellexerit, qui Sparto cõserant, auctor Pompeius Festus. Idê Napuras, funiculos
ex stramētis uocari tradit. In Africa exiguit, & inutile gignit. Carthaginêsis Hispaniæ citerioris
portio nō tota, sed quatenus parit, mōtes quoq; Sparto operit. Hinc strata rusticis eorû. Hinc
ignes facesq;. Hinc calceamina, & pastore uestis. Ad reliq; usus laboriose uellit in hyemê uix.
Facillimè tamē ab Idibus Marijs in Iunias. Hoc maturitatis tēpus. Ager unde colligit, minus tri-
ginta passuû in latitudinē patet, a litore Carthaginis nouæ, minusq; in longitudinē. Longius
em uehi prohibent impendia. Ideo Spartû aliter etiâ diuulsim, natura interpolatur, rursusq; q̃
libeat uetustû, nouo miscet. Sparto nihil fere utilius nauis armamētis, machinis ædificationû,
alijsq; desyderijs uite: inuictû in aquis, & mari: sicut in secco, funis e Canabe.

EX M. VERG. COM M.

Vlgarem Genistam passim & incultis locis nascentē, cuiusq; in re rustica ad nexus quo-
tidianus usus est, nō Hispaniæ Spartum descripsisse hoc capite Dioscorides uidetur. Quis em
Sparto huic breues, sine folijs uirgas, & natiuo lentore infragiles, quær in ligandis uineis usus
sit, phasclorû figuras siliquas, & in his lenticulæ semen, luteumq; leuciorû colore florem scri-
ptor hic tribuit, integrâ Genistarum quas diximus, & iconiâ imaginê ostendunt. Nec nos in
re aliouin ex scriptoris huius descripiõe satis certa suspicari, miscere uel aliquid audemus. Er-
si sciamus, a Plinio. 19. uolumine, capite. 2. Spartum aliter descriptum: & medicinâ remediâq;
omnia, quæ hoc capite a Dioscoride docentur, Sparto, non Genistâ, cui debebantur. 24. uo-
lumine, capite nono ab eodem tributa fuisse. Res enim nos sequimur, & quæ in antiquis scrip-
toribus uaga aut ambigua sunt, ad certam quatenus licet, significationem contrahere cona-
mur. Credimusq; ex his quæ in græcis latinisq; diu obseruauimus, monere tuto legentes pos-
se, duo fuisse græcis Sparti genera: quæ tamen alicuius notæ adiectione distingueretur. Quod
em in Dioscoride nunc forma diminutiuâ legitur, nouû discrimen est: idēq; a nobis non ser-
uati. Alterum quod in Hispania nasceretur. 19. uolumine, capite. 2. a Plinio descriptû: alterum
quod Genistæ appellatione a cunctis latinis censeat. Indicantq; qd didimus hic ipse primû scri-
ptor: qui intelligit alterû esse Sparton, nullius (quod hætenus inuenim) in medicina usus, ut
certius cognosceretur, ait, quo uites ligant: eandemq; ratione secutus in. 6. Paulus Aegineta,
eandem & ipse adiecit discriminis notam, dicens, *σπάρτον ὡς τὰς ἀμπέλους δένδρεα*, quod est, Spar-
tus, quo uites uinciunt: nulla addendæ eius notæ necessitate, nisi alterum esset, quod æquiuo-
ca appellatione fallere audientes posset. Estq; ex communi omnium usu adiecta discriminis
nota illa. Neq; enim Hispaniæ Sparto uti omnes possunt: at Sparto quo uites ligantur, uti o-
mnes possunt. Vbiq; em nascuntur Genistæ, & eundem inter ruris utilia ubiq; usum habent,

Pli. li. 24. ca. 9.
lib. 19. cap. 2.

B

D I O S C O R I D I S

C Quod Plinius in Hispanienſis Sparti hiſtoria nuſquā teſtatuſ eſt. Quodq; illi præcipuū ab eo tribuitur, ad funeſ pertinet. Totāq; habet Hiſpaniæ Spartuſ, ne longioreſ ſimul, diuerſam penitus a Geniſta hiſtoriam. Eſſeq; Sparton Geniſtam præter haſtenuſ dictā indicat etiā Theophrāſtuſ primo de plantarū hiſtoria, Linofpartum inter Polylopa numeranſ.

¶ De Silybo.

CAP. CLXI.

σίλυβον

Silybum lata ſpina eſt, folia ferenſ Chamæleonis albi. Hæc recens cum ſale oleoq; cocta eſt. Radicis ſuccuſ drachmæ pondere poſtuſ uomitioneſ ciet.

B A R B A R I C O R O L L.

Silybon, aut Silyboſ ſpinofa, perinde, ut albuſ Chamæleon, cui eſt ſimiliſ, ne in Cilicia quidē, aut Syria, aut Phœnicie ubi naſcitur, coquere tanti eſt: ita operoſa eiſ culina traditur. In medicina nullum Plinio uſum habet.

E X M. V E R G. C O M M.

Negauit Plinius Silybi huiuſ eſſe aliquē in medicina uſum; maiore tñ q̃ hic apparatuſ ad eiſ coqui indicauit. Sigdem cū oleo & ſale elixā comedi Dioſ. ait; ille uero ne in Cilicia quidē, aut Syria, aut Phœnicie ubi naſcit, coquere tanti eſſe ait; ita opoſa eiſ culina tradiſ. Ex quibuſ rōcinari illud facile eſt, peregrinā Italiæ herbā Silybum eſſe, & diligentiore cura et opera coqui ſolitā. Qui deſcriperunt eam poſterioreſ, lauiſſimilſ foliſ, & in foliſ per extremitateſ latiſ ſpitiſ eam tradunt. Noſ in peregrino frutice, quod aliud moneamuſ, non habemuſ.

¶ De Vomitorio Bulbo.

CAP. CLXII.

βόλβον vomι-
τικόν

Bulbuſ, quem Vomitorium uocant, folia habet lentiora & multo longiora cibario Bulbo, radicem conſimilem, cortice nigro uetiſſiā. Vomitiōeſ concitat, ſi per ſe comedaſ, aut eiſ decoctū ebibatur.

¶ De unguentaria Glande.

CAP. CLXIII.

D**G**lans unguentaria, fructuſ eſt arboriſ Myricæ ſimiliſ, magnitudi-
dine Auellanae nucis, cuiuſ nucleuſ græcarum nucum more tri-
tuſ, humoreſ reddit, quo ad precioſa unguenta pro oleo utuntur. Naſci-
tur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido Iudææ. Præſertim
ple-
na, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere pota-
liem abſumit. Cum Erui farina, & aqua muſſa, podagriciſ illiniſ. Pſoraſ
lepraſq; decocta in aceto, uitiſigineſ & nigras cicatriceſ cum niſtro emen-
dat. Et cum lotio lentigineſ, uaroſ & papulaſ in facie, & cutiſ uitia tollit.
Vomitioneſ mouet. Aluū cum hydromeliteſ reſoluit. Stomacho aduerſa
tur. Oleū quod ea exprimitur, aluū potuſ ciet. Cortex eiſ magiſ adſtrin-
git. Verum tuſæ & expreſſæ recrementum abſtergentibuſ medicamētiſ
adiſcitur, quæ aduerſuſ prurigineſ, & ſcabriciaſ idonea ſunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 12. ca. 22.

Balanuſ Myreſpica, ſiue ut Pliniuſ, et Aetiuſ appellat, Myrobalanuſ, hoc eſt, Glanſ ungue-
taria, ex arbore ſit cui foliū, ut inquit Pliniuſ, Heliotropiū: ut Theophrāſtuſ (niſi librariuſ cor-
rupit) Myrti: ut Dioſcorideſ, Myricæ, diſtaxat oblongiuſ. Arbor grandis, incorruptaq; ſed
contorta. Unguentarij corticem glandiſ eiſ premūt, odoris gratia. Medici nucleoſ tundunt,
affuſa paulatim calida aqua, etiamſi Theophrāſtuſ inutiſeſ eſſe dixit. Galenuſ unguentariuſ ut
ſcribit, expreſſæ carniſ ſucco, medicis quoq; utilem eſſe, carneſ eiſ pro uomitorio ſumentibuſ
affirmāſ. Glanſ ea magnitudi-
ne, & aſpectu Cappari, aut nuci potiuſ Auellanae ſimiliſ. Lignū
robuſtiū, uſu præcipue nauali, in Arabia naſcenſ. Syriaca dicūt, & eſt candida. Contra in The-
baide nigra. Præſertim illa bonitate olei, quod exprimiſ, ſed copia Thebaica. Inter hæc Troglody

tiſſima eſt. Sunt qui Aethiopiam his præponant, glandem nigrã, nec pinguem, nucleoque grãcilis, ſed liquore, qui exprimitur, odoratiore: naſcentem in campeſtribus. Aegyptiam, cuius & Hippocrates ipſe meminit, pinguiorem eſſe, & craſſiori cortice rubentem, & quis in paluſtribus naſcatur, breuiorẽ, ſicciorẽque. Ediuerſo Arabicam uiridem, ac tenuiorem: & quoniã ſit montana, denſiorem. Longe autẽ optimã Petrãam, ex oppido quod uocant Petrãam. Plinius, & alij nigro cortice, nucleo candido. Diſfert a glande unguetaria: quã nux Odorata, ſiue Muſcata uulgo dicitur, incognita ueteribus (ut exiſtimo) de quã in Macher.

EX M. VERG. COMM.

C Appari magnitudine figuraque unguentariã hanc glandem comparauit Theophrastus. 4. de plantarũ hiſtoria uolumine: utique ea unguentarios, & ipſe teſtatur eſſe. Eamque ob cauſam Plinius libro. 12. capite. 22. Myrobalanon uocauit, eadem eiufdem rei ſignificatione cum ſcriptore hoc: qui Myrſicen Balanon eam inſcripſit, quod ſcilicet unguentis tantũ inſeruat. Diximus primo uolumine de Palmulis agentes, quod ad Balanos grãciamque Balanorũ uocem pertineret, ideoque relinquendũ hoc loco quod dictum ſemel eſt, ne totiens idem repetat. Quod pro rei ipſa etiã dicendum fuerat, a Barbaro undique collectũ in Corollario eius expoſitũ omnibus eſt. liſdem enim uerbis, ut erat in cunctis diligẽs, ex Theophrasto, Plinioque omnia de unguentaria hac glande reddidit: ſignauitque diligenter, in quibus antiqui ſcriptores illi in eius hiſtoria diſcreperẽt. Nobis monuiſſe tantũ ſupereſt, augere uateque aliquo opus eſſe, ut intelligamus, quo nã modo unguetaria hæc Glans a priore libro, qui proprius illi inter unguenta aut aromata locus erat, in quartũ, & ad uulgares herbas tranſierit: quod conſpicere hæcenus nobis non licuit.

De Narcisso.

CAP. CLXIII.

N Arciſſum, aliqui Narciſſon Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitariũ. Sunt & qui ut Lilium, Lirium appellarint. Folia porro ſimilia, tenuia, multo minora, & anguſtiora, cauſis uacuis & ſine folijs ſupra dodrantem attolitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibuſdam purpuretis, radix intus alba, rotunda, bulbosa, ſemen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatiffimum naſcitur in montibus, ſuaui odore. Cetera porrum imitatur, atque herbaceum uirus olet. Radix cocta ſiue eſtur, ſiue bibitur, uomitoria eſt. Ambuſtis igni prodeſt cum exiguo melle trita. Præciſos neruos illitu glutinat. Luxatis maleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita, ex melle & impoſita ſubuenit. Vitia cutis in facie, uittiliginisque cum ſemine urticæ & aceto emaculat. Cum eruo & melle ulcerum fordes expurgat. Abſeſſus rumpit concoctioni repugnantes. Inſixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

BARBARI COROLL.

N Arciſſo, ſoliũ Albuc, terræ proximũ, ſed latius, ut Liſſo pingue, frequens, anguſtiũ cauſe ſine folijs herbaceo. Flos in cacumine, poſt Arcturũ, & circa æquinoctiũ, ac uere, item poſt Lilium, & Violam, Flãmẽam uocatã, membrana incluſus ceu uacuſco, ampliufculus, nigricans, oblongus: qui deſluens, ſponte germinet: præſertimque defixus in terrã, manu ſeritur & radice ampla, rotunda, carnoſa. Cauſis, & cum eo flos erũpit, ut in Croco, anteque ſoliũ: quod non anteque reſſeſcat, cernit. Cauſis cum flore ſuo emoriſ. Radix Bulbo aſſimilis, niſi quod non eſt ſquamata. Narciſſus ter floreſcendo, tria ſationũ tempora demonſtrat. In coronamenta flore ueniens, a nãrce, hoc eſt, corpore dictus, quantum caput grauẽt, non ut ſabulæ a puero. Plinius duo genera conſtituit. Vnum flore candido, calice purpureo. Alteri cetera eadem tribuit, ſed calicem herbaceum. Omnes inquit ſerotini, poſt arcturum enim floreſcunt, ac per æquinoctium autũmni. Duo hæc inquit genera medici præcipiũt, quaſi & alia ſint, quæ non recipiant, hoc eſt (ut arbitror) genus illud quod uere, aut æſtate naſcitur: ut ex Theophrasti ſentiẽtiã prædiximus. Sciendum porro eſt, cum florẽ eius nigrum a Theophrasto dici legimus, non de flore ipſo, quẽ candidum eſſe cõuenit, intelligi, ſed de ſemine: quod & membrana contegi, & nigrũ, ac prælongũ eſſe conſtat, quo in terrã cadente, propagat ſe, atque ſerit Narciſſum, Eumachus cyrenæus in Rhĩ

vdprius

B

Theoph. li. 3.

Crotomico, etiā Crotalō & Acalida Narcissum uocari tradidit. Nā Crotos in Hippo crate, ad ulcera uetera, & uulnera recentia p̄bata, qd aliud sit q̄ Narcissus, nō ideo. Nisi quis Crotū pro Crotone, hoc est, Cici capiat in eo. Iulius Pollux auctor est, Theophrasti morē fuisse, Lirū pro Narcissō dicere. Homerū uero Lirij appellatione complexū, florū omne genus. Narcissum ab adolecente sui met amore capto, & in eum florē conuerso, natū in Boëtia Thespiensis garriunt, fontē Donaca monstres, ubi se specularē puer stultissimus: qui umbrā suā a se nesciret distinguere. Coarguit hanc fabulā uetustissimus poëta Pamphilus, qui Proserpinā multis annis antequā Narcissus esset, captam a Plutone cecinit, carpentem Narcissōs.

E X M. V E R G. C O M M.

Lilio congenerē Narcissum antiquiores oēs faciunt, a Lilio statim continuata historia de eo agentes. Omnīq̄ certissime Theophrastus lib. 6. de plantis: historia his uerbis inter cetera de eo agens. ὁ δὲ νάρκισσος ἢ τὸ λείριον, οἱ μὲν γὰρ τοῦτο δι' ἡμεῖς καλοῦμεν. Quod est. Narcissus autē aut Lirion. Sunt em̄ qui hoc, & qui illo noīe appellent. Manifesto argumēto, congenerē, aut si milem saltem Lilio Narcissum esse. Ex quo Lirion, qua uoce Lilia ueteres appellauerūt, & ipse quondā dici poterat: & si ex antiquis græcis testatū aliquot fuerint, Lirion priuatim Narcissum indicare. Quemadmodū Crinon solū Lilium. Addiderūt quidam, etiā ab Homero flores oēs una Lirij appellatione indicari. Quod & Aristophanes in Comœdia etiā seruasse creditur. Sed quemadmodū nos in scriptore hoc, & in alijs obseruauimus, naga hæc noīa, similitudo, & pene eadē natura fecit. Vocariq̄ solitū Lilium a græcis Lirion, manifeste hic scriptor ostendit, cū ait. Quidam etiā quemadmodū Lilium Lirū Narcissum uocāt. Videnturq̄ Latini una tantū mutata litera, & ut balbutientes solent pueri, pro, r, l, pronūciasse: sicq̄ ex græcor: Lirio suū Liliū fecisse: eodē modo quo lepidissimus græcor: comicus in Equitibus suis blefa lingua in conuersione loquentē Alcibiadem finxit, ἐλάς θύλαος κίφωλον κόλακος ἔχῃ. Cum tñ in eo qd intelligi uolebat, ubi, l, litera audire intelligenda, r, erat, ἑρᾶς θύραος κίφωλον κόλακος ἔχῃ. Sed ut rem nostrā agamus, p̄ cōpto sit, congenerē Lilio, aut illi penitus simile Narcissum esse: & quoniā dolores & torpidas capitis grauitates faciat, a narce, q̄ uoce græci torporē indicant, nō a fabuloso puero, ut poëtae finxerūt, Narcissum græcis dictū fuisse. Testes in eo noīe rōnis eius sunt. Plinius 21. uolumine, cap. 19. & Symposij sui, 5. cōmentario, cap. 1. Plutarchus. Cuius obiter de Narcisso uerba hæc sunt. καὶ τὸν νάρκισσον ὡς ἀμυδρόντα τὰ νύκτα, καὶ βαρύντα τὰ ἱμνηοῦντα νάρκωσις. ὁ δὲ καὶ σοφοῦς ἀντὶ τὸ ἀρχαῖον μεγάλων θύων τοῦτο τῶν χθονίων σιφάνωμα προσήρηνκε. Quod est. Et Narcissum appellauerunt, quasi neruos hebetantē, & torpidas facientē grauitates. Quapropter & Sophodes magnor: Deorum, id est, subterraneorū coronamentū eum uocauit: q̄ scilicet defunctū & morte torpidū, torpido flore merito coronaret. Anydron uocasse quosdam Narcissum etiā in Dioscoride legitur: idq̄ nos factū illi nomē credimus, q̄ longe ab aquis in montanis floret. Quod etiā illi adiectū est Autogenes, quæ uox a seipso gentū, uel per se nascens significat rationē eam habet, quā Theophrastus his uerbis indicauit. ὅντος δ' ἐκ πίπλων ποτὶ βλάσκειν ἐντόματον, de flore & semine dicta ea sunt, significantq̄. Hic autē decidens sponte sua germinat & nascit. Etsi idem scriptor statim testetur, colligi semen eius, seriq̄ opere humano, nec minus etiā, ut in ceteris Bulbis plantari radicem. Vocari a quibusdam etiā Vomitorio Bulbum in Dioscoride audimus: haud sane, quia idem Vomitorio Bulbo sit, qui, 2. uolumine descriptus est, sed quia Bulbosq̄ radices, simulq̄ Vomitorius ut ille est: quē in antiqua medicina habet p̄cipuū usum. Serebat quondā in hortis ad coronamēta Narcissus: nūc montanis locis, in qbus nascit, quærendus est, non difficilis inueni, si diligentius quærat. Totam em̄ excēpta caulis altitudine, & calathi ambitu, quæ duo minora, q̄ in Lilio sunt, Lilioz: speciem referre eum testat oēs sunt. Et præter id serotinus flos (post arcturū enim Augusto mense, & ad Autumnū æquinoctiū floret) inter Lilia floresq̄ alios, qui fere oēs tunc defecerūt, latere nō potest. Habet & alias in scriptore hoc notas, qbus deprehendi possit: Folia porracea: quæ Plinius in radice esse illi ait, minora tñ & angustiora: Concauū caulem, & sine folijs dodrantali altitudine: Postremoq̄ florem candidū, in medio crocēū: & quod alteri eius generi competat, necesse est, in aliquibus purpureū. In qua descriptione, nisi in cunctis græcis, q̄s hactenus uidere licuit, uisū sit, ratiocinari oportet, duplicem esse Narcissum. Quod Plinius sane manifeste indicat de obus locis. Primum, 21. uolumine, capite, 5. in Liliorū historia, dicens. Narcissum uocant, huius alterū genus candido flore, calice purpureo. Mox eiusdem libri, capite, 19. Narcissi duo genera in usu medicæ recipiunt. Vnū purpureo flore: & alterū herbaceum. Non leui, ut uidetur in doctis his uarietate. Siquidē in priore illa descriptione, alterū Narcissum flore candido, & calice purpureo: in posteriore alterum purpureo flore, alterum uero herbaceum esse dixit. Theophrastus quod

D

hactenus in eo obseruauerim, cum sæpius Narcissi meminerit, nulla huiuscemodi generum diuisione usus est: semperq; tanq; unus Narcissus sit de eo docet, nunc folia, nunc flores diuident, nunc caulem describens: a quo credimus Plinium alterum genus herbaceum uocasse. Siquidem in eius historia inter cætera auditur, τὸν δὲ καλὸν ἀφροδίτην ἢ πεῶδιν δὲ. Quod est. Caulem quidem sine folijs, uerumtamen herbaceum. Ex quo potuit Plinius non a flore herbaceum alterum id genus appellare. Non ideo tamen non recipiendum duplicem Narcissum esse. Hoc enim a Dioscoride Plinioq; & ab alijs traditur. Sed quæ eorum discrimina in flore docentur, non satis & in scriptore hoc & in Plinio certa sunt. Cætera quidem, ut ex Theophrasto patet, eandem habent historię ueritatem. Ille enim, s. de plantarum historia Narcissum his uerbis descripsit. Narcissus uero, aut Lirium (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellant) solum Asphodeli figura terræ proximum habet: latius tamen q; Asphodeli, & quasi liliaceum. Caulem nudum quidem folijs, uerumtamen herbaceum: in summo cuius flos est. Semen ueluti in uasculo membrana quadam clausum, grande, nigrum, & figura oblongum. Id decidens sponte sua germinat. Verumtamen id colligentes, etiam in terra depanguit. Serunt & radicem, quā rotundam, carnosam & grandem habet. Serotinus flos est. Post æstuum enim & circa æquinoctium floret. Idem eodem libro in foliorum disciplina ait, Narcissum angusto, numeroso, & pingui folio esse. Nec multo post de caulibus plantarū agens ait. Mirabile autem in cūctis quod in Scylla & Narcisso accidit. In alijs enim & quæ a principio cōserunt, et per se regerminant, uere folia primum prodeunt, dein caulis: in his autem, id est, Scylla & Narcisso caulis præcedit, & in Narcisso floribus tantum caulis. Post quæ cum longius descripsisset Scyllæ caulis & floris ortum, subiecit. Cū autem caulis hic confenerit, tunc post aliquot dies folia prodeunt. Similiterq; & in Narcisso sit, πλὴν ὅντι καλὸν ἔτιρον ἔχει παρὰ τὸν τοῦ ἀνθεος ὤσπιν ὑπερβῶν. ὅντι καρπὸν φανερὸν ἔλλα χεῖ, ἀντὶ τοῦ ἀνθεος ἂν καὶ τῷ καυλῷ κατὰ θένει χεῖ, ὅταν ἔκταν ἔκταν τὸ τὰ φέλλα ἀνατίλλει, id est, Verumtamen nullū aliū caulem præterq; floris causa prolatum, ut præmonstrauimus, Narcissus habet. Manifestum, idem non habet semen. Flos autem ipse una cum caule arescit, & cum auerit, tunc folia emergunt. Præterea florere prius Scyllā, postea uero Narcissum, idem paulo post testatur scriptor. Nosq; tam multa ex eo collegimus, ut facilius & certius deprehendi possit tanti nominis in antiquorum cononamentis flos. Quæ enim Plinius diuersis locis de eo tradidit, ex Theophrasto quidem deflexa sunt: sed tanta breuitate ab eo tractata, ut obscuriora legentibus aliquādo sint: & ut respondere sibi inuicem Theophrastus & Diosc. uideantur. Cuncta enim de folijs, caulibus, & semine ambobus eadem sunt. Floris color, & coloris discrimen in Theophrasto tantum desideratur: idq; obseruasse & discreuisse legentes oportet: præsertimq; quod hic croceū & purpureum in medio describit, quod Plinius florem appellat, non satis cōtē intellectu, totum nē florem sic uocet, an quæ crocata in eo sunt & purpurea, ut hic manifeste docet. Potest enim utraq; pars flos dici: quemadmodum in Viola nigra de duplicis floris ex disciplina Theophrasti floribus diximus. Nos in Appenninis montibus his nostris, frequentem uidimus florem Augusti & Septembri mensibus florentē, figura Lilij, dodrā tali altitudine: folijs qualia in Narcisso hoc describuntur: singulari caule, isdemq; alijs omnibus, excepto colore, qui nec cādidius, nec purpureus ut Plinius docet sit, sed inter candidum & luteum colorem nullius, aut exigui odoris. Vidimus & in mitioribus collibus natum, sed non tam speciosum, & magis albicantem: diuq; credidimus Narcissum eum esse: neq; ab opinione ea longius adhuc discedimus. Indinat enim animus, potuisse antiquis uagum Narcissi nomen esse: & ut in plantarum disciplina sæpe alias testati sumus, congeneribus, similibusq; multis cōmunem eam appellationem fuisse. Tantūq; abest, ut constituamus luteo colore Narcissum esse: ut inueniendum hunc florem legentibus relinquamus, q; candido colore sit, croceis intus staminibus, & in aliquibus purpureis: quod unū in colore eius a Diosc. discrimen tradit. Nobis enim hactenus uidere non licuit candidos Liliorum figura flores, capillamentis, aut staminibus intus purpureis. Relinquimus etiam peritoribus cogitandum, probauerit ne hic scriptor Narcissum simpliciter montanis locis nascētem, ut a satiuo & hortensi fecerret: an desiderari ultra aliqd possit, quale scilicet Plinius ait probatissimum nasci in Lyciæ montibus: in quam partem propensiores trahimur. Superlatiuum enim illud καλίστος, certiores sibi nescio quomodo natales locos exigere uidetur: & præpositiuus ille articulus eodem sensu rem etiam indicare credi potest. Suspicio tamen hæc sit, non deeret. Qualis etiā est in uerbo πρασιῖν, quod statim sequitur, significet ne uirescere, & herbarum colore esse: an potius a Porro uerbum factum fuerit, significetq; Porri odore sentiri. Quod tamen nullibi inuentum in antiquis a nobis est. Quæ omnia diligentius obseruanda & constituenda alijs relinquuntur.

C

De Hippophæe.

CAP. CLXV.

ἵπποφαῖς

Hippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophanes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecinō, Romani Lappaginem uocāt, quo fullones uestes interpolant. In fabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, denso & largo, folijs Oleg. longioribus, mollioribusq;: inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. Flores Hederæ corymbis similes, racematim cohærent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti, ex qua perinde ac Thapsia succus eximitur: qui cum Erui farina subactus siccatur, & ad usum reconditur. Pituitas, bilēq; detrahit oboli pondere cum mulso & quatuor obolis Erui farinæ. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum depromitur, uti in Thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

B A R B A R I C O R O L L.

Hippophæes, siue Hippophyes, & Hippopheon Hippocrati. Galenus hanc & Gnaphon, & Stybon, & Styben quoq; dici putat. Nomen uidetur accepisse, quoniam forte accommodata sit equorum naturæ: quemadmodum & ea, quæ Hippophæston uocatur, post hanc dicenda. Sunt enim unius fere generis, in binas diuisi species. Vtrūq; nostri Lappaginem (ut arbitror) appellauere. Similis inquit Plinius Anagallidi Lappago uidetur, nisi esset ramosior, pluribus folijs, graui odore. Quæ talis est, Mollugo dicitur, quæ uero asperioribus folijs, Asperugo. Neruorū qdē causis uilem Hippophæston Diosco. affirmat. Plinius Lappaginē, quæ dicatur Mollugo. Vnde colligunt nonnulli eandem esse Hippophæston, & Molluginem.

D

E X M. V E R G. C O M M.

Sciendum primo est, spinosum fruticem esse Hippophæes: neq; a Diosco. tantum hoc habitus describi, uerum a Theophrasto, Plinioq; etiam: quorum alter spinis albis esse dixit, alter *ἵπποφαῖς* descripsit, id est, nullas habere in folijs, sed ut hic ait, inter folia spinas: quales ab eodem plures alie numerantur. Idq; in eius historia tam manifeste patet, ut nihil de spinis dubitandum sit. Mox ope spinarum quas habet, ad usum uestium translatus a ueteribus fuisse: nec aliud significare Diosco. cum ait, *ἡ γὰρ ἵπποφαῖς τὰ ἱμάτια*, id est, ut nos uertimus, quo uestes uellicando poliantur. Id enim est *ἵπποφαινον*, & ut Athenienses dicere consueuerant *ἵπποφαινον*, id est, *καταφαίνον*, quod uellicando expolire significat. Quæ autem uestium expolitio hæc spinis facta esset, facillimam habet coniecturam: eandem. scilicet aut illi similem, quam carduis, aut hamis-ferreis ætas nostra in nouis & obsoletis uestibus querit, iacentem, aut longo usu attritum pilum erigēs: & si in textura flocci, festucae uel, aut alterius coloris aliquid inheserit, ope spinarum illarum extrahēs. Eamq; ob causam Galenus Hippophæes hoc Gnaphon etiam uocat: Græcorumq; grammaticorum exponentes uocem, dicunt *ἡ δὲ ἵπποφαῖς, ἡ δὲ ἵπποφαινον τὰ ἱμάτια*, id est, Gnaphæ spinę sunt, quibus expoliuntur uestes: quasi non sola hæc spina eum quondam haberet usum, sed plures honoris eius prærogatiua gauderent. Sic etiam *καταποτρίβονα φαίνοντα* dixerunt, id est, quæ uellicantur. Galenus tamen, ut diximus, priuatim Hippophæes hoc Gnaphō appellauit. Quæ causa etiam fuit, ut quemadmodum in Diosco. nunc legitur, Romani Lappaginem id dicerent. Nec aliud significasse nobis Plinius uidetur, cum ait lib. 27. cap. 10. Hippophæston nascitur in spinis, ex quibus sunt æneæ fulloniæ. Aeneas enim, ut credimus, uocauit ad eundem usum æneum instrumentum aliquod hamatum, forficulatumue: quod primo ex ære factum, nomen in spinis postea seruauerit: auditq; ænearum nomine, instrumentum, additis deinde fullonijs materia & usus intelligeretur. Credimus fore, ut uideantur aliquibus nostra hæc duriora, præsertim cum fulloniam, & fullones receperint iam pridem in latina re omnes. p. his q. uestes purgant: & lotura, aut infectione candorem illis, aliumue aliquem colorem acquirunt. Quod nos non negamus: neq; his quæ nos p. Hippophæe hoc dicimus aduersantur, quæ illi de fullonibus dicunt. Potest enim utrumq; ab eisdem tractari: nec repugnat, posse eum qui uestes lauet, aut in

friciat, eadem qua diximus ratione expolire. Nos enim antiquæ uocis rationem & ueterum au-
toritatem secuti, quales *κναφίρ* quondam fuerint, & quæ uerbi *κναφίρ* significatio sit, demon-
strauimus: quæ nulla alia est quæ, ut græce loquamur, τοῦ ἀποφύιν καὶ ἀποφύινιν, id est, deradendo
expolire uellicareque: & si id patiuntur grammatici, expilare. Nasci fruticem hunc Plinius ait sabu-
lohis, maritimisque locis, scriptorem hunc secutus. Theophrastus sabuloso quidem, sed tenui so-
lo: quod pro ea quæ paulo ante ab eo accepta diximus, querendas cognoscendasque facile notas has
illi tribuit, *μονόφυλον δὲ ἰσπερσὶς ἰσχυρὸν καὶ χαμαίκαυλον*, *βλαστάει δὲ καὶ ἀνθὶ τοῦ θύρου καὶ διαμίνει*
τὸ φύλλον χλωρὸν ἕχρι πλειάδας, *καὶ χεῖρει ὑδάμνισι καὶ λιπτοῖσι χερσὶν*. *Λίγεται δὲ ὡς ἐν τοῖς ἰσχυαίοις*
ἀνθὶναι φύσθαι καὶ ταῦτα περὶ τὰ ἕκτα καὶ ἐν ἑκκλίσιο τόποις φύσθαι. Quorum sensus est. Singularem ra-
dice nititur in terra Hippophæas: terrestre est, & caules per terram spargit: per æstatē germinat
& floret: permanetque uiridi folio usque ad pleiadem autumnī. Sabulosum & tenue folium amat:
diciturque locis cultis nasci nolle, cum tamen circa oppida & apricis locis nascatur. Hæ Hippo-
phæas notæ a Theophrasto numerantur: quæ ideo a nobis repetitæ sunt, ut pluribus ueluti te-
stibus deprehendi sãrens frutex possit, & cuius non satis certa nominis origo est. Plinius cõpo-
situm ab equo nomen opinatus, ait. Debent (de Hippophææ & Hippophæsto sermo illi est) ac-
comodata esse equorum naturæ, neque ex alijs causis nomen accepisse. Quippe quædam animalū
um remedijs nascuntur, locupletī diuinitate ad gerenda remedia, &c. Quod si recipiatur, po-
terunt eandem cætera quæ pariter composita in græcis fuerint habere rationem.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

Hippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur
eisdem locis quibus Hippophæes, estque spinæ fulloniæ genus,
humilis herba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tantum capitulis, folijs
paruis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice et
folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui uoles tribus obolis in aqua
mulsa, aquam pituitasque detrahit. Priuatim comitialibus morbis, neruo
rum uitijs, & orthopnæce conuenit huiuscemodi purgatio.

BARBARICOROL.

Hippophæston, hæc uidetur quam Plinius Hippophyes, Theophrastum sequutus appel-
lauit, tributam ei proprietatem scribens, quod fructum spinosum habeat. Nascitur in spinis, ex
quibus sunt ænæ, ut idem inquit, fulloniæ, capitulis inanibus, folijs multis herbacei coloris,
radiculis candidis, quarum succus exprimitur æstate. Idem Plinius sexto decimo uolumine,
hanc non Hippophyes, sed plane, ut Dioscorides, Hippophæston nominat, inter herbas quæ
fructibus alijs circumuoluunt sese: quod notatur inquit, & in spina fullonia Hippophæsto,
caliculis inanibus, folijs paruis, radice alba, cuius succus ad detractiones in comitiali morbo uti
lissimus habetur. Qui locus in Plinio, deprauate legebatur ante nos, ita ut ne intelligi quidem
posset a peritis. Paulus non Hippophæston per, i, sed Hypophæsto p, y, scribendum putauit.

Miscuerunt in græcis & in latinis aliq̃, quod p̃monstratū mō est Hippophæes, & qd̃ hunc
tractamus Hippophæston, nominis similitudine decepti. Persuasileque id eis uidentē s̃dē
amborum natales, & in artibus usus. Vtraque enī fullonia spina, eadēque in morbis utriusque plura
remedia sunt. Verūt̃ scorsum a peritioribus actū de utraque est. Neque enī oīa penitus eadē utriusque
in historia & medicina iunt. Quinetiā Paulus Aegin. li. 6. cū de Hippophæe primū egisset, non
multo post de Hippophæsto agit. Necut Hippophæes cõposito à uoce hippo nomie scribit, sed
a p̃positione ἵππο. Hypophæsto. Quā rationē secutus etiā lib. 27. ca. 8, Plinius est: quāuis antea
lib. 22. cap. 12. & hæc, & Hippophæes dixisset, debere equorum naturæ accommodatas esse. Nos ut il-
lius, sic etiā huius nominis rationē ignoramus. Oportet tñ & hanc auleatā intelligere: ex q̃ hic
ait, & hanc fullonię spinę genus esse. Ratiocinarique facile erit, ut superiore capite p̃monstrauimus,
omnes quibus possent uestes qua ratione diximus expoliri, cõsuetuisse ueteres *κναφίρ*, & *κναφίρ*
κναφίρ, id est, fullonias spinas appellare: & ex earum censu hanc etiā esse, quæ non difficilis in-
uentu erit, tam certis notis ab hoc scriptore describitur.

De Ricino. CAP. CLXVII.

Cici, aut Croton aliqui Sesamon syluestre uocant, alijs Seseli Cy-
prion, alijs Crotona. Aegyptij Siftamna, aliqui Trixin, Magi
Ζή

A

ἰπποφύιστον
ἰπποφύισ

B

Pli. li. 27. ca. 8.
lib. 22. cap. 12.

VERG.

ἀνὴρ κρότον
εἰς κρονον ἔργον

C Sanguinem febris, Latini Ricinum, alij Lupam. Id nomen accepit, a Ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parua Ficus altitudine, folio Platani, maiore, lauiore & nigriore, ramis caudicibusq; catiis in arundinis morem. Semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinū animal representat: ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibis foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt. Vomitiones mouet. Sed iniucūda admodum est, & molesta purgatio. Siquidem stomachū uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uaroseq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes māsas cohibent. Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 23. ca. 5
lib. 15. ca. 7.

Cici ab ea differt quae Cuci a Plinio, & Cuciphoron a Theophrasto dicit. Cūci folio & caudice in Aegypto Palmae similis: quando & eius folijs utuntur ad textilia. Differt, q; Palma indiuidua est, At haec cum adolescit, in brachia ramorum spargitur: quae pari modo & ipsa fiunt, uirgis breuib; neq; multis. Pomo rotunditas, quae manum implet, colos fuluos, commendabili succo, ex austero & dulci, nec congesto ut Palmula, sed discreto; lignum intus grandis, firmeq; duricē: ex quo stragulares annulos detornant, ut Theophrastus inquit: aut uelares, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandū nō possit, nisi pluribus diebus aqua maceratus. Materies nō ut Palmē rara, nervosa, uirens: sed spissa, carnosa, grauis, dura, crispioris elegantiq;. Et ob id in magno honore Persis, ususq; ad lecteides. Hāc a Theophrasto & Persicā textilē uocari. Thebaica pfectura copiosam, si q; arbitrant, coniecturam potius, q; rationem sequunt. At Cici arbor, quam Herodorus Sillocypriū uocauit, Ricinus a nostris dicitur, ut ipsum quoq; animal, canibus praecipue infestum, qd & Cynorasta graece dicit, & Croton: quanq; Theodorus Crotōnas redivos cōuertit, non ricinos. Ferri ni etiam nū hodie, ut ex Didymō zenotele accepimus, q nobis a secretis est, & Anagnostes, uernaculo uocabulo Rhaistas canum uocant. Dicunt & Cynomyg, a quibusdā. Sed & ouibus molestos esse Ricinos testis est Caro. Vulgus ipsū eos graeco nomine appellat Cica, Galenus Cica dici uult etiam bestiolas quae frumentū corrodūt, quarū coetus Cion dicitur. Is uermis etiam Cīs uocatur: ut infra quoq; diximus. Hippocrates hanc arbore uidetur intellexisse, cū Crotonē deos radicem in medicinas quasdam adhiberi commonet. Aliqui non solum Cici, sed Ciceam quoq; nominant. Ab hac arbore conficta surium uocabula, Cicilendrum, & Cecimandrum, in Plautina fabula, si dixerim, diuinare potius q; docere uidear.

Herod. i Eut.
libro. 2.

E X M. V E R G. C O M M.

Copiosus in Aegypto quondam nasci Ricinus hic dicebatur. Idq; uerisimile est: quoniam luminum necessitas, sine quibus usq; nullus est per tenebras usus, faciendis lucernarum funiculis, & oleo aptum deficiente alio omni, optabilem genti illi fruticem secerat. Ersi Plinius lib. 11. cap. 5. testetur Elychnia qdem ex eo fieri claritatis praecipue, ex oleo tamen propter nimiam pinguitudinem lumen obscurum. Nec aliud hic idem scriptor primo uolumine significauit, dicens Aegyptios multum indigere, & copiose uti Ricinino oleo. Cogebant enim quod comicus ait, si non possent quod uellent, id uelle quod possent. Plinius. 11. uolumine, capite. 1. altitudine Oleae in Aegypto & Hispania prouenire ait, caule serulaceo, folio uitiū, semine uiuarum gracillum pollidarumq; quas hic βότρυς τραχὺς dixit, id est, racemos asperos. Theophrastus duobus locis, primo de historia, mox secundo de causis plantarum nihil aequè in eo admiratus est, q; ut ille ait, foliorum ἀνομοιότητα καὶ μεταχρηματισμόν, id est, inaequalitatem, siue dissimilitudinē & τῆς formationem. Numerauitq; primum inter ea quorum folia diuersis temporibus diuersa figura uidentur: uerbi causa, a principio rotunda, mox cum creuerint angulosa, aut ediuersa; qualia ostendunt Hedera, Populus alba, & Ricinus hic. Suntq; de eo scriptoris eius haec uerba. τὰ δὲ φύλλα τῶν ἡμῶν ἑλλάνων διέφερον ὅμοια πάντων ἀντὰ ἑαυτοῖς. τῶς δὲ λίνκου καὶ τοῦ κισσοῦ καὶ τοῦ καλονόμενου κρέτωνα ἀνόμοια, καὶ ὑπερῶν μόνά, τὰ ἡμῶν γὰρ ἴσα περιφύει τὰ δὲ παλαιότερα γυνέσθαι. καὶ ὡς τὰς ἑτέρας πάντων. Rursusq;. ὁ δὲ τὰ φύλλων μεταχρηματισμός καὶ ὑτέρων κοινός. ἴππ καὶ τὰ τοῦ κρέτωνα π-

πιστῆρ φρούρα τὴν ἀρχὴν ὅτις ποὺ ἀπογονοῦται καὶ ἀπὸ τῆς ἀναδιαστροφῆς. Quorum sensus est. Aliarum uero omnium arborum folia ipsa sibiipsis similia sunt: Populi uero albæ, Hederæ, & eius quæ uocant Ricinum dissimilia, & alterius figuræ. Noua enim & a principio circinata: adultiora deinde angulosa. Et omnium mutatio talis est. &c. Rursus. Foliorum uero transformatio & alijs cõmunis est: quoniam eius qui Ricinus nominatur, a principio nascentia folia circinata sunt: tẽpore dein de angulosa fiunt: quasi dearticulenta. Quam rationem ex Theophrasto a cæteris relictam addere placuit: ut hac nora etiam deprehẽdi Ricinus possit. Et si uulgaris iampridem hic frutex sit, seraturq; passim in hortis ad spectaculum. Neq; enim ætate hac nostra alium, quem sciamus in medicina, aut reliqua uita usum habet. Vocatq; Ethuria Phaselum Romanum. Diximus de eo etiam in Ricinino oleo: eamq; ob causam non erimus in descriptione eius longiores. Id tẽm testamur, uera esse quæ hic ait, Vomitiones dẽre, & per inferna laboriosa purgatiõe purgare. Scimus enim pueros aliquando deuoratis incaute seminibus eius aliquot, integram cum sua nocte diem paulominus q̃ ad mortem eo cibo periclitatos.

A

T De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septem, quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus Cometes, aut Amygdaloïdes, uel Cobios. Alter Myrthites, qui foemina existimatur, eũq; Myrsynitem, aut Carty itẽ uocant. Tertius Paralys, quem Tithymalida appellarunt. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dẽdrodes. Septimus Platyphyl

B

T BARBARI COROLL.

Tithymalum, & Tithymalus penultima producta, Meconion a quibusdam uocatur. Non sibi Lactucam appellant caprinam, marinamq;. Aliqui Lactariam, quia & Græci Galactida nuncupare soleant. Lactẽ Tithymali inscripto corpore, cum inaruerit, si cinis inspergatur, narrant apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, q̃ codicillis. Vfus iam & in castra, & obfessas urbes transit.

Pli. li. 26, ca. 10
lib. 20, ca. 19, et
26, cap. 8.

C De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Characis caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo, atq; acri madent. Folijs Oleę circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pender in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nasctur in asperis & montibus. Succus aluum purgat: Trahit pituitam bilemq;, binis obolis in posca sumptis. Et cum aqua mulsã nomitiones mouet. Appetente uindemiarum tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & uase reclusis excipitur. Aliqui ad iiciunt farinam Erui, & in pastillos digerunt, qui Erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas, quaternasue guttas instillant, ut cũ his inarescant. Quas ad usus recondunt. Per se etiã tufus in pila, & in pastillos cõactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neq; quo uentus aspiraret stare quenq;, neq; manus oculis admouere conuenit, sed ante eius collectionem, corpus, præsertim, faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe; aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. Quapropter catapocia, cæra, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen, ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse satis est. Recens lac ex oleo, peruncios in sole capillos euellit. Renascentescq; flauos

Characias

C & exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cæra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pensiles, & quæ Thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedanas ulceru, gangrænas, fistulasq;. Legitur semen autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui cõdiant admisto cum lacte lepidio, & castæo contuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

B A R B A R I C O R O L L.

Characias ramos habet digitali crassitudine quinq;, aut sex. Semen legitur autumnò cum coma, succus incipiente pomorum lanugine. Tam feruentis hoc natura, ut per se extra corpori impositum, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Nascitur & in maritimis. Alia omnino est Characias, quam uulgaris sermo Charanciam appellat: quoniã sepius modo, in hortis fenestrisq; per cancellos, opere topiario digeritur. De qua ne uerbū quidem apud ueteres habitum inuenio, Balsaminam Ligures Padani uocant, Hierosolymitanum pomū Eithuria, folio uitis minore, pampini item uitii, turbinato utrinq; fructu, uisceda cute, carnosa, uerrucosaq; per uersus: cucumeris pusilli, & Bucini marini quadam similitudine, malo uerius ac tubere, q; grandi bacca, aut folliculo puniceus, maturo colore, sanguineo quoq; succo. Inanitas contracto. Semina intus aliquot lenticulæ figura coniuncta rubentia, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum.

D

De Fœmina. CAP. CLXX.

μυρσινίτη
καρύιτη

Fœmina quam Myrsiniten, aut Caryiten uocarunt, similis suapte natura Daphnoidi. Folijs Myrti, sed maioribus, in cacumine acutis, & pungentibus. Ramulos ab radice mittit dodrantaes. Fructū fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in aperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem. Sed ad citandas uomitiones inualidior est.

B A R B A R I C O R O L L.

Tithymalus Myrsinites, a Theodoro Myrtaria cõuertitur, mollioribus folijs q; Myrti. Colliguntur comæ huius hordeo crassescente. Fructus demetitur cum messium maturitate. Hic nō pariter maturescit, sed pars sequenti anno, & nux uocatur. Inde cognomen dedere Græci Caryitin. Est ubi Theophrastus Clematiam, hoc est, Sarmenulam uocarit, folijs humi sparsam, palmi longitudine. Nisi quis corruptum locum putet, legendumq; non Clematiam, sed Carytiam censet.

De Paralio. CAP. CLXXI.

παράλιον

Aliud Tithymali genus dicitur Paralios, quem Tithymalida, aut Mechona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis rubentibus, palmum altis, quinis, senisue a radice exeuntibus. Folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato. In quo semen ut Eruum, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad usus recõdit.

B A R B A R I C O R O L L.

Tithymalus Paralios, a Theophrasto Coccus appellatur, folio rotundo, semine candido, quo uua incipiente stringitur.

¶ De Helioscopio.

CAP. CLXXII.

A

ἡλίουσπιον

Aliud genus Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, rotundioribus, ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite Anethi, semine in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus, semineque ut aliorum. Eademque superioribus vires, non tamen usque adeo ualidæ.

T B A R B A R I C O R O L L.

Ithymalum Helioscopium, semine albo, columbis gratissimo: quod colligitur nigrescente uua. Nomen accepit, quoniam capita cum sole circumagat.

¶ De Cyparyssia. CAP. CLXXIII.

CY P A R Y S S I A S in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum, ex quo folia Piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. Et in totum nascentem Piceam æmulatur. Vnde nomen traxit, Candido succo madet. Cui eadem uis quæ superioribus.

κνπαραύσιας

T B A R B A R I C O R O L L.

Ithymalus Cyparyssias, caule gemino, aut triplici. Nascitur in campestribus.

¶ De Petrao Tithymalo. CAP. CLXXIII.

GE N V S T I T H Y M A L I in petris nascens, Dendroides cognominant, in cacumine largam spargens comam, succo lacteo præguans, cauliculis rubentibus, folijs Myrti tenuioris, fructu Characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, similique modo reconditur.

B

T B A R B A R I C O R O L L.

Ithymalus Dendroides, aliqui Leptophyllum cognominant, maxime cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum.

¶ De Platyphyllo. CAP. CLXXV.

PL A T Y P H Y L L O S Verbasco similis est. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus & aquæ insparfus. Reliqua Tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, eadem efficiunt.

πλατύφυλλος

T B A R B A R I C O R O L L.

Ithymalum Platyphyllum alij Corymbiten, alij Amygdaliten a similitudine appellant: nec ullius longiora sunt folia.

E X M. V E R G. C O M M.

Satis uno uersiculo, & in eo una tantæ uoce in Theriacis suis monuit Nicander, quod commune Tithymalis omnibus esset, & unde potuerint posteriores latini nomen illis apte & fideliter facere. Is autem est: ὁ ἀμφύβιον κῆτιόν τε καὶ ὕψλα γὰρ θυμαλίδας. Id est. Sampsucum, Cyrtumque, & copioso lacte plenas Tithymalidas, γὰρ enim eius gentis poetæ lac aliquando appellant. Eamque rationem secuti ueteres Romani, Lactariam herbam communem appellatione, ob commune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Mox, ut plerumque in his fit, qui parum didicerunt, quantopere undique communia esse oporteat quibus constituendum genus aliquod est, uidentes aliqui non aliter quam ex Lactuca secta Tithymalis lac fluere, Lactucam uocare incæperunt: cum tamen nullius Tithymali folium ad eius similitudinem accedat. Licetque

C Lactuca a lacte, quod secto eius caule defluit, nomen inuenit, non ideo tamen hac una in re tantum illi similes plantæ aliæ eodem illi nomine indicandæ fuerant. Nullus enim audita Lactuca, non foliorum eius similitudinem quæret; quæ inueniri in Tithymalo aliqua non poterit. Nec refert, addiderit ne illi quispiam ex re aliqua discernit, caprinamq; aut marinā uocauerit. Semper enim audito Lactucæ nomine, similem folijs illi herbam aliquis cogitabit. Idq; sentiens Celsus libro. 5. capite. 7. cum Lactucam marinā appellasset, adiecit statim, quæ Tithymalos a Græcis nominatur. Intelligebat enim q̄ late pateret Lactucæ nomen, & quatenus salutare quærentes Tithymalum id nomen posset. Multa enim ad mare nascuntur: nec si Lactuca etiam uocari Tithymalus possit, totum genus ea uox indicabit. Quæ enim a Græcis Paralios nominatur, sola ad mare nascitur, & sola uere marina dici potest. Cæteræ enim montibus, campestribus locis, inter rudera, & circa oppida nascuntur. Verisimileq; est, fuisse id nomen tantum in usu his, qui aut nullam aliam Tithymalum apud se nascentem haberent: aut medicorum, qui ea tantum ad remedia uterentur. Eadem, aut non dissimilis in caprinæ Lactucæ nomine ratio est. Vescuntur enim capræ, non Tithymalis his tantum, uerum infinitis pene alijs: nec facile erat ex eius animalis cibo tam multiplicem herbam deprehendere. Eamq; ob causam nos, auctore Plinio, multoq; magis suadente id ratione, ne Tithymalis aliæ misceretur plantæ, ex tot alijs eius appellationibus Lactariam herbam elegimus: quæ tam multis eius generibus inserviret, & communem omnibus haberet ex communi omnibus lacte indicationem. Et hæc pro Lactariæ herbæ appellatione satis dicta hæcenus sint. Quibus adderem, doceremq; longius, quæ priuatim per singulas species fecerit illi nomina antiquitas: nisi qualicui breuitate obiter interpretes ea docuissim, Vallaremq; primum eius genus uocari dixissim, non aliter q̄ & Harundinis genus quoddam Characiā, Plinius etiam uocauit: q̄ ual-lis septisq; muniendis idonea sit: qua similitudine Lactariæ herbæ primum hoc genus Characiā hic etiam uocari ait, altitudine ut hic inquit, supra cubitum: ut pleriq; autem alijs, bicubitali, & crassitudine digitali: quæ tota quantitas erigendis uallis satis est. In cæteris ex historia eorum per se ratio nominis patet. Nec nos aliud habemus quod ad eam rem certius afferre ualeamus. Eamq; ob causam relictis huiuscemodi, ex Theophrasto monebimur, Lactariæ herbæ tria tantū genera ab eo describi. Eam scilicet, quæ prima ab hoc numeratur Characiā, siue marem: Myrsinitem mox, aut foeminā: postremaq; Paralium, quæ tertia Dioscoridis est. Cuius descriptionis quoniā multa erit pro scriptoris huius historia utilitas, nō pigebit longius ipsdē uerbis ex eo omnia repetere. Quæ huiuscemodi sunt, Tithymalorum autem maritimus qui Cocos uocatur, circi nata habet folia. Caulem, toramq; plantā altitudine fere do-drantali. Semen candidum. Demeritur cum primū incaperit uia maturitate nigrescere. Datuq; siccatum semen & tritum tertia fere acetabuli parte. Qui deinde mas Tithymalus dicitur, oleaginum habet foliū: tota est plantā bicubitalis: lac ex eo in uindemia colligunt, & cū id cura uerint, utuntur. Purgat aut magis per inferna. Qui etiā Myrtites uocatur Tithymalus, colore candido, foliū habet Myrti simile, sed in summo aculeatū. Spargit hic per terrā uiticulas longidine fere dodrantes, quæ annuū fructum alternant: aliæ scilicet nunc, aliæ uero sequenti anno ab eadem radice exeuntes. Montana amar loco Tithymalus hic. Vocatur: fructus eius caryon, id est, nux. Demeritur cum ad plenā crassitudinem hordea in spica maturuerint. Cumq; siccauerint, purgauerintq; semē eius, aqua lauant. Siccatumq; rursus dant bibendum, additis nigri papaueris partibus duabus, ita ut sit totū unius acetabuli pondus. Purgat autem per inferna pituitam. Si uero nucem ipsam dederint tritam, in uino dulci bibendam, aut in friso Sefamo comedendam dant. Hæc sunt quæ Theophrastus de tribus Tithymalorū generibus quo diximus loco docuit, longius ideo a nobis repetita, ut ex eius historia, tantiq; auctoris testimonio pleraq; in Dioscoride certius cognosci possint: collatisq; simul duorum scriptorum decretis, uideant legentes, si qua aliter ab alijs reddita a nobis fuerint, auctore Theophrasto, & antiquorum græcorum ope reddita fuisse. Quale est, quod in secundo genere foeminā Myrtitem, & Caryitem diximus Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similem esse, colore albicante. Qui color, quoniam in impresso, alijsq; aliquot non legitur, relictus ab alijs est: & quod ad Daphnoides pertinebat, non plene expressum. Legitur enim in antiquissimis, τῷ Διφροειδί τῷ γύρι καὶ τῷ ἰδίῳ λυκός. Quod est: ut nos uertimus: Laureolæ, quam Daphnoides uocant, gustu similis, colore albicante. Fecimusq; id confidentius Theophrasto adiuvante, qui in Tithymali huius historia ait, ὁ δὲ μύρτις καλεῖται τὸ τίθυμάλος λυκός. Quod est, Qui autem Myrtites dicitur, candidus Tithymalus. Declarat idem Theophrastus etiam quid in Dioscoride, & in secundo Tithymali genere est, τὸν δὲ καρπὸν φέρει παρ' ἑνικτόν.

D

Quod alter ex nouissimis interpretibus uertit, Fructum fert alternis annis similem nuci. Alter, Fructum fert post annum nuci similem. Nos autem annuū fructum inuicem alternantes. Manifeste enim id docet Theophrastus. Cuius in ea re uerba sunt, *κλυστία δ' ἀπασιν ἐπὶ γὰρ ὡς αὐτὰ θάμναι, ταῦτα δ' ὄνυχ' ἀμασίβητον τὸν καρπὸν ἔδδλ' παρ' ἑαυτῶν τὰ μὲν τὸν τὰ δὲ ἕως νύκτα*. Quibus nihil certius audiri potest. Viticulas autem per terram spargit dodrantali fere longitudine. Hæ autem non simul ferunt fructum, sed annua temporum uicissitudine, aliæ quidem nunc, aliæ uerò sequenti anno. Sentiens enim Theophrastus non satis intelligi illud *παρ' ἑαυτῶν*, ut certiorē faceret rem, addidit: alias quidem nunc ferre, alias sequenti anno. Idemq; est Dioscoridi *παρ' ἑαυτῶν*, quod Theophrasto *παρ' ἑαυτῶν*. Græcæ præpositionis uis id facit, quæ carentes latini, uon possunt una uoce id exprimere. Plinius ex Theophrasto locum interpretatus libro uigesimo sexto, capite octauo, ait. Fructus non pariter maturefcit, sed pars anno sequente. Cum tamen Theophrasti uerba ea sint, quæ nos proposuimus: neq; ex communi uocum illarum æstimatione, ut nobis uideatur, locus ille aliter intelligi poterit. Idem etiam Paralion, id est, maritimum Tithymalum Coccon uocari ait. Quod forte ex Dioscoride perijt. Est autem græcis Cocco non simpliciter omnē granum, sed quod rotundum est: etsi non semper in laudatis scriptoribus ea ratio seruatur. Pertinet ea appellatio ad capituli, aut seminis in Tithymalo hoc figuram, quam in altero Dioscoride *περιβεβη*, id est, circumatam, in altero *ὡς ὄρεος*, id est, Erui figura & magnitudine ostendit. Sunt alia etiam quæ Theophrasto & huic scriptori non penitus eadem sint, & quæ in medicina aliter doceantur. Ea cognitu legentibus facilia erunt. Tria ut uidetur Tithymali genera tantum Theophrastus cognouit. Eaq; sunt, quæ prima a Dioscoride númerantur. Cætera nec illi, neq; herbarijs antiquis in hoc censu fuerunt. Siquidem Crateias, & Micton antiquissimi herbarij, quemadmodum Nicandri interpres testatur, primū genus masculum dixerunt: appellariq; Cobiurtā, fruticem exigui, rubentibus uirgis. Secundum Myrrhinem. Et tertium Tithymalida, qui Paralios est. Cætera enim solo lacte, quo abundant, a posterioribus in censum Tithymalorum recepta fuerunt. Paulus Aegineta scriptorem hunc secutus, totidem illi genera numerauit. Discreuitq; quibus uiribus, & quæ natura communiter priuatimq; singula sunt. Quæ omnia quoniam non erit inutile audisse, ex eo ipsē uerbis tradentur. Quæ huiusmodi sunt. Prædominantem alijs uiribus acrimoniā habent Lactariæ herbæ omnes. Inest eis etiam ualida amaritudo. Primas habet partes lac: tum semen: mox folia. Particeps & radix earum qualitatū. Eamq; ob causam in aceto elixa, exesorum dentium dolores sedat. Lac uero cauis eorum inditur. Quod si os tegerit, q̄primū urendo exulcerat: ideoq; cæra id antea inuoluunt. Secundi enim ordinis in calefaciendo est, quem causticum esse dicunt. Eadem ratione defluunt lacte Tithymalorum inuncti capilli: sed quoniam uehementius est, oleo miscetur. Et si sæpius radices capillorum aliquis inunxerit, exulstæ penitus reuertunt, glabrumq; relinquunt locum. Eadem potestate pterygia, formicas, uerrucas, & thymos tollunt. Quinetiam scabies, impetigines, carbunculantia, phagedenica, & cancrescencia sanant. Omnium Tithymalorum efficacissimas maximasq; habet uires: qui Characias, id est, Vallaris dicitur: quem etiam marerti uocant. Fœmina iisdem: qui & Myrsinites uocatur. Quinetiam in petris nascens & arborefcens. Post hos qui Verbasco similis est, Cyparissias, & maritimus. Postremus omniū Solisequus est. Proportione his omnibus respondet eorū cinis, & lixiuius cinis. Hæc sunt antiquorū medicorum de omni Tithymalo decreta.

De Pityusa.

CAP. CLXXVI.

PITYVSA M aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralion, alij Canopicon uocant. Hanc speciem a Cyparissia differre constat, etsi Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs Piceæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar Lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsā. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

πύτυσα
κράμβιον

C Inter arbores libro. 24. capite. 6. Pityusæ meminit Plinius, & a Picea statim brevissime quam ille credidit satis fore omnē eius historiam & medicinā profectus est: nulla alia q̄ nomini occasione fretus. Neq̄ enim Pityi, quā Piceam uocauimus, congener Pityusa est. Frutex siquidē hæc, illa uero arbor, totoq̄ gñe inter se diuersæ. Ille tñ ne cognata a congeneribus suis separare uideret, cognomines potius q̄ congeneres plantas simul & continuata historia descripsit. Hic cōtra, naturā magis q̄ noīa secutus, Lactarijs alijs herbis eam statim subiecit: quoniā parem laētis ubertatē, & simile in purgando uim habet, nec tanti folia eius Piceæ similia fecit, ut reliquā naturā negligeret. Quod em Pityusa Piceæ simile habet, foliū tantū est: cætera Lactariæ herbæ similiorem & congenerē faciunt. Ideoq̄ ait a quibusdā inter Tithymalos species & hanc numerari: folaq̄ specie a Cyparissia Lactaria herba differre. Animaduertit hoc ante nos etiā Nicolaus Leoniceus, longiusq̄ de tota hac re in cōmentariolo suo egit. Eam uocari a quibusdā hic Clema ait, id est, uiticulam & sarmentū: quoniā forte quos habet caules, aliarū modo quæ uiticulas habent, per terram spargit. Paralium uero, quoniā Tithymalo ob lactis copiam similis sit. Quod deinde cæteri interpretes in radice dixerunt uocari eam Turpet, adiectū Dioscoridi a posterioribus fuit. Id enim in nullis ueteribus græcis aut latinis legitur: nec legi etiam debet, quādo barbara ea uox est, & a posterioribus medicis quæcunq̄ ea sit sic appellata. Ob quas cauissas, nos libenter & merito ex hoc scriptore eam decimus.

De Lathyri.

CAP. CLXXVII.

Lathyris

LATHYRIS, quam aliqui Tithymalum appellant, eamq̄ Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudi-
ne, & digitali crassitudine, inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora. Quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiæ, aut oblongæ Hederae figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici conceptaculo insignem, rotundum, ceu Capparin, in quo grana intercurfantibus membranis distincta continentur, Eruis maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti Tithymalus. Grana sex, aut septem in catapodio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea forbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus Tithymali modo excaptus, eundem effectum præbet. In gallinaceo iure, aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

Pli. li. 27. ca. 11.

LATHYRIS, folia habet multa Lactuæ similia,

tenuiora, ut Plinius tradit, germinibus crebris. semina Piperis magnitudine, facilia purgati.

E X M. V E R G. C O M M.

Demonstratam paulo ante Pityusam, & quā modo tractamus Lathyrim ob eandem Lactis notā, & purgandi uim, Paulus Aegineta in. 6. Tithymalis alijs adnumerauit. Suntq̄ de Pityusa eius hæc uerba. Et hanc aliqui Tithymali speciem dicunt: quoniā simile lac habet, & uilile purgat, de Lathyri autē quæ sequuntur. Priuatim hanc quidam Tithymalū uocant: quoniam pariter illi lac eius purgat: etsi in Lathyri præcipuā purgandi uim semen habet. In qua descriptione animaduertendū in primis illud est: quod dicitur, priuatim quosdam Lathyrim Tithymalum uocare, eo pertinere, quasi non Lathyris, sed certiore Tithymali nomine ab illis indicetur. Credimusq̄ nos ex hac descriptione, posteriorumq̄ temporū usu, Cataputiam minorem a nostræ ætatis medicis Lathyrim appellatam fuisse. Nihil de Lathyri hac, quod hætenus in eo inuenerim, Theophrastus. Masculino tamen genere Lathyron inter legumina libro octauo de plantarum historia numerauit. Vertitq̄ Gaza, Cicerculam: quæ nihil ad Lathyrim hanc pertinet. Plinius uigesimo septimo uolumine, capite undecimo, Lathyrim diuersa penitus ab

hōc scriptore historia tradidit; præsertimq; in folijs, quæ hic Amygdalæ, ille Lactucæ similia fecit; magno ut uideatur figuræ discrimine inter Lactucæ, & Amygdalæ folia. Sunt præter hæc & alia, quæ poterunt uolentes inuicem conferre. Nobis satis sit locum signasse.

¶ De Peplo. CAP. CLXXIX.
Peplos, quem aliqui Syden, alij Mecona Aphrodem uocant, fruticulus est lactei succi plenus, folijs Rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi respersa, semine sub folijs rotundo, minore q̃ candidi Papaueris. Pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuam, ex qua fruticat. Nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in umbra, & continue uestitur. Fructus rufus, & feruifactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio. Obsonijs inspersa conturbat aluum. Muria conditur.

BARBARI COROLL.
Peplos, ex una tenui radice fruticat; Hanc & Meconion, & Meconitin ab Hippocrate uocari, Galenus auctor.

EX M. VERG. COMM.
Meconion, Meconitinq; id est, Papauer, aut Papaueraeam herbam uocasse Peplion hanc Hippocratem, testis est Galenus. Idem & Dioscorides testatur, spumeum Papauer ab alijs quibus dici affirmans: postq; hos omnes Plinius libro, 27. capite, 11. Quod non aliunde, q̃ ex feminis similitudine factum est: quod omnes albi Papaueris esse dixerunt. Paulus Aegineta præter id habere Peplon lac etiam ait, Tithymalorumq; modo purgare. Omnes itidem Syden uocari dixerunt. Quæ uox græcis Ficum significat: & quoniam lacte arbor ea abundet, ideo Lactariæ herbæ cōmunicasse suum potuit nomen. Plinius quo diximus loco ipsam nouis descriptam facile cognoscendam diligentioribus reliquit.

¶ De Peplide. CAP. CLXXX.
Peplis, quæ aliqui syluestrem Portulacam uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi succi pleno, folijs satiuæ Portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, uti in Peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur uti Peplos, & conditur. Eadem habet uires.

BARBARI COROLL.
Portulacas syluestres uocari herbas tris inuenio. Vnam quæ sit Aizoï species. Alteram cognomine Telephon. Tertiā Peplin, siue Peplion: de qua præsens mentio. Quid aut sit Diplion Aetio, qui ad auctore id refert Aretæum, haud scio. Terendū cum aqua inquit in angina morbo Diplum, & subiecto linamento, importendum pectori, quoties præuocatio timetur. Sunt apud Græcos, inter quos Isacus, qui Peplium, pro Senna modo appellata intelligant. Ego diuersum puto genus: cum Senna filiquas, & in his semē ferat, Peplis nō ferat. Alia est & Sennicula, siue Sanicula uocata, trasalpina herba, folio Vitis, aut Apij rubentibus, in fine sectionū maculis quibusdam, surculis quoq; rubris ad radicē: quæ multis ei fibris subest, capitulis in summo frutice pusillis subnigrisq; huius succū uulneratis in potum cōmendant.

EX M. VERG. COMM.
Neutro gñe, sed eadē diminutiua forma Galenus Peplion Peplida hanc uocat, & ad ducendam pituitā & bilem semē eius cōmendat: auctoreq; Hippocrate, disciendiis inflationibus uti lem prædicauit. Paulus Aegineta a decretis scriptoris huius non discedens, feruidi saporis semine habere Peplida hanc ait, Peplioq; pariter purgare. Quā ob causam eandē Peplo esse aliqui crediderūt, solūq; in declinatione nois discrimen esse. Verūtamen certis discriminibus duæ inter se plantæ differūt: præsertimq; foliorū, quæ in altera Rutæ, in altera Portulacæ sunt. Ex quæ

C factum est, ut tertium genus syluestris Portulacæ hæc credita fuerit. Et sane similis illi paulo minus quæ tota figura est: adeo, ut facile pro Portulaca fallere legentes possit.

De Chamæsyce. CAP. CLXXXI.

χαμαίσυς

Chamæsyce aliqui Sycen, alij spumosum Papauer uocitant. Ramos emittit quaternū digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos, folia Lentis, parua, Peplum plane referētia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, ut in Peplo. Neque caulem, neque florem promit. Radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulua dolores sedant, in pesso appositi. Tollūt tumores, ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorū cibo, alius resoluitur. Succus simili effectū prodest. Illitus contra scorpionis ictum auxiliatur. Aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisque nascitur.

BARBARI COROLL. Chamæsyce, pumila Ficus est, quasi terræ Ficum significans.

EX M. V E R G. C O M M.

Quæ a Lactarij herbis deinceps a scriptore hoc numeratæ, tractatæque sunt Pityusa, Lathyris, Peplos, & Peplis, uno, quibus cætera desint, lactis liquore, quæ sectæ oēs desiliant, facile congeneres, nulla intercedente herba, fruticeue alio, coniuncta merito descriptionē in eo habuerunt. Nec aliunde humilis, iacensque in terra terrestres Ficus hæc, quæ tota Chamæsyces græcis significatio est, in ordinem & numerū illarum uenit: soloque lacte, quod Ficus simile habet, honestiorem quæ decebat ab arbore appellationem inuenit. Neque enim ramos, folia, fructusue ficulneos habet. Quod Fico commune habet, lac tantū est. Quā ob causam parū proprie pumilā Ficum, quod aliqui fecerunt, eam aliquis dixerit. Aliud enim est pumilam Platanū, & Cerasum dicere coactæ breuitatis arbores: & aliud quās Græci Chamæsyce, Chamæcisson, & alia huiusmodi. Illæ siquidem suū genus seruantes, sola breuitate ab alijs differunt: hæ si similitudine aliqua tantū, & alicuius solum partis in alio genere constitutæ, deficiente omni alio nomine, ab arbore, plantaue alia, cui in ea parte similes sunt, id impetrarūt. Quod facillime in Chamæsyce hac deprehendit: quæ ramulos suos per terrā spargit, & folia Lentis habet parua, ut hic ait, tenuiaque, & in terra iacentia: quæ longissime a Fico arbore absunt: nec relinquit, unde sic uocari debuerit, quæ lactis liquor, quo multis oculorum uitij & morbis medetur.

D

De Scammonia. CAP. CLXXXII.

σκαμμόνιον

Scammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophonía, alijs Dactylon, Romanis Colophonium, Magis Apopleumonos, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui non nihil crassitudinis præ se ferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangulis. Flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis Iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem Scammonium læue, nitidum, rarum, & colore quæ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ contermina deportatur. Nec attendere

solum par est, si linguæ tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, qđ A
admixto sit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si nō
uehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumentū est.
Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauiā, dē
sa, Erui farina, & Tithymalo uitiata. Succus drachmæ unius, aut quā-
ternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, uel mulsā, per infer-
na bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos
cum Sesama, alioque semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris pur-
gationis causa, succi quaterni oboli cum duobus Veratri nigri, & Alo-
es drachma una. Fiunt purgatorij sales drachmis uiginti succi Scamō-
niæ, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionē uiri-
um. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radi-
cis drachma una, aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli
decoctum radicis exhibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina
teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat, succus uulua in la-
na subditus. Tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus. Decocto in B
aceto perunctæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto &
rosaceo perfunduntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Scamonia, siue ut Cicero, & Plinius quandoq; appellant Scammonium: quanq; Scamoniū p
succo eius quoq; carpitur. Frigida amat loca, pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymā e
radice sua fundit, folijs albis, pinguibus, radice nauseosa. Circa canis ortum succus excipitur.
Adulerant Tithymali marini succo, maxime in Iudæa: quod etiam strangulat sumptum. Vis
bimo, nec ante, nec postea. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Priennense, specie autē
nitidū, cito liquefcens, uirus redolens, somniosum, linguæ tactu lactescēs, & cū diluit albescēs.

E X. M V E R G. C O M M.

Erimus ueterum & iuniorum exemplo in Scamonię & Scamonijs cōmentationē breuiore.
Quotidiani enim in medicina usus res est: nullusq; non audio alterius nomine, intelligit qđ ad
purgationis præsentem, & maximam uim habet: noueruntq; omnes quem uendunt officinę,
concretum ex radice herbæ liquorem. Quę multis quidem locis prouenit. Probatissima autem
transmarinis regionibus, præsertimq; Asia, & toto Colophonio agro. Ex qua regione factum
illi aliquando fuisse nomen hic a gentibus testatur. Quę dum probatissimum Scammoniū que-
runt, & ex Colophone Asiæ id petunt, paulatim fecerunt, ut quæ bonitatis nota erat, in nomē
& appellationem transierit. Verumtamen facile id nomen perijt: seruato ubiq; quod primum
et aprius illi fuerat a principio factum: quod nos credidimus rationem a fossura habere: quā hic
ad excipiendum liquorem fieri docet, *ἐκπίπτει* enim græcis fodere est. Vocauitq; gens illa for-
minino genere Scammoniam herbam: masculino autem, aut neutro, exceptum ex secta radi-
ce eius *ὀπρ*, aut *ὀπισμα*, id est, liquorem. Fecitq; usus, qui plerumq; liquoris eius est, ut miscerē-
tur quondam, & adhuc misceantur in appellationibus simul, liquor, & planta. Probatores tū-
en græci neutro genere semper Scammonium liquorem uocauerunt. Sic Plutarchus in commen-
tario, quo docet quibus noris fecernendus ab amico adulator sit, cum mōneret, non esse in ca-
lamitate & infortunio castigandum hominem: quoniam non aliter reiecturus tunc præcepta
illa esset, qđ si ægroto assidens medicus diceret, ob præteriti temporis uoluptates, nimiam uene-
rem, lōgiore coenas, & quotidianam ebrietatem omnia illi ea mala adesse. Fieri enim, ut respō-
deat dolens, iratusq; *παρασιλεύει ταί μοι κακὸι οὗτοι καὶ σκαμμόνιον, οὗ δὲ νοσήσεις καὶ φιλοσοφῆς*. Quod
est. Preparatur mihi Castorium & Scammonium, tu autem mones & philosopharis. Protulit
q; genere neutro Scammonium, *ὀπισμα*, id est, collectum & seruatum in medicinę usum radicis
Scammonia liquorem intelligens. Descripsit lōgiore historia Plinius Scammonium & Scam-
moniam lib. 26, ca. 8. Hortamurq; nos bonarum literarum studiosos, omnia eius scriptoris di-

Pli. li. 26, ca. 8

D I O S C O R I D I S

Ceta, singulaſq; uoces cum Dioſcoride conſetre. Neq; enim erit ad utramq; partem negligendū operæprecium. Si quidem intelligent in radicle descriptione, quam hic ait *βαρύμενον*, quæ uox græcis graueolentem ſimpliciter ſignificat, ab eo nauſeoſam dici: & quam hic *ἰσχυρόν* *μυκτόν*, id eſt, liquore abundantem, madidam; multa; alia quæ Barbarus Plinium imitauit, ab aliquibus for te longius a ſcriptoris huius ſenſu diſceſſiſſe uidebitur; madidam enim & ille uertit. Nos quoniam poſt tot ſecula ſentimus mutatam in multis uocibus antiquam ſignificationis aſſimilationem, aut ſi ea adhuc ſeruetur, apertiorẽ tamen docendi rationem in eundam in his eſſe, uertimus graueolentem, & multo liquore abundantem: iſſẽdem uocum ueſtigij huic ſcriptori per plantas eius ingredientem.

De Chamelæa. CAP. CLXXXII.

χάμηλαια

Chamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli Oleaginẽ, quidam Oleaſtellum uocant. Surculofa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia Oleæ ſimilitudinem habent, tenuiora & amara, quæ guſtata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, ſolijs præſertim in catapotio deuoratis. Namque duæ Abſinthij partes, ad iectã Chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapocia coguntur. Ea autẽ in uentre non liqueſcunt. Siquidẽ quot ſuere deuorata, re gerunt. Folijs cum melle trius ſordida ulcera & cruſtoſa repurgant.

BARBARICOROLL.

Pli. li. 15. ca. 7

D

Chamelæa, frutex eſt petroſus. Sunt ei (ut quidam habent codices) mora odorata Plinio. Quidam folia ei amara & odorata ſcribunt. Simillimum huic oleum ineſt; ut Oleaſtro: cuius & baccas quoque ſimiles habet, ob id a quibuſdam Oleaſtellum, & Olea ciliſbraca uocatur, autore Columella, Sirapam inde condiſolitam ſcribente. Sunt qui ſuccum in Gallia, aut Italia naſcentis, eundem eſſe cum Euphorbio putauerint. Sed hic multum infra illum eſt. Ex hac & granum Cocci plerique falſo naſci exiſtimauere. Noſtri & hanc, & Thymelæam præcipue Caſiã uidetur appellare. Theophraſtus Cneoron; Igino id apud nos Caſiã interpretate. Cuius duo genera feruntur. Candida, cui folium cutis modo quadamtenus oleagineum. Nigræ carnoſum, Tamarici ſimilius, ſiue ut in Theophraſto quidam (quos probò) legunt, Myrto. Candida magis humiſe ſpargit, & odorata eſt, Nigra ſine odore. Radix habebat alta, prægrandis, rami copioſi, craſſi, ſurculofi, ab terra protinus aut paulo ſupra emicant, admodum leni, ut quibus ad uinciẽ diu p. iunco utant. Venere in coronamenta folio. Poſt Aequinoctium autumnus germinant, atque florem mittunt, qui diutinus eis eſt. Hæc tota de Cneoro ſiue Caſia Theophraſti ſententia eſt. Dioſcorid. Ceſtron, & Cneoron uocari Thymelæam prodiit. At ego non Ceſtron, ſed Cneſtrũ legendũ arbitror, Hippocratis, & Galeni, & codicum uetuloſoꝝ fretus autoritate. Hoc ipſo nomine Cultrellus appellatur quo caſei ſcabunt; quanquam & Tyrogneſtis, & Cobelis quæ ſi dicunt Pol luci. Liparonis herbæ meminit Aetius, & Alexandria ſic uocante: quam aliqui Cneſtron inquit nominant, ad ulcera capitis manantia uehementer utilis. Nec indicat is autor, qualis ea ſit: utrumne a Thymelæa, ſiue Cneoro diuerſam, an eandẽ putarit. Recentiores, ut plerique omnia, Chamelæam, & Thymelæam cum Daphnoide turpiter confundunt.

EX M. VERG. COMM.

Non auſim ego dicere, quod feciſſe uidentur aliqui, pro comperito mihi eſſe, græcoꝝ Chamelæam capite hoc a Dioſcor. tractatam, Columellæ Ciliſbracam oleam eſſe, quam. 15. uolumine, capite. 45. ſcriptor ille, propter ſimilitudinem Oleaſtellum a qui. uſdam uocari ait. Quæ enim numerantur ab eo illic ad Sirapæ confectionem Oliuarum genera, ex arboribus, non fruticibus legi præcipiuntur, poſeæ, liciniæ, & culminiæ, omnes in Oliuarum cenſu inter primas laudatæ: quibus uerſimile eſt, connumerari debuiſſe eam quæ egregiæ bonitatis pariter eſſet: præſertim dicente eodem Columella. Verum tamen habetur præcipua in hos uſus olea Ciliſbraca: quam quidam propter ſimilitudinem Oleaſtellum uocant. Ratiocinari enim ex his oportet, meliorẽ, pbatioremque Ciliſbracã oleam præmonſtratiſſis illis eſſe: quod parũ uerſimile eſt in Bacca, Oliuacũ illa quæ ſola ſimilitudine, nõ quæ cõgener oleis ſit, in cenſum earũ uenerit. Nec obſtat dicere Columellã, ppter ſimilitudine Oleaſtellũ uocari. Poſſe enim ad totius arboris formã id re

ferri. At Plinius. 17. uolumine cap. 7. oleum ex Chamelæa fieri testat, expresso ex oleastris si-
millimum. Scimus id quidem: & nisi aliud doceatur, ex oliuis oleum etiam exprimi, oportet:
reque si exprimendum ex Chamelæa oleum sit, oliuas baccasue in ea intelligi: quod tamen hic
in Chamelææ historia non testatur: & si Plinius aperte id dicat, non constitutum ob eam cau-
sam Cilibracam Columellæ oleam: etsi Oleastellum uocari a quibusdam ille dicat Dioscōri-
dis Chamelæam omnino esse. Siquidem oportet ad conficiendam Sirapam (sic enim ab eo
appellatur, oliuarum cōdicuræ antiquum genus) meliores probatioresque oliuas eligi: quæ si in
Chamelæa sint, quemadmodum ex Plinio ratiocinari licet, immaturas, asperasque, & quales in
Oleastris sunt intelligere oportet. Non enim Olea Chamelæa est, sed a foliorū similitudine sur-
culosus, & dodrantalis frutex sic appellatus. Eamque ob causam, si baccas, aut oliuas fert, qua-
les diximus esse, eas uerisimile est. Patetque id ex eodem Plinio quo diximus loco, dicente post
descriptum ex oleastro oleum, Simillimū huic est ex Chamelæa frutice, folijs Oleastri, bacis-
que frutice saxoso, nō alioe palmo. Quæ tota descriptio longe a scriptoris huius historia diuersa
est. His nos rationibus uti, quod in Diosc. legitur, aliqui uero Citocastū Chamelæam uocant,
nō mutauimus: & si ea uox nihil modo nobis significet: sed qualis in cunctis grecis est, seruata
a nobis fuit. Barbarus literarum prima uestigia secutus, Cilibracum ex Columellā interpreta-
tus est. Neque aliam ob causam longius dicta hæc a nobis sunt, quæ ut diuersitatis huius, & serua-
tæ a nobis cōmunis lectionis ratio omnibus pateret. Heracliam mox, id est, Herculeam uoca-
ri etiam Chamelæam in Diosc. legitur. Credimusque nos factum id nomen ex antiqua fabula
fuisse, quam ex Pinđaro in Oleastro primo uolumine retulimus: quod scilicet Hercules ex Scy-
thia coronatus Oleastro in Græciam redierit: & quoniam similis Chamelææ Oleaster sit, &
Oleastro Chamelæa, ideo similitudine decepti aliqui, non Oleastrum, sed Chamelæam Her-
culeam uocauerint fruticem & coronam. Reliquimus etiam contra aliorū interpretum ratio-
nem quod inter has appellationes auditur, *ἡ δὲ χαμδαία μύλανα*. Quod est, aliqui autem Cha-
melæam nigram. Error enim id eorum est, qui græcarum uocum similitudine decepti, Cha-
melæonem cum Chamelæa miscuerunt. Neque enim nigredo Chamelææ competit. Qui co-
lore nigro a candido discernitur, Chamelæon est. Et quoniam nihil in Chamelæa id causæ ha-
beret, inutiles eas uoces expunximus. Errasse autem in duabus his plantis non græci tantum
sed latini, & hi quidem inter medicos probatissimi Auicenna, & Serapion uidentur. Qui Me-
zereon; quæ Chamelæa hæc barbaris est describentes, multa quæ Chamelæoni debentur illi
tribuerunt: & ediuerso. Poteruntque uolentes id certius in Chamelæone, & Mezereon poste-
riorum scriptorum uidere. Sunt Chamelææ huius appellationes aliæ, uerumtamen improp-
riæ, & ex alijs plantis importune ad hanc relatæ. Quemadmodum in Tymelæa quæ mox
sequitur patebit. Ea enim proprie Pyrosachne, & Cnidium granum uocatur, si Plinio & an-
tiquis grecis credendum est.

T De Thymelæa. CAP. CLXXXIII.
Thymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agrien, alij Cestron aut
Cneoron uocant. Ex qua Granum cnidium, quod est Thyme-
lææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apollinū, alij Linum appellant. Quo-
niam satiui Lini frutex suapte natura similitudinē referat. Virgas edit
perpulchras, tenuēs, tripedaneas, folijs Chamelææ, angustioribus, &
pinguioribus, uiscosis, gummosisque si mordeantur: flore candido, fru-
ctu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubes-
cit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per inferna bilem,
pituitam, aquasque detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur.
Verum fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta, aut in uuæ acino
dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui ægre desudant, tri-
to semine cū nitro, & aceto inunguntur. Folia quæ peculiariter Cneo-
rum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recon-
di. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere cōuenit. Illiū

Cacetabuli modo cum diluta potione, aquam extrahit. Mediocrius purgar, addita Lente cocta, aut contritis oleribus, Thymelææ farina. uuæ acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta. Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinatur qui Coccon Cnidium fructum esse Chamelææ existimant. Falluntur enim quadam foliorum similitudine.

Pli. li. 19. ca. 21

DE Thymelæa, granum, siue Coccon Cnidium enasci constat, Myrri magnitudine, colore & specie foris, autore Dioscoride, non farris, ut in Plinianis codicibus deprauate legitur. De Thymelæa nonnihil & Superior proinus mentione diximus.

B A R B A R I C O R O L L.

E X M. V E R G. C O M M I

Antiquæ, & antiquorum scriptorum auctoritate receptæ appellationes omnes, Thymelææ scriptori adiectæ sunt. Quandoquidem Plinius. 13. volumine, capite. 21. his uerbis de Thymelæa egit. Fruticem uero Thymelæam alij Chamelæam, alij Pyrosachnen, alij Cnestren, alij Cneoron. Qui uocum & nominum numerus idem huic scriptori est. Theophrastus itidem primo de plantarum historia de foliorum diuersitate agens, Cneoron Thymelæam uocauit. Eius uerba hæc sunt. τὰ δ' εἶον σπυρίδιον τὸν δὲ ἄτι σπυρίδιον ἔχοντι τὸ φύλλον εἶον ἀνέριπτος μύριον μύριον, τὸν δὲ θρυγακτὸν κνίστερ σείβη, τὸν δὲ πωδὸν αὐστῶν. &c. Quod est. Carnosi folij quædam eua: & id quidem, quoniam carnosum id habent qualis Cupressus, Myrice, & Malus est. In furculo so itidem genere Cneoros & Stoebe, & in herbaceo Sedum. Quæ ex scriptore illo repetita, & cōmentationibus his nostris addita sunt; ut qualis Thymelæa hæc sit certius adhuc cognoscat.

DSurculosi generis herba, & carnosæ folij: quæ in Diosc. consiçienda magis, q̃ manifeste intelligenda sunt. Siquidem uirgas in ea dixit, & Lino comparauit, & folia pinguia gumosaq; descripsit. Quod totum Plinius ex Theophrasto acceptum eodem loco retulit, simile Oleastro Thymelæam faciens: folijs angustioribus, gumosis si mordeantur, Myrri magnitudine. &c. In quo laudandus etiam Theophrastus, qui folium Thymelææ describens, Cneoron eā uocauit: quæ si sciret & ipse quod Diosco. restatur, folia tantum ea uoce censerit. In. 9. deinde remedia & uires eius tractaturus, Cnidium granum uocauit, eandemq; huic scriptori uires illi assignauit, ὅ δὲ κνίδιον κόκκος σπυρίδιον ἑνὲν τὴν χροὴν μύριον δὲ τοῦ πικρῆος ἰχυρότερον δὲ ποδὶ τῷ θερμότητι, διὰ καὶ ὅταν διδιδάσκων κατὰ ποσὶν, διδιδάσκων γὰρ πρὸς καρδίαν λέγειν ἵν' ἔργη ἢ εὐκαὶ περιλάπτουσι, καὶ γὰρ ἀλ- λωτὴ τὴν φάρμακον. Quod est. Cnidium uero granum rotundum, coloreq; rubens, semen fert Pipe re maius, multoq; ad calefaciendum Pipere ualidius. Quam ob causam cum dant (datur autē ad soluendam aluum) in pane, aut adipe inuolutum dant; alioquin fauces urit. Et hæc nominū diuersitas in Theophrasti Thymelæa est. Quibus addiderunt alij alia: uocaruntq; aliqui Pyrosachnem, ab urendi ui quam habet. Pyrenim græci ignem uocāt. Nec aliud Pyrosachne, compo- situm ex igne & tenui stipula nomen indicat, q̃ quod egregie urit. Chamelæa eadem dicta fuit, quoniam ut Plinius ait, Oleastro similis sit: ut hic scriptor autem, quoniam Chamelææ; quæ superiore capite præmonstrata est, folia similia habet: quod totum eodem redit. Quod enim simili simile est, eandem similitudinis causam & principium habere oportet. Cnestro postremo eandem hanc Thymelæam uocant probatissimi græcorum scriptores Hippocrates, Galenus, & pleriq; alij. Nobis tamē ignota uocis eius origo & causa. Comparauit eam Diosc. λῖνον κνίδιο: neq; aliud uoces illæ in cōmuni significationis æstimatione significant q̃ satium Linum. Quærendum tam & eruscandum diligentius opinamur, Lino ne satium simpliciter, an surculoso fructu, quem Sparton omnes uocant, & hic eodem hoc libro descripsit, similem Thymelæam dixerit. Nobis in hanc partem inclinat animus: & si aliorum interpretum medo & nos satium Linum uerterimus. Genistæ enī similior, q̃ Lino ex historia, descriptioneq; eius uideri potest. Vniuersæ plantæ nomen factum uidetur ab Olea cui similis est, & a Thyma herba cuius habet flores. Paulus Aegineta præter ea quæ nunc in Diosc. leguntur, radicē eius contra sanguinis pluuia cōmendauit, uiribus, saporeq; acerbis: ei; malo prodesse potā & foris impositam.

κνίς

A De Sabuco. CAP. CLXXXIII. Cren aliqui Dendron arctu, alij Hemeron, Latini Sabucum, Galli Scobiem, Dact Sebam uocant. Ex eo genere quædam in

arborem affurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candidi
cantes, proceros. Folia luglandis terna, quaternauca, ex interuallis circa
ramos exeunt, grauius odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum
cacuminibus cauliculisq; circinatae umbellae, quae florem candidum pa
riunt, mox fructum Terebintho similem, in nigredine subpurpureum,
acinosum, succo madentem, uinosumq;.

BARBARI COROLL.

Abucum medulla carere aiunt nonnulli. Theophrastus Carnosam ei adiungit. Fruticosa
uirgis arbor: quae anniculae, donec folia deciderint in longitudinem crescant. In sena maxime
cubita: post id tempus in crassitudinem fundantur. Lignum fungosum, & cum inaruitleuissi
mum: medulla molli: quae tota uirgulis eximitur baculorum usu. Siccatum durat, inoffensum
q; aquis redditur, etiam decorticatum, quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitudo ga
leae. Cortex laevis, tenuis, spissus: quem uocant Canopum, cuius a Graecis in Iuliani Oxyme
lite fit mentio. Radices tellure summa, nec multas, nec graues agit. Folium minus, quod quide
pars est maioris, molle oblongumq; habet, ut laurus latifolia, maiusculum tamen, latiusculuq;
subtus & situ medio rotundius, exacutum, serratumq;. Folium uero maius, qd ex illis minori
bus quasi coalescit, pediculo uno crasso & neruoso geritur, ceu ramulus, folijs utrinq; genicu
latim & ordine iugatis, uno in uerticibus relicto singulari. Subrussa haec, & fungosa, & de sin
gulis petiolis uniuersa collabuntur. Sunt & in ramis nouellis internodia, sed quasi rudia, inar
ticolataq;. Flos candidus, ex flosculis minutis, faui specie congestus, e pediculi fissura, graui o
dore, quanq; Lilij. Fructus quoc; racematim pediculo unico dependet, Aetion uocatus, qui
cum ematuruit, nigrescat. Immaturo color uuae acidae, paulo maior q; Eruum, humore lento.
Manus capillumq; inficit. Grana intus sesamacea, non ingrata turdis, sturnisq;. Locis potissi
mum opacis, & iuxta aquas gignitur. Differt a ferulaceo genere, q; plus ligni ac succi habet, q;
Ferula. E Sabuco magis canoram buccinam tubamq; credit pastor, ibi caesa ubi gallorum can
tum frutex ille non exaudiat. Dictam puto arborem, a Sambuca musico instrumento, quod
alij Pectida uocant, alij Magadin: ut in arundine notauimus. Sambuca porro, ab autore uide
tur appellata: cui nomen Sambyx fuerit. Vt iam tamen ea primam omnium Sibylla perhibent.
Arbor utiq; ipsa non Sambucus, sed Sabucus dicenda est: si Serenio Quinto credimus.

Pli. li. 16. ca. 19
26. 40.
lib. 24. cap. 8.

B

De Ebulo. CAP. CLXXXV.

AL T E R V M genus Chamaeacte uocatur, alijs Helio
saete, alijs Agria aete, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis
Ducone, Dacis Oliua. Ebulum longe humilius est, magisq; haerbaceo
generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdalae,
ex interuallo longioribus, genicularim distributis in uersus, graueolen
tibus, in ambitu serratis, muscario Sabuci flore, & acino eiusdem. Radi
ce nitit longa, crassitudine digitali. Eade utriusq; uis & usus, refrigeras, et
exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum mo
re coquuntur ad pituitam bilemq; detrahendam. Caules teneri in pa
tinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hy
dropicos adiuuat. Prodest uiperarum morsibus, eodem pota modo.
Vulvas emollit infidentium decocto. Laxat earum spiracula, & uitia
corrigit. Acini in uino poti eodem funguntur munere. Denigrant ca
pillos illiti. Folia si praetenera ac mollia ex polenta illinantur, inflam
mationem mitigant. Ambustis, & canis morsibus illitu profunt. Vlce
ra quae dehiscunt in fistulam, agglutinant. Iis qui podagra tentatur, cu

χάμακτι

D I O S C O R I D I S

C feno hircino profunt illita folia.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 25. ca. 10
lib. 26. cap. 9.

E Buli, siue Chamæactes, hoc est, Sabuci pumilæ foliorum decocto, mulsæ necantur. nam & colibuli macerantur aqua, ut ea sparsa culicis abigantur, Baccas, flores uel Ebuli, aut Sabuci uidetur intellexisse Plautius cum dixit in Captiuis, Laridum, Atq; Ebebulas foueri foculis fertientibus. Nisi quis herbulas in eo uersu lectitare malit, aut qd' propius est uero, epulas. Ouidius, Epulisq; foci miscere calentes.

Aut hanc, aut ualde similem esse puto, quam Plinius Actæan uocauit uigesimo septimo uolumine. Actæa inquit, graui foliorum odore, caulibus Anisi geniculatis, semine nigro ut Hederae baccis mollibus. Nasctur in opacis, & asperis, & aquosis, datur acetabulo pleno, interioribus foeminarum morbis. Pro eo quod Dioscorides in caulibus umbellas, & capitula Chamæacten habere scribit, Plinius caules Anisi reddit ei: quanq; non caulibus Anisi, sed asperis in plisq; legitur codicibus. Sed exemplaria quædam uetusta legunt Anisi, non asperis.

De Pynocomo.

C A P. CLXXXVI.

ΠΥΝΟΚΟΜΟΝ

PY C N Ocomon constat Erucae folijs, acrioribus, scabris, & crassis, caule quadrangulo, flore Ocimi, semine Marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui Mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semen grauius somnia & tumultuosa facit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polenta. Spicula, adactosq; corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutiunt. Radix eius in aqua mulsâ duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 26. ca. 9.

PYcnocomon, caule tenui, modico.

E X M. V E R G. C O M M.

Sunt Plinio, & scriptori huic nostro de Pynocomo omnia eadem: tantumq; non isdē uerbis cuncta latius scriptor ex græco genti suæ reddidit. Locus est. 26. uoluminis. 9. capite. A foliorum conserta densitate nomen illi fecerunt græci. Nec enim aliud Pynocomon indicat, qd' quod densa & conserta coma est. Herbarum autem comæ folia sunt, quæ hic a Plinio resecta aspera constituit. Ille enim crassiora tantum & aciora qd' Erucae sint dixit. Non indicauit etiam Plinius, quale semen Pynocomi sit: non dico autem quale uiribus, sed figura & specie. Desiderauimusq; nos id magnopere, hoc agentes, ut uariam in græcis lectionem teste & autore eo tutius eligeremus. Sunt enim in quibus Marrubij, in quibus Porri seminibus comparetur Pynocomi semen, una id discrimen faciente litera. Cæteri interpretes communem secuti lectionē, Marrubio simile fecerunt: nos probatiores & uetustiores græcos, & quæ habemus egregiæ antiquitatis latnum Dioscoridem secuti, Porro comparauimus: uolumus tamen incertæ nobis rei fidem penes naturam esse. Discrepant in radice colore Plinius & Dioscorides, ille lutei coloris tantum: hic nigrum primum, mox *ὀχρῶν*, id est, pallidam, quod idem luteo colori est, descripsit. Susplicari multa in uarietate hac licet: aut deesse Plinio, aut abundare huic nigrum colorem, aut foris nigrum, intus uero lutei coloris intelligi oportere, Pliniumq; alterum colorem tantum indicasset: quod suspicari ab re forte non fuerit. Nigram tantum tradit quem antiquissimū habemus latinus Diosco. Quotquot autem græcos uidimus, omnes nigrum & luteum colore illi assignant. Eamq; ob causam inclinat animus nobis, ut credamus diuersos colores illos, ad diuersas referri oportere partes. Legentibus tamen hoc liberum sit, donec, ut in semine paulo ante diximus, natura & res cognita, tam multas difficultates extricauerint. Animaduertendum illud etiam in uiribus & potestate radice, dicere Plinium exinanire eam aluum, bilem, & pituitam: hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum: & inter eos præferam Paulū Aeginetam, qui Pynocomi radicem, semen, & folia discutiendi & extrahendi uim habere ait: & semen, quia ualidius sit, infixæ corpori etiam extrahere. *ἵψαν δὲ γὰρ τὸν χυλὸν τῶναι καθαρτικόν.* Quod est, Radicem uero flauam purgare bilem. Id Barbarus extenuare dixit, non satis apto ad eam uim uerbo, ut nouisse omnes facile possunt.

A De Apio, seu Radice syluestri. CAP. CLXXXVII. **A**
 Pion nonnulli Ischiada, alij Camæbalanam agriam, alij Linozō
 stiri, Latini Radicem syluestrem, Poeni Thorphathsadæ appella-
 rant. Iuncos duos, siue tres spargit, rubros, tenues. Qui a terra parum at-
 tolluntur. Folijs Rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, hærba-
 ceis, semine paruo, radice Hastulæ regiae, in formam Pyri turbinata, succi
 fœcûda. Intus habet succum candidum. Extra, cortices nigros. Superior
 pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit. Inferior per alutum, Tota
 utrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in sicili
 mergitur, & agitata aqua quod supernatat pinna selectû, exiccatur. Purgat
 utraq; parte is succus sesquibolo potus.

D E B A R B A R I C O R O L L.
 De Apio herba, cognomento Ischas, quæ Raphani syluestris genus est, uolumine secun-
 do locuti sumus. Vbi omnia hæc ad uerbû fere uidentur esse repetita. Plinius Oposcillam uo-
 cauit (ut arbitror) corrupte, pro Apios Ischas.

H E X M. V E R G. C O M M.
 Hæc est Apios illa solo nomine, sed ab imperitis facta, notissimæ cunctis Raphano con-
 gener existimata. De qua longius secundo uolumine in Rhaphano egimus; pollicitiq; sumus,
 iterum hoc loco de ea dicendum nobis esse: haud sane quia supersuerint tunc aliqua, quibus
 nunc dictis secumenda hæc ab illa esset, sed q; inuenienda hoc loco, uelut ex aliena possessione,
 ob eas quas tunc longius percurrimus causas, eicienda ex illo erat, tractandaq; cum cæteris,
 quæ efficaciorum in purgando uim habent. Quales multæ descriptæ hoc libro hæctenus, & de
 scribende adhuc plantæ sunt, syluestres omnes, montibus & incultis locis nascentes: non qua-
 lis satua in hortis, aut syluestris in campis Rhaphanus nascitur: quæ nihil huic simile aequal-
 ue, aut idem habet, non ramulos, non folia, non semen, nec radicem etiam. Siquidem in Rha-
 phanis longiores, in Apio hac rotundiores & pyri similes radices sunt. Quinetiam præter to-
 tam speciem obstat color, qui in nulla Rhaphano foris, ut in Apio hac niger conspicitur. Sunt
 aliæ plures etiam diuersitatis notæ, quas breuitati consulentes expendendas legentibus relin-
 quimus. Apion a radice forma Græci herbæ appellauerunt. Est aut; græcis Apion in pomor; ge-
 nere Pyrum. Et quoniâ pyri forma radix eius sit, contractior tamen rotundioreq; ideo nomen
 hoc illi ea gens fecit. Antiquum sane; & quo, scribente Theophrasto plantatû historiam, Græ-
 cia passim utebatur. Neq; hoc tantum, uerum eo etiam quod secundo loco in hoc scriptore illi
 adijcitur. Verba eius nono de plantarum historia uolumine hæc sunt. τὸ δὲ τῆς ἀντὶς ἰσχῆος τὰ
 ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀλγὰς κατὰ τὴν θυμαρίωτην διὰ τὴν τι θαλασσίαν καὶ τὴν ἰχθυίαν, διὰ τὴν ἀπὸ καλῶν. Quod
 est, Purgare aut; in eadem radice alias partes per superna, alias per inferna, magis mirabile: quæ
 les Thapsiæ sunt & Ischiadis, quæ Apion aliqui appellant. Testis, ut uideatur, utriusq; appella-
 tionis Theophrastus est. Vtq; alterius appellatiōis Apij, scilicet manifesta est ex forma radice
 ratio, sic ignota nobis alterius: nec quæ ob causam a coxendice, coxendicisue dolore, nisi hoc
 loco Ischias aliud significet, nomē id inueniri ratiocinari licet. Est quidem omnibus in prom-
 ptu, facillimiq; ratiocinari, quia purget, & purgandō dolores coxendicis leuet, sic forte appet-
 lata fuisse: sed nimis cōmune id est: neq; hic, aut Theophrastus quicq; pro coxendicis dolore pa-
 lam illi tribuerit. Quo fit, ut nos & si in cōmuni græcor; omniū lectione nihil mutare ausi sim-
 us, credamus non Ischiada, quæ uox coxendicem & eius dolorem, sed Ischada, quæ Caricam
 significat, non absurde penitus existimasse quosdam dici Apion hanc oportere. Similis enim;
 & turbinata figura non aliter q; Pyrum Carica est. In Theophrasto quidem Ischas passim legi-
 tur, non Ischias. Quod fit, ne demiremur, qui in eo Caricam uerterunt. Quenādmōdum
 non constituimus, scriptoris huius codicibus magis, quā Theophrasti credendum esse.
 Plinius nec Pyro, nec Caricæ radicem etus comparauit, sed Cepæ; ampliorem tamen q; Cepa
 fit, eam describens. Legitur paulo post in scriptore hoc, Chamæbalanon dici etiā Apion hanc.
 Ea uox tereftrem significat glādem, quasi latentem & obrutam terra glādis forma radicem
 oportetq; non glādis simpliciter intelligere, sed ut Græci Balanon; cōmuni appellatione lon-

Cgiores fructus indicant. Cur deinde agreftis, aut montana Raphanus dicta eadem fuerit, facis lectundo uolumine in Raphano, & hoc loco dictum a nobis est. Radicem eius, ut fere in cunctis græcis legitur, Spodylio herbæ hic comparauit. Responderetq; id naturæ, quoniã & hæc, & Spodylion tertio uolumine tractata, Raphani radice describitur: oportetq; inuicem similia esse, quæ alteri pariter similia sunt. Vidimus tamen nos, in quibus non radix Spodylio similis legitur, sed Asphodelo, & his quidem probatissimis, & antiquæ fidei, quod ab re penitus non est. Siquidem Asphodeli bulbosæ radices illæ, non penitus dissimilæ huic speciem habent. Secuti tamen communem lectionem & nos sumus, ob eam præsertim causam, q; hic in Spodylio radicem eius Raphano comparauit: & hæc ob eandem causam syluestris, & montana Raphanus a multis credita & dicta est.

De Colocynthide. CAP. CLXXVIII.

καλοκυνθίς

Colocynthis aliquibus Colocyntha ægos, alijs Sicya picta, alijs Alexadrina Colocyntha, Zoroastri Tymbra, Ostani Autogenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata dicitur. Sarmenta foliaq; satiuæ Cucurbita emittit, per terram repentia, diuisa: fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratū, uehementer amarum, quem legere oportet, cum cœperit in luteum colorem permutari. Medulla fructus purgato riam uim habet, si quatuor oboli melle cocto Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt, neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli uitij, ut quæ bilem, pituitam & strimenta, interdum etiam cruorem eliciant. Foetus admotæ enecant. Dentium dolorem tollunt, si una repurgetur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulsæ, aut passum incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur. Virenti succo utilissime ischiadici perfricantur.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 30. ca. 7.

Colocynthis, Cucurbita est syluestris, plena ipsa, nec inanis, ut Somphos, minor q̃ satiuæ. Primo herbacea, mox pallida, quæ & utilior est, quando eius sunt medicinæ. Hippocrates syluestrem Cucurbitā Sicyonem, & quæ fundo careat, & specie globosa & uniformi sit. Sicyan ατμητόν, hoc est, insectilem appellat: interiorē uero partē eius, spongiam.

EX M. VERG. COMM.

Cucurbitulam Græcor: exēplo non male aliquis Colocynthida inter latinos dixisset. Cur enim, si licuit diminuto a Colocyntha, quæ illis Cucurbita est, nomine, syluestrem & amaram hanc Colocynthida dicere: nō liceat & nobis a latinor: Cucurbita, Cucurbitulā facere, æqualemq; illis æstimatione & uocis compositione, rei passim notæ appellationem ad medicinā afferre? Nos sane in eam partē trahebamus. Fuitq; diu nobis animus, Cucurbitulam huic capitulum facere: sed reuocauit nos ab eo consilio, recepta iam pridem a medicis oibus, & officinis græca uox: multoq; magis, ne æquiuoca appellatione miscerentur simul planta hæc, & quas latini scriptores omnes ad aliū medicinæ usum transfulerunt, Cucurbitulas eas uocantes, quæ spiritus, & præfocatæ flammæ ui corporibus nostris impactæ in superiorē partem & extimā cutē sanguinē, & q̃ alia opus fuerint, trahūt. Eaq; ob cām seruata græca appellatione, de Colocynthide, q̃ syluestris Cucurbita est, caput inscripsimus. Alioqn Colocynthis parua Cucurbita est. Fecerūtq; eā Cucurbitis alijs congenerē Viticulæ folia & fructus: ideoq; tā multas ab eadē Cucurbita appellationes alias inuenit. Credimusq; uos, qđ in Diosco. legitur, ἡ δὲ καλοκυνθία ἀγρὸς, quæ uoces nihil significat aliud q̃ capræ Cucurbitam, & a cunctis ex eo caprina Cucurbita reddita est, poruisse qđda legi ἡ δὲ καλοκυνθία ἄγριος, qđ est, syluestris Cucurbita. Nolumus nūc quære, uelcant ne ea capræ, an nō; amaritudinēq; eius in cibo sentiāt: & an qđ ho-

mini nocet, possit alijs animalibus nō nocere. Quotidianum enim id est. Fitq; passim quod Lucetius cecinit, ut non sit idem nobis & brutis multarū rerum sensus. Quippe uidere licet, pinguescere saepe Cicuta barbigeras pecudes, homini quā est acie uenenum. Verum quod suspirari hoc nos coegit, plantę genus est, quā ab omnibus in syluestriū censu numeratur; omnesq; Colocynthida describentes, siluestrem Cucurbitam uocant. Et omnium maxime Plinius lib. 20. capite. 3. Quod a scriptore hoc relinquendū fuisse uerisimile non est. Monere id uolumus, & si non multifaciendum forte aliquibus uideatur. Fecit amaritudo, quę Colocynthidi maxima est, & omnibus tam manifesta, ut qui plantam, & rem ignorat, solo Colocynthidi auditio nomine, amaritudinem intelligant, ut amara Cucurbita a quibusdam etiam diceretur. Quemadmodum quoniā copiosa in Aegypto nascitur, cuius rei testes etiam sacre hebræorum literę sunt, Alexandrina Cucurbita. Et hæc pro Colocynthidis appellatiōibus dicta hætenus sint.

De Epithymo.

CAP. CLXXXIX.

Epithymum Romani Inuolucrum uocant. Flos est e Thymo durior, Satureię similis. Capitula habet tenuia & leuia, & in eis fibras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura, ad quattuor drachmas, cum melle, sale & aceti exiguo, Plurimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

BARBARI COROLL.

Epithymum, flos est Thymi, sed non omnis. Differentia, quod hic herbaceus, alterius Thymi candidus. Aliquēum Hippopheon uocant. Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice nasci tenui, similitudine Pallioli rubens.

EX M. VERG. COMM.

Quod in Italia nascens nostrę ætatis herbarij Epithymon ostendunt, id nobis uidet quod Plinius. 26. uolumine capite. 8. de Epithymo agens aliter ab illo & his uerbis describit. Quidam aliter Epithymū tradūt, sine radice nasci, tenui, similitudine Pallioli rubens. &c. Tenuissimis quasi capillamentis in glomerem conuolutis, & his rubentibus Epithymon hoc uidetur: Floribus minimis, candidisque, Thymo similibus: nullis ut ille ait radicibus; eaq; forma, ut laneæ, stuppæue glomerem uidere te credas. Quam ob causam, non male crediderit aliquis, potuisse hoc genus a posterioribus Inuolucrum dici. Quod enim ab hoc describitur, & copiosum in Cappadocia & Pamphylia nasci traditur: diuersum, ut ex historia eius patet, et aliud a nostrate hoc est: simile tamen, aut coniunctum Thymo aliquid habere nomen indicat: aut alterum forte Thymi genus esse a Theophrasto & Plinio descriptum, nigro colore: quod tertio uolumine inter appellaciones Thymi numeratum ab hoc scriptore est. Theophrastus quidem palam id docet quinto de plantarum historia dicens, καὶ θύμιν το ὅσον δανόν, το δὲ μέλαν. Quod est, Et Thymon candidum alterum, alterum nigrum. Et Plinius. 21. capite. 10. Totidem & Thymi species, candidum, ac nigricans. Neq; hic aliud indicat, dicens Epithymum Thymi esse florem durioris & Thymbrę similis, quasi alterum sit Thymi genus, mollius, nec Thymbrę simile. Quocunq; autem modo se habet, si non alterum Thymi genus sit, coniunctum Thymo aliquid esse oportet. Id enim ea uox significat, quod in Thymo est scilicet. Et Paulus Aegineta lib. 6. de eo agens, ait in tertio ordine siccare, calefacereq; Epithymum, & Thymo efficacius esse. Quod ductu & conceptu uocum quod diximus ratio cinari facile est. Nihil autem in eam partem magis nos trahit, quā ut diximus, quod in Thymo sit, nascaturus, intelligi oportet. Vtiur eo idem Paulus, ut hic ait, in melancholicorum purgatione: nec minus etiam in ducenda simpliciter aluo. In quem usum bibi in uino iubet.

De Alypo.

CAP. CXC.

Alypon furculosa herba est, subrubra, latis ramulis, tenuibus folijs, flore molli, copioso, radice Betę, tenui, referta acris succo, semine Epithymi. Gignitur in maritimis. Hac pleraq; Libyę loca scætant. Semen atram bilem deiecit, si mensura Epithymo pari cum sale & aceto sumatur, Verum interanea leniter exulcerat.

Pli. li. 27. ca. 4.

C Lypon, & Alypea, & ut Paulo placet, Alypias, cauliculus est molli capite, non absimilis Betæ: ut inquit Plinius, acre gustatu ac lentum, mordensque uehementer & accendens. Caput, id est, radicem eius, Betæ similem intelligo, non folia: quippe quæ minuta ei sint: ut Dioscorides affirmat. Deprauatæ in Plinii uigesimo septimo libro Aliphôn, pro Alypo legebatur, antequam ipsi locum indicaremus.

EX M. VERG. COMM.

Semel tantum, & id etiam breuissime Alypi. 27. uolumine capite. 4. meminit Plinius. Nihil etiam Paulus Aegineta dictis decredisque scriptoris huius addidit. Vtinamque omnes non multo breuius & incertius, quam hic de eo tradidissent. Verba enim Plinii sunt. Alypon cauliculus est, molli capite, non dissimilis betæ: acre gustu, ac lentum, mordensque uehementer & accendens. Aluum soluit in aqua mulsa, addito sale modico. Minima portio duarum drachmarum, media quatuor, maxima sex, ea purgatione quibus datur e gallinaceo. Horum nihil, aut unum, alterumue in Dioscoridis legitur: cetera aut ab alijs accepta, aut aliter cognita Plinio fuerunt. Paulus Aegineta iisdem uerbis Dioscoridi subscripsit, Alypi dicens semen per inferna nigra purgare bilem, pariter Epithymo mensura sumptum, additis aceto & sale. Veruntamen leuiter intestina exulcerare. Quæ tota est in scriptore hoc Alypi medicina. Qui deprehendisse nostra ætate Alypon se credunt, furculosam, ut hic ait, herbam: sed non ultra duos, tresue furculos in ea ostendunt: in quibus per interualla bina sunt folia rubentia, & in summo lutei floris umbella. Quæ posset Alypon credi, nisi radix quæ in scriptore hoc gracilis & quantitate betæ traditur, in ea longe crassior inueniretur. Poruit illi a ui sua nomen fieri: & quoniam nigram bilem purget, qua purgata animi tristitia in melancholicis pellitur, eaque pulsa adest statim lætitia humani animi naturalis habitus, sic dici. Est enim græcis Alypon, quod tristitia, doloreque caret, aut liberat.

De Empetro, seu Calcifraga. CAP. CXCI.

EMPTETRON

D **E**MPETRON aliqui Phacoides uocant. Nasцитur in montibus & maritimis, falso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amarior sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 27. ca. 9.

Fmpetron hoc Phacoides a Dioscoride, Prasoides a Galeno & Paulo cognominatur. Fere in saxo nascitur. Recentius uires sunt, uetustate perdit eas. Lapillos qui fuisse uideantur, una rumpi affirmat, quod & in Saxifraga quod diximus ex Plinii sententia, ut qui nihil differre ab ea iudicari: quandoquidē medicinas, quas seorsum in utraque mentione Dioscorides enumerat, ipse uniuersas Empetro huic assignat. Aut igitur ita sentiendum est: aut Plinium errasse confitendum. Paulus certe Dioscoridem secutus, mentiones duas habet, quasi duorum generum. Galenus uero nicam, Empetron Actius etiam Epipetron, uocari solitum affirmat.

EX M. VERG. COMM.

Nasci in petris Empetron satis indicat nomen. Epipetron eadem significatione ex antiquioribus aliqui etiam uocauerunt. Nec solū, quia Lentis figuræ & spem refert Phacoides, sed Marrubio similis Prasoides etiam. Plinius Saxifragam a latinis uocari ait: miscetque cum ea quæ priuatim & seorsum a Dioscoride Saxifraga hoc ipso uolumine descripta est. Ex quo iterū suspicari cogimur, quod in Saxifraga dictum hoc ipso uolumine a nobis est, non esse illud in hoc scriptore eo nomine recipiendum: aut si sit, quod uerisimile tamē non est, uariantibus historia & medicina, bis de eadem actum fuisse non multo ante sub titulo Saxifragæ: quæ latina, & iterū nunc sub Empetri, quæ tota græca uox est. Paulus quidem Aegineta, qui totum in. s. suæ medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse uidetur, Empetri manifeste meminit: Saxifragæ autem nusquam: quod non relinquendum ab eo fuerat, si tunc in Dioscoride Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam recepisset. Crederemus nos, etiam eadem Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus utriusque historia & medicina esset. Ob eam causam peritioribus hoc relinquimus, certius de Saxifraga inuenturis, quod recipiendum, constituendumque sit.

De Clematide. CAP. CXCII.

A

κλεματίτις

Clematidem aliqui Epigetitū, Aegyptij Philacuon, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio uehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus ut Smilax. Tritum semen, & ex aqua, aut hydromelite potū, bilem pituitamq; detrahunt. Illita folia lepras eximunt. Cum lepidio conditur ad esum.

De Labrusca. CAP. CXCIII.

κλαύλος ἄγρια

Labrusca sarmenta Vitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij Solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis uuis simili, post maturitatē rubente. Rotunda est acitiorum facies. Feruesfacta radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marinā diluti pota, humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia condiuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Ampelos agria, hoc est, Vitis syluestris, ceditur horis omnibus, sed præcipue autumno. Ra dice acri, ut Theophrastus scribit, folio spisso, candicante, geniculata, rimoso cortice, uuis rubentibus Cocci modo, ut Plinius. 23. uolumine. Hæc & pro Amuleto, cuius sit proprie uua Taminia. Radix & acini, coria perficiunt, gelidissimæq; eorum est natura. Ut errauerit Theodorus, qui uerba illa in Theophrasto *κλαύτι τῷ καρπῷ τὰ ἀβρματὰ* interpretus ita sit, Fructu defoliant arbores; cum legere debuerit, non dendra, hoc est, arbores, sed derma, hoc est, corium: nec de foliant, sed depiant & subigunt. Pars acinorum æstu moritur, priusq; reliqua: qui & solstitiales dicuntur. Vniuersi nuncq; maturescunt: & si prius q̃ tota uua maturescat, detur cibo. Generi gallinaceo fastidium gignit uuas appetendi. Flos huius in racemis candidus dependet Solani per initia, post diuiditur in uitis fere imaginem, sed oblongam. Est ei similis, sed in salictis nascens, ad eisdem usus quæ Salicastrum uocatur, contra hominum & quadrupedū scabiem, Plinius. 27. ita descripsit. Folio duro, cineracei coloris, uiticulis callosis, rubentibus qualiter flos quem Iouis flammam appellamus in Violis, ferens semen punici mali simile in acinis, ad eisdem effectus. Propterea & recentioribus fere, qui hanc & flammulam, & Iouis quoq; flammam uocarunt. Est & Labrusca uitis syluestris una species, Oenanthen ferens, duorum generum, albi & nigri, ut Dioscorides post docebit: Neū quemq; decipiat Pliniana lectio, Labrusca inquit Oenanthen fert satis dictam, quæ a Græcis Ampelos agria appellatur, spissis & candicantibus folijs, geniculata, rimoso cortice, fert uuas rubentes, cocci modo, & reliqua. His uerbis Plinius. 23. uolumine duos fructes, non unum designat, Labruscam, & quæ Ampelos agria uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est syluestris hæc Vitis quam Romani Labruscam dixerunt. Illa enim sola consuetudinis priuatione à reliquo uitium genere differt: hæc uiticularū, & racemosi fructus, quæ fert, similiter dine inter Vites numeratur. Eamq; ob causam, duobus locis ab hoc scriptore, hoc scilicet, & a quinti uoluminis principio statim de syluestri Vite agit. Hæc inter herbas, illa inter Vites: hæc folio hortensij Solani describitur, illa uirgineo folio intelligenda est. Et nihilominus, quod raro in ea gente sit, utriusq; idem nomen auditur: & utraq; Ampelos agria uocatur. Fuitq; hæc Plinio causa, nomen magis aliquando q̃ rerum rationē sequenti: ut bis diuersis locis de eadem syluestri hac Vite importune ageret. Primuri. 23. tiolumine capite. 2. Inter Vites. Mox iterum. 27. capite. 7. inter herbas. Poterunt uolentes certius in eo quod dicimus cognoscere: legentesq; palam deprehendere, paulo minus q̃ totam duobus locis eiusdem plantæ historiam & medicinam esse. Quæ enim folia. 23. uolumine candicantia ab eo dicuntur. 27. deinde cineracei coloris uocantur: nullo discrimine inter candicans, & quod cineracei coloris sit. Quodq; priore illo loco in medicina decernitur, Radix decocta in aqua, & in uini Cōi cyathis duobus, humorem alui ciet, ideo hydropicis datur: in posteriore pariter docetur, Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis uini Cōi cyathis duobus, aluum soluit leniter: i-

Pli. li. 23. ca. 2
lib. 27. ca. 74

B

C deo hydropicis datur . Quæ ex multis monstrasse satis sit : ne dubitent qui in Pliniana lectio-
ne occupantur, quales in eo siluestres duæ Vites sint. Vna tamen tantum est, & inutiliter iterum
ab eo repetita, neque apte inter Vites tractata: quoniam herba sit, in herbarum censu seruan-
da fuerit . Nominis ut diximus ratio magis, quæ rei misceri in eo hæc fecit. Theophrastus, g.
plantarum historia breuitur, & his uerbis de radice agrestis Vitis egit, θυμακτίνον δὲ καὶ ἀριὺν καὶ
τὸς ἀμπέλων τὸς ἀγρίας οἱ βίβα, & αὐτὸ καὶ τὸς φίλωρον χρίσιμον καὶ ἰσχυρὸν ἀπέναντι . τῶ δὲ καρπῶ φαίνεται
τὰ δισμακτ, τὴν αὖτις δὲ πᾶσαν ὥραν οἱ πόδας αὐτὴ μέλαιναι . Quod est, Calefacit, acrisque est, & syluestris
Vitis radix, Earumque ob causam depilandæ est, & cutis aspredines exterit. Fructu depilantur co-
ria. Cæditur quocunque tempore, sed autumno præcipue. Dictum a nobis hoc etiã est, quoniã &
a Theophrasto inter herbas Peucedanæ, Daucum, Dracunculæ, non inter arbores syluestris
hæc Vitis numeratur: multoque magis ob diuersitate remedij ex ea contra cutis asperitates : quod
hic in fructu & acinis, Theophrastus in radice cõstituit. Videndum tamẽ, an syluestris hæc Theo-
phrastî Vitis ea sit, de qua nunc agimus : an quæ statim ab hac tractanda erit: exquo depilare
fructum eius dicit: quod a Dioscoride albæ Vin, quæ mox dicitur, tribuitur. Sit ergo inter her-
bas syluestris Vitis, inter arbores autem Labrusca, suisque notis utraq; quæritibus se ostendat:
illa, ut passim omnes nouerunt: hæc, ut a Dioscoride & alijs traditur, satiuæ Solani folio a prin-
cipio, paulatim deinde in uicigine figuram transeunte: uticulis longis, & quales in Vite sunt
lignosis, asperis, rimosi corticis, acinis paruiss, rotundis, in maturitate rubescẽtibus: quibus ob-
seruatis notis, non erit difficile inter prutem eam, et in sepibus inuenire. Et si non adeo frequens
nascatur, Nos qualem hic descripsit aliquando uidimus.

V De Vite alba. CAP. CXIII.

ἀμπέλους λευκῆς

VITEM ALBAM aliqui Bryoniam, alij Ophiothaphylon, alij Chelidonium, aut Melothron, aut Psilothron, aut Archezostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folij sarmentis, pampiniscq; satiuam Vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos prope se nacta sit frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrem uim fortiuntur. Itaq; ulcerum phagedanis, gangranis, chironijs, putrentium tibiarum tedio, efficaciter ex sale illiuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vicia cutis in facie, uarosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia, & scenogræco. Eodem effectû prodest decocta in oleo, usquedum liquecat. Sugillata tollit. Reduias committit. Inflammationes discutit illita ex uino. Suppurationes rumpit. Medicamento apte immiscetur, quod carnem exest. Infracta ossa extrahit, trita & imposita. Datur comitalibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto. Prodest attonitis & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra uiperarum ictus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus necat. Mentem interdum subtrubat. Cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, dissicile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsis, ruptis, & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus consumit. Illiniat ad eadem cum fico. Ad muliebres inessus decoquit. Siquidem uulvas purgat, sed abortû facit. Succus e radice uere exprimit, qui trahit pituitâ cû aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semel efficaciter illinit. Lactis abundantia facit succus eius, si cû tritico decoctio sorbeat.

BARBARI COROLL.

Ampelos leuce, hoc est, Vitis alba, quæ & Bryonia & Bryonias a Columella, & Madon ab aliqubus uocat, Echelos ab Hippocrate, Melothron (ut putat) a Theophrasto, in coronas folio admissa. Quidam Psilothrū dicunt: quia pelles confici huius acinis, quemadmodū & La brusca possint. Huius sarmenta, longis & exilibus internodijs geniculata scandūt. Folia pampinosa, ad magnitudinem Hederæ diuiduntur, ut Vitium; Radix albā, grādis, Raphano similibus. Semen in uua, raris acinis dependet, succo rubente, postea crōcino. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis.

EX M. VERG. COM M.

Quod poterat a legētibz in scriptoris huius Bryonia desyderari, quos scilicet natales habeat, & quibus locis inueniēda sit, Columella Romanus scriptor in carmine suo expleuit dicens. Quæq; tuas audax imitatur Nysie uites, Nec metuit sentes; nam uepribz improba surgens Achradas, indomitæq; Bryonias alligat ulmos. Bacchi uitibus similem, & in sepibus spinas, & æuleatos frutices alligantem describens: quæ totā fere est candida in hoc scriptore Bryoniæ historia. Monuit illud obiter etiam Romanus ille auctor, consueuisse ueteres ob quotidianum & multiplicem eius ad uitæ remedia usum, syluestrem alioquin stirpem in hortis conferre: ne eogerentur incultis locis, & inter sepes quærere, quod non in morbis tantū utile esset, sed in sanitatis usu simplex, & sale seruatum etiam placeret. Quod hic primum indicat, dicens comedi e terra primum prodeuntes Bryoniæ asparagos. Mox etiam in primo Paulus Aegineta de omnibus asparagis agens. Et inter latinos Columella lib. 13. capite. 7. multarum herbarum cum floribus & coliculis suis condituram docens. Quæ omnia a posterioribus neglecta, dubium nobis modo utriusq; Bryoniæ nomen & historiam faciunt. Cum tamē nihil ubiq; notius, & medicīna etiā nostri temporis, barbaris uocibus in his utens, cognita re, Bryoniam non satis cognoscit. Laudauit magnopere Bryoniæ asparagos quo diximus loco Paulus Aegineta his uerbis. καὶ οἱ ἀπὸ τῆς βρυονίας ἀσπαραγοὶ ὑπερύμαχοι καὶ καὶ διουρητικοὶ διὰ τὸ τρώειν αὐτὰ πικρὸν καὶ μέλλον τρίβοναι τὰν ἀπὸ τῶν λαχάνων. Egerat eo loco is scriptor de his, qui nūc priuatim asparagi dicuntur: mox ea subiecit. Et Bryoniæ asparagi stomacho quidē accommodati sunt, & urinam ciunt: parum tamen nutriunt; & si cum concoquantur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sint. Quod totum ad sanitatis usum pertinet. Nam in medicīna præter has alix ab eodem in sexto uires utriq; Bryoniæ assignantur. Omnes tamen ex hoc scriptore acceptæ, in quibus minus efficacem candida nigram, de qua mox dicitur, tradit. Nec aliud in remediōrū usu discriminē inter eas tradidit. Quibus autē notis & partibus inter se differant, facile ex scriptoris huius historia cognoscere: præsertimq; ex foliorum figura, & fructus colore. Sunt enim in alba fatiux uiti similia folia, pilosiora tamen: in nigra hederæ, priuatimq; Smilaci: fructus in utraq; quidem acinosus, sed in candida πύρρος rufus scilicet, in nigra ante maturitatem uiridis, cum maturuit niger. Habet nigra etiā radicis certas notas ab hoc scriptore traditas, quibus facillime discerni ab alia possit. Non erit, ut diximus, difficile in sepibus, & inter fruteta quærentibus utramq; Bryoniamprehendere: ubiq; enim nascuntur: & cum deprehenderit aliquis, si uoluerit antiquorum exemplo earū asparagis in sanitate uti poterit: sin minus, medicīnæ seruat. Numerauit Plinius, 23. uolumine capite. 2. Bryoniæ albæ easdem huic scriptori appellationes Ophiostraphylem, Melothrum, Psilothrum, Archezostim, Cedrosim, & Naddon. Verum ultima hæc Diōs, nulla est: nisi quæ in eo Chedidion legitur, Naddon legi debuerit: aut ediuerso legi in Plinio oporteat. Omnium huiusmodi nulla satis certa origo est: præterq; Psilothri, quæ a depilandis corijs, quem usum habent acini eius, facta est. Ex quo potuit etiam & Melothron fieri. Siquidē græci μέλοθρα dixerunt βέμματα & καλλωπίσματα, id est, colorum infectiones & concinnationes. Quod corijs forte ex Bryoniæ albæ fructu accederet. Sed in hoc scriptore per, u, Melothron, in illis per, s, scribitur. Potuit etiam Ophiostraphyle dici, quasi anguina uua. Id enim ea uox græcis indicat. In sepibus enim uirgineo folio, & acinoso fructu nascitur: in quibus & angues plerumq; latent: quasi crediderint aliqui, ut ex fatiuis uitis uux homini debentur, sic anguibz natura illas eo loco seruauit.

De Vite nigra.

CAP. CXCv.

Nigra Vitis quam aliqui nigrā Bryoniam uocat, alij Ghironion, ampelon, alij Bucranion, Romani Oblameniam, alij Britanum, alij Betisalcam, Daci Priadelam, alij Pegrinam, Aphri Lauothen.

ἡμπύλο μέλανα

C Folia fert Hedera, sed maiora, smilaceis pxima, caules etiam cognatos. Capreolis suis arbores quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racematū cohērēt, qui inter principia uirēt, & post maturitatē nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxco colore nītet. Caules qui primo germinū par-
tu erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. Vrinās cient. Lienem absumunt. Vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione ten-
tatis profunt. Radix eadē quæ Vitis alba præstat, sed inefficacius. Fo-
lia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illi-
nuntur. Luxatis itidem imponuntur.

B A R B A R I C O R O L L.

Ampelos melæna, id est, Vitis nigra, quam proprie Bryoniam uocant, alij Gynecanthen, aut Aproniam, simileni priori, præterq̃ colore, ut Plinius existimat. Sunt & in folio discrimi-
nā, ut Dioscorides, & ipsa quoq̃ res demonstrat. Huius semen nigrum, Asparago simile. In fru-
tetis, & arundinetis maxime nascitur. Aiunt, si quis in uilla eam extruxerit, fugere accipitres,
tursq̃ fieri aues uillaticas. Hanc etiam Tannum, siue Tamum quidam uocari putant; & uul-
go Tamarum. **Q.** Columella,
Lubrica iam Lapatos, iam Tami sponte uirescunt.
Sunt qui Thannum quoq̃ scribant, non Tamum, aut Tanum.

E X M. V E R G. C O M M.

R Arrior inuentu, ideoq̃ cognitu difficilior nigra q̃ alba Bryonia est: inuenta tamen, totam
ueterum scriptorum historiam confirmat. Sunt illi per interualla cum folijs dispositi racemi: & co-
lore ante & post maturitatem quo ab hoc describuntur. Quos tamen hic caules uocat, nos po-
tius uiticulas dixerimus: earum enim speciem magis q̃ caulium habent. Maturescūt acini eius
extrema æstare: & ubi minus calet, umbrosiq̃ locis autumnō. Nascitur & hæc, ut in alba dixi-
mus, in sepibus, & inter fruteta, propinquas fūrpes ascendens, & alligans. Minor hæc q̃ alba
est, nec tam late ut illa uiticulas suas spargit. Pares utriusq̃ uires antiqui omnes esse tradiderūt:
ideoq̃ sine discrimine uti alterutra iusserunt. Licetq̃ id in Paulo Aegineta cognoscere: qui con-
tra nigras cicatrices, utriusq̃ ope his uerbis uidetur. *ὁλὰς μελαίνας αἰρου βρυονίας ψίφη λυνεῖ καὶ με-
λαίνες ἰσχυρίσεν ἐν ὁλίῳ ἄγρι χυλῶσις τὸ ἰαεὶν ἰπτιδιῶνον.* Quod est. Nigras cicatrices delet Bryo-
niæ radicis albæ & nigre in oleo decoctæ. &c. De eius appellationibus non est quod dicamus,
præterq̃ Chironiam uitem uocari potuisse: aut q̃ Chiron medicinæ & herbarum in Thessalia
peritissimus, ulceribus iumētorum & hominum ex ea primus remedium inuenerit: aut q̃ Chi-
ronijs ulceribus ea ueteres mederentur. Quod autem in scriptore hoc legitur, uuā Taminiam
dici a Romanis, falsum est. Alia enim a Bryonia Taminia uua est: quemadmodum Latini anti-
quiores omnes docuerunt.

De Filice C A P. C X C V I.

πτερίδι

PTerin Græcorum alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anaspho-
ron, alij Blechnon, alij Polyrhizon uocant. Magi Hermubain,
Romani Filicam, alij Laculem, alij Filifanariam, Aegyptij Asini sangui-
nem. Folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali
longitudine exeunt, multifida & lateribus pinnata, subgrauī odore, ra-
dice per summa cespitum nigra, oblonga, multis capillamentis fibrata,
subadstringente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Radix latas ti-
neas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsā. Melius si cum
Scamonia, aut Veratri nigri totidem obolis detur. Sed qui sumunt, æ-
lia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat: Radix &
potu & illitu prodest ijs qui arundinibus cēsi sunt, Probatum maxime,

quæ in arundinetis proueniat & locis Pulegio scatentibus.

A

BARBARI COROLL.

PTeris, hoc est, Filix, marcescit sumo iniecto, & ob id pecoris incubitur: quod & in Medica herba nonnulli tradunt. Nullus Filici incisus succus. Radici gustus & dulci astringens. Vna hæc est, & ex ea Filices exeunt, bina etiam cubita excedentes longitudine, hanc a marem existimant. A Filicibus Filecta, ut a Caricibus Carecta dicimus. Est autem Carex e qua molli simi texuntur cathedrae. Folio fere arundinis, uliginoso, & palustri solo plurima. Seruus Caricem describit acutam, & durissimam, Sparto similem. A Filice Fdicoes dictos existimant: quos ueteres pro malis & inutilibus accipiebant. Dicebantur & Felicati calices a Filice.

Pli. li. 27. ca. 9.

EX M. VERG. COMM.

Inuisam Maro in Georgicis suis, contra in Buccolicis ἀπαλὴν, id est, mollem, & ex eo amabilem Theocritus Filicem, clari rerum omnium peritiam poetæ duo dixerunt. Neuter tamen simpliciter, sed alter aratris & frumentario agro, alter pastoribus & pecori: eadem fortuna qua tota fere natura est, quæ benigna semper & utilis, quod alijs importune abstulit, aut in quo nocuit alijs liberaliter dedit & profuit. Sterilitatis, aut parū fecundi ad fruges agri, indicium Filix est: & præter id obliquis & longis radicibus terram amplexa, bubulcos & boues longioris laboris tedio arantes remoratur. Contra, in montibus, in cultisq; locis nascens, grata pecori & pastoribus quæsita: his cubilia & tomenta per hyemē sicca præbens, illi utroq; tempore cibos. Inutilis homini & infelix, nisi eiusdem naturæ benignitate malorum remedijs & medicina ipsa etiam se miscuisset: nataq; in nobis uentris animalia escicare, & perimeret. Quod nō tantum hic docet, sed multo certius Theophrastus ad extremū nonum de plantarū historia uolumen. Cuius de Filicis potestate & ui uerba hæc sunt, ἡ δὲ τῆς πτρίδος ῥίζα μόνον τῷ κυλῷ γλυκύτροπος. ἡ μὲν δὲ πλατὺν ἰσθάλλει. σπέρμα δὲ οὐκ ἔχει οὐδὲ ὄπλον. τίμινος δὲ ὄρεα καὶ μετὰ πόρον φασίν. Quod est. Radix uero Filicis sola, sapore dulci simul & acerbō est. Latos lumbricos pellit. Non semen, non liquorē habet. Ferunt tempestiuū autumno secari. Pluribus in scriptore hoc appellatio nibus Filix indicatur: pluresq; earum ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt, factæ a genibus fuerunt. Pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Quæ quoniam numerosa & confecta in pilosis ramulis eius sunt, ideo etiam a quibusdam Dasyclonon dicta est, ἄσπις enim hirsutum, pilosum, & asperum græcis significat. Quod deinde in eodē scriptore hoc passim, & in cunctis græcis legitur, uocari a quibusdam Filicē βλάχων, id est, ut nos uertimus, Blachnon, parum certam nobis habet rationem. Nec scimus, an ex Pulegio, quod βλάχων ueteres aliqui nominauerunt, ad Filicem male & importune deflecta appellatio ea fuerit. Siquidē nihil Pulegio & Filici simile, commune ē est. Nec legisse meminimus, gustatam pecori primū Filicem, quod Pulegio omnes tribuerunt. Balatū in toto grege excitare: ideoq; sic uocatam fuisse. Et nihilominus, ut paulo ante testati sumus, quotquot uidimus græcorum codices, Blachnon uocari Filicem indicant. Solus Nicander in Theriacis suis, nisi alia Filicis in eo ea uox sit, aut male in eo id legatur, aliter appellationem hanc protulit. Versus eius est, ἡ δὲ πόδις χιλιῶν βλήθρον περιβάλλει χάρην. Blethrum ille, nō Blachnon Filicem in multa folia diuisam uocauit. Quicq; interpretatus est eum græcus scriptor, Blethrum ait Filicē dici, quæ etiam Blachnon nominetur. Ex quo si recipiendum sit hominis testimonium, colligere oportebit, utroq; modo & Blachnon, & Blethrū Filicem quondam dictam fuisse. Eamq; ob causam nos nihil mutantes, Blachnon uocari eam a quibusdam uertimus. Folia hic sine caule Filicem merito, & ex re uocauit. Sunt enim sibi folia non minuta illa, quæ numerosa & pene infinita totis ramulis disposita sunt, sed quæ uno pediculo cubitali, ut hic ait, longitudine a terra statim, aut ex stipite eius exeunt in plura & minora alia illa foliola diuisa. Nullos habere caules Filix. Si quid enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem habet: quoniam negato illi semine, merito caulem naturā etiam negauit. Propter seminem enim plerumq; caulis est. Sterilem, & sine semine omnes Filicem dixerunt. Falsumq; est quod iactant aliqui, una solstitiali nocte florere Filicem: eademq; hora cum defloruit, maturum in terram semē cadere: ideoq; nisi aliquis tunc adfuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse. Quæ omnia Agyrtarum cōmenta sunt, humanæ ignorantie ad quæsum tam impudenter illudent. Neq; hoc mendacii genere contenti, ne quid fraudi eorū & sceleri desset, religionem etiam cōgenitis suis addiderunt. Natali nocte eius, quo (ut sacræ Christianorū literæ testantur) inter natos mulierum maior alius non surrexit, cuncta illa fieri & obseruari præcipientes. Nec sentiunt, quo dierum numero natalis ea nox, & solstitialis illa nunc inter se distente.

✎

B b 7

C Sterilis, ut rem nostram agamus, priuataq; semine Filix est. Quodq; a natura sibi ea non inuenit, homini etiam inuider. Si quidem quod in scriptore hoc non legitur, ueteres græcorum medici & herbarij, posse Filicem dixerunt uiuentes in utero animantium foetus enecare, et enecatos pellerē. Quod ab hac statim dicendæ Thelypteridi a Dioscoride tribuitur. Cuius & Filicis pares paulominus q̃ omnino uires sunt.

De Filice foemina. CAP. CXC VII.

ἑλνπιρίς

Thelypterin, aliqui Nymphæam Pterin nominant, Romani Linguam ceruinam, folijs Filicis, furculosis & quæ non singulari ut illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus, latis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiam nigræ inueniuntur. Pelunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate sumpto. Potæ cum uino drachmis tribus teretes tineas eijciunt. Daræ foeminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. Iumentorum ceruicibus medetur. Folia recensia in oleribus cocta manduntur, ut uetrem emolliant.

BARBARI COROLL.

D Thelypterin alterum Filicis genus, foeminam appellant. Folijs hæc breuior, mollior, densior, canaliculata. Vtriusq; radicibus futes pinguescunt: quæ sunt eis longæ, obliquæ, nigrae, præcipue cum inaruerē. Siccant eas sole, Virgilijs occidentibus effollas. Nascuntur ubiq; sed maxime frigido solo. Vtriusq; lateribus pinnata: unde Græci nomen imposuere. His cimices necantur. Serpentem non recipiunt. Vfus radicis in trimatu tantum, nec ultra, nec citra. Laudant in utroq; sexu Macedonicam: deinde Cassiopicam.

EX M. VERG. COMM.

COpiosior, & pluribus locis Filix q̃ Thelypteris nascitur: ideoq; rusticæ & urbanae plebi notior: & quatenus homini inutilis planta, in minore honore est. Alioquin eosdē natales, eadēq; uires utraq; habet: specie etiam adeo similes, ut imperitos inuicem sæpe fallant. Quod aut maxime simile habent, pinnata folia sunt, eodem ordine & magnitudine in utraq; disposita. Quod contra discrepat inter eas, ramuli, & ramulorum color est: qui fruticosi in hac ab uno principio ex terra oriuntur, & quo colore radices hic esse ait, in nigro ruffo, & aliquando rubente uidentur. Discrepat & illud, q̃ Filix ubiq; fere nascitur, & contumax agricolæ repugnat, post confitos etiam agros regerminans: Hæc locis incultis, frigidis, umbrosis, & humentibus semper inuenitur. Quæ ob causam Nymphaea Pteris, id est, Nymphaea Filix dicta est: q̃ nymphas, .i. id est solitudines, nemora, & aquas amat. Foeminā Filicem græci eam nominauerunt, non sexus diuersitate aliqua, sed ut ea ratione qualia in plantis & medica materia pleraq; alia sunt, a priorē illa discernent. Plinius, & græcorum herbarij alij, & medici similes, continuataq; historia de utraq; egerunt: hic tamen seorsum: Eumq; nos secuti, duobus capitibus, duas descriptimus plantas. Alioquin non male forsan coniunxisset eas aliquis: tanta inter eas similitudo, & tam cōmunis genus, paresq; uires sunt. Legebantur in hoc capite contra q̃ oporteret duo. Alterum Barbarus ex Plinio emendauit, in radicem historiam. .i. in qua male in græcis legitur πλατύαι, quæ uox latitudinem significat: cum tamen nulla sit radicibus huius latitudo. Vnius literę uisum & lapsus id fecit. πλατύαι enim, id est, obliquæ, legi oportet. Plinius de his agens ait. Radices utriq; longæ in obliquum, nigrae. &c. Alterum ambo interpretes ex eodem Plinio emendari posse non animaduertuerunt. Est autem ad ultimum capite, quo loco hic ait, καὶ ἔχουσιν διαβῆ. &c. quarum uocum sensus quidem est, ut illi crediderūt, Et si prægnans supergrediatur. &c. Verum non διαβῆ, quod supergredi significat, sed διάβη, quod est, sumat, legi oportebat. Sic qui uetustissimus & probatissimę fidei apud nos est græcus Diosc. habet. Si ratio etiam offendit: & Plinius confirmat dicens, Neutra danda foeminis: quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Plinio etiam antiquior Theophrastus lib. 9. de plantarum historia de Thelypteride hac his uerbis docuit. ἡ δὲ ἑλνπιρίς χρησίμη πρὸς τὰς ἑλμεινίας τὰς τε πλατύας καὶ τὰς λεπτάς, πρὸς μὲν τὰς πλατύας ἀναδινύμην μάλιστα. πρὸς δὲ τὰς λεπτάς ἐν ὄνω γλυκὺ, μετ' ἀλφίτων διεισθῆναι. γυναικὶ δὲ ἰὰν γαστέρι, ἰὰν μὲν ἔχουσιν ἐν βελλυν φασίν, ἰὰν δὲ μὴ, τὸ ὅλον ἀτελεν γίνεσθαι. Quorum sensus est, Vilis autem contra

lumbricos uentris Thelypteris, & latos, & graciles. Contra latos quidem cum melle, cōtra grāciles autē in uino dulci cum polenta. Quin etiam si mulieri detur, pręgnanti quidem abortū, simpliciter autem foemini sterilitatem facere dicitur. Et hæc Theophrastus eadē cunctis alijs. Oēs, ut uidet, cibo potuue Thelypteridis sterilefcere foeminas, grauidas uero abortū facere affirmat. Nullus autē, si grauida Filicem hanc suppegrediatur, fieri abortum testatur. Eamq; ob causam, tot re stitū concordia fide & autoritate, aliter q̃ cæteri locum, & ut legitur intrepide uertimus.

De Filicula. CAP. CXCVIII.

Polypodium aliqui Scolopendrium, alij Pterin, alij Polyrhizon, Latini Filiculam uocant. Nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudicibus, præsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici si milis, subhirsuta, non tenui perinde diuifura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus hærbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgādī uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua, ad aluum sol uendum. Arida farina aquæ mulsæ insparsa, detrahit bilem & pituitā. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum fissuras.

BARBARI COROLL.

Polypodium, nostri, ut Theodorus putat, Filiculam appellant, in Plinio ita legens. Ego Filiculam dicendum arbitror, cum ex Dioscoride, tum ex Filicis similitudine: tum ex Catone, q̃ Filiculam uocauit, ad deijciendam aluum præberi iubens eam. Eodem modo & Columella nominauit. Vnde uinum Polypodites quoq; ad eundem usum fit, præcipuum in Phœnic oppido eius Byblo: ut inquit Aetius. Post imbres semper emicat hæc herba, floret, & semen non fert.

EX M. VERG. COMM.

Folia Romanis Filiculā, Græcis pilosæ cauernosæq; acetabulorum modō radices Polypo dium fecerunt: exiguum herbam, ideoq; diminuto nomine ab utraq; gente appellatam. Folia enim (quod hic: Theophrastus, Plinius, latinic; & græci fere omnes testantur) Filici similia habet: radices autem pilosas, minimi digiti crassitudine. Sed quod marinis Polypis cognominem plantam fecit, per longitudinem certis interuallis dispositi concaui tumores, eadem specie et natura usu quo in polypis acetabula uidentur, fuerunt. Neq; enim a multitudine pedū, quos nullo habet ut polypum, Polypodium græci herbam nominauerunt, sed quoniam polypo, quā diximus nota similis est, sic quondam uocata fuit: nulla alia q̃ exigui polypi significatione. Di minutum siquidem a polypo nomen Polypodium est. Facile intelligit quod dicimus, qui oculatus testis radice eius fuit. Videbit enim qualem nos diximus crassitudine, & uillositate radicem: mox in ea apertos & concauos tumores quosdam, quibus nititur & hæret: non aliter q̃ in mari polypi acetabulis suis hærent, sugunt, & quæ coeperunt tenent. Qualia autem Acetabula sint, & unde ad multas naturæ partes id nomen transierit, in Acetabulo herba, & alibi longius diximus. Idque est quod Plinius uicesimo sexto uolumine ait. Radix crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri. Felici descriptione usus, rei quam antea eum Theophrastus, & hic scriptor isdem fere uerbis tradiderant. Theophrasti uerba libro nono de plantarum historia sunt, quo loco de radicū diuersitate agit, hæc, ἡ δὲ τοῦ πολυπόδιον δακτύλου καὶ ἔχουσα κοτυλάδας, ἵσται δὲ τοῦ πολυπόδου πικτάναι, καὶ αἰσὶν δὲ κάρω. φέλλων ἔχει ὁμοίαν τῇ πτερίδι τῇ μεγάλῃ καὶ φέται ἐν τοῖς πέτραις. Quorū sensus est. Pilosa autē Polypodij radix, acetabula habens, qualia polyporū cirri habent: purgat per inferna. Foliū maiori Filici simile habet, & in petris nascitur. Hic non tam manifeste rem descripsit: sed cum dixisset habere Polypodij radicem cirros polypo similes, cogitanda legentibus reliquit acetabula: quæ necessario eos sequuntur, & sine quibus in polypis cirri esse nō possunt. Alioquin differunt a Cirris Acetabula. Illi enim tota polyporum flagella sunt: hæc autem in flagellis & cirris his cauernosæ concauitates, quibus id animal nititur, apprehendit, & apprehensa exfugit. Et hæc tota Polypodij nominis ratio in græcis, & causa fuit. Romani, quæ certius & in aperto magis erant folia contemplati, Filiculam uocauerūt. Testaturq; id Plinius, eodem loco dicens. Detrahit bilem Polypodium, quam nostri Filiculam uocant. Similis enim Filici est. Sed multo certius ante eum, M. Caro operis sui

πολυπόδιον

Pli. li. 26. c. 8. & 12.

B

C dere rustica capite centesimo quinquagesimo octauo, qui cum familiam rusticam doceret, quo modo aluum deijcere oporteat, plura simul coqui iubebat: frustum de perna Brassicæ, & betæ, cum radice sua coliculos: tum Filiculæ paulum, Polypodium hanc intelligens: cui, testantibus id cunctis alijs, egregia in purgando uis est. Polyrhizon, id est, multiradicem uocari hic etiam ait, ut paulo ante diximus, a copia radicum: quod nomen accreuisse nos illi credimus ex pilositate eius. Nasci in petris tantum Theophrastus ait. Omnes alijs tamen ultra petras in arborum, præsertimque quercuum truncis prouenire etiam tradiderunt. Probantque officing, ex quercu magis, quæ ex petris, aut alijs arboribus. Plinius sub arboribus uetustis nasci ait. Cæteri uero in, non sub arboribus. Addidit ille tamen uetustatem necessariam Polypodij natalibus. Inter corticis enim rimas nascitur, quas uetustiores tamen arbores amisso iuuentutis humore & liquore ducunt.

¶ De Dryopteris. CAP. CXCIX.

dryopteris

DRYOPTERIN aliqui Pterion, alijs Nymphæam Pterin nominant. Nascitur in ueterum roborum musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim primum usque dum sudorem euocet: mox sudor abluitur, & recess imponitur.

BARBARI COROLL.

Pli, li. 17, ca. 9.

DRYOPTERIS, folio subdulci diuersa huic, sed similis est, Dryophonon a Plinio uocata, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis utrinque folijs, Pollicari amplitudine: qualibus Oxy-myrsine, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos: semine uero pro Pipere utuntur.

EX M. VERG. COMM.

QVERNA Filix Dryopteris est: id enim græcis ea uox significat. Eamque ob causam ex Filice pleraque illi nomina accreuerunt. Polypodio similis eousque Dryopteris est, ut sæpe carpentes fallat. Filici enim similis ut illud, & in uetustis quercubus pariter nascitur. Quod discrepat, radix est, & in natalibus muscosæ arborum illarum partes. Sapor in utraque idem, sed ad medicinam uires diuersæ. Breuissime de ea antiquiores omnes egerunt. Nosque eos secuti, nihil ultra de ea monebimus, quæ oportere in carpendo diligentiores herbarios esse: ne si legentes similitudine fefellerit, nullas Polypodij uires esse utentibus credendum relinquat.

¶ De Cnico. CAP. CC.

cnicus

CNICUS folijs constat oblongis, asperis spinosis, caule sesquipedali, capitulo magnitudine grandis oliuæ, flore Croci, semine candido, alioqui rustico, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis rursus succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decoctus, cogitur in placentulas, quæ aluum emolliunt. Hæc in frusta quatuor finduntur, quæ nucis Iuglandis magnitudinem impleant. E quibus ante cenam duo uel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibatorum cyathi tres, anesi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

BARBARI COROLL.

Pli, li. 21, ca. 15.

CNECOS, a Theodoro Cartamum sermone tulgi dicitur. Multis caulibus, ramisque se spargit. Desyluestri diximus in Atractylide. In Cneco peculiare illud a Theophrasto redditur: quæ syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habetur: Satium durius, spinosius, Cnicon Italicæ ignotam, ut Plinius scribit, Aegyptus maxime celebrat, oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt

ex femine eius, quo & psitaci nuncaluntur, Cnecos melius q̄ Cnicos dicitur. Nam & Cnacōn, a feminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpar. Democritus, & omnino ehyimici florem Cnici Echumenion appellat. Iidem Elydrion herbam nominant: nec quæ sit ea docent, præter q̄, q̄ lucei sit coloris. Inuenio tamen in Opisthographis medicinalibus quibusdam, pro Chelidonio minore acceptam Elydrion.

EX M. VERG. COMM.

Aegyptiam ubiq; in historia sua, & Italia ignotam Plinius Cnicon suam facit: conficiq; in ea gente ex eius femine oleum. Theophrastus, aliq; omnes, non magis in Aegypto q̄ Græcia & alijs locis nasci decreuisse uidentur: simpliciter de ea agentes, nullumq; huiuscemodi discrimen in ea indicantes. Eorum nos, priuatimq; scriptoris huius historiam secuti, quam nouerūt rura omnia aculeatam herbam intelligimus. Cuius flore ad coloranda obsonia, pro croco rustica plebs passim nūc etiam utitur, Crocumq; saracenum totus Etruscus ager uocat. Congruunt enim omnes illi quæ a scriptore hoc notæ illi tribuuntur. Foliorum modica longitudo, incisio, asperitas, aculei, cubitalis caulis, & in eo capitulum: flos itidem Croco similis: postremumq; omniū candidum, oblongum, & angulosum semen: eamq; ob causam uulgarem, & quotidiani pro Croco usus herbam intelligimus: quam diligentius etiam rura ob eā utilitatem serere consueuerunt. Nolumus, ut factū ab alijs est, quomodo ab agresti fuso Cnicos differat docere, & an congener illi, diuersaue sit. Ex Theophrasto enim libro. 6. de plantarum historia nouisse huiuscemodi aliquid forte diligentior quispiam poterit. Qui duo genera Cnici constituens, syluestre, & satiuum, in altero potuit hanc, in altero illam numerare. Locus in eo nobis non satis integer uidetur. Eamq; ob causam nihil ultra ex eo constitulimus.

Mercuriali.

CAP. CCI.

Linozostin marem, e Græcis aliqui Parthenion, aliq; Argyron, aliq; Aritrillin, aliq; Chrysitin, Aegyptij Aphlopho, aliqui Hermu botanion, Latini Mercurialem masculam, aliq; Testiculatam. Aphri Asumes uocant. Folijs constat Ocimi minoribus, Helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu in foemina copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari e foliorū sinu dependente, paruo, rotūdo, ceu binis testiculis una coherentibus. Frutice dodrantali, aut maiore. Vtraq; in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere, ut foeminæ illam, si a purgatione bibantur, & tria folia genitalibus admoueantur.

BARBARI COROLL.

Linozostis, siue Parthenion a Mercurio inuentus est. Ideo apud Græcos Hermupoi, & Hermubotanen multi uocant. Caule utriusq; generis cubitali interdum, sed ramoso in cacumine, geniculis densis. Semen in geniculis dependens. Foeminæ solum & candidum, mari iuxta geniculatū stans, breue, rariū, contortū. Folia Ocimo angustiora, sed maribus nigriora, foeminis uero candidiora. Radix superuacua, præteruenis. Nascitur in campestris cultis.

EX M. VERG. COMM.

Com mendat se statim diuino nocte Mercurialis herba, uulgaris alioquin, uinetisq; campis fere omnibus nascens: aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiā inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Vna, præcipuaq; illi in deicienda aluo naturæ uis est, & a cunctis in medicinæ usu recepta. Numerauit, quod diximus in Polypodio capite. M. Cato & hanc inter ea quæ familiā rusticam ad deiciendam aluū docebat, monens non multū ex ea accipiendū esse. Quæ uis quoniā cōmunis illi cum pluribus alijs est, non uidetur diuino nomine ornare eam debuisse. Credimusq; nos, quod in extremo capite ex aliorū fide a Dioscoride, & a Plinio. 27. uolumine, capite. 5. traditum est, diuini eius nominis causam illi fuisse. Id enim magis Deum hominibus ostendisse decuit, rarum, incognitū, multisq; omnibus seculis optatum: qui aut dum ægre ferunt, plures sibi nasci filias: uxorūq; suarū in eo sexu fecunditatē calamitosam sibi fore aniaduertunt: aut dum nominis sui memoriā, generis subsidium, hæredes fa-

C milia, & Reipub. ciues post se quotidianis uisumis & precibus reliquisse optant. Qua ratione alia præstare id sibi possent, a Deo cognouerunt. Factumq; ex eo est, ut Græci ἱμερὸς πόναν, id est, Mercurij herbam, latini Mercurialem uocauerint: notam uulgo, ut diximus, & quæ ob nimiam soluendi uim, quam habet, pro maledicto in gente nostra etiam nunc sit.

C De Cynocrambe. CAP. CCII.
Cynia, aut Cynocrambe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, alijs Asumellabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia Mercuriali, aut Hederae similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamq; detrahit.

C B A R B A R I C O R O L L.
Cynia non est ea, quam Theodorus Canariam interpretatus est, ut in Culice docuimus.
E X M. V E R G. C O M M.

Q Valis canina hæc Brassica sit, non satis nobis constat. Si nomen solum expendatur, eadem Apocyno, quæ non multo ante hoc ipso uolumine tractata est, uidebitur. Si uires, & quæ posse traditur, Mercurialis esse merito credetur: præsertim iisdem penitus uerbis in hoc scriptore tractata. Quæ enim de ea feruntur, semen eam secus folia habere exiguum, rotundumq;: potam præterea, aluum soluere: & olerum modo coctam, bilem & aquas corporis trahere: omnia paulo ante dictæ Mercurialis herbæ sunt. Quod autem nos maxime suspenderit, & in ancipiti turbauit, uetustissimorum græcorum codicum, & latinorum fides est: in quibus non legitur hoc caput. Nec Plinius (quod hætenus deprehenderim) aut Theophrastus de ea alicubi agentes. Inclinat ideo animus nobis, adulterinū scriptoris huius esse hoc caput, & alterius Mercurialis herbæ traditam ab aliquo sub hoc titulo historiam esse. Censebunt de ea peritiores. Nos enim quod ignoramus fateri pudebit.

D De Heliotropio magno. CAP. CCIII.
ἡλιότροπον τὸ μέγα
Heliotropium magnum aliqui Scorpiuron uocant, alijs Heliotropon, alijs Dialion, alijs Heliopon, alijs Scorpioctonon, alijs Sesamon agrion, alijs Scorpj uran. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Unde Scorpiuro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circummagat, Heliotropion dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfuluus. Incuruatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis. Nascitur in asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plenæ, pituitā, bilēq; per aluū extrahit. Contra scorpionū ictus & potu & illitu prodest. Adalligat, ut conceptū adiuuet. Aiunt per horā unam ante accessiones, seminis grana quatuor, quartanas finire, tria uero, tertianas. Illitum semen formicantes uerrucas, pensilesq; & thymi florem representantes, & epynictidas exiccat. Folia infantiū destillationibus, quas syriaseis uocāt, podagris, luxatisq; utilissime illinuntur. Menses cient. Partus trita & imposita pellunt.

B A R B A. Heliotropium a Cornelio Celfo Solaris herba dicitur, æterno folio. Particulatim ut Oclumum floret: ideoq; perçediu. Incipiens ab imo per solstitiū circūagitur se cum sole, ut nomē indicat, ut ortum eius mane spectet, et eius iter ad occasum usq; persequatur. Sed & nubilo die. Noctu uelut syderis desyderio contrahit ceruleum, ut Plinius ait, florem: album, subruffumq; ut Dioscorides. Genera eius duo. Maius Heliostrongon cognominatum. Et minus. Quæ utrunq; semipedalem altitudinem non excedit. Semen in folliculis messibus colligitur. Nasci-

tur nō nisi in pingui solo, cultorq; maxime. Colos Heliotropij, unus est e tribus fastigijs, in quę cōchilium diuifere ueteres: nostri Verrucariam appellauere: ut ualentem contra uertucas. Si terram furculo huius circumfcribat aliquis, negant scorpionem egredi. Imposita uero herba, aut inde omnino respersum, protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari Heliotropio monstratum est, opilatis herba earum foraminibus. Succum huius excipiunt æstate hora sexta, miscenq; cum uino, ut sit firmior. Multa Magi de ea, sicut de cognomine quoq; gemma polliceantur. Sed hæc propolis nostri haud sunt.

EX M. VERG. COMM.

Varro rerum rusticarum primo uolumine capite. 46. Heliotropium describens, sic uocari ait, q; solis ortum mane spectat, & eius iter ita sequitur ad occasum, ut semper eum spectet. In Malua ex Theophrasto omnium huiuscemodi causa reddita a nobis fuit. Scopiuron mox, & Scorpj cauda a floribus, uel ut nos certius dici credimus, seminis inflexione, quæ Scorpionum caudę, ut hic ait, speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scopiostonon aut, a uiribus quas contra Scorpionum ictus efficacissimas habet: & quia scorpiones enecet, ideo Scopiostonon dictum etiam est. In reliquis non tam certa ratio est, ut doceri a nobis possint. Solarem latini priuatimq; Celsus uocauerunt, græcorum imitatione, qui a sole eam indicauerunt. Fuerunt præterea qui Verrucariam uocauerint, quoniam tam multis Verrucarum generibus, quæ ab hoc numerantur, medetur. Numerauit Heliotropium Theophrastus inter ea quæ particulatim florent: ab inferiore parte sumpto principio, mox inter ea quæ perpetuo folio sunt. Ex quibus tam multis notis, facile erit multi nominis quondam & usus herbam & florem deprehendere. Vtebantur enim Solari hac uerba passim ueteres græcorum medici in his naturæ uitij & morbis, quibus mederi scriptor hic eam testatur: quę nec numero pauca, nec periculo leuia, negligenda uel sunt.

De Heliotropio paruo.

CAP. CCIII.

Heliotropion paruum, quod & aliqui Scopiuron uocant, nascitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Hærbæ cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio & aqua, latas tincas teretescq; excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.

ἡλιότροπον τὸ μικρόν

B

EX M. VERG. COMM.

Heliotropium minus, Tricoccum priuatim appellatur. Vbiq; prouenit, folijs non solum minoribus, sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis caudæ: de quo & Scopiuron ei nomen est.

EX M. VERG. COMM.

Dvo esse Heliotropia, maius scilicet & minus, quo diximus in maiore loco Varro testatur. Verba eius sunt. Nec minus admirandum quod sit in floribus quos uocant Heliotropia. Idem & Paulus Aegineta lib. 6. confirmat, seorsum priuatimq; de utroq; agens. Quibus autem notis inter se differant, hic satis docuit: nec minus quibus etiam uiribus discrepent. Quod tamen hic additis nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua ait. &c. Paulus Aegineta pro Nasturtio (nisi uisum in eo sit) Cardamomum numerat, frequenter in scriptore hoc & alijs, a Cardamo, quæ uox Nasturtium græcis significat, ad Cardamomum lapsu & mutatione.

De Scorpioide.

CAP. CCV.

Scorpionides hærbula est, folijs exiguis, semine caudę scorpionis effigie. Illita, scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

σκορπιουίδες

EX M. VERG. COMM.

Scorpionides a Plinio Scorpis uocatur, ex argumento nomine accepto. Est & alia eiusdem nominis effectuscq; Asparagi cognomine: sed in totum spina, nullum enim folium habet, caule Asparagi, cacumine aculeato.

C Scorpionē Plinius uocare hanc aliquot locis uidet. Non satis tñ nobis constat, an ubiq; hæc intelligat. Theophrastus em̃ lib. 9. de plantarū historia Scorpion a radicis, non seminis figura dicta aperte ostendit. Verba eius sunt. *ὅτι δὲ σκορπίον καλοῦσιν διὰ τὸ πῶς ἴσταν ἔχουσιν ὁμοίαν σκορπίου.* Quod est. Alij autē Scorpion uocant, quia scorpionī similem habet radicem. Hic autē seminis eam figuram dicit esse. Cogitandum itaq; quærendumq; qualis Scorpioides hæc sit.

¶ Finis LIB. Quarti.

PEDACII

D I O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Quintus.

IO. RVELLIO interprete.



SUPERIORIBVS quatuor libris amicissime Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earūdem lachrymis ac fructibus, itē animalibus, melle, lacte, adipe, frumētis, oleribus. Nec non de omni radicū, harbarum, succorū, seminūq;

Dratione: In hoc autem totius operis Quinto differemus de uinis, & metallicis, & a Vite nostram cōmentationem auspicabimur.

¶ De uinifera Vite.

CAP. I.

Folia Vitū, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflā-
mationē stomachi ardorēq; cum polenta. Folia etiā per se, ut quæ refrigerēt & adstringāt, imponi solēt. Potus eorū succus dysentericis, sanguinē excreatibus, stomachicis, & grauidarū malaciæ medet. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli & poti. Lachryma Vitū quæ ueluti gūmi in caudicibus concrefcit, ex uino pota calculos pellit. Illita lichenas & pforas, leprasq; nitro prius perfrictas sanat. Eadē cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectū habet, maxieq; sanies, quā accensa farmēta Vitū exudarunt. Qua & peruncitæ uerrucarū informicationes extrahunt. Cinis farmentorū et uinaceorum erūpentibus in sede condylomatis & thymijs illitus ex aceto medet. Prodest luxatis & uiperarū morsibus. Contra lēnitis inflammationē illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

H E R M O L A I B A R B A R I

Patricij Veneri, & Aquileiē. Patriarchæ Collariorū LIB. Quintus.

VITIS SATIVA.



VITEM satiuam, Græci ampelon Hemeron, & Oenoen, & Oenophoron, id est, urbanam, & uinum ferentem uocant. Item Clematida, & Clemacem, interim & Oenanthien: ut placet Iulio polluci. Superuacuum genera eius psequi, quia totidem Vitium affirmantur esse, quot foli. Nasctur passim, & in alto Vitis, & propinqua littori. Durare Vitem ad infinitū, resubili fecunditate perhibent, cultura quodam genere, Theophrasto auctore,

ἀμπέλως ὀνόμας
50

ad Elephantinē: ut idem scribit, & Varro mutuatur. Non decidunt Viti folia, neq; circa Mem-
phin. Ad Delam quoq; Nili, fere tota uiret semper. Quod & alijs quoq; satis accidit. Capnia
uocat unum Vitis genus, quæ uuam nigram ex candida, & candidam ex nigra sine prodi-
gio ullo ferat. Infans Vites appellantur, quæ ad florem usq; perducunt. Quinetiam est ubi Plin-
ius Infanas Vites Triferas appellet: quoniam in his alię maturefcunt, alię turgescunt, alię flo-
rēt. Smyrnæ Triferam a se uisam. M. Varrone etiam prodeute. Vitis candida melius reddit,
quo lætius fuit germen: quod quidē & huic, & Fico proprium. Vitibus Capreoli tribuuntur,
& Viti: quos & Clauiculas, & Pampinos uocamus, Græci Helicas. Is est coliculus, ut Varro
inquit, Viteus, intortus ut Cincinnus, a capiēdo dictus, quoniam ad locum capiendū sur-
sum uersus serpat. Sicut Vitis dicta primo, quoniam inuitatur ad uuas parietendas: & a parien-
do Parilema, deinde Palma, literis immutatis. Est autem Palma maior flagellus, unde nascun-
tur uuæ, Dalma, unius inuersione literæ a uenti statu dicta: ut idem Varro inquit. Eadem Vi-
tis Caprea nominatur: quia Capreolum pareret. Vina & pabuli genus est, a uiuendo appel-
lata, q̄ item Capreolos habet ut Vitis, & ad scapum lupini, aliumue calamum ad quē hereat,
id solet uincire: unde Vititalia, pro pabularibus & Viti dicuntur. Viti tamen duplex, semina-
ris, & pabularis uocatur. Recentiores Græci Biciā appellant, a nostris (ut puto) mutuati. Con-
sistit in Vitibus lachryma largior incisus, paulo ante germinatum, partior autumno: & hyemis
initio, minus fecundæ crebrioribus oculis gēmantur, solidioresq; feruntur. Ipsæ appellamus,
uermes in Vitibus nascentes, austrinis flatibus. Peculiaris Viti morbus Tragos, hoc est, Hir-
culus importuno uento germinibus abscissis: uel imperitiā colentiū oblaesis. Theodorus Arti-
culationē uocauit, Hircere porro Vites dicuntur, cum infecundæ sunt: quoniam & Hircus
animal, ut inquit Aristoteles, sterilefcit pinguedine. Vuæ ipsæ, & pampini laborant Crambo,
qui similis rubiginē est, sole post humores longos insequuto uehementi. Est & Niuiatio, siue Ro-
ratio, quoties uua de flore uixerit. Præterea Exacinatio, quā Theodorus Exuperantiā ap-
pellat. Græci citto sin, quoties acinæ racemis defluunt. Sine gravis interioribus uuas arte nasci,
auctores Græci posse docuerunt, Agigarton id genus uocantes. Vites arbutiue sunt, & sim-
plices. Arbutiuas Græci Anadendritidas, & Dendritidas appellant. Arbutia uero ipsa, siue
ignobiliore uoce arborea hñdem Græci, Anadendradas, & Aminyxidas, & Amamaxidas, Epi-
charmus, & Sappho. Nam & Arbutula testudinū (instrumenti nomen id bellici est) Amaxa
podes uocantur: in quibus rotarum uersantur axiculi: ut Vitruuius Pollioni placet. Quamq;
nō defunt, qui genus Vitis Amyxidas, & Amamaxidas accipiant. Alij uuam Bumafon, ali-
j Hesperion uocatam interpretantur. Aurolchas Parthenio Vitem significat: Eratostheni, ra-
mus eius cum racemō dicitur: Apollodoro Vitis Elinos, quo nomine Philetas, & Nicander
ramum eius, non Vitem ipsam capiunt. In Hircania, feracissimam esse Vitem, mirati sunt scri-
ptores: cum sit Aquilonibus expōita. Nam in Carmanis, & Margianis, Arianisq;, crassitudo
tantā caudicis est, ut bini homines plerumq; amplecti nequeant, bicubitalibus racemis. Vitem
Bœtj Thebis primum natam pyrant: qua & Liber pater.

EX M. VERG. COMM.

Quæ a rusticæ rei scriptoribus in conferenda uinea tam multę numerantur Vites, Ami-
neæ, Pŷthiæ, Verrunculæ, Bumafthi, & pleræq; alię, omnes quocunq; colore ma-
turefcunt, uindemiamue, aut rusticā penum explent, una uinifere appellatione a Diosco. colliguntur. Omnium enim in medicina eadē uis, paresq; in earum partibus ad remedia uires huic
scriptori sunt: & si posteriores aliqui in plerisq; Vitis candido colore uuam maturantis folia,
palmites, & capreolos magis probauerint. Quodq; uinifere discrimen additum illi ab eo est,
nō aliā habet causam, q̄ ut ea nota satia omnis Vitis ab alijs, quæ superiore uolumine cognō-
mines illi tractatæ sunt, separetur. Hæc enim ad uindemiam, & sanitatis usum ubiq; fere conse-
ritur & excolitur: illæ sponte sua nascentes, nulla hominis cultura, medicinæ tantū inferuiunt.
Hæc passim & omnibus nota, illæ medicari materiam tantum tractantibus, solaq; similitudi-
ne aliq; gentium adoptione in nomen Vitium receptæ. De quibus dixisse tunc quæ oportebat
fatis sit: quemadmodū nunc in quotidiana & notissima re nullū opæ precium laborasse fuerit.

¶ De syluestri Vite.

CAP. II.

Syluestris Vitis duorum generum est. Alterius uia non mature-
fcit, sed floretenus Oenanthem nominatam perducit. Altera ad fru-
gem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules & clas-

αμυλὸς ἄγρια

C uiculae, quibus repunt, uim habent cultae Viti similem.

B A R B R A I C O R O L L.

D E Vite syluestri, superiore libro diximus.

E X M. V E R G. C O M M.

Alia est syluestris Vitis haec ab ea, quae superiore uolumine Ampelos agraria. i. syluestris Vitis dicta etiam a Dioseo, & tractata fuit. Haec enim sativae congener, syluestri habitu tantum diuersa: illa sola racemosi fructus similitudine sic appellata. Eamque ob causam illa syluestris, haec Labrusca uitis sit. Nota ubique, et cuius flores nunc etiam condiendis & odorandis uinis, quo tempore pubescit, diligenter leguntur. Dicimus autem pubescere, Vites florere, poetae nostri exemplo: qui felici translatione a pubertate hominis usus, ait, Tunc largo pubescit uinea foetu, flore Vitis intelliges: qui flauo colore lanuginosus, primae in homine pubertatis speciem ostendit. Graeci a flore *κρηνη* uocant. Quid autem Oenanthae graecis sit, primo uolumine in Oenanthini unguenti confectio-
ne diximus, & ab hoc loco non multo post etiam dicemus.

De Vua.

C A P. III.

καρπυδι

Vuae recentes aluum turbant, & stomachum inflant. Innocentiores quae decerptae diu pendere: ideo, quod in eis copia humoris exsiccat. Vtilesque fiunt stomacho aegrisque, atque cibi auaritatem excitant. Vinaceis, aut uinario uase seruatae, ori & stomacho gratae sunt. Aluum sistunt, sed uesicam & caput tentant. Et sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque quae in musto fuere. Sapa, aut musto conditae, stomachum magis infestant. At quae solem prius passae, in aqua coelesti conduntur, minus uinosae sunt, siticulosas, ardentibus, & longis febribus salubres. Reconditi uinacei, inflammatis mammis, turgentibus ac praeduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fluctuone uuluae laborantes iuuat infusa. Ad decessiones ac foris assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent. Stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum polentae modo, dysentericis & coeliacis & solutis stomacho.

B A R B R A I C O R O L L.

Vuam, Graeci Staphylen, a Staphylo Liberi patris filio, ut Ptolomaeus uoluit, appellant. Lenida etiam poetae. Nam & Lenaeus dicitur is Deus. Alia porro Vua eliquescit in portu, alia eligitur ad uescendum: haec aut in corbulam secernitur, ut inde addatur in ollulas: quae in dolia plena uinaceorum truantur: alia in piscinam picatis amphoris demittitur: alia in haram Carnario suspenditur. Vuam Amineam minusculam, & maiorem, & Apiciam, commodissime in ollis condidit putauit Cato. Eiusdem generis in Sapa, & Musto rectissime seruantur. Duracinas, & Amineas, Scancianas, affirmant opportunissimas esse quae pendeant: quod genus omnes Conditaneas, & Condituas appellamus. Vuae in palea seruatae, pensilibus proximae dicuntur. Vuae uehementiores nigrae. Ideoque uinum ex his minus iocundum. Suauiores albae, quoniam aere transilicido facilius accipitur. Est & Vua Theriace uocata: quod contra morsum omnium bestiarum proficiat: cuius ratione ferenda Palladius instituit. Florem Vuae, in cibis dard gallinaceis praecipunt, ut praeterea non attingat uuas: quod & in Labrusca diximus.

Vinaceus, Graece Stemphylon uocatur. Dicimus & Vinacea neutro genere. Palladius etiam foeminino Viuaceam. Haec & Flores appellantur, sicut in Oliua Flaces, atque Fraces. Vinaceos, poetae sunt qui Brycia, & Brytea quoque appellant, quod & pro fratribus Oliuarum sumuntur. Stemphyla, in Aristotelis Rhetorico, secundo, Gellius faciem ipsam e Vinaceis, & oliuis expressam, Flores, & Fraces dici scribit.

Nuclei acinorum Vuae, a Graecis Gigarta dicuntur. Palladius excrementa, & femina, & grana uuae interiora nominauit. Ab acinis, Acinaticum dici uinum existimo Veronensis agri: ut scribit Calliodorus, alumnū, odoris, saporisque suauissimi, colore purpureo, ineffabili dulcedine, tactu quoque densum, atque pingue: ut carnes liquor, aut potio esculeta uideri possit. Lau

dantur ex eodem agro & Rhetica ueteribus, in montanis Rhætorū, qui supra Veronam sunt, nascuntia: ut inquit Strabo. Ipsos acinos, Cato acina, Catullus acinas, pronunciant.

E X M. V E R G. C O M M.

E Scillud ante omnia sciendum, a patientia Passis uiuis, & uino nomē quondam factum fuisse ille, si Plinio credimus, 14. uolumine, capite primo dicenti. Quin & a patientia nomen acinis datur passis. Qualis autem ea sit, quantaq; 13. uolumine, capite. 16. docuit Columella, iubens ad passas eligi maxime albas, dulcissimi saporis, maximis acinis & raris: fieriq; id oportere Luna decrecente, sereno, & sicco coelo, circa meridiem: lectasq; uuas has in tabulis paulisper porrigi, ne inter se pressæ suo pondere collidantur: mox in alieno, aut fictili aliquo nouo amplo ex sarmentorum cinere factam lixiuiam, usq; ad feruorem calefacere: & cum feruebit, aliquid putri & optimi olei adijcere, simulq; miscere: tum racemos uiuarum pro magnitudine binos, uel ternos simul colligatos in ahenum illud feruens demittere: tam diuq; illic habere dum decolorentur, non tamen excōquantur: in qua re agenda moderatione temperamentodq; opus erit. Exemptas dein ex alieno uuas in cratē disponi idem iubet, rarius q̄ ut altera alteram cōtingat. Singulas deinde post tres horas insولات conuerſi. Neq; ubi prius fuerant reponendas: ne reliſto illic humore corrumpantur: noctibus etiā tegi, ne irrorentur, aut imbrē inaequant. Post aliquot postea dies cum modice aruerint, in uasā noua cōdi precipit. &c. Et hæc scriptoris eius Passæ uasæ sunt. Palladij alia ratio est: quam in Octobri mense his uerbis monstrauit, non ut Italia, sed ut Græciā cōficere consueuerat. Vuam passam græcam sic facies. Melioris acini, & dulcis, & lucidi boriones in ipsa uite torquebis, & patiens sponte sua inarescere: deinde sublatos in umbrā suspendis. & uuam distictam componis in uasculis: subternis pampinos, sicco algore frigentes. &c. Diuersa hæc a Romana Passæ Vuæ cōfectio est: quemadmodum & eius cōdituræ fuerunt. Quæ quoniam longius a Columella eodem capite docentur, non reddentur a nobis. Poterunt enim ab illo uolentes omnia certius audire. Interim autem nos docebimus, primum qua ratione Columella, tum qua Palladius Passum, & uterq; suum cōficiant. A Columella. 13. uolumine, capite trigessimono uo ex Magonis Africani præcepto (nam eius gentis primum Passi cōfectio, & maximus usus fuit) sic fieri Passum præcipitur. Vuam præcoquam, bene maturā legere oportet: acina aridā, aut uitiosa reſcere: furcas mox palosue qui cannas sustineant, inter quaternos pedēs figere, & periticos iugare: tum insuper cannas ponere, & in sole pandere uuas: noctibus uero tegere, ne irrorentur. Cum deinde exaruerint, acina decerpere, & in dolium cōijcere. Eodem mustum q̄ optimum, sic ut acinis surperſet, adijcere. Vbi combiberint uasæ, seq; impleuerint, sexto die in fiscellam cōferre, & prælo premere, Passumq; tollere. Et hæc cōficiendi Passi disciplina ueteribus fuit: & si alix etiā rationes ab eo eodem loco numerentur. Palladius non dissimilem huic cōfectionem. Octobri mense sua ætate fieri docuit. Antē uindemiam enim Passum fieri iubet uniuersæ Africæ more pingue atq; iocundum. Leguntur Vuæ Passæ q̄ plurimæ, & in fiscellis clausæ iunco factis aliquatenus rariore contextu, uirgis primo fortiter uerberantur. Deinde ubi uuarum corpus uis cōtusionis exsoluerit, cochleæ supposita sporta comprimuntur. Hinc Passum est quicquid effluxerit, & conditum uasculo mellis modo seruat. Breuior sane hæc ratio, sed non dissimilis priori. Siquidem quæ a Palladio Passæ Vuæ legi iubentur præcoques illæ, & sole arefactæ Columellæ sunt. Et quas ille musto implet ut succum reddant, hic uirgis flagellat, & lentescere cogit: quamq; hic cochleam, ille prælum: & quam fiscellam Columella, hic sportam uocat. Fuit quondam Passum quotidiani usus: eratq; in sanitate & ualitudine homini pro melle, sine inflationis periculo, ut diximus, quam mel præcipue facit. Exoleuerunt nostra ætate omnia huiusmodi: ideoq; qualia hæc quondam fiebant, repetita a nobis longius fuerūt: ut cognoscant, intelligantq; omnes, quantopere in Passis Uuis, & Passo a ueterum disciplina & moribus discesserimus: multoq; magis in tam multis Vuarum cōdituris, quæ illis pene infinitæ fuerunt, ex Columella, alijsq; rei rusticæ scriptoribus cognoscendæ: ut certius intelligant legentes, quas hic in uinacis, in ollis, in sapa, & musto, & in coelesti aqua seruatas dicit. Cūcta em̄ ab eo traduntur eodem operis sui uolumine, capite. 43. Nos enim tam multis obseruationibus cōmentationes has nostras augere nolumus. Erit etiam ex lectione scriptoris illius aliud operæ precium. Intelliget enim qui id ager, quas hic Passas antea factas Vuas in coelesti aqua componi iubet, addiditq; in ὀλίγον χρόνον τοὺς τοὺς ἀπὸ τοῦ γίνεσθαι ὀφείδουσιν, eam habere rationem quam nos locum illum uerentes indicauimus, exiguo scilicet uino, ut uinosæ fiant, cōspergi oportere. Ex Passi enim cōfectione tota ea ratio fluxit, in quo iubet ille uuas in musto demergi ut uinum combibant. Necessarium enim est, ut qui sole natiuus humor in eis aruit, nouo &

Cc

D I O S C O R I D I S

Congenereliquore aliquo iterum urefcatur. Idq; nos præcipi a Dioſcoride credimus: & ſi aliq; aliter locum interpretati ſint; quos non damnamus, ſed interpretationis noſtræ quam debemus cauſam indicamus. Quemadmodum a principio capitis huius cõtra q̃ Plinius & aliq; dixerint locum ipſi etiã uertimus, *πρὸς τοὺς ἀδινούτους*. Quas uoces Plinius. 27. uolumine, capite. 2. uertens, ait. Innocentiores, quæ decerpæ diu pendere, qua uentilatione etiam utiles ſunt, ſto- macho, ægriſq; Aegros appellans quos hic *ἀδινούτους*. Plinium ſecuti interpretes aliq; ægris ꝑ deſſe & ipſi dixerunt. Nobis, quibus inſirmum corpus eſt, magis uertere placuit; non ob aliam ſane cauſam, q̃ ut certiore intellectu res nunc pateret.

V De Vua paſſa. CAP. iiii.
scg Va paſſa alba adſtringentior eſt. Prodeſt eſitata caro earũ tuſ- ſi, renibus, ac ueſicæ. Eſtur in dyſenteria ꝑ ſe cum nucleis. Et decocta in patinis cum melle, admixta milij ac hordei farina & ouo, ualet ad purgandum caput. Eiufdem gratia cum pipere commandu- catur. Teſtium inflammationes ſedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epynictidas, carbunculos, enatas in articulis putre- dines, & gangrænas, ſine nucleis trita, & cū ruta impoſita, ſanat. Podæ- græ conuenienter cum opoponace illinitur. Mobiles ungues illita ex- trahit.

V Va paſſa Græce Staphis, & Aſtaphis Hemeros, hoc eſt, ſatiua dicitur. Cæterum Apame- as inuenio celebrari paſſulas.

O De Oenanthe. CAP. v.
ind Oenanthe uocatur Vitis ſylueſtris fructus, cum floret. Recondi- debet ſicili non picato, collectaq; ſubſtrato linteo in umbra ſic- catur. Laudatiſſima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adſtriſtoria. Quare pota, ſtomacho ac ciundæ urinæ utilis. Alium ſiſtit, ac ſanguis- nis excreationes. Contra ſaſtidia & acorem ſtomachi, ſicca & illita ef- ficax eſt. Capitis doloribus tam uiridis q̃ ſicca ex aceto & roſaceo ꝑ- funditur. Sanguinolenta uulnera cataplaſmate, & incipientes ægilopas, cicatrices in ore, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & roſaceo, ab inflammatione uindicat. Peſſis miſcetur ad ſiſtendũ ſan- guinem. Contra oculorum delachrymationem, & ſtomachi ardores, cum polline polentæ, & uino illinitur. Crematæ carbonibus cinis ſa- cit ad oculorum medicamētā. Rediuuius, paronychia, abſcedentes gingi- uas, cruentaq; cum melle ſanat.

V Va Oenanthe, quam Vites ſylueſtres, hoc eſt Labruſcæ ſerunt, laudatiſſima eſt in Syria, maxime circa Antiochiæ, & Laodiceæ montes. Item ex alba Labruſca. Sunt qui principatum in unguentis dent in Parapotamia naſcenti; deinde in Antiochia: & Laodicea Syria. Tertio lo- cum ex montibus Medicis, quæ & utilior medicinq; Quidā omnibus ijs præferunt e Cypto. Vi- tis ea quæ Maſſariis in Africa uocatur, nunc medicis, nunc odoribus tantum gigni Plinius af- firmat. Naſcitur in Africa & Vitis quam Vbolima uocant acetolæ, oliuā in uites inſita, utriuſ- q; fructum arboris ferentem; hanc Græci & Eleoſtaphylon appellant. Vihum Oenanthium, ſic- duabus libris florum, in muſci cado maceratis, qui poſt triginta dies mutantur. Oenanthem & a uitibus dulce uinum ferentibus arbuſtiuis maxime colligi quidam præcipiunt, non ſylueſtri tantum. Labruſcam dici putant, q̃ in matginibus terræ ceu labris quibuſdam fere naſcatur. Vi- num Anthoſmias, ab odore floris dicitur, nec idem cum Oenanthino uino eſt. Pro precioſo ſa-

ne capitura Græcis. Eius mentio est apud Aristophanem, & Hippocratem, & alios uel promi-
scua: Hippocrates certe hoc etiam Anethinē uocauit. Alij Anethinē, pro Anethino capiunt; ut
Galenus inquit. Nam uinum cognomento Hippocraticum, Gallijs maxime transalpinis gra-
tissimum, fidei generis est, facili ratione. Cinamomum, Saccarū, et Carpelū teruntur in fiscū:
ex eo uinum liquatur, ut transeundo qualitates eas cōibat. Datur hoc epulis principalibus;
cū Escharite pane bellariorū uice, qui mos, sed in alio uino, peculiaris Atheniēsis fuisse legitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Labruscæ uitis tantum Oenanthe medicis flos est, neq; ad medicinam ex alia uite utuntur.
Cæteris satiuæ etiam flos, & prima uitium omnium pubertas Oenanthe dicitur. Numerauit in-
ter aues etiam Plinius hoc nomine, quæ statos latebræ dies habet, exorientes serio, occultata ab
occafū eius progrediens. Sic forte dicta, quæ cum uinum prima pubertate hac prodeat. Nec ul-
tra quicq; de ea tradidit: diligens alioquin in Oenantes huius historia & medicina: quarum al-
teram, 12. uolumine, capite, 29. alteram, 23. capite, i. longius profectus est. Ex eo multa quæ in
Diosc. non leguntur, Barbarus æditioni suæ miscuit: quæ poterunt uolentes facile in eo depre-
hendere. Nobis tamen quatenus licuit & iisdem uerbis omnia reddere placuit. Eademq; fide
monemus, scribere in, 6. sue medicinæ Paulum Aeginetam, plurimū quidem ex Labrusca Oe-
nanthes usum esse: quoniam egregie adstringit, stomachumq; & aluum maxime firmat: uerū
tamen traditis his idem statim subiicit. *ὁ δὲ Dioscorίδης ἵσταν' ἐπερὰ τοῦ τῶν ἰανθίων τῶν ἀνάνθων
ἐχούων, ὅθεν ἀντίπα φασὶ καὶ σπυγγορίαν καὶ ἱανθίων ἰσταν'.* Quod est. Dioscorides autem aliam de
scribit Oenanthem contrarias huic uires habentem: ideoq; secūdis, stillicidio uessicis, & fellis sus-
fusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur: neq; in scriptore hoc alibi legis-
se me memini: & nihilominus non negligenda Aeginetæ autoritas & testimoniū est, quæ crede-
re oportet uera, & quæ aliqui legisset testari. Nobis nihil est qd adijcere aliud his ualeamus. Rem-
tū signauimus: ut si forte laxandi uires habere Oenanthem aliqui alius inuenierit, auctoritate scri-
ptoris eius sciat, aliam ab hac illam esse: alteriusq; uitis quarendum cum florebit fructum, q cō-
trarias huic uires habeat. Qualis autem ea sit, non auiū ego dicere.

De Omphacio. CAP. VI.

Omphacion succus est acerbæ uuæ, nondū maturescentis e Tha-
sia uite, aut Amminæa. Oportet autem ante canis ortum, ex-
pressam melliginem in cyprio uase linteo cōoperto insolare, usq; dum
cogatur. Semperq; quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humo-
ri permiscere. Noctū sub dialibus locis auferre. Quādoquidem noctur-
ni rores ipsum conrescere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile,
uehementer adstringens & linguā mordens. Sunt qui coquendo mel-
liginem cogant. Prodest contra tonsillas, uuam, ulcera oris, humida gin-
giuarum uitia, purulentas aureis cum melle aut passō. Item ad fistulas,
uetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluctione
uulvæ laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabriz-
ciæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sangui-
nis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat, sed pauco & a-
quatiore est utendum. Valde siquidem exurit. Idem adstringit. Prodest
stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item ijs
qui ilei dolore conflistantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorptū
auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi
omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

BARBARI COROLL.

Omphaciū, siue Omphax, idem, acor, siue acrementum uuæ, ab immatura uite dici, quæ
Omphax a Græcis uocatur. Est & oleum Omphaciū, de quo inter unguenta diximus. E Tha-
sia, ut Dioscoridi uidetur, uua, e Plytia, ut Plinio, probatur acor. Cum sunt acini ciceris magni

Pli. li. 14. ca. 14.

C tudine, ante canis ortum incipiente pubertate. Precium in libras sex. Solet & aliter fieri, uuam imaturam terendo in mortarijs: siccataq; in sole, postea digeritur in pastillos.

E X M. V E R G. C O M M.

Non animaduertunt Diofco. Omphacium uertentes interpretes alij, informē, nec reliquo corpori congruē in extremis clunibus caudam illi reliquissē: nec aliter q̃; Flaccus cecinit, q̃d ille fingebat monstrum, turpiter in atrum piscem definere, ex Omphacio Omphacite uinum fuisse. Quod em̃ in extremo capite in eorum æditionibus legitur, uis succo adstringitoria, &c. uel ut alter ex eis eam incæpit partem, idem adstringit, prodest stomacho qui cibi tenax nō sit: et ab his quod totum legitur usq; ad integram capitis huius clausuram, totum ex historia & medicina uinorum, quæ statim sequitur, in Omphacium irrepsit: in qua hic idem ait. ἡ δὲ καθόλου οὐ φαίνεται. &c. Mox, συγερὴν δὲ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ἰσχύμαχον, καὶ παρὰ δυνάμει καὶ τῷ ἀναπνεύσει καὶ ἰσχυρίσει τὸν σῶμαχον ἀρμόζουσαν. Δοκὴ δὲ καὶ κοιμητικὴ διαθέσις πεντικύ. &c. Nelongius q̃; decet tam multa repetantur, omnia, ut uideatur, duobus locis eadem, & importune ab aliquo ex uino ad Omphacium translata: qui Omphacite id uinum uocari sentiens, Omphacio coniungi debere credidit. Verum tamen longo intervallo Omphacium, ab Omphacite uino differt, ut mox in confectione eius legentibus patebit. Debuerant hoc illi animaduertere: nec præterita tantū, sed inuenienda posthac etiam in scriptore hoc cognouisse. Calcantis enim Homerici maxima illa fuit, & omnium integra semper laus erit, Præterita meminisse, præsentia intelligere, & futura conijcere: cognitisq; his, apte omnia constituere. Nos eam reliquimus partem inutilem hoc loco, non multo post apposite tractandam. Indicaruntq; id nobis antiquioris fidei codices, in quibus nihil huiusmodi legitur, sed multo magis res ipsa suis locis docens tractanda singula: nec diuersa simul miscenda rerum genera esse: importuneq; his aliquid nulla urgente necessitate tractari non debere. Discrepant nobis etiam cum alijs interpretibus pleraq; alia, & si forte nō multum facienda alicui uideri poterunt: quale est, quod alter eorum pro acerbis, necdum maturis u-

D uis, quas græci notissima cunctis uoce Omphacas uocant, acidas dixit: quod priuatim ad saporem pertinet, potestq; in maturitate etiam sentiri. Neque enim acidum ὀξύς græcis simpliciter significat, sed acerbum: in quo poterit acidus, poterunt & alij saporis esse: utq; priuatim acidū dicimus q̃d sapore suo accecit, sic acerbis omnibus cōmunis Omphacis uox est: neq; uuā magis q̃; oliuas, Lauri baccas, & innumera alia nondum matura græci ea uoce indicant: non ex sapore Omphacite oleum, sed ab imaturitate oliuarum appellātes. Eamq; ob causam, cōmunem eius uocis æstimationem nos secuti, acerbam uertimus. Nec dissimili ratione, quod hic scriptor μῆλον πυρραϊστίον ait: ueritq; idem, nondum nigrescentis: nos, nondum maturefcentis, diximus: cōmuniore in uis eius uerbi significatione usi. Est enim græcis πυρράειν μακρύνεσθαι, id est, nigrescere: est itidem, πυρρῶδες θάψαι, id est, uariari: est postremo πιπρῶδες θάψαι, id est, maturari, & maturitate mitius fieri. Fecimusq; id: ne quod hic non decernit, ex albis uis fieri posse Omphacium negaremus: quod contracta ad nigredinem uuarum maturitate necessario futurum erat. Sunt quidem leuia hæc, uerum tamen non negligenda penitus, in his quæ ad artes & uitam pertinent, in quibus nulla satis fides, aut diligentia hominis unq̃ fuerit. Quales autem Amineæ uites, quas hic cæteris antepōnit in disciplina ruris sint, copiosissime docebunt Columella quarto operis sui cōmentario capite. 2. & .14. uolumine, cap. 2. Plinius. Breuissimēq; omnium felicissime in Georgicis suis Maro, cum cecinit, Sunt & Amineæ uites, firmissima uina. Quæ una firmitatis laus causa antiquis scriptoribus tam græcis q̃; latinis fuit, ut ad medicinam ex hac uite materiā, uuā omphacium, & uinum præ cunctis alijs laudauerint semper, & amauerint. Idemq; de Thassijs constituendum est, quarum idem Maro honeste itidem eodem loco meminit. Quod deinde a Diofco. dicit ἡ καθ' ἑαυτὴν ἰσχύς, id est, rubēte æneo uase, ad genus æris pertinet, q̃d eo colore in hoc usu probabatur. Id Cyprium uas alter ex interpretibus uertit, relicto legētib; desyderio, ex qua materia querendū id uas sit. Scimus q̃dem ante ferri cūctis alijs in medicina Cypriū æs, & in Plinio Cyprium uas, pro æneo ex ea gente intelligi aliqui oportere. Verum tū nō erat nostra ætate tam obscure dicendum, quod a Diofco. apertissime offendebatur: præsertim nihil de Cyprio magis q̃; de quo uoluerit aliquis alio ære hæc docente.

V De Vini natura. C A P. VII.

Ino uetere nervi læduntur, & reliqui sensus, gustu quod suauis est. Quare cauendum ijs qui internam alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda ualetudine, paucum, aqua di-

lutum, innoxie fumitur. Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomnia parit. Et urinam ciēt. Aetate medium utraq; uitia fugit. Quare ad uictus sanorum aegrorumq; usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & cōcoctū difficile. Carnem alit. Et ebrietatē creat. Giluum, utpote quod mediū est, medias inter utrumq; uires habet. In secundā tamē & sinistra ualitudine, cum primis laudatur albu. Quin & uina qualitatē distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficilius a corpore discutitur. Stomachū inflat. Alium & interanea ut mustū turbat, sed minus inebriat. Renibus & uesicā apūssimū. Austerū per urinā celerius transit, sed capita dolore tentat, & temulentia gignit. Acerbum ad ciborū per membra digestionē accommodatissimū. Aluum & ceteras fluxiones cohibet. Nouū, neruos minus tentat. Vinū aqua marina factū, stomacho aduersatur. Siuū stimulat. Neruos infestat. Aluo aptū. A ualitudine se recolligentibus inutile. Passum quod uis sole siccatis in arca, aut in farmento adustis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramnion, aut Protopon, & Sapa, quę sit musto igni decocto, Gręci syriōn, aut Hepsema appellāt: quodq; Melas dicit, aut Melampsythiū, crassa sunt, & corpora multū alunt. Candidū tenuius, & medium medias sortitur uires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocāt. Faciūt aduersus uenena, quę exulcerando necant ex oleo pota, & uomitionibus reddita. Contracitutas, meconiu, uenenum, toxica, & concretū lac. Item contra rētur ac uesicę pruritus, rosiones, exulcerationesq;. Inflant tamē, & stomacho aduersantur. Priuatim prodest Melampsythium, si uenter rheumatismū sentiat. Album magis ceteris emollit aluum. Gipsō conditū neruis officit, caput aggrauat & incendit, ac uesicā aduersatur. Contra uenena ceteris aptius. Picaca, aut resinata, excalfaciūt, cōcoquūt. Sanguinē excrementibus inimica. Quę uero Parachyta uocant, admistā Sapam recipiūt, caput implent. Temulentia gignunt. Aegrius a corpore discutuntur. Stomachū male habent. Inter Italica uina Falernū principē locū obtinet, quod inueteratū perq; facile coquitur. Languidos pulsus exscitat. Aluum abstringit. Stomacho utile. Sed uesicę nocet. Atq; ijs qui uisus hebetudinē sentiunt, & ad potus crebros minime idoneū. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant, Ventrem emolliunt. Sed concoctionē non aque adiuuant, & neruosa minus infestāt. Verustate eadē, austerum sapore concipiūt. Cecubū dulce est, & Albano crassius. Corpus & colorē alit. Aegre tamē coquitur. Surrentinū satis austerū est. Quare intestinorū & stomachi fluxiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratū suauius redditur, & stomacho utile. Adrianū, & Mamertianū in Sicilia aque crassis partibus gignuntur. Modice adstringunt, & ocyssime inueterantur, minusq; ob-

C suam tenuitatem nervos tentant. Paretypianum, & qđ ex Adriatīco si-
nu deferitur, odoratū ac leuius est. Quare multus epotus fallit. Diu ser-
uat ebrietatē, et soporē adfert. Istīcū Paretypiano simile ē, sed urinā ue-
hemētius pellit. Chiū tñ antedictis mollit, et aptū potui ē. Bene alit, &
minus inebriat. Fluctiōnes cōhibet. Oculorū medicamētis utile. Lesbīū
facile mēbra subit, Chio leuius, & aluo idoneū. Ephesiū eandē uim ha-
bet. Empygela, et Etinolo Asia, Mesogites nomine, capitis dolores ciet,
& nervos lēdit. Cōm uero, & Clazomeniū, qm multam sibi maris az-
quam uendicāt, facile corrumpunt. Flatus mouent. Aluū turbant, ner-
uis officiunt. Vinū omne, ut reliqua in cōmune dicantur, merū, ac syn-
cerum, et sua natura austerū, exalfacit. Facile in membra distribuitur.
Stomachū adiuuat. Appetentiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur
auget. Somnum conciliat. Et cōmendat colorē. Potū liberalius, auxilio
est contra assumptā cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium,
argenti spumā, taxū, aconita, fungosue. Contra serpentium morsus, et
omniū iētus quē refrigerando necant, aut stomachū in uomitiōnes ef-
fundunt. Facit ad longas inflatiōnes, rosionesq; prācordiorū, ac disten-
siones & stomachi singultum, & si uenter aut interanea rheumatismum
D sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus immodico sudore di-
geritur (Diaphorumenos uocant) maxime alba, uetera, & odorata. Quę
tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesciæ accommodatiora reddū-
tur. Vlceribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur. Terra
ulcera, & phagedænica, & fluctiōibus obnoxia commode perfundū-
tur. Marina austera, & alba, ad sanorum uictus usurpantur. Iis pręstāt
Italica, salernum, surrentinum, cecubum, signinum, & permulta Campa-
nię, & parētypianum ab Adriatīco sinu, & siculum, quod martiertia-
num appellatur. Ex gręcis chium, lesbium in Phygela, & Epheso nas-
cens. Crassa uero & nigra, stomacho negociū exhibent. Inflationem
pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt,
et minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida, uehementius ur-
inam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervosq; largius pota tentant.
In media etate, ut a septimo aņo, potui saluberrima sunt. Modus aut-
em pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini defi-
niatur. Non sitire, & modice cibos prouē, optimum est pręceptum.
Nocet ebrietas omnis, et maxime assidua. Siquidē obsessos nervos quo-
tidie relaxat. Largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Modi-
ce tñ inebriari, aliqt diebus, maxime post aquę potus, utile. Namq; ex-
purgans sensuum excrementa transfert, et per circa corporis spiramenta
discutit. Sed aquam post ebrietatē bibere oportet. Namq; a cura cō-
stātis temulētis quendā auxiliij modū inducit. Omphacites nomine pe-
culiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uua, pauloātē maturitatē decerpta,

triduo, aut quatruiduo, donec racemi in rugas cōtrahantur. expressumq; **A** uinū cadis insolatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus. Item pręgnantiū malicię, & crudis. In pestilentia quoq; sorptū auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam Deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquę, in uinacea, quibus triginta uini metretę extractę fuerint: calcatis uinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios binis salis sextarijs. Post hyemę transfunditur in uasa. Lora post annū utendum. Etenim celeriter exolefcit. Conuenit ægris quibus timemus noxam uini, coactū sape desyderijs eorū obtemperare. Item a longa ualitudine se recolligentibus. Fit & uinum quod Adynamion uocant, Lorę uires habens, hoc modo. Pares aquę & musti mensurę coquuntur molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinę & cęlestis aquę, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta diebus insolant, quo post annū utuntur. Vinum e syluestri uua nigrum adstringit. Prodest alui & stomachi fluctionibus, & cęteris quibus cōstrictione & contractione opus est.

Vinum Oenos Gręce dicitur. Crathus Maronē uocat. Philaethen puerbia: quale illud est. Vinum, & ueritas. Item illud. Non habere uinū temones. Pittacus, ut æs frontis, ita uinū mentis esse speculū. Aristophanes Vinum loco Veneris appellat. Poetę uinū etiam παῖδες dicunt, quasi uibrare mentem faciat. Vnde Crapula inquit Phorion, dicitur κρηπίδα. Folia Vitis priuadim Oenaria uocant a poetis, & Sarmenta Oenaridos. Ipsa porro uitis, ab Hippocrate nominatur Oenarion. Tenuissimū est id qđ celerime inueteratur. Nam cui sumi amaritudine acefcit ætas, insaluberrimū putatur. Quo generosius uinū est, hoc magis uetustate crassefcit, & in amaritudine corpori minime utilem coit. Saluberrimū Campanię, quodecunq; tenuissimū, utilissimū cuiq; uiribus edomitis sacco. Vinum alit uires, sanguinē, colorē, sicut lactis potus, ossa, frugū, neruos, aquę carnes. Simias & quadrupedes digitatas, negant crescere assuetas uini potu. Vnum de dando uinū uolumē Asclepiades cōdidit, ab eo cognominatū, in quo uisitatatem eius uix Deorū potentia æquari posse pñciauit. Vinū succus est, qui seruendo uires e musto sibi fecerit. Mustum Gręci Gleucos, & Gleucinē uocant aliquando. Vinū omne, aut Mustum est, aut uetus, utin puerbio sit. Vinum mēdium pro aqua: quod & prandiū caninū dicitur, apud Varronem, & Gellium. In Plauti Cassina, inendosus est senarius.

Adibo, caninam scęuam spero meliorem fore. Scribendum est, non scęuam, sed cęnam caninā, hoc est, abstemiām. In Latino agro, & Campano ad montē Vesuuium, qui Sumanī dicitur, uites modo habentur Gręce appellatę, uino inde presso, qđ Gręcū non ante dicitur, qđ anno post calcatas uuas actō. Vilius, qđ dicitur anni cū lū est, pindeq; Vianū, quasi, uinū anni eius, hoc est, Ornū uulgo Tabernę pdicant uēdentiū.

VINI QVĀLITĀS. DE qualitate, & ætate Vini dictū mox est. Vinū porro tenerū Gręci Apalon, Cato, Lene uocat: cui cōtrarium sit asperū: ut idem auctor appellat, hoc est, Scleron, siue Durum. Nam & Muria, quę aspera esset, durā cognominabat Columellę, Celsq;. Nisi quis durā Muria, sicut durā Picem, nō pro aspera, sed p densa spissaq; accipiat, & utiq; p Garo. Quandoquidē Celsus eā dysentericis cōmendat, sicut Garū Dios. De uino temperando, quod Lymphatū, & Dilutū dicit, alij alia pēpiunt. Hesiodus tres partes aquę in unā Vini misce. Cæteri meracius fecere, hoc est, ut quinq; in duas adderent. Vnde natū prouerbiū. ἡ πλεον πινει, ἢ τρία, ἢ μὴ πλεονα. Quod Plautus poeta festiuissimus significat, cum de cantione gręca loquitur, in Stichō. Vide inquit, quot cyathos hos bibimus, Tum illē. Quod digiti sunt tibi in manu?

C Cantio est græca, ἡ τῆς πίπης, ἢ τῆς πίπης καὶ τῆς πάσης. Est autē sentus: ut aut duas uini partes, ad quinq; laticis, aut unā ad tres bibere oporteat, ad quatuor nō opteat: ceu futurū sit dilutus, q̄ sanitatis usus exigit. Anacreon, ut Vinarius poeta, unā uini, duabus aqua tēpat. Alij aliter, p̄ suo quisq; ingenio. Vinū modice incoctū, ut Aristotelis placet, minus officit ebrietatē uitaniis. Temulētæ sunt & animātes aliq̄, præter hoīem. Sues uinaceis, Corul & Canes herba quā Oenutā Græci uocāt, Simia & elephātī, uino. Vinū, cui nomē Samagonio, qd tradidit Aristoteles, tribus heminis, & quidē lymphatis, q̄draginta uiros inebriare dicūt, Ebrietatē Plato nunq̄, nisi semel anno liberalibus p̄misit in legibus. Ante decimū & octauū porro ætatis annū, uino tēpandū penitus existimat: ut ne gustet quidē. Mnesitheus Atheniēsis medicus, inebriari nunq̄, sed statim tū diebus hilarescere p̄misit: qd genus Chonismōn a calicis noīe uocauit: ut dilutū nihilominus, & sine bellarios comitatu biberet. Ac prima quidē porio in cōuiuijs, ga meraca erat, cum p̄satione ἑκατὸν δαίμονες, in honorē uel deditur Liberi patris, nec tū tora, sed quasi p̄gustāda p̄rebebat. Postrema uero quoniā diluta esset, & salutaris, cum p̄satione Iouis liberatoris hauriebat. Vinū aqua misceri Staphylus Siteni filius instituit: ob id græcū uulgo non aliter uinū modo noīat q̄ Crasin, hoc est, mixtū.

P A S S U M, ET VINUM PRO-

tropon, siue Creticum, siue Pramnon.

Pli. li. 14. ca. 169

P Assum, hoc est, Glycy, gñā habet laudata, Psythiū: & a colore appellatū nigro, Melampsythiū, quæ suū saporem, non uini p̄ferant. Nam in qd additū est Defrutū, Glyxis appellat. Athenæo. Sapa, quā Nonius scribit uulgo dictā suo tēpore Mellaciū, firmusio ad tertiā partē mensuræ decoctio: sicut Epsema, siue ut Hippocrates Epseron, hoc est, Defrutū, ad dimidiā: & Capellū, ad partes e tribus duas redactio. Passum probāt, Ciliciū, & Africiū: & in Italia, ut qd Neapolitanū uocāt, a Columella redditū, prouincijsq; finitimis. Oīaq; hæc, ut Pliniū uerbis utar, post Græcū. Fieri certū est ex uua, quā Græci Sticam uocāt, nos Apianā, q̄ apes eā impopulari gaudeant. Hanc sunt qui Muscatulā uulgo dictā interpretent. Item Venicula, siue ut Cāpani dicūt, Sircula: q̄ et Stacula, & Numisiana appellat, passis, & diutius in tute sole adustus uuis, Staphidion (ut arbitror) uocatū ab Hippocrate, aut seruētē oleo. Quidā e quacūq; dulci, dū præcocta. Q̄ si, quantū uuis exp̄ssere, adiiciāt uinaceis aqua puteana, secundariū Passum facient.

D Protropos accipit etiā pro musto, qd sponte defluit anteq̄ calcēt Vux, ut est apud Iulij Pollicē. Hoc protinus diffusum, lagenis suis deferuere patiunt: postea in sole quadraginta diebus torrent, ætatis secutæ ipso canis ortu. Habetur & Protropū inter transmarina uinū: quod Athenæus in Lesbō nasci dulce scribit, etiā Prodrōmon uocatū ab aliquibus. At Pramnon, siue Pramnon Hippocrates, & prior Homerus celebrat. Premebat hoc Smyne regio, ut Alciphron Mæandrius scriptū reliquit, Montano uico Latona: prius dicatō, postea Latoria, nomē id Amazonis. Extrabatq; id etiā nū Plinio prodente, iuxta delubrū matris Deum. Nigrū Galenus fuisse uoluit, Athenæus quoq; nō crassum, aut dulce, sed durū, austerūq;: ob id eo Athenienses minime delectari scribit Aristophanes: hoc tū non Smyne, sed in insula primū Icaro natū putat Seuius, in petra, quo nomen Pramno. Sed & Pharmacitin dici hoc ipsum quādoq; tradit. Pro ueneno est Sapa, si qs ieiunus a balneis bibat eam. Polybius auctor est, Romanas mulieres nō uinū, sed Passum bibere solitas, ad reslinguendā sitim. Passum uero dictū, quia ex uuis passis, siue quas in uite passi sunt aduri sole, premīt, simile Cretico, & Aegostheni uocatis. Plautus. Murrinam, inquit, Passum, Defrutum, Mellinam.

Nonius Murinulum, siue Murinulā uocat, quā aliq̄ Murrinā, nisi uitiū in exēplari sit, Varro mulieres inquit, natu grādiōres, aut Loram, aut Garū, aut Defrutū, aut Passum bibebant, quā Murrinā Plauto appellari putat. Est & Murrina idem qd & Myratū uocant aliqui. Non utiq; a Myrrha, sed a Myro, qd est odoramentū: ut post docebimus. Gellius mulieres inqt Romanas Lauream, Passum, Murrinā potasse: lauream pro lora capiens. Meminit Varro & potionis genus fuisse Miridā. Nonius duas facit Loras: alterā, quæ sit Deuteria: alterā, quæ Lota constat. Lora uinū dulce, potōis, inqt, erat cōfectū, mulieribus grādæuis aptū: qd in quibsdā codicibus lotā, non lorā scriptū inuenio, distinctionis forte gratia. Laudat a Græcis inter uina dulcia Scybelites: & natū in Arcadia Thyraū. De Cilicio uino mentionē hoc capite habuimus. Forte autē hoc sit, qd e Pisidia medicinae usu cōmendabatur Ambladetū cognomine, ab oppido: ut Strabo boni procer. Vino autē Aegostheni, de quo supra diximus, nomen datū quidem uidet a oppido Aegosthene, qd in Attica terra est. Cæterū affirmare non ausim: quādoquidem Carysiū ex Euboea quoq; posset existimari, Carysto ibi celebrata scriptoribus. E Laconia tantū ueniū Carysto uilla id ferente, quod & Alcman poeta celebrat. Laconicum uidetur fuisse initio: &

qd Monobasites dicit, etiā si Creticū hoc nomine intelligimus, corrūpente uulgo id uocabulū & uocante Maluasium. Moueor, q̄ locus ubi Tænarū in Laconia monstrat, Monobasia dicit hoc tempore, ditionis Venetū id oppidū est, unde in Cretā directo fere cursu nauigat. Forteq̄ Monobasites uino datū nomē fuerit, non q̄ ibi nasceret, sed q̄ illud primū e Creta cōportaret. Aetate nostra celeberrimū est qd Achaicū uulgo quoq̄ dicit: fortasse id qd ex Phliunte, oppido quondā Achaia, Phliasū ab Antiphane prædictū est: etiam nunc aliubi quoq̄ feritur.

VINVM GYPSATVM.

Vinum Gypsatum, a Gypso dicitur, sicut a Calce calcatum, a marmore marmoratum.

VINVM PICATVM, SIVE RESINATVM.

Vino Resinato dicta inquit Plinius est Crapula: siue quia caput tenet, quasi lucēta eius: siue q̄ ipsa quoq̄ resina, & flos eius crudus, qui uinis ad excitādam lenitatem additur, Crapula quoq̄ nominari solet. Pugnacibus inquit Plinius mustis, plus Crapulæ inditur, lenibus par eius: a quo & uehementia uini, atq̄ feritas crapulæ significatur uocabulo. Photionis de crapula interpretationem aliam superius explicui.

Pli. ll. 14. ca. 6.

VINVM PARACHYTON.

Vinum Parachyton, siue ut Plinius uocat, Diachyton, si modo idē est, sit uinis in sole siccatis, loco clauso per dies septē in cratibus, totidem pedibus a terra alte noctibus a rore defensis, die calcatis: optimi odoris, saporisq̄ inter dulcia. Etenim Parachyma, Græci Desfrutū q̄nq̄ appellant. Vnde uinū originale, hoc est, sine fuco, & sine dulci Aparachyton, & Autien uocāt. Quamq̄ & alia significatio Autitæ uini est: ut aliubi monuimus. Timachidas rhodius uini genus passi dulce Hypochytō in Rhodo uocari tradit. Nā uinū Autoceras hoc dicit, qd ita est exile, ut dilui nō debeat, ut iquit Pollux. Porro nostri, dulcia uina, Liberi patris Bellaria uocabāt.

PHALERNVM.

Phalernum, quod Græci Phalerinon uocant, nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre. Prima eius ætas a decimo, media a quintodecimo anno incipit. A uigesimo capiti, & neruis est noxiū. Duo eius genera. Austerum, cui rufus color: & dulce, quod tunc demū accidit, cum sub ipsam uindemiam austri flauerint: quo & nigrius efficitur. Athenæus, & Galenus auctores. Phalerno Statinum simile est, tantum leuius. Simile & Venaphranum.

Albani quoq̄ duo sunt discrimina, subacerbum, & dulce. Vfus æque a quintodecimo ætatis anno. Inter Albanum, Phalernumq̄ Labicū gloria: quod est dulce, ac pingue gustu sentitur. A decimo placere incipiente. Buxentinum Albano simile est, utiq̄ acerbū.

CECVBVM.

Cecubum iam non gignitur, frequens olim in Terracina, fundisq̄: sicut & Setina. Parum a superioribus Statana non longo fuerunt interuallo. Nam Signini nomen celebre alio sistendæ, in sexennium uetustate melius.

SVRENTINVM.

Surentinum, ueteres maxime probauerūt. Sequens etas, Albanū, aut Phalernū. Deinde alia aliq̄. Virium plus Surentino, austeritatis Albano, uehementē minus Phalerno. Surentinū a. 25. anno poculentum facit: quoniam macilentum, & aridū cum sit, ægre cōcoquitur, nec nisi uetustate castigatū utentibus prodest, qd & Tripholino accidit. Simile est & Aequanū. Celebrantur a medicis & Rheginū, Surentinū pinguius, eoq̄ celerius ad bibendū utile. Item Priuerinū Rheginū tenuius: & Phormianū Priuernū simile, dūtaxat crassius. Tiburtino tenuitas red datur: idq̄ a decimo anno bibitur. Prænestinū Tiburtino pinguius. Gaurano pstantiam paucitas quoq̄ ipsa facit: ualidū hoc, & pcrallum. Mariscū austerum. Auserū & Barbinū Athiense, qd Balbinum dicit, Balbiæ proueniens Plinio. E Campania, ppe Cumas, Vluanū cōmendat: quinto demū anno poculentū, leue. Iam Calienū, quod & Phalerno præferūt, ad utilitates stomachi. Fundanū plus iusto alitidē parcius erat cōuiuijs: q̄ & caput, & stomachū tentabat. Sabinum leuitate pponēbatur omnibus. Vsum eius a septimo ad quintumdecimū ætatis annum probant. Nomentanū a quinto anno incipit: nec leue, nec admodum suauē. Spolētinum suauē, coloris auri. Caulinum prope Capuam, fortasse id quod eo loco tradit Polybius Anadendritin uocari, prælatū omnibus. Circa Neapolim Trebellicum. Herbulo color niger, non multos post annos candidus: delicatū hoc, & perq̄ leue. Tarentina, & quæcūq̄ illo tractu habentur, tenera sunt, & dulcia, & amica stomacho: cuiusmodi Lagaria, non procul Grumentum nascentia, Messalæ poti, & salute, ut Plinius retulit, insignia. Beneuenti fiebat Infusum, quod Græce Capnias dicitur, a Platone comico, quemadmodum & uitæ fabrorū ferrariorum, maxime fornacibus ex Africa, præcipua Tiberij Cæsaris cura.

D I O S C O R I D I S

A D R I A N V M.

Pli. li. 14. ca. 6.
per omnia.

C **A**driana optima, ex intimo sinu Adriatici maris : quæ Pucina, a loco ibi sito dicta sunt; & a Græcis Pyctana, medicamentis aptissima : quibus Liuia Augusti octauaginta duos quibus uixit annos, retulit acceptos, non aquosis. Haud procul a Timau fonte, faxeo colle, maridmo afflatu, paucas coequent amphoras, Britannor: regi adeo gratū, ut quotannis deferendū sibi curaret. Mamerinū uero, a colonis eius loci, non Messeniū, ut inquit Strabo dicitur, etiā circa Messanā in Sicilia proueniat. Hoc & Italicū quoq; dicitur, etiā extra Italiā, ut Athenæus inquit, nascit. Siculū est, & Potulanū ab auctore dictū, qua proxima est Italiæ Sicilia. In eadem prouincia & Taurominitanis honor lagenis, pro Mamerino plærumq; subiectis.

P R A E T V. C I V M.

Praetucia ex supero mari, sicut & Ancone nascētia, & quæ a palma uua forte enata, Palme sia appellant: ut Plinio placet. Cassiodorus, Vinū quoddā inquit Brutū appellauit, Palmaria num laudare cupiens antiquitas. Nos Stryplin, asperū, sed gratū suauitate. Nā licet inquit, inter uina Brutia uideat extremū factum, tñ est bene gnali opinione p̄cipuū. Est eñ suau pinguedine molliter crassum, uiuacitate firmū, nari uiolentū, candore perspicuū, qđ ita redolet ore tractatū, ut merito illi a palma uideat nomē impositū. Viscere defecta cōstringit, uulnera madida desiccant, lassum pectus reficit. Prætiaci multo p̄cipue cōuenire dicūt, sicut Apamēū Syriæ. Inter externa Syriaci est: & qđ reges Persar: bibebant, Chalyboniū uocatū: ut Straboni placet. Hoc Possidonius in Damasco Syriæ nasci tradit, eorūdem regum cura satum.

H I S T R I A N V M.

Histriano, pximū natione Liburnicū fuit, ex Illa insula, qđ Agatharchides p̄fert oibus.

C H I V M.

Chium, & Chiothes dicitur, hoc & Thasium. E uinis trāsmaria ueteribus fuere in summa gloria. Theophrastus Thasium, quod magistratus bibebant, anteposit omnibus. Tercio loco habebatur Clazomeniū, postq; parcius mari condere coeperūt, utiq; post homerica illa, Pram-nion, & Maronites, siue, quod idem est, Maronæum, in Thraciæ maritima parte genitum, uti-ties tantum addito aque miscendum Homerus censuit. Vim eius ad Plinium durasse legimus, prodentem sextarios singulos, octogenis aquæ dilui: nigrum colore, & odoratum, & uetusta-te pinguefcens. Hinc (ut arbitror) Cratinus, uinum ipsum appellabat Maronem. Nam Mo-narites aliud uini genus est, Cappadociæ Melitena eius parte nascens, non possiderendum no-stratibus præstantia. Maronæum, a Marone filio Euanthis, satum publicatumq; Philostratus in heroicis suis testatur. Pramnion, a uite Primna dictum uolunt, aliqui a mansuetudine: qui-dam a caudicis crassitudine, quasi distinguatur a Crucio uocato. Est autē Crucium e uitis altissimis, q̄les Aricinae sunt, acerbiusculū, & asperū. Porro Thracia putant & Ismarici a Pol-luce, Bibliū ab Homero noiatū: siue q; Bibliua ea terra diceret, q̄ nūc Tisara, & Oesyra noia-tur: siue ut Epicharmo placet, a Bibliinis Thraciæ mōtibus uocatis. Seruius Naxiū id existiat, qđ Archilochus nectari cōparatū scribit a Bimblino, siue Biblio amne. Hoc i Sicilia Poliū, siue Poleum appellari, qm̄ a Polide sicyonio, siue Rhegino, qui Syracusis regnauit translatū eo sit. Quidā a uite Biblia, q̄ in Italia uisus dicat. Nā Byblos p, y, oppidū est i Phœnice uetustissimū: ut qđ a Saturno conditū putet: ubi uinū quoq; medicamentolum ex herba fidicula cōfecit: ut di-ximus. Differt a Maronæo Mareoticū in Aegypto, a Maria lacu dictū, ubi natum, ad uetustatē quoq; diffundi solitū. Nā uicinū ei Libycū appellatū, p̄fertimq; ad Antiphras norū: improbāt uel adagio, qm̄ minus uini, q̄ maris habeat. Alexādræ id uulgo bibūt præcrude ac Zythū: ut Strabo inquit: etiā nō Zythōn, sed Zygon interps in eo legerit, & ad pōdera uti uino eo Alexā-drinos ineptissime cōuerterit: in quē errorē & Domitius Veronēsis pnus corruit, in Propem-pico Papinij, qđ incipit, Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Oia porro trāsmarina septē, in sex annis ad uetustatē mediā peruenire existimant. Vino Chio ueteres in oculo: uitis uti solitos, nomen ipsum indicat Collyriorum quorundā, quæ Græc Chiaca cognouant. Hoc uinū & Ariusa, a loco, & optimū qđ esset Aristæum uocabant, Iulius Pollux auctor. Nigrū uinū in Chio primū fuisse Theopompus auctor est. Nam et uite serere in eadē insula, repertū putant a Oenopione Liberi patris filio: qui & urbē in ea condidit.

Lesbium, sponte naturæ suæ mare sapit. Hoc & Protropū dicitur quotiens dulce est, itemq; Prodromon, Athenæus auctor. Quærat aliquis in Viétruiuo, quis sit uerbor: sensus, cum dicit. Sed animaduertimus insulam Lesbōn, uinum protrum, maloniam, catacecaumenen, Item Lydiam molliton. Corrupta lectio: quæ sic restituēda est. Sed animaduertimus insulam Lesbōn Protropon, Moxoniam, Catacecaumeniten; Lydiam, Tmolitē dare, De Protropo di-

ſtum eſt ſuperius, de Tmolite ſtatim fiet mentio, de Catacecaumene Strabo. Catacecaumene inquit regio eſt, quam alij Myſiam, alij Mœroniam appellant. Diſtam uero ita, q̃ nihil in ea præter uinum gignatur : idq̃ nobiliſſimum, ambuſta uelut igni terra.

E P H E S I V M.

Ephesium Deſruto, & mari conditur: ideo inſalubre. Phygelites appellatū ab oppido propinquo, quod Phygelam Plinius, Pygellam pleriq̃ noiauerunt. In nomine ſunt & tranſmarina, & Leucadiū, & Sapia, & Thaliū: quibus principatū dat Hermippus in oppido Opuntie: q̃d et Plautus in Penulo demonſtrat, ſumptū ab Eubulo. Item ex Euboia Sciathos, et e Peparetho inſulis. Qzq̃ poſtremū hoc, multi ſunt qui dānant: ſam e Syria Phœniciū uocatum quādoq̃ Cycliū: cuius & Xenophon in aſcenſu meminit, Laudatur & Magneticū, & ut alibi diximus, Mendæum. Præterea ex Acantho urbe. Nam Cirimphiū aſperum continetur. Troezenij, ut ait Ariſtoteles, Anthedonidiū, & Hyperandiū cōmendant, auctores ſuorū noibus, Hypero, & Anthē: quēadmodū & Althephiadiū ab Altheſphio: q̃ ex Alpei nepotibus fuit. Apyrū quoq̃ uinū ab Alcmane poëta memorat. Eſt aut̃ Apyron, quodcūq̃ nō eſt coctū. Laconica ſunt Pen talophiū a quinq̃ collibus, ubi naſcit̃ uocatū: item Denthiadiū, ſive Denthis: & Oenuntū, & Onogliū, & Stathiniū, a locis omnia, quæ iuxta Pytanem ſunt oppidū eius terræ, Theophrastus Erythæum molle ſalūmq̃: idem Heracleoticū tradit odoratū, atq̃ durum.

M E S S O G I T E S.

Messogites, & Tmolij, aut q̃d idem eſt Tmolites, duo ſunt uini gñæ, noīe a montibus Lydia inſopito, qui Tmolus, & Meſſogis appellant̃. Meſſogites uero nobiliſſimū a loco Aromeum nomine, correpta ſecūda ſyllaba, ut Strabonī placet. Tmolio per ſe grati, ut uino non eſt, ſed cuius dulci admixto, reliquos duricia ſua uitatem accipiat ſimul, & ætatem. Ex eadem Lydia & Metropolitē uinum cōmendant, ab oppido eius uno Metropoli uocato.

V I N V M I N C O M M V N E.

DE uino Incōmuni, nōnihil & in mentione Annoſi diximus. Nūc illud adijcō. Vinum omne in infantia dulce eſt, tum uidelicet cum Muſtum dicitur. Vbi aut̃ pubeſcit, ſuauius efficitur, q̃ dulcius. Dulcedo enim ſeruendo adimitur Vinis. Vinum porro, aut uetus, aut nouū eſt. Media ætas a medicis introducta eſt. Vulgo neſcitur. Vnde notum prouerbiū Varroni, Medium uinum, prandium caninum eſſe: hoc eſt, quia nullum tale uinum habeatur. Vt uelut aſinum Ariſtophani, pro eo, quod nuſq̃ ſit.

V I N V M O M P H A C I T E S.

Vinum Omphacites, ſive Omphacnū, uidetur idem eſſe, q̃d & Bixon Græci appellauere: q̃zq̃ marinam ei aquā largiore miſceri adijciunt. Cætero cōueniunt, Medicinæ item congruunt. Vt errare uideantur, qui non Bixon, ſed Bion, quaſi a uita deriuatum nomen ſcripſere: cum Plinius, a feſtinatione, quaſi uiolenter fiat, uocari prōdidērit.

V I N V M D E V T E R I A.

Deuterias noſtri Lorās, ſive Loreas, ut Carō, & ſecundaria, & operaria uilla nominant. Lora, q̃ lota acina fiat, uocatur. Inter Deuterias, & Fecatum Carō appellat ſæcibus uini expreſſum, quod a Columella Fecinum dici putō, a Polluce Trygphanion. Plinius Tortiuum inquit, nouiſſime expreſſum intelligo: quod Carō Muſtis tingendi gratia, ut pigmentum aliū, quod adijciendum præcipit. Græci hoc uulgo Thamnam uocant, apud quos Autites uinum, pro Deuteria ſunt qui capiant. Alij pro ſyncerō, alij pro noſtrate, hoc eſt, non alienigena, ſed patrio Galeno. Galenus in Hippocrate Autiten interpretatur, quaſi autoctētem, hoc eſt, anniſſum, ſive orum. Eſt & Tornij uini mentio apud Hippocratem, ad pulmonū præſidia. Vitiōſum uinū Græci Tropian, & Ectropian, & Oxynon dicunt. Genus uini eſt & quod Grapnam uocant, ſub aſperū. Nulli ex hijs plusq̃ anno uſus. Erant & quæ Spurca dicebantur uſina: ſed apud Pontifices, hoc eſt, quæ ſacris adhiberi uetabantur: ut Deſrutū, & Dilutū: & igni tatum: ſed & Muſtū quoq̃, ante q̃ deferueſceret. Vinū porro malū, Amphijs græce dicitur a ſoſicrate, quaſi dubiū: ita enim uocauimus & nos, auctore Plinio Fugacia. Præliganea uocantur & quæ ad operarios, ut Carō inquit, ex miſcellis uuis premūt̃. Circumcidanea uero, ſive ut Varro, Circumciſta uina dicimus, cum calcatis uuis ſcopi earū, ſive ſcopia, ut Carō, cum folliculis prælo ſubijciuntur iterū: hoc eſt, ubi deſijt fluere circumciſſis extremis: non diſſimile Tortino, quod Græci Boſtrichitē (ut putō) uocant. Tortinū enim Columella dicit eſſe Muſtum, quod poſt primam preſſuram uſinæ eorū circumciſo pede exprimit̃.

V I N V M A D Y N A M O N.

ADynamon ratio faciendi uaria, ſed omnibus fere cognita.

A

B

Pli. li. 14. ca. 10.

C Discendentibus quondā ex Sicilia in Italiam Troianis, quæ uniuersæ classi & genti satis forent uina, bonus subinde cadis onerarat Acestes: Carthaginensis regina etiā, exceptis a naufragio ipsam cum rege suo, centū instituerat famulas, totidemq; pares ætate ministros: qui dapibus onerarent mensas, & pocula cunctis deinceps ponerent. Ipsa etiā cum laticum in mensam libasset honorem, Bitiaq; poculū increpitans dedisset, tanta copia diffundi uinū iussit, ut cum pleno ille se proliuisset auro, post alij omnes biberent procures. Tantis præterea, & eousq; uini laudator in suo carmine Homerus quibusdam uisus est, ut una hac suspitione, uinosus facile creditus fuerit. Fuerunt & in alijs cœnarū apparatusibus numerata a poetis, præsertimq; a Flacco in carminibus suis, tam multa & generosa uina, ut naturæ copiam, & hominum pro uita & uoluptatibus studium & artem merito aliquis in uino admiretur. Nullus tamen, toto orbe nascentibus uinis, & quibus tunc gentes maxime uterentur, plures, certioresq; ad salutem & noxam scriptore hoc notas assignauit: nec aliunde, ad utramq; fortunā, ex uini usu maior homini, q; ex eo occasio est. In cæteris enim uini, aut alterius horæ uoluptas in cōuiuio quæsitā uino est: laudauitq; unusquisq; aut quod maxime apud se natū nouisset, aut quod ingenio, naturæq; suæ aptissimū sentiret: in hoc longiore historia, cunctosq; habita rōne, singulorūq; in natura decretis uiribus, nihil desyderandū legentibus relinquit: siue ad uoluptatē cœnas, siue ad honorem cōuiuia & epulas, siue ad ebrietatem cōmessationes, siue in quotidiano usu pocula, siue ad medicinā remedia parasse aliquis sibi uelit. Magna sane in multiplici hoc bono, & liberalior naturæ uarietas: nō minor tamē scriptoris huius diligentia, qui obseruatis toto orbe per se nascentis, & humano artificio exculti uini potestate & uiribus: a principio statim uetustatē in eo dammare incipiens, uariato librarioq; incuria sermonis ductus, dubitandū legentibus reliquit, simpliciter ne, uitanda foris & intus uetusta uina sint, his qui uitiosa & infirma interiore aliqua parte sint: an uitanda intus tantū his, qui infirma & uitiosa interiore aliqua parte sint. Dubitationi huic, & si non multifacienda sit, causam dedit, q; in antiquis græcis diuerso loco librarij dictiones eas pupugerunt. Sunt enim in quibus legitur, ἀδύνησι μέρος ἔχοντων ἴνδον παραπικρίαν, &c. Quod est, His quibus uitiosa & infirma interior aliqua pars sit, uitanda esse hæc uina. In aliquibus autem, ἀδύνησι μέρος ἔχοντων ἴνδον παραπικρίων, &c. Quod est, Vitanda his intus uina hæc esse, id est, non bibenda, qui infirmā aliquam partē habent, non interiorem magis q; exteriorē: quasi intus damnādus, foris autē concedendus eorū usus sit. Nos in ambiguo communiorē lectionem secuti, & ex potiore, frequentiorq; uini usu, grāuioreq; eius noxa rem docuimus, uitanda his uetusta uina p̄cipientes, qui interiore aliqua parte infirma sint.

De Melitide uino.

CAP. VIII.

Melitides datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarūt. Namq; aluū emollit. Vrinam ciet. Stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, & mulieribus abstemiis. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat a mulso quod fit e uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitides autē adiecto ad quinq; congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quo magis ad effueruēdum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale. Cūq; effueruere desierit, in alia uasa transfunditur.

Pli. li. 14. ca. 9.

B A R B A R I C O R O L L.
D Vici e genere est Melitites, sed austerum seculis. Iam fieri desisse Plinius existimat, Sit autem Melitites id, quod in Pseudulo uocat Plautus Mellinam illd uersu, Murinam, Passum, Desfrutum, Mellinam, in medio relinquimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Desierat, quo tempore naturæ historiam suā Plinius cōmentabat, multoq; antea in usu esse Melitide hoc uinū: quoniā inflationes faceret, damnatū: & nihilominus confectionē eius, et ipse docet. 14. uolumine, capite. 9. eandē huic scriptori, aut paulo diuersam, medicināq; itidem 22. capite. 24. Quo minus miretur aliquis, nunc in nullo honore esse, uixq; in medicina nomen eius audiri. Antiquiores tamen oēs, ad explendā totius uini historiā de eum cæteris uini ge-

neribus tradiderunt: non inuili penitus, sed quod posset medicinā & ipsum augere, & humana salui aliquando adesse: præsertimq; ut hic ait, *γυναικὶν ἰσχυροτέρους*. Quod cæteri interpretes mulieribus uini abstemijs, ex Plinio uerterunt, nos simplicius, aquā bibentibus: haud sane quia non id pbemus, sed q̄ nescimus, an uini abstemijs simpliciter mulieres hic dicat: an in futura uinum fastidientes, ideoq; aquā bibentes. Ex quo em̄ hic uini huius usum ad mulieres priuatim contraxit, certā etiam priuatimq; in fœminis cognoscendam causam intelligi uoluisse uidetur. Si em̄ simpliciter uini abstemijs dandum hoc uinū sit, non magis fœminis q̄ uiris dandū erit. In utroq; enim sexu abstemijs uini passim uidemus. Quodq; in fœminis, idem in uiris etiā hoc uinum poterit. Credimus ideo nos sic intelligi locū oportere: fastidientibusq; in futura uinum mulieribus Melitide dandū. Eamq; ob causam, quoniā latius patet abstemijs uox, bibentes aquā mulieres nos diximus. Eoq; pertinere uidet̄ quod statim sequitur, Odoratum em̄ est, & nutrit. Quorum alterū pertinet ad discutienda fastidia: alterū ad uitæ nutrimentum, quo tunc maxime ad incrementū & firmitatem fetus prægnantes indigent. Quod etiā a Diosc. constituitur *νισσηνός*, id est, cum urinæ malo aliquo renum doloribus prodelle, in melioribus grecis non legitur. Nos tamē comunem secuti lectionē, eam seruauimus uocem, medicis diligentius excutendum relinquentes, quo modo huic malo prodelle Melitide hoc uinū possit. Adijcimus illud etiam, quoniā neruorum infirmitati omnes utile tradiderunt, & inter latinos Plinius, etiā non male suspiciaturum aliquem, quoniā idem in grecis renum & neruorū uocis principium est, uocatq; ea gens renes *νισσοί*, neruos autem *νισσα*, potuisse eas librariorum imperitia uoces commutari, & pro neruis renes scribi. Medicinæ quidem id certius responderet: in qua præcipitur, uitanda omnibus uina esse quibus uitio aliquo laborant nerui: tutoq; his pro uino Melitide hoc dari. Coniecturas tamen hæc nos, non deretra esse uolumus.

De Mulso.

CAP. IX.

Mulsum e uetere uino austeroq; & bono melle factum præfertur. Minus enim inflat, ac celeriter id genus uigore adipiscit̄. Vetus corpus alit. Media ætate, aluo prodest. Vrinā pellit. Ab ultimo cibo sumptū nocet. Et inter initia potum implet. Dein appetendi auiditatē reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, ammixta una mellis. Aliqui quo celerius præberi possit, mel cum uino coquūt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondūt. Dulce aut̄ permanet.

BARBARICOROLL.

Oenomeli, hoc est, uinum Mulsum: quāmq; nostri sine uini mentione hoc intelligūt, Mulsum dicentes. Vinum hoc facillime cum melle cōcorporatur, quod in dulci nunc̄ euenit. Mulsum in Thracia primus Aristeus comperit. Multī senectam longam intinctu Mulsi tolerauere, neq; alio ullo cibo. Regium morbi Varro cognominatum aquatorium tradit, quoniā curetur Mulso. Cibilites genus uini est, in Galatia nascens, & Balincium in Sicilia, quæ saporem Mulsi, non uini præbeant. Ex musto, quod fit Mulsum, Græci Nectar uocant.

EX M. VERG. COMM.

Fuit quondam in honore & dignitate Mulsum, uulgaris res, et quotidianus hominī potus: qui rusticas & urbanas cellas pariter augeret: nec aliter q̄ cætera uina, cum opus esset, ad usum familiæ seruariet. Nunc mutatis moribus, & faciendę hominī medicinæ rationibus solū eius auditur nomē. Idq; inmerito, modo uera sint quæ Plinius tradidit, interrogatū Pollionem Romulum Cæsaris hospitem, centesimū annum excedentē, quānam ratione maxime uigore illi animi corporisq; custodisset? Respōdisse, foris oleo, intus Mulso. Egregia sanē utriusq; laude, sed eo Mulsi maiore q̄ olei, quo meliora, uitalioraq; hominis intus q̄ foris principia & uires sunt. Quo magis demiremur, exoleuisse penitus Mulsi usum: qui multis antiquis ideo fuit, q̄ psuaderentur, omnē animę asperitatem dulcioribus succis mitigari, spiritus leniri, transiri, & molliores fieri meatus, experimentaq; in se ipso cuiq; esse. Quando omnis animi impetus cibo & potu mollitur: eoq; præfctim, qui non solum corporum medicinam, sed & morum etiam habeat. In quo genere Mulsum præcipue laudauerunt ueteres. Cuncta tamen hæc bona præsens inflationis periculū & noxa inutilia hominī fecit: deseruntq; uti eo homines, nocere

C sibi ea ratione sentientes: paulatimq; cum usu confectionis ratio etiam perit. Nos tamen si cui nouisse eam gratum sit, ex Palladio qualis scribente eo erat docebitur. Qui. 12. libro in Octo- bri mense de Mulsi confectione sic docuit. Mustum de maioribus & egregijs uitibus post. 10. dies q̄ leuatum fuerit, ex lacu quantum uolueris sumis: & ei mellis non despumati optimi quin- tam partem prius tritam foriter donec albescat admisces: & agitabis ex canna uehemēter. Mo- uebis autem sic per dies. 40. continuos, uel quod est melius quinquaginta: ita, ut cum moueris mundo linteo tegas, per quod facile confectio æstuanda suspiret. Post dies ergo quinquaginta munda manu purgas quodcunq; supernabit, & in uasculo gypso diligenter includis, & ad ue- rustatem referuas: melius tamen si in minora & picata uascula proximo uere trāsfundas: & gy- psata diligēter operies, & in terrena & frigida cella recondes, uel harenis fluuialibus, uel eodem solo uascula ex aliqua parte submergas. Hoc nulla uitiatu ætate si diligēter effeceris. Et hæc de confectione Mulsi satis modo dicta sint. Quibus in scriptore hoc addendum fuerat: quidnam, & qua ratione hic dicat simpliciter implere Mustum: nisi id medicis constituendum relinquere mus, qui ex uini mellisq; natura quid, & quo modo Mustum impleat facile intelligent.

De Aqua mulsa. CAP. X.

μυλινκρατον

A Qua mulsa easdem quas Mustum uires possidet. Decocta uti- mur, cum moliri defectionem, aut uomitionem incitare uolu- mus, ut ijs qui uenena hauserunt ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere Microsphyctos, tussi- entibus, peripneumonicijs, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum repositumq; quod aliqui hydromeli pprie uocant, media æta- te Adynamo uino, aut Loræ correspondet, & similem uim adipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus q̄ Lora prodest. In uete- rati tamen usus damnatur, inflammatis, aut constrictis. Sed laborāti sto- macho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit duabus plus- uis aq̄ ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fonta- nam aquam adiiciunt, & ad tertias parteis decoquunt, & ita recondūt. Nec desunt qui hydromeli appellent, qd a melle elutis aqua fauis con- fici soleat. Sed meracius facere conuenit. Aliqui id coquunt. Aegrotan- tibus noxium est: qm plurimam sibi floris cerei partem uendicat.

BARBARI COROLL.

Meliceraton, & mixtum mel, & aqua mulsa dicitur interim, & dulcis aqua. Rationes aquæ mulsæ conficiendæ plures sunt apud rei rusticæ scriptores. Alia res est Metaceras apud Hippo- cratem, quæ uox egelidum, siue quod idem est, repidum mixtum significat, hoc est, Galacto- des syncrama. Iulius Pollux nescio q̄ recte, Meliceratum inquit est, quod nunc Oenomeli uoca- mus. Cæteri magno hæc discrimine separauerunt. In Aethiopia Troglodytæ Meliceratum e cu- iusdam herbæ floribus conficiunt, proceribus bibendū uini loco, sicut dilutū Paliuri, populo. &

Hydromeli, secundum Aquæ mulsæ genus est, saporem uini uetustate assequitur: nulsq; ma- gis laudatū, q̄ in Phrygia, ex imbre quidem puro, & melle: damnatum multis annis, iisdem ui- tijs quibus uinum, nec iisdem utilitatibus.

EX M. VERG. COMM.

Frequens, & nullo nō fere capite repetita μυλινκρατον, et ὑδρομελιτω hic scriptori itox est, tam exiguo rei discrimine, si substantia & usus æstimeretur, ut totam nominis, nullam autem rei dif- ferentiam fuisse antiquis in ea merito quispiam crediderit. Vtraq; enim mellē, & aqua constat: & iisdem fere Plinio & alijs utriusq; usus sunt. Quod differre in eis uideretur, sola confectionis ra- tio est. Quam pleriq; non tanti faciunt, ut diuersi generis ob id eas faciant. Hic tamen, et post eū Plinius, omnesq; alij seorsum de utraq; agentes, diuersas merito constituisse creduntur. Eamq; ob causam diuersis nominibus in scriptore hoc indicatas, diuersis & nos appellationibus eas in- dicauius, dulcem alteram, mulsam aquā alteram appellantes. Fuitq; nobis dulcis aquæ au-

etor Columella, qui postremum Hydromelis genus, quod maceratis aqua fauis fieret, a Dios-
 proprio, & uero Hydromeli additum dulcem, s. uolumine, capite, u. aqua nominauit: inseri
 pro etiā de dulcis aquæ confectione capitis titulo: ut diuersis uocibus in opere hoc, diuersa sal-
 tem confectio Hydromelis ab aqua Mulsā ostenderetur. Etsi quod maxime inter eas differt, so-
 la ætas est: dicente Plinio, Mulsæ aquæ genera duo, subiq; ac recentis alterū: in ueteratæ alterum.
 Nec Plinio tm̄, sed hoc ipso scriptore etiam: qui cum Melicratum, quam nos Mulsam aquā in-
 terpretati sumus, apposuisset, subitā & recentem illā Plinij intelligēs, subiecit statim, τὸ δὲ οὐρε-
 σόν καὶ ἀπὸ πύλου. Quod est, ut nos uertimus, Quæ autē maiore apparatu inueterata seruatur, &c.
 In qua descriptione Hydromel, id est, dulcem aquā a nobis dictam intelligi tantū uoluit: præfer-
 tim cum adiecit, quā priuatim quidā Hydromel uocant. Congeneres em̄, & eiusdem substā-
 tiæ dulcis, & Mulsæ aquæ sunt, & sola uetustatis ratione inter se differūt, Eamq; ob causam pro
 miscuum in medicina usum habuerūt: præterq; in quibus nouitas, aut uetustas eius priuatim
 exigeretur. Quod nos ignorantes, seruatis ubiq; scriptoris huius uocibus, isdemq; uestigijs eū
 secuti: ubi Hydromel erat, dulcem: ubi Melicratū, Mulsam aquā semper reddidimus: ne si hoc
 magis q̄ illud exigeretur genus, uocū earū uarietate, & inconsistentia, grauiore periculo morbo-
 rum remedia miscerentur. Quotidianus, ut uidetur, cōmunisq; utriusq; huius aquæ quondam
 fuit usus, Indicantq; id re rusticæ Romani scriptores: qui nisi ad usum familiæ cōfici, & seruā-
 ri consueuisset, nunq; in ruris disciplina de cōfectione eius tam certe docuissent. In quo monu-
 isse illud uolumus: a Columella lib. 13. capite, 12. Mulsam appellari aquā utrumq; hoc genus
 a Palladio contra in Iulio mense Hydromel: quoniā, ut diximus, facile miscerantur, quæ tan-
 topere inter se similia erant: præsertimq; ab his, qui non ut in medicina oportet, certū illud & ex-
 actum quærerent. Docuit Hydromelis confectionem Plinius lib. 14. capite, 17. uinumq; ap-
 pellauit, ob eam quæ innox patebit causam. Verba eius sunt, Fit uinum ex aqua ac melle tantū.
 Quinquennio ad hoc seruari cōlestē iubent prudentiores aliqui. Alij statim ad tertias partes
 decoquunt, & tertiam mellis ueteris adijciunt: deinde quadraginta diebus canis ortu in sole ha-
 bent. Alij diffusa ita decimo die obturant, Vocatur hoc Hydromel, & uetustate saporem uini
 assequitur. Soporem uini uetustate assequi Hydromel Plinius ait: eamq; ob causam uinum uo-
 cari: cum tamen nihil uini admixtum habeat. Hic non saporem uini, sed uires asseq dixit, Lo-
 racq; pares habere uires: utile instaurandis in ualitudine ægrotorum uinibus: q̄ apperentibus
 his uinum innocenter potu daretur. Diximus ex Plinio, quale Hydromel quondam fuerit: di-
 cemus nūc ex Columella, qualis Mulsæ aqua fuerit: ut utriusq; certior ratio pateat. Verba eius
 sunt, Hæc aut non uno modo componitur. Nam quidam ante multos annos cōlestem aquā
 ualis includunt, & sub dio in sole habent. Deinde cum sæpius eam in alia uasa transfuderint, &
 eliquauerint (nam quociens etiā per longum tempus diffunditur, aliquid crassamenti in imo
 simile feci reperitur) ueteris aquæ sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen cum
 austeriorem uolunt efficere gustū, sextarium aquæ cum dodrante pondo mellis diluunt: & ea
 portione repleta lagenam, gypsatamq; patiuntur per cuniculæ ortū in sole quadraginta diebus
 esse: tum demū in tabulatum quod sumū accipia treponunt. Nonnulli, quibus non fuit curæ
 cōlestem inueterare aquā, recentem sumunt, eamq; usq; in quartā partem decoquunt: deinde
 cum refixerit, si dulciore Mulsam facere uolunt, duobus aquæ sextarijs sextarium mellis pro-
 miscent: si uero austeriorem, sextario aquæ dodrantē mellis adijciunt: & his portioibus factam
 in lagenam diffundunt, eamq; sicut supra dixi, 40. diebus insolatam in tabulatum postea quod
 suffumigetur reponunt. Et hæc quidem Columella: cui non dissimilia Palla dius instituit quo
 diximus loco. Docet præterea Columella alterius dulcis aquæ confectionem, quæ maceratis
 aqua fauis, & fauorū ceris fieret: quā Dios. in postremo capite numerat. Eam poterunt uolen-
 tes in eo scriptore uidere, u. tertij decimi uoluminis capite: quæ in medicinæ usu damnata ab eo
 est: quoniā stomachi, & præcordiorum inflationes faceret: confectionē tamen eius monstrauit,
 quoniam condituris oliuarum, aliarūq; huiusmodi rerum pro Deſuto utilis esset, & cibariū
 saporē haberet. Prodesse Mulsam aquam, dariq; decoctā Dios. ait, τὸ μικρὸν φάρμακον καὶ ἀσθενείᾳ,
 quod est, ut nōs uertimus, his qui pusillis uenarū pulsibus & multa corporis infirmitate sint.
 Plinius tamen aliter docere rem uidetur. Vigesimo em̄ secundo uolumine, capite, 24. ait. In-
 uenio etiā apud auctores hunc potum bibendū alioſis. Item animi humilis & præparci, quos il-
 li dixere, Micropsychos. Videntur Micropsychos & humilis & præparci animi eos appellare,
 quos hic μικροψύχος, & ἀσθενὴς uocat. Quæ omnes uoces ad corpus, non ad animū referendæ
 sunt. Monuisse id placuit, quoniā diuersa penitus Mulsæ aquæ tribuisse auctores hi uidentur.
 Nobis in scriptoris huius sententiā magis inclināt animus, Redingmusq; peritioribus cogitandā

D I O S C O R I D I S

C quale sit quod a Plinio dicitur. Sunt autē pusillis uenarū pusillis huic scriptori homines, quibus, ut Galenus in diffinitionibus suis docuit, exigui uenarum pulsus sentiuntur ad minimam longitudinem, altitudinemque & latitudinem extollente se & insurgente arteria.

De Aqua. CAP. XI.

A Quam in uniuersum, propter locorum proprietates & peculiares naturas, cœlum, & alia plerumque, difficile est experiri. Magna tamē ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps. Et quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur. Ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam. Si nec inflationes creēt, nec corruptioni cedat.

BARBARI COROLL.

Aqua profluens, utilior existimatur stagnante, ac pigra. Tum putealis quærenda. Cisternarum ab alijs laudatur, argumento subtilitatis: ut quæ subire in cœlū, ac pendere potuerit. Ab alijs damnatur: ut quibus sordium, & limi, & animalium quoque plurimum inesse sentiatur, cuius simumque ideo calescat aqua pluuiā, computrescatque, minime durans in nauigatione. Grandinis quidem porus, in consensio pestilentissimus. De niue, & glacie dissident sententiæ: alijs subtilissimas eius elementi partes arbitrantibus, quia pendeant in sublimi: alijs crassissimus, atque iccirco insaluberrimus inde haustus, quoniam exinanitū sit quicquid tenuissimū in his erat. Liquor omnis congelatione minuitur: & rore nimio scabies fit, pruina uredines. Aqua septies putrefacta, purgataque, non putrescit amplius. Amnica non statim utilissima, sicut nec torrentiū. Palustres, pluribus locis salubres. Parthorum reges & Choaspes, & Euleo amnibus tamen bibunt: eæ quauis in longinqua comitantur illos. Salubritatis argumentum est, anguillis scaterere amnes, sicut uitij limū, & frigoris in fontibus tineas: ut quæ uulgo nominantur Lampredæ, quasi lampyrides, aut Lampetræ, a lambēdis petris, in cibos admixtæ laucioris uitæ: interim anguillarū amplitudine, parte plurima digitū minimi crassitudine, palmi longitudine: cetero anguillis pusillis, & murenulis similimæ: nisi quæ septem habent a capite in collum foramina. Aqua ante omnia improbanæ amaræ, & quæ scrobē statim impleant. Fontes, Græci nymphas: & altrices Liberi patris cognominant, in sacris uinalibus, quæ ipsi Læneæ dicunt: quia uinū addenti, modū eius augeant: siue quia, ut Theophrastus inquit, uites percipiunt, aquā reddunt, & illachrymant. Est & cœlestis aqua, siue potius diuina, chrymistarū: quæ et Democritus, et Mercurius Trimegistus nouere, modo biberi, modo scythici laticē appellantes, modo Pneuma, hoc est, spiritū ex ætheris natura, & essentia rerum quanta: unde aurū potentum, & iactatus ille, nec dum inuentus philosophorum lapis, & fabulum consistit. Hinc & artem datum nomen, Pfammurgien, & Mysticen, & Hamophysiā, & sacrā & maximā uocando, ceu literas quasdam sedulas habeat, & a quibus profanum uulgus arceri cōueniat. Hoc genus laticis (ut arbitror) significat epigramma nuperrime in agro Patauino, iuxta oppidulū Ateste inuentum opere lateritio, ac proinde fragili, per imprudentiamque manus rusticæ proscindentis ibi terram, corrupto: cuius memoria ne pereat, uerba prætexuimus.

D Plutoni sacrum munus, ne attingite fures:
Ignotum est uobis hoc, quod in orbe latet.
Namque elementa graui claudit digesta labore,
Vase sub hoc modico maximus Olybius.
Adsit fecundo custos sibi copia cornu,
Ne precium tanti depercat laticis.
Abite hinc pessumi fures. Vos quid uultis cum uostreis oculis emissicis?
Abite hic uostro cum Mercurio petasato, caduceatoque.

MAXVMVS
MAXVMVM DONVM PLVTONI HOC SACRVM FACIT.

Tertium discrimen aquæ mulsæ, Apomeli dicitur.
EX M. VERG. COMM.

Aquæ, ut Græcorum uoce utamur, probatur aqua. Dico autē, & aquam, quasi sequelem, id est, qualitate omni carentem: quæ nihil odoris, coloris uel auctoris habet, & friget. Si enim ex terra emergens, calebit metalli alicuius, aut subterranei ignis contagio per quod transferit, medica

mentosa & infecta plerumq; erit: quales diuersis locis medicinae tantum utiles inueniuntur, a medicis per tempora deinceps cognoscendae, & ex infectionis caloriscq; sui natura, ad sanitatis & morborum remedia transferendae. Vt quae sulphureosae fuerint, neruis medeantur: quae caluminosae, sanguinis resectionibus, & non suo tempore & ordine purgantibus se feminis: quae nitrosae & salssae, capiti: quae ferratae, stomacho & leni prosint, alijsq; uitij & morbis alijs potestibus altae. In quo non tantum bonitates, uiresq; earum ad sanitatem, sed uitia etiam ad morbos cognouisse oportebit. Quae tota res quonia longior est, tractari hoc loco nec debet, nec potest: Illud tantum meminisse semper oportebit: quonia multus & quotidianus aquae homini & pecori usus est, nihil diligentius curandum homini esse: neq; id tantum quod Socrates praecipiebat, non agendum his locis nobis esse, in quibus nec iusticia, nec profluens aqua perennis erit, sed q; ciuillime & longius fugisse illinc, ubi uitio aliquo infectae aquae uarios subinde faciant morbos: quales multis locis fuisse quondam audiuius, & esse adhuc quotidiana experientia cognoscimus. Pro qua re satis huic scriptori fuit monere, quale oporteat quesiisse & probasse aquam, *αὐτοχόρ*, ut inquit, *ἡ ἀρδανητοῦν ποῖόντος*. Quod est, ut nos uertimus, cuiuscunq; qualitate expertem. In quo subscribentes sibi habet posteriores omnes graecorum medicos, *ἔργον ἰδὼν λήγοντας ἢ ἀποτίκτοντες καὶ κατὰ γένος καὶ κατὰ ὅμιλον*, id est, probatissimam esse aquam, quae omni penitus in gustu & odore qualitate carebit. Quin etiam adiecerunt, aspectu & oculis purissimam esse oportere: haecq; bibentibus utilissimam fore, & suauissimam. Licetq; hic probari puram, dulcemq; dicat, non tamen intelligenda aquae dulcedo est qualis in ceteris rebus dulcis sapor sentitur & est: sed quod hic ait *λῆγος*, quae uox in communi significationis aestimatione, dulce significat, pro suauis, & in potu amabili recipiendum est. Sic enim Paulus Aegineta *ἰδὼν* in hac ipsa re uocauit. Siquidem ad aquae suauitatem satis est, ut sine odore, saporeq; & aspectu pura solo frigore commendetur. Et haec dulcedo eius est, quam hic communi dulcedinis uoce indicauit. Cetera huic & alijs communia sunt. Sed longe plura ab alijs q; a Diosco. de tota ratione Aquarum dicuntur. Quae in Plinio, Victruuio, rei rusticae scriptoribus, mille alijs graecis, latinisq; auctoribus cognoscenda uolentibus relinquimus. Longior enim & numerosae uarietatis a disciplina est. Quodq; hic, quoniam multiplex erat, professoribus cognoscendum deinceps reliquit, tractari ob eandem causam a nobis non debet.

De Aqua marina.

CAP. XII.

B.

θαλάσσιον ὕδωρ

Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur. Aluum eam conturbat. Pituita expellit. Si uero calida ad foveas adhibeatur, elicit, & discutit. Neruorum uitij, & pernionibus ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepesfacta infunditur. Ad tormina calida, pforas, pruritus, impetigines, & mammas turgentes foueri utile est. Liuios suffitu discutit. Ad uenenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumq;. Etiam si quis in calidam descenderit auxiliatur. Et malo habitu coeactis iamdiu corporibus, neruisq;, balneae ex ea utiles. Hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquae mistione reposita, uirus deponit. Sunt qui etiam precoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum uino, aut melle. Verum post deiectionem, dant gallinae, aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

B A R B A R I C O R O L L.

Aquam maris, hoc est, hydor thalassion, probant ex alto hausta, nullaq; dulcium mixtura. Haec rubiginem ferro extenit celerime. Dulcescit enim argilla percolata. In mari expansa circa nauim uellera madesunt halitu maris: qui postea dulcis exprimit. Demisse reticulis in mari coctae e cera pile, aut uasa in ania obturata, dulce intra se colligunt humorem. Vetusstate uirus deponit. Coddunt aquae rosae, & Rosaceae uocant, hydorrhodina, & hydrososata Graeci appellant.

Dd in

Poterunt quibus procul a mari agentibus marinam aquam, & remedia eius negauit natura, maris aquam non multo sumptu laboreq; ex ueterum disciplina sibi facere. Præciperunt hi, quatuor aquæ sextarij, salis sextariū misceri: hisq; utriusq; rei portionibus, salissimi maris uim & naturam impleri. Moderatissimum tamen putari, supradictam aquæ mensuram octonis cyathis salis temperari: quoniam ita & nervos calefaciat, & corpus non exasperet. In quo mirum est, quantopere saluti hominis natura cauit, modo uera sint quæ illi retulerunt, si plus q̃ sextarij us salis cum aquæ sextarij quatuor mergatur, uinci aquam, salcmq; non liquari. Intelligens enim nociturum quod nimis fuerit, certam incuriæ & ignorantia hominum legem huiuscemodi natura præscripsit. Poterunt itaq; procul a mari agentes, marina aqua morbos, uitiaq; corporum suorum hac ratione curare. Quæ ut certius cognoscatur, non pigebit aliqua hoc loco signare, quæ aut mutata a nobis, aut cum alijs eadem nobis non sunt. Quorum illud primum est: dixisse nos purgare marinam aquam pituitam, & præter pituitam bilem: quoniam utraq; in uetustioribus & melioribus græcis legebatur: & Plinius lib. 31. cap. 17. dixerit, bibi non sine iniuria stomachi ad purganda corpora, bilemque atram: alioquin in cōmuni lectione pituitam tantum purgari indicatur: & posteriores græcorum medici pituitæ utilem tantum dixerunt. Signamus nos rem, & diuersitatis nostræ causam reddimus.

De Thalassomelite. C A P. xxi.

θαλασμίτη

Quod Thalassomeli uocat, uehemēter purgare cōstat. Tēperat aut æqs portioibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, et picato uase per canis æstus insolatis. Alij ad binas marine cōtē singulas mellis adiiciūt, et uase cōdūt, moderatius aq̃ marina, et mitius.

E X M. V E R G. C O M M.

Nihil certius in Plinio Thalassomellis huius confectio est. Eam, 31. uolumine, capite quinto docuit scriptor ille. Sed qui alter ex scriptoris huius interpretibus eo duce usus est, uertitq; confici Thalassomel æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto: qui totus uerborū Plinii in hac ipsa re ductus est, quod in Dioscoride non legitur addidit, & quod a Plinio dicitur im portune, nec suo loco reddit. Quod enim Plinius ex alto dicit, non ad imbrem in eo pertinet, sed alterius membri principium est. In quo cum dixisset, melle, mari & imbre confici Thalassomel: sumpto iterum sermonis principio, ex alto, & ad hunc usum aduehi, non imbrem, sed maris aquam dixit: nec littoralem, ideoq; lutulentam, aut dulci aqua mixtam, sed ex alto, id est, longinuiore mari petendam esse: quod in celesti aqua & imbre dici non potest, qui ex altiore parte cœli repeti nequit, sed dum decadat expectandus, & cum deciderit colligendus est. Non animaduertit, pungendas in Plinio uoces eas esse, anteq̃ ex alto, & ad hunc usum aduehi iuberet. Facile præterea erat meminisse in poetis, altum passim mare, non cœlum, aut aerem dici: & Columellam lib. 13. cap. 16. marinam aquam ad muria confectioem de alto peti iubere. Verba eius sunt. Quod si ager maritimus est, silentibus uentis de alto q̃quiescentissime mari fumenda est aqua. Pertinet hoc ad huiuscemodi confectio num disciplinam. Semperq; non nisi ex alto procul a litore, ob eas quas diximus causas, petenda est maris aqua. Quod forte in scriptore hoc desyderauerit quispiam. Ideoq; a nobis longius repetitum id est.

De Acetò. C A P. xxi.

ἀέτω

Acetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile. Appetentiam excitat. Erumpentem undecumque sanguinem, potu incessiue sistit. Prodest alui fluxionibus coctum cum cibis. Cruentis uulneribus inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum. Repri mit procidentia sedis, uuluæq;. Item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcèra quæ serpunt, lepras, im petigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas ulcerum, nomasq; fori continuo cohibet. Podagricis calido fori cū sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis

ardores cum rosacéo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad A
 aquam intercutem, grauitatem aurium & sonitus, sibilosq; feruentis ua-
 por proficit. Instillatum quoq; aurium uermes necat. Panos cõercet te-
 pidi fots, aut si imbuta aceto spongia admoveatur. Pruritus permul-
 cet. Contra uenenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum com-
 mode fouetur. Et frigidum hys, quæ exurens uirus ei acutatur. Calidũ
 potum, atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax
 est, præsertim contra meconium & haustam cicutam. Conglobatum in
 uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiã, taxumq; cum sale.
 Haustu uoratas hirudines si sorbeatur eiicit. Tussim ueterem mitigat,
 & recentem lacescit. In orthopncea calidum commode sorbetur. Gut-
 turis fluxiones gargarizatum inhihet. Anginis, & iacenti uux conue-
 nit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

B A R B R A I C O R O L L.

A Cetum, id est, Oxos, uini quidẽ uitium est. Sed ad luxuriam cessit hominibus: tot ad usus
 expetitũ, sine quibus uita, ut inquit ille, mitior exigi non posset. Est & Vapda uitium tini, sed
 nulla ex cõmendatione. Quin probrosa quoq; res, uel hominũ conuictio, quorũ degenerauit
 animus. Fitaũt Vappa, cum iterũ sponte musta feruent. Infusum terræ acetum, spumat, faxa
 rumpit, quæ non ruperit ignis antecedens. Cibos quidẽ & sapores, non alius magis succus cõ-
 mendat & excitat. Compescitur eius asperitas, tosto pane, aut uino, aut sale. Contra iners, ac-
 cenditur pipere, aut lasere. Acetum fit etiam non ex uino cõmentitium multis modis: sicut ui-
 num & oleum, sine uuis & oliuis. Acetum aliud non esse q; culpatum uinum, quis nesciat? M-
 xtum oleo Græci Oxelæon, sicut aqua Oxycratum, nos Poscã, Puscarnue dicimus. Ipsi quoq;
 Græci Phuscã, ut Paulus & Aetius. Insubres & Ligures Padani, uinum fecatum, siue Loram
 uulgo fere Poscam nominant. Nam acetum rosaceum, Oxyrhodinon græce dicitur. Acetum B
 natura frigidum comprobatur Galenus. Calidissimum Theophrastus existimauit.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vale hominĩ uinum natura dedit ex aceto, quod uisũ eius est, facillime rãdo cõtinabitur
 aliquis. Intelligit em̃, omnium bonorũ eius quæ tam multa numero usq; necessa-
 ria & grata hominĩ sunt, id maximũ merito esse; cuius labes & uitium, tam inultas medico salu-
 tis, patri uero familias uitæ occasionẽs affert. Cibos quidẽ & sapores nō allus magis succus cõ-
 mendat, aut excitat: nullus etiã tam efficax remediõ contra tũr mala pugnãt. Neq; ausim ego
 dicere, ut nobilior humani generi omniũ pareis natura fuerit. Id certe omnes sine inui-
 dia fatebimur: esse quidẽ multorũ, quæ sponte suã hitiata, bonitatẽ suã amiserint, in sanitã
 te & morbis aliqũẽ usum: esse itidem, quæ uiuari & corrumpi ob easdẽ causas a nobis cogitãt:
 sed nihil frequentiore opera, maioreq; diligentia, q; uinum in quotidianos uitæ usus ad cõtra-
 riam aceti fortunam transfertur. Cogiturq; deficiente aceto, acescere uinum, tantũ naturæ mu-
 nus: ut omnem domesticã rem nihilo minore q; uinum gratia ad cibos, & ciborũ condituras
 instruat. Rarã, & quæ uni Diogeni inter sapientes cõtingerat laude. Vt em̃ ille paupertate sua in-
 ter gentes claruit, quotidianamq; ex infelicitate laudẽ inuenit: non dissimili ratione ex uitio
 gratiã sibi acetum fecit: nec quicq; in uitiorũ naturæ cẽsu tam multos habuit semp, & adhuc
 habet usus: ex quorũ numero hic tantũ eos tradidit, quibus aliquando ad salutẽ medicinarũ indi-
 get. In eis satis certa omnia sunt, nec quicq; est quod legentes monete longius oporteat. Quod
 inter Barbarũ & nos unum discrepat tantũ significabimus: idq; ad uenena pertinet, quæ ille ue-
 nenata nominauit. Verba Dios. sunt, *νοῦν καὶ πρὸς τὰ βαρβαρικά*, quæ qualia sint ipse statim nu-
 merat: opium, cicutam, cõcretum in grumos sanguinem, & lac, fungos, ixiã, & taxum:
 quorum nullum rite uenenatum dicitur. Venena enim ipsa sunt. Venenata autem quæ uiuen-
 tia animalia parem uenenis illis noxã intẽ, morsu uẽ illatam relinquunt. Suntq; primum in
 natura uenena, mox eiusdem maleficij cõmunicatione uenenata: ideoq; in diuerso genere
 constituenda, nec simul miscenda: præsertimq; in hoc usu in quõ bibendum acetum est: tum
 uomitionibus reddendum, Quod in uenenis quotidianum est. In uenenatis autem fieri ne-
 Dd iij

C quit, quæ foris nocuerunt, non hausta nocent: ideoq; uomitionibus reddi non possunt.

¶ De Aceto mulso.

C A P. XV.

οξύμηλις

ACetum mulsum, quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinq; , salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinq; pariter coquito, decies effervescente cortina, atq; ubi refrixerit diffundito. Sumptum crassos humores ex trahere, & ischia- dicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius uiperæ quam Sepa uocant, haustum meconium, ixiæmæ, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 14. ca. 17
lib. 23. cap. 3.

OXymeli a Themisone, & Asclepiade medicis damnatum prædicant, Acetum mulsum latine dici potest. Nam mixtū cum saccharo pro melle, Oxyfachiæ appellatur.

E X M. V E R G. C O M M.

DOcuir duobus locis Aceti mulsi confectiōem Plinius, primum. 14. uolumine, capite. 17. tum. 23. capite. 3. alterā simpliciter, alterā ex Dieuæ antiquissimi medici auctoritate: nec eodem modo utrāq;. Si quidem in alterius confectiōe cœlestem, in alterius marinā aquā sumi iubet. Ex eo non importune suspicari aliquis possit, deesse huic scriptori in oxymellis confectiōe a- quæ genus. Neq; em̄ uerisimile est, qd non eodē modo a gentibus tunc fieret, incertū ab eo reli- ctū fuisse. Locus in Plinio primū est lib. 14. cap. 17. Suntq; de Oxymelle eius hæc uerba. Quin- etiam acetū melle temperabā: adeo nihil intentatū in uita fuit, Oxymel hoc uocauerūt: mel- lis decem libris, aceti ueteris heminis quinq; , salis marini libra, aquæ pluuiæ sextarijs quinq; , sufferu factis decies: mox obturatis, atq; inueteratis. Et hæc prima Plinio Oxymellis confectiō fuit. Alterā deinde. 23. uolumine, capite. 3. idem his uerbis tradidit, Oxymel antiqui, ut Dieu- ces tradit, hoc modo temperabant. Mellis heminas decem, aceti ueteris heminas quinq; , salis marini pondo, thymbræ quadrantē, aquæ marinæ sextarijs quinq; pariter coquebāt, decies de- feruescente cortina: atq; diffundebant, inueterabātq;. Quæ omnia præterq; in genere aquæ ea- dem huic scriptori sunt: desyderariq; , ut diximus, in eo id tantū potest. Verūtamen ut nos in medicinæ scriptoribus alijs, Galenoq; præsertim quarto lib. de his quæ faciunt sanitatem obser- uauimus: quemadmodū non erat una conficiendi Oxymellis ratio, sic etiā non unum, idemq; placuit diuersis eius auctoribus aquæ genus: uerū cœlesti aliq; , marina aliq; usi sunt, pluresq; sim- pliciter potabili. Neq; omnes antea melli & aceto mixtā inueterabant, sed in ipso usu aquā, sta- tim Oxymelli non alter q; in uino fit, miscebant. Testis eius rei, quō diximus loco Galenus est, qui despumato præcedente coctura melli aceti tantū misceri iubet, quod gustanti nec acidum, nec dulce nimis sentiat. Cumq; duo hæc miscuerit, iterum coqui ambo simul præcipit, usq; dum diuersi liquores inuicem penitus se miscuerint, nec crudum bibentibus acetum sentiat. Ex quo tempore cum exiger usus, misceri aquā præcipit, eodem temperamēto quo ad potum uina aquis temperantur, nullo aquæ discreto genere. Quo fit, ut potabilem simpliciter intelli- gi oporteat. Et hæc pro Oxymelle dicta hætenus satis sint.

¶ De acida Muria.

C A P. XVI.

οξύμυρα

ACIDA M V R I A, quam Græci Oxalmen uocant. Contra anomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluctiones post excisos calculos sistit, si statim ca- lida in uulnus iniiciatur. Procidiuam sedem reprimat. Dysentericis si no- mas sentiant, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare. Hirudi- nes sorbitione, aut gargarizatu necat. Furfures & manantia capitis ul- cera extergit.

B A R B A R I C O R O L L.

OXalme dicta, qd ex aceto & sale fiat, quasi acetū salsum efficaciter, si sit recens acetū.

Mixtis simul aceto & muria, quemadmodū in Galla primo uolumine dictum iam pridē a nobis est, Oxhalmē quondam fiebat. Indicatq; id nomen etiam: quā illi ad ea excogitauerunt, in quibus sale & aceto opus esset. Præferebantq; inueteratam: quoniā recentibus aceto & sale efficacior erat. Quos aut priuatim in medicina usus quondā habuerit, hic satis docuit: eamq; ob causam ad Thymoxalmem, cognatam ei rem, sermonem nostrum nos transferemus.

¶ De Thymoxalme.

CAP. XVII.

Thymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulū, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & acetī terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

B A R B A R I C O R O L L.

Thymoxalme, quasi thymata falsilago dicitur.

EX M. VERG. COMM.

Rara hæc in antiquis medicinæ scriptoribus auditur uox: nō multi ideo fuisse usus aliquis Thymoxalmem credat. Ad explendam tamen historiam, quoniā nihil intentatum uita sibi reliquit, confectionem eius hic docuit: quæ Oxalme eadem esset, nisi ex horto adiectæ illi herbæ paulo ante numeratæ fuissent, quæ ex uiribus suis in diuersis corporum nostrorum uitis eam cōmendarent. Fuisseq; usum eius in duenda per alium pituita, testis hic ipse in Thymo herba est. Siquidem habere Thymum ait *ἀνάμιν πινέμενον μετὰ ἑλάνη καὶ ὕδρον ἔχον φλυματώδες κατὰ καίαν*. Quod est, Potum cū sale & aceto pituitosa per aliū ducere. Quo genere remedij Thymoxalmem hanc indicasse palam uidetur: quæ Thymo, aceto, & sale præcipue conficiebatur. Testatur in Pulegio etiā hic ipse est, multis ex ea herba remedijs efficacit uirium societate acetū addi. Qua ratione Thymoxalmē quæ inter cætera aceto etiā constat, nunc Pulegiū additur.

¶ De Scyllitō aceto.

CAP. XVIII.

Scyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ candida fuerit expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Mina eorū in acetis boni sextarios duodecim immergitur, & uase diligenter operto, septenis diebus in sole madescit. Post eum numerū dierū Scylla eximitur, & expressa abijcitur. Defæcatū acetū transfunditur & reponitur. Aliq; Scyllæ minā, quinq; acetī sextarijs miscet. Alij citra exiccationē repurgantes, parē mensurā adijciunt, & senis mensibus macerari patiunt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Gingiuas humore pregnātes collutione stringit. Et motos dentes firmat. Putredines oris, & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit, & limpidā canorāq; reddit. Datur stomachicis, egre cibū cōcoquētib; melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis. Itē uuluarū strangulationibus, lienis incremēto laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, & bonū colorē præstat. Oculorū acie exacuit. Tarditatem quoq; aurium infusione purgat. In summa, ad oīa efficax. Cauēdū tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū uia.

C tñs. Datur quotidie ieiunis sorbendū, inter initia exiguū, paulatim adaugendo ad cyathum usq̃. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Pli. li. 20, ca. 9. **A** C E T U M S C I L L I T I C U M, & Scillinum, & Scillatum quoq̃ dicitur, & Scillites græce.

V I L G A R E M fuisse quondā Scyllitici acetī confectiōē, & ex ea quotidianū in familia usum, quī eam docuerūt tam multi ex ueteribus indicant Plinius, Columella, Palladius, & in græcis quicūq̃ ad sanitatē & ualitudinem humanā rem aliquādo instruxerūt. Nouerant enim, q̃ multas utroq̃ tempore acetū id utilitates haberet. Earumq̃ studio nullus nō propriæ, familiæq̃ suæ salutī consulens paterfamilias, Scyllite acetū per æstatem a se confectū domi seruabat. Monstrauerūt priuātum suas confectiōes singuli: quas ne longiores simus, repetere hoc loco consilium nobis non est. Locos tantū in latinis signabimus: eritq̃ uolentibus hæc nouisse legendus Plinius lib. 20. capite. 9. Columella lib. 11. capite. 34. Palladius in Iulio mense, capite. 8. Hi enim omnes prædictis locis suas Scyllite acetī confectiōes docuerunt. Suntq̃ illis omnia cadē, aut parum diuersa: præterq̃ in numero dierū, quibus insolandū acetum hoc est. Plinius enim quadraginta & octo diebus id agendū esse præcipit, Palladius. 40. quod hic septem tantū diebus fieri iubet. Ex eo suspicatum sumus. 40. dierum numerū, quo hic monet siccandā in umbra esse Scyllam, pertinere ad insolationem potuisse: aut septem diebus illis, quo spacio iubetur insolari acetū hoc, deesse quadraginta numeri notā: nec septem, sed quadraginta septem, aut octo diebus oportere id agi. Verba Plinij sunt. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub tegulis totius diei solem accipientibus: post eum numerū dierum tollitur uas. Intelligitq̃ numerū. 40. & 8. dierū, quem nō multo ante proposuerat. Palladij autē, Et. 40. diebus patieris esse sub sole. Obseruauimusq̃ nos quadragenariū hunc numerū in medicina, confectiōibusq̃ his ueluti decretoriū esse. Eamq̃ ob causam inclinat animus, ut credamus non septem, sed quadraginta & septem, octoue amplius diebus insolandū acetum hoc esse anteq̃ in uasa diffundatur, & seruetur. In cōmuni tamen græcorū omniū lectiōe nihil mutare ausi sumus. Quemadmodum non procul a fine totius capituli etiā, quo loco hic ait, In uniuersum ad omnia uim habere Scyllite acetum. Cauendū tamen in interioribus exulcerationibus, capitis doloribus, & neruorū infirmitati. Qualia illic erant, omnia seruauimus: q̃uis quæ uelut ultima duo sunt, coniungi præcedenti bus non possint: multoq̃ minus, ut in cunctis græcis leguntur, per se stare: modo uera sint quæ Plinius & alij tradiderunt. Hic enim dolorem capitis, & neruorū infirmitatem excipit: iubetq̃ caueri in exulceratis interaneis, dolore capitis, & neruorū infirmitatibus: Plinius autē de capitis dolore quidem nihil agit, sed neruis infirmis perq̃ utile ait esse. Quod intelligēs Barbarus, mutata dicendi forma, capitis doloribus, neruis infirmis quotidie ieiunis bibendū esse uertit. Nobis qua decet interpretem fide, nihil in scriptore hoc mutare placuit. Vitium tamen, aut uitiij suspicionem saltem signauimus: monemusq̃ iterum, male sequacem habere, quæ eo loco sunt uoces intellectum: ideoq̃ medicis diligentius omnia illic expendenda esse. Credimusq̃ nos, deesse eo loco aliquid, quo iuberetur in capitis dolore, & infirmis neruis bibendum ieiunis Scyllite acetum esse: uerum ut diximus, nihil addi, interponiue ab interprete debuit. Fuit etiam satis nobis a principio, purgatam tantum Scyllam dicere: quoniā nihil aliud q̃ ualde per in Dioscoride legeretur. Quæ autem ab alijs multa addita sunt: direptis, duris, & extrinsecus positis, &c. omnia ex Plinio huic scriptori addita fuerunt.

D

De uino Scyllino.

C A P. XIX.

σκιλλαιτικόν

S C Y L L I N Ū uinum fit hoc modo. Dissectam uti dictū est scyllam, & sole siccatam contundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo illigatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito. Vbi trimestri spacio maduerit, elutriatum uinum obstructo diligenter uase recondito. Licet quoq̃ sic humida Scylla uti. In orbiculos Rapi modo dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & in ueterascere. Alia parādi ratio. Scyllæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in Italica metretā musti demittito, & senos menses in uase obstructo mace

rari finito. Post id tempus excolatū uinum recondito. Vtile est contra A
cruditates, & ciborū corruptiones. Item ijs qui reuomunt cibū, & si pi-
tuita in uentre, aut stomacho cōierit. Prodest lienosis, male habitis cor-
poribus, aquæ inter cutē, regio morbo, difficili urinæ, torminosis, infla-
tionibus, resolutioni neruorum, rigoribus longis, uertiginosis, & uulsis.
Menses pellit. Minime neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit meli-
us. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

EX M. VERG. COMM.

Svas etiam Scyllitæ uini Columella & Palladius, quibus paulo ante locis diximus, conse-
craciones docuerunt, huic scriptori in eo, quod mox dicemus, tantopere contrarias, ut uinum in
altero non suspicari, sed constituitur oporteat. Dico autem alterum, quoniam concordēs sibi
in uicem Columella & Palladius, alterā contrarietatis huius ambo faciunt partem. Ea huiusce
modi est. Iubet ad uini huius consecracionem Dios. sectam in sole siccari Scyllam, *ἐξαιρεν ἐν ἡλίῳ*,
quod est, siccato eam in sole: illi autem contra in umbra siccari præcipiunt. Columellæ in ea
re uerba sunt. Taleolæq; sectas suspende in umbra, ut adsiccantur. Palladij, Scyllam de monta-
nis, aut maritimis locis sub ortu caniculæ procul a sole siccamus. Nec quicq; omnibus in eo
quod docent certius est, tam aperto sensu a singulis conceptæ uoces suæ sunt: eo fit, ut nullæ
in contraria re partes nostræ sint, q̄ rem simpliciter signasse. Grauis enim scriptoris huius æsti-
matio, dignitas, & fides: graues etiam in re latina scriptores illi sunt, præsertimq; Columella:
quem ego nunq̄ crediderim in uulgari re, & quæ quotidianum haberet usum, decipi debuisse:
& nihilominus, ut uidetur, contraria huic illi docent. Relinquemus ob causam de rota hac re
peritioribus censendam: illud tantū monentes, duorum fidē, contra unius auctoritatem cer-
tare: certioresq; habere rationem, ut in umbra potius q̄ in sole arefcat Scylla: quoniam ui-
sua exsiccata, omniq; humore citius exhausta, inutilem, aut saltem minus efficacem sol fa-
ciat: quod contra in umbra fit, in qua paulatim arefscens, nihil, aut parum ex uiribus suis amit-
teret. Et præter hæc in Scyllite Acero, cuius eandem merito in ea re aliquis credat esse rationem,
ab hoc ipso scriptore præcipi, in umbra siccari Scyllam: admittendamq; potius eam rationem,
in qua hic alijs, & huic alijs cōueniant, q̄ eam in qua hic nec sibi, nec alijs. Quod deinde dictum
a Diosco. est, secandam raporū modo Scyllam esse, ex Columella repetendum nouisse id uo-
lentibus est. Is enim, 17. uolumine, capite, 11. de Raporum conditura hæc docuit. Raporum
q̄ profundissima sumito: eaq; si sunt lutuosa, detergito, & summam cutem nouacula decerpi-
to. Deinde, sicut consueuerunt salgamarij, decussatim ferramento lunato incidito: sed caueto
ne usq; ad intum præcidas Rapum. Salem inter incisuras Raporum, non nimium, minutim
aspergito, &c. Hic incidendi Rapa modus est: quo in incidenda Scylla Diosco. uti iubet: ut pō-
sitam in tabula, scilicet integrā Scyllam, cultello decussatim incidas, ita tamē, ne usq; ad intum
præcidas. Quid autem decussare sit, & decussatim incidere, mathematici primum, tum rei rū-
sticæ auctores, & in architectura & fabrica periti facile ostendunt: qui omnes decussis, & in de-
cussim ductas lineas appellant, quæ non ad rectos angulos, sed quadam tenus transversæ ca-
dentes, & in alias lineas incurrentes græcæ literæ. χ. Romanæ autem. X. faciunt: quæ quoni-
am denarij numeri, quemadmodum nūc etiam est, quondam nota fuit, ab eo numero decus-
sis, & decussare uerbum latinis fecit. Ex rusticorum salgamorum disciplina itaq; secanda dua-
bus transversis, & in decussis incisuris Scylla, ut nos credimus, erit.

De Vinis marinis.

CAP. XX.

M Marina uarie faciuntur. Aliqui enim statim quū decerpit sunt
uuæ aquā maris ammiscent. Alij in area uuas sole siccant: qui
bus calcatis, marinā adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina
aqua macerant, mox calcatas exprimunt. Id magis Passi generibus ad-
scribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrīū ad-
uentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint. Aluum sub-
ducunt. Profunt purulenta extussientibus, aut si dura aluum exerceat.

C. Quæ ex Aminæis uinis fiunt, caput tentant. Stomacho aduersantur, flatus creant. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio tenerentur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre. Non quod frequēs eorū, aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorū rationem attineret. Sunt aut quædam ex ijs facticia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus. Vti quæ ex coto-

Vinum Tethalassomenon, hoc est, marina aqua factum, duo fere habet genera, Bixion, de quo dictum est. Alterum Leucoconion, aut etiā Leucochran, marina in album mustum confusa. In alijs autē gentibus Tethalassomenon, id est, mari conditum uocatur, a serui furto origine accepta, sic mensuram explentis. Habetur & Thalassites, uasis musti deiectis in mare; quo modo Cato præcipit, quadriennio Secundus. Rhodiū Coo simile est. Phorineum falsius Coo. Medicinæ aliquot ex uino marina aqua facto legas, & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In hunc usum quidā ex alto peti mare iubent, seruariq; ab æquinoctio uerno, aut certe nocte solstitio, Aquilone flante. Hauriri autē circa uindemiam: si hauriatur, decoqui.

Vinum facti-
um Incom-
mune.

Nillum uinum factitium, præterq; quæ specierum uetustate fiant, plus anno durare putant: & plura ne tricenis quidem diebus. Vinum ex filiqua, Cerantes, hoc est, filiquatum appellatur. Præstantissimum ex syriaca. Factitium uinum Græci Oenon Seuastron appellant. Quidam Propomata: quæ quidem ut sua quoq; sponte nascantur ex uitibus, ratio a Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina. Item marmore. Item sulphure, ac cinere: quod miremur. Veteres e uitis maxime sarmentis, aut quercu.

D**P**oterant, auctore Celso, uina omnia hæc simpliciter Salsa a nobis appellari. Is em. 6. primi uoluminis capite, inter solutæ alui remedia, negat falsum bibendū homini uinū. Habetq; id manifestā ex decretis ab hoc scriptore rationē: qui deiciendæ aluo, & his qui dura aluo erunt utilia ea esse docens, facile post se alios monuit, non esse augendā falsi uini potu alui solutionem. Sed accipit uocis eius intellectū fugientes, nolimus dubitari a legendis, posse qualia uina hæc quondā fuerint, & an satis esset illis salem miscuisse. Diximus it, quoniā poterant alijs inter pretes, si erat illis animus, in titulo capitis huius a rei substantia discedere, ex Celso honestiorem titulū uinis his præferre. Aptius enim Salsa, a sapore simpliciter, q; marina, aut græca uoce Tethalassomena dicta ab eis fuissent, præsentī legendiū dubitatione, quæ nam adiectæ uocis eius causā & ratio esset. Tradiderunt præter scriptorem hunc falsi uini huius confectionē, etiam non penitus eandē, non tamen oīno dissimilē. Plinius quidē. 14. uolumine, capite. 8. quo loco ait. Falsi uini huius originē, a furto serui ortam, marina aqua expletis, quod subtractū in dies fuerat, Columella aut. 13. uolumine, capite. 12. & 6. Quos poterunt uolentes audire, & ex eorum decretis etiā falsi uini confectiones discere. Nos interim ad reliquas uinorum confectiones interpretationem & cōmentationem hanc nostram transferemus.

κυδωνίτης
μηλίτης

C De uino Cydonite. **C A P. XXI.**
Cydonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exēptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarū pondo, in musti metretā triginta diebus demerguntur. Postea defæcatū uinum reponit. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum, pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit. Prodest stomacho, dysenterix, hepaticis, renum, uitijs, & urinæ difficultati.

Coniunximus e meliorū in græcis codicū lectione. Cydonite uini & mellis confectionem. Continuat enim historia in illis duo hæc capita leguntur. Habetq; id ex uirum utriusq; similitudine rōnem. Cydoniæ uini confectionē monstrauit Palladius in Octobri mense, capite. 10.

fed tam diuerſam, & ſcriptoris huius diſciplinæ adeo contrariam, ut uilius niſil de ea egiſſe ſue-
rit. Malomellis autem cōfectionem Columella, 13. uolumine, capite, 45. tam manifeſte tradidit,
ut cōmentationibus his noſtris eam addidiſſe inutile non fuerit. Poſt traditam ab eo ſcriptore
longius ſeruandorum pomorum, præſertimq; cydoniorum in melle diſciplinam, huius cemo-
di leguntur. Hæc ratio non ſolum ipſa mala cuſtodit, ſed etiam multi ſaporis liquorem præbet,
q̄ ſine noxa poſſit intra annum dari febricitantibus: iſq; uocatur Melomeli. Quæ omnia huic
ſcriptori eadem ſunt; præterq; q̄ Columella intra annum uti eo cōcedit, hic poſt annum miti-
us fieri oſtendit. Sed locus in hoc claudicat, & ideo utiq; nota ſignatus eſt.

A

De Melomelite. CAP. XXII.

Melomeli, quod & Cydonomeli nominant, ſic fit. Cotonea ma-
la ſeminibus ſuis caſtrata, in q̄ plurimum mellis, quo demer-
gi poſſint conſiſciuntur. Id poſt annum mitelcit, mulſo non diſſimile.
Præſtat eadem quæ ſuperior compoſitio.

μελιόμηλον
κυνόμηνον

De Hydromelo. CAP. XXIII.

Hydromelon duabus menſuris aquæ coctæ, & ſub caniculæ ſi-
cus inſolata, additis ad unam Melomelitis facti ex cotoneis. Viſ
huius eadem eſt.

ὑδρομήλον

BARBARI COROLL.

Hydromelon, aliud eſt q̄ Hydromeli, ut conſtat. alioquin & ſine melle ſingitur quandoq;
ut Paulus exiſtimat. Laudabatur in Græcia quod e Cibra ſiſtilibus puſillis auſtrum, uino-
ſumq; ſolebat inuehi.

EX M. VERG. COMM.

Nvillum, quod hætenus inuenerim, hoc nomine in relatina Hydromalum eſt. Factū illi ex
aqua & Malomelle, quibus conſtat, nomen eſt. Fuiſſe autem græcis uſum eius quæ tradi-
ſciendi diſciplina, & eius gentis medici aperte oſtendunt.

B

De Omphacomelite. CAP. XXIII.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc eſt. Acerbæ uuæ immaturæ
& tribus diebus inſolata exprimuntur, & ad ternas ſucci par-
teis, mellis optimi deſpumati ſingulæ partes adſciuntur, & inſolatum
in uafa tranſfunditur. Vim adſtringendi ac refrigerandi habet. Stoma-
chicis, coeliaciſq; conuenit. Vſus poſt annum eſt.

ομφακόμητις

BARBARI COROLL.

Omphacomeli, hoc eſt, mel acerbum, ſiue acidum.

EX M. VERG. COMM.

Docet in Auguſto mēſe Omphacomellis etiam cōfectionem Palladius. Ea neq; omnino
diuerſa, nec penitus eadem huic ſcriptori eſt. Quæ poſtiora in ea ſunt, ambobus eadem ſunt.
Quam hic tradit, ex antedictis nouiſſe facile eſt. Palladius ſuam his uerbis docet. In uuæ ſe-
miacerbæ ſucci ſextarios ſex, mellis triū fortiter duos ſextarios debebis inſundere: & ſub ſolis
radijs diebus quadraginta decoquere. Vocat Palladius ſemiacerbas uuas, quæ hic ait
ἡμισυρπῆες, id eſt, nondum integra maturitate nigreſcentes. Et quod hic ſimpliciter iuſſit, in-
ſolandum eſſe eum ſuccum, Palladius, 40. diebus fieri id præcipit. Cætera paulo minus q̄ ea-
dem ambobus ſunt.

De uino Apijæ. CAP. XXV.

Fit e pyris perinde atq; cotoneis uinū Apijæ nomine, ſed ita ut
pyra non magnopere matureſcant. Ex ſiliquis etiam, meſpilis, ſor-
bis ſimili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ ſunt, & adſtrin-
gunt, atq; inteſtinas fluſiones cohibent.

ἀπίτιο

C **V** **BARBARI COROLL.**
Inum e Pyro, Sorbo, Mespilo, Siliqua, Ceraunia. Differt porro Apites, ab eo quod Apia
tos etiam græce dicitur: q̄ illud e Pyro fit, hoc ex Apio.

EX M. VERG. COMM.
Longè aliter e pyris uinū cōfici in Februario mense Palladius p̄cipit. Et qm̄ qd̄ ille instituit,
aliud ab hoc penitus esse credimus, nihil ex eo ad hūc scriptorē afferimus. Quaq̄ breuitate Plī
nius lib. 14. cap. 16. uinū ex siliqua Syriaca & e pyris, malorumq̄ omnibus generibus fieri do-
cuit, eadem nos in scriptore hoc uina eadem primo uertimus, & nunc cōmentamur.

adulterus

De uino Oenanthino. CAP. XXVI.
ELabrusca fit, hoc est, uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum.
Sicci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta di-
es mutantur, mox colatum uinum recōditur. Facit aduersus stomachi
imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos & dysentericos.

BARBARI COROLL.
VInum Oenanthinum, quasi labruscatum conuertas. De hoc in Oenanthē dictum.
EX M. VERG. COMM.
Nihil ab hoc scriptore in Oenanthini uini cōfectiōe Plinius mutauit, e labrusca, i. syluestri ut
te fieri dicens: floris eius duabus libris in musti cado maceratis, & post. 10. dies mutatis. Qualē
autē legere florē eū oporteat, ex Palladij disciplina dictū in Oenanthino unguento a nobis est.

spolius uiror

De uino Rhōite. CAP. XXVII.
D **F**It e punicis malis maturis quod Rhōitē nominant, succo expres-
so ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, Apyrina uo-
cant, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones
internas, & febrim cum alui profluuiō exortam. Stomacho uile. Ad-
stringit aluum, & urina mouet.

BARBARI COROLL.
RHoites, & uinum dicitur, & mel, quo punica mala condiuntur.
EX M. VERG. COMM.
In medicina quotidianus ex punicis expressi uini usus est. Certa etiam in scriptore hoc eius
cōfectiō. Nihil ob eam causam de eo ultra agendum.

ioditior

De uino Rhodite. CAP. I. XXVIII.
RHodites sic fit. Rosarum siccarum tusarumq̄ minam linteolo
deligatam in sextarios octo musti demergito. Et post tres men-
ses, defæcatū uinum transfundens, recondito. Vtile ijs qui febris carent,
& ad stomachi cōctiones, & dolores in fine potum, & contra humiditas
aluos, & dysenterias. Fit quoq̄ ex succo rosarū, addito melle qd̄ Rhō-
domeli uocant, quod arteriæ scabricijs conuenit.

BARBARI COROLL.
Rosaceum uinum est hoc, siue ut Palladius, Rosatum.
Rhodomeli, hoc est mel rosaceum, aut rosatum. A Paulo etiam Rhodostactō dicitur. Nam
Rhodomelon ex rosis & cotoneis malis conficitur.

EX M. VERG. COMM.
Rosarū uini genus hoc Palladius in Maio mense appellat. Cōfectionēq̄ eius qualis sua æta-
te erat, his uerbis docet. Quinq̄ libras rosę pridie purgat, in uini ueteris decē sextarios mergis.
Post. 30. dies despumati mellis librā adijcis, & uteris. Nec multo post Rhodomel suū idem etiā
docet, quod huiuscemodi est. In succi rosę sextarijs singulis libras singulas mellis admiscēs, &
40. diebus sub sole suspendis. Docuit præterea in Octobri mense deficientibus rosis, qua ratioe
uinum quod idem rosaceo posset, conficeretur. Ea cōfectiō huiuscemodi est, Folia citri uiridia

in sporta palmea missa in musti nondum seruētis uasa depones, & claudes; exemptisq; his post 40. dies, addito melle ad modum rosati cum placebit ueris.

A

De uino Myrtitē. CAP. XXIX.

MYrtites fit baccis nigris post maturitatem tulsis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum. Postea exprimunt et seruant. Magnopere adstringit, Stomacho utile. Fluctionibus uētris ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

μυρτίτης

B A R B A R I C O R O L L.

Vinum Myrtites, hoc est, myrtatum, Cato docuit fieri & nigra: postea compertum ex albā. Genus uini Plinio est & Myrtidanum, ab ipso nominatum, & syluestris Myrti baccis: quo & manus tingunt. Myrtidanum Dioscoridi frutex est, non uinum, ut diximus. Aliud genus uini est Myratum: unde Myrata potio, non a myrrha, sed a Myro, id est, odoramento: quod & Iulius Pollux Myriuen uinum appellauit, nostri Murinam. Quancq; inquit iun, qui Myrinem etiam pro dulci capiunt: quod et Plinio placet ex Lelij Senilj Capitonisq; sententiā. In comœdia ceterē noua, Myrines, hoc est, odoratum uinum, Trimma dicebatur. De hoc & in Lota diximus. Nā Myrrha conditum amarissimum sit oportet: quippe quod in cruce Domino sit prebitum, non oblectamentum, sed cruciatu propositū: idq; non tam Myratum, q̃ Myrrhatum scribere oportet. Est & Myrtites pro melle myrtato acceptum quandoq;.

Pli. li. 14. ca. 16

E X M. V E R G. C O M M.

MYrtitæ uini confectioem in latinis rei rusticæ scriptores omnes quam non erant & exercebant sua tempora tradiderunt M. Cato operis sui de re rustica cap. 25. Palladius in Ianuario mense cap. 17. Columella. 11. uolumine, cap. 38. Postq; hos omnes Plinius. 12. uolumine, cap. 16. Omnes, excepto Catone, & Columella, simpliciter tulsis myrti baccis, &c. fieri uinum hoc tradiderunt. Duo illi ad certum fructicis eius genus rem contraxerunt, nigræ myrti baccis fieri precipientes: & ex duobus generibus in hoc usu nigram tantum probantes. Catonis uerba sunt. Myrtam nigram arefacto in umbra, &c. Columellæ uero. Nigri generis baccae cum sunt maturæ, &c. Eo fit, ut credamus quod a principio capitis huius legitur, *μύρτα μέλαινα παραμύσσητα λαβόντα*, &c. quod est, Sumito nigras myrti baccas cum iam maturitate sua dilabuntur, non ad nigrum in maturitate baccarum colorem simpliciter referendum esse, sed ad alterum myrti genus, quod priuatim nigrum ab antiquioribus uocatum est. Quod enim ad maturitatem pertinebat, in uoce *παραμύσσητα* indicabatur. Duobusq; illis autoribus redditus a nobis locus est, & ad nigræ myrti baccas contractus. Fecimusq; id confidentius: quoniam in omni medicinæ usu prælata candidæ nigra myrtus semper est. Non erit inutilis labor, antiquorum mores in his cognouisse cupientibus, quæ a Columella longius quo diximus loco de myrtitæ huius uini confectioe præcipuntur legisse. Diligens enim, & pro hominis uita ubiq; operosus homo, diligenter id etiam gentem suam & posteros docuit.

B

De uino Myrsinite. CAP. XXX.

MYrsinites sic temperat. Rami nigræ myrti cū suis baccis et folijs tulsis, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgijs feruescūt, donec duo supersint, aut certe sesq; congius relinquat. Id uinū colatū ad usus recōdit. Cōtra fursures, ulcera ī capite manātia, eruptiōes papularū, gingiuas, tōssillas, & purulētās aureis efficax est. Sudores sistit.

μυρσινίτης

E X M. V E R G. C O M M.

Altera hæc ex Myrto uini confectio est. Differt a priore: q̃ illa baccis tm̃, hæc ramulis, folijs & baccis myrti cōstat. Indicatq; in græcis manifeste utrāq; nomē. Quod em̃ myrtitæ ab illis dici, ex baccis quæ gens illa myrta uocat, factū est. Quod uero myrsinite, ex toto frutice quæ myrsinē idem græci appellant: eamq; ob causam alterum nos Myrtitæ græcorū & latinoꝝ mō, alteræ Myrteū latina tm̃ cōformatiōe diximus. Fuit ppria græcorū altera cōfectio hæc, si Pli. credimus,

Ee ij

C lib. 14. cap. 16. dicenti. Græci uero & alio mō teneris cum suis folijs in albo musto decoctis, &c.

¶ De uino Lētiscino, et Therebinthino. C A P. XXXI.

Λένισκος οίνος

Lentiscinū similiter ut Myrsinites temperatur. Nec secus Terebinthinum. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt uires. Adstringunt. Stomacho accommodantur, & defluctionibus intestinorum, uescicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiio. Vlcera omnia fluctionibus obnoxia, foru ad cicatricem perducunt, Fluctiones uuluar ac sedis, in seffione cohibent.

B A R B A R I C O R O L L.

Schininum uinū, hoc est, Lentiscinum, siue Lentiscatū dicitur. Si mastichen uero capiat, Mastichites uocabitur. Vtuntur in hoc cum pice diligentiores, ut inquit Plinius, nigra mastiche, quam in Ponto similem bitumini prouenire tradunt, radice Iridis, oleoq; additis.

¶ De uino Palmeo. C A P. XXXII.

Παλμικός οίνος

Palmulas maturas, quas uocant Chydæas, in urseolum imo pertusum, & obstructum, picata arundine demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congios infudisse satis est. Post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinū crasum & dulce, & reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxium. Cōtra fluctiōes ppter adstrictoriā uim efficax. Stomachicis, coeliacis, sanguinē expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoue faciunt: quod tandem acore uitiat.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 14. ca. 16

Palmeo uino Parthi & Indi utuntur, & oriens totus. Phœnicites appellatur, quod ex triualī palma constat. Id autem quod ex abiete palma fit, Spathites, & Elatites quoq; dici pōt.

E X M. V E R G. C O M M.

Tota, ut sic loquamur, diametro in Palmei uini confectiōe distat ab hoc scriptore Plinius. Ille em. 14. uolumine, capite. 16. palmularum modio iubet aquæ trēs infundi congios, hic decē modijs eam mensuram infundi pariter precipit. Magna inter hos scriptores mensuræ eius diuersitate, & cuius causam nos ignoramus. Nisi in alterutro mensuræ illius nota eam fecerit. In græcis omnibus, quas hastenus uidere licuit, nulla est nunc numeri alicuius nota, sed integra uox *Alia*, id est, decem, Qui itidem nobis est uetustissimus, & longobardis literis scriptus latinus Diosco. decem, manifeste ostendit. Pliniani contra codices omnes eodem modo, & his uerbis leguntur. *Marurarum, quas uocāt chydæas, modio in aquæ congijis tribus macerato. &c.* Quod autem nos diximus, potuisse mensuræ eius notam diuersitatis huius causam facere, huiuscemodi est. Græci denarium numerum decimæ, ut illi constituerunt in aliarum ordine literæ suæ nota, quæ iota est, indicant. Signantq; illam, ut uidere passim licet, eadem figura qua latini suum, i, Latini ediuerso unitates suas in numerorum incremento eodem illo, i, signant. Concurrentq; in eandem formam græcorum denarij numeri, & latinorum unitatis notæ. Potuit ex eo diuersitas hæc fieri, & quod decem in Diosco. legendum erat, unā a Plinio intelligi, non ex græcæ, sed ex latinæ notæ illius indicatione. Credimusq; nos ueriores scriptoris huius, q̃ Plinij historiam esse, Exigua enim mensura modius est, nec futura satis ad transferendum in tres aquæ congios uini saporem; multoq; minus in quinq; ut hic etiam iubet.

¶ De Vino Catorchite. C A P. XXXIII.

Κατορχίτης οίνος

Catorchites aliquibus Sycites uocatur. In Cyprio fit, ita ut Palmeum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adijciūt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ chelidonix, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigræ, macerantur, uti di-

ximus, & post decem dies humor excipitur. Atque iterum aut tertio, **A** idem modus aquæ in aqua uinacea maduerint, infunditur. Simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & acetum usum præbet. Id tenue est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamen prodest. Urinam ciēt. Menses trahit. Lactis ubertatem facit. Vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam Zethon appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adiiciunt. Alij muræ amphoram, quod non facile uitiatur, & aluo idoneum fore censent. Alij Thymum & fœniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt, & ita uicissim, donec uas expleuerint.

BARBARI COROLL.

Sycites uinum, aliqui Palmiprunum, siue Palmiprium uocant. Nam eius quod Sycinum appellauere, sicut & Idhacomeliæ, & Lectispagitiæ, oblitterata iam ratio est.

EX M. VERG. COMM.

Sycatum non male aliquis hoc uinum dixerit. Honeſta enim, & quotidiani usus in animalium fecore aliquando ea uox in re latina fuit: neq; ab re. Cur enim liceat grecis Sicytæ uinum hoc a ficis, quas ea gens ſyca appellat, dicere: Latinis autem a ficis Ficatum dixisse turpe sit. Infelicius bonas artes proficuntur, qui sic uetustatem amant, ut nihil suo tempore nouum oriri posse existiment. Nobis semper placuit quod Flaccus ait, licuisse indies, licereq; signatum presente nostra producere nomen. Ideoq; titulo capitis eam nos uocem addidimus, quam placere legentibus optamus. Satis in scriptore hoc Ficati uini perse confectio patet, nihil ideo de ea agimus. Quod desiderari a legentibus possit tantum monemus: quas hic chelidonias ad uini huius confectionem exigit, in ficorum censu ab antiquis scriptoribus inter primas numerari. Laudauit eas Athenæus in tertio sui Dipnosophistæ, campeſtribus locis conſeri præcipiens. Laudauit Columella in carmine suo, Purpureq; Chelidonias. Laudauit, ut cæteros omitamus, uolumine ne, capite, & Plinius, nouissimam sub hyeme maturari Chelidoniam dicens. Eam nos credimus a Chelidonijs in Illyrico gente dictam fuisse. Neq; ab re est, nouissimam sub hyeme maturari quæ in frigidissima regione primū puenerit. Omnis colore eā describit nigricans purpure. Neq; em̄ Colu. aliud significauit dicens, Purpureq; Chelidonis: et hic phœnicias, i. colore palmularum uocari, et nigras esse testatus, eodē cæteris colore describit. Facile ex his notis erit Chelidonias fici uolentibus cognoscere, colore nigricantis purpure, & postremę om̄ aliarum maturitatis.

De uino Sycomorite. CAP. XXXIII.

Fit & e Sycomoris eodem modo uinum. Sed in acetum acre de- σινωμορίτης generat: quoniā nominata præualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

BARBARI COROLL.

Vinum e fico Aegyptia, siue Alexandrina, item ex Cypria, cuius acetum Alexandrino melius est, Sycomoriten Græci uocant.

De uino Resinato. CAP. XXXV.

Resinatum uinum populatim facitari solet. Copiosum in Galia ρεσινάτης tia. quoniam uinum illic cōaceſcat, uua non matureſcente. Ideoq; refrigerat, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tūditur, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbuit, excolant, separantes resinam. Alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuuant, Urinam ciēt. Tussientibus ac destillatione uexatis cō-

Cueniunt. Item coeliacis, dysentericis, mulierum mensibus, & hydropicis, & foeminis fluctione uuluae laborantibus. Altis exulcerationibus in funditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Pli, li, 14, ca, 16

Vinum Rhetinites, hoc est, resinatum, de quo & in Pissite, id est, Picato dictum.

BARBARI COROLL.

EX M. VERG. COMM.

Haec sunt Resinata uina illa quae Martialis in Epigramate suo dicebat, relictis Phalernis im-
portune bibere hominem; quoniam potu illa delectarent, haec plerumque amarescerent; quo gu-
stu nunc etiam aliquot locis in Graecia bibuntur. Neque enim conditurae eius ratio penitus exo-
leuit. Quondam tam communis condiendi hac ratione uina in gentibus disciplina erat, ut hic Resi-
nati uini nota & titulo simpliciter contentus, nec quicquam ultra hoc testatus desyderare legentes
modo cogat, quo Resinae genere uina haec condirentur. Barbarus ex Larice addidit; cum tamen
in scriptore hoc non magis Larigna, quam quaevis alias intelligi resina possit. Resinatum enim tamen
hic ait, & nihilominus multiplex resina est. Dubitandum etiam, quam intelligi Galatiam oporteat:
etiam ne quae in Asia, an quae ultra Alpes ad Septentrionem est. Verum cum hic dixerit, non
maturescere illic ob gelu uuam, &c. aptius de ea quae ad Septentrionem ultra Alpes est intellexit
se fuerit. Et si nunc legisset me memini, consueuisse Gallos resina condire sua uina.

στροβιλίτης

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque. Praebetque resinati effectus, si quis madafactas nuces pini musto decoquat. Potum conuenit ijs qui tabitudine consiciuntur.

BARBARI COROLL.

DHoc uinum Hippocrates Coniam uidetur dixisse, quod arbor, e qua nuces pineae funduntur, Conos, & Strobilos uocetur; ut alio loco docui. Galenus Coniam, pro Pissite cepit.

EX M. VERG. COMM.

Nucleis Pineis, non nucibus condit hoc uinum Barbarus; nos contra nucibus, non nucleis. Anceps ad totam nucem, & nucleos eius in graecis uox diuersitati causam dedit. Secutus ille Plinium est lib. 14. cap. 16. dicentem. Fit nucleis Pineis; hi musto madidi exprimuntur. &c. Nos in ambiguo, quae scriptoris huius decretis responderent, potius elegimus. Primo enim uolumine, capite de pino, nucibusque & nucleis eius manifeste monuit, totas nuces ab arbore decerpas, contusas, in mustoque decoctas, uetustique tussi & tabidis prodesse. Quod totum idem hoc loco auditur. Nisi forte in prima capitis huius parte de nucleis, in secunda de nucibus agi dicatur: quod tamen parum uerisimile est; cum hic dixerit recentes strobilos, & contusos, quod nucibus magis quam nucleis congruit. Praeterea remedij tota uis in resina est, quae multa foris in nucibus, nulla in nucleis haeret.

κεδρίνης ἢ ἀρ-
κισίνος ἢ κυ-
παρίστινος ἢ
ἀλάφινος ἢ
πιτυίνος ἢ
ἐλάτνης

CDe Vino Cedrino. CAP. XXXVII.

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum, aut Abiegnum simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cum fructu adunt, aut soli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, uti desudet, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere. Et antequam recondantur insolare. Facticioium uinorum uasa impleri debent. Namque non plenae uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Urinae ciēt, & substringunt. Laurinum tamen uehementius excalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. Diebus quadraginta insolari debet, & defaecatum in uasa transferri.

Ἰουνιπερίνης

FDe uino Iuniperino. CAP. XXXVIII.

It etiam uinum e baccis Iuniperi, non aliter quam cedrites, et ad eadem ualens,

E X M. V E R G. C O M M.

A

Differt, ut uidetur, reprimi, mox nomine etiā quod ex eadem Cedro, sed non iisdem eius partibus fit uinum. Quod enim ex materia eius conficitur, Cedrinum: quod ex liquore, Cedrite ab antiquis græcis dictum est. Iisdem & nos nominibus duo discreuimus genera: licetq; in pluribus græcorum, tribus capitibus seorsum hæc docerentur, nos tamen naturæ in arboribus his similitudinem, & partium coniunctionem, mox meliorum græcorum fidem secuti paulo minus q̃ congeneres plantas, & earum partes uno eodemq; capite clauimus: reddidimusq; singulis, qua licuit certitudine, quæ sua erant.

De Vino Cedrite.

CAP. XXXIX.

Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt. Et ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat. Tussi utile sine febre, pectoris, laterumq; doloribus, uentris & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulvæ malo opportunis, hydropicisq;. Facit aduersus uentris tinea & rigores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

αποπνιξ

B A R B A R I C O R O L L.

Vinum Cedrites, a Cedrino differt: q̃ Cedrites e Cedria fit, Cedrinum ex Assulis Cedri, aut fructu.

E X M. V E R G. C O M M.

Debuerat resinato coniungi statim Picatum uinum: quoniam nihil aliud q̃ combustæ resinæ fluxus Pix est. Hic tamen plura ex arboribus his confecta ante numerauit uina, quæ aut resinam ipsæ ferrent: aut resinæ pares haberent uires: nec nisi post eas Picatum docuit uinum. De quo eadem huic omnia Plinius tradidit libro. 33. capite secundo, ex quo poterunt uolentes multa intelligendo huic scriptori necessaria audire.

B

De Vino Picato.

CAP. XL.

Picatum ex liquida Pice, & musto temperatur. Picem autem primum marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inaluerit, & syncæra maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluenda. Congijs octo musti, uncia Picis una aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, iocineris, lienis & uulvæ, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

οίνος πικαίτης

B A R B A R I C O R O L L.

Diximus de Pissite, id est, Picino, aut Picato etiam superius.

De Vino Absinthite.

CAP. XLI.

Absinthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, ammistam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias parteis, & ubi infuderint nonaginta aceti sextarios, & Absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas, dumq; conquieuerit defæcant, Alij absinthij minā in amphorā demittunt, tufamq; & raro linteo deligatā, in decem congijs musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantē, alij trientē, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, casia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarū,

αποπνιξ

Ec iij

C singulos sextantes injiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstrueto uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt. Postea defæcatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, celticæ Nardi drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta lintheo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant. Alij in uiginti sextarios musti, absinthij libram, & siccæ pini resinæ sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stomacho. Vrinam cit. Tardam concoctionem accelerat. Hepaticis, regio morbo, & renū uitij auxiliatur. Fastidia discutit. Iis prodest quibus stomachus negociū exhibet. Valet cōtra longā præcordiorū distentionē & inflatiōes, teretesq; uentris tineas, & remoratos menses. Contra hausta ixiæ uenena q̄ plurimū potum, & uomitionibus redditū auxiliā.

V B A R B A R I C O R O L L.
Inum Absinthites fit & alio modo circa radices uitium consisto, sicut Elleborites.

E X M. V E R G. C O M M.

Sacris Romanæ gentis celebratū quondam Absinthiū est. Siquidem latinæ: ferijs certantibus in Capitolio quadrigis, uictor Absinthiū bibebat: sanitatem, ut par est, præmio dari honorifice tunc existimātibz Romanis, cuius seruādæ, restituendæq; non parua merito inter olera laus Absinthio debetur: tam multiplex uis eius est, & in firmando stomacho tam efficax. Ob quod sapor eius in uina transferit. Fitq; Absinthite uinū toto hoc capite a Dioscoride longius descriptū: ne deesset gentibus tractandæ Absinthio medicinæ ratio hæc etiā: quā docuit & Columella. 13. sui operis uolumine, capite. 37. his uerbis. Vinū Absinthite sic condire oportet. Pontici Absinthij pondo librā cum musti sextarijs. 4. decoque usq; ad quartam. Reliquū quod erit frigidū, adde in musti ammingi urnā. &c. Simplex, ut uidet, Absinthite uini huius Columellæ conditura est. Dioscorides operosior: neq; una, aut altera, sed pluribus rōnibus instituta. Quæ omnes satis perse patent: tractariq; hoc tempore etiam possent, nisi quæ Absinthij, aliarumq; rerum pondera & uini mensuræ nunc in Dioscoride leguntur, suspecta nobis essent: non tam quia uarie in antiquis græcis leguntur, q̄ quia alicubi maiora, alicubi minora, q̄ rei usus exigit esse nobis uidetur. Nos nihil mutauimus, communem lectionem in cunctis secuti. Monemus tamē, sicubi conficiendi Absinthite uini studium aliquando fuerit, quod ad pondera & mensuras in eo pertinet, diligentius expendendum illi prius esse.

D

¶ De Vino Hyssopite.

C A P. XLII.

HYSSOPITES

HYssopites e Cilicio Hyssopo maximè laudatur. Fitq; similiter foliorum Hyssopi tusorum libra in amphorā musti coniecta. Lintheo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauiatus pondusculo fasciculus sidat. Vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Contra pectoris, laterum & pulmonis uitia, ueterem tussim, & suspiria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febriū circūitu repentibus auxiliatur. Menses mouet.

V B A R B A R I C O R O L L.

Inum Hyssopites, potest & iuxta radices sato uinum fieri, ut Absinthites.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est Hyssopite uini nostri orbis gentibus desperanda penitus confectio. Et si hic, Plini usq; ex Cilicia tantū Hyssopo probatissimū fieri dicunt. Columella em̄ quo diximus in Absinthite loco, nulla aliunde petita Hyssopo Hyssopite suū conficit. Poterūtq; uolētes suæ regionis Hyssopo uinū condire, si non omnīū aliāq; probatissima ea saltem quæ inuicilis oīno non sit.

¶ De Vino Chamædryte.

C A P. XLIII.

CHAMÆDRYTES

Simili modo Chamædrytes fieri solet. Excalfacit, discutit. Con-

uulſis, regio morbo, uuluaꝝ inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquaꝝ inter cutem, ſubuenit. Inueteraſcens melius redditur. A

¶ De Vino Stichadite.

CAP. XLIIII.

Stichadites non ſecus temperatur. Congijs ſex ſtichadis minam addere oportet. Craſſiciem, inflationes, laterum, neruorumq; cruciatuſ, & perfrictiones diſcutit. Comitialibus commode datur, cum Pyrethro & Sagapenio. συχάδιτις

¶ De Aceto Stichadico.

CAP. XLV.

Fit ad eadem Acetum e Stichade herba, ut paulo ante diximus, aceto macerata. Quod eoſdem implet effectus. ἄξος διὰ συχάδιν

¶ De Vino Ceftrite.

CAP. XLVI.

Fit Vinū e Betonica, quā Ceftron psychotrophon appellant. Hærbam ſemine maturo prægnantē, cū ſuis ramulis minꝝ pondo, congijs duobus muſti macerant, & poſt ſeptimum menſem transfundunt. Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipſe pollet. Et ut in uniuerſum dicatur, facticia uina, ſibi miſturarum uires adſciſcunt. Quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam conſequi. Verumtamen uinorum uſus febricitantibus abdiciendus. Fit etiamnum e Betonica Acetum ad eadem uitia utile. κεφρίτις

¶ De Tragoriganite uino.

CAP. XLVII.

Tragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quater- nos muſti ſextarios coniectis, & poſt tertium menſem tranſfuſis. Prodeſt torminibus, uulſis, ruptis, laterum doloribus, ſpūrituum diſcurſationi, ægris concoctionibus. B
τραγορίγανιτις

¶ De Vino Bunite.

CAP. XLVIII.

ENapis fit uinum nomine Bunites, drachmis duabus tuſi Napi in ſextarios duos muſti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodeſt ſtomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. βουνιτίτις uinum

EX M. VERG. COMM.

Napis inter cætera condiri uinum hic ſcriptor ait: prodeſſeq; armorum, & equitandi labore defatigatis: neq; haberet a reliquoꝝ diſciplina diuerſum aliquid conditura eiꝝ, ſi eſſet. Naporum contra laſſitudines priuatim uis aliqua. Aut ſi ratiocinari liceret, cur magis laboribus illis duobus, q̃ tot alijs curſus itineris, pilæ, remigij, faltuſq; proſit. Omniſ enim idem euētus eſt, & ob eam cauſſam eadem conſtituenda remedia ſunt. Teſtatur tamē id Dioſcorides. Fuiſſeq; id ab antiquiſſimis Græcis obſeruatum & inſtitutum. 27. uolumine, capite ſecundo Plinius etiam confirmat: & ſi in græcoꝝ oſtentationem totam huiuſcemodi ille reſciat rem. Eiꝝ uerba ſunt. Et alias modum exceſſerat medicos: in his oſtentatio: ueluti e Napis uinum utile eſſe ab armorum, equitatuſue laſſitudine præcipientium. &c. Nos ex tam multis hoc ſignauiꝝmus, ut ſcrupulum legentibus iniiceremus, quo cogerentur & ipſi remediꝝ eiꝝ ex uini & Naporum uiribus cauſſam inuenire. Docuit præterea hic ſcriptor, Marrhubio notiſſima omnibus herba condiri uinum. Certiorem tamē eiꝝ condituram decimoterſio uolumine, capite. 32. tradidit Colu mella. Ea huiuſcemodi eſt. Vinum Marrhubij multi utile putant ad omnia inteſtina uitia, & maxie ad tuſſim. Cum uindemiā faciēs, Marrhubij caules teneros, maxie de locis incul-

D I O S C O R I D I S

Ctis & macris legito: eosq; in sole siccato; deinde fasciculos facito, & tomice palmea, aut iuncea ligato: & in seriam mitto, ita ut uinculum extet. In musti dulcis sextarios ducentos Marrhubij pondo libras octo adijcito, ut simul cum musto deferuecat. Postea eximito Marrhubium, & purgatum uinum diligenter oblinito.

CAP. XLIX.

δικταμνίτης

DICTAMNI drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia, Menses & purgamentum a partu subducit.

CAP. L.

πρασίτης οίνος

MArrhubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, et reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinū pectoris uitijs, & omnibus quibus Marrhubium.

CAP. LI.

θυμίτης

THymi tusi & cribrati uncias duas lintheo colligatas, in amphorā musti adijcito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & præcordiorū dolores, hybernos horrores, & uenenata animalia, quorū morsum frigus insequitur, aut putrescit locus.

CAP. LII.

θυμικήτης

Similimodo e satureia uinū fit, quod eadē quæ Thymites præstat.

CAP. LIII.

όριγανίτης

Sic quoq; Origanites ex Heracleotico Origano conficitur. Facit eadem quæ Thymites.

CAP. LIIII.

καλαμίνθίτης

γλυχωνίτης

ECalamintha, Pulegio, Abrotono uina fiunt eodem quo Thymites modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, et regio morbo: q̄ urinam moueant.

CAP. LV.

κονυζίτης

Fit & item e Conyza uinū, contra uenenata ante alia efficax.

CAP. LVI.

άρωματίτης

ARomatites ita fit. Palmæ, Aspalathi, Calami, Nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito. Postq̄ contriueris musto subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadraginta diebus quiescere finito. Deinde ubi fæce expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami uncia, Phu drachmæ septem, Costi drachmæ duæ, Nardi Syriaci drachmæ sex, casie uncia, croci drachmæ quatuor, Ammomi drachmæ q̄nq; , Asari drachmæ quatuor, omnia simul trita, & lintheo colligata in caddū musti demergunt. Et postq̄ uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores. Difficili urinæ, rigoribus, retardatis mensibus, atq; ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. Præputiæ crassiciem extenuat, Colorem alit, Somnum conciliat, Dolorem finit, Renum & uesicæ uitijs auxiliatur.

B A R B A R I C O R O L L.

A

V Int̃ Aromatites, hoc est, odoratū, parabilius, & simplicius Catoni e ferta, lunco, Palmā. Athenæus auctor est, ut in Myrrite diximus, potiōis genus ex aromatis confectū, q̃ ueteres uterent̃, appellari Trimma. Diximus & de alio Aromatite, qđ Hippocraticū recētiōes uocāt.

E X M. V E R G. C O M M.

A B Aromatis, quæ odoramēta sunt, Aromatite uino nomen græci fecerūt. Neq̃ ab re tam multis odoramētis condit̃. Nota in conditura eius oīa sunt, & nisi in ponderū, & mensurarum notis utit̃ in græcis fuerit, qđ fere suspicamur, certa in reliquis ratio erit.

¶ De Vino e Pipere, Myrrha, & Iride. C A P. LVII.

F Ir & Vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coijt, Myrrhæ duæ drachmę, Piperis candidi drachma una, Iridis drachmę sex, Anisi drachmę tres. Omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex uini sextarios coniiciuntur. Vinum post tri-duum colatur, et in lagena reconditur. Datur post deambulationem me-raculū cyathū unius mensura.

¶ De Nectarite uino.

C A P. LVIII.

F le quoq̃ Nectarites ex Helenio hærbā, quā alij Medicā, alij Symphyton, alij Idaeon Phlomon, alij Orestion, alij Nectarion uocāt. Radicē sicca pondo quinq̃ drachmarum linteolo colligata, & in congios sex multi addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pecto-ris uitia. Vrinam pellit.

¶ De Vino e Syriaca Nardo celtica, & Malabathro.

C A P. LIX.

E Syriaca Nardo & celtica, Malabathroq̃ uinum faciūtatur hac ratione. Singulorum selibrām in binos musti congios mittito. Post menses duos colato. Datur cyathus unus cum tribus aquæ. Hoc Vinum efficax est contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem. Prodest stomachicis, atq̃ ijs quos pallor decolorat. Alij bessēm, aut sextantem acori, & celticæ Nardi quadrantem, in musti amphoram adiiciunt.

B A R B A R I C O R O L L.

H Vic uino pipere & melle addito, fiunt quæ alij Condita, alij Piperata appellant. Acetum quoq̃ piperatum fieri solebat.

¶ De Asarite uino.

C A P. LX.

A Sari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id uini genus urinam ciet. Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq̃ conuenit.

¶ De Vino e syluestri Nardo.

C A P. LXI.

R Adicis syluestris Nardi recētis & tritę, cribrataq̃ bessēm, in congiū musti conijcito. Duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

¶ De Daucitate uino.

C A P. LXII.

R Adicis Dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram im-

VINTAPITIO

B

Scripsero

Auctus

D I O S C O R I D I S

C ponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. Menses pellit. Ructus ciet, & urinam. Prodest tussi, ruptis, uulsiſq̃.

¶ De Saluiato uino.

C A P. LXIII.

ἐλαίου φανίτης

S Aluiæ unciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos menses.

B A R B A R I C O R O L L.

S Aluiatum uinum, a Saluia dici nouimus. Saluiatum uero quo ueterinarij utuntur, potionis genus est. Poton Græci uocant ex ordeacea, aut triicea farina & sale: a quo fortasse Saluiatum. Quidam in Columella Saluiatum, aut Salinatum legere malunt. Ab eo salinare uerbum deducitur.

¶ De Panacite uino.

C A P. LXIII.

πανακίτης

P Anacis unciam in musti congium mittito, & transfundito. Prodest ruptis, uulsiſ, fractis, orthopnoæ. Lienis crassiciem extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores efficax est. Tardas concoctiones accelerat. Menses & partus extrahit. A quæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

¶ De Acorite uino.

C A P. LXV.

ἀκορίτης

V Ina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorū uncias in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciūt ad pectus & latera. Et urinā mouēt.

¶ De Selenite uino.

C A P. LXVI.

σεληνίτης

S Eminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. Stomachicis & difficili urinæ auxiliatur. Oris halitum commendat.

¶ De Marathrite, & Anethino uino.

C A P. LXVII.

μαραθρίτης καὶ ἀνέθινος

E X Foeniculo, Anetho, & Petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

¶ De uino e flore salis.

C A P. LXVIII.

F It & e flore salis uinum multo ad purgandum efficacius, q̃ uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neq̃ in secunda, neq̃ aduersa uale tudine prodest. Fit etiam uinum quod Phthorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uisum sato. Siquidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Id uinum partus enecat. Datur ieiunis mulieribus quæ ante uomuerunt, cyathorum octo mensura dilutum.

B A R B A R I C O R O L L.

V Inum e salis flore, Halosanthiten Græci appellant.

¶ De Vîno e Thymelæa.

C A P. LXIX.

θυμηλαίτης

R Amorum Thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta dras

chmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec con-
gij duo superfint, defæcatumq; recondito. Aquosa purgat excremen-
ta, & lienem absumit.

A

Vinum Phthorion¹, aliqui Ecromaticon appellat, ex Elleboro in Thaso fit, ibi & uinū con-

di perhibent, alterū ad soporem, alterū ad uigilias. Cato Ellebori radices in pila contundi præ-
cipit, circū uitem dandas. Vtile id uinum fore ad mouendam aluum, sine periculo. Theopha-
stus in Arcadię oppido Heræa, uinum tradit esse, cuius potu foeminae pariant; uiri mente com-
moucantur. In Achaia saltu Ceryniensi uinum & uitem nasci, quę foemini gustata faciant ab-
ortum, in Troezenē steriles. Idem auctor, uina quædam scribit Ethica uocari: Theodorus uer-
tit, moralia: etiā mendose scriptū est, molalia quandoq;. Laudantur, q; celeriter purgāse, ac
cōsistunt, quoniā tenuia sunt, & mixturæ immunita, ob id Ethica dici potuerē, quasi castigata.

Vinū Phtho-
rion.

¶ De Vino e Chamælæa.

CAP. LXX.

Chamælæa dum floret, cū folijs tusa, & cribrata decem drachma-
rum pondere, in musti congiū additur. Post duos menses
uinum in uas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine
confractis efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

χαμαιαίτιος

¶ De Vino Chamæpityino.

CAP. LXXI.

Chamæpityinum simili modo fit, ad eadem conueniens, Vri-
nam quoq; ciet.

χαμαιπυτίνος

¶ De Vino Mandragoritæ.

CAP. LXXII.

Librum radices concidito. Segmenta lino traicito, quod selibram
æquat in musti congios decē demittito. Ibiq; esse finito ad men-
ses treis. Media potio hemina dimidium, bibitur, passio in duplum ad-
dito. Aiunt hemina uini congiō mistam, potu sapore adferre. Cyathus
unus cū sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius, doloris sen-
sum aufert. Fluctiones incrassat. Olfactu, instillatu, potuq; idē præstat.

μανδραγορίτης
B

¶ De Vīno Elleboritæ.

CAP. LXXIII.

IN congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri
ueratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit, in mari-
næ aquæ congios quatuordecim aut quindecim transfundito. Et ubi
pleniusscule frigeris, iniicito. Post aliquot dies colato, & utitor. Dato
cyathum unum ex aqua in potu ad aluum soluendam ijs qui euomue-
runt a cœna. Alia ratio. Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncia
as duodecim, spicæ syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteo colliga-
tas in septem uini cōi sextarios, diebus quadraginta macerandas indi-
cto. Postmodum colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Deco-
ctæ marinæ aquæ ex pelago petita sextarios duodecim, ueratri candi-
di libras sex, quadragesimo die q̄ madefeceris, colato, & utitor. Alia ra-
tio. Veratri drachmas duodenās, & aphronitri quaternas in senis mu-
sti sextarijs diebus quinis denis macerato, mox colato, & semestri ex-
actō, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uuas in

ελλεβορίτης

C. sole siccatas imponito in musti metretam (implet autem metreta congi-
os decem) & gypsum in uinum mittito pondo drachmarū uiginti, et bi-
duo residere finito: conijcito ueratri nigri uncias triginta, iunci odorati,
calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios du-
os & heminam, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens lin-
teolo diebus quadraginta appendito: postea colato, dabis heminas tres
aut duas dilutas. Purgat a partu & abortu foeminas. Menses extrahit.
Contra strangulatus uuluae efficax.

BARBARICOROLL.

DE altero Elleborite, dictum est in Phthorio.

DE Vino Scammonite. CAP. LXXIII.

SCAMMONITE

SCAMMONITES sic fit. Radicis scammoniae per menses ef-
fossae, tritae & linteo colligatae drachmas quinque, in uini congi-
um mittito, ad dies triginta. Aluum purgat. Bilem & pituitam extrahit.

BARBARICOROLL.

DE altero Scammonite legitur in Phthorio.

EX M. VERG. COMM.

Satis per se patent quae fictitij Vini tam multa grā supiore capite collecta a nobis sunt. Ni-
hil ob eam causam ultra de eis agemus: sed festinantes ad reliqua, quae uerēda in scriptore hoc
alia supersunt, interpretationis, cōmentationisq; nostrae laborem transferemus.

D
cadmiæ

DE oibus metallicis, et primū de Cadmia. CAP. LXXV.
EX Cadmiæ generibus optima est Cypria, Botrytis nomine, den-
sa, modice grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie,
colore spodij: quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur
foris cærulea, intus candidior, internatis segminibus, onychitæ lapidi si-
milis. Cuiusmodi sunt quæ e ueteribus metallis effodiuntur. Quædam
etiam Placodes, id est, crustosa dicitur, lineis quibusdam perinde quasi
zonis cincta: ob quod eam Zonitin appellauere. Alia Ostracitis nomi-
natur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem ha-
bet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis
Botrytis nomine, & Onychitis, utiles. Reliquæ ad emplastra, & farinas
quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem Cypria prodest.
Ex Macedonia uero, Thracia, & Hispania delata, improbantur. Cad-
miæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, cor-
poris meatus infercire, exrescentia in carne coercere, crustas creare, &
ulcera quæ cacœthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cad-
mia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus ca-
merisq; fornacum applicata. Prægrandes autē ac ferreæ sunt fornaces,
ab officinis appellatae Acestides, per summa nullo spiraculo relicto, cō-
cameratę: ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & ini-
bi detineant: quæ cū spissius insidēt, in corpus contrahescunt, & modo
genus unum eius, modo alterū, mō omnia perficiūt. Extrahitur & Cad-
mia cremato lapide cui Pyritæ cognomē est, mōti sole supereminente.

In quo etiā quādam quasi uenæ, chalcitis, myrios, foreos, melantheriæ **A**
 cærulei, chryfocollæ, atramenti futorij, diphrygiscq; inueniunt. Nec de-
 sunt qui Cadmiam in lapidū fodinis inueniri tradant: falsi quādā lapi-
 dum cognatione. Repertur & apud Cumas lapis nullā sui uim osten-
 dens. Li eo depræhenduntur, q; sunt Cadmia leuiiores, nullumq; alienū
 mandentibus sapore exhibent. Cōmanducatus aut lapis, dentes offen-
 dit. Cadmia, utpote cum cedat, esum nō respuit. Alio aut discerni pos-
 sunt argumento. Cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se cō-
 primit. Quod in lapide nunq; accidit. Item tritus, & igni appositus la-
 pis, profilit, & fumū igni similem eiāculatur: Cadmia uero quieta ma-
 net, fulginemq; luteo colore, aut aereo splendentem expuit, uario zona-
 rum discursu. Insuper lapis ignē expertus, atq; refrigeratus, colore mu-
 tabit, ac leuior multo fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eā aliquot
 diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus cādidiōr, ac minus pon-
 derosa, sed uiribus nequaq; comparanda ararie. Vritur Cadmia super
 ior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoreis
 modo bullet: mox extinguitur uino aminnæo. Sed quæ ad psorarum
 medicamenta preparatur, aceto. Alij hoc modo. Exustam cōterunt in
 uino, rursumq; ficuli crudo torrent, donec pumicosa uideat. Iterumq; **B**
 tritam ex uino, urunt donec in cinerem redigatur, nihil scabriciæ reti-
 nens. Hac spodiū uice utuntur. Lauatur in mortario trita, effusa subin-
 de aqua, dum sordidū nihil emergat. Dein coacta in pastillo reponit.

B A R B R A I C O R O L L.

Cadmiam uocant, & lapidem quendam erosum, ex quo fit as, fusuris necessarium, medici-
 næ inuiceliquamq; Galenus lapidosam Cadmiam circa Solos in Cypro insula nascentē, fornā-
 cariae prælatam ætate sua meminit, inuentu raram. Possidonius quoq; lapidem Cadmiam ex
 Cypro tantum ære fieri commemorat. Fit aut Cadmia, de qua hic loquimur, etiam in argenti
 fornacibus, candidior ac minus grauis, sed minime cōparanda arariæ. Plinius Capnidū, hoc
 est, Fumariam appellat eam, quæ sit tenuissima, in ipso fornacium ore inuenta: quæ flammæ
 eluctantur, exusta, & nimia leuitate similis fauillæ. Secunda Botryitū, hoc est, Racemariam
 quia interior sit, & cameris dependeat: cui prima dignatio tribuitur, grauior priore, leuior se-
 quentiū. Duo huius colores, cinerius, & puniceus, qui & melior. Friabilis hæc, oculorumq;
 medicamentis, utilissima. Tertium genus Placitis, aut Placodes: & ipsa ex argumento, quoniā
 crusta sit uerius q; pumex. Ponderosissima hæc, & intus uaria. E lateribus fornacis fluunt ex
 ea duo genera, Onychitis extra penē cerulea. Intus Onychite, modo maculosa, Ostracitis totā
 nigra, & cæterarum durissima: unde nomen.

E X M. V E R G. C O M M.

Non potterunt metalla etiā, & si naturæ solidissimæ sunt, pares iniurias temporū, & libra-
 riorum incuriā, duas bonarū artium, & antiquorū scriptorū maximas calamitates & pestes,
 euadere. Habet em hoc etiam caput, quod suspicemur aliter quondā legi potuisse, quod in an-
 tiquis exemplaribus uariet, & quod duobus locis necessario desideretur. Quod suspicamur
 eo loco est quo legitur. Vocatur & Ostracitis, alia concretionē suā *ixv*. Quam uocem nescio
 quomodo gracilem, nos etiā alios imitati diximus. Neq; em Cadmiæ gracilitas congruit. Si
 enim minore crassitudine describenda erat Cadmia hæc, tenuem, nō gracilem dici oportebat.
 Per latitudinem em Cadmia extenditur: potestq; tenuis, aut contra crassior concrecere: & ni-
 hilominus *ixv* hic dicit: quæ uox per longitudinem subtile, & gracile significat. Eapropter
 dubitauimus eum uertentes locū, non *ixv*, quod est gracilem, sed *ixvāv*, id est, ualidam & effi-
 cace legi potuisse; ut non ad habitum & figuram, sed ad potestatem & uires referenda ea uox

C fuerit. In quo non tam persuasit suspicari id, facili ob literarum & soni uicinitatem ex altera in alteram uocem & significationem lapsus, q̃ Plinius de hac ipsa Cadmia agēs lib. 35. cap. 10. for tissimam ceterarum eam esse dicens: quasi ἱχθυήν, non ἱχθυήν ipse tunc legisset. Cōmunis ramei gr̃corum omnium ea lectio est. Et qui latini scriptoris huius codices circumferuntur, his uerbis eam describunt. Est & alia quæ Ostracitis dicitur tenuis, & nigra, eadem fere tenuitatis & fragilitatis significatione: eamq; ob causam nihil nos ex cōmuni lectione mutauimus, contenti suspicionem hanc nostram legentibus indicasse. Quod deinde in scriptoris huius exemplāribus uariat, coniunctum his statim sequitur: habentq; uetustiores gr̃ci, & quibus nos magis deferimus, hæc uerba. γὰρ οὗτος δὲ ἢ ὁσπανάδου κίχρυς ἢ ἱχθυήν, coniuncto scilicet cum superioribus sensu. Qui sit, ut nos uertimus, uocari Cadmiam aliquam testaceam, gracilem, plarumque nigram, terreftri, testaceaue superficie: quasi rationem & causam hic scriptor redderet, cur testacea Cadmia hæc appellaretur, quoniam terreftri, aut marinis testis simili superficie sit. Qui uero impressi codices passim circumferuntur, alium, & qui forte a uero non discrepet his uerbis indicant sensum. γὰρ οὗτος δὲ ἢ ὁσπανάδου κίχρυς ἢ ἱχθυήν, qui scilicet sit, terrestrem esse Cadmiam, quæ testacea superficie sit: ideoque in medicina minus utilis. Nos antiquiores gr̃cos & latinos secuti, terreftri, testaceaue superficie Cadmiam illam esse descripsimus. Nec eo secius audisse hoc legentes inutile penitus nō fuerit. Quemadmodum contra pro comperto his esse illud oportet, perisse huic scriptori aliqua quo loco hic ait, adhærente parietibus & cameris eius fauilla. &c. Quæ enim statim sequuntur, Grandes hæ; ferreæq; sunt ab ærarijs acestidas appellatæ, in summis fornacium cameris compactæ. &c. integro & apto sensu coniungi nequeunt. Ceteri interpretes nihil deesse hoc loco suspicati, ad fornaces rē detorsērunt: uerteruntq; grandes, ferreæq; fornaces eas esse, & ab ærarijs acestidas uocari. Nō animaduertentes, si sic legatur, contra eius artis leges & obseruationes fieri ex metallo in cūsum fornaces: quæ eodam igne candentes & ipsę fluent, aut liquefacto aeri concorporabuntur: nec ab ærarijs in eo usu tractari aliqua ratione poterunt. Quod præterea sequitur, ut rerineant, confidantq; in eis quæ ab ære sursum feruntur, ad cameras & earum conuexitatem simpliciter referri non posse: neq; fornaces a gr̃cis acestidas uocari: sed ex quo hic ait, ab ærarijs acestidas uocari, oportere aliud quidpiam ea uoce significatum suspicari. Quibus ueluti impedimentis nos admoniti, suspicati usum primū sumus: mox ex antiqua scriptoris huius interpretatio ne id manifeste deprehendimus. Seruant em̃ adhuc in ea ueræ lectionis exigua uestigia aliqua. Quæ huiusmodi sunt. Multi uero ponunt ferreas hastas, & longas. &c. Ex quibus ratiocinari facile est, confuuisse qui Cadmiam quærent, ferreas uirgas ueluti axes transuersas in summa fornacis camera in eum quem hic docet usum suspendere. Eritq; sequax hic sermōnis ductus, ut cum dixerit Diosc. Fit Cadmia ex ære in fornacibus accenso, adhærente fornacium parietibus, & cameris eius fauilla: interim solere ærarios, ut aptius hæreat & confidat Cadmia, in summa fornacis camera transuersos axes, aut regulas componere: esseq; has grandes ferreasq; & ab ærarijs acestidas uocari. Quæ uoce gr̃ci ab Acesta Siciliæ ciuitate plostelli genus huiusmodi axibus compactum uocabant. Non longe postremo a fine necessario desiderat, quod tamen restitui facillime potest. Locus est ubi de cremanda Cadmia agitur: in quo cum in cunctis gr̃cis legatur, post eius costuram, tum uino amineo restinguitur: sequaturq; statim: quæ uero ad scabiem aceto. &c. necessario deesse aliquid constituendum est. Dicendi enim modus hic gr̃cis pariter & latinis parum congruus. Nec habet sequacem sermonis ductum aduersatiua particula illa quę sequitur, quę uero ad scabiem aceto. &c. Nisi præcesserit aliud a quo quod sequitur separetur. Nec sane decebat hunc scriptorem, aliam restinguendi crematam Cadmiam rationem docere, priuatimq; ad scabies eius usum cōrāhere, nisi diuersam in diuerso usu restinguendi rationem antea docuisset. Habendæ Plinio hoc loco ingentes gratiæ. Ostendit em̃. 34. uolumine, cap. 10. quibus additis et insertis in integrum restitui locus hic potest. Verba eius sunt, & ut nos credimus a scriptore hoc accepta. Restinguitur uino amineo, quę ad emplastrā præparatur: quæ uero ad psoras, aceto. Vocauitq; ille psoras quas nos scabies cutis. f. asperitate omnes. Nihil itaq; certius hoc loco erit: respondebuntq; sibi omnia, si quis post Cadmiæ costuram legat: restinguitur uino amineo, quæ ad emplastrā præparatur: quæ autem ad scabies, aceto. Fecit id Barbarus ex Plinio acceptum, ut diximus. Verumtamē in gr̃cis pars ea nō legitur: nec nos addere huic scriptori eam uoluimus, satis fore rati locum sig. 34. Volumines legentes in eo etiam monere, quod a principio capitis huius non ideo nobis cum ceteris interpretibus idem: maluisse nos rubiginosum dicere, q̃ eruginosum, quod in scriptore hoc id est. Scimus quidem in metallis aruginem plarumq; esse, ab ære dictam, quæ metallo illo &

humoris alicuius, præsertimq; aceti habitu, quemadmodū non multo post hic describet, fieri cuius in medicina multus est usus, uiridi semper colore. Nouimus etiam hunc scriptorem in ea significationis æstimatione hac uoce plerumq; uti. Veruntamen scientes duos in Cadmia ab antiquis græcorum medicis laudari colores, cinereum, & puniceum: nec posse æruginem quia uiridis sit, cinereo, aut puniceo colore describi ex altera græcæ illius uocis significatione, nam & rubiginem *ῥῶ* græci aliquando dicunt, rubiginosam diximus, in quā uoce puniceus color sit. A rubore enim, rubigo dicta est, & scabries quæ igne semper sit: quorum nullum in æruginē dici poterat, quæ uiret, & humoris alicuius alperginē, non igne conficitur.

De Pompholyge.

CAP. LXXVI.

Pompholyx specie sola, non genere a Spodio distat. Siquidem Spodios nigricat, & plerumq; ponderosior est, palearum, pilorumq; plena: quasi dera sum quiddam, ac detractum ab ærariarum officinarum pauimentis, fornacibusq; uideatur. Pompholyx uero pinguis est, & candida, usq; adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad æris colorem uergens, suppingue. Alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit Pompholyx, quoties in perficiundo æte, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam cumulatius insparserint. Namq; tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē cōit. Cæterum Pompholyx nō ex æris modo materia & fabili industria facitatur, sed ex Cadmia quoq; ad gignendā ipsam eximie profusa. Cuius faciundę ratio hæc est. In domo binis tectis operta, fornax extruitur: iuxta quam mediocris fenestra uersus tabulatum a supernis partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usq; perforetur, ad excipiendam follis narem. Ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. Domunculā altera cōiuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex, Cadmiam particulatim fractā inspargit, a locis supra fornacis caput extructis. Idem negociū obit artificis minister, simulq; carbonēs adiicit, usq; dum indita Cadmiæ copia prorsus absumat. Itaq; egesta suffitu, tenuis pars & leuis materię in summā domū euolat, & parietibus tectisq; adhærescit: constatū inde corpus, inter iniuria erumpentibus aquarū bullis simile prodit: postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Ponderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandū est, ideo q̃ multum terrę collegerit, & spurcicia in aceruacione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri Spodium arbitrantur, de qua ante dictum est. Opinia creditur Cypria, quæ accepto aceto odorem æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore luti horrido: & si fraudem nō experta, flagranti carbonē inferuescit, æreum colorem contrahit. Ante dictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem a nonnullis

D I O S C O R I D I S

- C** adulteratur taurino glutino, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitū fuerit. Quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauari oportet. Ligatam linteo mundo, modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam in labellum demittito, quod imbrem cōtineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita enim limosa pars eius ac dulcis effluet, et omne crassamentum in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dum arenosi nihil fidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, et manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant: & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumoso quod traiectum est & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero refedit, et sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime at tolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectū ut Cadmiam eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. Et ita redditur adstringentior, q̃ aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explorare, purgare, obstruere, & aliquantum exicare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim crustas obducunt. Quod si Spodium torrire libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in patillos: fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluescāt. Neq; ignorandum, ex auro, argēto, plumbocq; fieri Spodium. Verum post Cypriam Plumbea maxime commendatur.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Pompholyge, ac Spodio, cōmuni usu hic agitur: differentia, ut aliqui existimant, q̃ Pōpholyx paratur lotura: Spodium, sius Spodos illota est. Quidam id quod candidum sit, leuissimumq; Pompholygen dixerunt, & esse æris & cadmiæ fauillam, & ut nomen indicat ampullam: qualis est bullantiū aquarū. Spodiū uero nigriore, ponderosiorēq; mixtis scintillis aliq̃ et carbonibus. Optimā e Cypro: p̃pterea Hippo. Melancypriū, quasi atramentū cypriū uocatā inter p̃tānt aliq̃. Nam Possidonius e Cypro tm̃ ære fieri Spodiū existimauit, ut Straboni placet: fieri q̃ liquescentibus Cadmiā ærario lapide leuissimā. Hęc euolās e fornacib. & tectis adh̃rescēs, a fuligine distat cādore: q̃d minus cādidiū ex ea fuerit, imaturę fornacis argumētū est, hoc quā Pōpholygē uocat. Qd̃ uero rubicūdius ex ijs inuenit, acriorē uim habet: exulceratq; adeo ut cū lauat, si attingat oculos, exerceat. Est & mellei coloris Spodos, in qua plurimū æris intelligit: sed q̃dcūq; genus lauādo fit utilius. Habet & i argēti fornacibus Spodos, quā uocat Lauriotin, forrasse quā Illyriotin Hippo. nescio an corrupte. Lauriō certe locus erat in Attica, ubi Argēti lōdi

ne quodā fuisse, ut inquit Pausanias. Vtilissima hæc oculis, quæ fiat i aurarijs. Spodiō & ex plābo fit, eodē modo quo ex are Cypriō mōstrauimus. Fit Pompholyx et ex sola quoq; Cadmia, ut Galenus testatur. Acetius inuentu inquit rara est Pōpholyx, & adulterari facilis. Laudatur uerō non candida, sed quæ subliuet, quæq; carbonibus inspersa, flammā ignis auream uideri faciat.

EX M. VERG. COMM.

P Ræfatus a principio statim hic scriptor, specie solam, genere nullā habere diuersitatem in metallicis Bullam & Cinerulā, promiscuum in medicina monuit utriusq; cum opus erit fore usum: simulq; ueniam dari sibi a legentibus petijt, si mutatis inuicem nominibus his confectio nem, loturamq; & usum toto hoc capite utriusq; docuisset. Quod em̄ in eis differt, color, pondus, & puritas tantum est. Substantia eadē, & uires in utraq; pares: tantūq; abest, ut rei discrimen aliquod antiquitas fecerit: ut Bullam sola lotura differre a Cinerula aliqui testati fuerint. Hic tamē certius rem docens, certas utriusq; notas reddidit. Quæ deinceps ab eo traditæ, repetendæ inuoluerit a nobis modo non sunt; indicantibus præsertim earū etiam nominibus, nō rei, sed partium diuersitatem. Pompholyx em̄, quæ a nobis Bullæ nomine reddita est, Bullarum in aqua similitudine cōcrefcens, eademq; figura quasi clauso intra se spiritu, ut in offensa aqua sit, tumens, indeq; inuento nomine ui flammæ egesta, & hærens ex materia æris, quod leuissimum purissimumq; erat secū derulit. Contra autē Spodion, quā Cinerulam uerdimus, grauiore pondere, sordidioreq; non aliter q̄ cinis extincto igne mixtis carbonum reliquijs subedit. Accessit etiam utriq; color, qui in altera ob eam causam nigricans, in altera candidus, partium itidem, nō substantiæ diuersitatem ostendit. Eoq; pertinet quod in Cinerula hic ait, esse eam ueluti fornacum purgamentū, & quasi quod scopis ueritur. Non aliter q̄ infirmi, & pro re rustica stercoris generibus græci *σπυατίτιν* *σπόρον* uocant, id scilicet, quod undiq; scopis in unū collectum fuerit: quale in purgandis tridinijs, totaq; domo quotidie in certum aliquem conueritur locum. *σπόρον* enim, qua uoce hic usus est, nihil indicat aliud. Quemadmodum & *σπόρον*, siue *σπόρον*, non simpliciter cinerem, sed sordidum, & in quo extinctorum carbonum reliquæ super sint aliquæ. Id enim nōs obseruauimus inter *σπόρον*, & *σπόρον* græcorum discrimen. Neq; hic aliquando *σπυατίτιν* dicitur, dicens aliud, q̄ seruientem cinerem eumq; in quō ardentium adhuc carbonū exiguæ reliquæ sunt intelligi uult. Cognouerunt discrimen hoc latini etiam, si Columellæ credimus lib. 2. capite. 15. de generibus stercoris agenti: in quorum censu prodesse etiam satis ait cinerem, & fauillam: in altero rem notam significans: in altera cineri mixtos carbonēs, & eorum quas diximus reliquias.

De Antispodo.

CAP. LXXVII.

Q V O N I A M Spodos sæpe numero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in Spodij locū suffici possint. Antispoda uocant, quo q; modo sumi debent. Folia itaq; myrti, cum floribus & bacis immaturis, in fictili crudum coniecta, inditoeq; operculo continua foramina habente utrimq; fornacibus, donec siglinum percoquatur. Iterum in fictile aliud crudū transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauātur ad usū. Idem quoq; fit e termitē syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis coroneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis. Item ex moris immaturis, id est, candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, œnanthe, aut molliibus rubi folijs, uel e buxi coma, uel pseudocypero cum flore. Alij ficus in sole antea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinum gluten. Alij succidas lanas asperas, pice, aut melle irrigatas. Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

B A R B R A I C O R O L L.

A Ntispodion est & cinis fici, caprificiq; ac lentisci: e buxi quoq; coma est, pseudo Cypert, & Terebinthi, & Oenanthes.

C

κυανίνος
χαλκός

¶ De Aere usto.

C A P. LXXVIII.

AEs ustum probatur rubrum, quod contritu colore Cinnabarim imitetur. Nigrum uero plus q̄ deceat extustum est. Fit autē e clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis, subperso sulphure, cum sale pari: omnibus uicissim insparsis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale fictili, alij quot dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, urunt, & iterum aut tertio idem efficiunt: postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit. Ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Vitia oculorum emendat. Ex crescentia in carne consumit. Nomas cohibet. Vomitus ciet, cum Hydromelite potum, aut cum melle delinctū, illitumue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater in die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris cremētum, stercusue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecilliolem habet.

B A R B A R I C O R O L L.

AEs ustum, Græci Calchon cecaumenon uocāt: Celsus uero cum Cinerem cy priū uocat, aut Cypriū æs, crematū, aut Spodion cypriā intelligit. Aegyptus collyrii modo tenui in coctulis. Fuligo aeris, siue ut Aetius appellat, ærariorū laborum, Ephestia græce dicitur.

D

Scoriam metallorum, Græci, & Scoriam, & Cibdelin uocant: ut Photioni placet.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinium secutus Barbarus, colorem in cremato ære probauit, qui ad Minij speciem accederet: rubentis quidē, eodemq; aut non dissimili Cinnabari colore fulgentis: non tamen, ut hic paulo post docebit, re & substantia eiusdem: cum alterū ex Hispania, alterū ex Libya quondā afferret: uulgareq; Minium & copiosum, Cinnabari autem exigui & rari esset: & quo tantum in uariandis lineis pictores uterent. Ex eo quoniā in consimili genere poterant Cinnabari & Minij diuerso colore esse, alterūq; profundiore, alterum dilutione rubore uideri, a uocibus scriptoris huius discedere longius ip̄a nolimus. Et quoniā in cremato ære colorem hic probauerat, eundem nos etiam probauimus: nec aliter q̄ hic Cinnabaris colorem in attritu crematū fieri descripsimus. In cuius confectione non est quod miretur aliquis, probare hunc clauos solutarum nauium. Fuit enim aeris quondā largior, q̄ ferri copia: eousq; ut arma etiā quibus ad bellum uterent ex hoc metallo fierent: si græcorū poetis, præsertimq; Homero credimus. Erat in fabrica quotidianus itidem aeris usus: in qua prælatū diu ferro id est, non ob copiam tantū, quæ maior ferri aliquādo fuit, q̄ quia nulla rubigine perit æs, & in quotidiano attritu contumaciū durat. Ea q; est causa, cur hic æreos clauos in nauigijs dixerit. Cur autē ex solutis nauibus portus, q̄ nouos quæri præceperit, aliā habet rationē: quoniā scilicet aptius in eo usu æs illud sit, quod attritu domitū, & consuetudine laboris ueluti mansuefactū erit. Multa em̄ sunt quæ in nouitate sua mihorem, q̄ in uetustate, ob nimias vires, utilitatē habent. Nec aliū de factum fuisse nos credimus, ut uetusti aeris & in clauos iam pridem conformati, multoq; labore edomiti, ad hanc rem usus esset. Poruit etiam ex nauigijs magis, q̄ ex ædificijs quæri: quoniā ex mari, saleq; eius aliquid bonitatis ad hunc usum aeris accreuisset: quod antiquiores illi experti, posteris sua fide recipiendū tradiderunt. Satis cætera in hoc capite patent.

¶ De Flore Aeris.

C A P. LXXIX.

αἰὲρ χαλκός

Flos Aeris, quem nonnulli clauorum ueterum Pseagma, quasi ramentū, noiarunt, optimus est, friabilis, in attritu fuluescens, milij

effigie, breuis, ponderosus, modice splendens, atq; constringens, qui de A
 limatam æris scobem nō recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile de
 prehenditur cum dentiū illisū dilatantur ramenta. Fit aut, cum æs for-
 nacibus fufum, in receptacula delabitur, per cola fistularū ad ea perti-
 nentiū. Circa eas em occupati, sordes expurgantes, aquā clarissimam in-
 fundunt, refrigerare uolentes. Itaq; repētino concretu, ac addensatione,
 expuit, & scatet antedictus flos. Adstringit, & excrementia coercet.
 Offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternū
 obolorū pondere datus, crassum humiorē extrahit. Carnosa narium ui-
 tia absomit. Eruptiones papularum cum uino cohibet. Contra diutur-
 nas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellit. Vuam,
 tonsillasq; reprimi, farina eius cum melle admota.

B A R B A R I C O R O L L.

F Los æris, hoc est, Chalcuanthos, differt a Chalcantho, quod atramentum est futuriū. Dis-
 fert & a Squama, quæ ui atq; ictibus clauis & panibus æreis excutitur: Flos uero ex iisdem ca-
 dis sponte. Fit aut in ærijs officinis, iam fuso ære atq; percocto, additis etiamnū carbonibus,
 paulatimq; accensis. Tum repente uehementiori flatu expuitur æris Pala quædā (ut Plinij uer-
 bis utar) quod Plegma, Floremq; uocāt. Est aut Pala proprie, ut inquit Strabo, purgationis au-
 ri gleba semilibralis: a quo translatus id nomē est & ad alia. Plinius alio loco Palacas in Hispa-
 nia dici massas auri scribit, in puteis repertas, decussis pondere: quas & Palacranas uocant: si-
 cut minutum quod est, Balancē. Democritij chymistæ aphroditæ sperma, hoc est, Veneris se-
 men. Nā & ipsum æs nō alio q̄ Veneris uocabulo pnunciant. Iidem Alcion chalcē, pro æris
 flore accipiunt, hoc est, quasi exumbratū æs interpret. Sunt qui Florē diuersum intelligāt a
 Plegmate, sed ratio faciendū eadem. In utroq; solū quo Plegma excipitur, stratum esse iubent.

De Squama æris.

CAP. LXXX.

S Q V A M A æris excussa clauis cyprio ære fabricatis, crassā quæ
 dem ipsa. Bona est quæ Helitis nominatur. Sed ex malo ære, aut
 candido, uisiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inualidam dam-
 namus, maxime approbantes crassam, ruffam, præsertim si aceti resper-
 su rubiginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, res-
 primentē, & erodentem. Nomas cōercet. Ulcera ad cicatricē perducit.
 Pora ex aqua malsa aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in ca-
 tapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabriciam ab-
 sumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ æris squamæ ex
 purgatæ selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter contur-
 batur, quousq; pessum ierit. Abijcitur quod emerit, & effusa aqua, hæ-
 mina cœlestis hymbris adijcitur, & distenta manu, squama quasi exic-
 canda sit, uehementer confricatur. Dumq; lentorem emittere coeperit,
 aqua sensim ad sex heminas usq; superinfundit, terendo ualide. Squa-
 ma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus
 humor pixide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos.
 Squamæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis effi-
 cax. Inutile quod superest. Lauatur, donec nullam prorsus lenticiam
 excernat, & linteo opertum biduo conuiuiscere sinitur, effusaq; extan-

B

mari

Cte aqua, ubi ficcatum erit, reconditur pixidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt.

B A R B A R I C O R O L L.

SQuama, hoc est, lepis, etiam e ferro in usu est, ex acie, aut mucronibus maxime simili, sed acriore ui, q̃ tubigo. Cyprios clauos, de quibus hic habet mentio, Palladius cuprinos clauos: & cuprinū æs, pro cyprio ære appellat. Aeris inquit Celsus, duæ species sunt: alia tantū æris: alia rubri æris. Veteres ipsum æs rude impoliūtq; dicebant Raudū, siue Rodū: unde porta Romæ, q̃ ærata esset Raudera, et Rauduscula, siue Raudusculana uocaret. Quid si pomi genus in citrea, q̃d Rantiū uulgo dicit, ab æris colore quasi Raudiū uocaris: hoc est, fuluū. Est em̃ fuluū æs, ut inquit Ennius, Qz q̃ & a Neratio fortassis inuētoꝝ, Neratiū dici potuit. Nisi quis non Rantiū, sed Araniū, quasi Arianū, id est, Persicū, a gente uelit appellat. Est enim Aria, ut inquit Hellenicus, & si recte memini, etiā Herodotus, & Plinius, & ceteri, Persica quādā regio. Quid item si malū Arantū, ab Arantia oppido Achaia dictū conſicias: q̃d & pomis ferile scribunt fuisse: a quo effectu, posterī Phliunta noiauerē, ut inquit Stephanus: proinde Lacedæmoniū mēsem, in quo terra fructibus abundat, Phliasion appellat. Accedit, q̃ Herculem mala Hesperidū, Arantiam primū tulisse credunt, auctore Pausania. Sed ueroꝝ, ne quis me alias inuidiæ obnoxii, etiam nimio iuandū rem latinā studio, lapsū prædicet.

E X M. V E R G. C O M M.

Quæ tria ex uno eodemq; ære in medicinæ usu deinceps a scriptore hoc numerata hæc nus fuerunt, æs, ærisq; flos, & Squama, non aliter q̃ de bulla & cinerula non multo ante hic dixit, specie tantū inter se differunt, genere nullā habent differentia. Ex eadem em̃ materia, eosdem fere usus & effectus præstant. Nec aliter de his ueteres tradiderunt, q̃ ut æris partes haberi tria hæc uellent. Longius de his docuit Plinius uolumine. 14. capite. 11. Qui licet aliter a scriptore hoc de his tradere uideatur, re tamen eadem omnia docet. Nec aliud esse discrimen ostendit, q̃ q̃ Squama excutitur iſtibus, flos sponte cadit: alterūq; illud Squamæ genus, quod Stomoma dicunt, subtilius esse, ex summa scilicet lanugine decussum. Est enī græcis Stomoma ferri acies: & uerbum illis *σύνων* aciem in ferro trahere significat: cum in cote ductū, reductūq; acuitur, & acuendo exteriore, a quo euentu quæ subtilissima ex ære detrita est, Squama, Stomoma dicta ab ea gente est: quasi in trahenda acie in cote detrita. Squamā æris proba uis hic, quæ in Cyprijs ærarijs. &c. Damnauit contra, quæ in τοῦ παλίου χαλκοῦ ἢ ἐν τοῦ λευκοῦ de cussa fuisset: non ex malo ære, promiscuoue, ut alij interpretes uerterunt, sed uulgari & uili. Neq; enim malum, promiscuumue æs ea uoce indicatur, sed uulgare, quod omnibus locis inuenitur: ideoq; Cyprio comparatum, nullius, aut exiguae dignitatis & æstimationis. Sequitur ab hoc loco statim in probatione Squamæ huius participium *σύνων*. Quod alter ex interpretibus ad rubiginē retulit: cum tamen iudicio nostro ad Aeruginem, quæ propria æris est, contrahenda uox illa fuerit. Communis enim metallis omnibus rubigo est, quia rubet sic dicta. Quæ autem in ære concreuit, aceti, aut alterius etiam humoris aspergine, aut halitu, ærugo uiret. Quemadmodum in confectione eius mox dicetur.

D

De Squama ex acie decussa. C A P. LXXXI.

ἀνιόλης σόμωμα

Squamæ ex acie, aut mucronibus decussæ, quam uocant Stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad molien- dam alui deiectionem inefficacior est.

B A R B A R I C O R O L L.

Stomoma, genus est Squamæ subtilius, ex summa uidelicet lanugine decussum.

De Aerugine rasa. C A P. LXXXII.

ἰόν ἔρπον

AERUGO rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud consimile uas aceti q̃ acerrimi, ænecum uas, præsertim concameratum, sin minus, planum uersetur: sitq; exterius, nullumq; habeat spiramentū. Exempto uase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die infidens Aerugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspēn-

ditur, ne attingat: & totidem post dies raditur. Aut massulæ æris, aut A
laminæ, uinaceis iam acescentibus conduntur, & simili modo uersan-
tur. Quinetiâ ex delimata æris scobe æruginem facere licet. Necnô e
laminis, quibus bractæ auri conclusæ malleo ducuntur. Si quis eas ace-
to respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tra-
dunt æruginē in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdā nonnihil
æris habentibus, quibus ærugo efflorescit. Adduntq; nōnunq; per ca-
niculæ æstus e quodā specu manare. Sed hoc exiguum, & optimū esse:
illud speluncis effluens, copiosum quidē, & boni coloris, sed uitiosum,
quod lapides multos collegerit. Pluribus aut modis adulterant. Aliq;
pumice, alij marmore, alij atramentō sutorio. Sed deprehēdemus pumi-
cem, aut marmor, pollice sinistrae manus madefacto, & æruginis portis
unculā in alterū atterente. Siquidē eam diffundi constat. Marmoris aut
pumicisq; partes cōeunt non dissipatę, demumq; tractatione crebra &
humoris complexu dealbescunt. Quin et dentiū appressu. Siquidē syn-
cera cedit: leuis, sine asperitate. Atramentū uero sutoriū, igne coargui-
tur. Namq; si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, & feruen-
ti cinere, aut carbonibus incalescat, mutabit colorem. Atramentū suto-
rium rubescit, quod ustum suapte natura talem sortitur colorem.

B A R B A R I C O R O L L

Aerugo rasilis, quā Græci uocant Ion xystron, minus probatur e squamis. Ocyssime con- B
trahit æruginem coronarium æs. Aeruginem maximē Rhodiam adulterant marmore. Depe-
hendit papyro, galla prius macerato. Nigrescit enī statim æruginē illita. Deprehenditur & ui-
su, maligne uirēs. Aerugo æris, a Columella est ubi ænea rubigo dicta sit. A Vitruuio Eruca
nominatur, eadem quæ rasilis a specie uermiculi eius, ut consilio, qualis Rhodo finge-
batur. Ob id & genus alterum æruginis, ut mox liquebit, Scolex appellabatur. Nam & morbus qui
dam arborum, nunc Rubigo, ut Plinius, nunc Aerugo appellatur est, ut Hieronymus, quem
Græci Erythibem, Rhodij Erethibem uocant, a colore, ut nōs Rubiginem; a quo & Robur dictū
sit, quia plurimas huius coloris, quasi uenas habeat.

De Aerugine Scolecia. C A P. LXXXIII.

Aeruginis quam uocant Scoleciam, duo sunt genera. Quædam
fossilis est. Altera facticia. In mortario cyprii æris dimidiā he-
minā aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti cras-
situdinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossilij, translucen-
tis, aut marini q̄palbissimi, solidiq; drachmam unam, aut certe cum ni-
tri pari pondere terito in sole, ætuosissimis diebus, sub sidus caniculę,
donec colore æruginēum, & coaugmēto strigmētōsum fiat. Vbi aut se
in uermiculorū speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris
redditur, si duas parteis urinæ ueteris, cum una aceti adieceris, & alia
quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginem rasilē, quę in apparatu
non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendāt. Quod
genus, ut uitiosum improbatur. Fit & quædam ærugo ab aurificibus,
mortatio & pistillo cyprii æris, cum urina pueri impubis, qua aurū fer-

C ruminant. Antedicta æruginum genera, usto ari correspondent. Sed magis effectū ualent. Sciendum fossilem Scoleciā præstantissimā esse. Derasam sequi. Postremo loco facticiam. Mordacissima tamen est, & magis adstringens. Aurificum autē Aerugo rasæ correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorum cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomās sistunt. Vulnera ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo, cæracq; ad cicatricem perducunt. Callos & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ. Callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ. Ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarū crassiciem, cum melle illitæ. Verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur particulatim fracta, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita. Versaturq; donec se mutet, & colore subcinerefcāt. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata contrahit.

B A R B A R I C O R O L.

Scolecia Aerugo fit & per se rasa, ex ærario lapide quem Chalcithin uocant. Nominatur autem Scolecia, siue Scolex, uel quia se contrahat in uermiculos sponte, uel quia fingatur in eos arte. Aristoteles. In Cypro inquit insula, ærarijs fornacibus, ubi Chalcites lapis pluribus diebus uisus, uermiculi medijs igne quadrupes, & pennati nascuntur, paulo muscis grandibus maiores, qui per ignem ambulant, & saliant quamdiu ibi sunt, uiuentes: cum euasere longius paulo, moriuntur. Pyralides, siue Pyroni nominantur, uel ut in quibusdam Plinianis codicibus, Pyraustæ.

D Aerugo aurificum, hoc est, Santerna, quæ a Græcis Ios Chrysochoon, & Chrysocola dicitur, gluten est & ferrumen auri eius, quod argentosum uocant. Signumq; est, si addita ea, nitescit. Ediuerso ærosus contrahit se, hebetaturq; & difficile annectitur. Fit autem id glutinum præter ea quæ a Dioscoride scribuntur, etiam auro & spuma argenti additis, unaq; contritis. Vtrum uero Santerna hæc, an alterum genus intelligatur a Theophrasto, chytos argyros, hoc est, argentū fusile, quum dicat, & mortario, & pistillo æris terendo confici & aceto, non dum liquet. In Santerna certe sola, qd quidem sciā, mortarium & pistillū ex ære cyprio desyderant, sed cū urina impuberis, non aceto. Inuenio & Argentū mentitum, hoc est, Pseudargyron uocari, qd ex lapide quodam usto fiat Anderis, in Troade: itemq; in Lydia prope Timolum: huic æs addendo mixtura prouenit, Orichalcum a quibusdam appellata, ut Straboni placet. Cæterū Chrysocola dicit & panificij quoddam genus, ut in Tritico docuimus. Santernā raste dictam putē, quasi Xanthernā: quippe cum legamus Aeruginē hanc a Græcis quādoq; dici Xanthefin, a colore flauo: qualis aureus est. Ob id & Latex diuinus ille, tingendo auro chymistis tantopere quæsitus, plerūq; Ios Xystos, & Aerugo nominatur.

Aerugo ferri, hoc est, rubigo, deraditur humido ferro, clauis ueteribus. Hac Telephum Achilles sanasse proditur: qd id quidam ex ærea cuspidē factū interpretantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Monstrauit Viétruius suæ Architecturæ libro septimo cum de coloribus ageret, Aeruginis unam tantum confessionem, eam scilicet quæ secunda huic scriptori est: suntq; eius post conficiendæ Cerusæ disciplinam hæc uerba. Eadem ratione lamellas æreas collocantes efficiunt Aeruginem, quæ Eruca appellatur. &c. Vocatq; insecti, & uermis nomine Erucam, quā cæteri omnes Aeruginem dixerūt. Nec nos scimus, qd integra in eo scriptore ea uox sit. Aliqui quoniā insecti, quod Græci Campem dicūt, ea appellatio est, Vermicularem illā Aeruginem ex similitudine ab antiquis Romanis dictā eo nomine fuisse existimāt: nos tamē, quoniā quam Viétruius Erucam appellari ait, a uermiculari distat, nec aliquid illi simile, aut cōmune habet, uerum ut diximus, secundum huic scriptori genus facit, confirmare id non audemus: du-

bitamusq; in Viſtriuo male Erucam forſitan legi: ueramq; ſeſtionem, æneam, aut æream eſſe: quoniam latini ſcriptores aliqui æruginem nominantes, æneam, aut æream ſemper addiderūt: ut ex quo metallo æruginem dicerent, certius indicarent. Neq; ab re: quando ut in græcis *ἰὸς κομῆς* munis ad æruginem & rubiginem uox eſt: ſic forte in latinis aliquādo fuerit, promiſcueq; ærugo in cunctis metallis diceretur, & ſi priuātum in ære ea uox in uſu poſtea eſſe tantum coeperit. Conſiſimus hæc, non decernimus: eamq; ob cauſam poterunt arbitrio ſuo de his legentes ſeritare. Quo loco deinde hic ſcriptor ait, fieri itidem æruginem ex delinata æris ſcobe, laminisue illis *ἢτε περιχρῆμα τὰ χρῆσθαι πλάκα διακρίται*, &c. nosq; uertimus, quibus incluſa aurea coronarum folia extenduntur: adieciſus nos coronas, quæ nullæ tamē in Dioſc. ſunt: propterea, q̄ de his neceſſario agebatur: nec poterant aurea folia illa aliter, q̄ in coronis intelligi. Quod græci aliquot iudicant de coronis agentes: breuiſſimeq; Plinius dicens. Ocyſſime uero contrahit coronarium æs æruginem: illud intelligens, quod in extendendis ex auro bratteolis in foliorum figuram, in uſu ea tempeſtate eſſet. Quod nunc alia ratione ſit. Vitium non multo poſt ſignauimus, quo loco ſcilicet de deprehendendo rariſis æruginiſis adulterio agitur. Male em ſequax illic ſermo eſt: nec ſatis (alioquin certa res) patet. Docet enim pumice, aut niarmore adulteratam æruginem humore & attritu deprehendi: quorum altero deſluit, altero albeſcit ærugo. Quod in ſincera nō ſit, Numeratur deinde inter alias uermicularis æruginis uires a Dioſc. *ἀδερῶς ἄνιμα*, quod eſt, lachrymas ciere, trahere & ducere: idq; tam manifeſte, ut in ſcriptore hoc intelligi alter res nequeat. Neſcimus tñ nos, q̄ integer locus ille ſit: non tam quia Plinius de grugine rariſi, cui uermicularis non adeo diſſimilis eſt, lib. 34. cap. 11. ait. Vis eius collyrijs oculorū aptiſſima, & delachrymationibus mordendo ꝑficiens: q̄ quia in oculorum medicina compeſcuntur, nō pritantur delachrymationes. Erit id medicis diligentius animaduertendum.

De Rubigine ferri. CAP. LXXXIII.
Rvbigo ferri reſtingit. Siſtit ſceminarum profluuiā admota. *ἰὸς οὐδὺς*
 Potuq; præſtat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus ſacris, & popularum eruptionibus medetur. Perq; utilis ad ſcabricias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condylomatis prodeſt. Gingiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replēt. Vinum aquaue, in qua cādens ferrum ſit reſtinctum, potu cœliacis, dyſentericis, lienosis, cholera laborantibus, & diſſolutis ſtomacho auxiliatur.

BARBARI COROLL.
Ferrum Græce ſideros appellatur: candens hoc, niſi daretur ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile eſt tundendo, neq; ante q̄ albeſcere incipiat aceto, & alumine illitū ſit æri ſimile. A rubigine uindicatur Ceruſſa, & Gypſo, et Pice liquida. Hæc eſt temperatura a Græcis Antipathia diſta. Ferunt quidam & religione quadam id fieri.

EX M. VERG. COMM.
Maluimus in Ferro ob colorem Rubiginem, q̄ æruginem dicere, ob eas quas non multo ante tradidimus cauſas. Alloquin idem uidoſus in cunctis metallis euentus eſt, communiq; uoce a græcis omnium metallorum lauorū contraria ſcabricies uocata eſt. *ἰὸς* enim in cunctis metallis uocant, quod uetuſtate, humore, ceſſationeue aſperitatis & mali coloris illis accreuit. Habent etiam *ἰρῶς* qua rubiginem indicent: ſed ut nos obſeruauimus, in frugibus potius q̄ in metallis. Legentes illud etiam in capite hoc monemus, uidiſſe nos in græcis, nec negligendæ ſi dei codicibus, in quibus nulla erat extrema eius pars illa, qua ſubter demergi aqua, uino ue cādens igne ferrum. &c. Nos tamen ut erat ſeruauimus, ex quotidiano rei uſu, & ex eo quod Celſus monuit lib. 4. capite. 9. inter lienoforum remedia: pro quibus ait, & poſt cibum aqua a ferario fabro petitur, in qua candens ferrum ſubinde tinctum ſit.

De Stercore ferri. CAP. XXXV.
STERCVS ferri, quam Scoriam uocant, eadem poteſt quæ rubigo, ſed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitula- *ἰρῶς οὐδὺς*
 tur.

Metallorum spurciciam ueteres græci Scoriam uocauerunt: Romani, autore Celfo, lib. 5. capite, 5. Recrementum eam dixerunt. Neq; in metallis modo, uerum in multis alijs recrementis uoce usi sunt: ut primo uolumine in Crocomagmate dictū a nobis etiam est. Græci in metallis priuatim Scoriam suam seruauerunt.

¶ De Plumbo eloto. CAP. LXXXVI.

Lotura Plumbi sic fit. In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & succi modo crassescat, aut cœnosa reddatur. Linteolo deinde colato, aquam infundens: quo facilius quidquid est resolutum incerni possit. Hoc facito usq; dum satis habuisse uidearis. Vbi confederit, priorem aquam effundens, nouamq; adijciens, ut Cadmiam lauat, donec nulla extet nigricia. Postea in pastillos cogens reponito. Quidā scobem mundi Plumbi lima quæsitam, mortario lapideo, pistilloq; terunt: aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. Mox ubi crassamentum pessum icrit, colligunt in pastillos. Nam tritum uehementer, cerussæ simile redditur. Alij elimatē scobi modicam plumbaginem adijciunt. Affirmantes ita elotum Plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, obstruere, mollire, explere caua. Sistere oculorum fluctiones, & ulcerum excrementa. Sanguinem supprimit. Prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas ex rosaceo. Item ad ea quæ ægre cicatricem ducunt. Et in totum spodij effectus præbet. Nisi q̄ non obducit crustas. Integrum Plumbum affricu, marini scorpionis, draconisq; plagis auxiliatur.

EX M. VERG. COMM.

Loturam Plumbi Plinius etiam inter latinos, 34. uolumine, cap. 18. adeo similem huic scriptori docet, ut alicui decreti potius interpres q̄ sui autor uideri possit. Nisi aliqua addidisset, quibus non uariari rem, sed certius & aptius tractari aliquis credat. Quale statim est quod in colescitur, coelestem exigi aquam: quæ in plumbeum mortarium coniicienda erit, ut plumbeo pistillo circumacta, mutuo mortarij & pistilli attritu, plumbi substantia nigrescat & crassescat. Quod duo tantum ille dixit, non ut cæteri interpretes addiderūt, donec succi modo crassescat, aut cœnosa reddatur: non animaduertentes quod a Dioscoride dicitur, unum tantum esse *ἓν γίνεται ἰνὸς αὐτοῦ*, id est, in linum crassescat: quæ uero sequuntur, *ἢ χυλῶδες ἢ πικρῶδες*, glossemata & interpretationes illius fuisse, Diosc. codicibus ab aliquo adiectas, dum uult certius indicare quid *ἰνὸς αὐτοῦ* sit: quæ deinde ab imperitis librarijs in Diosc. coaluerint. Idem enim omnes significant: nec Plinius ut diximus, aliud q̄, donec crassescat, inquit. Quale etiam non multo post quo loco hic ait. Quidam purum plumbum lima deterentes in lapideo mortario, lapideo pistillo terunt, addidit ille, Thebaico, lapideo. s. mortario: sed ex ea gente lapide, ex qua ad usum medicinæ mortaria, ut idem Plinius testatur, præcipue probabantur. Quod & si non multifaciendū forte alicui uideatur, non tamen inutile penitus nouisse fuerit. Quemadmodum maiorem diligentiam exigit, qui statim in Diosc. sequitur male sequax, nec certo sensu locus: in quo spatium, & in spacio uisū nota relictū a nobis est. Cæteri quod uerisimile erat, & rei necessitatem secuti, locum iudicio suo magis q̄ ex uocibus quæ illic modo legantur expleuerunt. Quod poterunt græca intelligentes uidere. Nobis non uisum est alienis nostra miscere.

¶ De Plumbo usto. CAP. LXXXVII.

Ritur Plumbum sic. Super tenuissimas Plumbi laminas, fistili nouo inditas, sulphur inspargito, additisq; rursus laminis,

interiecto semper sulphure, usq̃dum uas expleueris, succendito. Flagra te autem Plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; nonustum hæserit. Tum demum obstructis naribus, eximito. Alioquin halitus Plumbi noxius sentitur. Aut elimatam scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes operculum, dato exili spiramento urunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne uruntur, & rudicula ferrea continue mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio: & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis placet nobis prima. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores;

B A R B A R I C O R O L L.

Plumbi halitus combusti, canes ocyslime interficit, sicut omnium metallorum muscas, & culices: quobrem non sunt ea tedia in metallis, Plumbum crematum, cui cerussa sit admixta pari portione, aut hordeum, Spodio cyprio a medicis præfertur: Retosum Plumbum est, quando uocetur a chymistis Helcysma. Laminis Plumbi ad lumborum renumq; partes adaligatis, somnia Veneris inhiberi prædicant: quod & Caluus orator, & Franciscus Barbarus auus meus fecere. Athletas Galenus eo remedio uti solitos affirmat. Plumbum græci Molibdon uocant. Multum aeris in Plumbo esse argumentum est, quod in statu is aspicietur. Plumbum qd pedes earum lapidibus ferruminat, & annectit, ita plerumq; intumescit, ut ex ijs lapidibus crystalli modo pendeant uerrucæ. Multa Plumbi genera connumerant chymistæ græci. Marinum sordet, & asperum est, Sabyesum, & Dalmatense niter, ac molle dicitur. In Sardiano teneritas, & aerofitas aspicietur.

E X M. V E R G. C O M M.

Er̃it opere precium certior adhuc Plumbi cocturam nouisse cupientibus, Plinium. 34. uo lumine, cap. 18. audire. Multa enim quæ desyderari posse nunc uidentur, certius ab eo traduntur. Qualia sunt, cum sulphuri quod Plumbilamellis inspergendum est, minutum adijcit: iuberetq; trito sulphure ad eam rem uti: & cum, non naribus tantum oclusis Plumbi cinerem tolli, sed spiritus foraminibus: ut os etiam complecteretur, per quod respiratione poterat eadem contrahi noxa. Et cum in fornacem coniectum fictile, in quo Plumbi delimata scobs erit, tandem coqui uult, donec percoquatur figlinum. Et cum ferro misceri præcipit, præter ferrum, ferulaceis rudibus idem fieri etiam indicans. Nec minus cum cerussam, aut hordea pro sulphure inspergenda pari pondere cum plumbo sumi monet. Multaq; alia eodem modo docet, quibus poterit coctura Plumbi certius tractari.

¶ De Recremento Plumbi. C A P. LXXXVIII.

Recrementum Plumbi, quod Scoriam uocant, optimum est desum, fractu contumax, cerussam plane representans, nihil plumbofi habens, quod ad mali colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa a quæ parte, quæ luteum colorem duxit. Idq; sæpius, dum recrementum absumatur. Dein quod subsidit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

E X M. V E R G. C O M M.

Monstrante id Celsi Romani sermonis candido autore, græcorum Scoriam Recrementum diximus. Locus in eo est quinto suæ medicinæ libro capite. 18. cum ait. Plumbi recrementum Scoriam molibdu græci uocant. Quid autem in metallis scoria & recrementum sit, satis non multo ante in Ferro dictum a nobis fuit. Plinius eodem quo in coctura plumbi diximus loco

A

Pli. li. 34. ca. 18

B

Βρωμία καὶ Σκόριον

C de Scoria, sed angustius ꝑ hic xgit.

modi Scoriae
dicitur

¶ De Molibdoide lapide. CAP. LXXXIX.
Molibdoides lapis a plumbi similitudine dictus. Corresponden-
tem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

BARBARI COROLL.
Lapis plumbarius, hoc est, Molibdoides, differt a Molibdœna, hoc est, Plumbagine, ut statim
constabit.

stimmi

¶ De Stibio. CAP. XC.
Stimmi optimum quod splendissimum est, modoque nitedularum
Semicat, con fractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabi-
le, quod Stibi appellant, alij Platyophthalmion, alij Larbason, alij Gy-
næcion, alij Chalcedonion. Vis eius adstringere, obstruere, refrigerare,
excrecentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes et
ulcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri membrana
profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est.
Priuatim ambusta igni, in crustas erumpere non patitur, cum adipe re-
centi illitum. Crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cæ-
ra & exigua cerussa. Torretur adipe circumlitum & carbonibus obru-
tum, donec carbunculetur adeps. Exemptumque restinguit mulieris la-
cte, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus suc-
censis efflatum, quoad flagret. Si enim paulo magis concremetur, plum-
bum fit. Lauatur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum
eluant.

Pli. li. 33. ca. 6.

D

BARBARI COROLL.
Stimmi, nos Stibium, & Stibi dicimus, in argenti metallis inuenitur, spumæ lapidis candidæ
nitentisque, non tamen translucens. Aliqui Alabastrum uocant, Alabandum, & Alabandi-
cum Aetius. Duo eius genera, Mas horridior, scabriorque, & minus ponderosus, minusque radi-
ans, & arenosior scæmina, quam magis probant: nitet friabilis scissurisque, non globis dehiscens:
Platyophthalmion uocatur, quia dilatat oculos. Gynæcion, quia mulieribus obseruiat, cilia tin-
gentibus, semiorbesque pingentibus. Vnde scitum illud, geometriam exercere scæminas in ci-
lio, præsertim in Hispania, Hippocrates certe Stibium significat, ut Galeno placet: aut crustas
in eo inuentas, quæ Tetragonum in medicina nominat. Democritus Stibium nisi locis distin-
guit, Italicum, & Chalcidonium prodendo. Quidam non adipe utuntur coquentes, sed fumo
bubulo. Habetur & Stimmi cognomento Regis Alexandri: sed cõpositio medicamenti ea est ad
oculos. Rhyadas, hoc est, qui delachrymationem arcere non possunt, quoniam per maxillas defluat.

EX M. VERG. COMM.

Stibium hoc est, quod in medicinæ usum a ueteribus inuentum, corruptis moribus paula-
tim ad formæ lenocinium concessit: cum natiuo decore non contentæ mulieres, ad fucum &
amoris illecebras abuti eo inceperunt. Auditur pro muliebri fucō ea uox aliquando in sacris
hebræorum literis, cum præcipitur, ne subio depinxerit aliquis oculos suos. Quam uocem igno-
rantes aliqui, a scæbe, quæ huic scriptori herba est, Stibium dici & fieri crediderunt: cum tamen
in Plinio, & Celso nihil aque notum sit: tradideritque Plinius. 33. uolumine, cap. 6. principalem il-
li usum circa oculos esse: ideoque Platyophthalmion uocari, quoniam eos dilatat, eorumque fluctu-
ones & lippitudines inhibeat. Et quoniam in cura decoris & formæ eo mulieres utebantur, γυναικῶν, id est, muliebri etiam dici: & si adiectiuo illi potuisse quondam coniungi substantiuum
aliquod nomen, suspicari aliquis possit: Verbi causa, fucū, pigmentum uel, aut simile aliud quod-
piam. Possunt desiderari alia etiam, quæ multa Plinius quo diximus loco longius tradit, uo-
lentibus in eo scriptore cognoscenda.

De Molibdena, siue Plumbagine.

CAP. XCI.

A

Molibdena optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice splendens, cum teritur ruffa. Cocta cum oleo iocineris colore trahit. Vinosa est quæ ærem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa non sit, aut recementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ Liparas uocant, atq; emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

BARBARI COROLL.

Molibdena, hoc est, Plumbago, quam & Galenam uocamus, communis est plumbi, & argenti uena. Commendantur friabiles, & modice ponderosæ. Quæ sint fossiles, metallicas appellant. Laudatissimæ quæ in Zephyrio fiant. Sunt qui Molibdenam inter spumas argenti collocent. Fossilis Molibdena est, & ad uicem Ergasteriam uocatum, inter Cyzicum, & Pergamum octo & quinquaginta millibus a Pergamo distantem. Nominatur & Molibdena, id est, Plumbago herba Plinio, contra serpentes, etiam in aruo, folio lapathi, crassa radice, hispida: quæ commanducata, si oculis subinde religetur, Plumbum, quod est, genus uitij, ex oculis tollit.

EX M. VERG. COMM.

Galenam bis terue trigesimo tertio & quarto suæ historiæ uoluminibus græcorum, metallicam Molybdenam Plinius uocauit: non tam ut a Molybdena Plumbagineq; sui generis herba, quam, eiusdem historiæ uolumine, cap. ii. priuatim Plumbaginem dixerat, alia appellatio ne feceretur: quia scribente eo suam historiæ, hæc erat priuatim metallicæ Plumbaginis appellatio, ab Hispaniæ Galesia, ut credimus, facta, in qua celeberrimæ quondam metallorum ferre omnium fodinæ fuerunt. Quæ quoniam nostra ætate nulla est, nec habet ea uox aliquā nunc significationis æstimationem, impune, & sine inuidia relicta a nobis fuit: præsertim in re quæ ex substantia sua certius indicanda erat. Plumbago ob eam causam Molybdena hæc dicta: & ne cū herba misceretur, ex metallo nota illi adiecta est. Herbam quo diximus loco Plinius manifeste Plumbaginem uocauit: causamq; addidit: quoniam si commanducata oculis subinde religetur, Plumbum quod est in ea parte uitij genus, tollat. Metallum toto hoc capite Diosc. nihil simile commune cum herba habens, quæ in Plumbi nomen & honorem ex usu tantum recepta est: id autem ex plumbi substantia iustius Plumbaginis nomen inuenit. Gigni hanc ex auro & argento hic scriptor ait: quale autem id sit Plinius ostendit, adherescere dicens argenti & auri fornacibus. Ostendit eisdem plumbi uenam esse Plumbaginem: multaq; alia, quæ nos breuitati consulescentes, relinquimus in eo scriptore nouisse ea uolentibus exposita. Fit quod nouerunt metallici, Plumbago alterius metalli, argentiq; præsertim coctura: quodq; excretum ex his plumbosum fuerit, Plumbago ueteribus fuit. Verumtamen fossilis eadem quondam inueniebatur ad Coryci, ut nos uertimus, Sebastiam, in Asia tunc notissimam regionem: cui Corycum hic adiecit, ut a reliquis quæ diuersis regionibus Sebastię urbes & oppida tunc audiebantur, separaret. Fuit enim frequens id quondam nomen: numerabaturq; in Armenia Sebeste ciuitas, numerabatur in Iudæa, numerabantur & alijs locis aliæ: omnes in Romanorum Cæsarium gratiam sic dictæ. Quas enim Augustas Germania, & Hispania nominauerunt, eas græci Sebastias, & Sebastias dixerunt. Est enim Sebaston græcis idem quod Romanis Augustum. Intelligitq; hic scriptor κατά τὴν ἐν Ἰνδίας κούρην ἱερὴν κούρην dicens, Coryci Chersonesum hoc nomine quodam in Asia sic appellatam.

De Recremento argenti. CAP. XCII.

Recrementum argenti, quod Scoriām uocāt, aut Helcysma, aut Encauma, molibdenæ uim habet. Quare emplastris quæ phlegmas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, utpote

Gg iij

molibdena

Pli. li. 25. ca. ii.

B

τὸν ἀργύρου
ἐκρίμα

C te cum adstringat, extrahatq;.

E X M. V E R G. C O M M.

Coniunctum natalibus plumbagini argenti recrementum est: ideoq; paulominus q̄ cōiuncta historia a Diosc. docet. Fit em̄ ex argento utrūq;. In scorie metallicorūq; recremento: omnium genere, solum argenti recrementum priuatim Helcysma grecis dictum est. Testatur id Plinius. 33. uo lumine, cap. 6. his uerbis. Scoriam in argento greci uocant Helcysma. Testantur idem græcilla tunicę omnes: nec aliunde q̄ ab extrahendi ui quam habet, factum illi nomen est.

De Spuma argenti. C A P. .X C I I I.

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam Molibdiū uocant, in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat. Altera ex argento. Tertia ex Plumbo. Probatissima est Attica. Secunda Hispaniensis. Has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est, Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. Plurima enim hisce locis e flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, Chrysitis appellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, Argyritis. Quæ ex argento, Calabritis, Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excreſcentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur Argenti Spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium, ita accensa follibus. Abstergitur insidens spurcicia, & reconditur. Aliqui quater aceto, aut uino restinguentes, iterum urunt & eadem prosequuti, reponunt. Lauat ut cadmia: ut Argyritidi nominatę, aut si desyderet, alteri cador detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, choeniceis atticę mensura, fictili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quatuor sextarijs, priuatimq; pugillo hordei, linteolo raro auribus uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. Triticum abiicitur. Spuma argenti uehementer manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq; in thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec dissoluatur. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperī infusa calida aqua sinitur. Mane colis excernitur. Alia infunditur, atq; ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas Spumę argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter in die teritur, & addita aqua excolatur. Cumque inalbuerit, calida infunditur, dum nullam prorsus falsedinem respiciat. Demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina Spumę Argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur. Aqua infunditur, ita ut superemineat. Mouetur quotidie mane & uesperī, aquaq; superinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit triginta diebus. Namq; nisi moueatur, crassescit usq; in duricię testę. Post hæc effusa leniter muria, in thebaico mortario Spuma argenti teritur: cōiectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsedinis indicium præbeat. Deinde quod

ex argenti Spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij Spumam argenti in fabarum magnitudines contractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquant, dum uiscus eliquescat, exemptamq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram unam, & Spumæ argenti tantundem in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sumite quantamuis Argenti Spumam, ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ fuerint, lanæq; dealbuerit, exemptam Argenti Spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito; cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens. Eadem tertio quæ supra, facito. In summa, tantisper dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortaeium, ad singulas salis fossicij libras adijcito octogenas Spumæ Argenti drachmas atticas, & terito, intermittensq; nitri q; albißimi cum aqua diuisi, drachmas quadraginta septem indito. Iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. Vicissim eadem prosequere, dum pura aqua dulciscq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum foeditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

BARBARI COROLL.

Spuma argenti, hoc est, Lithargyros, distat a Scoria, quo a fæce spuma, Lithargyros, purgantissimæ materiæ usus est, Scoria purgatæ. Tria Spumæ huius gēna nostri habent. Chrysitin: quæ fit ex ipsa uena, & est optima. Secundam Argyrin ex argento. Tertiā Molibditin, plumbi ipsius cufura, quæ fit puteolis: & plerūq; omnes hi colores, in eisdem tubulis inueniuntur. Quiddam duo genera eius nouere, quæ uocant Stelerythida, & Peumnen, tertium Molibdænā: de qua diximus. Omnis autē Spuma, fit ex cocta sua materia, ex superiore catino defluens in inferiorem: eo sublata uerruculis ferreis in ipsa flamma conuoluitur uerruculo, ut fit modici ponderis. Est autē, ut ex ipso nomine intelligi potest, seruefcentis, & futuræ materiæ Spuma. flet Argylolithos a Lithargyro, ut in lapide Selenite diximus.

Pli. li. 33. ca. 6.

EX M. VERG. COMM.

Operosa græcis, ut uidetur Lithargyri sui confectio fuit: licetq; præter argentū ex plumbo etiā fieret, a meliore tamē metallo nomen seruauit. Compositaq; ex argento & lapide appellatione, ex qua præcipue fieret, substantiā græci indicauerunt, Lapidem, uenam eius metalli intelligentes: quæ conflata igne, ut in coctura omni sit, eam ueluti Spumā redderet. Latini cocturæ eius euentū, & quod ex ea fieret contemplati, eiusdem metalli seruato nomine, Spumam argenti uocauerunt. Fuitq; non Plinio tantū, sed cunctis alijs Romani sermonis primis auctoribus, in indicanda re hac propria & quotidiana ea uox. Nec dubitandum alicui est, non esse latini argenti Spumam, quæ græcis Lithargyros est. Vnusq; satis in ostendenda re Plinius erit, qui: suæ historiæ uolumine, capite, s. omnem Spumæ huius confectionem, discrimina, appellationes, cocturam, loturamq; & usum similiter huic docuit, Argenti Spumam semper appellans. Eritq; sciporem eum legēbus, in tota hac re non parū operæ precium. Multa enim angustius ab hoc scriptore dicta certius audient: & ex his quæ aliter ab eo traduntur, suspicari in Dioscoride male forsitan legi aliqua poterunt.

C

transiit

Cerussa fit hoc modo. Infuso in urseum oris lati, aut fictile labellū q̄pacerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato. Crassamentumq; transfundito. Debet quoq; siccare in sole, mox trusatili mola teri, alioquin tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq;. Vicissim eadem tertio, quartoq; facienda. Melior quæ primo cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec defunt qui ligneam rudem in medio uase appendant, & supra cratem plumbum imponant, ita ut acetum non contingat, inditocq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies aliquot, laxato obturamento uisunt. Cumq; resoluta materia fuerit, reliqua ut supra diximus exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus obeundum est. Ita enim candida atq; efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urseis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis. Ascendēs enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone. Proximā Puteolis. Torref hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maxime attico, tritam Cerussam imposito, & assidue uersato. Cumq; cinerum colorē traxit, eximēs refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus. Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec similis sandarachæ fiat. Extractaq; ad usum ministratur. Quæ uero ita parata est, Sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur Cerussa cadmiæ modo. Vis ei adstringere, occludere, emollire & explorare. Insuper excrescentia reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur cæratīs & emplastris quæ liparæ uocantur, pastillisq;. Est autem lctalis eius potus.

D

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 34. ca. 18.

Cerussa, hoc est, Psymithion, colos est e candidis. Fuit & terra per se in Theodoti fundo Smyrnæ, ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra Melina differendum nobis est. Nunc omnis Cerussa ex plumbo & aceto fit. Sandyx uero ex Cerussa, si torreatur æqua portione rubrica admixta. Q̄q; Virgilius herbam uidetur intellexisse uersu illo, Sponte sua Sandyx, pascentes uestit agnos. Si Plinio, et Seruio grāmatico credamus, qui herbā dicit esse Sandycem, ex qua Sandycinus color fiat, Quidam pro colore ipso acceptā a poëta Sandycem existimant. Preciū Sandycis in libras asses bini, & semis, hoc est, dimidiū eius quod Sandarachæ. Paulus Sandycē, et Siricon, & Sericon uocari scribit. Syricon Aetius, & Plinius: hinc hodieq; Mauritanī Sarcon eam nominant, Syricū inquit Plinius, fasticius est colos, ex Sinopide ac Sandyce mixtis, quo Miniū sublinis, adulteraturq;. Nam Scyricū, aliud genus est, ut in Ceruleo notauimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Dant gentibus Cerussam plumbariæ officinæ. Confiuntq; eam huic scriptori eodē modo Plinius & Victruuius; alter historiæ naturalis, 34. uolumine, capite, 18. alter suæ architecturæ, 7. cōmentario, Laudantq; ambo, & cunctis alijs præferunt Rhodiam; non tamen bonita-

tis eius censum per gentes ultra faciūt. Hic diligentior, & humanæ salutis certius, & ex professo consulens, post Rhodiam Corinthiam & Lacedæmoniam, & ab his quæ Campaniæ Dicaearchia consiciebat, numerauit. Nec aliquid legentibus in Cerussæ confectione desiderandū reliquit, quæ dierum numerū, quo operculatum & circumlitū uas illud dimitendum sit. In prima si quidem confectione, donec solutū fuerit plumbum. In secunda, si *ἡμερῶν ἕκκατοιστον*. &c. Quæ partem deficiente dierū numero, post aliquot dies, nos uertimus. Poruit quidem numerus ille huic scriptori librariorum incuria perijisse. Verumtamen Vitruuius etiā nullo temporis certo decreto spacio (post certū enim tempus tantū ait) quæ a Dioscoride incerta relinquuntur confirmasse uidetur: effectū tempus id, cum solutū fuerit plumbū. Plinius rem certius tractans, his uerbis rem docet. Fit & alio modo, addito in urceos aceti plumbo obturatos per decem dies. Credimusque nos, & paulominus quæ pro comperto testamur, diebus scriptoris huius adhuc endum esse denarium Plinij numerum. Inconcinuus enim, & scriptore hoc indignus sermonis ductus ille est. Neque enim si *ἡμερῶν* aliud, quæ post dies, significat. Quæque a nobis, & ab alijs definiti numeri uox, aliquot, addita est, ad concinniorē sensum, & maiorem rei certitudinem addita est. Quemadmodum a principio capitis etiam, cum diximus (uentriculosi id uasis genus est) græcorum Gastram certius indicantes, & uasis in medio tumentis formam ostendentes, quæ olearii urcei nostra ætate passim uidentur. Quod Plinius intelligēs, urceos in hoc ipso usu sæpe appellauit. Quæ deinde hic *μακροδύκην πλινθον* imponendam uasis ori dixit, Barbarus cōmunem eius uocis æstimationem secutus, laterem plumbeum imponi iussit. Alter aptius, laminam plumbeam. Nos tegulam, cetiore adhuc, ut credimus similitudine, & græcæ uocis seruata significatione. Siquidem *πλινθον* appellatione laterem quidem plæruncque, aliquando tamen omnē in ædificio necessariam siglinam, lateres scilicet, imbrices, regulas, & si qua in hoc genere alia sunt antiquiores Græci uocauerunt: & ex tegularum similitudine hic plumbeam Plinthus dixit uasi huic superponendam esse, cuius patentius os lateris unius latitudine totū regi non poterit. Quinetiam in columnis architecti Plinthus nominauerunt, quod in earum basi spiris subiacet. Utque in superiore capitulo Abacus, sic in inferiore basi Plinthus est, exæquata latitudine ueluti tabula. Sunt & alia his similia in reliquo capite, quæ nobis & alijs eandem non sunt, legentium diligentia & censura relicta.

De Chrysocolle.

CAP. XCV.

CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ simillime reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. Quo in genere præfertur pura. Damnatur quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa aqua, mortario ex passa manu ad pilam uehemēter fricato, & statim quæ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursus terito. Hæc uicissim prosequere, donec pura, syncæracque spectetur. Dein siccato in sole, & ad usum recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos Chrysocollæ ad purgandas cicatrices. Excresecientem carnem coërcet. Adstringit, purgat, exalfacit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

BARBARI COROLL.

Chrysocolle, humor est in puteorum scrobibus, per uenā auri canalientis defluens, crassescens limo rigoribus hybernis, usque in duriciā pumicis. Laudatiorē eandem in ærarijs metallis, & proximā in argentiarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plumbarijs, utilior etiam auraria. Macedonicam Democritus æris similem ærugini describit. In omnibus autem his metallis fit, & cura multum infra naturalem illam, immixtis in uenam aquis leuiter hyeme tota, usque in Iunium mensem: dein siccatis Iunio, & Iulio: ut plane intelligatur nihil aliud Chrysocolle, quæ uena putris. Natiuam duriciā maxime distinguit, Vuam uocant: & tamen illa quoque herbā quam Luteam appellant, tingitur. Natiua est, quæ lino, lanæue ad succum bibendum tundi-

A

B

Χρυσocolλη

Pli. li. 33. c. 35.

Cur in pila: deinde tenui cribro cernit: postea molitur. Demū tenuius sic cribratū, quicquid non transiit, repetit in pila: & iterū molitur: puluis semper in catinis digerit, ex aceto macerandus, ut omnis duricia soluat, acursus rundi, dein lauat in concis, siccaturq;. Tum tingit Alumine fissili & herba supradicta, pingiturq; anteq; pingat, nisi rapiat colorem. Addunt & Scytanum, & Turbythū. Ita uocant medicamenta forbere cogentia. Cum tinxere pictores, Tursobolenta uocat, Medici Accessin, quae non sit tincta. Duo eius genera: pictoribus lutea, quae seruat in lomenta: & liquide, globulis sudore resolutis. Vtrūq; in Cypro fit. Alij tribus eam gñibus distinguunt. Asperam, quae taxat in libras septem. Mediā, quae denarijs quinque. Attritam, quā & Herbaceā uocant, quae tredecim. Luteam porro dictā putant, ab herba cognomine, a qua etiā adulterat. Et eū Ceruleo uiridiue subtilā, & pro Chryfocolia inducūt, uilissimi gñis, fallacissimiq;. Creta aestimat sestertijs in libras. Nouitius est & anularius, sed candidus, quo muliebres picturae illuminant ex Creta, & ipse admixtus uitreis gēmis ex uulgi annulis, unde & nomen. Chryfocollamin Hispania copiosissimā haberi narrāt. Sublinunt aut arenosam, priusq; inducant atramētō, & paretonio. Hae sunt tenacia eius, & colore blanda. Paretoniū quoniā est natura pinguis simū, & propter leuorē tenacissimū, atramētō inspergit: ne paretonij candor pallorem Chryfocolae afferat. Strauit Chryfocolia spectaculis circi arenā princeps Nero.

E X M. V E R G. C O M M.

DVplex antiquis Chryfocolia fuit, si Plinio in latius, in graecis uero eius gñis medicis credendū est: Altera, quae in cunctis fere metallis, laudatior tamē in aerarijs inueniret. Altera, quae ut graecorum scriptores docent, rubro aere, & impubis pueri urina: ut autem Plinius monuit, Cypria aerugine, & eiusdem pueri urina addito nitro temperaretur. Hanc aurū operibus inducentes, agglutinando auro necessariam sibi uendicauerunt, ab hoc usu nominatā extimandibus cunctis. Si quidem nihil Chryfocolae uox aliud, q̄ auri glutinū indicat. Metallicam contra illam medici sibi seruarūt. Naturalem, per uenas auri defluentem, crassescente limo hybernīs frigoribus usq; in duriciem pumicis, de qua tantū hoc capite agitur: indeq; facto nomine. Quāuis ut antiquiores omnes testant, laudatior in aerarijs metallis fluere: proximaq; illi in argentarijs: postrema aut in plumbarijs, quae auraria priore illa uilior etiā esset: & nihilominus nomen illi ex auro factum est: ob precii, bonitatesq; alias, deferentibus auro hunc etiā, ut credimus, honorē gentibus. Nihil metallicam Chryfocollam peritioris aliud esse tradiderūt, q̄ humorē per puteos metalloz defluentē, qui frigore, ut prae monstratū est, in pumicis duriciem daret. Nec minus cura etiā fiat, sed multo infra naturalē illū, immixtis per metalloz uenas aquis leuiter tota hyeme usq; in Iuniū mensem: dein eo tempore siccatis, ut plane intelligatur, putrē metalli uenā esse Chryfocollā, colore uiridi: ob quā causam hic primū laudauit, τὴν χρυαὴν κατακόρυον

Dπρασίονον. quod redditū a nobis est, usq; ad satietatem uirentē. Satietatē intelligētibz, qd ab undet, & ex copia facto fastidio minus placeat. Nec ultra id quicq; adieci mus, totidē huic scriptori uerbis rem ostendētes. Ceteri interpretes quae ab eo non dicunt, pleraq; addiderūt. Alter ad Porri colorē contracta re, ratus πρασίον uerbū, quoniā graecis πράσον Porri sit, eius oloris colorē tantū indicare: cum tamen oēm uiredinē eo uerbo graeci indicent: hoc uno ut cetera omittamus, indicio, q̄ πρασία in hortis uocat ea gens, cōfita olēribz, ideoq; uirentes areas. Alter ex Plinio longius, q̄ oportebat rem describit: qui. 33. uolumine, capite. 5. Chryfocolae huius bonitatē indicans, ait. Summa cōmendationis est, ut colorem herbae segetis letae uirentis, q̄ simillime reddat. Quae tota, τὴν κατακόρυον πρασίον in scriptore hoc summa est. Potuit ille sui auctor, non alieni operis interpres, qua magis placuit rōne, quod scribebat docere. Interpretē contra auctoris sui uestigijs inherere oportuit: ne frustra cogere aliquādo herbā, & uirentes letas segetes, quae nullae in scriptore hoc sunt, aliq; querere. Hec est Chryfocola illa, qua Romanae historiae scriptores, stratum a Nerone circū maximum dixerunt, qua die concolori panonaurigaturus esset. Bonitatis Chryfocolae censum per nationes aliter Plinius, quo diximus loco tradidit. Reliquit enim Cypriam: & pro ea largissimā in Hispania inueniri ait. Viciuū septimo suae architecturae libro, pingendis parietibus, forte utilio rem solā Macedonicā laudauit. Verba eius sunt. Chryfocola apportatur a Macedonia. Foditur autē ex his locis, qui sunt proximi aerarijs metallis, Quotidianus & multus fuit quondā in pingendis tridinijs, cubiculis, & porticibus Chryfocolae usus: quoniā sylvarum, & uirentis agri modo oculis color eius bladires: quemadmodū nūc etiā, sed alio colore, uiridi scilicet creta, passim fieri uidemus. Quod superest, unū adhuc monēbimus: contra aliorū additōnes a nobis redditum, quo loco scilicet hic ait, habere Chryfocollā ἀνθρακινὴν, ut fere in cunctis legitur, οὐλων, quae uox cicatricū, significat. Ideoq; ab illis, Valet cicatrices exterere, et ad purgandas cicatrices, locus red-

ditus est. A nobis autē, ad extergenda ulcera, cōtracta res fuit. Habuimusq; in ea diuersitate au-
ctores, ueterū primo & meliorē codicū fidem; in qbus ἰατρῶν, id est, ulcerū, non ὀφθαλμῶν, id est, ci-
catricū legitur. Mox Paulū Aeginetam. s. suae medicinae libro testatū, ἰατρῶν ἀποκρίσεις ἀρρυθρίων,
id est, dolosis et maleficis ulceribus accommodatam esse. Et si recipiendū sit, quod quadamtenus
simile fuerit, Pliniū etiam qui eodem loco ait. Vfus Chrysocolle, & in medicina est ad purgan-
da uulnera, non adeo dissimili ulcerum & uulnerum natura euentuq; : ut non possit hoc etiam
ueluti teste, quod dicimus confirmari. Adiciemus praeterea, ne suspiciones nostras etiam relin-
quamus : non penitus ab re forsitan fore cicatrices legi, non tamen simpliciter, sed oculorum.
Quoniam idem eodem loco Plinius dixerit, Miscetur & collyrijs ad oculorū cicatrices. Quod
si recipiendum sit, perisse oculorum uocem eo loco constituendum erit. Verumtamen nulli-
bi in graecis inuentis oculorum cicatricibus aliquibus, & in probatoris fidei inuentis ulceri-
bus, accedente Pauli testimonio, in ancipiti illud elegimus.

A

De Armenio lapide.

CAP. XCVI.

ARMENIUS lapis praefertur laevis, colore ceruleo, per se
aequabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quae Chrysocol-
la praestat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpe-
bris alendos.

ἐμπύριον λίθος

BARBARI COROLL.

ARMENIŪ, siue lapis Armenius, & Armeniacus, inter colores floridos uocatos deponitur.
Sunt autē Colores floridi, q̄s dominus singenti p̄stat, Miniū, Cinnabaris, Chrysocolle, Indiciū,
Purpurissimū. Ideo enī q̄ preciosi sunt, legibus excipitur, ut a domino, non a redēptore reprae-
sentent. Ceteri austeri nominant. Armenia hūc mittit. Lapis est Chrysocolle modo infectus :
optimūq; est quod maxime uiuet, cōmunicato colore cum Ceruleo, in libras tricenis quondā
nūmis. Nunc inuenta per Hispaniā arena, quae similem curā recipiat, ad denarios senos uilitas
redijt. Distat a Ceruleo candore modico, qui teneriorē Armenio colorem efficit. Dissert sine
dubio ab Armenio, ea gleba quā Bolon armeniam uocamus, dicendam inter Cretas.

Pli. li. 35, ca. 6.

E X M. V E R G. C O M M.

Mittebat quondā Armenia sui nominis lapidem hūc, Chrysocolle modo is infectus erat,
colore maxime uiridi, sed cum Ceruleo cōmunicato. Idq; est qd hic ait, χρῶς τὸ χρῶμα νύκτιν ἐ-
μυδύει. Veritatemq; nos, in quo ceruleus color aliquis est, & aequaliter cōmunicato sibi eo co-
lore splendet. Meminit Armenij Vitruius etiam libro septimo, sed ut doceret tantū, quem
in architectura, & pingendis parietibus usum quondam habuerit.

B

De Ceruleo.

CAP. XCVII.

Cerulei origo ex ararijs metallis in Cypro. Copiosius ex ha-
rena littorali, secundum quosdam sub cauatos specus maris in-
uenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur ut Chalcitis.
Lauatur ut Cadmia. Vim habet reprimentem, & modice erodentem.
Crustas gignit, & exulcerat.

κυπρίος

BARBARI COROLL.

Ceruleum, siue lapis Ceruleus, hoc est, Cyaneus a Theophrasto, Galenoq; Cyanos mas-
culino & foeminino genere pronunciat. In argenti & auri metallis sit, sicut & Sil: de quo prius
ut agatur, cōmodius est. Color Sili, ut Ochrae luteus : qui tamē cremato Sile marmoroso, ace-
toq; restincto, abit in purpureum: quod nos experti sumus, & testantur Vitruius, atq; Plini-
us. Optimū Sil, quod Atticiū uocatur. Preciū in pondo libræ. 22. Proximū Marmorosum, quo
tantū utuntur ad abacos: quoniam marmor in eo resistit amaritudini calcis. Hoc subdimidio
Attici precio est. Tertium genus est pressum: quod alij Scyricum uocant, ex insula Scyro. Iam
quidem & ex Achaia, quo utunt ad picturę umbras. Cuius preciū sextertij bini, uel octonij. At
quod uocatur Lucidū, uenit e Gallia, precio Scyrici dupondij detractis, quo & Attico utun-
tur ad lumina. Effoditur & ad uigessimū ab urbe lapidem in montibus: quod quidem crematū
adulteriū est pressū. Deprenditur amaritudine, & quoniam resolutū est in puluerem. At Ceru-
leum non limus, sed lapis, & harena est. Huius generis tria ueteribus fuerunt. Aegyptiū, quod
ad syncera, meracq; lomenta maxime probaretur, Scythicum, ad dilutiora : & etiam hoc di-

Pli. li. 3, ca. 17.

Cui facile. Cumq; teritur, in quatuor colores mutatur, candidiorem, nigriorem, crassio rem, tenuiorem. Quod hoc Ceruleo in commune Theophrastus, non Scythico solū tribuit. Tertium quod & præferebat Scythico, Cyprium. Adulteratur autē Aegyptium, ut idē Theophrastus ait, quoddā genere, idq; in gloriā regis Aegyptij adscribit, qui primus tinxit. Alio loco Plinius hæc tria Cerulei, siue Cyanei fastigia, Aegyptiū, Scythicum, et Cypriū, inter gemmas, nescio q̄ recte collocauit, ut in castigatione Pliniana indicauimus. Etenim scire oportet, Cyanon etiam gemmā esse proximam, & germanā laspidi. Ea uero, de qua hic agitur, metallicam & arrosam esse. Ea res peperit errorem scribentibus, ut utruq; genus pro uno ceu obliiti confunderent. Accessit his Puteolanū, & Hispaniense, harena similiter ibi cœpta confici. Viæruuius Ceruleū ait fieri, harena cum nitriflore in farinā cōtrita, & æris Cyprij scobe admixta factis orbiculis: qui siccati urceo fictili condunt in fornace, ut confudent, atq; ita Ceruleū colorem præferūt. Tingitur autē omne Ceruleū, & in sua coquis herba, bibitq; succū. Reliqua curatio eadem, quæ Chrysocolle. Ex Ceruleo fit quod uocatur Lomentū. Perficitur id lauando, terendoue. Ethoc est Ceruleo candidius. Precia eius. 2. in libras. Cerulei. 18. Vfus in Creta, calcis impatiēs. Nouissimē superuenit Nestorianū, ab auctore Puteolis id curante. Fit ex Aegyptij leuissima parte. Preciū, 40. in libras. Idem & Puteolani usus, præterq; ad fenestras. Vocant Cyllon. Est & subtilissimū genus Lomēti, quinis assibus taxati, qd Atticū uocant, hoc est, ut puto λίσμα. Quod Lomentū ipsum a Theophrasto λίσμα dici uideo. Cerulei synceri experimentū, in carbone ut flagret. Fraudat uiola arida decocta in aqua, succoq; per lintheū expresso in cretā erethriam. Sile primi instituit pingere Polygnotus & Mycon Attico dūtaxat. Hoc secuta ætas ad lumina est usa. Ad umbras autē Scythico, & Lydio. Lydiū Sardis emebat: qd nūc, ut ait Plinius, obmutuit. Difficillime terit Sil. Ab hoc, ut arbitrantur aliqui, Silatium uinum: quod & Sil uocat, & Silaceus color. Sil & Ausonius poeta nominat, latariis, an peregrina sit uox addubitans. De uino Sil. Cornelius mentionē habet. Silatū porro & lentaculū, & prandiculū dicebant: quoniā ieiunis & ante prandiū uinum bibere meracū moris esset. Auctor Festus. Ob id Græci Dianestimon, & Acraisma id appellabant. Sunt qui a Sefeli, quod Tordilon & Sile dicitur, Silatium uinum deriuant. Sed auctorem nec ij ullum habent. Erat autem ientaculum, ut Athenæus tradit, buccæ ex uino: quod genus barbari, a uino & pane Vippam uocant.

E X M. V E R G. C O M M.

DColorum duplex quondam, quemadmodum & nostra ætate, ratio fuit. Nascuntur enim aliqui, & exigua aut nulla hominis opera ad temperaturam indigent. Finguntur contra aliqui, & sine hominis opera nulli sunt. Nascuntur Ochra, Minium, Chrysocolle, & pleriq; alij. Fingebantur autem quondam atramentum, ærugo, hyalos, pluresq; alij, quibus similes nostræ ætatis pictura, nunc etiam multos alios fingit. Facileq; erit uolentibus antiquorum in his temperaturas, confectionesq; omnes a Plinio & Viæruuii audire. Ceruleum in utroq; genere quondam fuit. Nascēbatur enim & finge batur. Illud in metallorum fodinis, præsertimq; æris: in quo genere Cyprium hic ceteris anteponit: Hoc littorali harena, nitro, ære q; ui ignis excoctis eisdem in pictura habebat usus. Fuitq; ut fere omnium in natura rerum fortuna est, multiplex Cerulei bonitas, ex nationibus confectionisq; temperatura ab antiquioribus obseruata. Quæ omnia a duobus illis scriptoribus certius docent: ab altero naturalis historię. 3. uolumine, cap. 13. ab altero. 7. suæ architecturę cōmentario. Quæ potuissent, debuissentq; a nobis repeti hoc loco, nisi iisdē uerbis cuncta illa in Corollario suo Barbarus collegisset. Nec eo fecius nostra hæc legentes hortamur, historię pigmentorumq; disciplinæ huius magistros sibi antiquos scriptores illos potius fecisse. Intelligent enim certius, quid nam in Ceruleo hic dixerit. Nasci in Cyprio, in ærarijs fodinis, & ex littorali harena copiosissimum fieri Ceruleum: quod in toto hoc capite præcipuum est.

De Indico.

CAP. XCVIII.

in Anis

Indici duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquā spuma germi natione, Indici harundinibus exiens. Alterum insectoriæ dant officinæ. Et est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimū existimatur, quod Cerulei speciem præbet, succosum, & læue. Inter medicamenta est quæ uelociter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. Purgat & reprimat ulcera.

B A R B A R I C O R O L L.

A

Indicum Ceruleo proximum est, ex India nō pridem, ut Plinius inquit, apportari cœptum: cuius precium in libras. 17. alibi denarios uiginti reddit, inexploratq; libi hoc inuentionis fuisse tradens, & inter Cerulei genera constituens. Ratio in pictura, ad incisuras, hoc est, umbras diuidendas ab lumine. Quod ex India inquit uehitur, hârundinū spuma est, adhærescente limo, cum teritur nigrū. At in diluendo mixturâ purpuræ, Ceruleiq; mirabilē præsentat. Alterū spuma est purpuræ. Adulcerant uero Indicum, sterora columbina, uel cretâ selinusiam, uel anulariam uitro inscipientes, ut Victruuius ac Plinius testatur. Probat carbone. Reddit em̄ sincerū flammâ, excellentis purpuræ, & dū fumiat, sapit mare: ob id quidâ ex scopulis id colligi putât.

E X M. V E R G. C O M M.

Num tantum Indici genus ostendi nūc potest: neq; antiquum forte illud quod ab Indis in quibus nascitur nomen sibi fecit. Alterum ex quo desijt tingi purpurâ, nullum inter gentes est. Nouerunt nunc omnes Indicum, quem nostra ætas habet, eamq; ob causam in uulgari re nihil ultra nobis laborandum.

¶ De Ochra.

CAP. XCIX.

Ochram leuissimam, & uehementer luteam eligere oportet, me-
ram, & aliena materia uacantem, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare, Excrescentia in carne reprimat. Caua cum cærato explet. Et articulorum tofos comminuit.

B A R B A R I C O R O L L.

Ochram, Luba tradit in insula rubri maris Topazono gigni. Sed inde non peruehitur ad nos, inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cupiat, Luteam aptissime conuerterit. Nisi Lutea ut herbæ & Chrysocolle genus esset. Exoleuit inquit Attica Ochra Victruuius. Inueniebatur autem tum multis locis etiam in Italia.

E X M. V E R G. C O M M.

Apallore nomen Ochrae antiquitas fecit. Terra ea est quæ quondâ in Attica laudatissima fodiebatur. Vtq; illi precium & honor in pictura maximus fuit, sic nostræ & uulgari multiplex & sine honore aliquo usus est. Quos habuit & habet in medicina usus hic docuit: quos autem in pictura, pictores iam pridem quotidiana tractatione nouerunt.

Pli. li. 35. ca. 6.
B

¶ De Cinnabari.

CAP. C.

Hallucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse existimant. Minium em̄ in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ harenæ permisto, temperari solet. Alioqui non dignoscitur. Fornacibus autē in florentissimum fragrantissimūq; colorem permutatur. In metallis uero strangulantem halitū eructat. Itaq; facies incolæ uescis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxiū ærem attrahant. Ea pictores ad sumptuosa parietū honestamenta utuntur. Cinnabaris, quæ ex Aphrica deferē, magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciât. Densum, nec dilutum colorem reddit. Quare quidâ Sanguinē esse draconis existimauerunt. Vim habet Cinnabaris Hæmatitæ lapillo eandē, uerum efficaciorē. Conuenit ad oculorum mendicamenta. Magis em̄ adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus cærato excepta medetur.

B A R B A R I C O R O L L.

Cinnabari ueteres usi sunt ad monochromata, hoc est, ad ea quæ coloribus singulis pingebantur. Adulteratur sorbis tritis, aut caprino sanguine. Preciū sinceræ nummi quinquaginta.

Pli. li. 35. ca. 17.

Hh

C Est autem Cinnabaris, siue Cinnabaris, uera sanies draconis elisi, elephātorum in pugna commorientium, pondere permixto utriusq; animalis cruore. Nec alius est color qui in picturis p̄prie sanguinem referre possit. Pinxerunt & epheso Minio: ubi primum id repertum est, autore Theophrasto, ac Vitruiuo. Vtrumq; omisum est, inquit Plinius: quia nimis acre existimabatur. Tum quia curatio magni operis erat, ideoq; transire ad Rubricam, & Sinopidē. Minium sane inter pigmenta magnæ auctoritatis fuit: quando & Iouis ipsius simulachri faciem, festis diebus miniandam censes locabant. Triumphantium quoq; corpora, Minio lini solita leguntur. Ideo & in unguenta triumphalis cœnæ addebatur. In Aethiopia & totos tingi procures, & Deos, hoc colore moris fuit. Inuentū Theophrastus tradit, hæc multo ante se a Callia atheniense, initio sperante, aurum posse excoqui harena rubente in metallis argenti. Reperiebatur tamē inquit, iam tum in Hiberna (malo enim ita q̄ in Hispania coherere, ut in castigatione Pliniana diximus) sed durum & harenosum. Item apud Colchos in rupe inaccessa, decutiendum sagittis. Sed id esse adulterum. Optimum autem supra Ephesum. Clisbianis agris Iliba Minium scripsit nasci, & in Carmania & Aethiopia Harenā illam Ephesi, quam diximus Cocci colorem habuisse, prædicant. Hanc teri solitam: dein lauari, & quod subsidat, iterum lauari. Differentiam artis esse: quā alij Minium faciunt prima lotura, apud alios dilutius id esse: proptereaq; Plysina dici: sequentis autem loturæ optimum. Minij uenæ Romam ex Hispania signatæ perferebantur, ad dena milia fere pondo annua. Romæq; lauabantur, statuto lege precio, septuaginta in libras, officinis eius, inter ædem Floræ & Quirini positis. Atq; hoc uerum erat Minium. Quod uero Dioscorides commemorat, adulterinum ac deterius. Namq; est alterum genus, in emimbus fere argentarijs, & plumbarijs metallis, quod fit exusto lapide uenis permixto. Non ex illo, cuius uomica liquoris æterni Argentum uiuum nominant, sed alijs simul repertis, qui steriles etiam sunt plumbi: nedum argenti. Tales cremati tunduntur in farinam: & hoc est secundarium Minium, perq̄ paucis notum, multum infra naturale illud sabulum. Hoc ergo adulteratur Minium in officinis: unde præda societati. Item Syrico. Sublimi autem Syrico Minium, compendij ratio monstrauit, & alio modo furtis opportunum erat: pictoribus plenos subinde penicillos abluentibus. Sidit enim in aqua Minium, constatq; furantibus. Sincero Cocci nitor. Secundarij autem splendor in parietibus sentire debet imaginem: quanq̄ hoc rubigo quædam metalli est. Sisapontensibus autem miniarijs in Berica, unde ad nos nec aliud fere inuehebatur, suæ ueng. Harena excoquitur, sine argētoq; eæ, contra quam alijs regionibus. Idq; eccerrimum auri modo probatur ferro, & melius auro candente: fucatum quod est, nigrescit. Sincrum retinet miniacum colorem. Inuenio & calce adulterari. Solis atq; Lunę contactus inimicus. Vin dicatur ab hac iniuria, si parietis siccat, tera punica cum oleo liquefacta candens, fetis inducatur. Iterumq; admotis gallæ carbonibus, aduratur ad carbonem usq; postea candelis subigatur: ac deinde linteis puris, quo modo & signa nuda marmorea nitescunt: quæ Loricatio græce appellat Coniasis. Autor Vitruius. Minium in uoluminū q̄q; scriptura usurpat, clarioreq; literas, uel in auro, uel in marmore etiā in sepulchris facit. In uenena esse Minium nemo dubitat.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redidit Plinius contra q̄ hic testatur, saniem draconis elisi elephātorum mortientium pōdere, permixto utriusq; animalis sanguine Cinnabarim esse. Nec solus credidisse id uidetur: cū hic plures idem sibi etiam persuasisse testetur. Quod ex grauiore Cinnabaris precio factum fuisse uerisimile est, dum nouitate & miraculo aliquo mercium suarum precia augere mercatores conantur. Verumtamen arguendo tam impudenti eorum mēdacio satis unus hic scriptor sit, qui totius naturæ peritissimus, qualis uera Cinnabaris sit, optime cognouisset, & saluti humanæ consulens, non id tantum monuerit, sed falso etiam existimari Minio eandem Cinnabarim esse. In quo decæptos quondam fuisse, & decipi adhuc posse homines non adeo difficile fuit & erit. Rubent enim ambo, & in pictura eundem tunc habebant usum. Discrepant tamen, ut hic docet, nationibus: q̄ altera ex Libya, alterum ex Hispania quondam afferebatur: & illa in medicina usum, hoc inter uenena, aut ueneni saltem maleficium habentia receptum fuerat. Vtriusq; seruantur nostra ætate nomina. Habetq; gens nostra quo passim utitur, uerbum miniare, a Minij colore factum: quo pingi, uariariq; libros, & librorum titulos eo colore dicat. Habent Cinnabaris nomen omnes in nostro orbe fere gentes: quo non rem, sed colorem illum indicet. Qui enim nunc ruber color eum habet usum, ex argēto uiuo conficitur: quem admodum ex Minio argētum uiuum. Quod torum nouerunt qui hæc tractant: ideoq; a nobis aliud agentibus relinquenda huiuscemodi sunt. Satis enim legentibus erit, ex scriptore hoc didicisse, quale utrumq; fuerit, & qua ratione inter se differant: tamq̄ nunc ueram Cinnabarim uidisse homini

difficile esse, quodā Minium facile erat: cuius quotidianus usus & tractatio Romæ quondā fuit, ex Hispania per redemptores eius metalli, ut illic curaretur, allatā. Relictum in Cinnabaris & Minij huius historio non procul a principio spacium a nobis est, utiq; nota signatus locus: quoniam male sequax uerborum & rei ductus illic esset: exigeretq; sibi aliquid, quod ad discernendam a Minio Cinnabarim antea dictum pertineret; a quo statim hic inferret, aliter nō posse cognosci. Siquis autē totam Minij confectionē, temperaturam, uitā, bonitates, & usum audire optauerit, Plinium & Vistruuium auctores habebit: quorū alter. 33. suæ historiæ uolumine, capite. 17. alter suæ architecturæ cōmentario. 7. longius omnia illa profecuti sunt.

De Argentō uiuō.

CAP. CI.

Argentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur. Patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarini continente, & calice cōperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Si quidem deterſa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argentum uiuum cōit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretū. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagneis, aut argenteis uasis. Siquidem aliam materiā omnem exedit, & defluere facit. Potum uim pernicipalem habet. Suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multū subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentum tenuissimum epotum, mirabili est auxilio.

B A R B R A I C O R O L L.

Hydargyros, siue Hydrargyron, ex Minio fit tantum secundario. Apofpermausmū Draconis non desunt qui uocent in arte chymica Hydrargyrum: ut fel Draconis Hydrargyrum, quod e stanno fit, & quod ex auro Discū solis. Fit & ex marmore, ut Vistruuius refert Argentumq; id uiuum nominat. Sudor calici deterſus in confectione Hydrargyri liquorem aquæ habet, argenteo colore: unde nomen Hydrargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico humore confluuit. Hydrargyro quemadmodum & Argentō uiuō argentum inauratur solum, nunc prope. Cum & in ærā simili modo aurum duci legitimum quondam fuerit. Sed alia ratio inuenta est e uiliori materia, ut paulo post dicemus. Quæ autē hic de noxa Hydrargyri a Dioscoride scribuntur, Plinius Argentō uiuō tribuit. Credo Hydrargyri genus haberi duplex. Factitium, quod proprie Hydrargyron dicitur: & Metallicum, cui fit Argenti uiui nuncupatio dicata. Est autē Argentum uiuum, argentei liquoris uomica: qui in lapide in uetis Argenti reperto, inuenitur: qui & ipse in Argenti excoquitur, & Achrosyalon priuatim uocatur a Chymistis. Quamq; & pro Scithierite lapide Aphrosyalos ab his accipitur. Venenū rebus omnibus est Argentum uiuum. Omnia ei innatant, præter aurum. Id unum ad se trahit mere: ideo & optime purgat, ceteras eius fodes expuens crebro iactatu fictilibus in uasis. Ita uitæ eius abiectionis, ut & ipsum ab auro discedat, in pelles subactas effunditur, perq; eas sudoris uice defluens, purum relinquit Aurum. Ergo & hoc cum ærā inaurantur, sublitum bratteis, pertinacissime retinet: uerum pallore detegit simplices earum, aut prætenues: quæ propter id furtum quærentes, oui liquore candido usum cum adulterant: mox & Hydrargyro. Inaurandum uero æs cruciatur ignibus, accensumq; refinguitur sale, aceto, alumine: postea exarenatur, an satis recoctum sit splendore deprédente. Iterumq; exhalatur igni: ut edomitu, mixtis pumice, alumine, Argentō uiuō inductas bratteas accipiat. Argentum uiuum non large inueniri solum affirmant. Candidum id, & fugaci corpore, nec usq; consistens. Omne tamē corpus fusile recipiens atq; in se contrahens. Qui Metallicas species adulterant, & Chymicæ a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarū maxime conquirunt, immutant rebus nomina: siue ut alijs maligne occultent, in quibus ipsi hallucinantur: siue ut præstigias suas uelut quædam mysteria uenerabiliore faciant. Argentum uiuum Hermem, hoc est, Mercurium appellant. Sed aliter quam Græci Aurum Solem, Argentum Lunam, & alia fere ad hunc modum omnia. Multos huic

Volsapysus

Pli. li. 33. ca. 6.
& s.

*

Hh ij

C Auaricia sola compulit frustra, nondum inuentio, qui non oleum et impensam perdiderit: ut de his iure dici possit quod Demetrius Phalereus in eos cauillatus est, qui aurum per cauemas scrutantur, & in ea spe patrimonialia sua cōferunt & absument. *ἡ μὲν ἐμύλλον ἐν ταύταις, ἡ δ' ἔχον ἀπίστω.* hoc est, quæ capere debuerant, non cōperunt: quæ possidebant, amiserunt, ut Athenæus, et ante ipsum Strabo meminit. Argentum eos uiuū p̄cipue torquet, indignantes tam proximam argenti probi spem elabi manibus, nec spissari, aut inhiberi motum eius ullo fere modo posse. Argentū quidem iam tingitur tam simili colore auri, ut nec marculo, nec coticula, nec pondere, nec alio q̄ lateris & ignium argumento deprehendatur. Quæ probatio Cōmentitia & Cupellaria uocari solet: qm̄ cōmētū illud laterculis, hoc est, in cuppa uratur. Malsū hoc iam late patet: nec Auaricia solū, aut Luxuria censenda, sed puerilis quædā uanitas, & ostentatio diuitiarum: ludi cra, totis abacis ex hoc adulterio, uel principū epulas ornantibus. Hinc passim moneta falsa curditur, præsertim Veneta: maiore furto, q̄a nullum sit aurū, uel argentū Veneto sincerius. Prefertur omnibus numis orbe toto Venetus. Huic crimini, Decemuiralis potestas, non aliter q̄ aut lese maiestatis, aut uiolata religionis obiecta est. Nihil fere tū, aut graues poenæ fontibus constitutæ, aut imensa præmia deferentibus proposita iuuere. Non erat prius cautum, ne cui liceret metalla cruciare, Monetarios tantum leges oderant, Chymistās esse patiebant. Hoc ipso anno quo hæc prodimus, Chymistas quoq̄ ipsos capitales fecere: simul ut occasio tēti sceleris adimerent: simul, ne quis ætatem suam tereret in foliibus & ustrinis et capunculis sutilibus, quæ iam conuicio desidia Choridiola, siue Scordiola græce nominantur.

E X M. V E R G. C O M M.

STare loco nescit, micat, trematq̄, & suo pondere hac & illac facile fertur Argentum uiuum. Vnq̄ hanc rationem in eo contemplant, ueteres Romani, insensibili alioquin rei, uitæ sensum Argento huic tribuerunt, uiuum uocantes. Græci ediuerso non motum, sed fluidum & aquosum eius habitum admirati, Hydrargyron, quasi aquosum argentum nominauerunt. Omnes tū cōmuni consensu in Argenti censu id constituerunt: uel q̄ candore suo simile argento sit: uel quod magis uerisimile est, quoniam in argentarijs metallis cū argento inuenitur: uel q̄ priuatim & per se similem argento uenam & uomica habet. Fuit enim hoc primum Argentum uiuum in metallis natum, & a natura gentibus datum. Quo deficiente, ut fuit semper urgente necessitate aliqua ingeniosa humana gens, fingi cōptum est, et ex alijs metallis artificiose cōfectū. In quondianos uitæ usus pro illo concessit. Quo magis miret aliquis scriptorem hunc, a fictitiū historiam Argenti uiui incēpisse, quam Plinius a naturali, 33. uolumine, cap. 6. auspiciatus fuerit his uerbis. Est & lapis in his uenis, cuius uomica liquoris æterni Argentū uiuū appellat. &c. Et cum longius de eo egisset, fictitiū ex Minio eiusdē uoluminis, cap. 8. docuerit, hic tū artem naturæ anteposuit: nec scimus, an bonitatem, efficacioresq̄ in fictitiū q̄ in natūo uires hac ratioe mōstrare uoluerit: habereq̄ in artibus & medicina fictitiū aptiorē natūo usum. Duplex ex his quæ p̄monstrata sunt Plinio Argenti uiui genus est, huic uero triplex. Fictitiū ex Minio, quod in fossura argenti inuenit. Et quod per se metallum est, perpetua liquoris uomica a Plinio fluere dictū. Est præter hæc quartū etiā genus, eodē fere quo ex Minio modo ex marmoris fragmentis & assulis quæ marmorarij disiciūt, factum. Docet id a Viétruuio quo paulo ante diximus locū. Quæ consiciendi id ratio quoniam multiplex est, & longa rerum serie tractatur a nobis, legenda in eo scriptore uolentibus relinquitur.

μίνιον σινωπικόν

M De Rubrica, seu Minio sinopico. C A P. CII.
Minium sinopicum maxime probatur graue, densum, ad iocine ris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, in resolutione succosum. Effoditur in Cappadocia spelūcis quibusdam, expurgatumq̄ defertur in Sinopen urbem, in qua uenditur. Vnde cognomen tum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam. Quapropter utlunerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumptum, aut clystere infusum. Datur iocineris uitio laborantibus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pl. II, 33, ca. 7.

Rubrica Sinopis, quam Celsus Minium Sinopicum appellat, inuenta primum in Ponto

dicif. Nafcitur Rubrica & in Aegypto, & Balearibus, & Africa: fed optima in Lemno & Capadocia: ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species Sinopidis, aut Sinopice tres. Rubra. Et minus tubens. Et inter has media. quæ præfertur omnibus: quia minus adule retur, ob id & Autarcen uocari Theophrastus eam prodidit. Preciũ optimæ in libras. ii. denarij. Vfus ad penicillũ, aut si lignũ colorare libeat. quæ plus rubet, utilior est abacis. Idem preciũ eius, quæ Pressior uocat, & est maxime fusca. Vfus eius ad bases abacorsũ. In medicina quoq; blandus emplastris & malagmatis, quæ dicunt Phæa. Troianis etiã temporibus, Rubrica hoc est, Miltos in honore fuit, Homero teste: qui naues Miltoparias cõmendandi gratia uocauit. Alioq; rarus in picturis. Rubrica & in ferrarijs metallis nascitur, picturis apta. Fir & ex Ochra, ut dicemus. Quid sit apud Columellã in apum curalutum punicum, nisi sit Rubrica, non satis ideo. Legitur sane Rubricam ex Africa uenire, quã Cicerulum uocabant, cuius precium octoni asses, Legitur & Lutura uenetũ abluendis maculis quesitum: de quo & Martialis poeta meminit. Nisi quis hanc intelligat, quam dixi Pressiorem uocari, & maxime fuscã esse.

E X M. V E R G. C O M M.

Quod in Sinopide Rubrica maxime optauerit nouisse aliquis, eadem ipsa est: ut optima, & quæ ueteribus cognita tam multis remedijs medicinam insruxit, uti ætate hac nostraliceret. Cætera enim quæ de ea a Diosco. docentur, in hoc ipso, & in Plinio satis perspetant. Eamq; ob causam relictis omnibus alijs, illud tantum monēbimus: ob coloris similitudinem, & hanc, & Fabrilẽ, & Lemniã Rubricam Minium sæpe appellasse ueteres aliquos: non tamen simpliciter, sed adiecto semper gentis, aut usus cognomine aliquo: uerbi causa, Sinopicum Lemnium, & Fabrilẽ, Minium nominantes. Sic Celsus aliquando, sic plures alij usi sunt. Cætera quæ de omni Rubrica dici poterant, ab alijs ex antiquis scriptoribus collecta, sine legentium desyderio a nobis relinquuntur.

De Rubrica fabrilĩ.

CAP. CIII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis. lapidũ expers, friabilis. Gignitur in Libria quæ ad occidentẽ spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricã.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica fabrilis, hoc est, Miltos rectorice, utilissima fabris est: quæ in Aegypto nascitur & Africana: quoniam maxime sorbetur. Hæc & in Lemno sit, diuerso genere ab ea quæ Sphragis appellatur. Sicut & qua linearij, fullonesq; utuntur, in lauando extergendoq; uiribus præcipua. Galenus auctor, Ochra excoquitur in Rubricam, ollis nouis luto circumlitis. Commentus hoc esse dicitur Cydus quidam, incensis casu officinis. Quo magis arsit in catuinis, hoc melior, quia nigrior, & carboni similis efficitur. Vtrumq; talis Rubrica deterior q̃ natua semper, ut Theophrastus inquit.

E X M. V E R G. C O M M.

Licebit uolentibus ex Plinio fabris aptæ Rubricæ huius historiã, bonitatem, natales, temperaturã, omnemq; usum, 3. uoluminis, capite. 6. certius intelligere: ideoq; nos parato omnibus eo scriptore, nihil cõmentatiõibus his nostris in re aliq̃n nota adijciemus. Factũ Rubricę huius cognomẽ a fabrica est, in qua dirigendis lineis, colorandoq; ligno multus semp fuit eius usus.

De Lemniã terrã.

CAP. CIIII.

Lemniã terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista. Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant. Vnde & Sphragida appellauere. Vim antidoti habet, contra perniciofa uenena singularem. Pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. Contra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale uirus eiuculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dysenterię utilis.

B A R B A R I C O R O L L.

Rubrica, siue terra Lemniã, quã Celsus Minij Glebam uocat, Palmam huic dedere Mili.

Hh ij

μῖλτος τεκτονικῆ

B

Pli. li. 35. ca. 6.

λεμνικῆ γῆ

Pli. li. 35. ca. 6.

Cnio proximam. Hæc est antiquis multum celebrata, cum insula sua, in qua nascitur. Hæc Minium sublinūt, adulteratq; qualis & in Cappodocia effodit spelūcis; quæ saxis adhæsit, excellere existimat. Glebis suus color, extra masculosus: hæc usi sunt ueteres ad splendorem. At Sphragis uocatur inquit Galenus, quoniam Dianæ signum habeat a Sacerdote impressum; nec animalium sanguinem misceri, sed triticum & hordeum piamenti gratia, illi terræ dari. Rubet attribuit modo tumulus in Lemno; ubi hæc legitur, prope oppidum Ephesiada cognominatum; quod in eum locum Vulcanus ceciderit, quo orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci, aut uire-re. Siccarum Lemniam, nec remollescere sub digito protinus taciām, ut Rubrica. Philoetem sanatum ea ex Hydri morfu, Philostratus scribit; ob eamq; rem nouum insulæ nomen inditum, ut pro Lemno diceres Acefa. Huius insulæ uestigia senatus populusq; Romæ, concessit Atheniensibus fouendo.

E X M. V E R G. C O M M.

Non est cæteris græcorum scriptoribus, præsertimq; Galeno eadem huic scriptori Lemniæ rubricæ, seu terræ historia. Hic enim ex cuniculoso specu, palustribusq; eius insulæ locis afferri ait: illi in ea insula montem esse dixerunt, ambustorum modo rubentem, sterilem, in quem poecæ e celo pulsum cecidisse Vulcanum ferunt: ex quo terra hæc legitur, non procul ab Ephesiade eius insulæ oppido: signariq; Dianæ, non capræ signo a sacerdote eius hanc terram: nec sanguinem illi caprarum misceri, sed fruges alias, piamenti causa monti illi defodere incolæ: pluraq; alia, quæ huic scriptori non conueniunt. Quinetiam nihil ab eis dictum est quale a Diosco. dicitur, uti ad religionem & initiationes quosdam hac terra.

De Atramento sutorio.

C A P. CV.

Atramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum, sed in specie differentias treis habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit. Quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, Stalactis appellatur. Petesius ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillaticium: alij Pecton, Ephthon, Aracton, Lonchoton. Alterum simpliciter ratione fit in speluncis. Postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capessit. Quod Pecton, id est, Cōcreticiū proprie nominatur. Tertium dicitur Coctile, & in Hispania fieri solet, sed inutile, ac inualidissimū esse cōstat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt: mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus cōalescit, in complureis formulas digestum, tesserarū speciem reddētes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, cōtrecrum, translucens. Cuiusmodi Stillaticium est. Ab alijs Lonchoton nominatū. Proximum Concreticiū. Coctile uero ad insectus & denigrationes aptius cæteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docēt. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. Latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratū, aut cum melle linctū. Vomitus ciet. Aduersus hausta fungorū uenena, ex aqua potum auxilia. Purgat caput aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 34. ca. 11

Chalcanthum, aut Chalcanthos, aut Chalcætes, ut Strabo appellat, a Cornelio Celso Atramentum sutorium fere semper conuertitur, cognitionem aeris græci nomine fecerunt. Fit in Hispania, e puteis stagnisq; id genus aquæ habentibus. Decoquitur ea, admixta dulci pari mensura, & in ligneas corūnas funditur. Imobilibus super has transitis dependēt resces lapillis extētes,

quibus adhærescens limus, vitreis acinīs, imaginem quandam uuæ reddit. Exemplum ita significatur diebus, 30. Hoc Ephthon uocāt, quod fit & salis modo flagrantissimo sole, admissas dulces aquas cogente. Color est ferrugineus, siue ceruleus, per quē spectabili nitore, utrumque esse creditur. Diluendo fit Atramentū, tingendis corijs. Fit & pluribus modis, genere eo terræ, in scrobibus cauato: ut Dioscorides tradit. Purissimū est, quod Stalactida, siue Stalagmiā, hoc est, Stillatitium uocant. Sed ex eo candidum colore uiolam sentiente, Leucoion nominant, cetera uiolacea. Fit autē quod Pecton uocatur, & in faxorum cadinis pluuiā aqua corruuato limo gelascente: a quo & nomen habet. Factitium pallidius est quā fossile: quantum colore, tantū & bonitate uiuicetur. Maxime probant Cyprum in medicinæ usu, quod & solum Possidonius esse credidit. Chalcanthum Galenus in Chalcitin lapidē mutari tempore, incipiens a superficie, testatur est. In harena Vrsorū & Leonum ora Chalcantho aspergi solita dicuntur: tantaque erat uis in astringendo, ut mordere non possent. Differt Chalcanthos, id est, æris flos, a Chalcantho latius quā ut monendū sit: etiam si Democritus in chymicis florem æris dicendo Chalcanthum intellexisse uideatur: ut Chalcanthū nominando, luteum oui significare uoluerit. Atramentū est & quod Melantheriam Græci dicunt, explicandum suo loco. Itemque Melan. Differt Calacanthum a Chalcantho: quod illud herbæ genus est, muscas, muresque necans, nec aliud de ea proditum inuenio: quamquā Græci uulgo Calacanthum accipiunt pro Chalcantho.

E X M. V E R G. C O M M.

Aeri cognata res est Chalcanthum. In ærarijs enim metallis, ut metallici docent, plerumque conrescit. Indicatque id in græcis nomen: in quo quāprimum æs intelligitur, Romani, quoniam eo tingendis corijs gentes uterentur, a nigro colore quē reddebatur, Atramentū: & a sutrinis in quibus coria tractantur, futorium nominauerunt. Genera, confectionesque eius satis hic docuit. Nec nos parum laborauimus in restituenda capiti huic antiqua integritate. Qualis autē ea sit, & quibus ablatis, mutatisue factum id a nobis fuerit, collatis cum nostra aliorum additionibus, facile uolentes intelligunt. Poterunt a Plinio etiam Atramentū huius futorij easdem confectiones, genera, & nomina intelligere historiæ suæ, 34. uolumine, capite, 12. Eadem enim omnia huic & illi sunt. Quod in medicina, & remedijs monere uolumus, illud est. Quod hic Atramentum futorium contra fungos cum aqua bibi ait, non multo post cum ex professo de fungorum maleficio agetur, cum aceto bibendum in eo periculo precipitur: ut tunc certius docebitur.

De Chalcite.

C A P. C V I.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurrentibus oblongis uenis, splendentibusque. Huic absterforia uis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. Ad ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e uulua & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Carunculā gingiuis enatam, depascentia ulcera, tonsillaque, eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculorū medicamentis longe utilior redditur. Callum genarum & scabriciam absomit, abstergitque. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta.

B A R B A R I C O R O L L.

Chalcitis, hoc est, lapis ærarius, ita dicitur, quoniam ex ipso Aes coquitur. Dissat a Cadmia fossili, quod illa ex subdialibus petris ceditur, hic ex obrutis. Item quod Chalcitis friat se statim, natura mollis, ut uideatur lanugo concreta. Est & alia distinctio: quod Chalcitis tria præter se genera complectitur, Aes, Misy, & Soiy. Habet autē æris uenas oblongas. Probatu mellei coloris, gracili uenarum discursu. Putant & recentem meliorem esse, quoniam uetustate Sory fiat. Maceratur autē in fistilibus ex aceto circumlitis fimo diebus, 40. & colorem Croci trahit. Chalcitis inueterata, ut Galenus inquit, etiam in Misy transit, a summa cute incipiens.

E X M. V E R G. C O M M.

Chalcitum uocant metallici lapidem ex quo æs coquitur. Habet is plures, ut illi uocant, distinctiones, non repetendas hoc loco: quoniam ex Plinio cunctas alij suis Corollarijs inseruerint. Et si uetustiores aliquis amet auctores, totam unus Plinius rem lib. 34, capite, 12, docebit.

Hh iij

A

B

xallitæ

Pli. li. 34. ca. 15

C
† uirid

Flt ex ea medicamentum, quod Pſoricon uocant, duabus Chalcitidis partibus, cum una Cadmiæ additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere ſimo, diebus quadraginta per caniculæ ardore: ſicenim ſit acrius. Idem quod Chalcitis poteſt. Alij pares utriuſq; portiones in uino terunt. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus ſuperpoſito. Modus autem uſtionis in humidioribus eſt, dum ipſa Chalcitis bullas excitare deſierit, & perfecte inaruerit. In reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & ſanguineum, aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda eſt. Inſidens autem ſpurcicia ſtatu expellenda. Mox reponenda. Torretur etiamnum perſtatis carbonibus, uſq; dum luteo colore paleſcat. Aut fictili ſubditis candentibus prunis, ſubinde uerſata, donec conflagret, & colorem mutet.

E X M. V E R G. C O M M.

Conſiunxerunt Chalcitidi Pſoricon hoc aliqui: nec ſine cauſſa penitus. Ex ea enim, ut præmonſtratum eſt, fingitur, fictitium enim, non natium: nec ſimplex, ſed compoſitum eſt. Nos tamen ueterum græcorum rationem ſecuti, qui ſeorſum a Chalcitide de Pſorico egerunt, diuiſa hiſtoria, & alio capite a Chalcitide, ſtatim Pſoricon proſecuti ſumus. Medicamentum id eſt, ſic dictum, quoniam contra ſcabricies & aſperitates cutis, quas Græci Pſoras, dicunt uim & uſum quondam haberet. Quæ autem ſit huic ſcriptori eius conſectio, ſatis ex eo patet. Cæteri tantum græcorum medici ad conſectionem eius non Cadmia, ſed Spuma argenti uſi ſunt: neq; ex uiribus eius minus aptam forte uim contra cutis aſperitates Pſoricum habebit. Cætera huic, & alijs omnia eadem ſunt: qui ſimo obrui, & 40. diebus ſub ſole habendum omnes præcæperunt: quoniam ea ratione maiores in ſiccando uires acquireret: ipſum magis extenuaretur, & in erodendo mitius Chalcitide fieret. Eſt illud in medio capite certius cognoſcendum: in coſturæ ſpacio, et q̄diu coqui metallici aliquid oporteat, quæ nam hic πάλυρα, id eſt, humore abundantia, quorum coſturæ ſinis ſit, cum bullas agere deſierint, & aruerint, dicat: & quæ reliqua intelligi ibidem oporteat, quorum coſturæ ſinis ſit in ſpecioſiorẽ colorem mutatio: in uno ne Pſorico conſtituendum id ſit, an in cunctis metallicis: decreueritq; hic, & appellauerit humore abundantia Pſorica, quæ copioſo aceto, aut uino temperata fuerint, reliqua uero quæ aridiora: an ſimpliciter de cunctis metallicis, omniumq; coſtura intelligere id oporteat. In quam partem inclinat animus nobis, non tam ex conceptis illic uerbis, quæ in hunc ſenſum facile legẽtes ducunt, q̄ quia non uidetur, quo referenda reliqua illa ſint, cum de uno tantum Pſorico agatur. Eamq; rationem nos ſecuti, de cunctisq; præcipi eo loco opinati, ad omniũ metallicorũ coſturam rem contraximus. Plinius. 34. uolumine, capite. 12. de eodem Pſorico hoc, ſed nõ eodem penitus huic modo egit. Prius enim ſimo in ſole obrui, q̄ Cadmiã illi miſceat, Cætera huic & illi eadem fere omnia ſunt.

¶ De Miſy.

CAP. CVIII.

μίσω

Miſy aſſumendũ natione Cyprium, auri ſimile, durũ, quod friando auri colorem imitatur, & ſtellæ modo ſplendet. Vim habet, & uſtionem cum Chalcitide eandem, citra Pſorici compoſitionẽ, ex ceſſu defectuq; differens. Aegyptium aut cæteris præſtat, ut pote quod efficaci uſ habeat. Sed ad ocularia medicamẽta multo ſupradicto inferius.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 34. ca. 12

Miſy, quidam putauere fieri ex uſto lapide, in ſcrobibus, flore eius luteo, miſcente ſe ligni, pineæ ſauilla. Re uerã autem ex Chalciti ſit lapide, concretionum natura, diſcretumq; optimũ cum teritur: arenofa qualitas, ſiue terrea, ſimilis Chalcitidi. Hoc miſcent, aurum purgant. Lapidioſius eſt q̄ Sory.

Deprehenderunt metallici in Chalcitide lapide, ex quo diximus excoqui æs, tria contineri. Aes primum; mox Misy hoc de quo nunc agitur; & tertium Sory, de quo non multo post agitur: non tanquam eiusdem substantiæ partes, sed diuersi generis cōcreta simul, discretæque quasi metalla aliqua, quæ coctura deinde, rationibusque alijs separata in usum uitæ traherentur. Quale autem hoc Misy sit, satis hic, satis etiam Plinius quo diximus loco docuerunt. Hic breuissime medicinam, & remedia eius numerauit, æquale uiribus Chalcitidi faciens. Plinius tamen longiore ceterisque historia multa addidit, quæ uidisse in eo operæ precium fuerit. Docentur autem ab eo quo diximus paulo ante capite & libro. Cæteri etiam græcorum medici in genere exulcerantium medicamentorum cum ualidiorē adstrictione Misy hoc numerauerunt: minus tamen quam Chalcitis erodere, quia tenuius ea sit, Addidit præterea Galenus Chalcitum: & quod non multo post dicitur Sory, uetustate in Misy hoc mutari a superficie incipiente statim mutatione.

De Melanteria.

CAP. CIX.

Melanteria geminæ est originis. Quædam in faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, salis modo cōcreuit. Alia uero in summa facie supradictorum locorum cōit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus fossilis quædam. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam obtinet Misy similem.

Melanteria

MELANTERIA, ex nomine quidem ipso atramentum significat: quemadmodum & Melan: de quo post dicemus. Differt: quod Melan factitium & librarium, siue scriptorium atramentum est: Melanteria uero terræ.

EX M. VERG. COMM.

Fecit Melanteriæ nomē color, qui in metallica natiur, sin fossili contactu aque illi accedens, semperque in omni niger est: non male a latinis Atramentum metallicum dicta aliquando est. Græcis tamen uocibus in hoc Romana medicina plerumque usa est: uocaueruntque latini non minus quam græci Melanteriam metallicam hoc atramentum, in ærarijs fodinis cōcreuit, & ut uerisimile est, æris naturæ. Veteres græcorum medici in genere efficacissime asfringentium eam nominauerunt: facilem ex historia huius in ærarijs metallis inuentum.

B

De Sory.

CAP. CX.

Sory existimarunt aliqui Melanteriam esse, aberrantes. Siquidem sui generis est Sory, ei non absimile. Verum Sory uirus inest graue, & nausæam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cipro. Præfertur Aegyptiū, quodque frianti nigrius apparet, spongiosum, suppingue, insuper adstringens, & olfactu, deuorationeque magnū uirum olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas Misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uestionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex uino infusum auxiliatur. Illitum cum aqua uaros extinguit. Medicamentis ammiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ uestionem experta non sunt, perustus ualidiora esse existimantur, præter salem & uini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Composita enim uiribus efficaciora redduntur.

122

C Sory Cyprum oculis utilius, cæterò superatur ab Aegypcio: alterius nationis Sory, q̃ Aegyptium. Si teratur, splendet. Sory crassius est q̃ Misy. Chalcidis mediâ inter ea qualitatē habet. Galenus auctor, Describitur Sory a Democrito, ceruleum, scabrum, semper inueniri soli tum in ipso Misy, uocatum ab aliquibus Calchandum uiride.

Hoc est Sory illud nō multo ante dictū a nobis in Chalcithite cōtineri. Quodq̃ ea iuetera fieri etiā Plinius ait, satis ab hoc & ab eo descriptū, ideoq̃ non dicendū a nobis iterū, neq̃ ex scriptoribus antiquis repetēda ad Soreos huius historiā modo quæ in illis, præsertimq̃ Plinio parata oībus, & exposita sunt. Docet em̃ ille longius genera, bohitates, ususq̃ eius oīs.

¶ De Diphryge.

C A P. CXI.

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. Lutosum namq̃ deferitur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccatur, mox circumpositis farmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, q̃ & a sole, & a farmentis uratur, arefcat, & ferme torreatur. Alterū perfecti æris, quasi subsidens fex est. Siquidem post frigidæ aquæ offusionē, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære fornacū ima parte cohærēs id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem Pyriten, ut calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq̃ colorem rubricæ contraxerit, eximētes recondūt. Quidam tradunt ex sola materia lapidē æris gignente fieri, quoties in dictis areis assata, & in scrobis translata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locū comprehendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporis æris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam uehementer excicans. Quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata Diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurigare, excrescentia consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut cærato excautum discunt.

Pli. li. 34. ca. 13.

Quatuor habent, qui Aes perficiunt, Aes, Scoriā, Florem, Diphryga. Aes ipsum in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernat, Diphryges remanet, auctor Plinius. Quidam perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur, ferruminari: cū ea hunc Aes feruere: ipsum uero non percoqui, nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quandam materiæ, id quod relinquitur ex cocto, Diphryga uocari.

Eadem huic scriptori Diphrygis Plinio undiq̃ historia est, nec quicq̃ ab eo felicius simul & breuius ex hoc scriptore redditū aliquādo fuit. Locus est. 34. uolumine, capite. 13. Diphryges em̃ uocari ab eo, q̃ bis torreatur, inquit. Triplicem eius originē esse. Fieri ex Pyrite primū lapide in fornacibus cremato, donec in rubricā excoquatur. Fieri item in Cypro ex luto cuiusdam antri arefacto prius, mox paulatim circumdati farmentis excocto. Fieri postremo in fornacibus subsidente æris face. Differentiam esse: q̃ Aes in catino defluit, Scoria extra fornaces, Flos supernat, Diphryges remanet. Addidit præterea, tradi a quibusdam ferruminari globos lapidis, qui in fornacibus coquuntur: circa eos feruere æs, ipsos uero non percoqui, nisi in alias fornaces translatos, & esse nodū quandam materiæ: idq̃ quod excocto supersit, Diphryga uocari. Ex quibus ratiocinari facile est, quatuor ærarijs in coctura æris redire res, æs, scoriā, florem, & diphryga: quorū quemadmodum non dissimiles, sic non penitus æquales uires in medicina sunt. Nosq̃ ex antiquo scriptore iisdem uerbis commentationibus nostris illa adsecimus: ut scirent primum legentes, recepta a latinis scriptoris huius decreta fuisse, mox ha-

berent uolentes inueniendi & colligendi Diphrygis a Plinio tradita certiorẽ rationẽ.

A

¶ De Auripigmento. CAP. CXII.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandarachæ gigni-
tur. Optimũ existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli
materiæ permixtum, fissile. Quale Mysiæ & Hellesponto nascitur. Hu-
ius duo genera fluxerunt. Vnum supra dictum est. Alterum glandis
effigie, pallidum, & colore Sandaracham imitans, glebosum. Ex Pon-
to & Cappadocia defertur. Secundum locum tenet, has nactum dotes.
Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis. Assiduoque uersat,
donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumque
reconditur. Vim habet adstrictoriã & erodentem. Crustas cum uehe-
menti punctione excitat. Reprimat quæ excrescunt, & capillos euellit.

Egerius

BARBARI COROLL.
Arsenicum, siue Arrenici tria genera. Coloris in auro excellentis. Alterum pallidius, &
Sandarachæ similis: quod sit deterius. Tertiũ quo miscetur aureus color Sandarachæ, quasi
ex prioribus duobus iunctum. Vtraque hæc squamosa: illud uero siccum, purumque, gracili ue-
narum discursu fissile. Arsenicum nos, & Auripigmentũ uocamus: ut Paulo, & Vitruiuo,
& Plinio, & Celso placet, Democriti Chymistæ Androdamanta quandoque hoc appellat. In
Carmania duos haberi montes Onesicritus tradit, alterum Arsenici, alterum Salis.

EX M. VERG. COMM.

Auripigmenti in pingendo adhuc usus aliquis est, ex quo Romani quondam illi nomen fe-
cerunt, utunturque eo nunc passim in pingendis librorum frontibus bibliopola. Accessit no-
stra ætate etiam, qui antiquioribus, ut credimus, nullus erat alius Auripigmenti usus. Tritũ
enim, pediculosos accipitres suos aucupes inspergunt, presenti contra eã labem remedio. Du-
plex eius genus hic fecit. Alterum quod fulgore auri splendet. Alterum quod Sandarachæ uo-
cauit. Significatque ea uox, ut omnes uerimus, quod glandis formam & speciem habet. Non
quod glebosum paulopost dicitur. Ob eam causam suspicati sumus, ad colorem posse eam per-
tinere uocem: & eum quidem puniceum, qualis non in glandibus simpliciter, sed qualis in ma-
turis palmulis est: quas greci cõmuni aliarum glandium nomine Balanos aliquando uocant:
ut primo cõmentario in Palmulis & Balanis testati sumus. Vbiq; enim & passim coloris hoc
discrimen in Auripigmento uidetur, præcipueque in pingendo apparet: quo tempore dilutum
humore aliquo ad eam rem necessario puniceum illum quera diximus colorem representat.
Facitque ad hoc quod coniunctum illi statim est *καυδαραχίς*, id est, colore Sandarachæ, cuius co-
lor flammeus & rubens describitur. In hac partem diu inclinauit animus nobis, & adhuc pro-
pensiores sumus. Nihil tamen contra aliorum interpretum æditiones mutare in re non satis
certa uolumus.

B

¶ De Sandarachæ.

CAP. CXIII.

Sandarachæ probatur ruffa, & aliena materia uacans, friabilis. Cin-
nabaribus colore, sulphuris uiridis redolens. Dos eadẽ & uestio, quæ
Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabrös ungues exi-
mit. Contra phthiriasin ex aceto efficax est. Tubercula cum adipẽ dis-
cutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & cæteras papularum eruptio-
nes cum rosaceo. Item condylomata. Datur ex mulso purulenta ex-
tussientibus. Sufficitur quoque cum resina, aduersus ueterem tussim, raptò
per fistulam nidore. Vocem expedit, cum melle delincta. Suspiriosus
cum resina in cataportio, optime datur.

Egerius

D I O S C O R I D I S

B A R B A R I C O R O L L.

C Sandaracha inuenitur & in insula rubri maris Topazono; ut Ochra. Sed inde ad nos importari negant. Inuenitur autem & in aurarijs, & argentarijs metallis; ut in Paphlagonia Pimolifeno tractu, urbe Pompeiopolis. Sed & in Scythia proxime flumen Hypanin optima. Fit & adulterina ex Phimychio, in fornace cocto; idq; incendio facto ex casu repertum est. Colos esse debet flammeus, precium in libras asses quini. Vitruuius multo meliorem usum præstari ex ficticia, q̃ ex fossili Sandaracha pictoribus existimat.

E X M. V E R G. C O M M.

DVplex quondam græcis & latinis scriptoribus cunctis Sandaracha fuit. Metallica pluribus locis fossilis, ut testati Plinius, Vitruuius, pluresq; alij sunt: qui ad Hipanin Scythiæ fluxu optimam omnium inueniri tradiderunt. Ficticia deinde & adulterina, quæ excocta cerussa fieret. Illa apud medicos, hac pictores felicius usi sunt. Auripigmento æqualem in censu remedium uitæ græcorum medici eam fecerunt, discutiendis & repurgantibus medicamentis eam miscentes. Cerussæ substantia Sandaracha est: indicatq; id Vitruuius septimo suæ architecturæ cōmentario, dicens. Cerussa uero cum in fornace coquitur, murato colore ad ignem incendiij Sandaracha fit. Id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea meliorem usum præstat, q̃ quæ de metallis per se nata foditur. Et hæc Vitruuius. Plinius addidit, flammeum debere in ea esse colorem; & si hæc ipsa torreatur, æqua parte admixta rubrica, Sandycem fieri: qui ueteribus poetis, præsertimq; Maroni color notissimus est. Et si crediderunt aliqui herbam Maroni Sandycem esse cum cecinit, Sponte sua Sandyx pascens uestiet agnos. cum tamen id nullam eius intellectus necessitatem habeat. Quod enim ab eo dicitur est, fore eam tunc felicitatem, ut sponte sua colores in ouium uelleribus nascantur, & inter pascendum agni colorentur; neq; id pastu Sandycis futurum, sed quod nos credimus, colorem Sandycis contrahendum simpliciter ab eo dici.

¶ De Alumine.

C A P. CXIII.

svithp

OMne Aluminis genus fere in Aegypto, & eisdem metallis inuenitur. Est enim scissile quoddam, quasi flos sudorue eiecticius terræ. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Libanis, Sardonis, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plarissq; alijs regionibus, Rubricæ modo. Plurimæ eius species, uerum ad medicandū usum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perq; adstringens. Caliculorum expers, nec glebulose, aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Quale est quod Trichitis, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic Alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, q̃ non adstringat. Damna in rotundi genere, qd manu confectū est. Sed ex figura deprehendit. Assumendum aut suapte natura rotundū, bullis turgens, albo propius, atq; ualidius adstringens. Præterea nō nihil palloris cū quadam pinguedine præ se ferens, sine harenis, friabile, natione Aegyptiū, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit lymphidū, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atq; quendā caloris igniculū expirans. Vim habent ex calfaciendi, stringendi, sanandi, & expurgandi, quæ caliginē pupillis oculorū offundunt. Genarū carnem, cæterasq; excrescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligit. Vri & torreris Chalcidis modo debent. Putrescentia ulcera cōpescunt. Sanguinis fluctiones inhibent. Gingiuas humore prægnates comprimūt. Motus dentium cum

aceto et melle firmant. Profunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum, & fluctionibus aurium, cum sanguinalis hærbæ succo. Leporis conueniunt cum brassicæ folijs, aut melle cocta. Item pruritu & unguum scabrieijs, pterigijs & perionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceto, fæce & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas ulcerũ, & cum salis duabus partibus, ad uitia quæ pascunt. Furfures cum eruo & pice illita abstergunt. Ad lendes, pediculos, ambusta, cum aquæ illita auxilio sunt. Contra tumores, et graue alarum inguinumq; uirtus, illinuntur. Ex melo autem aduectum, mulieribus præstat ne concipiãt, ante coitum ori uulua inditum. Partus quoq; extrahit. Gingiu si caro excreuit, uua, ac tonsillis accommodantur. Auribus & uerendis tũ melle illinitur.

BARBARI COROLL.

Alumen Græcis ab astringendo Stypteria dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, saluginem terræ sinunt. In Cypro candidum, & nigrum, exigua coloris differentia, cum sit usus magni: quoniam inficiendis claro colore lanis, pellibusq; candidum liquidumq; utilissimum est, contra fuscis, atq; obfuscis nigrum: ob id Byrsodepicon utrumq; cognominatur. Et aurum nigrum purgatur. Fit autem omne ex aqua limoq; hoc est, terræ exudantis natura, corruuati hyeme. Solibus aestiuis maturatur. Quod fuerit ex eo præcox, candidum efficitur. Laudatissimum in Aegypto Alumen: proximum in Melo. Quancũ in medicina Aegypto prælatum. Nascitur & in Hispania, & Ponto, & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui notæ optimi respondent. Quod an sit adulteratum, deprehendit succo punici mali. Sincerum enim mixtura eius nigrescit. Est & genus alterum, quod Paraphoron uocant, pallidæ, & scabræ naturæ, & qd inficitur galla. Concreti uero Aluminis genus id quod Trichitum appellauer: fieri arbitrantur ex lapide, propterea & Chalcitum uocant, quem Hippocrates Meliada, quia sit e Melo, nominat: ut sit sudor quidam eius lapidis, in spumam coagulati. Strongyle duas habet species, Fungosum, atque omnium ore dilui facile: quod in torum reijcitur. Melius pumicosum: & foraminum fistulis simile spongiæ: nec inficiens nigritia. Optimum ex omnibus rotundis, Melinon. Aluminis, ut breui comprehendam, sex habentur Galeno summa genera. Scissum, siue scissile. Rotundum, Astragalioites, hoc est, talare. Hygron, id est, liquidum. Placitis, & Plinthis, hoc est, crustarium. Et Latercularium. Alumine prælicta non incenduntur: id quod ob fidione Athenarum sub L. Sylla Quadrigarius compertum scribit.

EX M. VERG. COMM.

Quæ sit uniuerso Aluminis præcipua dos & uis, nomen indicat. Ab astringendo enim quæ multam & egregiam potestatem habet, græci Stypteriam uocauerunt. Longe plura q̃ hic discrimina eius & genera Galenus & Græcorum medici alij numerauerunt: monstrante, ut par est, quotidie nouum aliquid natura, & adijciente antiquorum inuentis experientia quod ab illis nondum inuentum, aut obseruatum fuerit. Ea nos in scriptoribus illis cognoscenda relinquimus. Scriptori huic tantum inferuientes, qui a principio statim dicens esse Alumen scissile, ὡς αὖ τὸν βολῆτιδον κτλ. Quod ab alijs, nobisq; pariter ueluti glebosi flos uersum est, non leuẽ suspicionem nobis iniecit, potuisse quodam aliter legi: quoniam in toto Aluminum censu nulum Bolitidis nomine indicatur. Præterea glebam βολῆτις græci dicunt, & ω, litera scribunt. In cũtis autem, quos hactenus uidere licuit, scriptoris huius græcos cõdices, o, paruo uox illa legitur. Accessit his Plinius etiam lib. 35. cap. 14. de scissili Alumine hoc his uerbis agens. Concreti Aluminis unum genus Schiston, id est, scissile græci appellant, in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Vnde quidam Trichitum potius appellauer. Hocq; sit ex lapide: ex quo & id Chalcitum uocant: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hæc nescio quo modo historiz & uocibus scriptoris huius respondere omnia uidentur. Id quidem in confesso est, de eodem scissili Aluminis genere ambos agere. Poruitq; hic florem, quem ille sudorem nominat, dicere. Et si id sit, non sine ratione dubitauerit aliquis, Bolitidẽ scriptoris huius in Chalcitidẽ Plinij mutandam esse: qui Chalcitum uocari alumen etiam hoc aitq; ex lapide fieri: sitq;

A

Pli. li. 35. ca. 14

B

C ueluti sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Hoc nos monemus, eruscandæ ueræ lectionis & inueniendæ rei non contemnendam occasionem hanc legentibus porrigentes.

¶ De Sulphure. CAP. CXV.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocant, nitez dulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatum in genere Sulphuris ignem non experti, quod uiret ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum Sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulentis extussientibus, in ouo sumptum, aut suffitum. Præterea partus, uel uti nidore extrahit. Lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert. Cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. Vitiligines tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cum aceto uero, draconis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro deterfum sedat. Regium morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinē, & destillationes. Sudores quoq; conspersum inhibet. Podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Erumpentē undecumq; sanguinem sistit. Fractis auribus cum uino & myrrha illitum medetur.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 35. ca. 14.

Sulphur Græce Thion, nascitur in insulis Aeolijs, inter Siciliam, & Italiam, quas ardere cernimus. Nobilissimum in Melo. Sed & Neapolitano, Campanoq; agro collibus: qui uocantur Leucogæi. Libyæ cuniculis effossum, curatur igni. Genera quatuor. Viuum, hoc est, Apyron, siue ignes non expertum: gignitur solidum, id est, glebosum, eoque uno ex omnibus generibus medicamentum utuntur: cetera liquore constant, & perficiuntur oleo incocta. Viuum effoditur, translucentq; ac uiret. Alterum genus appellant Bolon. Quidam pro Sulfure tantum crudo Bolo capiunt. Tertium uocat Egula, cuius unus duntaxat usus, ad suffiendas lanas fullonum officinis, quoniam candorem mollicieq; confert. Quarto utuntur ad Ellychnia maxime conficienda: ex eo Cautio uocant. Ceterum tanta ei uis est, ut morbum fonticum deprehendat nidore. Lufit & Anaxilaus eo, condens in calice nouo, prunaq; subdita circumferens, exardescens reperculsu, pallore dirit, uelut defunctorum effundente conuiuis. Harpacticon, siue Harpax appellatur in medicamentis, a celeritate uelendi. Habet & in religionibus locum, ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis feruentibus. Neq; alia res facilius accenditur. Fulmina quidem, & fulgura Sulfuris odore habent. ac lux ipsa eorum sulfurea est. Porro sulfur in uenis terræ ceu decoctus quidam adeps est, tam ualida & firma confusione partium, ut oleum eius arte nulla separari possit in rebus ceteris. Propterea cum oleacea, & ignea, non saluginea sit eius natura, haud facile diluitur. In spiritu, siue nebula facile attollit, ac sublime fit. Crematum cum aere, uiolaceum colore: cum hydrargyro, ceruleum facit. Sunt hæc chymistis notissima, non aliud magis in conficiendo auro commendatibus, quod Sulphur: quippe quod splendorē, & colore metallis afferat: ut corpus, & materiam hydrargyros: proindeq; sit maris uice Sulphur, Hydrargyros uero, id est, Argentum uiuum foemina: ut Democritus propterea omnis generis metallici spumam esse Argentum uiuum prodiderit. Duobus istis, phar-macum illud famigeratum potius quam compertum etiam, Philosophici lapidis nomenclatura nobile. Conficitur ab Osthane, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodemone, Democrito. Quanquam & alij scripserunt de miris, ne dicam signis huius peritæ, Orus, chrysorychites, Pebichius, Comerius, Ioannes, Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus. Synesius Olympiodorus Alexandrinus: recentiores istis Stephanus ad Heradeum Celsarē, Heliodorus ad Theodosium, iam foemina. Cleopatra uirgo, Taphnutia, quem minus probat, & Iudee gentis Maria, quam plurimi sequuntur. Auctores istos, occulte rei gratia, nihil fere suis nominibus appellat: ut ipsam Sulphuris, & Hydrargyri fuliginē Argentiō nama, hoc est, Argentum fontē dicant, Asemon uero, fuliginis eius ferruginē.

EX M. VERG. COMM.

A

Fecerunt Sulphuris quatuor alij genera, quæ ut græcos omittamus, a Plinio. 37. suæ historiæ commentario cap. 14. suis nominibus, notisq; priuatim indicantur & numerantur: hic duo tantum; alterum ignem non expertum, quod uiuum nominant; alterum uero quod igne confectum fuerit. Diuersitatq; eius non alia fuit causa, q̃ q̃ cæteri pluribus locis & multiplex nascens Sulphur, quale in plerisq; artibus & uitæ necessitatibus aliquot quæsisse id oporteat, docet: hic medicinam tantum tractans, ex omnibus generibus uiuum, & ignem non expertum illo præcipue indigebat. Eo enim medici plerumque utuntur: quoniam natura, & sua uis efficacior illi quam cæteris est. Eamq; ob causam in uniuerso Sulphure una illa differentia merito usus est. Græci *ἄπυρον* uiuum illud uocant, non alia uocis indicatione q̃ q̃ igne careat. Celsus libro quarto, cap. 18. altera nota idem indicauit, Sulphuris ignem non experti quod Apyron uocatur, dicens, Maro contra Georgicorum suorum. 3. commentario, in pecoris medicina uiua Sulphura appellauit. Contrarium uero illi alterum genus idem græci *πυρρῶν* uocant, igne incoctum intelligentes. Quotidianus, & numerosus inter homines Sulphuris usus est. Indiget em̃ eo plerq; artes. Indiget & ad quotidiana igniaria, expiationeq; domus: sed nullibi utilius q̃ in morbis, quibus numero multis, & periculo grauib; medet̃. Quæ omnis ratio ab hoc scriptore, & quo paulo ante diximus loco, a Plinio copiosissime tractata, repeti a nobis inutiliter non debet.

De Pumice. CAP. CXVI.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, teri facilis, nec harenosus, item fragilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, et ubi canduerint, extractus, uino restinguitur odorato. Iterumq; incensus extinguitur: & tertia uisione exemptus, & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excreſcentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricum. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis apus. Theophrastus autor est, si quisq; in bullientem urſeum uini Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

BARBARI COROLL.

Pumicis farinam, potiores in certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleantur, periclitari Theophrastus autor est: qui & Eudemum pharmacopolam, in uigilantissimas secundas uices durasse scribat. Ingressumq; balneas, nihil omni no reieciſſe: sed quasi non bibiſſe, ita coenatiſſe, Pumice uidelicet, ab septima statim portione hausto, primum ex aceto aspero, mox ex uino. Ut errauerint qui locum eum in Theophrasto de uiginti duabus Ellebori portionibus acceperunt, cum ex Plinio id facile deprehendi possit. Pumice in musti cados addito, non ad præsens modo, sed in totum feruere uina desinunt uis siccifica, Pumicis duo significatus. Alter notus omnibus. Altero dicuntur ita & cætera saxa erosa annis, qualia in ædificijs, ut Plinius inquit, Musæa uocant dependentia, ad imaginem specus natui arre reddendam. Nunc inde Musæica uulgo nominantur, preciosissimis dicata templis. Inuentum id Agrippæ quidam referunt acceptum. Huiusmodi operis artifices Musæarios Cassiodorus, & Iustiniani leges uocant, etiã si musæarios corrupte multi lætitent. Amianus Marcellinus, Musiciũ opus nominat. In uitis cæsariũ, quas ab Adriano Iulius Capitolinus, & alij cõplures scripsere, pictura de Musæo nominat̃, etiã si mendose legebatur, de musco. Laudatissimi Pumices sunt in Melo, Scyro, Aeolijsq; insulis. Probantur teri faciles. Poliendis libris accommodantur: unde Republicanos appellamus. Pumex græce Cissaris uocat̃: qd nomen aliud nihil significat, q̃ erosum. Et em̃ uermiculus triticarius, et ordearius Cis dicit̃, ut Ips cornicularius, Trips lignarius, Sis uestiarius, Ix nitiarius, si Phoroi græmatico fides habenda est. Pumicem ueteres etiã spongiã uocabant. Nã & e maris quoq; spuma coalescit aliquũ: itemq; ex arena littorali: ut in insula Cyclade Nisyro. Victruuius, quæ nũc inquit, sub Vesuuii monte Spongia, siue Pumex Pompeianus uocatur, ex cocto alio genere, lapidis, in hæc redactus uidetur generis qualitatem. Talis autẽ Pumex inquit, & circũ Aetnam gignitur, & collibus Mysiæ, qui catacecaumenos a græcis, hoc est, deustus appellatur. Talis &

Pli. li. 16. ca. 16

C Lipareus est, ut inquit Theophrastus: alioquin anteq̃ uratur, niger, leuis, atq; farctus. In Melo quoq; insula, idem autor est, Pumices quandoq; in altero gigni lapide: ponderosum, & nigrū esse Siculum: qui & cæteris præfertur.

E X M. V E R G. C O M M.

C Redimus scriptoris huius Pumici ab aliquo, qui omnem eius historiam eodem loco habere uoluerit, accreuisse quod in extremo capite ex Theophrasti, s. de plantarum historia acceptū legitur. In uetustioribus enim græcis nulla est ea pars, neq; in medicina necessitatem aliquam habet. Nec Dioscoridis etiam historiæ, decretisq; omni ea reiecta parte nocuerit aliquis. Retulit id Theophrastus quo diximus loco: acceptamq; ab eo rem eam omnem Plinius etiam docuit, 36. uolumine, cap. 16. quo loco tractata itidem omnium Pumicum historia & medicina, scriptoris huius decretis omnibus subscribit: additisq; aliquibus, cōstatur, usuiq; Pumicum non parum profuisse uidebitur. Nos breuitati consulentes, ea relinquimus: monemus tamen omnes, non fore inutilem eadem hæc in eo scriptore legentibus operam. Aut si Plinium audire noluerint, Barbarum saltem uisere, in quo omnia ex Plinio h̃sdem uerbis tradita legūtur. Notissimus nunc etiam omnibus Pumex, a græcis Cisseris, ob fistulosas concauitates quas habet, nominatus. Cis enim ab eis dicitur, qui in tritico & hordeo cum referbuerunt, nascitur uermis. Cui natura est, semina illa cuspidē potius, q̃ ore quam habet exiguis foraminibus terebrare: quibus foraminibus quoniam similis sit fistulosus ille Pumicum habitus, quasi ab his uermibus perforatus fuerit, Cisseris Pumex dictus est.

¶ De Sale. C A P. C X V I I.

SM S Al fossilis efficacior est, communiter si est candidus, calculis uacās, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter Amoniacum genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisq; segminibus diduci. In marino Sale eligendus est cādīdus, æqualis. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phrygius, nomine tapēus, ut tritæus, aut gantēus. Salis natura, in commune p̃ q̃ utilis est. Adstringit, abstergit, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, q̃ alius alio sit præstantior. Quin & a putredine uindicat. Ammiscetur medicamentis p̃foras abstergentibus. Excrescentia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit. Cæteraq; carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores in faccis fotu mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infrictus, donec ad ignem sudent. Item lichenas, lepras, p̃forasq;. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonsillis, uuaq; cum melle tostus, ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, & phagedænis ulcerum cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini semine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduersus cærasten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus cum melle & aceto. Aduersus uespārū ictus, & crabrones, albidasq; capitis pustulas, thymos, & tubercula cum seuo uitulino. Furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum moribus auxiliatur, tritus in linteolo & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in fa-

cie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cū aceto mulso bibit. **A**
Luxatis imponit cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo impos-
fitus, pustulas erumpere non patit. Podagricis itidem imponitur, & au-
rium doloribus cum aceto. Ignis sacros & ulcera quæ serpunt cum ace-
to, aut hyssopo illitus sistit. Vritur ficili, diligenter opertus, conditusq;
prunis, usq; dum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline, obliniunt,
& carbonibus subiiciunt, usq; dū pollen exuratur. Solet & sal cōmunis
eodem modo uri. Sed aqua semel abluitor & siccatus in ollam cōoper-
tam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat.

BARBARI COROLL.

Sal omnis, græci halas uocant, Panaceam Lucretius, a remediorum multitudine. Aut sit, ut
palustris, & maritimus: aut gignitur, ut fossilius: utrumq; pluribus modis, sed causa gemina.
Coacto humore, aut siccato, siccatur in lacu Tarentino. Item lacu Cocanico, in Sicilia, & alio
iuxta Gelan, & Pachyuum, tanti splendoris, ut sentiat imaginem. Item in Phrygia, Cappado-
cia Aspendi, ubi tantum noctu subuenit, quantum in heridii auferas. Omnis est alius Sal minu-
tus, atq; non gleba. Lacus duo in Baetris sale astuat. In Cypro, Citiceum, ab oppido id nomē.
Extrahit & Memphi, & stagno: dein sole siccant. Apud Caspias portas, quæ Salis flumina ap-
pellantur, superficie densantur in salem, amne reliquo fluente uelut sub gelu. Itē circa Mardos,
& Armenios, & in Baetris amnes Ochus, & Oxus, ex appositis montibus deferunt Salis ra-
mēta. Lacus in Africa, & quidem turbidi, salem ferunt. Calidi quoq; fontes, sicut Pegase. Oro-
menus, salis mons natiui est apud Indos, in quo ceditur renascens, magno uestigiali Regū. Car-
ris Arabiæ oppido muros, domosq; massis salis faciunt, aqua ferruminātes. Inuentus & iuxta
Pelusium, inter Aegyptum quoq; & Arabiam etiā per Africā squalētia detractis harenis, us-
q; ad Hammonis oraculum, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus. Hammoniacus tra-
ctu Cyrenaico celeberrimus, sub harenis, unde nomen, similis est colore alumini fissili, longis
glebis, neq; perlucidis, ingratus sapore, sed medicinæ utilis, leuissimus, intra specus suos in lucē
uinterfā prolatus, uix credibili pondere ingrauescens. Adulteratur cocanico & cyprio, mire
simili. In Hispania citeriore Egelest, ceditur glebis pene translucenibus, cui iam pridem palma
a plerisq; medicis tributa. In Medis Atropatena regione, stagno cui Spauta est nomen, sal coit,
pruritum & dolorem tactu ciens. Remedium, oleo inungere. Omnis locus in quo reperitur sal,
sterilis est. Vulgaris plurimus in salinis, mari affuso, non sine aqua dulci, sed imbre maxime iu-
uante, ac super omnia sole multo. Africa circa Vticam, construit aceruus salis ad collium spec-
em: & in agro Rauēnati, Ceruia: ob id, ita ut puto, nominata, quasi Aceruia: qui sole & luna in-
durati, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cedi possint. Fit tñ & in Creta, sine riguis aquæ
dulcis, & in Aegypto. Fit & puteis in salinis ingestis. Prima densatio Babylonē, in bitumē liq-
uidum cogit oleo simile, quo et in lucernis utunt. Detracto subest sal, Et in Cappadociæ puteis, ac
fonte quem in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effodit, magno glebarum
pondere: quas uulgo Micas uocat. In Chaonia excoquant aquā ex fonte, refrigerandoq; salē
faciunt inertem, nec candidū, Galliæ, Germaniæq; aquam salinam lignis ardentibus infundunt.
Hispaniæ quadam sui parte puteis hauriūt salisuginem, Muriā appellantes. Quercus ad id opti-
ma, alibi Corylus laudat. Carbo etiā in salē uertit. Quicūq; ligno conficit sal, niger est. Vmbræ
harundinū, & iuncorum cinerem excoquit aqua, donec exiguiū super sit humoris. Quin & mu-
ria salamentorum recoquit ad naturam suam consumpto rediens liquore, uulgo e menis io-
cundissimis. E stagnis maxime laudat Phrygius, Tattæi cognomento: et Tarentinus, quē antiq;
ad medicinā usum uehementer probant. Tattæus e Cappadocia, magna Phrygiæ parte stagno.
Tatta Morimenorum gente nascit. Nam q fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur.
Colopono et Camiseno tractu multus, ut Straboni placet, foeminis gratissimus, qā cutis nitore
faciat. Magis tamen extendit Citiceus. Salsissimum Salem putant, qñt siccissimus. Suauissimū
esse Tarentinū, eundemq; candidissimum. Fragilis quonq; candidus, pluuia dulcescit ois. Sua-
uiores fores faciunt, copiosum aglones. In igni nec exilit, nec crepitat Acathius, ab oppido ubi
nascit uocatus. Nec Tragaseus, ppe Smynthiū in Troade, ab aq, quæ Tragasta dicunt, appella-
tus: siue ut Iulius Pollux, a Trago, cui Neptunus agros in Salē uerterit, Licebat hñc omnibus

Pli. li. ii. ca. 7.
& 9.

B

C gratuito colligere. Vētigalem fecit Lyfimachus, obaruit; uestigalibus remissis, denuo erupit. Sed nec ullius spiritu crepitat in igne, nec ramētum, aut tenuis Sal. Agrigentinus, ignis paries, ex aqua crepitu exilit. Rubens Memphi, croceus in Cappadocia, idemq; odoratissimus. In Baetris rufus circa Oxum Cēturpis, et in Aetna purpureus, & in Lusitania, ut inq; Strabo, purpureus albet, lumentos; & boū oculis Tragaeus, & Beticus pfer. Ad obsoniū, & cibū utilior quigqs facile liquecit. Item humidior, minus em amari sunt, ut Atticus, & Euboicus. Seruadis carnibus aptior Megaricus; qm acer, & siccus est. Condit Sal odoribus, quo & pulmentarij uice usi ueteres. Adeoq; necessariū elementū est, ut transierit intellectus ad uoluptates animi q; Nam ita, ut inq; Plinius, Sales appellant. Hinc dicta salsa, & uia salaria: qm ea sal ad populos portari consueuisset. Ancus Martius salinas primus instituit, & populo congiarium e Sale edidit. Sine Sale, hoc est, mola salsa, nullū sacrū fiebat. Caunites efficax i collyria. Tebaicus ad pruritum, Laudas & a Sodomis Galeno, Sal, uitrū, atq; nitrū, sulfuri cōcoctū, in lapidē uertit. Cornea piscatorū corpora dicunt, q; sole, & sale obduruerūt. De Agrico sale mentionē in Columella inuenias; nisi p gñe niri capiat, qd Agrion uocari docebimus; haud scio preerea qualis sit.

Alod. 8xv

Halos achne spumosi salis ramentum, in exilibus petris inuenitur, cui uis eadem quæ sali.

De Spuma salis. CAP. CXVIII.

Pli. li. 31, ca. 7.

Halofachne salis genus, & hoc sponte natum, spuma ex aquis maris in extremis littoribus ac scopulis relicta. Hæc enim omnis rore densatur, & est acrior quæ in scopulis inuenitur. In igni nec crepitat, nec exilit. Ad omnia in quæ sales, probatur: spuma iocundior & utilior, Halofachnen uocant, & unum e quinq; Alcyonij generibus.

EX M. VERG. COMM.

Salis seipsam solo nomine cōcrescens in littoralibus petris, & in mari scopulis, fluctuū aspergine, salis lanugo potius q; spuma indicat. Plinius Spumam, 31. uolumine, cap. 7. appellat, ex propria achnes in grecis significatione. Hic tamen in ἁλὴν eam esse dicens, lanuginem magis, cum iam in faxis concreuit, describere uidetur, facilem cognitū & inuentū rem.

Alod.

D

Muria effectus salis præbet. Abstergitq;. Dysentericis infunditur, etiāsi nome intestina corripit. Ischiadicis ueteribus ad fortus, aquæ marinæ usum præstat.

De Muria. CAP. CXIX.

Pli. li. 31, ca. 8

Salsugo, id est, Halme, iteq; Muria uocari pot, q; & aliud genus Murie inter sales diximus. A Garo differt Halme, etiāsi utrūq; ad pisces Galeno teste pinet. Garus est sanies intestinorum ipsa, ut diximus secūdo libro. Halme uero muries & salsilago pisciū inueterator; hoc ē, ius salsum in q; seruant, quā mulieres nostræ uulgo Salimuriā appellant. Hæc a ueteribus & Salsugo thasia uocari solita est: ita condebant, inueterabantq; pisces ij, q; in pruna et craticula cōmode cog possent. Ob id eos Aristophan. Anthracidas, hoc ē, prunarios & carbonarios uocauit. Nos ut arbitror Aleculas. Huiusmodi sunt Smarides, & Menç. Itē Chalcides, quas & Chalcidicas, & Sardas, & Sardinos q; appellat. Nā Chalceus. i. Saber, alius piscis ē orbiculari specie, Cyzici frequēs. Carbonarij sunt & Trichides, quas & Trichias uocat. Nā Trichiades ab Aristot. dicunt quæ Thyñides sint: quas tū ipsas, ut Athençus, qnto de partib. animalij uolumine Trichidas nominat. Eiusdē sortis arbitror Epseros, a coquēdo nominatos, q; Artemidorus etiā Plectos uocauit. Sed in Aristot. Theodo. Naricas interpretatus est, nescio q; uere. Piscis certe minutus ē Narica, ut Festus inq;. Plautus muriatricā Naricā i uasis stagnæis apportat i comœdia. Illud in transcurso dixerim, Sardinos ab Aristot. intelligi nōnunq; eos, q; a nōnullis Eritimi uocant. Differūt porro Eritimi, ab Erythinis. Nā Eritimos, ut dixi, sarda ē, uel sardç similis. Erythinus aut is ē, q; a nostris uocat Rubellio. His gñibus pxime sunt & Thyrsæ, quas Gaza noster, et ante Gazā Georgius tiphernas, in Strabōe Alofas, cōi pisciū cū mugili & delphinis Nilo. Sed ita cur uocet, nondū cōpi. A qbus distat, q; Thratæ siue Thrassæ nominant, et a qbusdā Therç. Pisciculus et hic pusillus ac uersicolor. De Alofis ē qd dubit, sint hç q; Romanū uulgos Latinas appellat, Alofas Gallia & Germania, Culpeas Venetiā, in insensum platīs, quæ Tiberino a rane capiant; an genus aliud. Athenæus qdem Laton piscem cōmemorat, quem Archesistras

poeta præstantissimū in Italia nasci cecinit, præsertimq; frētō sculo. Hunc in Nisō grandissimū euadere ducentē quandoq; libras. Esse autē candidissimū, & suauissimū, oībus modis paratū, similem glandi uocato, qui amne Iſtro capiā. Ex aceto & muria fit, qd oxalme dicitur. Sicut apud Cratinū ex alio & muria Scorodalme. Qui iocularē quæstionē, siue gryphum in cōuiuio propositū non soluisse, multabantur haustu muria, sed ita, ut in uino paulatim, & cum interſpiratione biberet. Apud alios uictis meracū, uictoribus oculū dabatur.

EX M. VERG. COM.

Pro comperto nobis est, deesse huic capiti uires, potestatesq; illas oēs, quas salī hic idē scriptor paulo ante assignauit. Neq; em uerisimile est, ex tā multis, unā tantū extēdi scilicet dictā ab eo fuisse. Persuaderq; id non tā antiqua scriptoris huius interpretatio, in qua deinceps multæ aliæ numerātur, q̃ Plinius, 31. uoluminis, cap. 3. plures & ipse numerās, spissare, mordere, extenuare, ficcare, & quæcūq; alia hic scriptor toto hoc capite docet; a quo isdem uerbis oīa reddita sunt. Credimus nōs factū id ab aliquo, cui satis esset, in sale ea audisse, laboriq; in scribendo iterū quæ semel scripta fuissent parcens, eas neglexerit. Repetēda itaq; et in hoc caput reuocanda ex sale oēs illi erūt. Barbarus græcorū Halmen Saluginē uocauit, latioris forte ambitus, q̃ græcorū Halme certa res exigeret, uoce usus. Nos Muria auctoribus Columella, Plinio, Romanisq; scriptoribus alijs appellauimus: qui in medicina, & domesticare Muria semp uocauerūt. Ea duplex ueteribus fuit. Altera, qua in cōditura uini uterent; cuius cōfectionē & usum Columella docuit. 13. uolumine, capite. 16. Altera, quæ dura ab illis uocabatur: cuius cōfectionē & usum idē scriptor eodē uolumine, sed capite. 6. & 7. tractauit: qua in condituris oleū, radicū, pomorū, salgamorūq; omniū uſa antiquitas est. Solūq; hoc genus Halmē Dioscorides uideat: quoniam altera illa admixto sibi melle, nullū nisi in uindemia habebat usum. Eius cōfectio a Columella his uerbis docet. Dolūm q̃ patentissimi oris, locato in ea parte uillæ quæ plurimū solis accipit. Id dolū aqua coelesti impleto. ea est em huic rei aptissima: uel si non fuerit pluuiatis, fontana dulcissimi saporis sit. Tum indito sportā iunceam, uel sparteā, quæ replenda est sale candido, ut candida Muria fiat. Cum salē per aliq̃ dies uidebis liqueſcere, & ex eo intelligis nondū esse Muriam maturā, aliū subinde salē tandiu ingeres, donec in sporta permaneat in teger sal, nec minuat. Quod cum aniaduueris, scias habere Muria maturitatē suam. Et si meliorē adhuc uolueris, in uasa bene picata diffundes, & opertā in sole habebis. Omne enim mutorem caseum in eam dimiseris: si pessum ibit, scias esse adhuc crudā: si inuabit, maturā. Et hæc cura antiquorū Muria fuit, qua in condituris salgamorū uillici & patres familias utebant. Mediciina autē in plerisq; morbis, præsertimq; interaneorū exulcerationibus, & coxædicis doloribus eadem rōne, qua secundo uolumine in Garo idem hic scriptor monuit: ut exulcerata ad cicatricem perduceret, & quæ exulcerata non essent, ad ducendum ulcus proraret.

De Flore salis.

CAP. CXX.

Flos salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamē quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu Gari. Interdum longe magis uirus olet, gustusq; mordacior, & pinguius lentus. Fuscatus aut rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulteratur nōnulla ex parte, etiā aqua diluente facticiū colorem. Ad ulcera quæ cacoethe uocant, & phagedænas, genitaliū nomas, & purulentas aureis efficax est. Oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisq; coloris caussa, ut rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Aluū turbat in uino, aut aqua sumptus. Stomachū male habet. Additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum, acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

BARBARI COROLL.

Flos salis, id est, Halosanthos, siue Halyanthion, non fit, nisi aquilonibus. Est autē fauilla salis, quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totiq; diuersa res a sale, humidiorsq; naturæ, & crocei coloris, aut rufi. Si facies imæ conſpiciant in uasis, uel ut rubigo salis

C adulteratur, & testa trita. Florem Salis Cato uocat, qui e populari Sale candidus arte factus sit. Propterea & Alabaster a Democrito quandoq; dicitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Peregrina, nec satis certa res Italix quondā salis hic Flos fuit. In Aegypto inueniri ab hoc, & ab alijs dictus, paludibusq; & fontibus quibusdam innatare. Quo minus demiretur aliquis, nūc in medicina parum cognosci, & nullum eius esse usum. Salis ueluti rubigo quædam ab alijs dictus salis Flos est, quoniam colore ruffo sit. Commendabatur tunc, qui olei pinguitudinem quandam redderet. Quod sane miretur aliquis, ab olei pinguitudine diuerso penitus sale. Certissime de eo Plinius. 31. uolumine, capite septimo egit: nihilq; nō ab hoc scriptore traditum, iisdem reddidit uerbis. Ob quam causam longius de eo non agimus, in scriptore eo cognoscenda relinquentes, si qua nouisse alia de eo aliquis optauerit.

¶ De Nitro.

C A P. CXXI.

νίτρον

Praefertur Nitru laeue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddā. Quale ex Illyrico affertur, a Buniorū ciuitate. Humores transfert qui alicubi concreuerūt.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 31. ca. 10.

Nitrum, Graeci & Litron, uocāt attice. Veteres hoc ignorauere medici. Non multū a Sale distat, nec quisq; Theophrasto diligētius de eo prodidit. Exiguū fuit apud Medos, canescentibus siccitate conuallibus, uocabant Halmirhaga, minus etiā in Thracia, iuxta Philippos. Sordidum terra, quod appellant Agrion. Omissum est e quercu cremata fieri, propter impendia. Nitrosae uero aquae, multis locis repta, sicut & sulphurosa, aluminosaq; sed sine uiribus densandi. Optimū, copiosumq; in Clitis Macedoniae, qd uocant Chalaestricti, quo in pane utitur pro sale: cui & proximū est natura, purū & candidū, nitroso ibi lacu exiliente, e medio dulcis aquae fonte: quo semp emicante, nec augef tamen, nec effluit. Ibi sit Nitru Canis orau, nouenis diebus. Si fuere imbres, falsius, per aquilones deterius: totidēq; cessat, ac rursus inarat, ac dein de cessat. In Aegypto non nascit, sed conficit fuscū, lapidosumq; nitriarijs Nilo infuso. Siccant excedente eo, decedente madet. Succo Nitri. 40. diebus cōtinuis, non ut in Macedonia statim, protinusq; ut densari est coeptū, rapitur: ne lique scat, Conditū in aceruis durat in lacu Asanio, & quibusdā circa Chalcidem fontibus. Sūmas aquas dulces, et poculentas tradunt; inferiores nitrosas. In Nitro optimū quod tenuissimū, & ideo Spuma melior, Aphronitru uocata. Sordidum tantū probāt ad insciendas purpuras, tincturasq; oēs. Nitriariae calca mēta protinus consumūt. Vlcera allata, eo celerrime sanant. Ibi facta tarde. In Nitriarijs, non lippiunt. Aegyptiū teneriores facit Rhaphanos, sed obsonia alba, & olera uiridiora. Salnitru uocabulo uulgi dicit, pulueri consiciendo necessariū: quo ad bellica tormēta utunt, nouitia, pœnitendaq; ac pessimo publico inuenta. Diuersum a Nitri generibus existimo, indicūq; ueteribus, etiam si locus in Plinio est, ubi de hoc gñe loqui uideat. Sed eum nos mendosum credimus.

E X M. V E R G. C O M M.

Fuerunt quondam Nitri pluribus locis non aliter, q̃ alijs metallorū nitriariae fodinae: alijs quibus etiam siccatis sole nitrosis aquis & paludibus fiebat. Et ne longiores simus, nullū quale nostra ætate est, ficticiū Nitrum tūc erat: nec eum quem nostra ætate usum, in missilibus igne tormētis habet, in antiqua militia habuit. Vtebatur eo medicina tantū. Nihilq; Apsyro in ueterinaria medicina frequētius est. Quonā salis modo auaritate cibi morbofo pecori excitaret. Simulq; quā habet pellendi uī purgaret. Vtebat & ganea, in qua periti eius obseruauerāt, tene rescere Nitro multa, praesertimq; herbarū radices, candorē obsonia contrahere, & olera uiridiora fieri. Ex quo usu Martialis etiā cecinit. Ne tibi pallentes moueant fastidia caules, Nitrata uiridis brassica fiat aqua. Quod totū legentes monuisse placuit, ne quis ab hoc, et ab alijs de Nitro dicta, de Nitro nostrae ætatis, quē Salem Nitrum oēs passim noiant, dici existimer. Laudauit antiquitas Nitru ob diuersos usus, diuersis locis nascens. Hic ex bunis spongiosum alijs an re-

posuit: non satis certa loci indicatione. Omittimus quæ Plinius, 31. uolumine, capite. 10. retulit, optimū, copiosumq; in Clitiis Macedoniæ nasci. Nihil enim quod ille ait ad scriptoris huius Bunos pertinet. Quis hoc loco colles simpliciter significant, fossile & ex montanis erutū cæteris uidetur Dioscorides anteposuisse: sin contra, non colles ea uoce, sed certū aliquem significauit locū: in ambiguo tunc res est. Plures enī diuersis regionibus urbes, & oppida hoc nomine in antiqua Geographia audiuntur: quia in collibus ædificatæ habitarentur sic nominatæ. Bunos enim Græci cespitibus erectas aras & tumulos uocant. Siquidem in Illyrico, in Epiro, nec procul ab Antycira eodem nomine Buni urbes & oppida fuerunt: ut testati Stephanus Bizantius, Plutarchus, pluresq; alij sunt. Nobis inclinatur animus in eam quæ non procul ab Antycira a Plutarcho describitur, in commentariolo, cui titulus est, utrobi, in terrestribus, an in aquatilibus brutis maior sit prudentia.

De Spuma Nitri.

CAP. CXXII.

Spuma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex Philadelphia Lydiæ deferitur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur. Vim & uisionem salis habet tam Nitrum, q̃ Spuma eius. Præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febribus circumitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autē calida, aut uino infusa, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. Sordes expurgat cum acetō instillata. Canum morsibus ex asinino adipe, aut suillo medetur. Resinæ admista furūculos aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur, opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis cum cærato. In resolutione linguæ panī cōmode permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urūt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

BARBARI COROLL.

Aphronitrum, siue Aphrolitron maxime laudatur, quia sit Nitri pars tenuissima. Hoc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnatibus nitrarijs, sed nondū parientibus: itaq; non fieri incitatis: etiā si caderet. Alij operimētōs, acruorūq; fermētō gigni existimauere. Proxima ætas in Asia colligi tradit, in speluncis distillans molibus: specusq; eos Colycas uocant, dein siccat sole. Lydiū in pastillis affert. Aegyptiū in uasis picatis, neliquestat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiunt. Differt Aphronitru, ab Aphonitro. Id qd Spuma sit, tritum esse in pollinē affirmat. Candidū, & triticæ farinæ simile. Aphonitru uero, siue Apholitru congelati specie coit; eoq; in balneis quotidie, ut Galenus inquit, ad extirpandas sordes utimur.

EX M. VERG. C O M M.

Nec eadem, nec diuersa Nitro penitus nitri Spuma antiquis fuit: ipsdem locis cum Nitro nascens, & æquali illi potestate: aspectu tamen alia, quo tenuior Nitro, eo etiā melior. Discrimen in nascendo potius q̃ substantiæ eius erat. Prægnantibus enim, sed nondū parientibus nitrarijs, ut Plinius ait, Spuma colligebatur. Eratq; ob tenuitatem suam Nitri Spuma præuius, & in summū emergens, simulq; concrescens humor. Sunt tamē in græcis, qui testentur fieri Nitri Spumā, a ceruoq; nitri, ueluti fermētō quodam, ex quibus referuētibus hæc ueluti Spuma emergeret. Quod in multis alijs sit, seruiore suo se purgātibus. Addiderūt alij, in priore illa colligendē nitri Spumæ rōne, non concerni eā in nitrarijs, nisi nocturni accesserint rores. Quocūq; aut modo se res habuerit, qd tenuissimū ex Nitro se proferebat, id nitri Spumā quondā dicebatur: multi, ut uidet in medicina usus, a Nitro sola bonitate diuersa. Ob quā causam, & si forte uno, eodēq; capite continuata historia de utroq; traditū quondā a Dioscoride fuerit, nos tamē alioq; omnī rationem secuti, seorsum de utroq; egimus. Neq; est quod ultra moneamus, q̃ fuisse quondā pro sale aliquibus locis Nitri huius usum: tanta illi similitudo coloris, saporis, & to-

A

ἀφρονίτρον

B

Pli. li. 31. ca. 104

C tuis substantiæ est. Posteq; adhuc inueniri, & in eodẽ usu gentibus aliquibus esse: id tamen pro comperto nobis nõ est. Quemadmodũ sine controuersia a cunctis recipit, nullũ fuisse usum, nec confectiõẽ aliquam eius, qđ nunc decocta terra ad usus belloꝝ fingit, & Salem Nitruũ uocant, Magna cum illo similitudine, & naturæ id generantis imitatione excogitatũ.

¶ De Facce.

C A P. CXXIII.

E Ligenda Fax maxime a uino uetere, Italico: sin minus, ab alio con-
simili. Fax aceti uiribus longe acrior est. Crematur ut alcyonium,
ante diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum
penitus incandescat. Alij uiuis carbonibus Facis glebam obruunt, &
idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio
nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Facis
aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. Vlcerata ad cicatri-
cem perducit. Vehemẽter exest, siccataq;. Sed recenti utendum est, quo-
niam celeriter exanimatur, aperta, & nullo uase condita. Lauat ut Pom-
pholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum
myrto cohibet. Ventris, stomachiq; fluctiones illita sistit. Muliebre pro-
fluuium, imo uentri, aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit,
nondum exulceratos, & tubercula. Turgentes mammas suiq; lactis im-
patientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina uero ambusta, &
scabros unguēs aufert. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat ca-
pillum. Elota, oculorum medicamentis, ut spodos adijcitur. Cicatrices,
D & eorum caligines eadem abstergit.

V B A R B A R I C O R O L L.

V ini Fax, græce Tryx uocatur, utiq; nõ usta, sicut usta Sphede, quasi fæcula, interim Sphedem pro facce cruda quoq; Græci capiunt, ut Paulus. Faci tanta uis est, ut descendentes in cupas enecat. Experimentũ dimissa præbet lucerna, qđ diu extinguatur descensionis periculũ denuncians. Siccata recipit ignes, ac sine alimẽto perflagrat, cuius uis & natura quæ Nitro. Fax cum expirauerit, lauandis corporibus, & uestibus est utilis. Fax aceti pro materia acrior sit oportet. Vtriq; multum adijcit uirium crematio. Habet & suam sapa facem. Cratinus poëta comicus, hoc est, Tryga, pro uino quoq; accipit aliquando. Apud nos quoq; Fæculam, qui dixerit, pro uino meminisse uideor.

E X M. V E R G. C O M M.

S edimentũ uini, cum in dolio deferbuit, Fax est: nota omnibus, & nisi in medicina uires ali-
quas habeat, homini penitus inutilis. Crudę pariter & coctæ usus quondam fuit. Vocauit Fax
cem posterior græcoꝝ medicina etiam Phedam. Copiosaq; in græcoꝝ medicis ea uox est, qua
cremata priuatim significant. Eius non meminit Dioscorides, quoniã sua ætate nullũ erat forte
adhuc id nomen. Illud humaniores literas profitentes nouisse, & obseruasse uolumus, quod a
nobis dictum est. Utendum recente est: diuissime enĩ efflata ui languet: eamq; ob causam dili-
gentissime operculanda: nec nisi uase aliquo clausa seruanda est: a Plinio breuius & aptius di-
ci. Celeriter exanimatur, non incluso condita. In quo exanimandi uerbo usus, animam ad om-
nem halitum, & ut Græci dicunt, ἀπὸ ψυχῆς, contrahit.

¶ De Calce.

C A P. CXXIII.

C A L X H O C modo fit. Marinorum buccinorum testas igni
condito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die si can-
didissima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterum urito, usquedum uehe-
menter inalbuerit. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile
nouum conijcito, & exacte pannis operiens, noctem unam conquiesce-

refinito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recon- A
dito. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e uili marmore: quæ cete-
ris præfertur. Vis omni Calci in commune ignea, mordens, adurens, &
crustas inducens. Quibusdam alijs immista ut adipi, oleo, concoquendi
uim assumit, & dissipat. Vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existit
matur recens, nec aspersa aquis.

C **B A R B A R I C O R O L L.**
Alx uiuâ, id est, Asbestos. Differt ab ea Calce, quâ Græci Titanon appellant, ut spēs a ge-
nere: item a Maltha, quæ fit ex Calce recenti. Vino resinguit, mox tundit cum adipe suillo, et
sic duplici linamēto: quæ res omniū tenacissima, & duriciâ lapidis antecedens. Quod mal-
thatur, oleo perficitur ante. Galenus in Hippocrite, Maltham pro cera capit.

Pli. li. 36. ca. 24

T **E X M. V E R G. C O M M.**
Itanos inter uenena ab hoc ipso scriptore sequenti commentarii nominatur, quæ hoc lo-
co Asbestos ab eodem dicta est: specie tantū, ut aliqui crediderunt, diuersa: ut nos autē in græ-
cis obseruauimus, solo architectorum usu: qui Titanon intellexisse uidentur, eam qua parie-
tibus rectoria inducuntur. Et quoniam Gypso id aliquando fieret, Gypsum sexpenumero ea
uox græcis etiam significat. Quinetiam *titanus* uerbum illis inter cætera, Gypso inducto te-
gere & oblinire est. Verumtamen sola Calx utraq; appellatione illa indicatur. Quæ potuit ex
diuersa materia, ut hic ait, facta, in architectura diuersos habere usus. In medicina tamen con-
traq; in ueneni maleficio, utrumq; enim Calx præstat, nullum huiusmodi discrimen a natu-
ra accepit. Omnis enim Calx sine generis discrimine nocet, & prodest.

G **De Gypso. CAP. CXXV.**
Y P S V M V I M habet adstringendi, obstruendi. Sangu-
nis eruptiones, sudoresq; cohibet. Sed potum strangulat, quo
dam suffocationis modo.

440

G **B A R B A R I C O R O L L.**
Ypsum, siue Gypsus, siue Spygos, ut Theophrastus quoq; noiat, plura habet gñâ. Nam
& coquit e lapide, ut in Syria, & Phœnice, ac Thurijs. Et terra fodit, & quidē summa eius cu-
te, ut in Cypro. Copiosa itē Aetolia, circa Peroëbiâ, atq; Tymphem: a quo & Tymphaciū, si-
ue Tympheticū uocatur. Qui coquit lapis, non dissimilis Alabastris esse debet, aut marmori
eroso. In Syria durissimos ad id eligūt, coquitq; simo bubulo, ut celerius urant. Optimū fieri
comperit ex speculari lapide: qui & Diapahnes uocat, squamam uitalem habente, Gypso
madido utendū est, quoniā celerrime coit. Inepta sit operi duricies: tamē rursus tundi, & in fa-
rinâ resolui patitur. Natura Gypsi caloris in terendo tantū, ut rudiculis non manibus tractari
possit. Tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis ædificiorū & coronis gratissimus, & ad
uaporaria conclauū apud nos, quæ Mappas ex nostra consuetudine uocamus. Græci pro Cy-
molia, uestibus poliendis, Tymphacio utebant. Gypso, Theophrasti ætate. Hinc Gypsati ue-
nalitior: pedes, ut in Cymoliâ dicit. Est & in Gypso qd flos appellat, ueteres Chymiste, Argen-
tum uiuū, gelu astrictum, hoc est, spissatum, iam addensatumq; Gypson uocabant.

B

Pli. li. 36. ca. 24

C **E X M. V E R G. C O M M.**
Cognata calci res Gypsum est. Plura numerantur eius genera, priuatimq; a Plinio libro
36. capite. 24. Poterunt uolentes ab eo singillatim omnia audire. Posteriores græcorū medici
de uiribus eius certius docuerūt, siccare, & opplere Gypsum dicentes, & in compescendis san-
guinis profluuijs cum farina polline, & oui albo usum eius esse. Cremari ut cætera Gypsum
etiam, crematumq; opplendi uim amittere, sed in siccando efficacius fieri.

S **De Sarmenticio Cinere. CAP. CXXVI.**
Sarmentorum Cinis urendi uim habet. Cum axungia autē, uel ace-
to illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum no-
dis prodest. Cum nitro & aceto ex crescentias carnis in scroto reprimi.
Serpentium canumq; moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obdu-

1090 1111111111

Centibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

B A R B A R I C O R O L L.
 Pli. li. 17. ca. 9.
Cinīs, Græce Conīs, & Spodion, & Tephra dicitur, & Coloscertos poetice. Sed lixiuium Coniā. Apud nos Lix; unde Lixiuū, & Lixiua, & ut Columella uocat Lixiua. Cinis foci uocatur: dictus forte, quia luxatis in potu proffit. Vnde Gladiatores cum delussent, hac iuuari portione uidebantur. Cineri omni uim astrictoriam inesse, Dioscorides uoluit. Negat id Galenus: utiq; ficulneo. Ipsum quoq; uinum, quod anteq; prælo pressum sit, aut nimium calcatae uix in lacum musti fluxerit, Lixiuum, aut Lixiuum mustum appellatur, a Græcis uero Prochyma. Nam & Protofactum inuenio apud Paulum. Sed pro cinere Lixiuo, qui primus distillauerit, ut coniectura capio. Calidum cinerem Hippocrates Marilem appellauit.

De Alcyonio. **C A P. CXXVII.**
 Ἀλκυονίον
Alcyonī quinq; esse genera, compertum est. Vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plerūq; in littoribus inuenitur. Alterū pinnulae oculorū, aut spongiæ simile, fistulosum, & læue, odorē algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore, magis purpureum, quod Milesium uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, spongiosum, læue. Quintū figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre. Quod plurimum in Proponide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur. Patrio nomine Halosachnen uocāt.

Duo priora, in sceminarū simegmata assumuntur. Contra lentigines, lepras, uiligines, nigricias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertiū ijs qui difficili urina uexantur, aut harenulas in uesica colligūt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. Vstum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. In alia absterforia, psilotraq; assumitur cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, in crudum fictile mittat: & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet: & cum figlinum percoquetur: extrahens ad usum recondat. Lauatur ut Cadmia.

B A R B A R I C O R O L L.
 Pli. li. 32. ca. 5.
Fit in mari Alcyonium ex nidis, ut aliqui existimāt Cæcium & Alcyonium: quas nostri Alcedonas uocant, quasi Algedonas, ab Algore, ut alij, e sordibus Spumarum crassescentibus, alij e limo, uel quadam maris lanugine. Quo candidius, hoc minus probabile. Dioscorides quinq; genera dinumerat, Plinius quatuor. Primiū quale Dioscorides. Secundum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartū pumici & spongiæ putri simile, pene purpureum: quod optimum: hoc & Milesium uocatur.

E X M. V E R G. C O M M.
Non ausim ego nunc censere, an quæ in antiquis græcorū & latinorum poetis, discedentibus a se mari, aut eodem elemento ad se reuersuris coniugibus, & amoribus suis Halcyonios precabantur dies amicæ & uxores, bona fide pro salute eorū uota, precesq; conciperent: An utliceret illis per brumam septem diebus, tranquillo mari, ad nitorem læuorēq; cutis Halcyonium tuto expiscari. Mala enim mulieris mens, & ad nouas uoluptates sedulus animus, conciliandis nouis amoribus continue studet: gaudetq; aliud agere credita, quibus subinde placeat formæ suæ lenociniū quærere. Id certe uersimile est, & facile credat aliquis: Halcyonium, quod quodidie ad uultus decorem uterentur, certius q̃ Halcyonios dies nouisse forminas: reliq; uiris tota maris & nauigationis obseruatione, unde speciem suam augerent diligentius curasse; neq; ex fabulosa Ceycis, & Halcyones historia aliud, q̃ Halcyonium nouisse lenociniū for-

ma nascentem in mari rem: siue ex Halcyonum nidis reliquiae, siue crassescences spumarū for-
des, siue limus & maris lanugo quædam id sit. Nomen illi Halcyones marinæ aues fecerunt,
haud sane quia ex earum nidis Halcyonium mari innatet, sed quia ex eo mari innatanti & flui-
tanti Halcyones aues nidos sibi ad forturam faciant. Prius enim Halcyonum nidis spuma &
lanugo illa maris est: tum ex ea Halcyonum nidi: & quoniam Halcyonibus ad forturam inser-
uiat, Halcyonium dictum est. Discrepat in generum numero ab hoc scriptore Plinius: ille qua-
tuor, hic quinque genera eius facit, nec isdem notis ambo quotcumque ea sint indicant. Quodque
a Plinio non numeratur, quintum illud nobis uidetur fungorum figura, sine odore, & asperū.
Poterunt id certius uolentes in Plinio uidere lib. 32. capite. 3.

¶ De Adarce.

CAP. CXXVIII.

FIt in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem concreta fal-
silago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harun-
dinibus ac hærbis agglutinata, colore flori lapidis Asiatici similis, &
omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanquam lacu-
stre Alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigenes, lichenas, & uis-
cia cutis in facie accomodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorem euo-
cat, qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

BARBRAI COROLL.

Adarca, & Adarcion, & Adarces, & Adarcos dicitur. Item Calamochnus, id est, calami
lanugo. Plinius latinum Adarcæ nomen putauit, in Italia nascentis circa tenues harundines,
hoc est, in cortice calamorum, sub ipsa coma, e spuma aquæ dulcis ac marinæ, ubi se miscet.

EX M. VERG. COMM.

Calamochnum, id est, harundinum lanuginem Adarcem hunc in græcis aliqui nominaue-
runt: factum, quia in harundinibus concreta lanuginis modo inuenitur, illi hoc nomine. Credi-
musque nos, non excusandi lapsus Plinio occasione eam dedisse uocem. Is enim quod ante nos
alii etiam deprehenderunt, lib. 16. capite. 37. inter harundines Adarcem his uerbis numerat.
Est & in Italia nascentis Adarca nomine palustris, &c. Tum cum tota fere natura percurrisset,
ageretque de aquatilibus, 32. capite. 6. inquit. Inter aquatilia dici debet & Calamochnus, latine
Adarca appellata. Nascentem circa harundines tenues, spuma aquæ dulcis, & marinæ, ubi se mis-
cet. Plura sunt duobus his locis eius scriptoris errata. Primum, quod plantam cum hærente & ad-
nata illi spuma miscet, confunditque rei intellectum: tum quod Adarcam latinam uocem esse affirmat,
cum græci passim pro sua ante latinos usi ea fuerint: mox in Italia nasci, contra Dioscoridis, &
aliorum omnium decreta. Barbarus etiam hoc capite quod Diosco. περι περιόδους καλόμοις ηδὲ
χερταρίσις ait, monetque condescere Adarcem in harundinibus, & herbarum cremijs, farragine
dixit, contra rei rusticæ auctores omnes, farraginis uoce in ea re usus. Habet enim farrago cer-
tæ rei in pecoris pabulo significationem: ut certius illi docuerunt.

¶ De Spongijs.

CAP. CXXIX.

Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quarum
duriores Tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ contrariis
as dotes habent. Vruntur eæ ut Alcyonium. Recentes sine pinguitu-
dine uulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. Recentia uulnera ex aqua
poscaue conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetus-
tæ autem inutiles. Aridæ & ligatæ lino, si penicilli modo adigantur,
occlusa ulcera, callosque laxant. Recentes & uacuae senilia ulcera, & quæ
fluctione laborant, aut cuniculatim exedunt, imposito siccant. Sanguis
nis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini
auxiliatur. Et ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius,

Cin oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, e molliſſimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæret. Inſolantur inuerſæ, hoc est, parte caua sursum spectante: et qua adhæſere, deorsum. Si uero æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, perſuſæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 9. ca. 35
lib. 31. cap. 11.

Spongia, græcæ spongos appellatur, itemq; Spongia, ut dicunt Auiæ. Inter Zoöphyta, hoc est, quæ nec animalium, nec fructicum naturam, sed tertiam ex utroq; sortiantur. Nascuntur oēs in petris. Aluntur conchis, pisce, limo. Vbi auulforem sensere, contrahunt se, ac multo difficilius uelluntur, exprimentes abundantiam humoris, abscissæ uero sanie emittentes. Circa Toronem, ut inquit Aristoteles, uelſi conchis minutis intra eas repertis cōstitit, auulſasq; aiunt, & ex relictis radicibus recreſcere. In petris cruoris quoq; inhæret color, Africis præcipue, quæ generant in syrabus. Maximæ sunt Maucæ, sed mollissimæ circa Lyciam penicilli: in profundo autem nec uentoso molliores, unde ablatae sunt spongiæ. In Hellesponto circa Maleam uero asperæ ac densæ, putrescunt in apricis: ideo optime in gurgitibus. Viuētes, madetescq; ac illotæ, nigricant. Adhærent nec parte, nec toto. Interfunt enim fistulæ quædam inanes, quaternæ fere, aut quinæ, per quas pasci existimantur. Item aliæ, sed superne concretæ: & subesse membrana quædā radicibus earum intelligitur. Viuunt longo tempore. Pessimæ sunt Aplysiæ, quia erui nō possunt, in quibus maxime sunt fistulæ, & reliqua densa spissa. Ceterū aliter discernere genera. Earum quædam tria faciēdo. Spissum ac predurū & asperū, quod Tragos, idest, Hirculus uocetur. Alterum spissum & mollius, quod Imauos. Tertium tenue, densumq; Achilleū, inuentur rarū. Hoc galeis & ocreis inferitur, ne strepitum gestatu cieant. Ex eo peniculi fiunt. Medici insidia, ad duo eas genera redigere, Africanas, quarū firmitus sit robur, Rhodiacas, quæ ad fouendū molliores. Nunc aut molliſſimæ circa Lyciæ urbis Anipheilli muros inueniuntur. Mares quæ dicuntur perforant, tingunturq; in delicijs aliquando & purpura. Fœminis fistulæ maiores, ac perpetuæ: Tragis tenuissimæ ac densissimæ. Ab aquilone genitas ceteris præferunt. Nec usq; diutius durare spiritum medici, quæ in Spongijs affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia uostro suum misceant. Hoc genus re medijs Apōspongiliō Archigenes, & secuti eū medici appellant. Quia uero de peniculis diximus, scire oportet, nō Spongias mō, sed & e codis quæ setas, Penicillos a ueteribus esse nomina tos, quibus calciamenta tergebant: ob id & Tergentes uocabant eas aliq; nos uulgo Setulas. Est enim penis, idem quod cauda. Vnde Penita ossa, obsegen carnis porcing eū coda significat.

E X M. V E R G. C O M M.

Tertium habet in natura Spongiæ ordinem nec fructices, nec animalia, sed inter utroq; hoc genus medium quiddam, in quo mixta simul animalis, & plantæ natura est. Zoöphyta græci omnia appellant. Pluribus locis in mari nascentes, diuersisq; nominibus ab antiquis distinctæ: quoniam non una sit earum forma, bonitas, & usus. Hic quod ad faciendam ex eis homini medicinam pertineat, satis hoc capite tradidit. Quod autem ad historiam, certius Aristoteles libro quinto de animalium historia, a quo accepta omnia Plinius lib. 9. primum capite, 35. tum, 31. capite undecimo ipsidem retulit uerbis. Quæ a Barbaro in Corollario suo etiam collecta, sine dedero legentium a nobis relinquuntur. Quomodo autem uulnerariæ Spongiæ sint, manifeste docuit eodem loco Plinius, dicens. Fracturæ, & uulnera spongijs utilissime fouent. Sanguis rapitur in secando, ut curatio perspicui possit: & ipsæ uulnera inflammationibus imponuntur. Multaq; alia, quæ idem scriptor & alij in uulnerum curationibus tradiderunt. Quod dictum a nobis est: ut scirent legentes aliter uulnerarias esse Spongias, quæ plura alia sint quæ toto hoc opere a Dioscoride τριφυμνική, id est, uulneraria dicuntur.

De Corallio. CAP. CXXX.

κοράλλιον

Corallium, quod aliqui Lithodendron appellarunt, marinum esse fruticem constat, qui imo extractus duratur statim, atq; emergit, tanq; offuso ære protinus concreſcat. Plurimum inuenitur Syraculis, in promontorio cui Pachino nomen est. Laudatissimum rubens, co-

lore Hastulæ regiæ, aut Sandycis meri, nec secus terenti facile cedens, **A** æquabili usquequaq; cōcremento, rursus algæ, aut fūci marini odore, q̄ ramo fissimum, cinnamomi æmulum, forma fruticis. Quod autem in lapidis duriciam cōit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excreſcentia cōercet. Oculorū cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

B A R B A R I C O R O L L.

Quantum apud nos Indiciis margaritis precium, tantum apud Indos Corallio. Gignitur & in rubro mari. Sed nigrius. Item in Persico uocatur lace. Laudatissimum in Gallia eo sinu circa Orchadas: & in Siculo circa Heliam, & Drepanum. Nascitur & apud Grauisacas in Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Campaniæ, maximeq; tubens: sed molle, & ideo uilissimum Erythris. Color sub aqua uiridis. Baccæ eius candidæ ac molles. Extra rubescunt, induranturq; ceu corna satiuæ magnitudine ac specie. Aiunt tactu protinus lapidescere si uiuat. Itaq; occupari, euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi, a quo & Corallio, quasi curallio *ἡνὲ τὸν κορῶν* nomen inditum; nec aliter sane Theophrastus, q̄ Corallium appellat, a radendo scilicet: ob id & Gorgonia quoq; dictum putatur: itemq; Dendridin, hoc est arboreum. Probant q̄ maxime rubens, & q̄ ramolissimū. Damnant inane, aut concauū. Auctoritas Baccarum Indis, utroq; sexu preciosa. Religiosum etiā id gestamen Haruspices eorū, uatesq; inprimis habent, priusq; hæc notescerent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant Corallio: postea Indis Vniones suas pro Corallio mutuantibus, in penuria esse cœpit. Surculi eius infantia ad alligati, tutelam habere creduntur. Ignibus diu repugnant. Est & lapis Corallius, uel ut q̄dam scribunt Colaris, multū a Corallio diuersus, Pyrites s̄ quibusdam appellatus: quoniam sit plurius ignis illi. Sed est alius etiamnum Pyrites, in mentionē suam seruandus. Qualis porro lapis Erythros, hoc est, rubens, ab Hippocrate significetur, quo mulieres inquit explorantur, an sint prægnantes, nisi aut Corallium sit, aut Pyrites, aut etiā Hamatites, affirmare nihil habeo.

E X M. V E R G. C O M M.

Crescit arboris modo, & in duriciem lapidis duratur in mari Corallium. Nota hunc res omnibus, sed in nullo fere honore, si antiqua repetatur eius gratia, qua p̄dolosissimis in natura gemmis praelatum in gentibus aliquibus diu fuit. Siccandi, & mediocriter repurgandi uim illi ueteres græcorum medici tribuerunt: ideoq; cruentis sputis, ut illi etiam tradiderunt, utile.

De Antipathe.

C A P. CXXXI.

Quod Antipathes uocat, Corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figurā, ramosum magis. Vires supradicti habet.

B A R B A R I C O R O L L.

Antipathes, pro genere Corallij, quale sit in Plinio, haud facile docuerim: nisi quis intelligat fruticem circa Troglodytarum insulas, nascentē in alto, quæ Isidos Plocamon uocari tradit, Corallio similem, sine folijs sentiri eum, se capi, durariq; colore in nigrum, cum cadat frangi. Theophrastus Corallij duo uidetur statuere fastigia. Vnum quod rubens, rotundumq; est, ut Radicula in mari nascens. Alterum huic nō multū dissimile: quod Calamus inquit uocatur Indicus: qui duratur in silicem. Plinius inter gēmas enumerat Corallida, minio simile: quæ in India, Syenæq; gignatur. Fortasse per Theophrasti tēpora, minus erat Corallij uulgatus usus.

De Phrygio lapide.

C A P. CXXXII.

Phrygius lapis quo insectores in Phrygia utuntur, a qua nomen accepit. Nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modice grauis, inæquali compage corporis, intercedentibus albis segmentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; car-

Pli. li. 32. ca. 2.

B.

ἀντιπάθης

Pli. li. 37. ca. 10

λίθος φρυγίος

C bonibus obrutus perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat. Rursus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & tertio faciendum. Attendēdū tamen, ne minutim confringatur, et in fuliginem euanescat. Vis crudo ustoq; adstrictoria, expurgans. Viceribus crustas quadamtenus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

Pli. li. 36. ca. 19

BARBARI COROLL.

Lapis Phrygius, gleba est pumicosa. Plinius medicinæ utilem negauit.

EX M. VERG. COMM.

Gentis nomen habet Phrygius lapis, pumicosa, ut Plinius ait, gleba; Italiæ semper peregrinus, nūc autē nulli cognitus; & ex eo, quod præcipuum habere fertur, in nullo nostra ætate usu.

De Asio lapide

De Asio lapide. CAP. CXXXIII.

Asius lapis assumi debet pumicosus, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas melini coloris ad imū actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compagine tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergēc. Admotus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, et modice erodentem. Ammissus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longe ualidior flos existimatur. Cæterum siccatus flos, uetera ulcera et cicatrici repugnantia sanat. Excrescentia cohibet. Tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat. Vicerum caua explet, depascentiaq; cū cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & liensis ex aceto & calce. Prodest phthisicis linctū. Podagrici iuuantur pedibus in solio, ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoq; loculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporū crassiciem absumunt, uice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Pli. li. 36. ca. 17

BARBARI COROLL.

Asius, et Asia petra dicitur. Est et Asius per duplex, II, ab Asio Troadis, ut inquit Plinius. Sed ab Asio diuersus. Ille Sarcophagos quoq; nominatur, ab effectu: qualis & in Lycia, & in Oriente habetur. Et in Mysia quoq; inueniri eum Stephanus affirmat. At noster hic per simplex, s, fere scribitur ab autoribus, gustu falsus. Corpora defunctorum condita Sarcophago, consumi intra, 40. diem, sed illata quoq; mortuis, lapidea fieri caduntur. In Oriente adalligata uiuentibus erodunt ea.

EX M. VERG. COMM.

Longe breuius q̄ hic cæteri græcorum medici lapidis Asij, florisc; eius uires tradiderunt: ex tenuare q̄dem, sed sine erosionē dicentes. Eamq; ob causam humentes & flaccidas carnes absumere una πλάσσειν σαρκῶν uoce complexi, quæ tam multa singillatim a Diosc. numerantur.

πυρίτης

De Pyrite lapide. CAP. CXXXIII.

Pyrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur sic. Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec rufescat. Alij in carbones igni candentes, lapidem melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt. Efflatoq; cinere, rursus madefaciū cremant, donec æquabili tenore assiccatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; reconditur. Si ex loto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi, q̄ usti uis est excalfa-

cere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias conco- **A**
 quere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne
 cohibet, sed calorem quendam & adstrictionem parit, itaustum non
 nulli Diphryges appellant.

PYRITES, sunt qui & Sideriten uocent, & Androdamanta, & Bostrychiten. In Cypro repe-
 riri uolunt, & in metallis, quæ sunt circa Acamaniam. Vnum argenteo colore, qui & Argyri-
 tis a Democrito cognominatus uidetur. Alterum aureo. Aliqui tertium genus faciunt, quod
 plurimum ignis habeat, ponderosissimumque sit: quos & uiuos appellamus. Hi exploratori-
 bus castrorum maxime necessarij: quia clauo, alteroue lapide percussis, excutuntur scintillæ,
 quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, aut folijs celerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma
 est, nec scio an diuersa ab hac, Nigram esse inuenio, & attritu digitos urentem. Pro Pyrite, in
 medicinas uenit Myllios, siue Myllitis, Cochlax appellatus, hoc est, molarius, insula Nisyro plu-
 rimus, ab Hippocrate Lapis niger, ut Galeno placet. Myllias ab Theophrasto & Hellano, ex
 Aethna monte fluens, luti nigri modo in Sicilia, post durefcens colore custodito. Fluunt & Py-
 romachi dicti, ut idem Theophrastus ait.

Pli. li. 36. ca. 19.

EX M. VERG. COMM.

Igniarium fuit quondam, quemadmodum & nunc etiam est Pyrites lapis. Factumque illi ab
 igne nomen, haud sane quia caleat, aut ignis modo fulgeat, sed quod inuicem attritus, aut ferramen-
 to aliquo percussus, ignis modo igneas scintillas ex se mittit. Dico autem igniarium, quodcumque
 ad instaurandum nouum ignem homines excogitarunt, Semina siquando hesternæ male con-
 dita flammæ. Vt prima sub luce solet cinefacta, perissent. Habent, præstantque id uulgares lapi-
 des omnes, sed omnium maxime qui durissimi & metallici sunt: qualis Pyrites hic est, cuius ab
 hac potestate bonitas probatur. Anteposuit enim hic cæteris eum qui concolor æri est, & qui
 facillime, & quantum uoluerit aliquis leui pulsu scintillas ignis aget. Quod ideo adiectum illi
 a Diosco. est, quoniam plura ad instaurandum nouum ignem lapidis huius genera & bonitates
 sunt. Quæ ex eadem ignis potestate & natura eodem nomine omnia tunc censebantur. Egit
 de his Plinius libro. 36. capite. 19. plures & ipse Pyrites numerans lapides: & inter eos genus **B**
 unum faciens plurimum habentium ignem, quos uiuos tunc uocabant, ponderosissimos: qui
 bus exploratores in castris uterentur: quoniam clauo, uel altero lapide percussis, scintillas sta-
 tim ederent: quæ sulphure exceptæ, aut fungis aridis, uel folijs, dicto celerius ignem traherent.
 Quos Maro etiam felicissime in primo suæ Aeneidos descripsit dicens. Ac primū silicis scinill
 lam excudit Achates, Succipitque ignem folijs, atque arida circum Nutrimenta dedit, rapuitque in
 fomite flammam. Validissimum in discutiendis tumoribus, concretionibusque Pyritem lapi-
 dem hunc ueteres græcorum medici dixerunt. Contra durices, quas Scirros ea gens uocat
 utentes, cremato primum, mox acerrimo aceto restincto. Nec minus contra concretum in gru-
 mos puerperarum lac.

De Hæmatide lapide. CAP. CXXXV.

Hæmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, durus
 in se, & æqualis, nulla forde ammista, nulloque zonarum discor-
 su. Vim habet adstringentem, & excafactoriam aliquantum. Oculorum
 cicatrices & scabriciam cum melle purgat. Cum lacte aut muliebri, lip-
 pitudini, collisionibus, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur con-
 tra difficultatē urinæ, & fluxiones mulierum in uino, & ab ijs qui san-
 guinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo cotes & colly-
 ria oculorum uitij apta. Vritur ut Phrygius, uino tantum subtracto. Mos
 dus uestionis est, ut modice leuis fiat, & bullis quibusdam inturgescat.
 Sunt qui Hæmatiten ita adulterant. Deusam glebā rotundamque schisti
 lapidis, cuiusmodi sunt quæ radices uocantur, uase figlini operis, quod

ἀμακίτην

C feruentem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximūt, experiunturq; si trita ad cotem Hæmatitæ colorem reddat: q̄ si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruūt, & subinde conspiciētes periculum faciunt. Siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato dissipatur. Coarguitur male confectus, scissilibus uenis. Quippe in rectos uenarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq; floridū reddit, Hæmatites uero sanguineum atq; Cinnabarin imitantem, inuenitur in sinopico minio. Fit & e magnete lapide, uehementer am- busto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

B A R B A R I C O R O L L

Pli. li. 36, ca. 20

Hæmatites reperitur in metallis. Vltus Minij colorem imitatur. Adulterant Schisto: sed distinguūt uenæ rubentes. Est & Magnetis genus unum Hæmatites appellatum. Præter hoc qn q̄ genera Hæmatitarum traduntur. Aethiopicum, cui & principatus datur. Alterum Andromamanta uocant, colore nigro, pondere ac duricia insignem: & inde nomen, præcipueq; in Africa. Trahere autem in se argentum, æs, ferrum. Experimentum eius esse, in cote ex lapide Basanite. Reddere enim succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum sanguineum. Tertium genus Arabici, uix reddentis succum ad cotem aquariam, aliquando croco similem, pari duricia cum secundo. Quartū generis Helatites uocatur, q̄ diu crudus sit. Coctus uero Milites, aut etiam Militēs, ad omnia utilior q̄ Rubrica. Quartum ijs adijcitur Schistos, de quo prodius mox agitur.

E X M V E R G C O M M.

Cruento sanguinis colore cōspicitur Hæmatites: & inde illi nomē. Plura eius gñā numerat Plinius li. 36, ca. 20. oīa Italiæ peregrina, ut ex eorū nominibus cōjicere licet. Idem bonitatis oīm notas eodē loco docet: multaq; alia, quæ uidisse in eo inutile nō fuerit. Vtilis medicinæ & inter uitę remedia q̄ndam lapis hic fuit: medebaturq; inter cætera oculis. In quorum usum fiebāt ex eo collyria, ut hic ait, & Aconia: quæ a coribus, quas græci aconas dicunt, dicta in Hebeno pri- mo uolumine certius descripta a nobis fuerunt.

D

De Schisto lapide.

CAP. CXXXVI.

xix. 10. 11. 12.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ contermina gignitur. Probatur maxime, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & serie cohærentium uenarum, Ammoniaco sali simili. Vim exhibet Hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet, muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarū crassiciem, & uuas oculorum, magnopere efficax est.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli. li. 36, ca. 20

Lapis Schistos cognationē cum Hæmatite habet, sed peculiare in Schisto, q̄ splendet. Est & Schistos alterius omnino generis q̄ Hæmatites, quem cognominant Anthracidin, nasci tradentes in Africa nigrū: qui attritus reddat aqua ijs cotibus ab ea parte quæ fuerit ab radice, nigrum colorem, ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbunculi: quarum alie præciosæ sunt, alie uiliores, ut quæ nascuntur in Græcia: Theophrastus autor, ac Plinius.

E X M V E R G C O M M.

Qualis habitu, concretioneq; sua lapis hic sit, nomen, sed longe certius hic scriptor ostendit. Illud a scissili crustarum eius diuisione factum est: hic Hammoniaco sali comparans, certissima nota totam speciem eius indicauit. Plures in græcis Hæmatitæ congenerem Schistum hunc lapidem fecerunt. Sotacus tamen ex antiquissimis scriptoribus, alterius generis tradidit. Plinius duplicem colorem illi tribuit, ab altera parte nigrum, ab altera croceum. Vocariq; a carbonum nigro colore Anthracitem: hic tamen simpliciter ἀνθράξ, id est, croci colore esse dixit. Nosq; ad certiorē coloris eius intellectū, luteū addidimus. Vtilē oculorū medicamētis tm Plin. Schistū lapidē hūc testatus ē. Ideoq; nos credimus, quæ multa numerata a Dioscoridis hoc capite sunt, cōcaua, rupta, procidentia, crassas palpebras, & uuas, oīa ad oculos pertinere.

De Gagatē lapide.

CAP. CXXXVII.

A

IN Gagatarum lapidum genere præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est cōmuni ex parte, squalidus, crustosus, perq̃ leuis. Vis ei molliendi & discutiendi. Deprehendit fonticum morbum suffitus. Recreatq; uulnē stranguationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qui influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

Gagatē aiunt & in Leuco Pamphyliæ (ut arbitror) promontorio, aut Lyciæ, ppe Cypri insulā, expelli mari, atq; infra duodecim stadia colligi. Solinus & in Britania Gagatē gigni tradidit. Planus est, pumicosusq; nō multum a ligno differens, fragilis odore, si teratur grauis. Fictilia ex eo inscripta nō delentur. Accenditur aqua, oleo restinguitur. Deprehendere dicitur uirgines suffitus. Hoc & magi utunt̃ in ea quā a securis argumento uocant Axinomanciā; peruri eū negantes, si euenturū sit, quod quisq; optet. Dictum a fluuio in Lycia cognomine, Diosco. affirmat. Nullum se Galenus in Lycia cōperisse tradit amnē, qui Gages, aut Gagatē uocetur. Photion grāmaticus, oppidū in Lycia fuisse Gagas a Rhodis cōditū scribit. Plinius Rhodiopolin a Gaxis diuersam facit. Stephanus Gagas oppidū in Lycia fuisse, qd Paleontichos ante diceret. Crustaceos uero lapides, atq; nigros, & q in ignē additi exilem flāmam ederent, bituminis odore in Syria Coele inuētos sibi meminit, in collibus mari mortuo circumdatis ad orientē solē spectantibus; ubi & Bitumē q̃q; nascit̃; utilissimos tumoribus in genu diuturnis.

Pli. li. 16. ca. 19

EX M. VERG. COMM.

Qui Gagatem statim sequitur Thracius lapis, a Diosco. & ab alijs dictus Gagatē eadem uia posse, miscendi simul utriusq; noras & euentus Plinio causam dedit, tradendiq; libro. 35. capite. 19. Accendi aqua, oleoq; restingui: qd non Gagatē, sed Thracio lapidi Nican der in Thraciis suis, & hic in lapidum historia aperte tribuerunt. Nicandri de utroq; uersiculi sunt, primumq; de Gagatē. ἄλλοτε δ' ἀσάλην καίον ὑγραγίδα πύρρον, ἢ ὃν δὲ μακροῖο πυρὸς περιναί νται ὀρμαί. Quorū sensus est. Aliquando aut Gagatem siccū lapidē urens, quē ualidi ignis impetus non domat. Accendi quidē igne Gagatem Nican der ait: non tamē ut cætera eo absumi, sed in urendo bituminis odorem tantum sentiri. Paulo deinde post de Thracio agens, inquit, ἡ λείνα θρακίαν ἔνι φλίγας πυρὶ λαὸν ἢ θ' ἰδύασι βροχιδίκα εὐδάνται ἰσχυροί, ἄντην τυτθὴ δ' ἰσχυροῖς ἀπὸ θρακίαν νοχίον ποταμοῖς φέρονται, ὃν πόντον, καλῶσι. Quorum sensus est. Aut Threicium in igne lapidē urens, qui aqua resperfus flāmas agit. Extinguitur autē exiguo insperfo oleo. Lapidē hunc a Thracio flumine pastores quē Pontum nominant afferunt: quē tota est in scriptore hoc Thracij, non Gagatē lapidis historia. Plinius aut quō diximus loco de Gagatē inquit. Mirumq; accenditur aqua, restinguitur oleo. Quod, ut præmonstrauimus, in Nicandro, & ut mox in scriptore hoc in Thracio lapide patebit, nō Gagatē, sed Thracio cōpe rit. Diximus nos cōmitiales suffitus deprehēdere Gagatē, quos hic περιπαικτικῶς palā nominauit. Ceteri interpres acceptā ex Plinio uocē, fonticū morbū dephēdi eo dixerunt: cōiore mali illius indicatione q̃ nunc forte oporteat usi. Alter etiā cōmunem secutus lēctionē, in Cilicia nasci Gagatem ait: cum ex Geographis, Plinio, melioribusq; græcis in Lycia uertendum fuerit.

B

De lapide Thracia.

CAP. CXXXVIII.

Lapis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei Gagatē. Traditur aqua accendi, & oleo restingui. Quod in bitumine accidit.

Thracias

It lapis Thracias, qui exemplaribus Plinij quibusdam Meulla dicitur, trium generum, albidus, pallidus, sanguineis guttis. Non habeo certum proferre. Nomen gentis suæ habet, ut cecinit Nicander: quemadmodum & Cappadoces in Argæo Cappadocij nascentes, simili cum prioribus natura, qui & in lactem cremorem soluatur, ut Galenus & Paulus ægineta scribunt, qui & Ageroton lapidem cōmemorant, astrictoriam, & discussoriam uim habentem, & guttus in inflammationibus auxiliare: quo futores uti soleant ad dandum calcei nitorem. Præter-

Pli. li. 17. ca. 10

Cea & Hieracitin, ut Diogenes scriptū reliquit, subuiridem ex atro coloribus itē alijs respersum, quē qui gesser, muscæ non infestent. Hunc literis quibusdā inscriptis, contra sanguinis eruptiones ualere perhibent. Addiderūt ijs & Indicū, subruustum colore, attritūq; succo purpureo manantē, nec ualido, nec denso corpore. Inuenio & Perdicitin, siue Perdiciatin, et aliū a sorbi similitudine, ut uitrū cognomēto Scythicū, ad oēs duricias pollentes, in compositionē illam quasi ras quæ Pamphlethes, & Diacinnabareos uocat ab Aegineia Paulo. Vitem ad oculos quoq; suffusionē cōmendat, cum felle aspidis acontia uocata, mirabili effectu, post quintum diem repræsentata curatione. Id fel, in serpentis eius dorso, iocinori annectitur, ut Aetio placet.

¶ De Magnete lapide.

C A P. CXXXIX.

μαγνίτης

Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum uergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua multa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magnetem crematum pro Hæmatite. uendant.

B A R B A R I C O R O L L.

Pli, li. 36. ca. 16

Lapis Magnes, quē & Magnitin Græci dicunt. Itē Sideriū & Heraclion, id est, Herculeū. Magnes ab inuētoe uidet appellatus. In India nunc, & passim inuenit in Hispania quoq;. Reperit aut scribitur clauis crepidarū, & baculi cuspidē ferrata hærentibus, cum armenta pasceret. Quinq; genera eius ferunt. Aethiopico principatū dant, argentūq; rependit. Inuenit in Aethiopia Smiri. Ita uocat regio harenosa, ibi & sanguinei coloris, sanguinēq; reddēs, si teratur. Sed & crocum, Hæmatites cognomine, in trahendo ferrū, non eadē natura, qua ceteri Magnetes. Aethiopici argumentū est, q; Magnetem quoq; aliū ad se trahit. Secundū genus Magnesia cum, e Magnesia, & contermina ei Macedonia, a Bebonea locatum petentibus dextra. Tales ruffi, nigriq; sunt. Tertiū in Echio Boëtia, ruffi coloris plus habens q; nigri. Quartū circa Alexandriā Troadem, nigri, & scæminei sexus, ideoq; sine uiribus. Quintū in Magnesia Asiæ, deterrimū (nam & candidus est) neq; attrahit ferrum, similis pumici. In eadem Aethiopia mons haud procul gignit lapidem Theamedem, cui contraria Magneti natura, ferrum cuncte abigens respuensq;. Trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea, uires ab eo lapide concēptas diu retinet. Aliud apprehendens ferrū, ut annulorū catena uideatur: quod quidem imperitum uulgus appellat, ferrum uiuū, uulneraq; ex tali asperiora sunt. Lapis hic & in Cantabria eruitur. Non ille Magnes uerus, caute cōtinua, sed sparsa, Bubbatione (ita appellant) nesciō, an uitro fundendo perinde utilis: nondū enim expertus est quisq;. Auctor Plinius, Ferri utiq; insicit aciem, ut Magnes. Dinocrates architectus Alexandriæ templū Arsinōēs concamerare cœperat Magnete lapide. Intere effrit mors, & ipsius, & Ptolomæi regis, quid sorori suæ fieri cupierat, ut simulacrū eius e ferro pendere in aëre uideret: quod genus præstigiæ, ad superstitionem suam Arabes cōmentum dicunt in eo feretro, ubi auctor eius sectæ conditus existimatur, Diogenianus Magnetem uerum argento scribit esse tam similem, ut decipiat. Nec hunc lapidem, qui ferrum ad se trahat, Magnetem, sed Heraclidean appellandum esse.

D

¶ De Arabo lapide.

C A P. CXL.

ἄραβικος λίθος

Arabus lapis elephanti maculæ similis. Is tritus illitu Hæmorhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

¶ De Galactite.

C A P. CXLI.

γαλακτίτης

Galactites appellatur, q; lacteum reddat. Cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plumbea recondere, propter uim glutini, quod obhæret.

B A R B A R I C O R O L L.

Galactites, ait Plinius, ex uno colore lactis est, succo quoq; eius & sapore, a quo nomē: de hac intelligat, an diuersa, dubium: quando cineris colore traditur a Dioscoride, non lactis. Est & Galaxia, quam aliqui Galactitem uocant, intercurrentibus sanguineis, aut candidis uenis. Nam Chalcia, grandinū & colorem, & figuram habet, unde appellata est, adamantinaq; duricie. Narrat etiam in ignem additæ, manere suum frigus. Ergo Pliniana Galactites, quam

aliqui & Leucogageam, & Sinephyten, & Leucographin appellant, uidetur ei proprior. Quæ A
& Morochthos, & Leucographis, & Galaxia Dioscoridi & Galeno dicitur, ut paulo post lique-
bit. Vtuncq; infantum adalligata collo, saltuam facere dicitur. In ore aut liquefcere: memori
am adimere uel iniuriarum. Mittit eam Nilus, & Achelous quoq; amnis. Sunt qui & Smara-
gdu, albis uenis circumligatū, Galactiten inquit uocent. Est & gemma Galaticos, distans ab
hac, Argyrodamanti similis, paulo sordidior. Inueniuntur aut binæ, aut senæ.

¶ De Melitide.

CAP. CXLII.

Melitites omnia Galactitæ similis. Hoc tantum interest, qd dul- μελιτις
ciorem succum remittit. Eiusdem ut Galactites effectus.

B A R B A R I C O R O L L.

Melitites lapis dictus, quia succū tonfus melleum emittat. Differt ab hoc Melichrus: cuius
plura sunt genera. Melleus colore. Differt & Melitis a malo, cuius imitatur colorē appellatus.

¶ De Morochtho lapide.

CAP. CXLIII.

Morochthus lapis, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida λίον μόροχθον
uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo utpote molli, & facile
liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis
obstruere uidetur, conueniens ijs qui sanguinem expuunt, cœliacis, &
uesicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluctionibus uulua, imposi-
tus uelleri. Mollihus oculorum collyrijs miscetur. Explet enim caua,
atq; delachrymationes sistit. Idem cærato exceptus, ulcera quæ sunt in
teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Molochthus, aut Morochthus, siue ut Galenus & Paulus uocauit, Moroxus, & B
Graphis, haud uideo eundem cum eo esse, qui Molochitis, a colore malua dicitur, spissius ui-
rens: nec translucida, reddendis laudata signis, & infantium custodiæ. Sit aut Morochthus,
quem Plinius in ore ait liquefcere, de quo in Galactite diximus, ex collatione Dioscoridis sub-
odorari potest aliquid, dicentis mollē eum esse, diluicq; facilem, ut uel idem cum Pliniano, uel si
milis esse uideri possit. Nominatur & Morochthos Plinio, sed inter gemmas, lacte sudans por-
raceo. Idem auctor & Leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit, reperisse unq; scie-
tur, eosdem ei effectus reddens, quos hoc loco Dioscorides, Galenus, cæteri, ut propterea non
desint, qui Plinio quasi pro herba lapidem acceperit, increpient. Sed auctor grauissimus, alio-
rum sententiam, non suam opere toto recitat.

¶ De Alabastrite lapide.

CAP. CXLIIII.

Alabastrites uocatus Onyx, creinatus, resina aut pice assumpta λίον ἀλαστρίτης
duricias discutit. Stomachi dolores cum cærato læuat. Gingi-
uas comprimit.

B A R B A R I C O R O L L.

Alabastrites, siue Onyx in Alabastro Aegypti, circa Thebas nascitur: quem in ædificiorū
quoq; ornandis includunt. Nascitur in Syriæ Damasco, candore interdicto, uarijs colori-
bus. Cæteris omnibus candidior. Probatissimus in Carmania: mox India. Iam quidem & in
Syria, Asiaq; Vtilissimus, & sine ullo nitore in Cappadocia. Probatur maxime mellei coloris,
in uertice maculosi, atq; non translucidi. Vitia in ijs corneus color, atq; candidus, & quicquid
uitro simile est. Alabastrites, ad unguentorū fidem laudatissimus: unde uas, id est, Onycem un-
guentarium uocamus, quod & Alabastrum, & Alabastrū quoq; dicitur, cui e uitro interim.
Est & Onyx inter ostrea, ut uolumine secundo patuit. Habet & Onyx gēma: in qua unguis hu-
mani similitudine candorē esse dicitur. Alabastrites porro, & in Arabiæ montibus, & Germania
quoq; reperit, ex quo & uasa potoria, & pedes lectorū, & sellæ delictijs facit. Ict amphoræ, & ur-
cei cadorū magnitudine. Iā columnæ, 30, duos pedes longæ. Sunt q; hac amplitudine, nō Ony-
cem, sed Onychitin uocēt. Differt ab Alabastrite Alabandicus, siue Abalandicus: & eū uiroq;

C modo legitur. Color Alabandico subnigrat ex ruffo. Perfpicius eft, ut ignis, & quibufdā qua-
fi rimulis uenisq; dehifcit. Capillos albos, attritus inficit. Dicitur Alabaftus Democrito, & fal-
omnis, & calx uiua; quæ de putaminibus ouorum conficitur. Hæc ipfa Encephalos quoq; di-
citur a chymicis, & marmor Thebaicum, & Claudianum.

¶ De Thyite lapillo.

C A P. CXLV.

λίθος θυίτης

L Apis nomine Thyites, in Aethiopia gignitur, fubuiridi colore, la-
spidem imitatus. Liquefcens tamen lacium fuccum reddit. Vhe-
menter mordet. Tenebras quæ pupillis obuerrantur expurgat.

B A R B A R I C O R O L L.

L Apis Thyites, a Plinio Mortarium uocatur, quoniam Thya mortarium fignificet: etiam
Acone dictum Hippocrati, ut Galeno placet.

¶ De Iudaico lapide.

C A P. CXLVI.

ιουδαϊκός λίθος

I Vdaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, fcita
admodum configuratione, difcurrentibus lineis quaſi industria
detornatis. Solutus nullam qualitatem manifef tam guſtui repræſen-
tat. Poſſeſt ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum ca-
lidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos
in ueſica comminuere.

B A R B A R I C O R O L L.

Hic & Tecolithos uocari cœptus, quia calculos abſumat: qđ a Galeno falſum exiſtimat.

¶ De Amianto.

C A P. CXLVII.

λίθος ἀμιάντος

A Miantus lapis in Cypro nascitur, ſciſſo Alumini ſimilis, quo ut
pote flexili, pannos tantum oſtentionis gratia texunt, qui ad
ignes coniecti ardent quidē, ſed flammis inuicti ſplendidioreſ exeunt.

B A R B A R I C O R O L L.

D Lapis Amiantus, ueneficijſ reſiſtit omnibus, præſertim magorum. Hoc qđ de lapide A-
diantho dicitur. Texi ex eo uela, quorum ignis uelut aqua ſordes eluat. De lapide quodam na-
ſcente in Caryſtho Euboæ, Strabo reſtulit.

¶ De Sapphiro.

C A P. CXLVIII.

σάπφειρος

S Apphirus lapis, percuffis a ſcorpione potu prodeſſe exiſtimatur.
Contra inteſtinas exulcerationes bibitur. Excreſcentia in oculis; u-
uasq; & puſtulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

B A R B A R I C O R O L L.

S Apphiri aureis punctis collucent, ceruleæ, raroq; cum purpura. Opimæ apud Medos,
nuſquam tamen perlucidæ. Præterea inutiles ſculpturæ, interuenientibus criſtallinis centris.
Sapphirum gemmarij inter Iaspides collocant.

¶ De Memphite.

C A P. CXLIX.

μυμφίτης

M Emphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorū ma-
gnitudine, uerſicolor. Tradunt trito & illito, quæ urenda, aut ſe-
canda ſunt, ſine periculo obſtupeſcere, ita ut non ſentiant cruciatū.

B A R B A R I C O R O L L.

L Apis Memphites, gemmantis eſt naturæ.

¶ De Selenite lapide.

C A P. CL.

σεληνίτης

S Elenites lapis, quem aliqui Aphroſelenon appellarunt, quoniā no-
ctū plenus, creſcente luna reperiatur. Naſcitur in Arabia, candidus,
tranſlucens, læuis. Huius ramēta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad

amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodē frugiferę reddunt. **A**

B A R B A R I C O R O L L.

Selenites, fulgore melleo spicuius nomine accepto, quia imaginem Lunę reddit in dies singulos augescens, minuentisq; numero. Hunc semper Galenus Aphroselenon appellat, Chymistę Aphroselenon, etiam Comarin, & a leuitate ponderis Cupholithon, & Argyrolithon quandoq; uocant. Habetur & Comaris apud eos Scythica, pro Arsenico & sulphure. Itemq; pro lapide philosophico, toties a nobis indicato, coarguendi potius & irridendi proposito, q̃ monstrandi. Seleniten Eustathius alium quoq; lapidem intelligit, qui & Asterius, & Lychnites uocetur, nascens in Thracia Pallenes littoribus, auctore Dionysio. Plinius Lychniten ab Asterio diuidit, itemq; Selenite. Sed ut herbarum, sic & lapidum uocabula confundimus.

De Iaspide lapide.

CAP. CLII.

Iaspidium quedam Smaragdum imitatura. Alia Chrysellū, similis pituitę. Alia nō dissimilis aeri; ob id uocatur Aerizousa. Alia ueluti fumo infecta, quę Capnias ex argumento uocatur. Quędā lineis albis & resplendentibus præcingit, Assyrios appellata. Alia Terebinthinę similis, quę Terebinthizusa dicitur. Alia colore Calaida gemmā æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensę.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis sepe trāllucet ac uiret. Smaragdo similis Indica est. Cypria, colore glauco & pingui. Persica, similis aeri: quę ob id Aerizusa uocatur. Thermodontiaca, cerulea; & Scythica inter ceruleas omnes optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo cerulea, atq; non effulgens. Thracia Indicę similis. Chalcidica turbida, præfertur omnibus, quę purpureę quicq; habet: secunda quę roseę: tertiā quę Smaragdi: quarta cœlo autumnali matutino similis: quę Boëa appellat, & Aerizusa. Similis est & Sardę, imitata & uiolas. Non minus multę species relię: sed omnes in uitro ceruleę, aut chrysallo similes, aut pituitę, atq; muco, siue ut Plinius, Myxis. Item Resinę Teberinthi, quā & Terebinthi Zusan uocant, inter ceruleas & ipsam mārē existimantes. Nam quę Iaspachates appellatur, ex Iaspide Smaragdo similis, et Achare proprietatem suā habet. Præstantiores Sphendone, id est, funda cludi solent, id est, parentes, nec præterq; margines auro amplectente. Vitiū est & breuis nitor, & longē splendēs, & sal & omnia, quę in cæteris gēnīs nitro adulterata coarguitur, extra fulgorē spargendo, atq; nō continendo in se, nec in diuersa. Quę Sphragides uocantur, quoniā optimę omnium signent: ea quę Smaragdo similis p̃ transuersum linea candida p̃cingitur. Orienti familiarissima, pro Amuleto Garāmatis uocat, quę pluribus Polygramos. Est & Onychi puncta, quę Iaspónyx dicitur, & nubē cōplexa, & niues imitata, quę stellata rutilis punctis est, & salī megarico similis, & fuinida, Capnias, siue Capnitris appellata. Magnitudinē Iaspidis, undecim unciarū uidit antiquitas, effigie Neronis thoracata. Inter ceruleas, post Scythicę Cypria; post quā Aegyptia. Adulterat̃ maxime tinctura, Idq; in gloriā Regū Aegypti ascribitur ei, q̃ primus tinxit, inest aliquando ceruleis aureus pulsus: nō ut in Saphiris puncta. Galenus Iaspide medicinę utilē, Chloron Iaspin, hoc est, utridem cognominat. Inscribi iussit in Iaspide draconem radios habentē Necepsos Rex, ad stomachi fulturā. Sed idem pfectus est, in torq̃e suspensio eo rudi, ita ut os stomachi attingat.

De Aetide lapide.

CAP. CLIII.

Aetides lapis est ueluti prægnans, cum quatitur alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricę sunt uulue & parū tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueatur, & seminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditū offerat. Fur em̃ mansum deuorare nō poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cū eo, deuorare non poterit. Tritus & cætrato exceptus, cyprino, aut gleu-

C cino, aut alio excafaciente, comitiales magnifice iuuat.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapis Aëtites, quem aliqui Gagiten dixerunt, Strabo Gangiten, in Armenia repertum scribit: quo serpentes fugant: hunc, an alium accipiat, nondum liquet. Inaedificatur nido aquilae, non tamen omnium, nihil igne dependens: sed vis eius medica, non nisi nido direpti. Aiunt binos in uentri, marem, & foeminam: nec sine his parere Aquilas, & ideo binos tantum. Genera eius quatuor feruntur. In Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam suauem, candidam. Ipse friabilis: quem foeminam existimant. In Arabia mas durus, & similis gallae, aut subrutulus: in utero continens lapidem durum. Tertius in Cypro, colore Africani, amplior tamen atque dilatus. Caeteris enim globosa facies. Habet in aluo harenam iocundam, & lapillos. Ipse tam mollis, ut etiam digitis fricetur. Quarti generis Taphiusus uocatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiussa: qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucaden: inueniturque in fluminibus candidus ac rotundus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur Callimus: nec quicquam tenerius. Nam Calais, aliud genus est lapidis, a quo & Calainus color, pro Veneto, si Phorioni credendum est. Ego etiam sordidum colorem, Plinium secutus, Calaini appellationem possum capere. Amplitudinem inquit conspicua, sed fistulosa & sordidum plena est Calais. Hic & Augites a multis dicitur. Quae uero Calaina ostraca nominat Aetius, pilos extenuantia, considerantibus relinquo. Apud chymistas uiuae calis aquam inuenio Calainon uocari. De Calaino etiam colore, Dioscorides in lapide supra mox commemorat. Idem Aetien pro Chrysolitho, & Porphyrite, & Chrysochromo cognomine Macedonico, & Polychromo accipitur.

De Ophite lapide. CAP. CLIII.

οφιτης

Ophitae genera multa. Quidam grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

B A R B A R I C O R O L L.

Ophites, marmor est serpentium maculis simile: a quo nomen. Duo eius genera: molle candidum: nigricans durum. Ex Ophite, columnae nisi paruae admodum inueniuntur. Inter Ophitas existimari fere possunt, propter colorem, quod Augusteum uocant & Tiberium. In Aegypto utriusque principis temporibus reperta. Differunt, quod maculas diuerso modo colligit. Augusteum undatim crispatur in uertices: Tiberium sparsim, conuoluta canicie spectatur. Theophrastus lapidem Chium uocando, uidetur Ophitem intellexisse. In Aegypto inquit, nascitur lapis niger, translucidus, Chio similis. Quem locum Plinius ita uertit. Theophrastus inquit auctor est, transparentes lapides in Aegypto inueniri, quos Ophitae similes ait. Fortasse, quia uersicolores illas maculas, ut ait Plinius, primae Chiorum lapidicinae ostenderunt.

De Lapidibus Spongiarum CAP. CLIIII.

LAPIDES in Spongijs inueniuntur, qui uesciae calculorum punct, in uino poti.

B A R B A R I C O R O L L.

Lapides, qui nascuntur in Spongijs, & ipsi uocantur Spongiae, quidam eos Cysticolithos uocant: quia uesciae medeantur. Sunt & Pumicum in genere, quos Spongas uocant: ut in Pumice docuimus.

De Lithocolla. CAP. CLV.

λιθοκόλλα

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autem ex marmore, lapide pario, & taurino glutino. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

B A R B A R I C O R O L L.

Lithocolla nomine, significat glutinum ex lapidibus.

De Ostracite. CAP. CLVI.

A

Ostracites testæ similitudinem habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino sistit. Si quattuor diebus a coitu bibatur sicilici pondere, fœminis prestat ne concipiant. Cum mel, le autem impositus, maniarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

εστρακίτης

BARBARI COROLL.

Ostracites a testa nomen habet. Translit & ad gemmas. Si quidem, ut Plinio placuit, Ostracias, siue Ostracites, altera est testacea & durior, altera Achate similis. Nisi quod Achates politura pinguescit. Duriori tanta uis inest, ut aliæ gemmæ scalpanitur fragmentis eius. Habetur & Ostracides, cui Ostrea nomen, & similitudinem dederit.

De Smyride. CAP. CLVII.

σμύρις

Smyris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, et urendum utilis. Gingiuis quas humor uexat, prodest. Dentificio commendatur.

BARBARI COROLL.

Nota uulgo Smyris, uel ipso nomine, quam Smyrium potius quàm Smyrin officinæ appellant, cuius fragmentis gemmæ aliæ scalpanitur: quo usu Plinius secundus non Smyrin, sed Ostraciten uocauit, ut superius proxime notauimus.

De Harena. CAP. CLVIII.

ἄμμος

Harena e littoribus sole seruescens, hydropicorum tumores expugnat, si capite tenus in ea obruantur. Torreretur ad aridos fortius, pro milio, aut sale.

B

BARBARI COROLL.

Harena littorum, græce Psammos, & Hammos Aegialitis uocatur. Quæ porro calculosa lapidiosaque est, Acholax poetis dicitur. Harena secantur marmora premente eam ferra, in prætenſu linea uersando, tractusq; ipso diuidente. Aethiopica ad hoc maxime probatur. Proxima Indica, & scabrior: qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia, & a Coptis quæ uocatur Aegyptia. Postea inuenta est, non minus probanda, ex quodam Adriatici maris uado exsistit nudante, obseruatione non facili. Fraus deinde secandi, quacumq; harena fluuiatili, quæ quod, crassior est laxioribus segmentis terit, ita sectæ attenuantur crustæ. Polituris accommodant Thebaica, et quæ fit e pumice, aut Porro lapide, hoc est, Toſo. De Sabulo puteolano, Campanoue, ite de Etrusco, quod proprie Carbunculus uocatur, nihil dicturus sum, nisi quod Campanum ex uſta terra, Carbunculus ex cocta materia efficitur. Auctor Vitruuius. Romæ uulgo Puteolana dicitur harena quocumq; loco fossilis, modo quæ in calcem conueniat.

Pli. li. 36. c. 11

De Cote. CAP. CLIX.

καόνιος γαλίαν

Ecote Naxia, quod exacuendo ferro detetitur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec incrementum patitur. Potum ex aceto lienem absumit.

BARBARI COROLL.

Cotes, siue lapis Naxius, id est, Acone, sicut olearis Cotes, Elæ cone. Diu placuit Cotes, e marmore Naxio, ut & simpliciter Naxium dicatur. Ita uocant in insula Cypro genitas. Viceri postea ex Armenia. Differre putant Cotem a lapide Coticula: uon solum inueniri, nisi in flumine Timolo, siue Timolo (nam utroque modo recte dicitur) a monte, ut arbitror, cognomine in terra Lydia. Nunc uero passim quæ alij Heraclium, & Lydium appellant. Sunt autem leues, & calculis similes, quaternas uncias longitudinis, binasq; latitudinis non excedentes: siue ut Theophrastus inquit, calculi amplissimi, dupla magnitudine, peterea specie lata, non rotunda: quod a fossilis in his melius, quàm a terra, Sed & caloribus uinodis deterius respondet. Fiunt enim asperg

Pli. li. 36. c. 11

Cne quadā ex alto reuocata, quasi ſubricę, ut idē Theophrastus ait. Iis Corticulis perſi cū e uena ſiue nūmo lima raperint, experimentum protinus dicunt, quantum auri, quantū argenti aut æris habeant ſcrupulari differētia, nunq̃ fallente ratiōe: incipientibus a minimis notis, hoc erat graniū, poſt colybus, tū duo chalchi, dein quatuor moria, ut Theophrasti uerbis agā. Lapis & Chryſitis, & Baſanos chryſochoice, hoc eſt, index aurarius uocaſ, quo, ut gręci aiunt, aurū explorat, obryzū ſit, atq̃ probū, an improbū uitioſumq̃. Quanq̃ Baſaniſtes & p mortario qnq̃ accipit. Porro dicitur Obryziū, quaſi abryzū, hoc eſt, delicatū ſincerū. Vt Phorionis etymo utar. Vo cāt aut Obryzū, q̃tiens ſimili colore rubet ignis, ut inq̃ Plinius, & aurū qd apyrō appellāt, purum eſt: idq̃ habet nomen, gaigne nō egeat: quale arabicum eſſe Diodorus tradit; qd inter Abileos, Gaſandofq̃ foditur. De arabico Auro & literę ſacrę meminerunt.

videtur yndidit

G De Lapidē Geode. **CAP. CLX.**
Eodes lapis, adſtringit, ſiccāt. Caligines oculorum diſcutit. Illitus autem ex aqua, teſtium maſſarumq̃ inflāmationes ſedat.

E X M. V E R G. C O M M.
E X M. V E R G. C O M M.

Repetemus & id quidem q̃ breuiſſime licebit, ex gręcorum decretis, quas uniuerso lapidū generi uires, priuatimq̃ ſingulis, & his præſerim quos deinceps ex toto eorum genere hic ſcriptor numerauit, naturam diſſe antiquiores deprehenderunt. Quę huiuscemodi ſunt. Siccāt non aliter q̃ Terra omnis lapides omnes. Priuatim tamen Magnes, quem & Heracleum lapidē uocant. Hæmatitæ aequales habere uires dictus eſt. Notus ubiq̃ hic lapis, mirabili naturę euentu, ex interuallo ferrum ad ſe trahens: & quaſi ſenſus, manuſq̃ illi ſint, omnium rerum domitricem materiam illam cedere & parere ſibi cogit: non aliter q̃ toto orbe monſtra ceſſiſſe quondā uiribus Herculis traduntur. Ob quam cauſam ab Hercule Heracleum credere aliqui dictū fuiſſe. Verumtamen non deſunt qui non ab Hercule, ſed ab Heradia Magnete dictum uelint. Et quemadmodum a Magnesia Magnes, ſic Heradius ab Heradia dictus fuerit. Sic Lucretius libro. 6. credidit dicēs. Quod ſuper eſt agere incipiam, quo ſedere fiat Naturę lapis hic ut ferrum ducere poſſit. Quem Magneta uocant, patrio de nomine Graſ, Magnetum quia ſit patrijs in ſi nibus ortum. Et ſi Plinius autore Nicandro, a Magnete inuentore nominatum teſtetur. Euripides non hunc Magnetem in carmine ſuo uidetur uocaſſe, ſed Indicem, quo argentarij utuntur. Verſiculus eiſ eſt. τὰς βρωτῶν γνάμας σκοτῶν ὅσα μαγνῆτις λίθος. Quod eſt, Hominū mentes ueluti Magnes lapis probans. Arabicus Ebori ſimilis, ſiccandi repurgandiq̃ uires habet. Laſtarius ſciſſili eadem omnia, ſed minore efficaciā poteſt. Melitites a ſapore mellis nominatus quadā tenuis caleſcit. Morochthos, quem a candore lactis Galaxiam, & Leucographida uocari Dioſcorides ait: quo prædictis omnibus mitior eſt, quia nullas habet efficacioreſ uires, eo mſgis ſine dolore curat. Eamq̃ ob cauſam, in mollibus corporū partibus ad inducendās cicatrices uſa eo antiquitas eſt. Plinius tertiam lapidis huius appellationem inter herbas numerauit lib. 27, no minis uicinitate cum leuce deceptus. Poterunt uidere id uolentes. Nos enim feſtinantes hęc tū ſignamus: præſertim, cum ante nos aliq̃ id etiam deprehenderint Alabaſtritz cinerem qdam ex ueteribus bibendum dederunt cibum in ſtomacho non continentibus. Hunc primo Onychē, ab humani unguis ſimilitudine ueteres gręci nominauerunt: quemadmodum ſecundo uolumine in Indico Onyce diximus. Nunc eo loco dictis adijciendum eſt, gręcos præter Onychem Alabaſtrem etiam uocaſſe, ab uſu. ſ. qm̃ ad Alabaſtra unguentorū uſus eiſ eſſet. Fuerunt aut gręcis Alabaſtra lapideę pixides, in quibus ob frigiditatem ſuam diutiſſime & feliciffime odores ſeruarent: ſic dicta, quoniā ob leuiorem ſuum e manibus laberentur. Et qm̃ ex Onyche hoc alabaſtra illa fierent, ideo Alabaſtrites lapis dictus eſt: priuſq̃ Onyx fuit: tum facta ex Onyche alabaſtra Alabaſtritz uocari lapidē fecerunt. AEqui uoca in gręcis, ut uidetur, ad unguem & lapidem Onycis uox eſt: poteritq̃ aliquando ubi parum certa res ſit, legētes fallere: quemadmodum primo uolumine in Bdellio dubitari poteſt, lapidi ne, an ungui id Dioſc. comparauerit. Simpliciter enim ὄνυξι λίθος eſſe ait. Nos nihil illi aliud adiectum inuenientes, unguem uertimus: id enim tutius uſum eſt, & ſi Alabaſtritz huic lapidi ſimile forte Bdellium ille fecerit. Qd tunc relictum monuiſſe nunc ſatis ſit. Quemadmodum a mortariorum uſu Thyitem eum qui ſtatim ſequitur dici intellexiſſe. De quo præter tradita a Dioſc. nihil certum in antiquis gręcis inuenimus. Diſſicere renum calculos dictus ab illis Iudaicus eſt. Ob eaſq̃ uires poſteriores gręcorum medici Tecolithon, id eſt, calculos abſumentem eum uocauerunt, Sapphirū cōtra ſcorpio

hum iſtus bibi utiliter, ſedem græci dixerunt. Lunarem comitialibus utilem. Iſpidem, qui uiri di colore ſit, alligatum, & in anulo geſtatum, cibum in ſtomacho non continetibus prodeſſe. Qui autem ſubuiridi, qm̄ efficacior ſit, oculorum cicatrices & pterygia extenuare. Ophitæ ad alligatum, contra uiperarum morſus prodeſſe. Calculos in ueſſicis frangere, in ſpongijs inuen tos lapides. Oſtracem, & Geodem, id eſt, terram intra ſe complexum, efficacius ad ſiccandū ui eſſe: ideoq; inflammatis tumoribus egregie prodeſſe. Smyrim repurgandi uim habere: ideoq; denſiſſis accōmodatum eſſe. Refrigerandi uim habere etiam crediderunt ueteres græci, quod ex Naxia cote confricato ferramento detritum fuerit: eaq; ui creſcentibus uirginum māmīs, & puerorum teſtibus utile. Quod uero ex olearia Cote detritum pariter fuiſſet, capilli deſluuiā, quas alopecias dicunt, explere. Plures alios etiam medicinae utiles lapides numerauerunt poſt hunc ſcriptorem poſteriōres græci: uerū ab eo reliſtos, nos etiam relinquimus; in re quæ iam pridem deſijt in honore eſſe, legentes monuiſſe haecenus contenti.

De Terra. CAP. CLXI.

OMnis terra ad medendi uſum recepta, ſumma & primam uim habet occludendi. Sed ſpecie diſtant, cum alia adiunctis quibuſdam, ad alia ſit utilis.

BARBARI COROLL.

Terra, hoc eſt Ge, omnis ſicca eſt in medicina ui, præſertim appellata Georgumene, hoc eſt, agricolaris. Nam terra Aegyptia, e luro eius ſit. Sunt qui Aegyptiam, pro ſingulari terra inter pretentur. In nomine eſt & Cretica, minus pollens, & plus habens æris q̄ ceteræ: uſus ad exte rendas ſordes argenteis uasīs celebratiſſimus. Et Armeniæ glebæ locus, ſiue lapis ea, ſiue ut Ga lenus n̄iauit terra nominetur: quia maſceſcat aqua interius, non ſumma tñ cute, ut lapides. Vul garo eius uſu, contra peſtilentiam, quæ Galeni ætate fuit, & contra deploratos phthiſicos: ob id in Africā & Alexandriā nauigare ſolitos, ex Armenia Cappadociæ cōtermina inuehit: ui ma xime ſiccifica, luteo colore, aut pallido, teri faëllis, uſi mō lapidis: minimū tñ harenola lapido ſaue, ſed Samio Aſteri leuore ſimilis, uerū pōderoſior ac denſior. Syri eā Zaznachia appellāt, ut Aetius ingit, urbē in cuius mōre naſcit Vagauanaga uocari: agri in q̄ mōs ille ſit Agaraces uulgo dici, cui ſimilis ē effectus, quæ Alanæ cognominat. Eſt & Carafenia ex oppido Tauricorū peninſule, qua uulnera oīa ſanant. Quod aut genus Cretæ ſit, quā Hippocrates Schediada no minauit, duorum diſcriminū, haud plane ſcio: quemadmodū nec illam quam Conchylū Xen ophon, alij Cenchylū uocant lapidem, ut ingit Pollux. Agricolaris duæ ſumæ differentiæ, in ſinitis inter eas medijs. Nigra, quæ & pinguis eſt. Alba, quæ græci uocant Argilon, hoc eſt, Ar gillā, Sabulonī ſimilē, aciei unā, ſordidā, ſamelicā. Sunt & alia duo. Terræ gna. Pharmacitis, hoc eſt, medicata: cuius ſpecies Eretrias, & Samia, & Rubrica, & Lemnia, & quæ ſequuntur cæteræ. Metallicum: in quo lapidēs, & fere quæcunq; ſupra diximus, oriſi a Cadmia.

De Eretriade. CAP. CLXII.

Eretriæ duæ ſunt, una uehementer alba eſt, altera cinericia. Opti ma habetur ad cinereum colorem uergens, perq̄ mollis, quæ ſi per aramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam reſert. Lauatur ut Ce ruſa, aut hunc in modum. Teritur ex aqua, & ubi peſſum ierit, humor leuiter excolatur. Siccata ſolibus iterum teritur, interdū adiecta aqua, ut ueſpere conſidat. Antelucanis colo excernitur, & demum in ſole tri ta, ſi fieri poteſt, digeritur in paſtillos. Quod ſi toſta deſyderetur, paſtil li magnitudine Ciceris in fiſtule perforatū conijciuntur, oreq; uasīs di ligenter obturato, ſupra carbonēs continenter ſolibus perſtantur. Vbi uero cinis in ſauillas ſe conuertit, aut æreum colorem contraxit, exem pti reconduntur. Vim habet adſtringentem & refrigeratōriam, leuiter mollientem. Caua explet, & ſanguinolenta conglutinat.

BARBARI COROLL.

Eretria, & Eretrias terræ ſuæ nomen habet. Hac Nicomachus & Pārapius uſi.

Pli. de terræ ge neribus lib. 17. capite. 8.

B

ipſe pido

C

πρ σαμία

¶ De Terra Samia. CAP. CLXIII.

Samia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quam aliqui Collyrion, & uocant & uocant. Duæ enim species eius. Vnam ante diximus. Altera Aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædêsa. Vritur ac lauatur ut Eretria. Vimq; consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Foemina fluxione uulug laborantibus, cum flore syluestris punici datur. Testiũ & mammarũ inflammationes illita ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arceat. Contra serpentium morsus et uenena pota ex aqua auxiliat.

B A R B A R I C O R O L L.

Terra samia, genus est candidi coloris, quemadmodum & Melinon, de quo in Creamellina differitur. Porro Samia quæ Aster uocatur, globosior est q̃ species eius altera Collyrion, utraq; tamen candida. Nascitur & in Samo quoq; Melinum, sed pictiores eo quod sit e Samo nõ utebantur, propter nimiam pinguitudinem, sed eo quod e Melo. Accubantes effodiunt ibi, hoc est, nõ stantes, sed aut in obliquum, aut supini uenas scrutantur in saxis, autore Theophrasto: quæ ut Iulius Pollux inquit, Geophania uocantur, Aster, non nisi quarta demum aggressione proditur.

¶ De Samio lapide. CAP. CLXIII.

λίθος σαμίας

Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur possuendo auro, ut resplendeat. Probatur candore & duricia. Vis ei adstrictoria, et refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & ulcera cum lacte efficax est. Paratus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit.

D

χρῆμα γῆς

¶ De Chia terra. CAP. CLXV.

Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem glebosa, albaq;. Sed ficticijs formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ. Extendit faciem, & erugat, atq; splendidam reddit. Colorem in facie & corpore toto commendat. In balneis pro nitro deterget.

¶ De Selinusia terra. CAP. CLXVI.

εὐδίνουσία γῆ

Eadem præstat Selinusia. Maxime laudatur quæ uehementer resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

B A R B A R I C O R O L L.

Selinusia, lactei coloris est, eadẽq; lacte diluta, renouandis albarijs tectoriorũ probatur.

κίμωλία

¶ De Cimolia. CAP. CLXVII.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraq; aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duricias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

BARBARI COROLL.

Terra Cimolia, siue ut Hippocrates & Pollux & Nicocharis appellant, terra Meftis, siue Smeftis, ab exterſu a Cimolo quidem, una Cycladiū. Sed tñ laudatur maxime Theſſalica. Naſcitur & in Lycia, circa Bubonem oppidum. Eſt & alius uſus Cimoliae in uestibus. Nam Sarda, quæ aſſertur de Sardinia, candidis tantum probatur, inutilis uerſicoloribus; & eſt utiliſſima omniū Cimolię generi. Precioſior Vmblica, & quam uocant Saxi, q̄ creſcit in macerando, atq̄ pōdere eniſ; Illa uero menſura, Vmblica nō niſi poliendis uestibus aſſumbant. Primū igit uestibus abluebatur Cimolia Sarda, dein ſulphure fuſſiebat; mox deſquamata Cimolia, quæ eſt coloris ueri. Fucatus enim nigreſcit, & eſundit ſulphure: ueros aut̄ & p̄cioſos colores emollit Cimolia, & quodā nitore exhilarat contriſtatos ſulphure. Candidis uestibus Saxi utilius a ſulphure, inimiciū coloribus. Græcis uicem Cimoliae Gypſum tymphaicum implebat.

De Pnigite terra. CAP. CLXVIII.

Quæ Pnigitis dicitur, colore Eretria ſimilis eſt, grandioribus tantum glebis. Manum ſi quis admoueat, refrigerabit. Taſtu linguæ uſq̄ adeo glutinoſa, ut penſilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliae, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretria de uendunt.

P Nigitis, nigra eſt, ut Ampelitis, glutinoſior quandoq̄ q̄ Samia.

De Teſtis. CAP. CLXIX.

Fornaceæ Teſte, uehementer toſtæ, cruſtas ulceribus obducunt. Quare prurigini, & pabularum eruptionibus medentur. Podagricis proſunt. Strumas diſcutiunt, cærato exceptæ.

BARBARI COROLL.

T Eſtas, Oſtracæ uocant græci.

De Terra fornacum. CAP. CLXX.

FORNACVM terra, quę retorrida ſulueſcit, eiſdem cum Teſta effectus.

BARBARI COROLL.

Terra uſta, ſiue toſta, itemq̄ ruſſa, quæ a græcis Catopos & Caminitis atque Pyrra dicit̄, nō eadem eſt cū ea, de qua Plinius ita meminit. Uſta caſu primū repta in cœdio, Pyrræ ceruſſa in orcis cremata, quam primus Nicia tabulis inuſſerit. Optima nunc Aſiatica habetur uſta, quæ & Purpurea inquit uocatur. Preciū eiſ in libras æris quinq̄. Fit & Romę uſta cremato ſilice mar moroſo, reſinctu aceti, purpureo colore, ut inquit Viſtruius. Sine uſta non ſiunt umbræ.

De Melia terra. CAP. CLXXI.

Melia colore cineream Erethriam imitantur, aſpera taſtu. Ea diſgitis friata, deaſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminōſam, ſed remiſſiuſculam, id quod guſtu deprehenditur. Modice linguā ſiccata, purum corpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Viti ligines & lepras abſtergit. Piſtoribus uſum præbet, ut colores diutius perennent. Emplaſtris quæ Chlore dicuntur, efficaciter inſeritur. Ex omni Melia terra, & omni alia in uniuerſum, eligi debet recens, molliſ, non lapidoſa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile reſoluatur.

BARBARI COROLL.

Colores, præter Ceruſſam, candidi erant antiquitus duo. Melinum, ab inſula Cycladiū Melo dictum; quod & in Samo quoq̄ naſcitur, ut diximus. Linguam taſtu ſiccata omne Melinum. Taxatur in libras, ſingulis ſextertijs. Melinum porro, a terra Melina, ſiue ut græci appellant, Me

Cliade, atq; Melia nihil distat. Alterum candidi genus, Paretonium uocatur. Nomen loci habens ex Aegypto. Spumam maris esse dicunt, sordidatam cum limo, propterea & minutas in eo spectari conchulas. Fit & in Creta insula, & Cyrenis. Adulteratur Cimolia decocta, conspissataq; Preciū optimo in pōdo sex librarum. E candidis coloribus pinguisimo, & ppter lguorē tenuissimū tectorijs. Fuit & Smyrnæ terra, Theodotios ita nominata, quia Theodoti fundus erat, in quo id genus Crete primo fit inuentum. Hanc Plinius inter candidas enumerat, quæ ueteres inquit, ad nauium picturas utebantur. Victruius inter uirides, optimā credi uoluit.

¶ De Ampelitide terra. CAP. CLXXII.

Amptilitis

EX Ampelitide terra, quæ Pharmacitis nomine, in Seleucia iuxta Syriam nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ carbones referēs, assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tinguendis capillis idonea. Vfus ad illinendas uites sub germinationis tempus. Vtpote cum innascentes uermiculos enecet.

BARBARI COROLL.

Ampelidis, bitumini est simillima. Vocatur ita, quoniam uitis, quæ gemant illitis, arcere creditur uermes Ipsas, siue Senipas a grecis appellatos, a nobis Voluoces, & Conuoluolos; etiam si Voluocem alij dumtaxat intelligunt, qui prærodant pubescētes uuas. Theophrastus hæc in Cilicia coqui tradit, atq; ita lentescere, ut iteq; obungere. Hæc & Pharmacitis dicitur, etiam si nomen hoc medicatis omnibus commune est, ut inquit Galenus.

EX M. VERG. COMM.

Quod ad omnem terram cōmuniter priuatimq; hanc, aut illam a grecis traditum pertinet, sic se habet: Siccat omnis terra: & nisi mixtam, coniunctamq; sibi aliam haberint qualitatem, nullam habet erodendi uim. Sin autem feruida illi qualitas aliqua accesserit, eā omnem lotura amittit. Primumq; a ueteribus grecorum medicis efficacissime adstringere Eretria dicta est. Crematamq; & lotam sine erosione siccare, & in toto eius genere probari & anteponi cunctis alijs quæ cinereo colore est. Samiam, quoniam glutinoso lentore fit, uilem omnibus quæ leniri oporteat. Omnesq; sanguinis eruptiones, quacunq; parte erumpant, compescere. Chiam & Selinusiam maiore & efficaciore repurgandi ui esse: ideoq; mulieribus ad nitorem & leuorem cutis usum eius fuisse. Quinetiam carnibus ulcera explere, & ad cicatricem perducere, præsertimq; ambusta. Cimoliam, quam a Cimolo insula nominauerunt, mixtas refrigerandi discutiendiq; habere uires: & hoc simplicē, nec lotā: lotā uero magis refrigerare, & ambustis ex posca mederi. Phigitim deinde pares Cimoliæ uires habere. Hanc nigro colore esse tradiderunt ueteres greci. Ampelidem a uineis appellatam ferunt: q; contra innascentes uitis uermes, gemmasq; earum erodentes, usus quondam eius esset: siccandi discutiendiq; egregias habere non sine erosione uires. Numerauerunt & alias aliquot relictas ab hoc scriptore posteriores greci. Aegyptiam, cuius luto contra incipientes cutem subire aquas, & duratos lienes uretetur. Creticam, quam sine erosione similem Ampelidi constituerunt. Alanam, quam Armeniæ glebæ æqualem fecerunt. Omniumq; postremam Armeniam glebam, quam adhuc Armenium Bolum uocant. Cuius multiplex fuit & est in medicina usus. Numerabantur ab eis etiam in Terræ cœsu Lemnia, Sphragis, Sinopis, Rubrica, & Fabrilis. De quibus quoniam nō multo ante priuatim actum ab hoc ipso scriptore, & a nobis est, nihil ultra hoc loco agetur.

Barb.

¶ De Fuligine pictoria. CAP. CLXXIII.

Flugo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. Si quidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax. Fracta cum rosaceo cerato, ad cicatricem perducit.

BARBARI COROLL.

Pli. li. 35, ca. 6

Flugo hæc a grecis Asbolon, & Asbole uocari solet. Inuenti sunt pictores, qui & sepulchris carbones infectos effoderent ad atramentū tectorium, siue quod idem est, Pictorium. Sed cōmodius tñ fit ex fuligine, resina exusta, aut pice: propter quod officinas & laconica etiam ædifi-

cauere, fumo excipiendo. Fit ex sarmentis, sed laudatissimum e tedarum Schedijs, ita enim uocat allulas Vitruius. Igitur Fuligo quæ parieti & cameræ curuaturis adhærescit collecta, partim componitur ex gummi subactio ad usum atramenti librarij, partim tectores glutino ad mixto in parietibus utuntur. Adulteratur fornacium, balnearumq; Fuligine, quod ad uolumina scribenda utuntur. Sunt qui & uini facem arefactam excoquant: quæ si ex bono uino fuerit, Indici speciem imitari uideatur. Polygnotus & Mycon e uinaceis fecere, Tryganori uocatum. Apelles commentus est, ex ebore combusto, quod Elephantium uocant. Fit & e tædis ligno combusto, tritisq; in morario carbonibus. Mira in hoc Sepiarum natura: sed ex ijs non fit. Omne autem Atramentum sole perficitur, librarium, & tectorium, glutino admixto; quod autem aceto liquefactum est, ægre cluitur.

E X M. V E R G. C O M M.

Facilis cognitu pictoriæ Fuliginis huius in Vitruiuo confectio est. Eam longius scriptor ille septimo suæ architecturæ libro tractauit. Poterunt uolentes ab eo non eius tantum, sed librarij Atramenti etiam, quod statim sequitur, certam audire rationem: ideoq; nos nihil ultra de his agimus. Mōnemus tamen, quod in hoc capite a Barbaro uersum est, fracturas perducere ad sanitatem Fuliginem hanc, assumpta cæra Rhodia, longissime a Dioscoridæ sensu abesse. Neq; enim quod hic ait, *εν ποδὶν κερωτῇ* ad gentem & insulam Rhodum pertinet, sed ad caeratum quod rosaceo unguento coactum fuerit. Notiores, & toto hoc opere totiens repetita, ut ostendi a nobis aliter non debuerit.

De Atramento librario. CAP. LXXIII.

Atramētum quo scribimus, Fuligine e tedis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ Fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam e Resinæ fumo, & pictoria Fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, Gonus sesquilibra, Glutinis taurini, Atramenti sutorij, singulorum sesquuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua commode illinitur. Sed non ante soluatur q̃ cicatricem iuduxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decidit. Cæterum habes amicissime Ari abunde, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materię & auxiliorum medicinalium copia.

B A R B A R I C O R O L L.

DE Atramento scriptorio, quod & librarium uocatur, & græce melan graphicon, dictum est in Fuligine pictoria, Chalcantho, Melantheria.

L i iij

Finis LIB. Quinti.

P E D A C I I

D O S C O R I D I S

De Medicinali materia. LIB. Sextus.

I O. R V E L L I O interprete:



V P E R I O R I B V S amicissime Ari libris, tra-
didimus de aromatibus, oleis, unguētis, arboribus,
& eorundem fructibus, lachrymisq; : Item animali-
bus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, hær-
bis, radicibus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc ue-
ro totius operis ultimo, facultates eorum recensebimus, quæ prodesse no-
bis, aut officere possunt. Vitantes itaq; nomenclationis tædia, ad insti-
tutum reuertemur. Huiusmodi autem Tractatus, cum bifariam distri-
butus sit, in partem uenena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes;
aut siquando per imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant,
irritaq;. Et in partem auxiliatricem. Primum disseram de præcauen-
di modo: quem esse difficillimum plerique Maiorum arbitrantur, q̃
D dantes clam uenena, ita insidias temperant, ut peritissimum quemq;
decipiant. Siquidem uenena sua amaritudine, permixtis dulcibus spo-
liant, & graue odoris uirus mixtura odoramentorum eximunt. Aut
medicamenta immiscent, quæ leuandæ ualitudinis gratia dari solent,
& præsertim quæ infirmioribus, ut Absinthium, Tragoriganum, Cu-
nilam, aut Hyssopum. Quinetiam Thymum, Irim, Origanum, Ca-
storium, aut si quid medicamenti cognatum habere saporem uidea-
tur. Aut potionibus inserunt, aut uinis, aut iuribus, aut passo, aut mul-
sæ aquæ, musto, succis, lenti, polentis, aut medicaminibus. Aut concin-
nantes ipsi, edulj admiscunt. Quare qui in ea suspitione sunt, condita
edulia uitare debent, omniq; intensa saporis qualitate, dulcium, aut sal-
• forum, aut acrium abstinere, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes,
uoraciter comesse, semperq; ad saporem esitatorum diligenter attende-
re: præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim ap-
petitu, qualitates ægerrime concoquuntur. In infirmis quidem faci-
le uitare possumus potiones auxilij gratia dari solitas, quas offerunt im-
probi, qui beneficia moliantur. Itaque ob id laborantes morbo, non
perinde au dentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile seducti ho-
mines, capiantur dolis ueneficorum, occasio est & facultas. Sed alia ex-
peditior, ut suspiciosi aliqua præsumant, quæ uenenorum uires hebe-
tent, & inefficaces irritasq; reddant. cuiusmodi Caricæ sunt cum Iuglan-
diū nucibus manducatæ, & quæ Cedromela uocant, id est, Citria, semis

nis Napi drachma cum uino. Item folia Calaminthæ, aut terra quæ Le **A**
 mnia sphragis appellatur, pondere pari cum uino. Aut Rutæ folia, & nu
 cis luglandis nucleum, aut Caricas duas, & salis callum ieiuni sumant, &
 nullo ueneni genere legentur, Antidota ex uino sumpta eundem effectū
 præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridatium, quod scinco &
 sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis oblistūt peculiaries affectus
 in corporibus, certo quodam modo constitutis, & quadam cibi potusq;
 qualitate, aut uini copia ita temperatis, ut cum uenenis dissentiant. Siqui
 dem ingesti ueneni uires frangunt, atq; iam priore alimento factis, præ
 clusisq; meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur.
 Verumenimvero quoniam fortunæ temeritas interdum similia discrimi
 na, peregre agentibus affert, absq; ullis insidijs hominū, nonnihil disse
 rendum mihi de hac re necessariū duco. Iamprimū igitur culinam appa
 rare loco sub diali conuenit, cibosq; & potus in huiuscemodi loco strue
 re. Si id fieri cōmode nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, appo
 nendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Fre
 quenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua
 quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stel
 lions, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligēter intueri oport
 tet. Namq; reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, no
 xium uirus eructant: interdum uero delapsa, immerasq; moriuntur, & **B**
 exitij causas haurientibus afferūt. Sed hæc hæcenus dicta sunt, cauti &
 prouidi, insidijs ne pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam
 insidijs sumperūt, auxiliari primo quoq; tempore oportebit. Siquidem
 dum comites singulorum uenenorum notæ expectantur, immedicabile
 fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægre cedit. Quare si
 qui compotes mentis, se uirus sumpsisse fateantur, aut eorū qui aderant
 testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile pecu
 liari natuæq; constitutioni restituemus. Neq; enim ijs assentimur, qui
 prorsus auxilia in huiuscemodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim
 modo uitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam admitt
 unt, & quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationem aspernan
 tur? Aequè uero omnes morbi pro causarum ingruentū magnitudi
 ne, aut pristinis affectionibus, qualitatibusq;, quibus sit opportunū cor
 pus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui
 forsan obmutescentes, aut temulentī, aut nolentes alioquī uenenū egeri,
 nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendū ad
 ea quæ cōmuniter epotis quibuscuncq; uenenis opitulari consueuerūt.
 Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari potest, quam ut
 proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare si
 ne mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogantur, da

Cri conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scenograeco, aut halicæ decoctio uicem eius exhibebit. Hæc enim non modo uomitionibus exigent uel illa sua laxatrice, aut nauisam ciente, sed aluum quoque subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias eorum hebetent. Id quod euidenter huiuscemodi argumento deprehenderelicet. Esto ut quisquam uia calce, uel uini facce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque uehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam uomitus non ob id modo quod uacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert, sed quod assumptum uirus nonnunquam odore, coagulatis globulis, aut colore, prodat. Quippe cum odore & amaritudine meconium, colore cerusam gypsumue, globulis lac, aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit: ita ut nonnulla ab istis remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi uero uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coeant, quæ hæserunt intestinis reliquiae dylstere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum, & cum hydromelite sumptum. Vina uetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes, pinguesque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namque subducunt, uti diximus, & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad uomitionem reddunt. Et uenenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ comuni dote profunt, ut Lemniæ terra, Agaricum, Abrotonum, Irio, radix Eringij, semen Pastinacæ & Calaminthæ, Nardum gallicum, Castorium, Ferulæ uirentis medula, flos Rhododendri, succus Marrubij, Laser aut Laserpitium, Sagapenum, Peucedani succus, aut Panacis, & radix quæ Magudarim appellatur, Aristolochia longa, syluestris Rutæ semen, & Betonica (quæ Cestron noiant) folia. Singula cum uino drachmæ pondosumi debent. Effectum præbet Polij decoctum, & Seseli, & liquida Pix linctæ. Magnifice ferunt opem, antidota quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi auxilij, ita se habet. Ceterum ab istis quæ con fuerunt euenire, communia remedia sumptuari possunt. Fere enim uires uenenorum quam plurimorum, in affectus consimiles, corpus tandem reddunt. Quam ob causam plarisque communia conducunt auxilia. Permulta etenim uenenorum genera, communes tamen, nec multi istidem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, unum uenenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset uenenorum tractatus, si

gillatim remedijs ab authoribus traditis. Neq; uero in uno eodemq; **A**
promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renum & uesicæ dolore ue-
hemēter crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, ob-
mutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, ueterno prematur, caligent sen-
sus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre conficietur, ægre lotium
reddat, torminibus uexetur, crebro uomitet, nausea prematur, rubescat,
liuore suggilletur, palleascat, desipiat, stertat, uiribus deficiatur, & plaræq;
alia eueniant. Vnumquodq; uenenū in generales affectus diducitur: ut
pauca numero & communia demonstrantur, quæ enenire consueuerūt.
Quare in singulis quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum uirus
cognoscere. Nam stomachi & linguae erosio, uentris ac renum inflamma-
tio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, &
in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in Cantharidibus
modo potis reperiuntur, sed in Erucis quoq; pinorum, & Bupreste, &
Salamandra. Porro eos qui Meconium hauserunt, non modo ueterno,
aut sopore premi, stertere, liuore, suggillari, torpere, refrigerari, stupe-
re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui Mandragorā, aut Cicutam de-
uorarunt. Delirium non Hyoschamus tantū infert, uerū etiam quæ To-
xica appellantur. Idem aconitum, & mel quod in Heraclea pontica gi-
gnitur. Strangulatio non minus in fungis, q̃ in sanguine taurino, lacte,
aconito, cērula, gypso conspicitur. In summa, difficile unum unī ueneno **B**
propriū inuenire signum, quod haustum uirus prodere possit. Maxi-
me, q̃ hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, com-
munia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter euecant, adnotari for-
tasse, quod inspectum fuerit, licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad lon-
gas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat,
quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum uenena statim atq; præsentia
neam uim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus communia
reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent: cum uenefica
proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diu-
turniorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi ra-
tionem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hætenus.
Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus: si
prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut ma-
lesicam uim sortiunt: ut medicinæ studiosi, intra obseruationē cauti, quib-
usdam eorū medicamentorū misturis utant, quæ memoriæ literarū tra-
dita sunt, & ab authoribus descripta. Imprudentia eīm magnas adfert no-
xas, & sæpe continuo usu eorū, homo in perniciem agitur. Proinde ani-
malia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt. Cantharides, Buprestis, Sa-
lamandra, pinorum Erucæ, Lepus marinus, Rubeta, & Rana palustris
muta, deuorant Hirudines. Semina sunt, Hyoscyamus, Coriandrū, Cicu-

Cta, Gith, Mandragora, Psylion. Liquamēta, Meconium, Opocarpason, Thapsiæ succus, Elaterium. Radices quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui colchicum uocant, q̄ in Colchide nascatur. Hærbæ oleraq̄, Smilax, quam aliqui thymion appellant, Romani Taxum: Solanum manicum, quod et doricnium dicitur: Sardonîa herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Phtharicum, Toxicum, Ruta siluestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo Sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E uitibus uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

¶ De Cantharidibus.

C A P. I.

cantharidus

Quibus datae sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usq̄ cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam Cedriæ resipiunt. Dextra præcordia inflammantur. Vrinam ægre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atq̄ dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent. Animo linquuntur. Obortaq̄ uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo anteaq̄ tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzae, tragi aut pisanæ cremor, aut decoctum maluae, aut seminis lini, aut scenigræci, aut radicum altheæ, quam latinus sermo Ebiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitrum eisdem dandum, ex hydromelite: ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adhærent, lingendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi intercidantur, ingesta ex Nitro aqua mulsâ uacuari debent. Detur deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nucleî, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsâ, aut anserinus adeps in passo liquefactus, inflammatae aut partes hordei farina aut mulsâ perunganter. Ab initio ad mota cataplasmata nocent: q̄ citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur. Vtpore quæ dolores & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Cæterum omnibus medicina, ut noxium uirus per summa corporis excernatur. Deiectiones multas riam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capestat. Galinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis, catulis, maxime pinguibus. & tenerimis uesci debent. Siquidem aluum cient, atq̄ uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aster appellatur: si quaternæ singulorum

drachmæ cum passo sumantur. Item Pulegium, ex aqua tritum. Irinum aut rosaceum cum rutæ decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longe omnium potentissime antidota auxiliantur, in quatuor drachmis aquæ mulsæ pota.

EX M. VERG. COMM.

In famas quotidianis experimentis, & in interiore usu a cunctis damnae Cantharides semper fuere. Quales autem hæ sint, satis, 2. uolumine a scriptore hoc, & a nobis dictum est. Tractataque tunc omni earum medicina & historia, nihil nisi maleficium, in quo diligentiores esse hominem oporteat, relictum modo est. Quale autem id sit, satis in scriptore hoc patet. Patent & remedia, quæ ab eo deinceps tradita sunt. Idque tam certe & diligenter factum est, ut nihil monuisse legentes nos oporteat: & si plurima in nobis aliorum æditionibus contraria, aut diuersa falsè legantur. Quæ diligentius, & exactius prosequi posthac nobis animus non est. Festinamus enim longiore quæ a principio credidimus, opere hoc defatigati. Cupimus tamen pro nobis in eo legentes laborare: collatisque aliorum in hac parte æditionibus, scriptori huic, & in eo humane salutis operam ferre. Ipsi interim in Cantharidibus his non tacebimus, discrepare alterius interpretationem a nostra, quo loco Diosc. negat inflammationibus potu Cantharidum factis, imponenda a principio ex hordeacea farina fomenta: causam afferens, *διὰ τὸ ἐπὶ τῆς γενόμενης θερμότητος κατὰ τὴν ἐξέλιξιν ἐπὶ τοῦ τόπου ὄντας κυρίως*. Quod uersum ab eo est. Quia ex calfactis corporibus remedia continentur, quæ muniendis & defendendis illata uitalibus fuere. Nos autem contrarium concipientes sensum, diximus. Propterea quæ accedente calore retinetur quod datum fuerit, uenenum uitalioribus partibus inhærens. Retulit ille τὸ δεινόν, id est, quod datum est ad remedia: in quo rei, & sibi ipsi, ni fallimur, aduersari uidet. Negat hic ob calorem a principio fomentis utendum esse: reddiditque causam, quoniam, si retineatur. &c. Manifesto argumento sumpta a contrario ratione, uelle conarique Dioscoridem, pelli & excludi pro hominis salute quæ intra eum sunt. At in remedijs optandum querendumque id non est. Quæ quo diutius intra hominem fuerint, eo certius medebuntur. Idque nos cogitantes, de ueneno intelligi oportere in eo participio credidimus: eamque rationem secuti, locum ut in æditione nostra legitur uertimus. Dicit forte aliquis, de remedio intelligendum ob eam causam esse: quoniam nisi descendat, egrediatque uomitione, aut alui deiectione sumptum id remedium, uenenum una non e-ducet, simulque cessans nullam afferet in hoc periculo opem. Non spernendum penitus id esset, nisi hic subiecisset, retineri quod datum fuerit uitalioribus partibus inhærens: quod nisi de ueneno apte intelligi non potest: & si intellexisse hoc modo etiam id oporteat, ad uenenum & unde mali principium est tota reuertitur res. Non conuenit etiam nobis cum cæteris interpretibus quo loco hic scriptor ait, dandas contra Cantharidum maleficium animalium pingues carnes, *καὶ ἀπαλώματα*. Eam uocem cæteri ex cōmuni eius æstimatione uerterunt, tenerrimas: nos autem, longiore coctura flaccescentes. Fecimusque id autoribus græcorum medicis, qui in scriptore locum hunc signantes, *τακρὰ* in hoc usu carnes exigunt. Significat autem id quod diximus, longiore coctura, & eousque tenerescētes, ut diminutè primum a sua quantitate, omnem etiam amiserint duriciem. Suntque coctura, non ætate tenerrimæ hoc loco intelligendæ carnes. Idem etiam dulcis aquæ balneis in hoc periculo uti iubent.

De Pinorum Eruca.

CAP. II.

Is qui Erucas Pinorum hauserunt, ilico dolor in ore & palato exoritur. Vehemens alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur. Corpus totum exæstuat, fastidium urget. Quibus est succurrendum, remedijs quæ deuoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici Oleo et Irino, Melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperat, accipiemus.

EX M. VERG. COMM.

Satis secundo uolumine de Erucis dictum a nobis est. Nunc legentes monuisse aliud non oportet, quæ tunc de olerum, nunc priuatim de Picearum Erucis agi: simili quidem, & natura congeneri insecto, uiribus tamen & maleficio dissimili. Siquid quæ in piceis nascunt, presentem mortis habent causam, ab oibus passim danatur: priuatique a scriptore hoc, quæ saluti humane consules, notas

C ueneni earū et remedia breuī qdē, sed certissime tradidit. Meminisse illud tñ legētes uolumus, quē cognomines his in mari nascunt, Erucq; adhuc passim aliq; gentibus uocant, nullū habere ueneni maleficiū, sed mare incolentibus gentibus in mensarū precio & honore esse.

¶ De Bupreste. CAP. III.

Βούπρεστις

Q Vi Buprestin biberunt, non dissimile Nitro uirus sapiunt. Stomachi, uentrisq; uehemens dolor insequitur. Tam ueter q; stomachus mirum in modum ut in aqua intercutem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contendit. Vrina supprimit. Quibus eadem quæ potis Cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridē ficus p̄sunt. Itē earum decoctū ex uino. Vbi uero iam fere pericula inclinantur, thebaicarū Palmularū cibo, aut earūdem tritarum in mulso, aut lactis potu iuuatur. Pyrorū etiāmnū omne genus esse, & lac humanū bibere, cōuenit.

EX. M. VERG. COMM.

P Estis acerba bouū Buprestis est: & inde illi a græcis nomē. Rarū in Italia animal, antiq; autores aliqui hoc tradiderunt. Nunc frequētius q; agrestis fortuna & res patitur, interempto quod tidie boue, ruris colono, inueniri agricolę lamentantur. Scarabeo lōgipedi simillimum tradit. Fallit inter herbas, bouēq; maxime: haustumq; ita inflamat, ut rumpat. Vniuerso qdem pecori nocet, sed in maiore bouis q; aliarum quadrupedum iactura: ab eius noxa priuatim nominatū est. Cecinit in Alexipharmacis suis notissimos de eo uersiculos Nicander: nihilq; non ab hoc, & ab alijs dictum & ipse etiam in notis & remedijs monuit. Addidit tamen, colorari labra eius qui Buprestidem hauserit. Versiculus eius est. ἰδὲ τῇ λίτρω μὲν ἐπιχρῶσθαι χαλκῷ. Ex quo infecta nobis suspicio est, quod nitrum in scriptore hoc legitur, in Nicandro autem λίτρω, potuisse quondam forte aliter legi: nec maleficiū Buprestidis notam in uiroso tātum odore niri esse, sed in putris corruptiq; tabi colore simul & odore. In cōmuni tamen græcorum omnium lectione nihil mutauimus. Relinquimusq; in bubus saltem diligentioribus obseruandam rem. Quos etiam monere uolumus. 22. uolumine eiusdem numeri capite, Buprestin Plinio herbam esse, quæ ramen ille non describit: & si Græcos, magna inconstantia, in ciborum laudibus eam habuisse dicat: eosdemq; remedia tanq; contra uenenum prodidisse, boumq; uenenum esse ipso nomine indicari, quos dissilire degustata farentur. Quod quale in eo sit, legentes uiderint. Nobis enim constituisse sibi græci uidentur, nec nisi in uenenorum censu Buprestim constituisse.

¶ De Salamandra. CAP. IIII.

Σαλαμάνδα

S I Salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur, mens spræditur. Tremor cum torpore, aut horrore quodam ac exoluti one accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; suggillantur. Sæpeq; diutius immorante ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta quæ potis Cantharidibus. Peculiararia uero remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & trisaginis decoctum, in quo nuclei pinei conterantur, urticæ quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinę, aut terrestis, cocta. Item ranarum ius, cum quibus eringij radix incocta sit.

EX. M. VERG. COMM.

D Escribitur a ueteribus Salamandra Lacerti figura, stellato corpore, nunq; nisi magnis & continuis imbris prouentens: tanta natui & intra se congeniti gelu ui, ut ignes non aliter q; glacies extinguat. Reterulerunt h̄dem, sanie, quæ lactea ore eius euomitur, quacūq; hominis parte contacta, defluere pilos: quodq; contactum fuerit, natuum colorem in uiliginem mutare. Addiderunt aliq; inter quos & Plinius est. 29. uolumine, capite. 4. inter omnia uenenata maximum Salamandræ scelus & maleficiū esse. Siquidem aliorum uenenis singuli, nec plures pa

riter intereunt; Salamandra improvidos necare totos populos potest. Nam si arbori irrepfit, **A** omnia poma ueneno inficit: & eos qui ederint, frigidissima ui enecat. Idem familie periculū est, si contacto ab ea ligno panis incoquatur. Vel si in puteum deciderit. Habet tamē talis, & tantū mali uis remedia aliqūot, quæ capite hoc a Dios. docentur. In quibus a principio statim non est cum alijs idem nobis, quod ad notas haustam Salamandram sequentes pertinet. Illi enim quod nunc in Dios. legitur καὶ δαναίος ἰμπεδισμός, significatq; usus mentis impedimentū, utin eo legebatur uerterunt. Nos autem ad sermonis impedimentum, auctoribus græcorum medicis eam transultimus rem. Siquidem Paulus Aegineta de Salamandræ maleficio agens, καὶ λαλῶς ἰμπεδισμός ait: significatq; illi, nō mentis, sed linguæ ad sermonē impedimentum: quod alijs eius mali notis magis cōgruit, linguæ inflammationi, resolutioni, tremorq; quæ omnia sermonis potius q̃ mentis usui officere uidentur. Accessit his etiam in Alexipharmacis suis utriusq; sane euentus testis Nicander, sed in eo quod nos dicimus certior. Versiculi eius sunt. αἰτὰ μὲν ἰμπεδιστὴν γλῶσσαν βατοῦ, ἀτὰρ ὑπερμάχου δάμναται, ἰμπεδιστὴν δὲ κακὸν ἔργον ἔχει λαί. οἱ δὲ περισφαιλόντες ἑκτερίθωσ' ἱππύουσι τετραπόδιος, νεῖραι γὰρ ἀπόφρυνος ἀμείδονται. Eorū sensus est. Statimq; incenditur lingua: & torpore contrahitur. Vrgensq; malus tremor, membra soluit. Illi uero aberrantes, uelut infantes quadrupedes repunt. Mens enim illis hebetatur. Vtraq; a Nicandro ueneni Salamandræ nota numeratur, & linguæ, & mentis impedimentum. Sed nos magis amauimus, quod Aegineta & Nicandri testes & auctores habet: præsertim dicente hoc impedimentū, quod linguæ & sermoni aptius q̃ menti tribui uidet. Persuasitq; id etiā quod Nicander ait, inflammari linguam, & torpore contrahi. Quo loco aduerbio ἔφ' usus est, quod retro significat: & μάλιν voce, quæ in contractione ex gelu facta apte dicitur. Est enim ut græcorum grammatici docent, μάλιν, frigore contrahi manus & torpere: quod suo gelu Salamandra in lingua facit: torpentēq; ea impeditur eius usus. At Nicander ait, hebetari eis mentem. Fatemur id quidem, nec multo ante diximus, probasse nos hoc magis q̃ illud, quia plures id testarentur: & q̃ apud hic sermonis ductus nobis uideretur. Nunc autem illud adimus, non aduersari huic sententiæ Nicandrum, sed hanc ultra alias notam mali huius eum ostendere. Nos sic sentimus, & nihilominus poterūt uolentes quod magis probauerint sequi. Nobis grauissimus testis Paulus Aegineta est, toto huius scriptoris capite hoc in cōmentarijs suis exscripto. Testati cæteri omnes sunt, nō tam qui ex professo hæc docuerunt, sed qui obiter Salamandræ meminerunt poetæ, scriptoresq; alij, ueneno eius defluere humani corporis pilos omnes. Sic Martialis mulieri imprecabatur. Hoc Salamandra caput, uel sæua nouacula nudet. &c. Et nihilominus a scriptore hoc, alioquin diligentissimo, nihil huiuscemodi traditur. Non tamē negligentæ, ignorantiaue eius aliquis id adscripserit. Qui cum bisariam nocere, foris scilicet contactu, & intus haustu Salamandram sciret, alterumq; illud malum leuius esse, nec nisi dehonestamentū decoris facere, alterum in quo de uita ageretur diligentius obiit. Quam rationem secutus Plinius .10. uolumine, capite. 67. quomodo cōtractu foris Salamandra homini nocet, breuius docuit. Ait enim. Sanie eius quæ lactea ore uomitur, cōtractas hominis partes totum amittere pilum, idq; quod contactum fuerit colorem in utilignem mutare. Reliquo deinde opere, multis locis intra hominem insecti huius maleficiū hoc; aut illo re medio curari præcepit: hic autē, ut diximus, τοῖς σαλαμάνδραν λαβύειν id est, his qui Salamandram hauserint, remedia instituit. Crediderunt aliqui etiam, male in hoc capite legi, remedium illud quod ad Vrticæ folia cum Lilij decoctæ pertinet: asserētes, auctore Appollodoro, ut Plinius testatur, non cum Lilij, sed cum testudine legi oportere. Plinij uerba sunt lib. 22. capite. 13. Appollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Ratiocinatiq; in eo sunt, ἀπὸ τῶν χελωνῶν, quæ uox testudines significat, facile κρίνω, id est, Liliorum fieri potuisse. Verumtamen in cunctis græcis eadem lectio est, & Pāulus Aegineta inquit, ἢ κνίδος φύλλα συνιμείνεται κρίνωσι. Quod est, Vrticæ folia cum Lilij decoctā.

De Ephemero. CAP. V.

Sympto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem Buibū **B** appellat, pruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica, aut scylla laceffuntur. Interna rosionem sentiunt, Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis ammistus, peraluum exigitur. Quibus ut ijs qui Salaman

Cdrā hauserunt, uomitione, aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed antea q̄ uenenum inualescat, dandum est decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut florum mali granatæ. Lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum. Ite succum sanguinalis hærbæ, aut ramorū uitis, aut rubi, aut medullę recētis ferulæ, aut myrti. Baccæ autem myrti tusæ tritæq; & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Medicus sardoniarum glandium liber, similē effectum præbet, si crudus in aliquo supradictorum succo sumptetur. Origanum quoq; cum lixiuio epotum. Exinie iuuantur asinini lactis, aut bubuli potu, etiam si in ore cōtineant. Ita, ut quibus copia lactis huius adsit, nō aliud desyderetur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quale Ephemeron hoc sit, & quibus locis frequens nasci quondam diceretur, satis dictū quarto uolumine ab hoc scriptore, & a nobis est. Potuit, quia sumptum ad unam diem uitam proroget, sic græcis nominari. Non aliter q̄ multa alia, quę ob hanc ipsam causam Ephemera, ab eadem gente appellantur. Obseruatum in hoc capite illud a nobis est: uomitiones, & clysteribus intestinorum inundationes, quas hic ex Salamandra ad Ephemerī remedia repeti iubet, nullas in ea legi. Oportetq; ob eam causam suspicari, aut in Salamandra remedium eorum rationem deesse, aut (in quam partem nobis inclinat animus) quoniam Cantharidū modo curatur Salamandra; in ea em̄ hic ait, cū fecerimus omnia quę in Cantharidibus iussa sunt, &c. non ex Salamandra, sed ex Cantharidibus uomitiones, clysteribusq; exinanitiones illas repetendas esse. Vtriusq; enim pariter competunt, & ex utrisq; pariter imperari possunt. Licetq; non legantur in ea; quia tamen fiunt, non male id fieri percipitur. Est illud etiam animaduertendum, quam Diosc. ait castanearum mediam tuniculam, &c. eam intelligi oportere, quæ inter corium & carnem eius ferrugineo colore est. Et præter id, quemadmodum primo uolumine in Castaneis hic monuit, non tuniculam eam tantum, sed carnem ipsam etiam contra Ephemerum uim habere: efficaciorē tamen tuniculam hanc esse. Quod & Nicander in Alexipharmacis suis etiam testatur.

D

De Dorycnio.

CAP. VI.

Dorycnion, quod & aliqui Manicon Solanū appellarunt, epotum, lactis sapore in gustu refert. Vehementes singultus ciet. Humor linguā uexat. Sanguis subinde reijcitur. Strigmentosa quędā perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq; anteq̄ aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quęcunq; potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, nuces amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchylia omnia tam cruda quam tosta esse salutare est. Conueniunt & locustæ marinę, & gammari, & pota eorundem iuscula.

E X M. V E R G. C O M M.

Potest, nec male quidem, falsoq; Dorycnium uocari quodcunq; tela, cuspidēs, & ut Poeta cecinit, ferrumq; potest armare ueneno. A ferratis enim lancearum cuspidibus, quas græci dorata dicunt, factum illi nomen est. Præstiterunt id, & adhuc præstant multa. Antiquitas tamē, si Plinio credimus, furiosi Solani succo ad eam rem primatim usa est: uocauitq; ob id Dorycnium. Verba Plinii sunt. 1. uolumine, capite. 2. Hoc est uenenum, quod innocentissimi auctores simpliciter Dorycnion appellauerunt, ab eo, q̄ cuspidēs in præliis tingerentur illo passim nascente. Esseq; Dorycnium furioso Solano idem, hic primum testatur, dicens: Dorycnium, quod quidam furiosum Solanum dicunt. Testatur Plinius quo diximus loco certius: testatur græcorum medici & herbarij omnes. Vtq; ab hoc ipso scriptore; 4. uolumine lætale sim-

pliciter dictum Dorycnium est, sic certius, & ex professo nunc notæ & remedia eius docetur. In quibus duo tantum, ex Nicandro alterum, alterum ex Paulo Aegineta monebimus. Sequi haustum Dorycnium hic ait, *ἄσπερ γάλακτος ποίητος ἐν τῇ γυναι*. Quæ voces nihil significant aliud, quæ lactis in gustu qualitatem, quæ nulla alia quæ sapor est. Pertinet enim ad gustum ea tantum qualitatem, Nicander tamen in Alexipharmacis de hoc ipso Dorycnio agens, inquit, *ἁλλὰ ἔχει δὲ ὄρα* *ἁλόνιον οὗτε γάλακτι ὠπὴ τε ἑρῶσις τε περὶ σωματικῶν γίνεται*. Quod est. Sed age Dorycnium etiã contemplare. Cuius circa os lacti similis est aspectus & cibus. ὁπνι enim ille uocat, quod uidetur, & oculis sentitur; id aut color est: *ἑρῶσις* uero quod estur: & ex eo saporem, duasque notas has numerat colorem & saporem, & utrunque lacti similem. Hic tamen solum saporem indicasse uidetur. Nisi aliquis in comuni illa qualitatis uoce qua usus est, colorem etiam intelligi uoluit; uerumtamen eam qualitatem ad gustum hic tantum contraxit. Alterum quod ex Paulo Aegineta monemus, ad remedia pertinet. Quod enim hic ait, cum aniso tepidum passum, ab eo cum exiguo aniso dari præcipitur. Potuit ea uox scriptori huic perijisse. Eaque ob causam ignota legentibus esse nolimus.

De Aconito. CAP. VII.

Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit, gustantibusque maxime cum exurgere conatur, uertigines offundit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori & præcordiis adfert. Simulque crebri spiritus deslantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per alium egeri opus est. Vitur inter arcenses potus origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuino, uel abrotono, uel chamælaea, aut trifagine. Prodest etiam annum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipe-
re, & ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum hædi, leporis, aut hini nuli cum aceto. Ferri quoque stercus. Item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur potum. Lixiuiaque cum gallina & uino decocta, aut carniū præpinguium iura cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

EX M. VERG. COMM.

Atestibus contra testes, ut in iudicijs quotidie fit, pro Aconito agendum nobis est: & unus contra multorum fidem audiendus, haud sane quale Aconitum sit dicentibus: letale enim omnes esse affirmant: sed unde factio nomine in poetis, scriptoribusque alijs tantopere infamis sit. Grammatici siquidem, poëte, & qui plantarum historiam aliquando scripserunt, a cotibus & petris, in quibus nasci fertur dictum esse uolunt. Naso in Transformationibus suis lib. 7. notissimos cecinit uersus. Quæ quia nascuntur dura uiuacità caute, Agrestes Aconita uocant. Plinius. 27. uolunt mine, cap. 3. eosdem natales illi tribuens, ait. Nascitur in nudis cauitibus, quas Aconas uocant: & ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iusto ne puluere quidem nutrire. Secuti hos plures alij, idem tradiderunt. Tamque a grammaticis id receptum est, ut non facile sit decreta eorum conuellere. Conabimur tamen, ueritati consulentes: unusque cunctis his uelut in acie obijciatur Theophrastus. Qui lib. 9. de plantarum historia nasci quidem petrosis locis Aconitum tradit: non tamen a petris nominari, sed a Perandynorum uico, quem Aconas uocabant: ad quem copiosum & efficacissimum nasceretur. Verba eius sunt. *φύεται δὲ πανταχὺ καὶ θυεὶ ἐν ταῖς ἀκραις μόνον ἂν ὦν ἔχει τὴν προσηγορίαν, ἔνθα δὲ καὶ καὶ αὐτὸς τις τῶν περιανδύων, οἷον δὲ μάλα τοὺς πετράδων τόπους*. Quorum sensus est. Nascitur autem ubique Aconitum, non in Aconis tantum, a quibus appellationem habet. Vicus autem Perandynorum Aconæ sunt. Amat præcipue petrosa loca. Aequiuoca loci & cotis appellatio, diuersitati huic causam dedit: multoque magis i petris natales eius. Vtris autem magis credendum sit grammatici censebunt. Est enim omnium grauis, nec damanda fides. Theophrasti tamen auctoritatem poetis, Plinio, grammaticisque nunquam ego ex æquo contulerim. Anceps in hoc capite etiam locus est: illic scilicet ubi contra Aconitum remedia docentur. Dubitari enim potest: iubeat ne Dioscorides sumi cum uino Lixiuiam, & elixos gallinaceos: an potius contra Aconitum prædesse lixiuiam, in qua una cum uino elixari gallinacei fuerit.

C rint. Nos in ambiguo id elegimus quod ab alijs græcorum medicis confirmatur.

¶ De uenenato Heradiæ melle. C A P. VIII.

μῆλι ἢ τὸ ἥρα -
κλίνα

MEL Heradiæ in Ponto, ubi aconitum gigni solet, Athenis Ionia, Euboice Siderites nominatur: quod qui edunt, bibuntue, non secus affliguntur, q̃z qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ po- to Aconito conueniunt. Adiuuantur in primis cōtinuo uini mulsi po- tu, cui rutæ folia sint adiecta.

¶ De Coriandro. C A P. IX.

κρίον

COriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem, densam uocem facit. Insaniam adfert, a temulentis non aber- rantem. Qui sumplerunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis o- dore uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo conciz- tatam, uti retulimus. Merum & per sese, & ex absinthio potum auxilia- tur. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in mu- ria forbeantur, & epota muria, & ius falsum ex gallina & anserē, Palsū quoq; cum lixiuia sumptum.

E X M. V E R G. C O M M I

D

FAmosa in Carmine suo Coriandra appellans Columella, ancipiti uoce usus, cogitandū po- sterioris reliquit, quotidianum ne eorum usum laudauerit: an magis in ueneni maleficio, qd ha- bent, monere legentes ea ratione uoluerit. Vtrumq; enim nouisse hominem uerisimile est, præ- cepisseq; eorum inter hortensia consitionem: & nihilominus quoniam homini nocerent, una illa uocē, nimium, ut hic in Coriandro ait, usum eorum damnaſſe. Quod ab hoc ipso, uolu- mine factum est, cum monuit, maiore copia sumptum Coriandrum graui periculo mentem cō- mouere: ideoq; nimium, & continuum uitandum eius usum. Factum & ab alijs græcorum me- dicis & herbarijs omnibus, inter quos & Nicader poeta est. Cuius antiquissimus interpretes, syl- uestri Coriandro, non fatiūo ueneni maleficium assignat. Nos tamen in plantarum, & medicæ materiæ historia, syluestre in hoc genere hætenus non inuenimus. Et quoniam omnes Corian- drum simpliciter nominant, unum tantum genus eius credendum. Plura q̃ Diosc. numerau- rit remedia contra Coriandri furorem a Nicandro traditū. Nolumus nos ea docere. In eo em̃ scriptore parata omnibus sunt. Quod autem nobis cum alijs nō conuenit, ex eo, et Paulo Ae- gineta confirmandum est. Id scilicet quod hic ait ὡς τε κινώβιντα ἢ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνθίντα σὺν ἄλλῃ βο- ρονύμῳ. Qui locus quomodo ab alijs & a nobis redditus fuerit, facile erit uolentibus cognosce- re. Quod autem cum altero eorum nobis non conuenit, remedij huius ratio & usus est. Ille em̃ quæ Dioscorides ὡς κινώβιντα, id est, oua omni intrinseco humore uacua appellat, nec ultra q̃- q̃ illis adiicit, Oua in patinam depleta & subacta cum salſugine, uertit. Remediumq; instituere uidetur, quasi deplere oua oporteat: & quod ex eis depletum est, subigendum esse, & cum salſu- gine forbendum. Nobis contra uisum est non quod in ouo clauditur querendum esse, sed de- pletis omni suo humore ouis, eorum putamina. Vtimurq; ad hanc sententiam rationibus his: q̃ in cōstitiundo ouorum usu, huic & alijs, semper satis fuit ouis uti præcepisse. Quod enim in illis usum plerumq; habet, interior liquore est: & si hac magis q̃ illa parte uti oporteat, tunc ui- tellum aut albumen seorsum imperari. Idq; tam late in hoc scriptore & alijs patet, ut certius o- stendi non sit opus. Hoc autem loco cum iubeat hic scriptor, depletis, id est, uacuis ouis contra Coriandrum uti, putamina eorum tantum imperari opinati sumus. In eamq; sententiā nos pri- mum traxit Paulus Aegineta, qui ὡς κινώβιντα ἢ τὸ αὐτὸ λεγόμενα, in hac ipsa re itidem dixit, id est, euacuata oua, & in seipsa, id est, nullo alio in loco trita & infracta. Traxit & Nicader, qui in Alexipharmacis suis inquit, πάλαι χυμὸν ὀρεαλίων ἀπαλὴν ὡδινὰ κινώβιντα, ἢ φρονὶν πίπικυράσαι, &c. Qd̃ est, Sæpiusq; gallinarum mollem partum euacuans, spumam superinfundens. Manifeste iubet is, gallinarum oua deplenda esse: depletisque his nihil superest quod intelligi possit, quam puta- mina. Accedit his communis deinde sensus, in quo auditis depletis ouis, nihil quæw putamen

intelligi relinquatur.

¶ De Psyllio.

CAP. X.

A

PSYLLION epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert. Cui omnia quæ exhausto Coriano auxiliantur.

461199

EX M. VERG. COMM.

Refrigerat Psyllion, quæ Pulicaris herba est. 4. uolumine a Dioscoride tractata: suoque frigore uitæ noxias perfrictiones & algores facit. Et præter algores corporis resolutiones, & mentis tristitiam. Qualis ea sit, & quomodo ueneni maleficiû hominis uitæ afferat, ex historia eius facile legentibus patebit.

¶ De Cicuta.

CAP. XI.

Cicuta pota, uertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut minus non cernatur. Singultus ciet. Mentem turbat. Extremitates gelantur. Denique conuulsi suppressio arteriæ spiritu, stranguantur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur: ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus, dantes nonnihil intermissionis. In qua proderit lac bubulum potui datum: aut absinthium cum pipere, & uino castorio, ruta, mētha cum uino: aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia: aut piperis cum semine urticæ & uino: aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per sese largius potum proficit.

xviii

EX M. VERG. COMM.

B

Sunt scriptori huic, & græcorum medicis in Cicutæ remedijs omnia eadem: pleraque tamen illi adiungunt, quibus tota certius tractetur res. Quale uerbi causa est, quo loco hic Piper simpliciter instituit, illi commune addiderunt: utendumque communi Pipere iubent, ut longum & album ab hoc usu excluderent. Quale itidem cum Lauri folijs teneritudinem adiungunt, tenerisque eius arboris folijs uti præcipiunt, summos ut nos credimus coliculos eius intelligentes. Quale etiam cum decernente hoc Amomi, Cardamomi, aut Styracis drachmam, illi unciam constituunt. Similiaque his pleraque alia, quæ uolentes diligentioribus in hoc studiorum genere relinquimus.

¶ De Taxo.

CAP. XII.

Smilax a quibusdam Thymion, a Latinis Taxus appellatur. Frigiditatem uniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quæ Cicutæ conueniunt.

emilax

EX M. VERG. COMM.

Dicta a nobis quarto uolumine de Taxo arbore fuerunt, quæ satis tunc fore credidimus. Nihil nunc monuisse aliud legentes oportet, quæ ex eo loco repetendam eius historiam: cognoscendamque arborem, quam ueteres græci non Smilax tantum, sed Thymion etiam uocauerint. Hæc enim altera eius appellatio quondam fuit, & si uarie in antiquis exemplaribus legatur: solaque umbra, non succo tantum homini lætalem: non tamen semper, sed ut Plutarchus Sympolij sui tertio commentario monuit, quo tempore prægnas flores profert. Ex quo quod in historia scriptoris huius, quo diximus loco legitur, lætalem umbram homini Taxum esse, non nisi cum floret, intelligendum est. Nec caret ratione aliorum quorundam florum exemplorum, quorum halitu homini sæpenumero nocetur.

Mm iij

C De Carpasi succo. CAP. XIII.
E Potus Carpasi succus, soporem, citamq; stranguatōem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

EX M. VERG. COMM.
C Arpessia quinto suæ medicinæ cōmentario uocat Paulus Aegineta, cuius liquorē oēs homini letalē faciunt, Meminit eius aliquādo Plinius. Nobis de gñe herbę nō satis cōstat. Verūtāme frigore noxiā intelligere oportet, ex quo ipsē Cicutæ remedijs illi succurritur.

σαρδόνια πόν

S Sardonia hærba, CAP. XIII.
SARDONIA Ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescens tibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectiōne, de Sardonio Rifu adagium in uulgus aperte manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa liberalius epota, lac, irrigatio, perunctioq; a pinguibus totum corpus excalfacinentibus. In calidam aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere expedit. Et in summa, curam omnem quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

EX M. VERG. COMM.
Nouerunt nostræ ætatis herbarij Sardoniam herbam, Rifu Apium appellantes, Apuleius in cōmentario illo de herbis, Sceleratam herbam nominat, manifesta a maleficio eius nominis rōne. Nos longius de ea secundo uolumine in Ranunculo herba egimus; quodq; tunc factum est, inutiliter agi iterum hoc loco non debet. Poterunt uolentes ex cōmentationibus illis nostris quæcunq; opus erunt in hunc locum reuocare.

υποσκιάμω

H De Hyosciamo. CAP. XV.
HYOSCIAMUM potum, aut comestum similem ebrijs ab alienatiōem mouet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliaria aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininum, si id desyderatur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuū decoctum. Faciunt ad id etiā nuclei pīnei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & uinum salsum cum adipe suilla recentis passoq; itidem urticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturcium, radix cepæ, & allium. Et hæc singula cum uino sumantur: post conuirescant, ut uinum concoquatur.

EX M. VERG. COMM.
Quæ cognoscendæ Apollinari herbæ necessaria erant, quarto uolumine in historia eius dicta iam pridem ab hoc, & a nobis fuerunt. Quo loco, cum dictum a Dioscoride fuerit *κατωδὴν καὶ καρωτικόν* esse Hyosciamum, Quarum uocum altera insaniam, altera soporem significat, dubitandum, querendumq; legentibus reliquit, an desit hoc loco, an abundet illic altera illa soporis uox. Ex his sane quæ hoc capite traduntur, abundare illic uidetur. Ex quo inquit imperandam esse quietem, ut porum ebriorum modo uinum concoquant. Quæ imperanda non erat, si *καρπον*, id est, soporem Hyosciamus faceret. In maleficio eius præterea a græcorū medicis nihil aliud, q̄ ebrietati similis amentia numeratur. In angusto uersatur res, ut aut ex Hyosciami historia eam expunxisse uocem oporteat, aut quod illic *καρωτικόν* est, contra cōmunem uocis eius æstimationem ad capitis affectiōnem aliam transfereidum sit. Omnia toto hoc capite, omnibus eadem sunt: præterq; in extremo calce, in quo aliter uoces suas concipit Paulus Aegineta: monetq; imperandā esse quietem, ut non aliter q̄ ebrij potum somno concoquit uinū. Sic etiā quiete sua qui Hyosciamū hauserint, ueneni eius uim pariter concoquāt, Nihil em̄ in re alioquin haud multifacienda mutauimus, satis imperatā quietē fore opinati.

¶ De Mandragora.

CAP. XVI.

A

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternum, nihil temere distans a lethargo. Cui anteq̃ aliquid ex ijs accidat, uomitus ex aqua mulsâ proderit. Postea nitru, & absinthium, ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & acetato perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii & rutæ, tritorum in aceto, & liquidæ picis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si ægre iñ reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq̃ communibus auxilijs uti conueniet.

mandragora

EX M. VERG. COMM.

Sopit q̃primū malo somno hominem Mandragoras, Idq̃ non tantū hoc loco Dioscori, sed in historia. 4. uolumine longius ab eo traditū est. Remedia nunc tam noxiæ quietis traduntur. Primūq̃ locum uomitiones, & mulsâ aqua sibi uendicauerunt. In quibus non cōuenit nobis cum alijs interpretibus. Illi enī uomitiones, & aquā mulsam coniunxerunt, uomitus ex aqua mulsâ prodesse, & uomitiones moueri, & aquā mulsam dari dicētes. Nos ex Græcorum medicorum disciplina, conferre quidem uomitiones diximus, sed a uomitionibus statim mulsam dari auim. Habuimusq̃ in eo auctorem Paulum Aeginetam, qui scriptoris huius caput hoc exscribens ait, ἀρμίσυ δὲ πρὶν τοῦτων τὴ συνελθαι ὅτι ἔμειθε, καὶ μετὰ τοῦτον μολικρατὸν. Quod est. Prodest priusq̃ quicq̃ horum fiat uomitus, & post hunc aqua mulsâ. Cogitauimus etiam, quoniā ab eodem scriptore inter Mandragoræ remedia non numeratur Eupatorium, multoq̃ magis, quoniā nihil quod ad hoc faciat in decretis Eupatorii a Dioscoride traditur, aut abundare eam uocē, aut pro quapiā aliā male eam illic legi. Quod signasse tantū uoluimus.

¶ De Meconio.

CAP. XVII.

B

Poto Papaueris succo, quem Meconion uocant, consequitur ueternum, cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe inualefcente ueneno tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq̃ mulsū cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiuia, aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, uino & panace, piperq̃ cum castorio & aceto mulsō, uel cum satureia, aut origani decocto cum uino. Si olfactibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendāt, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

μῆκων

EX M. VERG. COMM.

Numerant a Nicandro in Opī potu, p̃ter p̃frictiōes, soporē, languorem, pruriginē, & toto corpore Opī odorē, notæ aliæ plures: pallida facies, labros igneus color, exigua & frigida respiratio, liuescentes ungues, distortæ nares, & concaui oculi. Addidit illud etiā, odorem quē Dioscorides ait toto corpore reddi una cum sudore, ueluti ex labore euaporari.

¶ De Corniculato Papauere.

CAP. XVIII.

Papauer quod Corniculatū appellāt, & potu, & cibo eadē inferre cōsueuit quæ Papaueris succus. Nec alijs expugnāt auxilijs.

κινετῆρις μῆκων

¶ De Pharico.

CAP. XIX.

Pharicon, quod uocant, sapore syluestre Nardum imi-

φάρικον

Ctatur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo gallico, quod Serinē aliqui uocauerunt, aut Spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo, iri, & rosīs ex uino. Deraſumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

E X M. V E R G. C O M M.

Quid, qualeq; fuerit Pharicum, non satis inter antiquos scriptores constat: simplex alijs, alijs contra compositū tradentibus: & quod hæcenus legisse me meminerim, nullo eorū, siue simplex, siue compositū fuerit genus eius, & substantiā indicante. Incerta posterioribus græcis ratio nominis etiā fuit, & si a gentibus & locis aliquot Græciæ dictum oēs testent. Quidam em̄ a Pharis in Arcadia: quidā a Pheris in Thessalia: quidā postremo a Pharide in Laconia, cuius meminit Homerus, Pharicū dictum uoluerūt. Nec defunt, qui ab inuēctore sic uocātū putent. Athaneus in tertio sui Dipnosophistæ, quo loco de Cotoneis malis agit, nisi uitiū in eo sit, non Pharicum, sed Phariacum noiauit. Verba eius sunt, τὸ γέν φαρικόν φάρμακον. &c. Nec ipse etiā, alioquin in huiuscemodi multus & diligens, quicq; de nomine, aut substantia ueneni huius docet. Refert tamē, quod miretur aliquis, in cæteris non legi, neq; inter remedia a quoq; numerari, infringere ueneni huius uires mala Cotonea: & ex Philarcho in. 6. historiarū suarum narrat, Cotonea hæc mala odoris sui bonitate letalium uenenoꝝ uires hebetare: Pharicumq; hoc ueneni, Cotoneis malis mixtū, amissa nocendi potestate euanescere: deprehensumq; id fuisse, dato homini Pharico qd inter Cotonea mala fuisset, nullo mortis, aut ueneni maleficij secuto euentu. Cæteri itidem oēs proposito Pharico, descriptisq; notis, & traditis remedijs nihil ultra de eo docuerunt. Quo sit, ut credamus, tam notum tunc oibus fuisse Pharicum, q̄ nunc nobis incognitū est: & ut in re nota sit, tacuisse cætera omnes qui de eo agerent. Ne descripta re, male & scelerate agere, & ueneni uti discerent homines.

D

φάρμακον

Toxicum ex eo nominari uidetur, q̄ barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione torquentur. Incoercitus furor uariās ijs imagines obuersat. Quare uix medicinæ locus est, raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum. Priuatim ijs conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. Malacq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet. Amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum uitæ tempus degunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Plinius. 16. uolumine, cap. 11. de Taxo arbore agens, his uerbis Toxica descripsit. Hanc Scitius Smilacem a Græcis uocari dixit, & esse in Arcadia tam p̄sentis ueneni, ut si qui dormiāt sub ea, cibūue capiant, moriant̄. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicāt uenena, quæ nūc Toxicā dicimus: qbus sagittæ tingunt̄. Sunt, ut uidet Plinio, Toxica ex Taxi arboris succo confecta uenena. Huic aut̄ agere credat alijs, idem Plinij Toxicis hoc esse. Siquidē non multo ante priuatim de Smilace. i. Taxo arbore egit, perfrictionesq; & strangulationes suo frigore facere dixerat: ideoq; non credendū aliter, & iterū de ea ab eodē nunc agi: p̄sertim non congruentibus, nec ijsdē in utroq; ueneno notis. Relinquit ob eā causam, ut credamus a sagittis Toxicū noiatū fuisse, certi quondā ḡnūs ueneni, qd ex quidiano frequentioreq; usu antiquitas sic appellauerit: scisseq; tunc oēs ueneni, & ueneni propriū genus. Nunc aut̄ in multiplici ad tingēdas sagittas, culpidesq; alias ueneno, quo passim uti, nisi obtarent leges, liceret, non faciliē habet intellectum, nec discerni ex eo usu, & ab alijs potest, quē multis cōmunem & eundem habet.

De Ixia.

CAP. XXI.

A

IXia quæ Vlophonon appellatur, inter potandum aliquid Ocimo simile redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat. Mentem mouet. Omnes excrementorum exitus suppressit. Strepitum cum animi deliquio ciet. Iis intestina latrant, nec secedit quicquid. Post uomitionem, aluumque resolutam, auxilium præstat, aqua in qua Absinthiū maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæque syluestris semen, aut laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpicio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Item Chamelææ, aut Thapsiæ, aut Absinthij succi sicilicum cum aqua mulsæ, & acetum calidum potum.

EX M. VERG. COMM.

Viscum pluribus locis Plinius græcorum Ixiam hunc uocauit: duo diuersi generis in plantarum historia, nulla discriminis adiecta nota, eadem appellatione indicans. Quod an uicinitate nominis in græcis deceptus fecerit (Ixon enim illi arborum Viscum, Ixiam uero quod nunc tractamus uocant) an sciens, uolensque, negata sibi in latina re appellatione, qua Viscum penitus si milem rem indicaret, non est propolitiū nobis modo ostendere. Fedimus enim id in Chamæleonis, & egregie eruditionis homo, in Epistola ad Menodimum Lucensem medicū idem etiā fecerat. In qua multa breuitate, summaque diligentia ueterū & posteriorū scriptorū, de tota hac re dicta collegit. Quorū summa est, aliud ab Ixia hoc Viscum esse: hoc in multarū arborū ramis nasci, nec ueneni maleficiū habere: illud ad radices Chamæleonis, albi spinæ noxiū adnasci, pluribusque alijs inter se notis & uiribus distingui: patereque id in græcis, quibus Viscum *ixor* sit, non *ixias*: quæ uox a Viscum quidem facta fuerit, non tamē Viscum significet, sed quod paulo ante diximus, Chamæleonē album: cui, quemadmodū hic tertio uolumine tradidit, aliquibus locis Viscum adnascitur: quo pro Mastiche ad nitore cutis mulieres quondā utebantur. Et hūc non in arboribus natū, illud inter uenena numeratū quondā est: ideoque Vlophonos dictum: quoniam, ut in historia utriusque Chamæleonis hic docuit, canes, sues, quadrupedesque alias in cibo enecet. Non debuerat, ut uidetur, cū Viscum misceri Ixias, qui Viscarius potius adiectiua forma, quæ Viscum a Græcis notatus fuisse uideri potest: ideoque nos, ne simul æqui uoca uoce duo diuersa miscerent, alterum Viscum, alterū uoce græca Ixiam notauimus. Barbarus Pliniū secutus, masculino genere græcorum exemplo Viscum Ixiā hunc uocauit: quod in dispescenda re non semper satis est. Illud uolumus legentes monere hoc loco, cū proponeret a principio uoluminis huius Dioscori, quæ in tota natura ueneni maleficiū habent, inter radices Chamæleonē, non Ixiam numerasse: in reddendis deinde notis & remedijs, Ixiā, non Chamæleonē noiasse. Nec dubitan dum alicui erat, hoc, aut illo loco uitū esse. Idem em̄ Ixias, & Chamæleon est: nisi Paulus Aegineta quinto suæ medicinæ, uolumine ipsedem oibus uerbis scriptorē hunc cōmentarijs suis miscens, Ixiæ & Chamæleonis duo seorsum capita legētibz cognoscenda reliquisset. In quorū altero albi, in altero nigri Chamæleonis maleficia traderet notis & remedijs penitus diuersa. Respondetque id duorū Chamæleonū historiæ. Vterque enim Vlophonos æqua nocendi potestate noiaur. Eamque rōnem, ut credimus, secutus Paulus Aegineta, seorsum de utroque inter uenena etiā docuit. Quod si easdē notas ambo haberent, ipsedē remedijs curarent, crederē ego hunc scriptorē breuitati consulente, uno eodēque capite de utroque egisse. Sed cū diuersa in eis oia sint, uitū suspicari oēs cogimur: reliquūque in uenenorū censu Ixiā, in notis deinde & remedijs Chamæleonē. Neque em̄ uersimile est, reliquisse hunc, quod alij cōmentaria eius exscribentes, tradiderunt. Irrepisisset id uitū uersimile est, ab aliquo, qui medicæ materiæ, & plantarū historiæ parum peritus, bis repetitū idem esse ratus: tanquam superuacaneam utrobique alteram reliquerit uocem. Persuademur nos hoc facile, ex eoque præsertim, quod in censu uenenorum propositus Chamæleon, in remedijs deinde redditus Ixiæ est. Quod futurum non erat, nisi propositus

B

Ctus a principio Ixias cum Chamaleone fuisset. Nec proponendus Chamleon, si reddendum aliquid in eo postea non erat. Ixias tota res in scriptore hoc pater: nec repetere quæ præmonstrata sunt, opus est. Quid autem in Chamaleone desiderari possit, id nos ex Paulo Aegineta repetemus: qui ut cætera ab hoc scriptore accepta commentarijs suis inferuit, sic Chamaleonem etiam exscripsisse credendus est. Verba de Chamaleone nigro eius hæc sunt. Haustum Chamaleonem nigri erosio, dolorque ingens sequitur: & cum stomachi euerfione totius corporis tremor. Accedit mox & conuulsio, biliosque & spumosi uomitus. Sunt etiam quibus singultus cum priuatione uocis, distortusque uultus fiunt. Confert triticæ farinæ cremor pinguis calidusque. Tum uomitus & lactis potus. Prodest clysteribus etiam infundi quod lene sit. Profunt & fomenta emplastri modo imposita. Verum contra strangulationes, liuoresque facientem Chamaleonem, proderit potum Absinthii, nitrum uic cum aceto mulso, aut Raphanis. Proderunt & præcordijs imposita fomenta. Sunt hæc nigri Chamaleonis ex Paulo Aegineta notæ & remedia. Quæ ob eas, quas paulo ante diximus causas, ne quid huic operi deesset, addere placuit.

¶ De Cerusa.

CAP. XXII.

φάρμακον

Cerusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiua, lingua, & commissuræ dentiū, candamore quodam inficiuntur. Singultus, tussim ac linguæ ariditatem excitat. Iis extrema frigescent. Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaracinum oleum, aut Irinum, Persicorum ossa cum Lilij decocto. Columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plorauit, aut humore quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed tum quoque uomant. Conuenit etiam Thapsiæ succus, aut Scammonia cum aqua multa potus.

D

EX M. VERG. COMM.

Sunt toto hoc capite plura, quæ alijs interpretibus, & nobis eadem non sunt. Diuersitatisque nostræ una est causa, quod impressum scriptoris huius illi codicem secuti, alios eiusdem rei auctores non consuluerunt, nec quæ aptius & uerius dici poterant, cogitauerunt: ideoque qualia se oia obtulerunt, talia etiam reddita ab eis sunt. Nos contra auctore Nicandro, & antiquis græcorum medicis, quod in scriptore hoc erat, & Persicorum ossa cum Liliorum decocto, cum hordei decocto uertimus. Illi enim non σὺν κρίσει ἀφισήματι, quod est, cum Lilij, sed σὺν κριθῶν, quod est, hordei decocto dixerunt. Eadem ratione quod legebatur, ἢ κοκκινύλοις, significatque, cum prunis, cum prunorum gummi uertimus. Quicquid folijs ulmi contineri humor dicebatur, folliculis eius arboris contineri diximus. Illis enim, non folijs continetur. Pluraque alia mutauimus, quæ monentibus illis naturæ rerum, & ueneni huius remedijs male respondebant. Quæ poterunt uolentes per se certius uidere. Cogitabant etiam, in Persicorum ossibus, quæ Cerussæ aduersari hic ait, an trita ossium eorum putamina, an interiores nucleos intellexisse oporteat Nicander sane in Alexandria pharmacis suis putamina intellexisse uidetur. Versiculi eius sunt, καὶ κατατριβέντα μετ' ἀρζιόντος ἰλαίου ἐκλῆξ' ἀπὸ περισίτου κάρνα βλάβου διὸν ἱέρου. Quod est. Quinetiam tritæ cum splendente oleo duræ Persicæ arboris nuces malum egregie discerniunt.

¶ De Fungis.

CAP. XXIII.

φάρμακον

Fungorum alij genere, alij copia lædunt. Omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurrendum. Communiter ex oleo uomere cogendi. Mirifice iuuat lixiuia ex sarmentis, aut pyrastri surculis, epota cum sale, posca, & nitro. Pyra, aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, manfacque eisdem auxiliantur. Aduersus Fungos gallinacea oua cum po-

ſca proficiunt, adfecta aristolochiæ drachma. Item abſinthium cum ui-
no melleq; ſumptum, & ex aqua potum. Apiaſtrum ex nitro, Panacis
radix in uinò, Fæx uini cremata cum aqua, Aeris flos ex aceto, Radix
ſinapis & naſturtium eſu proſunt.

EX M. VERG. COMM.

Nāſcuntur ab æſtuo & autumnali imbrē ſtatim euocante ſole Fungi omnes. Nec minus
conſtrua tubera, oprabiles Fungi pluuias eo tempore hominibus faciunt: hæud ſane omnibus,
ſed his qui, ut Heliodus cecinit, infelicitatem ſuam & malum amantes, naturæ potius monſtris
& uenenis q̃ melioribus & tutioribus cibis uelſci gaudent. Male, exceptis pratēſibus, autore
Flacco, alijs creditur Fungis. Male etiā, autoribus græcorum & latinorum medicis, in cibos
receptis uelſcitur. Omnes enim, ut hic a principio ſtatim monuit, uel genere, uel copia nocent.
Eamq; ob cauſam debueramus tam male tuto cibo abſtinere omnes. Verum quoniam noui-
tate potius q̃ ſuauiditate eius illeſti, præſenti uitę periculo æſtius & autumnales cōnas hoc cibo
etiā inſtruimus, debuerant cæteri interpretes in docendis faciarum a Fungis ſtrangulationū
remedijs, diligentiores eſſe: meminifſeq; ambo, non præcipere Dioſco. contra Fungos bibendū
ex aceto æris florem, ſed atramentum ſutoriū. Nec ſi etiā χαλκοῦ ὕλης paſſim in ſcriptore hoc
legatur, pluris librariorum in curiam, q̃ ſcriptoris huius decreta facere: in quo cum reſponde-
ant primis ultimæ, & ſibiſynuicem omnia, facile erat ex Atramēto ſutorio, quod Chalcantiū
græci uocant, locum emendare. Quæ enim ipſe hic ſcriptor pro Fungorum maleſicio illic mo-
net, huiuscemodi ſunt. *ἡ δὲ μύκτης καλοῦσι βοτάνη*. Quod eſt, Et his qui Fungos hauſerint opem
fert. Priuatim inter ceteras quas habet Atramentum ſutorium uires, Fungis opem ferre a Dio-
ſco. dicitur. Quod Flori æris neq; ab hoc, neq; ab alijs tribuitur. Oportebat etiā alterum eo-
rum non coniungere, copulareq; ſimul, ſalem, & nitrum, ſed hoc, aut illud præcipere. Hic enim
alterutro uti mōnt. Habetq; res certam ex naturæ rationem: quando ſimilis, aut non adeo di-
uerſæ naturæ ſunt nitrum & ſal. Sunc etiā pleraq; alia, quæ non ſunt nobis cum illis eadem, ſed
leuiora, & ob eam cauſam reſicta. Monemus illud etiā, quod a legentibus forſan deſyderari
pōrerit. Quæ hic iubet ſimpliciter, gallinarum oua cum poſca bibi, non uideri nobis integrū.
Siquidem græcorum medici ἀριφύμια in ἐμπύκτω ſumi iubent. Quod eſt, in poſca elixa. Quin-
etiā quod hic ait, μέλι ἐν τοῖς βόυς, id eſt, mel in cibo, illi in λυγρόν, id eſt, in edegmate dicunt. Et
quā hie Panacis radicem tantum, illi radicem & ſemen. Addiderunt præterea, quoniam in Fun-
gis a uenenatis conoſi aliqui non tantum ſtrangulant, ſed ex diuerſa alterius ueneni ui in teſtina
exulcerant, dandum in eo periculo copioſum abſinthium, caricarumq; & origani decoctum:
muſſa aqua cogendos ad uomitum qui in periculo ſunt: calida lauati aqua: impōnendāq; præ-
cordijs emplaftri modo farinam hordeaceam, hydrelęo mæceratam. Reſictum hoc ut credimus
a Dioſco. eſt: quoniam ad aliud ueneni genus pertineret. Quod ex ſuis notis cognitum ſuis re-
medijs etiā curandū eſſet. Hoc enim capite de Fungis, eorumq; maleſicio, non uenenato-
rū uenenis agebat. Monuerunt iſdem græcorum medici nos etiā, ut in extremo capite contra
q̃ præter ex interpretibus fecit, non Cardamomū, ſed Naſturtiū uerteremus. Illi enim manifeſte
ἡ δὲ ἀδελφία ἐν τοῖς βόυς, id eſt, in cibo Naſturtia Fungorum maleſicio aduerſari teſtati ſunt.

De Gypſo. CAP. XXIII.

Lapidēſcens Gypſum ſtrangulationem creat. Quare eadem pro-
ferenda ſunt, quæ manſis Fungis auxilia. Inter quæ habe-
tur maluæ decoctum, quod etiā olei uicem penſat. Vtpote cum pin-
gue ſit, euomendoq; lubricitatem inducens, deradi corpora non ſinit.
Quod ubi duratur in lapidem, efficit. Quinetiam prodeſt oleum ex a-
qua muſſa, aut ficorum decocto. Lixiua e ſiculneo cincre, aut ſarmentis
facta, cum uino copioſiore pota. Origanum, aut thymum cum lixiua,
aut aceto, aut paſſo. Loca decoctio maluæ proluenda.

EX M. VERG. COMM.

Non eſt quod in Gypſo legentes moneamus, præterq̃ auctoribus iſdem græcorum medi-
cis paſſum clyſteribus infundi, nō cū origano, aut thymo, lixiuiq; & aceto bibi a nobis in ex-

C tremo capite dictum fuisse. Illi enim remedium sic docent: uisumque est rationem habere, quod male uidentur similiter coniungi posse, & alternari diuersarum uirium acetum, & passum. Poterunt tamen legentes quod magis probauerint sequi.

ἄμα ταύρου

T De sanguine Tauri. CAP. XXV.
Auri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumque concitat. Fauicium meatus cum neruorum distentione præcludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur. Quædam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum uitabimus. Sanguinis enim globi per extractionem eleuati, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiunt, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne, cum acetato & laserpitij radice, aut lasere. Itidem & brassicæ semen, cinisque ficulneus. Conyzæ folia, cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda, Seruatîs fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua multa perungere oportet.

E X M. V E R G. C O M M.

D Vnt hominîs & brutorum sanguinis notæ, uires, & euentus uarij. Quemadmodum, .i. uolumine longius dictum in sanguinibus a nobis est. Nunc unius tantum describenda malefica uis, & in tota sanguinû historia damnandus Tauri nup iugulati: quoniam celerrime coit atque durescit, ideoque persistit hominî, præsertimque potus. Veneni maleficio infamis, miserabili genere mortis græcorum historici & poetæ implet. Deprehenderunt id in diuina re mortales, cum iugulati ad sacrificium tauris, quod aderant superstitiosiores calentem adhuc biberent: noua & indigna deo ratione hac sanctitatē incolumitatēque suâ augere se existimantes. Nullus tamen clarius hoc genus mortis quam Themistocles fecit, quod post pulsum e græcia Xerxē, exul a patria, accepto ab Artaxerxe exercitu, siue nolens, siue desperans quæ illi contra græcos pollicitus fuerat præstare: in Ionij Magnesiæ decerpto cultuario ipse taurum in sacrificio tenens, exceptum poculo sanguinem repente hausit: ut esset eo tempore anteposita uitæ mors, perpetuam uoluntatis honorisque sui testimonium, quod semper ciues sui meminissent. Caneretque pro se in Helena Sophocles ἡμὶ δὲ λῶσον ἄμα ταύρον γ' ὑπὸ πύλιν. καὶ μὴ κελεύω τῶν δ' ἔχειν διὰ φημίαν. Et Aristophanes in equibus suis, βέλτερον ἢ μὴν ἄμα ταύρου πῦρ. ὁ θύμις κλέος γὰρ θάνατος κρείττωτος.

γὰρ ἔμπυ-
τασίης

E De Coagulato lacte. CAP. XXVI.
Eos qui coagulatum lac hauserunt, frequens strangulatio inuadit, quæ in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antidoto iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere sæpius cogimus. Damus, & calaminthæ folia arida, item succum. Aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. Thymumque ex uino, & lixiuiâ. Sed nulla falsilago obijciat: quoniam magis lac coiret, & in caseum densaret. Neque illos uomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi angustias insinuans, strangulat.

E X M. V E R G. C O M M.

N On habet ueneni maleficium Lac simpliciter coagulatum, alioquin nullus esset in cibo eius usus: sed quod antequam concreuerit admixto illi coagulo aliquis biberit. Coit enim in stomacho, & coaguli uis, quod illi admixtum est, concreuit in grumos: concretionemque illa interiores obstruit meatus: obstruissis his, strangulationes facit. Plinius mali periculique huius genus diuersis locis diuersis uocibus indicat. Nos ex re, & ex græci nominis uis, lac proposuimus quod admixtum habebit coagulum. Id enim ὑπὸ πύλιν participium indicat. Ceteri interpretes coagulatum simpliciter lac uerterunt. Nobis placuit certiore illam rei indicationem sequi. Placuit etiam inter remedia nihil potius quam quod ignoraremus asserere, quo loco, scilicet relictum inane spacium non pro

cul a fine capitis est. Quem alter interpretum dissimulauit, alter lutum simpliciter dixit. Di-
scordis uerba sunt, καὶ τὴν παλοποιτικὴν κοινὰν. Pertinetq; id ad lixiuiæ genus aliquod: quale aut
em, non satis nobis constat; nisi forte hic præceperit utendum lixiuia quæ non per cinerem; sed
terram traiecta fuerit, πύλον enim lutum & aqua dilutam terrâ græci uocant. Sed nihil in ea re
cōperit aliqñ nobis est. Pōuit forte etiam ea imperari lixiuia, quæ non traiecta per cinerē aqua,
sed uino facta esset, πύλον enim antiquissimi uinum etiam uocauerunt. Et in hanc partem incli-
nat nobis animus. Nihil tñ constituius, integram rem peritioribus seruantes.

De Argenti Spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum
magnis torminibus adfert. Et nonnunq; pōdere suo intestina uulne-
rat. Vrinam supprimit. Corpus intumet, plumbæamq; deformitatem cō-
cipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris hor-
minij semen, myrrhæ drachmæ septem. Absinthium, hyslopum, apij se-
men, aut piper, aut ligustri flos ex uino. Aridum palumbis fimum, cū
nardo & uino.

EX M. VERG. COMM.

VNa tantum litera Cypros, quæ latinis Ligustrū est, a Cypero, q; quadratus odoratus Iu-
tus iisdem dicitur, differt. Ideo facile fuit in antiquis exemplaribus scriptoris huius alteram uo-
cem pro altera scribi. Diuq; nos anxij, cum uariarent in his antiqui etiam græcorum medici. Ni-
candrum testem secuti, Ligustrum uertimus. In eo em carminis necessitas non aliter q; ligustrū
legi posse & debere ostendit. Vericulus eius est. κίτρον τι θλαστὴν τριανθία. Quod est. Et Ligustrū
nuper florescentes germinationes.

De Argento uiuo. CAP. XXVIII.

Argentum uiuum potum, eadem quæ Spuma Argenti infert.
Eisdemq; utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari con-
stat, sed postea euomant qui hauserunt.

De Calce, Sādaracha, & Auripigmēto. CAP. XXIX.

CAlx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota, aluum et intestina
cum uehementi e. osione excruciant. Præbenda cuncta quæ suf-
frenare & soluere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt. Cu-
iusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, uel fructus
Tragi hærbæ, uel Orizæ, lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pin-
guia, & boni succi.

De Lepore marino. CAP. XXX.

Qui Leporem marinum biberunt, piscium uirus olēt. Intercedē
te aliquo tempore, aliud dolore afficitur. Vrina sistit. Et si quā-
do eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Om-
nē piscis genus auersantur, & odio habent, Fætido ac graui sudore
manant. Biliosus uomitus, interdum sanguinis promiscuus subsequitur.
His dandū lac alininiū, uel passum cōtinuē, aut radicis malug, foliorūq;
decoctū, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scamo-
nij drachma cū aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria cōtrita cū ui-
no efficax ē. Anserinus sanguis ut tepebit potus. Sed cū pisces oēs re-
spuant, aspernenturq; solis fluuiatilibus cancris uesti possūt, bibuntq;
eos admisto uino, adiunctq; præcoquant. Cumq; comesse pisces coepe-
Na ij

Crint, suae salutis indicium est.

R De Rubeta. CAP. XXXI.
Vbeta, aut Rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor corporis uehementer decolorat, ut plane buxum spectetur. Spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusq;. Inuita genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum uomitionem multo meri potu, & harundinis radices binis drachmis, aut cyperi. Breuiter cogendiunt, ut exercitationi & cursui se credant, ob torpore quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauiandi sunt.

D De Hirudine CAP. XXXII.
Euorate cum aqua Hirudines, si ori uetri adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebent. Eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & syrenicus succus, aut laserpitij folia, aut betae, cum aceto, aut posita niuis glebula, cum posca. Nitru ex aqua gargarizetur, aut atramentum futorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, insecta lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, et ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiam ijs, quae & si ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen caeteris uenenis pericula saepius adferunt. Qualia sunt album Veratrum, Tapsia, Elaterium, Agaricum nigrum. Siquidem ea strangulatus concitat. Aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quae in Fungorum mentione & similibus retulimus. Nimos autem deiectionum impetus, medicamentis quae excrementa suppressunt coercebimus. Neq; negligenda quae gliscente sensum nocumeto, pericula ingerunt. Quo in numero sunt syluestris Ruta, Gith, et nouae Glacies.

P EX M. VERG. COMM.
Lura & certiora pro haustis Hirudinibus docent graecorum medici. Primumq; inter notas numerant quae nullae in hoc scriptore sunt, floridi, ut illi aiunt, id est, uiui sanguinis excreatioes. In remedijs etiam lupinorum farinam addunt. Ex eorumq; disciplina, ut uidetur, nouissimorum alter interpretum scriptori huic remedium illud addidit, quod aliqui in scriptoris huius codicibus inuentum a nobis haecenus non est. Causam etiam asserunt, cur frigidae aquae sensu, quae ore contineatur, profiliant faucibus haerentes Hirudines. Ea est, q; frigidae aquae appetentes, ad eam festinant. Adhuc & illud, Cimices dedisse aliquos: quod hic ipse secundo uolumine in Cimicibus praecipit. Nec male suspicetur aliquis, deesse huic scriptori hoc loco inter remedia, quod alibi in historia cognitum, imperatumq; fuerat. Galenus priuatim Allijs usum se fuisse status est, nec alio indiguisse remedio.

A De Axe. CAP. XXXIII.
Xos flos est sping eiusdem nominis. Eos qui uescantur, sola uomitio recreat.

A De Aqua frigida. CAP. XXXIIII.
Qua frigida habunde pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, praesertim a balneo, aut cursu, aut uehementi

exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio pro-
tinus, & uacuatio imminentiā soluūt pericula. Sed de notis ueneficio-
rum remedijs, & cauendi modo, haecenus dicta sint. Subiungeremus
etiā antidota necessaria quæ prædare auxiliantur, quibus utimur, quæ
le metridatium est, præsertim quod sanguine & scinco temperatur: ue-
rum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum de-
scriptione superfedemus.

MONENDI hoc loco legentes sunt, quas hic scriptor Antidotos tam sæpe laudauit, & quas
subiecturum se commentarijs his in fine pollicetur, nullas ætate hac nostra in eius exemplarijs
bus, quæ uidere haecenus licuit, inueniri, ideoq; non expectandas a nobis.

¶ Finis LIB. Sexti.

PEDACII

DIOSCORIDIS

De Venenatis animalibus, & rabio-
so Cane, LIB. Septimus.

IO. RVELIO interprete.



DE BESTIIS quæ uirus ei aculantur, & exitiali
bus uenenis, ut circūitus medicinalis ad umbili-
cum perueniat, sermonem facere proposuimus,
& quidem cæteris non minus necessarium, ijs qui medicinæ artem ex-
ercent. Vtpote cum adminiculo eorū quæ in eo traduntur, doloribus,
periculis, & cruciatibus, homines liberari conueniat. Hic Tractatus in
summas parteis duas, sicuti ab initio relatu est, distribuitur. Nam qui
de feris uirus inspuentibus differit, Theriacus dici solet. Qui uero de
amoliendis ueneficijs, Alexipharmacus: de quo cōmentabimur, simul
quæ sequi consueuerunt, quæq; nonnihil auxiliij ferunt, explicabimus.
Omnia in promptu & ad manū artificem habere oportet, propter ur-
gentem sæpenumero uecessitatem. Siquidem pauca e uenenis & uirus-
lentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dila-
tionē admittant. Pleraq; uero presentaneam perniciem afferunt. Ho-
minum aut partim male alteris cogitantes, ingenita prauitate maleficiū
ita temperare statuerūt, ut spacium curanti liberū non relinquunt: par-
tim tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi
cōciscere conantur: qui postea deprehensi, aut resipientes, & uitæ cu-
pidi, presentaneā opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illi-
gentes, aut fontes, aquasq; puteanas hac labe poluentes, citam aduersā

Corpijs perniciē moliunt. In quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquāto post respōdere natura sua cōparatū est, tū nisi primo quoq; tēpore cōerceat, & remedijs subīde excipiat ueneficiū, frustra postea succurrit, occupatis iā corporibus exitiali ui ueneni. Proinde nō uulgari industria diligētiāq; in ea re utendū est: ut quod in alijs incōmodis ars cōsueuit, in his quoq; salutē mortalibus praebeat. Quin & apud priscos modus hic unus existimabat eius partis. Sed recētiore ipsū discreuerūt, nō minātes prae cautionē & modū prae cauētē, salubris sanātisq; mediū statuētēs. Qui parua & leui supra modū persuasione freti, magno in errore uersant. Siquidē treis in humanis corporibus cōstitutiōes esse cōrēdūt. Vnā, qua sani degimus. Alterā, qua sinistra ualitudine corpora laborāt. Tertiā, mediū inter utrāq; locū sibi uēdicat. In qua positi, sanitatē specie mētunt, faciliq; in morbos & pericula cōcidūt, ppter mortiferā uī quā in eorū corpus incūbit. Quēadmodū in ijs uidere licet, quos excādescēs rabie canis momorderit, necdū tamē aquā horrēt: in ijs quoq; qui cātharidas hauserūt, sed nōdū urinā tormēto cruciantur. Tripartito igit artē digeri, tripliciq; cōstitutiōi respondere tradūt. Salubre partē esse uolūt, quē sanitatē tuet. Prēcauētē, eandēq; phibentē, quē obstat q̄ minus in morbos incidunt. Et in sanitatē, qua uitia discutiunt. Quibus ita respōderi pōt. Qd̄ primū p̄ illud additamētū nō treis corporis tm̄, sed quatuor haberi cōstitutiōes fatendū esset. Quippe ut aliq; sunt, q̄ necdū morbo laborāt, morbo tm̄ maxime ob impendentē causam sunt obnoxij: ita sunt q̄ iā priore morbo defuncti, nondū tm̄ secundē ualitudini restituti sūt. Id qd̄ a morbo pximo sese recolligētib. cerne re licet, q̄ uiriū recreationē et robur desyderāt. Sed quēadmodū agrotātū cura ad partē medicamētariā ptinet, ita qd̄ morbos amolit, eide subijci par ē. Ad arcēdas em̄ ualitudines uehemētib. utimur auxilijs, altiore scarificatu, uisionibus, amputatiōe, derodētibus epithematis, potionibus p̄niciēi occurrentibus, et plērisq; alijs. Verū enim uero sunt usq; eo rudes nōnulli, ut ne remedia qdē appellent, quā morbos arceāt. Cuius sentētiē inire rationē haud p̄mptū est. Etenim cū uerbū ipsū, p̄cauere, tū opus p̄cauētis, modū omnino auxiliārē remediariūq; p̄ferūt. Mirū uero, nisi etiā sua illa distributione partiū, eos cōplectunt q̄ in pestilentis cœli statu morbo nondū correpti sunt, pesti tm̄ ppter obuersionis aeris occasionē, opportuni, & in morbum proni reddunt. Dicere forsitan q̄ possit, salubris institutionis alimētaria p̄cepta nō aliud esse, q̄ arcendōrum morborum rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus uitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degāt, nec morbis cōflicentur. Neq; id silentio prætereundum, quod peculiariter ad rē pertinet: non oportere medicinā partium distributionē, totidē corporis cōstitutiōibus respōdere, sed naturas peculiarib. uniuscuiusq; notis

conijcere: ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur, non pluribus agent- A
dum. Illud magis adnotare cōuenit, affectus qui a uirulentis animalibus,
uenenisq; contrahuntur, cecos uocari. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur,
nulli sunt addicta causæ. Quapropter questionibus obseruatoriæ ar-
tis, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; ex se uerū deprehendi-
tur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod semper se protrahit, & nul-
lum in quibusdam necessarijs usum exhibet, non facili coniectura colligi
potest. Et si secundū proprietates prorsus cecos eos affectus concedimus,
qui ab exitiālibus uenenis, & animātib; quæ uirulento morfu sæuiunt,
contrahuntur, non tamē quod ad opus nonnullū usum præbet, datq; me-
dendi occasionem, aut imperceptibile, aut cecum, nulliue causæ obnox-
ium reputatur, sed magis ab ipso quis impulsus, fidem quam habet & op-
inionem de abditorū cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe mi-
nora sunt, q̃ ut sensibus percipiantur, euidenter tamē ex alijs correspon-
dentibus deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Pl-
starcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad hanc uerborū sententiam scri-
bens. Nosse quis hoc potest, cum in alijs non paucis, tum in uiperis &
scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans: ut quamuis
exiguo sint corpore, uixq; conspectui subiiciantur, magnorum tamen B
discriminum ac dolorum causas inferunt. In quibus nihil præter quan-
dam corporis exiguitatem, uehementiamq; præ cæteris animantibus dat
tam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim scorpj magnitudo, aut cor-
poris moles existimari potest: si ad eius iclum comparauerimus, aut reli-
quorum id genus carne perimentium, Quorum aliqua uehementes cru-
ciatus excitant. Alia erodunt, & putredines cient. Nec desunt quæ præ-
sentaneam perniciem moliantur. Nonne quod a phalangj morfu uirus
ingeritur, uniuersum corpus excruciat? At neq; quis uehementiam ipso-
rum a mole deprehendere posset, cum prorsus exiguo corpore cōstent.
Ergo q̃ hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum q̃ exa-
cte deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ permi-
sta corporibus molestiarum quæ exoriuntur, causa sit, in confesso est, &
omnium consensu defenditur. Nec quisq; offendi posset usque adeo con-
tentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueraret, q̃
a materia mortifera partem corporis attingente. Porro id fuit quod in-
ter utilia artis opera dicere cogit, nos nihil prorsus lædi ab incompre-
hensione per proprietatem communis causæ, cum euidenter, tum in-
dicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum per-
tinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit,
inficiatus, communem causam, quæ morbis accessit, esse incomprehen-
sibilem. Et hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissime
prodidit, Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut

C in uenenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse. Obseruatio igitur comprehensionis caussarum, nobis perfecte diuidentibus satisfaciet. Primum enim per genus comprehendere non possunt. Quod autem sit lætifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, medellam subscribit, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Quando subiunxit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem in uomitū, propter ferientis uehementiam, & demorsæ partis fracturam, Cucurbitulam adfixit: urentia medicamentā, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admoit: postremo partem amputauit. Secum reputauit medicamina, quæ ad summa cutis adiunguntur, immixtæ ad intima perniciem repugnare. Hæc itaq; quæ proposuit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demerari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negociorum, quæ ipsa faceffit, esse causam diffiteantur. Verū rudiuscule nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immixta uis *φθοροποιός*, id est, mortifera nominatur, *φθοροποιόν* autem aliquid esse uolunt, quod nullius rei sit causa. Aiunt hæc nomina *μάρτυρ*, & *ἀνακαλίντων*, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda prolatione comprehenduntur. Enim uero quemadmodum in his uocibus *μάρτυρ*, & *ἀνακαλίντων*, partes uernaculos & præcedentes non retinent significatus, sic in hoc uerbo *φθοροποιόν* partes productionis gratia non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad caussarum differentias transeunt. Affirmantq; caussarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualeitudinem creantur, separantur, cuiusmodi sunt frigus, labor, insolatio, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postq; morbum excitarunt, hoc est, cum præsentibus sunt, & effectus eorū adsunt: cum incrementum, effectus augentur: cum decrescunt, minuitur: & cum desinunt, finiuntur. Quia per se prodeuntes effectus, aliquid cuius finis gratia esse possunt. Tales quidem probatissimæ sunt caussarū differentię, quarū nulli phthoropceon subijci potest. Euidens enim causa non est, quoniā morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit. Quemadmodum accidit ijs qui a rabioso cane sunt demorsi. Quod si neq; euidens causa, neq; continens fuerit: neq; ad finem coadiuuantē causam referri potest. Si uero a nulla caussarū differentia phthoropceon deducere possumus, causam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quædam in se non habere partis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolatione ficta esse: fateri necesse est. Verū non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est. Namq; *ποιόν*, in hoc nomine *φθοροποιόν*, perinde atq; adsumpta profertur: sed peculiarissimam usurpat significationem. Quemadmodum enim *φθορά*, id est, corruptionis nomen

mutationem in peius significat, si hoc uerbum ^{passiv} sumi debet, ut nihil
 in dictione ^{propt} fortiri se declaret, neq; prorsus id significat, quod omnes
 audiunt: & hinc simile redditur, ^{passiv} Si dant a corruptione sa-
 lubrem fieri morbū, concedunt utq; uihuiusce uerbi ^{passiv}, nisi quid cor-
 ruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per sin-
 gulas causas, quæ corporibus subiiciuntur, præsertim in immixtis uene-
 nis. Verum non nihil subiacere causarū differentijs produnt. Quinetiam
 aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui uero se dogmati-
 cos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem
 asserunt, ut inguinum ulcus, & inguinariam febrim, quod effectui tum
 assistant, tum etiam separentur, ut a fractis præcipitatio. In summa, quo-
 ties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehen-
 ditur, uitiosum est, neq; causæ adscribitur eorū quæ idem genus sortiun-
 tur. Sed quod phthoropceon, id est, mortiferū causa sit, nomen ipsum ar-
 gumento est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud
 causæ arbitrant esse post impressum a serpentibus ictum, q̃ ex animan-
 te uim & illapsum in corpora uirus. Neq; enim frigus, neq; æstum, neq;
 cruditatem, neq; aliud quicq; causari possunt. Verum quoniam causas
 rum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appella-
 nt: ipsis dicendum, altero istorū modorum euidentem dici causam, q̃
 effectum præcedit, & corporis compagem occupat: continentem uero, B
 q̃ morbis præsentibus adest: qua separata recedunt, quæ cum ipsa eue-
 nerant. Sed de ijs hæcenus. Fatendum itaq; mortiferam uim intrinsecus
 manifestissimam esse causam. Ipsamq; principem facere scopum opor-
 tet. Et anteq̃ morbis confliscitur, uarijs modis est certandū, donec uis
 tota corporibus excutiat. Modo in loco præsertim principatum non
 obtinente, ante coëreatur, q̃ altius irrepens uiscera tangat: aut eius per-
 niciēs eluatur: aut iam membratim peruagatura suffragetur. Itaq; uene-
 na si hausta sunt, crebris uomitionibus: si morsu impressa, scarificatio-
 ne, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunq; am-
 putatione extremæ partis, euocantur: clysteribus, & imposito medica-
 mentorū acrim cohibentur. Hæc simul utiq; arcere uirus & eluere pos-
 sunt. Restinguuntur meratiore potu, aut passo nulla aqua diluto, uel con-
 trariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectione alui, euo-
 catus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonst-
 bimus, auxiliantur. Verum enim uero non letiferam modo materiam,
 sed & magnitudinem, & tempus efficere scopum & propositum opor-
 tet. Etenim ab ijs remedia q̃ plurimum discrimen capeunt. A magni-
 tudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericu-
 la minantur. Alia putredines altas, aut exteriores excitant. Alia uehe-
 mentissimos dolores, aut cæcos cient. Alia uix medicamenti cedunt.

C & magis minusue molestias excitant. Oportet aut̃ ea quę pericula ferunt euincētibus auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe absurdū fuerit, in maioribus tardiore medicamentorū usu homines in discrimen afferre: in minoribus uero, uehementiū auxiliiorū iniuria laceßere. Finitio a tēporibus in promptu est. Aut em̃ subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dilatas in tempus. Itaq; præsentibus multa simul auxilia repræsentrari oportet: reliquis paulatim. Hęc quadā artis formula breuiter definita sint. Iam membra tū procedamus.

¶ Signa rabiosi Canis & demorforū ab eo. **C A P. I.**

D E rabiosi Canis morſu sermonem alijs præposuimus, q̃ id animal domesticum ac frequens esse consueuit, & rabie sæpius corripitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile. Inde periculum ineuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plærumq; flagrantissimis æstibus in rabiem effertur. Interdum quoties frigora incesſerunt. Rabiosus autem, potum & escam auerſatur. Largam spumantemq; pituitam naribus & ore proſicit. Torue, et solito tristius intuetur. In omnes passim sine latratu irruit. Aequę feras, hominesq; tam familiares, q̃ ignotos mordeat. Nec proſinus infestum quicq; inſigit, nisi ut uulnus dolorem. Exinde morbus ille, qui ab aquæ metu Hydrophobicus graia est uoce appellatus, contrahitur. Euenit autē cum distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore & languore quodam. Aliqui auræ splendore fugiunt. Alij sine ulla doloris intercapedine uexant̃. Sunt etiā qui canū more latratus ædant, interuenientesq; morſu adoriūtur, ac mordentes simili uitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione unū, aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendā affirmat. Themisonem aliqui demorſum in idem uitium incidisse, & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti, morem gerentem, & officiū exhibentem, quadam naturarum concordia similem subijsse affectum: sed post multos tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq̃ ipsum experirentur, uindicauimus. Et complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

¶ E X M. V E R G. C O M M.

N Vmerātur ab antiquis græcoq; medicis, præter dictas ab hoc scriptore plures aliæ rabidi Canis notæ. Sitire scilicet tunc eos, non tamē bibaces esse. Quod Celsus libro., etiam in timente iam aquā homine testatur. Anhelos prætereā, suspiciososq; & languidis flaccidisq; auribus uideri. Quinetiā, quod hic ait, sine latratu omnibus pariter inſillire, copiosius illi explicat, docentq; mutos tunc penitus, & udui insanos fieri: eouſq; ut nec domesticos etiam noscant. Quod licet a Dioscoride constitutū etiam fuerit, cum inquit, sine latratu omnibus pariter inſillire, bestijs, hominibusq; contubernales, & alienos mordere: nescio tamē, quomodo certius illud est. Occasionem sane obrulit, ut quod malē inter notas timētis iam aquā hominis in Dioscoride legebatur *ἡνυπία*, quā uocem alter interpretū, cum languore, alter, cū fastidio uertit, ad ignorantia huiusmodi nos transferremus: & quasi *ἡνυπία* legi oporteret, cum sui, domesticorūq; ignorantia, uerteremus. Inter cætera enim quæ docent græcorum grāmatici, significare aporian, *ἡνυπία*, id est, cognitionis priuatio est. Aniauerimus etiā, quo loco inane spa-

ciūm relictū, & uirij nota adiecta a nobis est, in male sequacis sermōis ductū deesse aliquid. Ab
 A
 exceptione enim quod sequitur statim membrū principium habet: non ineleganti tantū, sed in-
 firmo penitus sensu. Oportuit enim prius constitui aliquid, unde quod sequitur, exciperetur.
 Quale autē id quondam fuerit, manifeste Paulus Aegineta indicauit, qui ipsē hunc scriptori
 uerbis eadem docens, cum eo produxisset rem, moneretq; iam & ipse accurrentes mordere ra-
 bientes homines, morsuq; suo suā in alios affectionem transferre, subiecit statim plerūq; alia,
 & inter cetera, τὰς δὲ συμφορὰς τοῦ τοῦ πάθος ὁδὸν ἵστας πρὸς τὴν ἰσότητά τιν' ἢ διό. Quo-
 rum sensus est. Omnium uero qui in hanc affectionem deuenerint, nullum nos seruati scimus,
 præterq; ex historia unum, duosue. Quæ si scriptori huic inseratur, apte spacium id totum ex-
 plebunt. Nos ea signamus, ut habeant uolentes, unde locum instaurare possint. Docent præ-
 terea ipsē græcorū medicū, aliorū quidem accidentiū manifestam esse causā, occupatis scilicet
 cer ueneno illo paribus cunctis. Metum uero aquæ fieri aliqui eorū dixerunt, ex nimia siccita-
 te: quasi in contrariū habitum mutata penitus humida eorū substantia. Verū tamen Ruffus an-
 tiquæ medicinæ grauis auctor, insanī ex atra bili genus id esse, testatus est, magna ueneni eius
 cum humore illo similitudine: nec secus q̃ atra bile insanīētes scimus alios alia timere. Idq; sen-
 tire etiā uidentur, qui dicunt, Canis qui momorderit imaginē in aquis, opinari eos se uidere:
 eoq; metu terribos aquā fugere, & auerfari. Monent etiā, quoniā non statim rabidi Canis mor-
 sum sequitur metus aquæ, sed circa quadragesimā fere a morsu diem adeſt, & aliquando feri-
 us, opinātes aliquādo homines non rabire Canem qui momorderit, festinata morsus cicatrice
 causā affectioni huic dedisse. Id ne fiat, docuerūt qua indicatiōe usus aliquis rabire, aut non
 rabire Canē intelligat, iubentq; iuglandis concidi nuces, diligenterq; huius uulnus obstruere &
 circūligare. Mox sequenti die solutas & ablatas, gallinaceis in cibo apponi: & si his a princi-
 pio non pascantur, fame ad uescendū cogi: futurū enim superstitēs uiuāt, si nō rabient Canis.
 Sin cōtra, postera die peribunt. Tuncq; ad uulnēis dilataciōem festinandū. Iterumq; post pau-
 cos dies eadem indicatione utendū: & si non perierint gallinacei, tunc a periculo tutū uulnus
 ad cicatricem perducendū. Creditur indicationis huius auctor quondā fuisse Oribasius. No-
 lumus illud etiā relinquere, uideri nobis, quod hic ait, nullum a metu aquæ seruatum sciri. &c.
 credidisse aliquos de his intelligendum esse, qui non a rabido Cane, sed rabiente & aquā iam
 timente homine morſi fuerint. Hic tamē simpliciter tradidisse id uidetur.

R Remedia demorſorum a Cane rabioso. C A P. II.
 B
 Ratio medēdi duplex. Vna cōmunis, qua utendū in omnes mor-
 sus, quos uirulentæ animātes impreſſerunt. Alia peculiaris pri-
 uatq; eorum dumtaxat, quos rabiosi Canes momorderint. Quæ nōn ul-
 lis quidem summā opem ferre consueuit. Alijs uero inutilis, maxime qui
 ex multo iam tempore icū accaperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū
 exponemus. Deinde cursim perstringemus, quæ ad cōmunem medendi
 rationē pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles, cum sarmentis aibæ uitis cre-
 mare oportet, & cinerem eorum q̃minutissime tritum habere reconditū.
 Itidem gentianæ radicem tufam, cribratamq; reponere. Quoties autē Ca-
 nis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos uini bina cineris can-
 crorum cochlearia, unumq; gentianæ conijciantur. Hæc in polentæ ma-
 defactæ modū subacta, quadriduo bibantur. Inter principia medicamen-
 tum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu duo, aut tres dies fluxerūt,
 curationem auspicabimur a triplicato pondere, supra id quod ab initio
 retulimus. Optimū hoc aduersus rabiosorum morsus auxiliū, quod
 & multis unum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiam
 num auxilijs contrā inuitabile periculum muniāmur, nihil cæteris uti
 prohibet. Satiū autem multo fuerit; medicamentorum scruitiā tole-
 rare, q̃ propter negligentiam in discrimen adduci. Nec ita in demorſis

C a rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia. Quippe maiori uulnere copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulentū liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. Quin a maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scapelli circumscribere, & præhensam hamo carnē amputare oportet. In utrisq; circūstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda: ut sanguinis uacuatio resistat, ne uenenū membratim insinuetur. Cucurbitulæ cū multa flāma agglutinatæ id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Vos hic iubet, Vitis albæ sarmentis crematos simpliciter seruari fluuiales caneros, nec qua ratione seruandus per se eorum sit cinis monet: græcorum medici cremari quidem præcipue, sed in æneo cyprio uase, ut purus, & per se colligi cancorū cinis possit. Et quia forte ex eo ære medica uis aliqua contra canis rabiem esset. Ex ea enim insula in omnes medicinae usus æs laudabatur. Relinquimus hoc capite etiam cogitandum, quod in eo instituitur remedium cancorum cineris cochlearia duo, gentianæ uero unum, meraci uini cyathis quatuor mixta a prima die usq; ad quartam bibenda esse: quotidie ne hac mensura bibenda ea sint: an ex quo quatuor cyathi uini sunt singulis diebus usq; ad quartā, bibendus cyathus unus tantū sit. Nobis in priorem illam rationem inclinat animus. Credimusq;, singulis diebus totam esse illam bibendam mensuram. Arbitrarium tamen legentibus id relinquimus.

¶ De Vstione.

C A P. III.

C Contra uirulentos ictus, Vstio expeditissimum est auxilium, ut pote cum ignis cætera uiribus præstet. Simul quod uirus domet, **D** & ferri penitus non patiat: simul q; pars ignem experta, deinceps non uilem, nec indecoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Animaduertendū ex eo tempore cum crustæ decident, ne ulceris oræ coalescant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest, ad præfinitū tempus ulcerationes, & sordidas adhuc, & inflammationē minantes, pro rogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentū optime præstabit, & syluestre allium detritū. Item cæpe, succusq; præsertim cyrenaicus, aut qui medicus, aut parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, q; non mansa imponantur, siquidem subacta pistaue, ob perfusionem uulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio sibi aliquid affiscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verumtamen id non constat. Cæterum tempestiue his utendum. Si uero, quod persæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq;, manum postulabunt, Namq; eas diducere, carnemq; scapello circinare, aut iterum inurere expediet. Vbi uero propositum tempus præterijt, ulcus ad cicatricem ducendum, & emplastro quod e salibus conficitur, locus comprehendendus. Nec multo post sinapismo utendum.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Væ de Aduisione toto hoc capite a Dioscoride præcipiuntur, a Nicandro longeprius instituta pariter fuerant. Versiculi eius in theriacis sunt. ἡ ἀρκυρία γλαυκίνα ὑπερὶ τὸν ἰκτὸν, ἡ ἰσίδιον καυστὸν διαφύκειν ὑπὸ στρογγύῃ καμίνῳ. Iubet & Columella septimo rei rusticæ suæ uolumine, capite undecimo contra rabidi Canis morsum uetere salsamento uis. Nihilq; non idem omnibus in eodem periculo remedium est.

Q De Ratiōe uictus in morsu rabiosi Canis. C A P. III. **A**
 Væ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterū
 uictus rationē ex ijs quæ ueneno aduersantur, coniectura quæ-
 dā colligere oportet: simul ut ueneni uires hebetet, restin-
 guatq; simul ut arceat, quominus ad intima perniciēs illabatur. Etenim
 assumpta, perniciosarū uirium penetrationi resistunt. Quorū utrumq;
 præstare potest uini meracioris passi, & lactis potus. Quippe qui hæc
 oīa capiunt ad curā, nonnihil ueneno obijciunt, quod omnē eius acri-
 moniā obtundat. Simili modo aliorū, porrorū, caparumq; cibis: q; ea
 difficulter cōficiantur & aboleantur. Nam multos dies huius cibi quā-
 litates remanent: quo tempore nec euincuntur, nec permutant a mortī
 fera ui. Cōtrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorū usus accōmo-
 datur, & theriaces, metridatij, & eius quod eupatorio temperat, deniq;
 omniū quæ magnā aromatum partē sibi uendicant. Quippe aromata
 omnia uiribus & substantia ægre permutantur. Quare in corporibus
 euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nosse conuenit, pauorem
 aquæ nō statō, definitoq; tempore exoriri. Plurimū tamē ad quadrage-
 simū usq; diem neglectis deferri cōsueuit. Post semestrem etiā nonnullos
 inuadit. Quendā post annū aquā horruisse, nobis præsertim cōpertū
 est. Narrant & aliquos post septenniū aquæ metu fuisse tentatos. Inter **B**
 principia demorforū a Cane rabioso curandi ratio talis est. Verūenim
 uero si ea quæ retulimus auxilia primis diebus prætermissa fuerint, nec
 scalpō carnē circinare, nec uestionē experiri operæ precīū est. Non em̄
 quod iam p̄transit satis euocare possent. Nulla utiq; adiectionis utili-
 tas, sed in cassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis
 modus accedat. Deiectio magnū præbet iuuamentū: utpote cū mouen-
 do, corporis habitū trāsmutet. Et quæ colocynthidē recipit hiera, item
 lac scistum quod simul deiectionē moueat, & uenenum domare possit.
 Cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer retundi-
 tur, quotidie sumi debent. Cæterū sudores ante cibos, & post etiā cien-
 di. Dropacisni, sinapisniq; particulatim per corpus totum adijciendū.
 Sed longe omniū efficacissimum auxilium, Elleborismus cognoscitur,
 quo cum fiducia nō semel atq; iterū, sed frequentius ante quadragesi-
 mum, uel post hoc tempus uti licet. Tantam em̄ uehementiā hoc auxi-
 lium habere fertur, ut quidā qui iam aquæ metū sentirent, sumpto El-
 leboro, simulac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruatī.
 Nam & iam uisio tentatos neq; parū adiuuare potest. Itaq; primū cu-
 ram contra rabiosi Canis morsus, breui sermone exposuimus. Iam ad
 alia quæ uenenatis morsibus sæuire consueuerunt, transeundum. No-
 tas uno prætextu, deinde cōmunem medendi modū, qui omnibus con-
 uenire possit, explicabimus. Cursim postremo subiungemus ea, quæ
 Oo

C sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectemus etiam uenenata quæ nullis cedunt remedijs.

¶ Finis LIB. Septimi.

PEDACII

D I O S C O R I D I S



De notis eorum qui a uenenatis de-
morsi sunt, LIB. Octauus,

IO. RVELLIO interprete.

¶ De Phalangijs. CAP. I.

Emorsis a Phalangijs, locus quidē ipse, quasi ab
impacto aculeo rubet, non intumescens, nec p am
bitum calidus, sed mediocriter subrubens. Vbi uero contrariorum oc-
cursu refrigit, cōsequit corpore toto tremor, distēctiōnes circa poplites et
inguina, cōuulsionib. nō dissimiles. In lūbis collectio exoritur. Perpetua
urine libido laceffit, multaq; reddēdis extremētis colluctatio. Vniuersa
cute frigidus sudor emanat. Collachrymāt oculi, offusisq; nebulis caligāt

¶ De Scolopendra. CAP. II.

SI Scolopēdra, aut dicta Ophioctene morsum intulit, locus per am
bitū liuore sugillat & cōputrescit, interdumq; licet raro, sculētus
atq; ruber cernit. A morsu ipso exulcerari locus incipit. Vlcus id negoci-
um exhibet, fere remedijs inuictū. Præterea toto corpore prurigo sentit.

EX M. VERG. COMM.

Habet mare Scolopendras: de quibus secundo uolumine ab hoc, & a nobis longius actū
est. Habet & terra: uerum multiplices, nec eiusdem formæ, maleficiq; omnes. Eam ob causam
hic inter uenenata tantum numerat. Quæ quondam ab enecandis anguibus Ophioctene priua-
tim dicebatur. Notū omnibus Scolopendarum genus: priuatum tamen incognita uobis Ophi-
octene, quam unam in eo genere ueneni maleficium habere hic ostendere uidetur. Et si postero
res græci marinæ etiam huiuscemodi uim aliquam assignarint, discreuerintq; utriusq; morsus
notas: a marina dicentes tumorem aliquando fieri pellucidum, & aque similem: a terrestri ue-
ro rubentem: quam hic tñ proposuisse credi debet, nec nisi de terrestri monuisse. Addiderūt ue-
teres græci aliquid, nec tñ morsus eius liuescere, sed tumere, & extolli etiā locū tradiderunt.

¶ De Scorpione. CAP. III.

SCorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac
intentus rubet, uicissimq; dolore premitur. Modo siquidem ex-
stuat, modo frigore occupatur, labor repente fatigat: aliquando melius-
cule habet, aliquando recrudescit: Consequitur sudor, horroris sensus,
& tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt. Inguina extolluntur.
Tubercula in sede prosiliunt. Capilli eriguntur. Pallor membra decolo-
rat. Dolor tanq; ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur.

¶ De Pastinaca marina.

CAP. IIII.

A

SI marina Pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, labor, & imbecillitas. Mens percussis labat. Postea obmutescunt. Oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

EX M. VERG. COMM.

Non adeo uenenî maleficio infamis marina Pastinaca est, ut non eadem naturæ & morbis aliquando utilis, suas ab hoc ipso scriptore laudes secundo uolumine inuenerit. Eas, omnemque eius historiam poterunt uolentes illinc, & ab alijs de naturæ animalium scriptoribus facile audire. Græcorum medici nullas ex morfu eius notas descripserunt: quoniam non posset piscis quod possunt uenenata alia latere, sed ex morfu eius statim malæ causæ omnis pateret.

¶ De Mure araneo.

CAP. V.

AMure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans ulcus, non ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, et humoris offusio consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

Addiderunt ueteres græcorum medici Mure aranei moribus, quæ ab hoc scriptore non dicuntur has etiam notas. Dolores, qui pulsuum modo per interuallâ pulsant: & in singulis dentium eius animalis ictibus rubores: disruptam præterea pustulam illam candidum ostendere ulcus: nec solum propinqua depasci loca, sed corruptas etiam decidere ex his locis partes. Erant de araneo Mure dicenda multa quæ ueteres tradiderunt, nisi quæ satis esse possint secundo uolumine dicta a nobis iam pridem fuissent.

¶ De Vipera.

CAP. VI.

SI Vipera momordit, corpus intumet, uehementer arefcit, subalbidumque colorem concipit. Sanies a uulnere profunditur, suppurans, mox cruenta. Pustulæ adustis similes erumpunt, & antea depascens ulcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed maxima quoque corripit. Gingivæ ipsæ cruore suffunduntur. Inflammatio circa iecur erumpit. Tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

EX M. VERG. COMM.

Fieri in Vipera morfu præter numerata a Dioscoridis, græcorum medicis hæc etiam dixerunt. Dolores a principio in morfu ipso: mox toto corpore etiam: uiderique in morfu exiguo spacio inter se distantia exigua duo foramina: fluereque primum ex his sanguinem, & aquosum humorem: tum oleosum tantum humorem: postremo uiridi æruginis colore, quod Vipera uenenum aliquod esse crediderunt. Tumoribus præterea, quos hic numerat, liuores illi addiderunt: rubores iidem, oculorum uertigines, stomachi resolutiones, & animæ defectus. Cuncta hæc tamen illi πρὸ τοῦ ἔχειν, ἢ ἐκ τῆς ἀνδρῶν tradiderunt, non satis certa nobis indicatione, duo ne illi serpentum genera, an unum tantum duobus nominibus indicent. Nobis, quatenus obseruauimus in scriptoribus alijs, non uidentur differre Echis, & Echidna: duplexque unius animalis potius nomen quam duorum duo esse uidentur. Paulus Aegineta duo manifeste genera constituit. Inquit enim, ἐκ τῆς ἀνδρῶν ἀλλὰ δύο καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ αἵματος οἱ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἢ ἐκ τῆς ἀνδρῶν. Quod est. Minore autem periculo euadere creduntur qui ab Echidna, quam qui ab Echis morfu fuerint. Ceteri tamen, ut diximus, duo hæc genera

C miscent, præsertimque latini, Viperam utriusque appellantes: tanta est similitudo, tamque in cunctis congener earum natura. Barbarus inter pestis huius notas, *νῆρον* ab hoc scriptore fieri dictum, capitis grauitatem interpretatus est. Cum tamen ad soporem, ut sæpe alias testati sumus, ea vox tantum in grecis pertineat. Alter ne bis de uomitu ageret, tremores reliquit: nesciens *ἰμύτων* corruptam illuc uocem, *τρίμυον* legi oportere: quod meliores greci omnes indicant.

ἐκ τῆς
ἀμφισβᾶνης

¶ De Amphisbæna. CAP. VII.

Consimilia eueniunt ijs qui ab Scytala nomine, aut Amphisbæna demorsi sunt. Eademque fere auxiliantur. Quare hoc uenenum priuatam descriptionem sortitum non est, quæ non eidem generi assignandum sit.

EX M. VERG. COMM.

Diuersa duo hæc animalia sunt. Indicant id Lucanus poeta in. 9. omnesque alij. Eapropter cum male in scriptore hoc locus hic legeres, coniungerentque simul Scytale, & Amphisbæna, quasi duplex unius tantum nomen esset, nos & rei ipsius, & aliorum scriptorum auxilio, locum in integrum restituiamus.

¶ De Druino. CAP. VIII.

ἀρβύνοιο

A Druino morsus pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim qua dilutæ saniei emissarium subest. Quinetiam erosio, torminaque consequuntur.

EX M. VERG. COMM.

Libet ex Paulo Aegineta addere quæ cum maleficio suo hanc pestem certius aperiant. Eius de Dryino uerba hæc sunt. In radicibus Quercus, a qua arbore nomen inuenit, uitam Dryinus agit: tam malefica, parataque ad nocendum ui, ut calcatus tantum cute nudos hominis pedes relinquat, totisque cruribus tumorem faciat. Ferunt præterea, quod magis mirentur omnes, nudari cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis interfecerit, male olere bestiolam, suoque illo odore omnium aliorum odoris sensum auferre. Inter notas morsus eius, numerauit idem Paulus, etiam cum rubore circa morsus locum tumorem fieri. Desyderauimus & nos Dryini morsus notas uertentes, qua parte corporis erosiones illæ fiant: uerbi causa, stomachi, aut alterius cuiuspiam in homine partis. Nobis in stomachum inclinât animus: sed in nullo grecorum ea vox inuenta a nobis est.

ἡμorrhόιοιο

¶ De Hæmorrhoo. CAP. IX.

A B Hæmorrhoo ictis uehementes cruciatus accidunt, qui breuē strigofamque prorsus raritatem ex continuo dolore præbent. Ex plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnuscque adfuerit, frangitur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur. Profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem excussunt, & nullo denique remedio euomunt.

EX M. VERG. COMM.

Foeminino genere nono sui carminis uolumine Lucanus serpentem hanc Hæmorrhoidem dixit descripsi: longissime cunctis eius euentibus, miserabile omnibus Romani militis mortem fecit. Nos plerumque in alijs de Hæmorrhoo hoc tradidimus. Eamque ob causam relicta nunc omni eius historia, quæ etiam ex eo poeta repeti potest, monemus, uideri nobis in hoc capite male legi locum cui uirij notam adieciimus, & in quo discrepant a nobis reliqui interpretes: idemque relinquere peritioribus instaurandum quod in eo uarie legitur, ex dolorum continuitate breuia, angustaque reddi corpora. Alij enim id totum aliter reddiderunt. Nos communiorē sectionem eo quo legitur modo uertimus. Et quem reliquit Barbarus sanguinem, quoniam in Dioscoride non legerat, ex alijs grecorum scriptoribus reddidimus. Ille enim e loco ictus multum excerni liquorem tantum ait, nulla eius liquoris indicatione: cum tamen sanguinis ea sit, & sic in melioribus adhuc legatur,

¶ De Diplade. CAP. X.

A

QVos Diplas percussit, intolerabilis ardor premit. Sicq; usq; eo pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla intercapedine ex-
cruciet. Et si potum affatim trahant, ilico in eandem sitim re-
labuntur. Iis uero qui per initia potum nō hauserunt, simile quiddam
prorsus accidit. Quare propter cōtinuam sitim, & Prester, & Causon,
aut Pfas appellatur.

¶ De Hydro. CAP. XI.

AB Hydro demorsis ulcus dilatatur, & lividum ac ingens eua-
dit. Sanies ex eo multa & atra & male olens, non secus atq; ijs
quæ serpunt ulceribus expuitur.

EX M. VERG. COMM.

AB aquis græci Hydron, Romani a natatu, qui tutus in eo elemento terrestrium animalium
motus est, Natricem nominauerunt. Pulcherrimum hoc anguium genus, qd in aqua uiuit nul-
lis serpentiū ueneno inferius aut ignauius. Ex quo Romanus Cæsar, turpis & malefici ingenij ho-
minem, Natricem se Populo Romano nominis & imperij sui hæredem alere lamentabatur.

¶ De Cenchro. CAP. XII.

Cenchri morsum, qui uipe, ino ictui similis est, putridū ulcus se-
quitur. Carnes antea ut in aqua inter cutem prætumidæ, defluz-
unt. Letargo corripuntur, et ueterno pressi, somnos captant. Erasistra-
tus eos iocinare, uesica, coloq; conficari autor est. Quippe dissectis is-
plis, omnes fere partes corruptæ reperiuntur.

EX M. VERG. COMM.

PLuribus hic maculis uariatā tingit aluū, ut Lucanus cecinit. Quæ qm Milijs seminibus simi-
les sunt, quam frugem græci cenchron uocant, nomen serpenti hoc fecerunt. Plura quo dixi-
mus loco poeta ille de serpente hac egit, quæ poterunt uolentes ab eo audire.

¶ De Ceraсте. CAP. XIII.

ACeraсте percussis locus attollitur, cum duricia pustulosus. E pla-
ga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa concre-
mentum totum rutilefcit, genitale intenditur, mens labat, oculorum ca-
ligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti commoriuntur.

EX M. VERG. COMM.

HAbet Cerastes hic cornu figura callosam in fronte carunculam, unde illi nomen factū est.
Cornu enim ceras, græci uocant. Diuersus hic ab his uermibus est quos Plinius in Cossorum
genere in arboribus nasci tradit: & Cerastras pariter appellat. Sunt Diosco. & græcorum medi-
cis, præsertimq; Paulo Aeginetæ de Ceraсте hoc omnia eadem: præterq; ubi hic uisq; dicit fieri, et c.
quod interpretes alij ad colorem simpliciter contraxerunt, rutilefcere & ruffescere dicētes. Nos
uicissim in alijs legentes, eorum sententiam potius secuti, uaricum modo tumere totum cor-
pus his diximus. Id enim magis placuit, cæteris notis magis congruere uisum. Tument enim
uaries, quam in hac peste præcipuam notam hic numerauit.

¶ De Aspide. CAP. XIII.

AB Aspide ictus, uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu ci-
tra eleuationē conspicit. Sanguis exiguus ille qdem, sed ater de-
stillat. Caligo uelox oculos obnubit. Labor in totū corpus multiplex,
omnino leuis, & nō sine uoluptate cōsequit. Ideo Nicāder perpulchre
cecinit. At uir perit absq; labore, discolor, atq; uirēs. Aliquātulus cordis

Cæstus afficit. Frons ppetuo reuellitur. Genæ cōtremiscūt, quasi sine sensu in somno uacillent. Hos mors tollit ad diei trientē non dilata.

E X M. V E R G. C O M M.

Tria Galenus Aspidum genera esse testatur: numeratq; primum eius quam Chersæam uocant; mox eam quæ Chelidonia dicta est; tertiam postremo quam Pryda nominauerunt. In omnium nominibus naturæ earum indicatio & nota aliqua est: sed nulla certior, & quam solam cognouisse nunc satis sit Pryade illa, quæ omnium perniciosissima est. Siquidem erecto in anteriorem partem collo, ex interuallo quod satis ea fore coniecerit, uenenum in hominem iacula-
tur, eoq; nihil aliquando huiusmodi timentem, & incautum conspuens perimit. Et quoniam græcis ptyin, expuere sit, ideo Pryda eam nominauerunt. Ex hoc genere ferunt Aegypti reginam Cleopatram, cum deuictō Antonio Augustum uictorem timeret, sinistræ mammæ admo-
uisse, morsuq; eius seruitutem, & uictoris triumphalem pompam euasisse.

¶ De Basilisco. C A P. XV.

ERasistratus in libro quem de medicaminibus & uenenis condidit, de uocato Basilisco scite ita refert. Cum Basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem exflauescit. Itaq; in plurimis quæ uirus eiæculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntēs utiq; ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

E X M. V E R G. C O M M.

DAro, ut græcorum scriptores retulerunt, uidetur Basiliscus: totius ideo historię eius fidē penes autores hic esse uoluit. Eo enim pertinet quod Diosc. inquit in cōmentario de uenenis & remedijs, Erasistratum de Basilisco testatum fuisse: cum momorderit, sufflauo, & quasi aureo colore plagam fieri, &c. Vidisse tamen eum eos oportuit, qui traicctam per caput eius diadematis figura, candidam lineam contemplati, Regulum ob eam causam nominauerunt. Lucanus nihil de Basilisco aliud inquit, q̃, Sibilaq; effundens cunctas terrentia pestes. Ante uenena nocens late sibi sum mouet omne Vulgus, & in media regnat Basiliscus harena. Quod Plinius
29. uolumine, cap. 3. cōfirmauit dicens, Basilisci, quē etiā serpentes ipsi fugiunt, alios olfactu necantē: qui hominē uel si aspiciat tātum dicit interimere, &c. Veneni eius penetrālē per oīa uim, non multo post idem poeta descripsit. Quod totum poterunt uolentes in eo uidere.

¶ Cōmunis curatio in oēs ictus uirulentos. C A P. XVI.

ADuersus quidem omnem animalis ictum, quod uenenum uibrat, oris succio conuenit. Sugentem uero oportet ieiunium nō esse, sed & cibum sumplisse, & uino os abluisse. Postea exiguum olei in ore continens ictum exugat. Locus ipse spongia fouendus. Deinde scarificandus. Sed ulcuscula altius imprimere expedit: quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longe potentius opitulant. Namq; ab ijs duo peculiaria p̃sidia fiunt. Vnū, q̃ uirus e loco tollitur. Alterum, q̃ ante occurrentes q̃ interna subeat, cū sanguine copioso excernit. Quod si locus carnis circūscriptionē nō admittat, cucurbitulę cum largiori flamma adfigendę sunt. Sed iā de uisitatione, supra in rabiosorum morsu disseruimus. Si uero icta pars, utpote extrema, sectionē cōmode nō respuat, p̃sertim in omnibus serpētibus, ut aspide, cerasse, & similibus, p̃culdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt quę Epithemata uocant. Imponat sarmēticius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio, subacta stacte, garo, & acri salsamento. Porri, cepe, & allia mō minutissime cōtrita illinunt, mō cremata uul-

neribus iniiciunt. Quinetiā dissecti gallinarū pulli cū maxime tepent, **A** percusso loco conuoluunt. Nec defunt q̄ hisce tanq̄ discordia quadam naturali pugnantis utant. Verū huius rationē inire facillimū fuerit. Gallinę em̄ calida natura p̄ditae sunt: argumēto, q̄ deuoratū insigne uirus eliquēt, & aridissima quęq̄ semina consumāt. Itē nōnunq̄ harenas, lapillosq̄, q̄s faucibus insinuarint, dissoluunt. Itaq̄ animātis calore, spūs ic̄te partis impetū capescēs, uenenū exigit. Nec me fugit, qd̄ i aegypto fieri soleat. Cū spicas Aegyptij metūt, ollā picis paratā habent, et appensam fasciā. Tunc em̄ maxime serpentū iniurias expauēscūt, tum p̄pter spicilegij tempus, tū q̄ opacis simul abdite spelūncis, & cauernis, densoq̄ aruorum cespite delitescunt. Molestiora em̄ animalia, et uirus eructantia Aegyptus in campis ferre consueuit. Vbi ergo aut in pedē, aut partem aliā morsum intulerunt, affidentes, fasciam in ollam picis coniiciūt, & semel, aut iterum brachiū, aut crus paulum supra uulnus obligāt, & arctissime duo e presentibus distringūt: locūq̄ secantes qua circūactus est laqueus, picē instillant. Cūq̄ satis uulnus excepsisse uideat, laqueū resoluunt, et cepis, alijsq̄ supra memoratis illiniunt. Præterea pix liq̄da cū sale trito et seruētē illita, p̄sentanco est auxilio, si iugiter innouet. Conuenit et cedrus, & simū caprarū ex uino decoctū. Locū aceto calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare **B** est. Quinetiā nō defunt emplastra uehementissima, & calidissima, quae uenenū elicere, expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quę ex sale, aut nitro, sinapi, & semine rorismarini componuntur. De quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus aut nō iniusta reprehensione eos incescit, q̄ incognitas ad hunc usum facultates conscripserūt: ut elephanti fel, testudinis sanguinē, aut crocodili oua, & cōsimilia. Nā cū iuuantia quędā literis tradidisse uident, plane in hec sola incidentibus impōsuerunt. Quare talia deuitanda sunt: cū difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neq̄ quo nostra fides ijs obstringatur, frequēti obseruationē sufficiēs expimentū p̄stiterint. Quae aut ad cōmunē omnium usum p̄tinēt, quęq̄ facile suppeditari, & omnibus a serpente percussis auxiliū ferre queūt, subiungēda uident. Intubus itaq̄, & Erica, & Astragalus cū aceto potus, contra oēs serpentū morsus auxilianē. Itē Bitumē, et uirētes Platani pillulę in uino diluto coctę, & Paliuri decoctū, radix Aristolochig, et Eringij. Decoctę etiā Lauri bacę, et deuorate, Piperq̄ largius esitatū, Ruta, Anetū, et Cyclaminus. Coma porrorū priuatū ex pane, aut alliū, aut cepe, balsamētaq̄ q̄ acerrima, origani decoctū cū uino potū, fceniculi, pulegij, calamithę porrorūq̄ succus cū melle desorptus. Hęc qdē a plātis congrunt. Ab animātibus uero quędā cōmo de peti solēt. Gallinaceorū cerebella in cibo, lepторинū coagulū cū uino. Itidē castorij sextās. Testes marinae testudinis sumpti, multū p̄desse tra-

C dunē, Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleq; siccescens inueteratur: ex aqua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hactenus. Percussis a serpente prodest alui deiection, diffuens sudor, urina copiose reddita. Composita etiā quædam recenter remedia polliceri traduntur. Vtopij, & myrrhæ singuli oboli, piperis quicunx. Ea melle excipiuntur, & instar ægyptiæ fabæ dantur. Idem syluestris rutæ seminis, gith, cumini æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. Dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de cōmunibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs cōtra bestias quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

E X M. V E R G. C O M M.

C Opiosiores, certioresq; in cōmunibus his contra uenenata remedijs posteriores grecorum medici fuerunt. Neq; inmerito, accrescentibus artī quotidie nouis eorum experientijs. Quas deinceps obseruantes, qui salutī humanæ diligentius confulerent, monuerunt, non esse cucurbitulis simpliciter utendum, sed anteq; uulneri admoueantur, propinquas confodiendas esse partes: ut pluribus quasi canalibus una cum sanguine & spiritu uenenum foras trahatur. Addiderunt præterea, in repleto hominis corpore, secta uena mittendum esse sanguinem: quod nullibi a scriptore hoc præcipitur. Et in admouendis moribus, aut ictibus uenenatorum, dissectis galinaceis, cæteris omnibus mares anteposuerunt. Deficientibusq; his, ne quid ad faciendam hominī medicinam deesset, dissecta eodem modo, & ad mota animalia alia in eum usum receperunt. Aliam a Dioscoride causam reddentes: q; scilicet uenenum in se trahunt, & dolores leuant. Quinetiam uri locum, & ignis crustā uulneri induci iusserūt. Quod in scriptore hoc tm signat, cū de adustione dictū a se fuisse ait. Pluraq; alia, quæ longius poterint uolentes ab eis audire.

¶ Finis. L I B. Octauī.

P E D A C I I

D I O S C O R I D I S



Cōtra Venenatos morsus L I B. Nonus,
I O. R V E L L I O interprete.

I H I L inter ferientium uenenatorū notas de Vespīs, et Apibus articulatim digessimus: q; conspicuæ omnibus forēt, & nihil excellens, aut nota tu dignū in his obseruaretur: inter remedia tamē earum meminisse non fuit alienum.

A ¶ De Remedijs cōtra Vespārū, Apūq; ictus. C A P. I.
Duerfus Apū, Vespārūq; ictus, prodest illita malua, & hordeacea farina cū aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, a muria, aut maris aqua fots.

E X M. V E R G. C O M M.

Q V; neglexit Diosc. Apū & Vespārū ictus, notas & signa posteriores excerpunt. Ab Apis ictu dicētes statim sentiri dolorē, rubere locū, tumere, ppinquas & incrementum partes, spi

culūq; in uulnere relinqui. In Vespis deinde eadem, sed intensiora omnia; nec relinqui spiculū. Addiderūtq; in remedijs, lutū, & bubulum fumū, quibus illeuisse ictus utile sit: & p̄ter hæc con-
cisa, & posita mori arboris folia. Relinqui autē ab Apibus in ictu spiculū Aristoteles, de anima
lū historia, & Nicander in Theriacis suis testant; suoq; illo telo castratas perire.

De ictu a Phalangio.

CAP. II.

Phalangiorū ictibus ficulneū cinerem, adiecto sale trito & uino im-
ponere oportet, aut radicem syluestris punici q̄tenuissime tritā,
aut aristolochiā hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris pro-
luenda, aut apiaſtri decocto. Folia eiūdem illinenda. Lauacris perpetim
utendū, & potionibus quæ hæc medicamēta recipiant, abrotoni semen,
anifum, aristolochiā, cicer syluestre, cuminū æthiopicū, cedrides tri-
tas, platani corticem, & trifoliæ hærbæ semen. Priuatim autē singulorum
ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit. Item myricæ fru-
ctus, & chamæpityos, & uiridiū cupressi pillularū decoctum, ammisto ui-
no. Sunt qui fluuiatilem cancrū in succum redactū, cum aqua, aut lacte,
assumpto apij semine confestim molestijs liberare prodant.

EX M. VERG. COMM.

Sunt in græcis nec reprobandæ fidei codices, in quibus non Aniso, sed Anetho contra Pha-
langiorum morsus pugnatur. Nos tamen eiūdem scriptoris huius decreta in Aniso secuti,
quod utile his quæ uenenum ictū, aut morsu relinquunt, ab eo dictum est, Anisum, ut in com-
muni lectione erat, reddidimus.

De morsu Scolopendræ.

CAP. III.

Si Scolopendra morsum infixit, sal q̄leuissime tritus ex aceto uulne-
ri inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida mu-
ria perluendus. Danda in potu aristolochia cum uino, aut serpillum, aut
calamintha, aut ruta syluestris.

EX M. VERG. COMM.

Adicerunt remedijs his ueteres græcorum medici pleraq; alia. Cinerem aceto macera-
tum, aut scyllam uulneri iubentes imponi. Quodq; hic iubet, oxhalmē fouendum esse locum,
auctore Archigene antiquissimo medico, calido oleo fieri aliqui instituerūt. In portionibus etiā
am asphodeli radice usi sunt.

Remedia ad Scorpionis ictum.

CAP. IIIL.

Percussis a Scorpione, præsentī est auxilio ficulnum lac in uulnus
instillatum. Scorpis ipse qui ictum uibrauit, tritus, & percussio
loco impositus, suæ plagæ remedium est: ob quamdam, ut constat discor-
diam. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa conue-
nit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina excerptum, & em-
plastri modo adiectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam
ductum, & calamintha, quæ trita illinatur. Et farina hordei in uino para-
ta, in decocto rutæ. Semen trifoliæ hærbæ tritum, & uulneri iniectum, o-
pitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Post hæc q̄fficacissimis po-
tionibus utendum: cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ
drachmæ cum uino. Tusa gentiana, & pulegiū decoctum, & bacæ lauri
paucō numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere disco-
qui debet. Cupressus cum uino, & ruta. Nec secus ficulneum lac, laserpi-

C tium si adsit: sin defyderetur, peucedani succo utendum. Efficax est potus trifolij succus, & ocimi semē. Omnibus autem ijs perpetuis lauacri usus, euocatus sudor, & diluta uini portiones registrum.

E X M. V E R G. C O M M.

N On poterat sine græcorū latinorumq; scriptorū aliquot ope integra huic scriptori Scorpionū morsus curatio nunc esse: tam longe ab antiquæ lectionis ueritate deuia, parum diligentes græcorū librarij eam fecerant: pro parthico lasere, peucedanū: & pro cyperide, cupressum modo nobis ostendentes. Id cæteri interpretes, aut in extremo opere festinantes, aut scorpionum iniurias parū timentes, qualia in impresso scriptoris huius codice omnia legebatur, talia etiā uerterūt. Cum tamē utriq; facillimū fuisset: & si græcorū medicos, præsertimq; Paulū Aeginetam nūq; antea legissent, ex Plinio locum emendare: qui, ut uolumine, capite, is: de Cypero agens, inquit, Cypero uis in medicina, &c. pauloq; possit. Radix aduersus serpentium ictus, & scorpionum præsertim remedio est. Aut si ex Plinio id etiā agere noluisse, in scriptore hoc saltem meminisse debuerāt, contra scorpionum ictus Cyperi radicem præcipue laudari. Sed omnium aliorum certissimus instaurandi eius loci auctor Paulus Aegineta illis fuisset, Cyperide contra scorpionum ictus manifeste utens. Debuerat & illud homines monere, nihil huiusmodi cupresso, aut ab hoc, aut ab alijs tribui. Eodemq; modo pro Peucedano, cui nulla contra scorpiones uis est, parthicum laserpiciū mutare. Quod hic ipse scriptor contra uenena omnia in Silphio laudauit, id alter ex eis melioris codicis, quem ipsi etiam uidimus, ope adiutus, animaduertit, & felicius uertit. Sed certius totam & ipse scorpionum rem absoluisse, si eundem Paulum Aeginetam libro, r. de his agentem diligentius audisset. Sunt enim in reliquo capite pleraq; alia, quæ ab eo, & ab altero parum apte uersa fuerunt: quæ nos breuitati consulentes, reliquimus. Multoq; magis, ut quæ addiderunt, mutauerunt in his posteriores græcorum medici, breuiter dicamus: quæ huiusmodi sunt. Althea, quæ hibiscus est, simpliciter hic uti iubet. Respondetq; hoc decretis ab eo in ea herba: in qua testatus est, Altheæ folia uenenatorum moribus, & ambustis mederi. Illi autem semini has tribuerunt uires. Et quas hic iubet sumi pauciores lauri baccas, illi decem tantū decernunt. Quinetiam, argentī laminā uulnere impositam, egregie prodesse testantur. Bibendum præterea Sulphur uiuum in uino additis pipæris granis octo. Lasæris liquorem cum tritis cancris, Nigellæ, & Aethiopiæ Cynint, & Viticis semeni, cum itaq; æquali pondere cum uino iubent.

D

C Aduersus marinæ Pastinacæ, Scorpj marini, & Draconis ictus. C A P. V.

E I qui a marina Pastinaca icitur, omnia quæ de Viperarū morsu paulo postreferemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus a marino Scorpione, & Dracone inferuntur, qui molestos cruciatus ciunt. Interdum autem, sed raro nomas excitant. Quibus absinthij, saluicæ, aut sulfuris ex aceto triti portio subuenit. Pastinaca diuulsa, & uulnere imposita, sui ictus medela est.

E X M. V E R G. C O M M.

V Enenīs ex mari addidit hoc loco Dioscorides Draconem, & Scorpionem, nullis tamen descriptis antea eorum maleficijs notis & signis. Quod quare factum eo sit, non facile est conijcere. Nisi forte, quia alia piscium q̃ terrestrium ratio sit: possuntq; terrestria fallere incautos, marina autem nisi in aperto nocere hominī nequeunt, ideo relicta a scriptore hoc illa fuerint. Siquidem posteriores græcorum medici, & ipsi nihil huiusmodi addiderunt. In remedijs tamen copiosiores præter ab hoc scriptore dicta præceperunt, plumbo confricandum esse marini Draconis ictum, Triti serpillō, aut elixa lente, aut uiuo sulphure obstruendum locum: eundemq; hoīs urina fouendū. Et absinthiū in diluta uini portione dandū: dandum & scilicetorum furculorū in dulci uino dilutum. Contra Scorpj uero ictus: nullum piscem dissectum imponi iubent. Quod miretur aliquis a scriptore hoc relictum fuisse: cum secundo uolumine de Mullo pisce agens, inter cætera uim hanc illi tribuerit. Nisi satis fore credidit, semel quocunq; loco de eo traditum fuisse. Adiciunt præterea, uiuo sulphure confricandum esse locum, bibendasq; tritas lauri baccas numero tres,

¶ De morfu Muris aranei.

CAP. VI.

A

SI Mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium per se
vulneri exterius impositum, aut medicamenti modo aceto tritum,
& hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam Mus ipse, qui mor-
fum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. Resistant quo-
que acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, nec
non aqua calida fotus. Sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum ab
rotoni decoctum, maxime si in uino detur. Præterea serpyllum, & gal-
banum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pillulæ cum aceto, &
cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum uino, & chamælæonis
herbæ radix. Nec desunt qui literarum monumentis tradiderunt, tri-
tum Murem araneum contra suos ictus cōmode bibi. Quam historiam
apud alios inuentam, dignam dumtaxat censuimus, quæ annotaretur.
Alij asseuerant, demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus Mus ara-
neus astiterit, tum quoq; auxiliari referunt.

E X M. V E R G. C O M M.

Multa sunt quæ alia, & aliter pro Muris aranei morfu ueteres græcorū medici docent. Pri-
mumq; inter ea quæ emplastri modo imponuntur, non dulcis punice acinos, ut cōmunis ferele-
ctio habet, sed Malicoriū imponi iubent, aptiore remedij genere q̄ si quis acinos dixerit. Nu-
merant mox agrestem maluam, & ex aceto tritum sinapis semen. Cumq; & ipsi calida aqua,
uerumtamen marina (quanti uocem deesse huic scriptori suspicamur) locum foueri præcæpe-
rint, adijciunt statim, cremata hōrdea ex aceto imponenda esse. In potionibus deinde, non nu-
merata ab hoc scriptore, adijciunt sisymbrium, saluiam, hedinum agnitumue coagulum, gen-
dianæ radicem, aut uerbenacam, cunctaq; cum uino. Quinetiā cum uino bibendum tritum
Murem araneum dicunt. Facere ad hoc ueneni genus myrrham pondere semissis drachmæ,
& aristolochiæ corticis drachmas quatuor. Sunt & alia ab eis in huiusmodi malo obserua-
ta & tradita remedia, sed efficacissima, & præcipua hæc sunt. Post quæ erat dicendum nobis,
cur in extremo capite uisij nota æditioni huic nostræ addita sit. Sed tam aperta erit græca in-
telligentibus eius consilij ratio, ut nihil iacturæ sit eam non tradidisse, præsertim in extremo
opere ad ea quæ supersunt festinantibus.

B

¶ Ad morsum Viperæ remedia.

CAP. VII.

SI Viperæ morsum impressit, simum caprinum cum uino impositum
opitulatur. Item laurus & abrotonum & galbanum splenij loco su-
periectum. Origanum uiride inditum. Pulli gallinarū discerpti, & conse-
ctim admoti. Erui farina, aceto mulso subacta. Radicis cortex usq; eo tu-
sus, ut in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum,
hordeaceum cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus ante cali-
da foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum
uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari pro-
dunt. Leporini coagulū in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi he-
mina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta. Hæc in uino
potari debent. Merum continuo bibendum, allia mandenda, & cæpe, &
porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sunt. Per-
cussis a Serpente præclare auxiliatur medicamentum quod myrrhæ, pi-
peris, castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo constat.

C Hæc omnia in cretico passo teruntur, aut in alio probato uino. Erasistratus in eo libro, qui *περὶ συνδύμων*, id est, de uiribus inscribitur, plæræq; alia tradidit, quæ ictis ab Vipera auxilium ferre possunt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potū. Quinetiam bonum est digitum in liquidā picem intingere, deinde uinū, quo digitus fuerit elutus bibere. Hæc sunt quæ contra Serpentium ictus auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Sunt toto hoc capite a scriptore hoc decreta, quæ contra Viperas imponi, comedi & bibi oporteat. Quæ item simplicia, & quæ composita eius mali remedia sunt. Adiecerunt his alij græcorum medici plura alia. Elixas in cibo rānas: in poculis meraci uini potiones, tam presentī remedio, ut si quis remedio eo utatur, nullo alio opus sit: Marinæ testudinis, cum agresti ciminio sucum, sanguinemq; Leporis, inulue tribolari pondere coagulum: Siccati ceruini genitalis drachmam: Panacis cum uino radicem: Agarici drachmā: Luniperi baccas: Asphodeli radicem: Condisa pistacia: Viticis semen: inueteratæ mustelæ drachmas duas: Fluuiiales marinosue caneros perse, & cum pediculari herba, quam Staphidagrium uocant, faleq; & polio: Aristolochiæ, cum myrrha radicem: Gentianæ, baccarumq; lauri parem mensurā melē exceptam, Oribasius prætereapriuatum, quam alij Aristolochiæ radicem, radice ille corticem sumi iubet. Addit & castorium, & opium: iubetq; habita uirium ratione, in diluta uini portione dari. Lycus Sandaracam & Anethum adiciebat. Archigenes Lauri folia in oleo decocta imponi iubebat. Tamq; in toto hoc genere remediorum abundanti græci, ut multum illis merito secuta tempora debeant: qui dum salutē humanæ consulunt, nihil intentatum reliquerūt. Poterant plura alia etiam numerari, sed ex multis satis hæc fore opinati sumus. Poterunt enim uolentes a Paulo Aegineta & hæc & plura alia certius audire.

D.

De Amphisbænæ morfu. C A P. VIII.

DE Amphisbæna mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferere medicis ad Viperas scriptis, percussis ab ea, adiuuari soleant.

E X M. V E R G. C O M M.

Breue quidem, non leuiter tamen corruptum in cunctis fere græcis, quos hætenus uidimus, hoc caput erat. Id aliorum scriptorum, & eius qui mihi omnium uetustissimus & probatissimus græcus codex est ope, & ex hoc ipso scriptore in eam quæ legitur in æditione nostra formam restitutum est.

Contra Druini ictus remedia. C A P. IX.

ADruino ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifoliū hæba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni quærcus genere. Tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

E X M. V E R G. C O M M.

Quas hic dolorem lenire tantum ilicis radices tusas, & loco impositas ait, cæteri remedio esse dixerūt. Hic *παρηγορητικόν*, quod ad leniendum dolorem pertinet, inquit, illi *ἀπαρτιωτικόν*, quod ad opem remediiq; & salutem.

De Hæmorrhoi, & Dipsadis ictu. C A P. X.

HÆMORRHOI, Dipsadisq; morsus, uelut immedicabiles a plæriscq; maiorū deplorati relinquebantur. Quare si peculiaribus contra Dipsadem medicis egeamus, cōmunia experiri operæ precii erit. Protinus autē scarificatione uti, ustionem facere, & si locus patiat, amputatōe opus erit. Consequēter q̄acerrima cataplasmata ad mouere, de quibus sepenūero diximus. Nec me fugit, acres cibos maxie a fassamē

• tis utiles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interie- A
cto breui spacio assumenda sunt, priusq̃ morbi genus emerferit, quo se-
mel erumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu Hæmor-
rhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, ut scarificati-
ones, escutiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in Dipsade definiui-
mus. Quin etiam decocta uitis folia, & cum melle trita.

EX M. VERG. COMM.

I Nuenisse se ab antiquioribus tradita Paulus Aeginetæ, quæ præter supra dicta uulneri impo-
nerentur, hæc etiam inquit. In Dipsadis morsu concisa portulacæ folia ex aceto: Polentam i-
dem: Rubiq; concisa cum melle folia. Plantaginem præterea, Hyssopum, Allium, Elaphobo-
scum, Porrum, Rutamq; & Vrticam. In Hæmorrhoi autem hæc ipsa, & præter hæc elixa uitis
folia cum melle concisa. Nec minus Hæmorrhoi ipsius crematum caput in potione datum:
aut cum Irino oleo Scordion herbam: comedendasq; in periculo hoc passas uuas. Non con-
uenit deinde nobis in hoc capite cum alijs, quo loco hic scriptor ait, *ἡ δὲ δριμυφάγος χρῆται μὲν*
κῆρ, μέλαινα τὰς ἀπὸ τῶν περιχρῆσιν. Illi enim Drimiphagias frequentem in hoc scriptore uocem,
ad acres tantum cibos contraxerunt. Nos ut est communis & propria eius uocis in medicina
æstimationo, ad eas uomitiones retulimus quæ accremento ciborum quaruntur. De quibus a-
ctum longius secundo uolumine a nobis in Omotharicho est.

De morsu Hydri.

CAP. XI.

S I morsum Hydrus adegit, prædest origanum tritum, & aqua subas-
ctum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut quærna
radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colloquato. B
Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto uino, aut poscæ
cyathis duobus: deinceps marrubij succus, uel decoctum utriusq; cum
uino. Fauus recens datur in aceto.

EX M. VERG. COMM.

N On satis certa in hoc capite omnia in græcis sunt. Pluribus enim locis a reliquis græco-
rum disciplina uariant, quæ hic scriptor pro Natricis morsu constituit: non tam adeo diuersa
nobis uisa sunt, ut mutare aliquid, aut addere placuerit. Illud tantū monemus, quod Barbarus
ait, bibendū porri succum, &c. nos Marrubij dixisse, concordi in hanc uocem græcorum alio-
rum medicorū præcepto: qui prasi, id est, marrubij, non prasi, id est, porri succo uti iubent.
Potuit ille suorum codicum fidem sequi: nos cōmunem lectionem, & ueterum auctoritatem
magis amauimus. Addiderunt græcorū medici remedijs ab hoc scriptore numeratis Nastur-
cium, Asphodeli semen, floremq; & cum uino sceniculi semen,

De morsu Cenchridij.

CAP. XII.

M Orsis a Cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semi-
ne illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum cum
duodecim hastulæ regiæ drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolo-
chiæ radix. Item cardamomum, & gentiana.

EX M. VERG. COMM.

C Orruptū, maleq; habitum a librarijs aliquot locis caput hoc est. Licetq; Pauli Aeginetæ
auxilio totum restitui possit, satis tamen nobis fuit pro Cardamomo, quod passim in eo lege-
batur, Cardamon, id est, Nasturcium uertere. Factumq; id est, non tam quia ut diximus Carda-
mo græcus ille scriptor manifeste uisitur, q̃ quia hic ipse scriptor in Nasturcio dixerat, *ἡ δὲ δριμυφάγος χρῆται μὲν*
κῆρ, μέλαινα τὰς ἀπὸ τῶν περιχρῆσιν. Quod est, Potum serpentibus remediū est. At Cardamomū etiam
id præstat. Scimus id quidem: sed utentibus ad hanc rem Nasturcio alijs in ambiguo id potius
elegimus, q̃d græci alicuius scriptoris auctoritate defendi posset. Vitiū suspicari sumus illuc etiā
esse, quo loco non integræ lectionis notā adiecimus. Credimus em̃ legi quondam potuisse ali-

C ter cum locū, καὶ ἱππῖλλας σὺν ἀσφοδῆλαι λαλαμῖνες, ποτισθῆμα δὲ παραχρῆμα κενταυρίον τῆς πίσης ἀρά-
χμῶν δὲ σὺν ὄνω κνάθοις γ. Quorū sensus est. Et Serpillū cum Asphodelo tritum. Potiones autē
statim Centaurij radicis drachmæ duæ cum uini cyathis tribus. Nihil nos tamen mutauimus,
locum legentibus signasse contenti. Sumusq; ad hoc Pauli Aeginetæ disciplina, & præceptis
usi: qui totum scriptoris huius caput ipsēdem uerbis commentarijs suis adscribens & miscens,
quo diximus modo totam hanc rem docet.

¶ De percussis a Ceraſte.

C A P. XIII.

S I Ceraſte, aut Aspis percusserit, cita partis amputatio suffragatur.
Quare sine mora ictam partem amputare, aut scalpro confestim cir-
cumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper admouenda.
Siquidem uirus hoc ueneno Basilisci simile est.

¶ De morſu Aspidis.

C A P. XIII.

I s qui ab Aspide feriuntur, quæ de Ceraſte scripta sunt auxilia da-
ri debent. Nam uenenum hoc quemadmodum Basilisci, aut sanguis
bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit

E X M. V E R G. C O M M.

S Eorū, duobusq; capitibus de Ceraſte hic scriptor & Aspide egit, contra q̃ in Græcis alijs
omnes fecerunt: qui simul de utroq; docuerunt, certius remedia hæc etiam tradentes. Dico
autem certius, non quia plura, aut alia, sed quia expoſitis remedijs illorum causis & tracta-
tionibus, certior legentibus totā hanc rem fecisse uidentur. Nos eam relinquimus, non tam
breuitati consulentesq; q̃ quia nihil huic scriptori contrarium, aut aliud in eis est.

¶ De Basilisci morſu.

C A P. XV.

D A D Basilisci morſum, ut Erasistratus author est, auxiliatur ca-
storij drachma in uino pota. Item papaueris succus.

¶ Ictuū remedia ita se habent.

E X M. V E R G. C O M M.

Q Uæ ab Erasistrato contra Basilici morſum instituta quondam fuisse Diosco. ait, ueteres
græcorum medici incerta sibi esse tradiderunt: propterea, q̃ eorū periculum nunq̃,
aut rarissime ab aliquo factum fuerit. Et hæc quidem hæctenus. Nobis sane longe plura, & ma-
iore q̃ a principio cogitauimus operis incremento aucta. Dioscoridi uero, & legentium desy-
derio (tam late tota hæc res patuit, & nos tam multa, quod iam pridem sentimus, parum certe
diximus) nunq̃ satis futura: nisi uoluntatem nostram magis q̃ officium manes eius amaue-
rint: & qua solent humanitate bonarum artium, & humanitatis professores nostra hæc excæ-
perint: nec quatenus aliquid præstitimus, sed quid conati fuerimus, in honoris & officij cen-
su nobis numerauerint. Relinquimus nos in extremo hoc opere quæ ab interpretibus alijs im-
portune, & contra suam etiam iudiciū addita huic scriptori fuerunt. Pro comperto enim
nobis est, non esse eius, quæ tam leuiter, superstitioſeq; in eis docentur. Relinquimus & quæ ali-
quando polliciti sumus in ultimo opere, addituros nos esse, Colorū proprias cum suis disci-
minibus uoces: & antiquorum ponderum, mensurarumq; omnium antiquas rationes: præfer-
timq; quibus græcorum mensuris & ponderibus antiqua Romanorum, & nostrorum tempo-
rum pondera & mensuræ respondeant. Non tamen auferetur, quod nunc non datur. Cogita-
mus enim ueterum quorundam exemplo, & ex Theophrasti disciplina, de floribus commenta-
rium, in quo certior Colorum omnium, in natura sumptis ab ea exemplaribus, ratio & histo-
ria tradet. Adijcieturq; illi quod ad pondera illa, & mensuras pertinet. Nunc enim ampliore
uolumine librariorum & legentes defatigare, uisum non est.

¶ Finis L I B. Noni.

. Q V A E S E Q V V N T V R, N O N V I D E N S

tur esse Dioscoridis.

¶ De Rhamno.

Rhamnū, si quis eruat silente luna, & secū ferat, contra uenena, & improbos hoīes proderit. Pecoribus iuuādis appendit. Nauigij circūponi solet. Valer cōtra capitis dolores, & laruas.

ῥάμνος

¶ De Artemisia.

Artemisiam hārbam, si quis teneat dum iter facit, lassitudinē discutiet: & si in pedibus ferat, bestias, & lemures abiget. Si sanguis circa artus cōaluerit, ramulos ex rosaceo in olla ferue facito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est. Strangulatui uulua mirum in modum auxiliatur. Vrinæ stillicidia, & opisthotonum leuat.

ἀρτεμισία

¶ De Pentadactylo.

Pentadactylū, si q̄s circū corpus portet, nullo dolore afficiet. Oculos, strumas, callosos tonsillas tumores, uuā, articulos sub lingua, neruorū dolores, & dentes, p̄sora perniciali fame cōtractā iuuat. Remoratos a partu mēses ejicit. Infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fascinū, & laruas mirū in modum cōmendatur. Vellito hārbam cum luna crescit oriente sole.

πενταδάκτυλος

¶ De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa, doloribus oculorū auxiliat. Contra hebetudines eorundē & capitis dolorē efficax est. Trita ex aceto, lassitudinē reficit. Strumas, callosos fauciū tumores statim discutit. Febrū horrores sanat, si q̄s solū ex aduerso stans ramulos tenuerit.

περιεργή

¶ De Dictamno.

Dictamnū siccātū manibus terito, & redigens in farinā adiecta uini stilla corpus tangito. Si quidē contra oēs serpentū iniurias auxiliatur. Ulcera, & putrescentes nomas præpurgans explet. Adactis corpori aculeis oblini, ut p̄senti sit auxilio. Ad lienē, et in abditiis locis uitia inflāmatiōis turgentia, redactū in farinā illinito. Hārbā uere, magnis æstibus, aut tūnoq̄ eruito.

δίκταμνος

¶ De Saluia.

Saluia singultū, tuſsimq̄ discutit. Omnibus malis ulceribus cum cæra & rosaceo sumpta auxiliat. Lienis dolorē, dysenteriaq̄ porta cū uino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, potu medet. Ad extrahenda uulua onera efficax est. Pessimæ mulieres pectus ex ea subiiciūt, ut partus excutiant.

ἑλενισφάκισ

¶ De Cupressō.

Cupressi herba cōtra raucedines auriculasq̄ pdest. Induratos tōſillas tumores, aquā incutē, & coxendiciū cruciatus p̄sanat.

κυνάριον

¶ De Centauro.

Centauriū contra inflāmata uitia, & pulsantes ictus ualet. Forminis uulua malo laborantibus auxiliat. Stillicidiū urinae, calculorūq̄ tormēta leuat. Hārbam uere oriente sole legito.

κένταυριον

¶ De Buphthalo.

Buphthalmū crescente lunā legere oportet. Facit aut̄ contra pauores, laruas, & mala triedita, fascinationes, utpote cū eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionēq̄ cōfessum sistens auxiliat. Quin & uentrē resoluit.

βούφθαλμος

¶ De Pæonia.

Pæonia hārbā per æstus caniculæ ante solis ortū uellit, appensaq̄ cōtra uenena, fascinū, pauores & laruas pdest. Itē contra febrē cū horrore uenientē, diurnā nocturnāue, & aduersus tertianā. Prodit lemures a mōte in q̄ nascebat fugasse.

πæονία

¶ De Moly hārbā.

Moly hārbā si secā radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

μωλὸς

¶ De Marina quærœu.

Marinā quærœū, cū rosaceo & oleo miscro, & faciē illinito cū ad negocia te cōferes. Vegetiores reddit pueros imo uentri appensa, & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Cōtra fascinū, & oīa maleficia pdest. Corpus tuū. Cum em̄ fascinātes recedūt, areſcentē ramulū occludit; & cū p̄pius accedūt, aperit.

¶ De Chrysanthemō.

Chrysanthemō, si terra ante solis ortū eruat, & collo appendat, ueneficas mulieres, oēs q̄ fascinātes amolūt.

¶ De Eryſimo.

Eryſimon cū uino tritū, aduersus uentris dolorē bibit. Si q̄s grana septe domū ingesserit, rixæ & iurgia concitabunt.

¶ De Elleborine.

Elleborine aliquibus Epipactis, alijs Borion dicit. Frutex est exiguus, minimis folijs confans. Bibit contra omne uenenu, & iocineris uitia.

ῥήθ.

¶ ARGENT. APVD IOANNEM SCHOTZ

tum librariū, .29. Augusti, Anno Christ. M. D. XXIX.

Chartarum numerus, præter Indicem, 187.

INDEX

VOCVM

ferè omnium quæ passim in COROL-
LARIIS Hermolai Barbari, Anno-
tationibus M. VERG. ipsiusq;
DIOSCORIDIS
Simplicium descriptione continentur.



INDEX

MOON

The moon is the only natural satellite of the Earth. It is a spherical body that orbits the Earth in a circular path. The moon is the second largest natural satellite in the Solar System, after Jupiter's moon, Ganymede. It is the only celestial body in the Solar System that is visible to the naked eye from Earth. The moon is the only celestial body in the Solar System that is visible to the naked eye from Earth.

Io. Schottus Librarius
Lectori, S D:

Polliciti sumus Lector candida-
de, idq; ab ipso Operis nostri fron-
tispicio, binos Indices; quod inge-
nue quidem fatemur. Verum ut
est sapientis, pro tempore mutare
consilia, longe melius compendi-
um in animum subiit, ut duos, in
unum contraheremus: nō tam ut
tibi uestiganti singula quæq; obui-
am, & ob oculos essent, q̃ ut pen-
si quoq; nostri finem felicius adse-
queremur. Id ut boni consulas,
rogamus. Vale.

¶ Litera A.

ABACVS

Alabandicus 337 a
Abies duplex 335 c
Abietarij 62 c
abrotonum ibi. d 162 a
absinthium 161 a b
absinthij genera eo. c
absinthium marinum eo. b c d
absinthium Santonicum eo. c d
Acacalis 49 b c
acacia 55 c
acanthos ibi. 158 c d
acantha 92 a 158 c d
Acani 115 d
Acantha leuce 159 b
acanthica mastiche 224 a
acanthium 158 b
acanus feminalis 124 a
acarna 190 b
Accipenser 103 c
Acesa insula 321 c
aceffis 317 c
acerabulum 142 d. 285 b
aceraria 142 d
acetum 297 d. 298 a b
acetum mulfum eo. b c
acetum scyllinum 299 b c
acetum stychiadicum 303 a
Acherois 45 d
Acherusion ibi.
achillea 223 a
achrofyalos 220 b
achudon 68 d
Achy 7 b. 69 d
achyra 68 d
aica muria 258 d

acinea
acini
acinoë
acinos
acis
Acocion
aconia
Aconitum 239 d. 240 a b
aconitum alterum 245
aconos 240 b c
acorma 169 d
acorus, um. 190 b
Acridophagi 2 a b
acris 92 b
acrodrya eo.
Actea 66 b
Acylon 279 c
Adama 59 c. 71 c
adarce 104 a
Adeps 31 a
adiantos 100 d. 102 b c
adianti miracula 258 c d
& 259
adianti genera a
Adipion eo. b
adipfos 68 c
Adnara 61 c
Ador 139 b
adorea 110 a
adoreum ibi.
Adorei quatuor discrimina ibi.
Adrachne 71 b c
Adusio 314 d
Aedon 89 d
Aera 113 d
aeromel 26 a c
aerizusa 336 a
Agallochum 7 c d
agis 35 c
agidion 64 b
agyluros 207 c
agylops 260 a b c d
agolethros 106 b
amalea 104 a
amiation ibi.
aeris coctura quatuor parit 313 d
aeris flos 310 d
aeris species 311 c
aerugo rasa 312 b c d
aerugo scolecia eo. d
aerugo aurificij ibi.
aerugo ferri ibi.
aerugo uermicularis ibi.
aes inauratum 320 b
aes ustum 310 c d

athyopis 169 d
aesculus 64 b
aesculetum 169 d
aethal ibi.
aether 34 c
actes 108 c
actitis genera 336 b c
ibi. c
Agaricum 151 b. d
ageroton 231 a
agne 36 b
agneta 57 d
agnos 56 b.
agonos 49 d
agria 56 c
agriandrys 44 b
Agricofal 58 d
agrifolium 327 c
Aiuga 75 c
aiuga altera 212 a b
aizoon 210 a
aizoon genera 244 c d
ibi. & 245 b
Alabandicus 335 c
alabafter 328 c
alabastrum 335 b
alabastrus ibi.
alabastrites ibi.
alapathron 120 c
alarea 72 a
alaria ibi.
albus 243 b.
albuma 50 b
Alcea 102 c
309 d. 210 a
Alcyonium 330 c d
Ala 339 b
alec 86 c
Alecula 87 c
Alectorolophos 86 c
Alex 321 d
Algamaris 87 c
Aliata 247
allicacabus 109 d
allicaria 137 d
alma 239 a
alipenon 21 c
alipres 58 c
alipaston 24 c
alifon 102 b
alifum 189 c
210 d 21 a
Allectoris 91 a
allectryenæ ibi.
allectryon ibi.
allium 135 b d
Alemanni 23 b
almytis 50 a
aloe 160 b c d
aloidarium 63 a. 160 d

249 a
59 b
ibi.
34 c
108 c
336 b c
ibi. c
151 b. d
231 a
36 b
57 d
56 b.
49 d
56 c
44 b
58 d
327 c
75 c
212 a b
210 a
244 c d
ibi. & 245 b
335 c
328 c
335 b
ibi.
ibi.
120 c
72 a
ibi.
243 b.
50 b
102 c
309 d. 210 a
330 c d
339 b
86 c
87 c
86 c
321 d
87 c
247
109 d
137 d
239 a
21 c
58 c
24 c
102 b
189 c
210 d 21 a
91 a
ibi.
ibi.
135 b d
23 b
50 a
160 b c d
63 a. 160 d
A ij

| I | | N | | D | | E | | X | |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------|----------|----------|------------------------------|---------------|----------|--|
| aloemon | | 28 c | anchusa genera | | 220 a c | apimelis | | 71 b | |
| alopeca | | 89 b | anchusa alia | | 220 b c | apinthium | | 161 b | |
| Alphita | 108 c, | 109 d | anchusa tertia | | eo. c | apludæ | | 109 d | |
| Aliline | | 244 b | Andrachne | | 71 b | Apochyma | | 40 b | |
| althæa | 121 c, | 209 b c d | androface | | 205 b c | apocynon | | 86 242 b | |
| Alumen | 324 c d, | 325 a b c | Androsomon | | 211 c | apocrypha Dioscoridi annexa | | | |
| alumen scissile | | 325 b | androsomon duplex | | ibi. | folio ult. | | | |
| aluminis genera | | ibi. | andrachon | | 239 a | apollinaris | 235 c, & seq. | | |
| alus | | 215 d | andrachon | | ibi. | apollo myriceus | 49 a | | |
| alosus | | 327 | andrachon | | ibi. | apospematismus | 320 b | | |
| alutarij | | 90 c | androdamas | | 324 a | Appendix spina | 158 d | | |
| alutamentum | | ibi. | Anemo | | 146 b | appherema | 109 d | | |
| Alysson | | 189 b c | anerectos | | 108 c | Apumictus cura | 158 d | | |
| Alypon | | 281 b c | anethum | | 176 b | apospingifimos | 331 d | | |
| Amala | | 96 d | anifum | | 175 d | Apraginosi | 64 c | | |
| amaracus | 26 d, | 27 a | Angulium senectus | | 82 d | Apteros | 52 b | | |
| amaracinum duplex | | ibi. | Anonis | | 159 a | Apuas | 87 c | | |
| amara | | 46 b c | anosteos | | 78 d | apulas | ibi. | | |
| amarice | | 48 c | Anthalion | | 206 b | Apyrena | 62 d | | |
| amamelides | | 71 b | Anthemis | eo. b d, | 140 b | apyrenon | ibi. | | |
| amaracus | | 168 c d | anthemidis genera | | eo. d | Aqua | 296 c d | | |
| amarandus | | ibi. | anthea | | ibi. | aquarum discrimina | ibi. | | |
| Ambrosia | 197 d, | 198 a | antheles | | 48 a | aqua marina | 297 b c | | |
| ambra | 46 b d, | 47 a | antherices | | 108 a | aqua multa | 295 c d | | |
| Amellum | | 23 a b | anthracidæ pisces | | 327 c | item folio | 296 b | | |
| amentum | | 60 d | anthyllis | | 206 b | aqua frigida | 300 d | | |
| Amiantus lapis | | 335 c | anthias | | 102 c | aquifolium.ia. | 302 d. | | |
| Ammi | 176 d, | 177 a | antithrenæ | | 106 b | item folio | 59 d | | |
| amilla | | 23 b | antinoius | | 251 d | aquiceli | 36 b | | |
| ammium | | ibi. | antispodos | | 310 b | Arabis | 137 b | | |
| ammoniacum | 187 a b | | antiora | | 152 b | arabus lapis | 324 d | | |
| Amomis | | 9 d | antirrhinum | | 257 d | aracus | 115 d | | |
| amomum | eo c d | | antitaura | | 192 b | arachnion | 57 d | | |
| amorgis | | 56 a | Apalos panis | | 108 b | araneus | 95 a | | |
| amorgynæ | | ibi. | aparathe | | 71 c | ara neorum genera | ibi. | | |
| Amurca | | 55 d | aparine | | 189 a | Arbores resinam ferentes sex | | | |
| Ampeloprasum | | 134 d | Aper | | 90 b | folio | 35 d | | |
| amphibia | | 160 d | Aphenum | | 7 c d | arbutus | 71 a | | |
| amphicaustis | | 109 d | apn | | 17 d | arbuti genera | ibi. | | |
| ampelitis | | 339 c | aphroditarium | | 63 a | Archemora | 57 d | | |
| amphisbenæ ictus | | 356 c | apharca | | 71 b c d | arction | 249 b | | |
| Cura eius | | 360 d | aphritis | | 87 c | arcton | ibi. | & c | |
| Amygdalus | | 71 c | aphros | | ibi. | Arenga | 86 c | | |
| amygdalæ | | ibi. | aphrya | | ibi. | Argemone | 146 c d | | |
| amylum | 113 d, | 114 a b | aphryæ | | ibi. | argemone altera | 147 a | | |
| Anabasis | | 227 b | aphyæ | | ibi. | argentum uiuum | 150 b | | |
| anagallis | 147 a b c d | | aphaca | 133 d, | 134 a | item folio | 310 a b c d | | |
| anacacabea | | 69 c | aphia | | 134 a | argenti uiui genera | 310 d | | |
| anacacabos | | ibi. | aphonitrum | | 329 b | Argyriion nama Chymistarum | | | |
| anacollia | | 177 c | aphroniteum | 328 c, | 329 b | folio | 325 d | | |
| anatis | | 104 a | aphrofenon | | 335 d | Aria | 44 b, | 311 c | |
| anatum differentia | | ibi. | aphurca | | 71 c | arinca | 111 c d | | |
| anagyris | | 210 b c | Apium | 166, | 178 a b | aris | 142 c | | |
| anagnostis | | 172 d | apia | | 68 c | arifarum | 142 c | | |
| anarrhion | | 457 d | apios | | ibi. | aristæ | 108 a | | |
| anchusa | 219 d, | 220 a b | apiastrum | 145 d, | 193 d | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Arifolochia rotunda | 141 d, | Atriplex | 121 e d | Berberi | 29 c |
| item folio | 153 a | Atharathrion | 111 c | berberion | ibi. |
| arifolochia longa | 153 d | atramentum librarium | 340 a b | bellis | 266 c |
| arifolochiæ genera | eo. a | Aureon | 50 a | bellio | ibi. |
| Armamentarij | 47 c | auricula muris | 149 d | Bera | 123 b c |
| armenius lapis | 318 b | auricula muris altera | 150 a b | betæ genera | ibi. |
| armillini | 57 a | Auena | 260 a b | beta fylueftris | 218 b |
| Aron | 141 b, 142 b c | aupigmentum | 324 a, | betonica | 312 d, 213 a |
| Arfacus | 44 c | item folio | 350 a b | betylus | 123 c |
| arsenicum | 324 a | Axinomandia | 334 a | Bia | 104 a |
| Artemifia | 197 b c. | axos | 350 d | Biblos | 48 b c |
| artemifia tenuior | eo. d | | | Bilis | 103 c |
| artemidorus | 250 c | | | bilis duplex | ibi. |
| artheredones | 106 b | | | bilis flauæ genera | ibi. |
| Aruina | 102 c | | | Bitumen | 40 c |
| Afarum | 5 d, 6 a b | Bacæ lauri | 44 d | bitumen ex fulmine | 40 d |
| afarus | 142 c | Bacatum | 119 c | Blachnon | 284 b |
| Afcion chalcon | 311 a | bacchar | 170 b, 5 d | Blaftus mufelitis | 7 c |
| afclepias | 139 c | baccharis | 170 b c | Blarta piftrina | 88 d |
| afcyroides | 211 c | Bacteria | 47 c | blattarum genera | ibi. |
| afcyrum | eo. b c | Badrya | 70 d | blattaria | 248 d |
| Affius lapis | 332 c d | Baius | 61 d | Blechron | 164 a |
| Asphalatus | 12 c | Balanus myrepfica | 269 | blethrum | 294 d |
| asphaltus | 40 c | c. item folio | 270 a | Blitron | 121 a b |
| asphaltites | ibi. | balani fardinianæ | 60 b | blitomama | ibi. a |
| asphodelus | 143 a b | balani | 61 d | Boæcæ | 86 d |
| afparagus | 124 b c d | balis | 266 c | boæcæ | ibi. |
| afperugo | 271 c | balithum | ibi. | bolbiton | 121 b |
| afpidum genera | 81 d, 357 c. | balaufium | 61 b | boletus | 243 a |
| afpidis icfus | 317 b | ballote | ibi. | bolita | ibi. |
| Cura eius. | 361 c | balfamodes | 193 c d | Borrage | 256 c d |
| afphenium | 205 c d, 2 a b | balfamum | 7 c | Bofmorus | 112 b |
| afpris | 59 c | balfami genera | 11 b d | Botis | 126 d |
| Affulæ | 11 a | balfamina | eo. d | botrys | 198 b |
| Aftacia | 72 a | balthæus | 273 c | Brabyia | 78 d |
| afthaphus | 267 c d | Banchus pifcis | 102 b | Bralfica | 112 a b c d |
| afthaphylinum | 174 b | Baptifecula | 88 c | bralficæ genera | eo. b c |
| afterius | 95 b | Barathon | 201 d | bralfica fylueftris | 123 a |
| after | 253 c d | barbula hirci | 42 d | bralfica marina | eo. h |
| aforgion | 95 b | barba Iouis | 132 d, & 133 a | Bredon | 93 c |
| aftragalus | 93 b, 232 a | barbaria | 229 c | bregma | 158 b |
| Attacos | 92 a | barbari | 46 a | bretanica | 213 b |
| atraga | 103 d | bardones | ibi. | Bria | 48 c |
| attagenus | ibi. | barython | 93 d | Bromus | 112 a, 260 d, 261 a |
| athea | 121 c | Bafilifcus | 42 d | Bruchus | 92 b |
| atrega | 133 c | bafilifci morfus | 83 a | brufcandula | 124 d |
| attelabis | 92 b | Cura eius | 317 c d | brutia | 39 b |
| Athera | 111 c d | Batis | 361 d | Brenthiæ | 150 b |
| ateramnon | 116 c | batos | 126 d, 44 c | bryon | 13 a, 45 d, 59 c |
| ateramna | ibi. | batos Idæa | 213 b c | bryon marinum | 247 b |
| atinie | 46 b | batrachos | 15 c | bryonia | 292 d, 283 a b c d |
| Arractylis | 190 a b | batrachos halica | 85 d | bryton | 110 b |
| atramentum futorium | 321 c | Bechion | 86 a | Eubleton | 121 b |
| d. item folio | 322 a | bechionis genera | 197 a | bubonios | 255 a b |
| Et differentie eius | ibi. | Belenion, um, | ibi. | Buceras | 114 d |
| atramentum metallicum | 323 a | Bentelis | 16 a | bucheides | 203 a |
| | | | 16 c | | |

¶ Litera B

B

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Buccina | 78 c | canchryæ | 110 a | caros sylvestre | 5 d |
| Buffo | 86 a | canchry | 181 d, 182 a | Carpalium | 162 d |
| Buglossa, os. | 256 a b | Candidum oui | 91 c | carpali succus | 146 c |
| bulbina | 143 d | candaulos | 111 c | carpesium | 162 d |
| bulbus uomitorius | 143 b. | candylus | ibi. | carpæ | 58 d |
| | 209 c | Canicæ | 103 c | Carpinum | 38 c |
| bulbus cibarius | 143 c | canis ponticus | 85 b | carpatinæ | 217 d |
| bulborum genera eo, d. | 144 a | canis marinus | ibi. | carpisculus | ibi. |
| Bumelia | 45 b | carnis rabiosi signa | 353 c d. | carpophyllos | 263 a |
| Bunias | 119 a | item folio | 354 a | carphos | 114 d |
| buri | 329 a | Contra canis rabiosi morsum re- | | carpum | ibi. |
| bunion | 120 d, 121 a. | media | 354 b c | Carthamus | 19 d |
| Buprestis | 94 c, 343 c | Cura uictus idem in morsu canis | | Carubum | 78 d |
| buphthalmus | 107 b c | rabiosi | 355 a b | carubulum | ibi. |
| Butomus | 207 c | canistrubus | 51 a | carus, um, | 178 a |
| buryrum | 98 d, 99 a | Canna | 47 c | Caryon | 72 b c |
| Byrsodepsicon | 325 a | cannabis sylvestris | 210 a | caryophyllos | 138 c, 170 c |
| byssos | 208 d, 209 a | cannabis fatiua | eo, b | caryotidum genera | 61 d |
| | | cannabus | ibi. | Casus | 98 b |
| | | Cantharus | 94 c | caseorum genera | eo, c |
| | | cantharides eo, b c. | 342 d | caseorum differentia | eo, d |
| | | item folio | 343 a b | Cassia | 7 b, 8 b., 48 b |
| | | cantharidum genera | ibi. | cassia fistula | 8 b |
| | | cantharis | 108 a | cassia cathartice | ibi. |
| | | cantherij equi | 89 b | cassia myrrha | ibi. |
| | | canthelij | ibi. | cassia siliqua | ibi, c |
| | | canthelci | ibi, c | cassia lignea | ibi. |
| | | canthonæ | ibi, c | cassia genera | 277 d |
| | | Caper | 90 b | Castanea | 59 a, 60 a b |
| | | capis | 44 b | castanearum genera | eo, b |
| | | capnos | 250 b c, 92 d | castor | 14 c, 85 a b |
| | | Capra | 90 b | castoreum | 85 c |
| | | caprificatio | 75 c | Catacharce | 258 a |
| | | caprificus | 85 c, 221 d | catacecaumene | 294 a |
| | | Capparis | 144 d, 145 a b | cattyma | 90 c |
| | | & eius genera | ibi. | Caucalis | 14 a, 131 c |
| | | capparoculæ | 79 b | caulias | 194 d |
| | | Cara | 176 a | Cedrelion | 41 d |
| | | Carbasa | 217 d | cedria | 39 b, 43 b d |
| | | Carbasinus color | 217 d | cedrus | 43 a |
| | | carbatinæ | ibi. | cedri genera | ibi. |
| | | Carcinos | 80 c | cedrelate | ibi, & d |
| | | Carchesium poculum | 37 c | cedris | eo, b |
| | | Cardamon | 9 a | cedromelon | 68 b |
| | | cardamomum | 5 c d | cedrula | ibi. |
| | | cardamomi genera | eo, d | cedrium | eo, d |
| | | cardia | 4 d | cedrea | ibi. |
| | | carduus | 155 d, 117 b | cedrites | ibi. |
| | | Carea | 72 b | cedrinus liquor | ibi. |
| | | Carides | 239 d | Celester | 51 d |
| | | caries lignorum | 46 c | celtica spica | 5 b |
| | | carion myristicon | 46 a | celtis | 69 c |
| | | Carmalinus colo | 217 d | Cenchridæ | 113 a |
| | | carmes | ibi. | cenchri morsus | 357 a |
| | | Caro | 10 c, 176 a | Cura eius | 361 b |
| | | caron | ibi. | centaurium magnum | 154 a b |

¶ Litera C

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Acabis | 191 d | cantharidum genera | ibi. | cassia fistula | 8 b |
| Cacabos | ibi. | cantharis | 108 a | cassia cathartice | ibi. |
| acalia | 14 a 254 d, 255 a | cantherij equi | 89 b | cassia myrrha | ibi. |
| Cadmia | 307 d, 308 a b c d | canthelij | ibi. | cassia siliqua | ibi, c |
| acalrys | 46 b, 60 d | canthelci | ibi, c | cassia lignea | ibi. |
| cadmia colores | 308 b | canthonæ | ibi, c | cassia genera | 277 d |
| caddiscus | 257 b | Caper | 90 b | Castanea | 59 a, 60 a b |
| cactos. | 241 d | capis | 44 b | castanearum genera | eo, b |
| Calais | 336 c | capnos | 250 b c, 92 d | castor | 14 c, 85 a b |
| calainus color | ibi. | Capra | 90 b | castoreum | 85 c |
| calamintha | 166 a b | caprificatio | 75 c | Catacharce | 258 a |
| calamites | 86 a b | caprificus | 85 c, 221 d | catacecaumene | 294 a |
| calamochinus | 331 a b | Capparis | 144 d, 145 a b | cattyma | 90 c |
| calamus odoratus | 10 c d | & eius genera | ibi. | Caucalis | 14 a, 131 c |
| calamus | 47 b | capparoculæ | 79 b | caulias | 194 d |
| calamus Indicus | 332 b | Cara | 176 a | Cedrelion | 41 d |
| calcifraga | 231 d | Carbasa | 217 d | cedria | 39 b, 43 b d |
| calistephanos | 58 d | Carbasinus color | 217 d | cedrus | 43 a |
| callieia | 58 s | carbatinæ | ibi. | cedri genera | ibi. |
| callichthys | 103 c | Carcinos | 80 c | cedrelate | ibi, & d |
| callinus | 336 c | Carchesium poculum | 37 c | cedris | eo, b |
| calx | 330 b, 328 d | Cardamon | 9 a | cedromelon | 68 b |
| Camatias | 108 a | cardamomum | 5 c d | cedrula | ibi. |
| cammata | 44 b | cardamomi genera | eo, d | cedrium | eo, d |
| cammatida | ibi. | cardia | 4 d | cedrea | ibi. |
| camhari | 87 c | carduus | 155 d, 117 b | cedrites | ibi. |
| Campa | 94 a | Carea | 72 b | cedrinus liquor | ibi. |
| campæ | ibi, 78 a | Carides | 239 d | Celester | 51 d |
| campanæ | 40 a | caries lignorum | 46 c | celtica spica | 5 b |
| camphora | 21 c | carion myristicon | 46 a | celtis | 69 c |
| camptauli | 47 d | Carmalinus colo | 217 d | Cenchridæ | 113 a |
| Cancanus | 14 a | carmes | ibi. | cenchri morsus | 357 a |
| cancanum | 13 d | Caro | 10 c, 176 a | Cura eius | 361 b |
| cancer | 80 d | caron | ibi. | centaurium magnum | 154 a b |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Centaureum minus | 154 d | Chamae Platani | 45 a | chymistarum uanitas | 320 c |
| item folio, | 155 a | chamglea | 19 d 277 c d | chymiae scriptores | 325 d |
| centaurea | 174 a b | item folio | 278 a b | Chydon | 16 d |
| centipedes | 81 b | chamaeleon albus | 155 b | Ciboris | 87 c |
| Centunculus | 199 a, 215 b | chamaeleon niger | eo. d. 156 a | ciborium | 116 d |
| Cepa | 134 d, 135 b | chamaecerasi | 65 a | Cinnamomis | 9 c |
| ceparum genera | 135 b | chamerhaphanus | 119 d | cinnamomum | 3 c |
| cepea | 210 c d | chamaedrys | 191 c | cinnamomi genera | eo. d. 9 b |
| cephalo | 61 d | chamaeleuce | 197 a, 255 c | cinnamomū mosylici | 8 d. 9 a |
| Cera | 107 a | chamaezeleo | 225 d | cinnabaris | 319 b c |
| cera confectio | eo. b | chamaeryphes | 241 d | cinera | 157 a |
| ceraha | 70 c | chamaecissus | 255 c | Cimbalaris | 245 c |
| ceranthemos | 193 b | chamaedaphne | 263 d | Cimices lectularij, & planta- | |
| ceras | 93 d | item folio | 264 a | rum | 89 b |
| cerasbolon | 116 c | chamaemalum | 206 d | Cimolia | 338 d, 339 a |
| cerastes | 75 b | chamaelyce | 226 c | cinerula | 310 a |
| ceratophyllax | 218 c | chamaezolon | 62 b | Cinis foci | 330 c |
| cerastis morfus | 357 b | chamepytis | 212 b | cinis farmentitius | ibi. |
| Cura eius | 367 c | Characias | 273 b c, 275 a b | cinaura | 102 b |
| cerasia | 64 d, 65 a | charadranos | 237 b | Cicadae | 92 a |
| cerasus | ibi, 65 a | charites | 41 d | cicer | 115 b c |
| cerasorum genera | ibi, | charma | 193 a | ciceris genera | eo. c |
| cerasa amarasia | ibi, | charmi | 217 d | cicercula, um. | ibi, 321 a |
| ceratia | eo. b c | Cheiri | 254 b | Cices | 62 b |
| ceratonia | eo. b c | chelidonia | 148 d | cici | 272 c d |
| Cercis | 210 a | chelidonia minor | 149 a | cica | ibi. |
| Cerea | 5 d | chelidonia lapis | 93 b | cicatrix | 14 a |
| cereia | 60 b | chelones pisces | 88 c | cicuta | 346 a b, 240 d 141 a b |
| cerbellum gallinaceum | 90 d | chelonis | 140 c | cicuta genera | 241 b |
| cerium | 107 c | chenes | 102 d | cicum | 63 b |
| Ceribia | 108 c | chenoboscion | ibi. | cicures | ibi. |
| cerinthe | 193 c | chelidonia phragmites | 210 b | cicuri | ibi. |
| cerinthus | eo. b c | chenopus | 170 a | cicerbita | 127 b c |
| Ceroma | 17 d | Cichria | 109 b | cichorium | 128 b |
| ceromata | 21 c | chidros | ibi. | citreoli | 129 d |
| ceronia | 65 b | chironias | 55 a | cicutaria | 193 c d |
| Ceruleus lapis | 193 b c d | Chole | 103 c | Cion | 272 c d, 78 d |
| cerulei genera | eo. b c | chondros | 112 a c d | cionion | 78 d |
| cernas | 93 c | choridiola | 320 c | Ciphilion | 241 d |
| ceruiocellus | 179 d | chorus Aphrodisias | 2 a | Circæa | 190 c d |
| cerusa | 348 c d | choroni | 64 b | Cirri | 285 b |
| cerussa | 116 c d, 317 a | Chrima | 21 c | Cis | 272 d, 326 b c |
| Ceryx | 78 c | Chrisma | ibi. | Cistus | 52 a b |
| Celyphum | 52 d | Chroma | 26 d | cistos | eo. d |
| cestrum | 213 b | chromasus color | ibi. | cistaros | ibi. |
| Chalaxia | 334 d | chrysoellae genera | 317 d | cissus, os. | ibi, & d, 148 c |
| chalcæan | 207 c | Chrysoella | 150 b c, 312 d 35 d | cissanthemon | 140 c |
| chalcis | 96 b | item folio | 317 b | cissophyllon | ibi. |
| chalcidica | ibi, | chrysoalanus | 61 c | cisseris | 316 b |
| chalcanthos | 311 a, 311 a | chryfocorallium | 79 d | cissybon | 143 c |
| chalcanthum | ibi, | chryfocome | 239 c d | Citron | 5 c |
| chalcanthum uiride | 313 c | Chryfanthemos | 210 c d | citrus | 65 d |
| chalcicis | 322 b, 325 b | chryfagonon | 219 d, 230 a | citromela | ibi. |
| chalceus piscis | 327 d | chrysomela | 66 c | citrinum pomum | ibi. |
| Chamae | 29 c d | Chydræ | 64 b | citrea mala | eo. c d |
| chamarum genera | ibi, | Chymistæ | 320 b | citrago | 194 a |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Citynus | 63 b | colybiſta | ibi. | corydalis | 92 d |
| citynum | ibi. | Comaros | 71 a | corydylis | ibi. |
| Cleonia | 15 c | comaron | ibi. | corymbia | 183 a |
| Clinopodion | 190 d | Comites | 47 b | corymbus | ibi. |
| Clematis | 214 d, 215 a, 282 a | comaris | 335 d | corythallion | 57 d |
| clematis altera | 215 a b | Conchis | 116 c | Cosmofandalos | 64 b, |
| Clymenos | 216 d, 217 a | couchylium | 39 d | item folio | 232 c |
| Cnacron | 286 | Condylos | eo. d | Costus | 9 d |
| Cnicus | 19 d, 285 a, 286 b | condrilla | 113 c d | costus trifarius | ibi. |
| cnipes | 46 c | Congros | 57 c | costi tria genera | 10 a |
| cnedros | 277 d, 278 a | Conia | 76 a, 330 c | Cottabis | 34 b |
| cnestron | ibi. | coniaſis | 319 d | cottabus | ibi. |
| Coagulum | 100 b c | coniatae chriſiae | 30 c | cottabica | ibi. |
| Cocalia | 80 c | conis | 17 d | Cothon | 115 b |
| Coccalus | 36 b | coniſalon | 17 d | Cotinos | 57 b, 58 a |
| coccalus | 157 d | coniſterium | ibi. | cotonea | 66 b |
| cochleæ | 80 b c | Conos | 36 b | Cotes | 337 b |
| cochleis | eo. c | conum | 38 d, 39 c | cotricula | ibi. |
| côchilax | ibi. | connarus | 50 c | cotula | 107 a, 215 d |
| cochlia | ibi. | conſecratrix | 1 a c d | Coryledon | 245 c |
| cochlearum genera | ibi. | conſiligo | 111 b | Courmi | 110 a |
| cochleare | 142 a | conſperſio | 102 b | Crada | 75 b |
| coccinea ueſtis | 218 a | conuoluolus | 215 b | Crambe | 123 b, 123 a |
| coccomelea | 70 c | Conyza magna | 200 a | crambalea | 122 b |
| cocomelos | ibi. | conyza parua | eo. b | crambus | 287 a |
| coccos | 275 c | conyza tertia | ibi. | Cranius | 76 a |
| coccus | 227 b c | Coptica fidelia | 53 d | Crataegonum | 201 c |
| Codia | 125 b | Corallium | 331 d, 332 a, | cratagos | ibi. |
| Codymalon | 66 b c | item folio | 147 c | crataegona | ibi. |
| Cœle | 10 b | corallius | ibi. | Creocaccabos | 104 a |
| Cogigigrya | 70 c | coralis | ibi. | Crepis | 169 b |
| Coicina | 227 d | coraliſtigiaduo | 332 b | crepula | ibi, 251 a |
| coix | ibi. | Corchorus | 147 c | Cremes | 14 a |
| Colchicon | 243 c d | Cordylon | 175 c | Cretura | 108 c |
| colocynthis | 28 c d | cordumeni | 3 d | Cremor lactis | 97 c |
| collection | 58 c | Corianum | 177 a b | Cribana | 108 d |
| Colocasia | 116 d | coriandrum | ibi, 345 c d | crithanias | 109 c |
| Colorum ratio duplex | 318 d | corion | ibi. | Crina | 24 c |
| color melinus | 339 b c | coris | 211 d, 212 a | Crimnon | 110 d, 111 a |
| color paretanius | eo. c | Corma | 110 b | Crinonia | 193 a |
| colores floridi | 318 a | Cornea | 64 c | Crifon | 253 b |
| colores auſteri | ibi. | cornoceraſium | 65 a | Crithmum | 116 c d |
| color ſanguineus | 319 | cornus | 70 a | criſpina | 50 d |
| coloſtræ | 97 c | cornus indica | ibi. | Crocum | 14 c d |
| coloſtrati | ibi. | cornopæ | 92 b | Croci genera | eo. d |
| coloſtratiuſ mons | ibi | cornu ceruinum | 93 c, 94 a | crocotula | 170 c |
| coloftrum, a. | ibi. | Coroneola | 54 b | crocus ſarracenus | 286 a |
| colofſinus | 140 c d | coronarum genera | 64 b | crocomagma | 15 b c |
| Columbarum genera | 104 d | corona | eo. c | crocodilos | 156 b, 205 a |
| columbaris | 251 b | corolla | ibi. | crocodilea | 105 a |
| colluthra | 116 a | Coroneola | 51 a | crocodilina | ibi. |
| colymbades oliuæ | 58 a b | coronopus | 117 a b, | crocodilitis | ibi. |
| columbarium | 78 d | corruda | 124 d | Crotones | 18 d |
| columnarium | ibi. | Corſion | 251 d, 252 a | croton | 57 c |
| colythra | 75 a | Cortex thuris | 33 d | Crymodes | 111 a |
| Colybus | 115 d | Corylus | 77 a | Crucialis herba | 189 c |

| I | N | D | E | X | |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Crucialis herba | 189 c | Damalis | 102 d | Droxanus | 188 c |
| Cyaneus | 318 | Damalion | ibi. | Druini morfus | 396 d |
| Cyanios | 116 b | Daphnitis | 7 b c. s a | Cura eius | 360 d |
| Cyanus | 201 d, 318 d | daphnois | 7 c | Drunculi | 242 |
| Cydyomalon | 66 c | Daphnides | 44 d | Druppa | 16 d, 20 c |
| Cyclaminus | 240 a b c | daphnoides | ibi., 263 c d | Dryos | 58 d |
| cyclaminus altera | 60. c d | daphnococci | ibi. | dryopetes | 86 a |
| item folio | 141 a | Darcas | 7 c | dryopteris | 185 c d |
| Cyllastis | 108 c | Dasipodion | 83 d | Duracina | 90 d |
| Cyma | 322 c | Daucus, um. | 131 c d, 174 b | E Benus | ¶ Litera E. |
| cymbium | 143 c | c d. item folio | 150 c | Ebeni | 53 b c |
| Cynocrambe | 243 c, 286 c | Daucorum genera plura | ibi. c | Ebur | 93 b, Ebulus 279 b c |
| cynoctonos | ibi. | item folio | 180 d | Ecidion | 58 c |
| Cynopa | 110 d | Delphax | 89 b | Echis | 85 d |
| Cynomaron | 156 a | delphinum | 180 b | echidnae | 81 d |
| cynomoros | 242 c | delphinum alterum | 181 a | echios | ibi. |
| cynomorphos | 14 c | Demos | 102 b | echios genera | 210 d, 221 a b |
| cynorhodos | 51 d | Dendroides | 274 b | Echinus marinus | 221 a b |
| cynorhoda | 54 b | dendrolibanus | 33 d | echinorum genera | 77 b |
| cynomyae | 272 d | dens caninus | 90 c | echinometrae | ibi. |
| Cynoglossos | 266 d | Derceumenos | 83 d | echneis | ibi. |
| Cynosbates | 256 d | Detis | 115 d | Elaphoboscus | 179 d |
| Cyparissias | 274 a | Dialptarion | 51 d | elaphon | 93 c |
| Cyperus | 5 a, 10 b | Diacheron | 12 d | elanae | 60 a |
| Cyperus indica | ibi. b | dialeucon | 15 a | elara palma | 22 c |
| Cyperis | ibi. | diaphanes | 330 b | elaterium | 226 d, 227 a b |
| cyperida | ibi. | diaporphyron | 13 a | elatine | 224 d, 225 a |
| Cypirus | a d, 3 a c | diaxyllon | 12 c d, 13 a | Electrum | 46 d |
| cyphi | 14 b c | dictamus | 104 a b, 105 a | Electri genera | ibi. |
| cyphellae | 17 d | dictamus Cretica | ibi. | elegia | 47 c |
| cyprus | 51 c | diglaucion | 187 d | Eleomel | 16 a b |
| Cyribia | 108 c | Didalis | 110 a | Eleos | 57 d |
| Cysteolithos | 336 d | Diphyrges | 323 c d | eleoselinum | 178 c |
| Cytinos | 52 c | Diosbalanos | 72 d | eleothrepton | ibi. |
| cytifus, um. | 271 b | diospyros. | 208 b, 64 d | elelispacus | 105 b |
| Cubebae | 262 d, Cud 272 c | Dipfas | 156 b c d, 12 d | Elleborum album | 264 b c d |
| Cucurbita | 129 a b | dipfacum | 317 c | elleborum nigrum | ibi. & 265 a b |
| Cucumer fatiui | eo. c d, 267 b | dipfadis morfus | 360 d | eleogaron | 87 d |
| cucumer syluestre | 366 c | Cura eius | 320 b | Elephas | 93 c |
| Cucurbitula | 380 c d | Discus Solis | 117 d, 262 a | elephantus | ibi. |
| cucumis | ibi. c | Dolichus | 80 d | Elymaeus | 31 d |
| Culmus | 108 a | domiporta | 13 b | elymaei | ibi. |
| Cuminum satium | 276 b c | dorcis | ibi. | elydriion | 286 a |
| cuminum syluestre | eo. c d | dorcidium | 93 d | Embasis | 47 d |
| Cuniculus | 83 d | dorx | ibi. | Embrion | 46 c |
| cunila | 167 b c | dorcas | ibi. | empetron | 281 d |
| cunila gallinacea | 161 a | doryon | 235 a | Encardios | 61 d |
| item folio | 167 b c | dorycnion | ibi., & b, 344 | Encephalos | eo. d |
| cunilae genera | 200 b c d | & sequenti. | 97 a | enorchos | ibi. |
| item folio | 201 a b | dofuariae pelles | 137 b | Enula campana | 15 c |
| Cynilaginis genera | 200 a | draba | 81 a | enoplion | 47 d |
| Cupressus | 41 b c d | Draco marinus | 141 a b c d | enthæmon | 58 c |
| Curallium | 332 a | dracuuculus | eo. c d | Epalelima | 21 c |
| D Ama | ¶ Litera D. | dracunculus parvus | 142 a | epargos | 38 c |
| Damale | 93 c | item folio | 156 c | Epatica. | 229 b |
| | 102 d | Dropax | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------|----------|
| Epecla | 44 b | F | Litera F | Fœniculum | 186 a b |
| ephemeron | 244 a b, 144 b | Flos achæicus | 7 a | Fœniculum erraticum | ibi. |
| ephemeron duplex | 243 c d | Flos syriacus | 14 a | Ferula | 183 a |
| Ephialtion | 208 a | Flomus | ibi. | Ferulæ genera | 183 a |
| Ephthion | 322 a | Fuligo | 15 c | Ferulago | ibi. |
| Epidormismara | 44 b | fumus | 34 c | Furfugium | 197 a |
| epidiphnides | ibi. | fuliginis compositio | ibi, d | farfaria | ibi. |
| Epimelis | 69 b | fufternæ | ibi. | flammea | 202 a |
| epimelon | 71 b | fuligo Refinæ | 35 b | flammearij | ibi. |
| epimelida | ibi. | fuligo picis liquidæ | 38 b | fungi | 242 d |
| epimedium | 218 d | fraxinus | 40 a | fungorum genera | ibi. |
| epimetron | 169 d, 170 a | fraxini genera | 45 a b | fucus marinus | 247 c d |
| epipactis | 250 a | fraxinula | ibi. | fuci genera | ibi. |
| epipastron orchomenium | 48 a | fraxinago | eo. c | fumaria | 250 b c |
| epipetron | 169 d, 170 a | februa | ibi. | fidicula | 259 c |
| epithymbrum | 167 b | fagus | 57 d | Filix | 283 d |
| epithymbiton | 92 d | fragi duo genera | 59 c | Filicones | 284 a |
| epithymum | 98 c, 166 d | fagus Sciffima | ibi. | Filix foemina | eo c d |
| item folio | 281 a b | ficus Aegyptia | ibi. | Filicula | 285 a b |
| epityum | 58 b | fabagrica | 73 d, 69 b c | fuligo pictoria | 339 d |
| Equisetum | 226 d, 227 a | fabagrica | 69 b c | fungi | 340 a b |
| equisetum alterum | 227 b | fabagrica | eo. c | ferrum | 313 b |
| eranthemon | 206 d | fraga montana | 71 a | flos æris | 310 d |
| eretria terra | 338 b c | ficus Cypria | 73 d | flos falis | 328 b |
| Erefios | 57 d | Ficus | 74 a b c | Fex uini | 329 c d |
| Ergasima myrrha | 29 d | Ficorum genera | eo. d | Fex aceti | ibi. d |
| Erica | 49 a | ficorum nomina | 75 a | Fecula | ibi. d |
| ericeum mel | ibi. | Frugilega | 75 b | Flos gypfi | 330 b |
| erinaceus terrestris | 77 c | Fiber | 84 d, 85 a | | |
| erinos | 221 d | fibrini testes | ibi. | Litera G. | |
| eritimus | 327 d | felis | 56 b | Ladiola, Iris | 1 a d |
| erithinus | ibi. | Finica | 52 c | Geu | 2 d |
| erigeron | 246 d, 247 a | Ficedula | 93 a | Gallica Nardus | 5 b |
| eruca | 331 d, 94 a | Fel | 103 b c | Gizer | 7 c |
| eruca pinorum | 343 b | Fimus | 104 c, 105 a | Gazella | 13 b |
| Eruilia | 118 a | fimi differentia | 105 a | Gloeon | 17 d |
| eruum | 117 d, 118 a | Fruentum | 108 a c | Galbanum, Metopum | 280 a b |
| Erisiceptron | 12 c | Frit | eo. a | gabireya myrrha | 29 d |
| erythacus | 44 c | Fertini | eo. c | galbuli | 41 d |
| erythros | 61 b | farinæ nomina | 103 c | galbæ | ibi. |
| erysimon | 137 b c d | furfures | ibi. | gingros | 75 c |
| eryngion | 159 d, 160 a | farris quatuor discrimina | 110 a | gerra cefyma | 47 b |
| eryngiatum | ibi. | fabila | eo. c | gerandryon | 55 c |
| erythrodanum | 208 d | fabulus albus | ibi. | glans | 58 d |
| Escharulæ | 106 d | farrago | 111 b | glans Iouis | 59 a b |
| Eufragia | 218 a | farraginaria | ibi. | garbion | 60 a |
| eupatorium | 225 a | fœnugræcum | 114 d | galla | 60 b c |
| euphorbia | 186 b c | fœnigræci farina | ibi. | gallæ genera | ibi. c |
| euphorbia | ibi. | fabagrica | 116 a b | grossi | 75 d |
| eumphalos | 73 d | fabulum | ibi. | grossuli | 76 a |
| eupteros | 259 d | fabalica | eo. c | Galeos | 85 b |
| exhalme | 60 d | fabago | ibi. | Gefentera | eo. c |
| exalipres | 21 c | fabagrica | ibi. d | Gobius | 86 d |
| exalburnare | 102 c | Fremium | 145 d | Garrum | 87 b c d |
| exalburnatum robur | ibi. | Fel terræ. | 154 b c | Garus, um | ibi. & c |
| Excantare | 132 b | item folio | 155 a | Galecula | 87 c |

| I | N | D | E | X |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Gonos Thalassios | 87 c | Gramen Cilicium | ibi, c | Hippomani testes 84 c d |
| Gallaria piscis | 88 c | granum tinctorium | 227 c | Hyrca 57 b |
| Genitale Cerui | 89 d | Galiopsis | 246 b c | Hysca ibi. |
| Gallina | 90 d | galion | eo, c. d | Hyn ibi. |
| Gigleria | 91 a | glauz | 261 a b | Hyccara ibi. |
| Gallinarum tria genera | ibi. | genista | 269 a b | hyena eo. c |
| Gallinaria | ibi. | Glans unguentaria | 169 d | halme 27 d |
| Galerita | 92 d | item folio | 270 a | halos achne ibi. |
| Ginni | 93 d | geodes | 337 c d | hepar 29 e |
| Gygenij | ib. | gypsum | 349 b | hepatus ibi. |
| Gaphagæ | 96 c | item folio | 330 a b | hippomanes 90 a |
| Grassos | 102 b | Gypsi genera | ibi. | hippi 91 a |
| Grasson | ibi. | galena | 315 a b | herodius 92 c |
| grassonia | ibi. | gastra | 317 a | hirundo 93 a |
| grasson ibi, 108 a | gluma | garus | 327 d | hirundinun genera ibi. |
| gerania | 109 d | gorgonia | 332 a | Hinnus 99 d |
| grastis | 111 b | gagates | 334 a | Hinnulus ibi. |
| gossampinus | 115 b | gagis | ibi. | Holcos araneus 95 d |
| gossipion | ibi. | Galactites lapis | eo, d | Hippace 98 d |
| Githon | ibi. | item folio | 335 a | Hippace ibi. |
| gy | 116 c | Galaxia | 334 d | Hordæ 102 c |
| Gongylæ, lis. | 118 d | Galaicos | 335 a | hordicalia festa ibi. |
| Gingidium | 130 d. | 131 a | H | hellos 103 c |
| gethyum | 134 c | Herida, Iris. | Litera H | hypotrimna 104 a |
| gingiber | 138 d | Hirculus | 4 c, 5 a | hyposphagma ibi. |
| glastum | 150 b | Helis | 10 b | hordeum 109 c |
| Glastum syluestre | eo, c d | Hieracunta | 11 d | hordei genera ibi. d |
| Gentiana | 152 b | Haormia | 13 c | halica 112 c |
| glycyrhiza | 153 c d | Heliacón | 14 b | halix ibi. |
| glycis ancon | 162 a | Helenius | 15 c, & 16 b | helymos 113 a |
| gordylon | 175 c | Hydreleón | 16 d | Hium 116 c |
| gich | 184 a | Halmon, oleu. | 19 a | Halisparton 108 c |
| Gitago | 184 a | Hygromyza | 21 c | Hippolapathum 120 c |
| galbanum | 186 c d | Hydrosfata | 22 a | humulus 124 d |
| galbeum | ibi, d | Hemismata | 34 c | hydropiper 139 a |
| glaciūm | 187 d | Herba | 43 a | hastula regia 142 d |
| Glutinum | 188 a | Harundo | 47 a b | item folio 143 a |
| Gluten | ibi. | Harundinum genera | ibi. 48 a | Hedera 147 d, 148 b c |
| glutinum genera | ibi. | harūdo obliqua | eo, c | Hederæ genera ibi. |
| gluten atticum | eo, a | Hieratica | 48 c | Hysopus, um 165 b |
| gluten piscium | ibi. | halimus | 49 d, 50 a | Hedyosmos 165 c |
| geranion | 198 b | halimi genera | 50 a | harmela 171 d |
| geranion alterum | eo, c | Hemicyprus | 51 c | hieracia 277 b c d |
| gruina | 198 c | hypocistis | 52 b | hieracia parua ibi, c d |
| gnaphalion | eo, d, 199 a | hebenus | 53 b | Hippofelinum 179 a |
| gnapheus | 198 d | hebeni genera | ibi. | Hippomarathrum 180 b c |
| gnaphos | ibi. | Halmades oliuæ | 58 a b | Hippophanes 298 d |
| gnaphalus | ibi. | hala | ibi. | hemerocallis 201 c |
| gnaphalides | 199 a | hemeris | eo, d | horminum 204 a b |
| glycyfis | 208 a | haliphlocos | 59 c | hedyfaron eo, a b |
| gladiola | 219 a b | hypothymis | 64 b | hemionion 205 d 206 a |
| gladiolus | ibi, b | hypomelides | 71 b | hemionitis ibi. |
| gramen | 221 d, 222 a | homomelis | eo, b | heluron 207 c |
| graminis genera | ibi. | hegeteria | 74 c | Helurios ibi. |
| gramen harundinaceum | eo, b | Halicacabus | 76 d | Hypericum 211 b |
| Gramen Parnasi | ibi, b c | Hippocampus, | 78 a | Holosticon 216 b |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------|----------|
| Helixine | 223 d. | a b | Iafne | 29 c | Ia | | ibi. b |
| Helixine duplex | 224 | a b c | Iaron | | ibi. | Ianchina ueftis | ibi. |
| Hippuris | | b | Iefimimum | | ibi. | Impia | 266 d |
| helichryfos | 230 | a b | Iafmes tria genera | | ibi. c d | Ixia | 248 a b |
| hyacinthus | 232 | b c | Iuniperus parua | | 21 b | Indicus color | 318 d |
| hyacinthinus color | | ibi. | Iuniperi duo genera | | ibi. | item folio | 319 a |
| hygiginus color | 232 c | | Iuniperus magna | eo. d | Ips | | 326 b |
| hyginobaphes | | ibi. | Irefio | 57 d | Ix | | ibi. |
| Hypecoon | 235 | b c | Ilex | 59 c d. | 60 a | Igniarium | 333 a |
| Hyofcyamus | co. c d. | 236 a | Iuglans | 60 b. | 72 b c | Iafpis | 336 |
| Hippomanes | | 242 b | Ifca | | 72 c | | |
| hyophthalmos | | 253 d | Ifchades | | 74 c | | |
| Hippogloffos,ffa. | | 257 c | Iberis | | 76 c | | |
| Hippogloffis | | eo. c | Ionia | | 78 d | | |
| Hypopion | | 263 c | Inteftina terræ | | 85 c | | |
| Hippophâtes | 271 | c d | Iuli | | eo. | | |
| Hippophæfton | 272 | a b | Ixia | ibi. | 155 c | | |
| Heliofcopium | 274 | a | Ixon | | ibi. | Lacaphon | 11 b |
| heliotropium magnum | 286 | d | Ificia | | 87 d | Lacca | 13 d |
| item folio | 287 | a | Ius pifcium | | 88 a | Lenis | 14 a |
| Heliotropium paruum | 287 | b | Iulus | | eo. c | Lirium | 15 c |
| Hirculus uitis | 288 | a | Ilia | | 89 b | Labyzos | 24 c |
| hydromeli | 296 d. | 296 a b | Ila | | ibi. | Libanos | 28 b |
| harena | | 337 b | Iria | | ibi. | libanotos | 33 d |
| hyofciamus | | 345 d | Ileos | | ibi. | larinum | 34 a |
| hirudo | | 350 c d | Iecur afininum | | 89 c | larax | 34 a |
| hemorrhoiiftus | | 356 d | Iecur caprinum | | 90 b | laragæ | 24 b |
| Cura eius | | 360 d | Iecur aprinum | | ibi. | lychnis | ibi. |
| Hydri morfus | | 357 a | Iecur caninum | | eo. c | luflon | 34 c |
| Cura eius | | 361 a b | Iecur Mergi | | 90 d | larix | 35 c |
| Hydromel | | 301 a | Inulus | | 93 d | lenrifcus | eo. d. |
| Hydromeli | | ibi. | Innus | | ibi. | lama | 36 c |
| Helcyfma | 314 d. | 315 c | Inis | | ibi. | larigna | 37 a |
| Hydrargyrum | | 320 b | Inteftina terræ | | 96 c | Laurus | 38 c |
| harpax | | 325 d | Iulus | | ibi. | Laurigenera | 43 d. |
| harpaction | | ibi. | Italos | | 101 c | Lautus tripas | 44 a b |
| halofachne | | 327 c | Italia | | ibi. | Laurea | 44 a |
| halcyones | | 331 a | Ius nigrum | | 104 a | Lorea | ibi. b |
| halcyonium | 330 d. | 331 a | Ius dulce | | ibi. | Laureoli | ibi. b |
| hæmatites | | 333 c | Iuris genera | | ibi. | Lora | ibi. b |
| Hæmatis genera | | ibi. | Infrunitus | | 117 c | Iex arborum furtim cafaræ | 44 d. |
| hieracites | | 334 b | Incubus | 127 d. | 128 a b | lebyz | 47 d |
| heracleos lapis | | eo; d | Irion | | 137 c | leucocantha | 49 d |
| | | | Ifatis | | 140 b | liguftrum | 51 b c |
| Iris | | 1 a b c | Ifatis fylueftris | | 150 c | ledon | 52 c |
| Iris Illyrica | | ibi. & c | Iechthyocolia | | 188 a b | ladanum | ibi. & d |
| Iridis illiricæ duo genera | | eo. c | Iouis flos | | 202 a | lada | 53 a |
| Iridis pifidicæ offura | | ibi. | Iris fylueftris | | 219 c d | lycium | ibi. d |
| Iris Troglodytica | | ibi. | Idæa radix | | 226 b c | lygon | 54 c |
| Iuncus triangulus | | 3 b | Iuncus paluftris | | 228 c d | lygean | 55 a |
| Iofcinnamon | | 7 c | Iecoraria | | 229 b | Ligella | 56 b |
| Iuncus odoratus | | 10 a | Inguinalis | | 253 c d | Lopas | 56 c |
| Iuncus rotundus | | ibi. b | Ifoopyron | | 254 a | Lachrymæ oleæ æthiopicae | 57 d |
| Iuncus quadratus | | ibi. c | Ifion | | ibi. | Lophiae | 58 c |
| Ipnon | | 13 a | Ion | | ibi. | Lorus | 60 a |
| Inula | 15 c. | 16 a | Ionfa | | 254 b | Lorus 69 b c. Liftatia | 72 a |
| | | | | | ibi. b | * fequitur fupra. | |

B iij

В иң

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|
| * Limax | 90 c | Lactuca | 130 a b c | Laurus Alexandrina | 169 a b |
| Lepus marinus | 93 b | Lactucæ genera | eo. b | Licium | 170 c |
| Lepus terrestris | ibi. c | Lactuca sylvestris | eo. c d | lappago | 171 c d |
| Leporum genus triplex | ibi. d | & eius genera | ibi. | lactuca | 174 c |
| Loligo | 94 a | lanaria herba | 139 c d | lactaria | eo. b c |
| lolliguncula | ibi. | lepidium | 145 b | lactariæ genera | eo. d |
| lutra | 95 a | lepidij genera | ibi. | lathyrus | 175 c d |
| lytra | ibi. | lutea | 150 b c | labrusca | 182 a b |
| liquimarij | 97 c | lepton | 155 a | linozostis | 186 b |
| lupus piscis | ibi. | labrum Veneris | 156 b c | lora | 189 a |
| liquor sociorum | ibi. | luma | eo. d | lapidum aliquot uires | 197 c d |
| Lagonoponos | 99 b | lumeſta | ibi. | item folio | 198 a |
| Lactes | ibi. | Lumariæ falces | ibi. | lapis Samius | 199 c |
| larinæ larini | eo. b | Leucacantha | 159 b | lac coagulatum | 198 d |
| larini | ibi. | ligusticum | 173 c d | lepus marinus | 198 b |
| lebias | 99 c | libanotidis genera | 182 a b | Lutea | 197 b c |
| lichenes equorum | 90 a | laſer | 184 b d, 185 a | lomentum | 198 c |
| lyſſon. | eo c | laſerpitium | ibi. | Lutum Venetum | 198 a |
| locuſtæ | 92 a b | leucoporon | 189 a | libri repumicati | 196 b |
| Loba | 92 b | leucophæon | ibi. | latos piſcis | 198 a |
| Lacerta uenenaria | 94 d | Lithocolia | ibi. | lixitiuum muſtum | 190 a |
| Lupus araneus | 95 c | Lappa | 189 b | lapis Iudaicus | 195 c |
| lacerta, um. | 95 d, 96 a | leontopedalon | 191 a | lapides ſpongiarum | 196 d |
| lumbrici | 96 c | leucas | 191 d, 192 a | lathocolia | ibi. |
| lactis uſus | 97 b | leucæ genera | 192 a | | |
| lactarium opus | eo. c | lychnis | eo. a b | ¶ Liſtera M. | |
| lac muliebre | 98 a b | lychnis ſylueſtris | ibi. b | | |
| lanarum medicina | 99 b | liſium | eo. c d | M Artia radix, Iris | 1 a |
| lanæ fucciæ | ibi. c | Lilium | 192 d, 193 a b | Meon, Meu. | 1 c d |
| lanæ uſtæ | ibi. | Lilij genera | 195 b | Meu duo genera | eo. d |
| Lana, Erion | ibi. c | lomentum | 198 d, 199 a | Melligera | 5 d |
| Lanarum diſcrimina | 99 c | liſium ſylueſtre | 201 b c | Malabathrum | 6 d |
| lipos | 102 b | liguſtrum candidum | 201 d | Malabathri genera | 7 a |
| laridum | eo. c | lutearum genera | 202 a | Mortodes | 7 c |
| lotium | 105 c | liſthosperma | 208 b | moſelytis blaſtos | 7 d, 39 a |
| Lyncurium | ibi. | Lonchitis | 209 a b | myrrha caſſia | 8 b |
| Lynx | ibi. | Lonchitis altera | eo. b | muſcus | 13 a b |
| libum | 109 b, 114 c | Lyſimachia | 213 d | moſchus odoratus | ibi. |
| lutum Vulcani | 109 c | limonium | 218 a b | muſcilion | 13 b |
| lepyria | 111 a | lagopus | 218 b c | magma | 15 c |
| leſſus | 113 a | lagopyros | eo. c | medica | 15 c |
| tolium | eo. c d | lycopliſ | 220 d | Manna | 16 a c |
| linum | 115 a | Lichen | 229 a b | Melligo | eo. c |
| Lecithos | 115 d, 116 a | Lycoſonon | 240 c | Metopium | 19 a |
| Lcithopolæ mulieres | 116 a | lens paluſtris | 144 b c | Melanthemon | 20 a |
| legumẽ omne tribus modis man- | ibi. | laſtoris | 248 a | moſchata | 21 c |
| ditur. | ibi. | lychnitis | eo. d | moſchomyra | ibi. |
| lenticula | ibi. 117 b | lotus urbana | 250 d | moſcholea | ibi. |
| Lens | 117 b c | Lotophagi | ibi. | myra | 21 d, 30 b |
| Lupinus | 118 a b | Lotus ſylueſtris | 250 d, 251 a | myracopa | ibi. |
| Lapathum | 120 a b | item folio | 251 c d, 252 a | myrrha | 29 d, 30 b |
| tampſana | eo. d | lotus Aegyptia | eo. d | myrrha troglodytica | ibi. |
| lupulus | 124 d | lotometra | 257 a b | Myrrha Caucaſis | 30 c |
| lupus ſaliſtarius | ibi. | Leontopodion | 259 d | Myrrhæ genera | 30 b |
| lupus reptitius | ibi. | Lappa minor | 250 a | Myrrhæ probatio | eo. c |
| Lauer | 125 d, 126 a | lapparum genera | | Myrrha Boeotica | 31 b |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----|---------------------|----------------------|
| Manna thuris | 34 a b | Memecylon | ibi. | & d | Marciatum unguentum | ibi. |
| Manna | ibi. | Moracie | 31 c | | Marci pastilli | ibi. |
| Maza | 34 c | moracillæ | ibi. | | Mydas | 108 a 109 d |
| Mastiche | 36 d. 37 a. 44 b | mollusca | ibi. | | Mola salſa | 109 b |
| maſtiche, Silphium | ibi. | morus | 73 a b | | Maza | 80. d. 110 d |
| maſtichis duo genera | ibi. | marathia | eo. b | | miliuni | 112 d 113 a |
| maltha | 41 b | moreos | eo. c | | miliarium uas | 113 a |
| muſtax | 44 a | morofycos | ibi. | | miliaride aues | ibi. |
| muſtacea | ibi. | metræ | 77 b | | mel frugum | ibi. |
| muſtiæ | ibi. b | myaces | 79 a | | malua | 114 b c |
| magides | ibi. | myes | ibi. | | metachæron | 116 d |
| maſe | ibi. | Myſicæ | ibi. | | medica | 133 d |
| magis | ibi. | muſce | ibi. | | molyra | 135 d |
| Milea | 45 b | muſculus | ibi. | | malum terræ | 140 b |
| Melea | ibi. | mytulul | ibi. | & b | myſora, tis | 140 d. & ſeq. |
| milon, Taxus | ibi. | myxa | 80 c | | Murtiolum | 177 c |
| macer | 45 d. 46 a | marafi | 81 d | | Murtius campuſ | ibi. |
| magadis ſibia | 47 d | maſſi angueſ | ibi. | | Murtea Venus | ibi. |
| Myrica | 48 c | muluſ piſciſ | 84 b. muſſuſ. | | myrtuſ | ibi. |
| miceſ | 57 d | muſtella | 85 c d | | murtuſ | ibi. |
| morſa | eo. d | mutill | 86 a | | myrtella | ibi. |
| Melandryon | 50 d | maris | eo. c | | melitid | 163 a |
| myrobalanuſ | 61 c | maruda | ibi. | | mentha | 165 c d |
| malum punicum | 63 c d | mænæ | ibi. | | mintha | eo. c |
| malorum punicoſ: genera | ib. d | melandrya | 87 b | | menthaſtrum | eo. d. 166 a |
| Malicorium | 81 c | muria | eo. d | | melilotuſ | 169 b |
| myrtuſ, a. | ibi. | murieſ | ibi. | | marum | eo. b c. maru ibi. c |
| murta | ibi. | millepeda | 88 c d | | magneſia | eo. c |
| murtatum | ibi. | mataliſ | 89 b | | Moly | 171 d. 172 a |
| murtatulum | ibi. | Maſſoneſ | 92 a | | Molon | eo. |
| myrtatium opſonium | ibi. | Maſſonia | ibi. | | melanthium | 183 d. 184 a |
| Myrtine | ibi. | maſſon | ibi. | | melanthemoti | 184 a |
| Myrti genera | ibi. | maſſace | 92 b | | melandryum | ibi. |
| myrta coniugalſ | ibi. | moluſuſ | eo. b | | magydariſ | 185 a b c |
| myrtæ | ibi. | malleoluſ | 93 b | | maſpeton | 187 b |
| medilotini | 64 b | muluſ | eo. d | | Myxa | 188 d Myxaria ibi. |
| myrtidanum | eo. c d | myrmecioni | 95 b | | marrubium nigruſ | 193 c d |
| myrtida | ibi. | muſcariuſ | ibi. c | | marrubium | 194 b c |
| Maluſ, um. | 65 d. 66 a b | muſ araneuſ | ibi. & 96 d | | marrubium duplex | ibi. c |
| Malaurena | ibi. | mygale | 96 d. 97 a | | mithridation | 196 c |
| maſſorum genera | ibi. | Muſ | 97 a | | malanthemon | 206 d |
| melea | 66 a b | maſmoræ | ibi. | | Muralium | 207 a |
| muſtea | eo. c d | molce | 100 c | | Matricaria | eo. b |
| mala dulcia | eo. d | melandryon | 102 c | | malua | 209 d |
| Medimela | ibi. | moſchoſ | eo. d. 103 a | | maluæ genera | ibi. |
| Mala orbiculata | ibi. | moſchétuma | ibi. | | medion | 218 c d |
| mala ſylueſtria | ibi. a | medulla | eo. d. 103 a | | matheronion | 219 a |
| mala perſica | eo. b | Myma | 104 a | | macheroniſ paſtilli | ibi. & b |
| mala præcokia | eo. c | Mel | 105 d. 106 a b | | macherion | ibi. b |
| malum Medicum | eo. c d | mel Sardoumi | eo. c | | millefolia | 223 b |
| malum Heſpericum | ibi. d | mel Ponticum | ibi. | | mercurialiſ | 224 b c d |
| Mepſiluſ, um. | 69 a | mel Hereacleoticum | ibi. | | mimiras | 226 d |
| Mepſilorum genera | ibi. | mel Manicum | 106 c | | Melancranis | 228 d |
| mepſilum trigranum | eo. b | mel Menomenon | ibi. | | Meconium | 234 b |
| myxa | 70 d | Mazapaniſ | 106 c | | Mandragora | 238 a b c d |
| madrya | ibi. | Marcipanſ | ibi. | | item ſolio | 239 a b c |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Malinsana | 339 a b | Nardi species nouem | 4 b | Nitrum | 323 c d |
| Myxtonos | 339 d | Nardus Syriaca duplex | eo. c | Nittaria | eo. d |
| myrphonos | ibi. | Nardus Indica | ibi. | ¶ Litera | O. |
| margyllios | 241 d | nardus Celtica | 4 d. 5 a | O Zis | 7 e |
| margarides | ibi. | nardum montanum | 5 b | Oxyſchoenos | 10 b |
| millefolium | 252 b | niris | 5 b | Oloſchoenos | ibi. |
| myriophyllon | ibi. | nardum ſylueſtre | eo. d | Opobalfamum | 11 c |
| myrrhis | eo. c | nardum ruſticum | ibi. 170 b | Oreſtium | 15 c 16 a |
| myla | eo. c | nardum ſylueſtre | 6 c | Opinais | 16 c |
| Myagros | eo. d | nardum Creticum | ibi. | Oleum omphacinum | ibi. & d |
| Melampyros | ibi. | Ner | 13 b | & ſit duobus modis | eo. d 17 a |
| myrtus ſylueſtris | 262 c d | Narcaphthum | 13 d | Omotribes | 16 d |
| myrobalanos | 269 d | nectarion | 15 c | omphacium | ibi. |
| mollugo | 271 c | nenuphar | 16 c | omphax | ibi. 17 a |
| myrſinite | 273 d | nigella | 20 a | omphaciomed | ibi. |
| meconium | 276 a | nux Indica | 21 c | oleum Druppæ | ibi. & |
| Mercurialis | 286 b | nuces pineæ | 36 b | proba eius | ibi. |
| Muſum | 295 a b | nucum pinearum. 4. genera | ibi. | oleum ſylueſtris oliuæ | 17 a b |
| melicraton | ibi. d | nux Sapinea | ibi. | oleum Candidum | ibi. |
| muria acida | 98 d | naphtha | 41 a b | omotribes | ibi. b |
| mel Heracliae | 345 c | neuroſpaſtus | 51 a | oliuitates uariæ | ibi. b |
| mandragora | 347 a | neruus paſſus | ibi. | oleum Sicyonium | 17 c |
| Meconium | eo. b | Naucus | 57 c | Oleum Cicorum | 18 c d |
| Muris aranei icſtus | 356 a | Nacæ | ibi. | Oleum Amygdaliinum | 19 a |
| Cura eius | 360 a | Netrindes oliuæ | 58 a | Oleum Balaninum | eo. b c |
| melomeli | 361 a | naueratites | 64 a | Oleum Sefaminum | ibi. |
| molibdoides | 314 c | nux | 66 b | oleum Carinum | ibi. |
| molibdena | 315 a b | nucipruna | 70 d | oleum Hyoſciaminum | eo. c |
| Minium | 319 c d | nelia | 71 a | oleum Cnidium | ibi. |
| miniare | eo. d | nux regia | 72 b c | oleum Cnicinum | 19 d |
| minium Sinopici | 310 d. 321 a | nux perſica | ibi. c d | oleum Rhaphaninum | ibi. |
| miltoſ | 321 a b | nux Auellana | eo. d | oleum Melanthini | ibi. & 20 a |
| Miltopariæ naues | ibi. | narce. | 81 b c | oleum Myrteum | 20 b |
| Miſy | 322 d. 323 a | napunculum | 92 b | oleum Laurinum | ibi. c |
| melan | 323 a | Nebreon | 93 c | oleum Lentifcinum | eo. d |
| melanteria | ibi. | Notiaos | 103 a | Oleum Maſtichinum | 21 a |
| muſcæ | 326 b | Necſta | 104 a | Oleum Roſacium | eo. d 21 a |
| muſcæarij | ibi. | Nafſos | 108 d. 114 c | Oleum Elatinum | 22 c |
| Muſcicum opus | ibi. | nelinos | 115 a | Oleum Melinum | ibi. |
| Muria | 327 d. 328 a | naſturtium | 136 c | oleum Oenanthinum | ibi. d |
| Muria duplex | 328 a | nycteris | 147 c | oleum Anthinum | ibi. |
| Maltha | 330 a | nycteritis | ibi. | oleum Telinum | 23 a |
| Milios | 332 a | nepita, eta | 166 b | oleum Sampsuchinum | eo. b |
| militis | ibi. | nephaſtum | 178 b | oleum Ociminum | eo. c d |
| magnes | 334 c d | Narthea | 183 a | oleum Abrotoninum | ibi. |
| magnetis genera | ibi. | nigella | 184 b | oleum Narcifſinum | 24 d |
| melitites | 335 a | Nymphæa | 204 d. 205 a b | oleum Crocinum | 25 a |
| Morochthus | ibi. a b | nymphæa altera | 205 b | Oleum Gleucinam | 26 b c |
| Molochitis | ibi. b | nautea | 210 c | Oleum Aegyptium | 28 b |
| Memphites | 335 d | neuras | 229 b | Orobia | 33 a |
| | | nerion | 243 c d | oleum Picinum | 29 d |
| | | Nuxodorata | 270 a | oxycedrus | 43 a b |
| | | Narcifſus | 270 a b c. | oripetea | 46 b |
| | | | 271 a b | oxycantha | 50 d |
| | | | 280 c | Olea ſylueſtris | 57 a |
| | | | 317 d | Oleafter | ibi. & b 58 a |

¶ Litera N

N Ar. Iris. 1 a item folio
Nardus, dum. 1 d. 4 a Nummus uenetus
Nardi genera ibi. & ſeq. Narica

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| Oleastellum | eo. c | Ofchos | eo. d | onyx | 331 b |
| olea cilibraca | ibi. | Oca | ibi. | Onychipuncta | 336 b |
| oleæ medulla | ibi. | omphalos | 106 b | Ophites | 336 c d |
| ossarij | ibi. | oxylepes | 108 d | Ostracite | 337 a |
| olea Arabica | ibi. | offa | 110 a | ¶ Litera P | |
| oleæ uita longissima | ibi. | olyra | 111 b | Parallelæ | 1 a |
| olea Orchitis | eo. d | oryza | 112 b | Piper aqueum | ibi. b |
| ostracismus | 38 a | Onobleton | 111 b | piperapium | ibi. |
| oliuæ Colymbades | eo. a | olus | 122 d | pseudocypirus | 1 b |
| oliuæ uariæ | ibi. | olla | ibi. | pison | 4 b |
| oliuæ cibariæ | ibi. b | ocimum | 131 d, 132 a b | pyritis | 5 c |
| oleum syluestris oliuæ | eo. b | ocymum | 132 a | perpenfa | eo. d, 6 a |
| oleæ Aethiopice lachryma | 38 c | orobanche | eo. c | perptefa | 6 a |
| Onicicidæ | 60 c | ornithogalum | 133 a | Phu | 6 c |
| oxyphœnicæ | 62 b | Oxybaphon | 141 d | phyllon unguentum | 7 a |
| oporotheta | 66 b | Omoconitidis | 143 d | pseudocasia | 8 a b |
| opora | ibi. | Othonna | 149 b c | pseudocinnamon | 9 b |
| oxymala | 67 d | ononis | 159 a | Pyxacantha | 11 c |
| Oen | 70 b | origanum | 162 d | Porrigo | 12 c |
| Oien | ibi. | origani nomina | 163 a | Phasganon | ibi. d & d |
| Oa | ibi. | onitis | 163 b | piperella | 13 c |
| onomalidæ | 71 b | Origanum syluestre | eo. b | perfica | 15 c |
| Opisthocarpion | 75 a | Ocimastrum | 169 d | puluisculus | 17 d |
| olynthos | 76 a | Oreoselinum | 178 c | patos | ibi. |
| Odynolyon | 77 b | olufatrum | 179 a | phaselus Romanus | 18 d |
| Ostrum | 78 b | opos | 185 a | pæderos | 18 b |
| ostrea | ibi. 79 c | omphacocarpon | 189 a | plasse | ibi. 30 b |
| onyx | 79 d, 80 a | oenanthe | 199 d | pediasmos myrrha | 29 d |
| ostracon | eo. d | organorum notæ | 200 c d | plastinx | 34 b |
| ostracium | ibi. | orchis Serapias | 203 c | pinus | 34 d 35 a d |
| Ophloctena | 81 b | Onosma | 204 d | picea | ibi. 35 a d |
| omotarichos | 37 a b | oxosma | ibi. | paniculæ | 35 a |
| oxalme | 87 d | Onobrychis | 211 a b | Piceaster | eo. b c d |
| oxygarum | ibi. | ocimastrum | 221 b c d | Pix ibi. b. 36 a. 39 a. | 43 d |
| oxyporum | ibi. | ocimoides | ibi. | pinus germinatio terna | ibi. b |
| oxyliparon | ibi. | oxyfa | 226 c | peuce | ibi. c |
| onos | 88 c | oxys | ibi. d | pinus duo genera | ibi. d |
| oniscos | ibi. | ophrys | ibi. d | peda | ibi. d |
| orthroriscus | 89 a | Oxychoenos | 228 d | pityda | ibi. d |
| Opla | 89 d | Opium | 234 b | pinæ nuces | 36 b |
| Ouorum natura | 91 c | Oenagra | 253 a | Pitynon physema | 38 c |
| oui Candidum | ibi. | osyris | 261 c | Pix liquida | eo. d |
| ouorum differentie | 91 c | opocarpasum | 262 d | Picis confectio | 39 a b |
| oua pniſta | ibi. d | oleastellum | 277 d 278 a | picis uitia, & experimentū | ibi. d |
| oua chifta | ibi. | olea cilibraca | ibi. | picis genera | ibi. |
| ouum | 91 c d | Oenanthe | 289 d, 290 a | Pix, & Resina quo differant | 39 c |
| onos | 92 b | Omphacium | 290 b c | pissaleon | eo. d |
| ossifragus | 92 c | omphax | eo. d | pix sicca | 40 a |
| ossifraga | ibi. | oxycratum | 298 a | palimpissa | ibi. b |
| Ophion | 93 d | oxyrhodon | eo. b | pissaphaltos | 40 d |
| Oogala | 97 c | oxymeli | ibi. c | Panduna | 44 b |
| Oxygala | 93 b, 99 a | oxalme | eo. d, 299 a | Pseſta | ibi. |
| Ocypira | 99 c | ostracites | 327 a | Platanus | eo. d |
| Ocypus, um. | eo. d, 100 a | obryzum | eo. c | plataniſtos | 45 a |
| Oes | 100 a | omphacomeli | 301 b | platanio | eo. 2 |
| oxyngion | 102 c | ocira | 318 b, 319 a | platanos | ibi. |

| | N | D | S | X | |
|-------------------|-----------|-----------------------|--------|--------------------------------|----------------|
| Plecta | 45 b | Prumnō | ibi. | portis | 109. c |
| Populus alba | eo. c | Prumnula | ibi. | portax | ibi. |
| populus duplex | ibi. | Pistacea | 72 a | Peciolus | eo. d |
| populitria genera | ibi. d | Psitracia | ibi. | paraspades | ibi. |
| psenes | 45 c | pilistacia | 75 c | Pompilos | 103 c |
| Populus nigra | 46 d | psenos | 75 c | Perdix | eo. d |
| phæcton | ead. d | perfea | 76 a b | perdicnm genera | ib. |
| plōades | 47 b | perficus | ibi. b | Peristeræ | ib. b |
| papyrus, um. | 48 b | Purpura | 78 b | peristeri | ibi. |
| promala | eo. c | Porphyriones | ibi. | Propolis | 107 c |
| paliurus | 50 b | Papauerculum | eo. d | panificij nomina & genera | 108 b |
| Phelyrea | 51 c | Polyps | ib. | pyrinos panis | ib. c |
| phillyra | ibi. | pectunculi | 79 b | panis fermentatus | eo. c |
| philyca | ibi. d | Ptox | 83 c | pityra | ibi. |
| Patella | 53 d | Pastinaca | 83 d | panis canicaceus | ibi. |
| Pyxacantha | 55 a | phocæna | 87 b | pepalis | ibi. |
| piper agreffe | 56 c | Psammos | eo b | panis genera | eq. d. 109 a b |
| phaulia | 57 c | porcelliones | eo. c | panis | 109 a |
| patella | eo. d | phrynos | 86 a | pelanos | eo. b |
| petalismus | 58 a | piscis saxatiles | 88 a | polenta | 109 d |
| Pirene | eo. b | Piscij marinos: genâ. | ibi. | proconion | ibi. |
| pityrum | ibi. | Pulmo marinus | 89 a | porus pelusiacus | 110 b |
| pityris | ibi. | Pulmo Suillus. | ibi. | pinum uinum | eo. b |
| phascon | 59 c | Pulmo uulpis | ibi. | Poltos | 111 a |
| prinos | eo. d | Pulmōes animantū | ibi. | poltarion | ibi. |
| Phyllodrys | eo. d | & | b | puls | ibi. |
| Panos | 60 a | psyæ | eo. b | pultarium | ib. b |
| phanos | ibi. | Porceta | eo. b | ptifana | 112 c |
| pogoniæ | ibi. b | Porcus | ibi. | panicum | 113 a b |
| Palma | 61 b. c | petalidæ | ibi. | placentarum differentæ & gene- | 114 b c |
| Palma ægyptiaca | 61 b c | petali | ibi. | ra | ib. |
| palma uictorialis | eo. c | Pulmo | 89 c | pastillum | 115 d |
| Poma | 61 c | pellis Calcedonia | 90 c | pifus. a. um. | 117 c. d |
| Phœnicobalanus | 61 c 62 a | pullastra | 91 a | phasiolus | 117 c. d |
| Phœnix | ibi. d | pnicton | eo. d | Petrea | 117 a |
| Pienes | ibi. | parnopæ | 92 b | portulaca syluestris | 117 d |
| Pfarios | b. d | Pes Locustæ | 92 b | item folio | 114 a |
| palmulæ caryotæ | eo. d | Phinis | 92 c | Portulaca | ibi. |
| pateron | ibi. | phine | ibi. | plantago | 115 a b c |
| palmulæ thebaldes | 62 a | psara | 92 c | plantaginis nomina | eo. c |
| palma Elate | eo. b c | Parcus | ibi. d | pepo | 119 b d. 120 a |
| panchrisitos | 63 a | Proca | 93 d | pes gallinaceus | 121 c |
| phthaleos | 64 a | pityocampæ | 94 c | porrum capitatum | 124 b c |
| phyleones | eo b | Pulex | 95 b | Piper | 127 d 128 b c |
| pothos | ead. b | phalangius | 95 c d | piperis genera | 128 b |
| pancarpias | 64 c | phalanx | ibi. | Pharmacum medicum | ibi. |
| pomum. 65 a b. | 66 b | pedes blæsi | 96 a | pharmacum Indicum | ib. |
| pomum libræle | 66 b | pyriathes | 97 c | piperitis | 129 a |
| Precocia mala | 67 c | pyriephton | ibi. | ptarmica | 129 b c |
| pyrum | 68 b c | pyctes | ibi. | ptarmon | ibi. c |
| pyrorum genera | ibi. | Pyos | ibi. | panis porcinus | 140 c |
| Pyrastrum | eo. d | pus | ibi. | panis terræ | ibid. |
| Plus tyriaca | 69 c | pietya | 100 c | Pancratium | 144 c |
| Prunus. na. | 70 c d | pitya | eo. | phenion | 146 b |
| Prunorum genera | ibi. | pimcle | 101 b | Pulminaria | 158 a |
| Pruna Damascena | 70 d | pion | ibi. | Poterium | 158 a b |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Phrynon | 158 b | parthenium triplex | 214 b | Papauer corniculatū | 347 b |
| paderora | eo. c d | Pentaphyllon | 215 c d | pharicum | eo. b c |
| panactia | b. | Phoenix | 226 b | phalangiorum ictus | 355 c |
| pulegium | 163 d. 164 a | Phœnicopteris | ibi. | Cura eius | 359 a |
| pseudodictamnū | 164 c | papyrus | 228 d | pastinacę marinę ictus | 366 a |
| Polium | 167 b | prostitulę | 229 b | Cura eius | 359 d |
| panax | 163 b. | Paronychia | eo. b | plumbum elorum | 373 c d |
| panacis genera | 172 b d | peristereon | 231 b | Plumbum ustum | eo. d 314 a |
| Panaces Asclepion | ibi. | Petonomos | ibi. | plumbum retostum | 314 a |
| item folio | 173 a | Panchromos | ibi. | plumbi genera | eo. a b |
| panaces Heraclium | 173 a | Papauer erraticum | 233 a b | plumbi recrementum | eo. b |
| panaces chironion | eo. b | papauer satium | eo. c d | platyophthalmos | 314 d |
| pastinaca sylvestris | 174 a | item folio | 234 b | plūbago | 315 a b |
| Philtron | ibi. | papaueris satui genera | ibi. | plumbum oculi | 315 a b |
| pastinacę genera | ibi. b | item folio | 234 b | plinthrum | 317 a |
| petroselinum | 178 d | Papauer corniculatum | eo. c d | Paretonium | eo. c |
| pastinaca gallica | 180 d | papauer spumeū | 235 a b | Plyma | 319 c |
| Pyrethrum | 181 b c | psyllium | 236 b c | proba cōmentitia | 320 c |
| peucedanum. us. | 183 b c | palmidium | 241 d | proba Cuppellaria | ibi. |
| pinastellum | eo. c | pappos | ibi. a d. 246 d | pecton | 322 a |
| philantropos | 189 a | phycos | 247 c d | pforicon | eo. c |
| philadelphum | ibi. | potamogeton | 247 d | pforę | ib. |
| polycnemom | 190 c | item folio | 248 a | pompholyx | 309 b c d. 310 a |
| Praſon | 193 d | Phlqmos | 248 c d | pala | 311 a |
| prasion | ibi. | personara | 249 b c d | Phliasios | eo. e |
| Phyllitis | 194 d. 195 a | perasites | eo. c d | Pyralides | 312 c |
| phyllantion | 195 a | perfoliata | ibi. | pyroti | ibi. |
| phyllantes | ibi. | perfoluta | ib. | Pyraustę | ibi. |
| phalangium | 195 a b | perfolyton | ibi. | Photimon | 315 a |
| polium | 196 a b | perasus | ibi. d. 250 a | paraphoron | ibi. |
| phlogion | 201 d | perasones | 250 a | pumex | 316 a b c |
| phfox | ibi. | Pseudobunion | 255 b c | protostactum. | 320 a |
| phlogis | 202 a | Phyteuma | 257 a | Penis | 321 d |
| phyllon | 202 d. 105 a | polytrichon | 259 c | Penita ossa | ibi. |
| phellandriom | 203 a | pteris | eo. d | peniculus | ibi. |
| profedamum | 204 a | Polygala | 261 b | phrygius lapis | 322 c |
| parthenium | 207 a b | Paralyſis | 266 c | Pyrites | eo. d. 323 a |
| Pæonia | 270 d. 208 a | Paradelos | ibi. d | pyromachi | ibi. |
| phalaris | 268 c | Pituitaria | 267 c | Perdicites | 324 c |
| petilus | 213 b | Pomū Hierosolymitanū | 273 c | Perdiclates. | ibi. |
| petilius | ibi. | Paralios | eo. d | ¶ Litera Q. | |
| polygonum | 214 c b | plaphyllos | 274 b | | |
| Proserpinaca | eo. b | pityusa | 275 b c | Qvercus | 32 d |
| Polygonatum | 214 d | peplos | 276 a | Quercetum | 39 b |
| polemonia | 215 c d | peplis | eo. b | Querquerulana | ibi. |
| Philereria | ibi. | Portulacę sylvestris herbę tres. | 276 b | querquedula | ibi. |
| phoinę uestes | 216 c | folio | 276 b | Quisquilium | 218 a. 227 c |
| Phleos | ibi. | Pyncocomon | 279 c | Quisquilix | ibi. |
| periclymenon | 217 a b | Psilothrum | 283 a | Quinq:folium | 225 c d. 226 a |
| Purpura | eo. d | Pteris | 283 a | Quinq:folium duplex. | ibi. |
| purpurissus | ibi. | Pteris nymphæa | 284 a b | ¶ Litera R. | |
| potamogetana | 218 b | polypodion | 285 a b | | |
| pseudanchusa | 220 a | polypus marinus | eo. b | Raphanitis | 1 c |
| perdicialis | 224 a | Palma uitis | 288 a | Rizotomos | ibi. |
| perdicion | ibi. | psyllion | 2346 a | Radix Marica | ibi. d |
| parthenios | ib. | Pulicaris | 246 a | Radix nautica | 2 a b |
| | | | | Radix Rufic, Acoron | eo. b |
| | | | | Rhizium. | 24 a |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Rhypon | 17 d | Rapum terræ | 240 d | Sanguis Herculis | 14 e |
| Ricinum | 18 d | Ranunculum | 145 c | Symphicon | 15 c |
| Rhodomeli | 22 a | Rhaponicum | 151 d, 152 a b | Strigmenta Balnearum | 17 c d |
| Refinā ferentes arbores | 35 d | rhabarbarum | 152 a | Strigmenta Palestrarum | ibi. |
| Refina lentisci | 35 d, 37 a | rhafluuius | eo, a b | Strigmenta gymnasiaforum | ibi. |
| refina liquida | 38 a b c | radix dulcis | 153 c d | strigmenta | 18 a |
| refina siccā | eo, c | ruta | 170 d, 171 b | sinapi | 20 a |
| refinarum species | ibi. | ruta sylvestris | ibi, b c | symplicia | 21 a |
| refinarum usum | ibi. | ruta Galatica | eo, c d, & 172 a | sagda | 21 c |
| refina Stillaticia | ibi, d | rosmarinus | 181 c | sandalorum tria genera | 21 c |
| refinæ ustio, & coctura | ibi. | rosmarinus coronarius | 182 b c | Syrupa | 24 c |
| Rizophagi | 47 c | Rosa lunonia | 193 a | Syria herba & radix | 26 d |
| Rhamnus | 49 c | Rhapalos | 205 a | stacte | 28 b c, 30 b |
| rhamni genera | ibi, d | rubia | 208 d | smyrna | 30 c |
| Rubus Canis | 51 a | rubus | 227 b c | styrax | 31 b d |
| Rosa | 53 c d | rubri genera | eo, c | styraces | eo, d |
| Rhodon | eo, d | rubus Idæus | eo, d | saba thurifera | 33 a |
| rhodonia | ibi. | radix Idea | 226 b c | strobili | 35 c, 36 b |
| rhoduntia patella | ibi. | radix rhodia | eo, c | Syce | ibi. |
| rhodiaca olla | ibi. | rhodius color | ibi. | symplicia | 35 a |
| rosalia | 54 a | rhododaphne | 242 d | Sapinus | eo, b |
| rosarum genera | ibi, & b | ruscus, um | 262 c d, & 269 a | sapinea | ibi. |
| rosarum fabulæ | ibi. | Ricinus | 272 b c d | symplicia | 36 c |
| rhodides | ibi. | Radix sylvestris | 280 a b | Sphagos | 42 d |
| rhachos | 57 d | Rubeta | 350 c | fabina herba | 43 d |
| Robur | 58 d | rhodomet | 301 d | septe | ibi. |
| Roboris quatuor genera | ibi. | rhodomelon | ibi. | septica | 45 b |
| Rhus | 60 d, 61 a | rubigo ferri | 313 a | Secaculis | 46 b |
| rhoon | ibi. | recrementum plumbi | 314 b | Samaria | 47 c |
| ros syriacus | 61 a | recrementum argenti | 315 c | Syringias | 48 a |
| rhoos genera | ibi, b | rubrica Sinopis | 320 d, 321 a | siticina tibæ | 49 d |
| rhoas | 63 a | rubrica Sinopis species | 321 a | spina cerualis | ibi. |
| rhoeras | ibi. | rubrica fabrilis | eo, a b | spina | 50 c |
| rhoiadriom | ibi. | Rubrica lemmia | eo, a b | spina acuta | 51 a |
| rhoon | 73 b | Raudum | 311 c | senes canis | 52 d |
| Ricini | ibi. | Rodum | ibi. | strobil | 55 c |
| Remora | 77 b | ¶ Litera S | | spina Syria | ibi. |
| remeligo | ibi. | ¶ Andix nautica | 2 b | spina Aegyptia | ibi. |
| rana | 85 d | ¶ Syngentiana | ibi. | spinarum genera | ibi. |
| rubeta | 85 d | 2 b, & 10 b. | 10 d | semnos | 56 c |
| ranarum genera | ibi, & 36 a | Stimmi | 4 d | Salix Amerina | eo, d |
| rotæ | 90 b | Saliunca | ibi. | Salix | ibi. |
| repunculum | 92 b | Sanguis Martis | 5 d | salicis genera | ibi. |
| ramenta | 93 b | Succinum | ibi. | Salix uiminalis | ibi. |
| rhagion | 95 b | Syrinx | 8 b | Salix uitellina | ibi. |
| rhypara | 99 c | Smyrris | ibi. | salix Gallica | ibi. |
| Rhitace | 107 c | siliqua cassia | eo. | salix frugiperda | 57 a |
| Redundago | 108 c | schoenon myrepsicos | 10 b | salicis succus triplex | eo. |
| robos | eo, d | schoenos Hedyosmos | ibi. | salicium | ibi. |
| rapa, um | eo, d | schoenanthos | ibi. | sanfa | 57 c |
| rupum sylvestre | 119 a b | schinos | ibi. | sanfarij | ibi. |
| radix | eo, b c | sceptium elisel | 12 d | sclauole | eo, d |
| raphanus | 119 d | sphagnon | ibi. | secos | ibi. |
| raphanus sylvestris | 120 a b | splachnon | 13 a b | Strepte | ibi. |
| Rumex | 129 c | Seleniacum | 14 b | Saronos | 58 d |
| Radicula | | | | Saron | ibi. |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------|-------|
| Saroniacus sinus | ibi, 59 a | Saura | 96 a. | Seps | 96 a b | Saurion | eo. c |
| Sibari thuri | eo. d | scincus | 96 c | | 96 c | Siliquastrum | 139 a |
| Sphagnon | 59 c. | smynthea | 97 b | | 97 b | Salicastrum | ibi, |
| Scillima | eo. c d | serum lactis | eo. d | | eo. d | Seliquastrum | ibi, |
| Suber | 60 a. | schistum lac | ibi, & | 98 a | Struthion | 139 c d | |
| Sumach | 61 b. | saprus cascus | 98 b | | strutheum | ibi d. 140 a | |
| Spadix | 61 d. | simpspe 79 c. | Seuum | 102 b | spheritis | 140 c | |
| Semita alta | 62 d | stear ibi. | Staes | ibi. | strumus | 145 d | |
| Sclerococcò ibi. | Stomatice 63 a | sordæ eo. c. | Spondylis | 103 a | fardonius rifus | 145 d | |
| Sidem ibi. | Sida ibi. a c | sanguis | eo. d. | 104 a | spina alba | 156 c | |
| Sidion ibi. c. | Stephanos 64 c | sanguiculus | | 104 a | spina Arabica | 157 a | |
| Symphonia 65 a. | Siliquæ ibi. b | scor 105 a. | Sorioli | eo. a. | scolymon | eo. c d | |
| Syrice ibi. d. | Serica ibi. | saccharum | | 106 c d | spina syluestris | 158 d. & seq. | |
| Salgamum | 66 b | sacchar eo. d. | Sitos | 108 a | stichas | 162 c | |
| Salgamanus ibi. | Struthea ibi. c | spicus eo. a. | Spicum | ibi. | Saluia | 165 a b | |
| Sorba.us. | 69 a. | spica ibi. | Spica mutica | ibi. | Sphaelus | 165 b | |
| setanium | eo. b | stipula | | ibi. | fatueia | 167 a b | |
| Sorborū differentia quatuor ibi. | | Sitania | 109 a b | | serpillum | 167 d. 168 a | |
| Spinus 70 c. | Sycaminos 73 c | synomistos | ibi. b c | | sampsuchum | 168 b c d | |
| Sycameia ibi. | Sycea ibi. 74 c | similago | eo. c. | | sertula campana | 175 a b | |
| Syce ibi. 74 c. | Sycomoros ibi. | simila | ibi, & d | | sylua Barbarica | 170 c | |
| Sycomorea ibi. | Syca 74 c | semidalis | ibi. | | sylua confeminea | ibi. | |
| Sycada ibi. | Syreon 75 b | siligo | eo. d. | | sylua Ciminea | 170 c | |
| Spicilega 78 b. | Solinisæ 80 a | semidalites | ibi. | | sylua Rom. | ibi. d | |
| Sardonyx | ibi. | spolea 109 b. | Sisar | 110 a | staphylinus | 174 c d | |
| Sanguineacsa | eo. d. | ficera ibi. b. | ficerites | ibi. | sefeli | 175 a | |
| Scorpio terrestris | 81 a | spelta 110 c d. | siligo | 111 b | Sesiliæthiopicum | eo. b | |
| Scorpio marinus | ibi. | fecale ibi. | Scrutum | 112 d | sefili pelonnense | ibi. | |
| Scorpidæ ibi. | Scorpiæna ibi. | seræ uermiculi | | 113 a b | Seseli Cretense | ibi. b c | |
| Sedopendra | ibi. b | seræ populus | | 113 b | Syreon | 175 c | |
| Serpentum genera | 82 d. | sefama, um. | | 113 b c | sison eo. c d | sinnon ibi. d | |
| Staphlinus 83 d. | Sepia 84 a | strufetanus | | 114 c | Smyrnion | 179 b | |
| Sepia 84 a. | Scillaros 85 b | sciolus | | 115 a | Sphondylion | 182 c d | |
| Syagris eo. c. | Synagris ibi. | succidulus | | ibi. | Silphium | 184 d 185 a b c d | |
| Silurus 86 b. | Silluarion ibi. | scrutum | eo. d. | 116 a | syre | 185 a | |
| Smaris eo. c. | Salfamētū 87 a | scrutiscum | | ibi. | sagapenium | 185 d. | |
| Salgama | ibi. | scruteum | | ibi. | scapeniū | 186 a | |
| Salfamentorum genera | ibi. | scapus | | 116 c | sarcocolla | 187 c | |
| Sarpeda ibi. | Sturio 87 b | scaphi | | ibi. | ferrata 191 c | bandaraca 193 b | |
| Sconbri eo. c. | Salfugo 87 d | sifarum | 119 d. | 120 a | stichys 194 d | scordiū 196 b c b | |
| Salsilago | ibi. | scopa regia | | 121 a | scordotis ibi c | secula 201 d | |
| Sibariticum ferculum | 87 d | scorpius | | 122 c | Scopa regia | 202 a | |
| Saxatiles pisces | 88 a | Sion, um. | | 123 d | Silaus | 203 a | |
| Seps eo. c. | Scari eo. c | Sisymbrium | | 126 a b | Satyriion minus | ibi. | |
| Subgrumus | 89 a | sifymbrium alterum | | eo. c | silphio eo. c | satyrifum eo. d | |
| Scropha | eo. b | sonchos, um. | | 127 b c | satyrion Erythroniū ibi, & | 204 a | |
| suum differentia | eo. b | seris 127 d. | Sicya | 129 c | satyrion | 204 a | |
| lycotos | 90 b | scandix | | 131 a b | satyrifinos | ibi. | |
| soleæ crematæ | 90 c | sandix eo. b. | Smilax | 133 b | satyrifasis | ibi. | |
| falsa Marfonica | 92 a | scena | | eo. c | Satyriion Indica | ibi. | |
| sanqualis | 92 c | scordium | | 135 d | Securi daca | 204 b c | |
| sturnus 92 c. | Scobe 93 b | scordoprasum | | 136 a | Scelorythē | 213 c | |
| salamandra | 94 d | sinapi eo. b c. | Sinapis | ibi. | Sanguinaria | 214 a b | |
| stelliones | ibi. 95 a | sinape | | ibi. | Sanguinalis | ibi. | |
| stellionatus crimen | 95 a | sinapi genera | | 136 b | sanguinaria foemina | ibi. b c | |
| stellatura ibi. | Stellare ibi. | sinapismus | | eo. c | Symphitus | 215 d. 216 a | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Stæbe | 216 c | Scorpios | ibi. | T | Litera T. |
| Stymphalides | 210 c | Smyris | 317 a | Helpide, Iris | 1 a d |
| Stypion 216 c. | ibi. d | Salamandra | 343 d. & 344 a | Thaumatofos, Iris | ibi. & d |
| Stuppa | ibi. | Smilax | 346 b. | Thylacitis | 5 b |
| Saxiphagos | 217 c d | fanguis Tauri | 349 c d | Thesa 5 d | Tenbul 7 a |
| Saxifraga, um. | ibi. | Spuma argenti | 350 a | Therifum 11 b | Tarus 13 c |
| Sanguiforba | 217 d | Sandaracha | eo. b | Thya 13 c | trogetes ibi. |
| Sparganion | 219 b c | Scolopendremorsus | 355 d | terminalium | 15 c. 16 a |
| Sideritis | 222 c | Cura eius 359 b. | scorpiõis ictus. | thyomata 21 b | thus 32 c d 33 a b |
| Sideritis alia | ibi. d | Cura eius 359 b c. | (ibi. | thus Stagonias | ibi. 33 a b |
| Sideritis generâ | ibi. | scoria ferri 313 c. | Stibiũ 314 c d | thus Amyntia | ibi. |
| Sideritis tertia | ibi. | Stimi ibi. c. | Stibi ibi. c | thuris uindemia duplex | 37 a |
| Salix | 227 a | Stibij genera | eo. c d | thus Carpiathum | ibi. |
| Schiænobatæ | 223 c | Stoebe eo. d | Sebaste 315 b | thus Dathiachium | ibi. |
| Sycómora ibi. d | Scirpus 223 d | Spuma argenti | eo. c d | thus masculum | ibi. |
| Schœnicula | ibi. & 229 a | item folio | 316 a b | thus Aconium | ibi. |
| Schœnotroges | 229 c | spumæ argenti genera | 316 b | thus unde dicitur | 33 b |
| Schœniculæ | eo. | Sandyx | 316 c | thuris Cortex | 33 d 34 a |
| Sclarea | 231 d | sandycinus color | ibi. | Thus corticosum | 34 a |
| Struthion | 235 a | scytanum | 317 c | Thuris micæ | ibi. |
| Solanum | 236 d. | Sil 318 b c. | Silis genera eo. b | Thuris manna | ibi & b |
| Strychnos | ibi. | silacæus color | 318 c | thuris substantia triplex | 34 a b |
| Strychnos genera | 237 b | Silatum | ibi. | Thuris fuligo | 35 b |
| Solanum somniferum | eo. c d | scoridiola | 320 c | Tæda | 35 a 36 b |
| Solanum mancũ 237 d. | & 238 a | Sphragis 321 c. | Sory 323 b c | terebinthus | 37 b c d |
| Smilax | 241 c d. | Sandaracha | 334 b c | Thericlei calicis | ibi c |
| Scalia | 241 d | Sandaracha duplex | ibi. c | Tubecula | 44 c |
| Semperuium | 244 c d | spodos 309 d. | 310 a b | Tubeta | ibi. |
| Sedum maius | ibi. | Spodion | ibi. | Tibiarum distinctio | 47 d |
| Semperuium minus | 245 a b | Squama æris | 311 b c | Tibix uariæ | ibi |
| Subgrundiariur | ibi. b | Squama ex acie de cussa | 311 d | tonarius Arabicus | 48 a |
| Senetio | 246 d. | Stomoma | ibi. | tamarix 48 c d | tetralix 49 a |
| Stachytis | 248 a | Santerna | ibi. | tetragenia ibi. b | tilia 51 c |
| Stratiotes | eo. a b | Styperia | 325 a b | toxiton 52 d | thali 57 c |
| Stratiotes chiliophyllos | 248 b | Strongyles species duæ | 325 b | Terminis eo. d | thlasia 58.3 |
| Stephanomata | 251 d | sulphur | 325 c d | Thunni 58 a | tamarindi 62 d |
| Saxifragum | 258 d | Sulphuris genera eo. d | 326 a | triberes 65 d | tuberũ genera ibi. |
| Smilax aspera | 261 c d | Spuma metallorum | ibi. d | Thya 68 a | trogetes ibi. |
| Smilacis genera eo. d. | 262 a | Sis 326 b | Spongia ibi. | Thelycrania | 70 a |
| Smilax leuis | eo. a b | Sal eo. c d. | 327 a b c | Thuria 76 a | Thron ibi. |
| Sesamoides maius | 265 c d | saless 327 c. | Salsa ibi. | Telamones | 78 b |
| Sesamoides paruum | 266 a b | Salaria uia ibi. | Spuma salis. ibi. | Tenax ibi | tellinæ 79 b |
| Staphis agria | 267 b c d | Salugo eo. c d | Saliautria. ibi. d | Torpedo 71 b | turpetia ibi. |
| Spartum | 269 a b | Sardinus | ibi. | Theutos | 84 a |
| Spartion | 268 d | scorodalme | 328 a | theritis ibi | triglis 84 b c |
| Silybum | 269 c | salis flos eo. c. | Salnitru eo. d | thurio 85 b | tursio ibi. |
| farmentulâ | 273 d | spuma Nitri | 329 a b | Tirfio ibi. | torsio ibi. |
| Sanicula | 276 b | sphecle | 329 d | Thunnus | 86 d |
| Sennicula | ibi. | spongia 331 b c d. | 336 b d | Tarichos | 87 a b |
| Scâmônia 276 d. | & 277 a b | spongiarum genera | ibi. | Taus | 91 b |
| Sirapa | 278 a | sarcophagos lapis | 336 d | tertigēs | 92 a |
| Sabucus 278 d | 279 a | schistos lapis | 333 d | tetrapelyris | ibi b |
| Sambuca | 279 b | selenites | 335 d. | Talus fuillus | 93 b |
| Saxifraga | 281 d | Sphragides | 336 a | terragnathus 95 b | Tamisos 100 c |
| Scorpionofconon | 287 c | spongiarum lapides | eo. d | Tracta 102 b | Tauræ eo. c |
| Scorpioides | 287 b | Smyris. | 337 a | Tauri ibi. | Tenax ibi. d |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|
| Tatyris | 101 d | Tithymali genera | 273 a b. | unguentum Mendesium | 28 a |
| Tetartos | ibi. | & | 274 b c d. | unguent. Cinnamominū | eo, c d |
| Tettaros | ibi. | Thymelæa | 278 b c | unguent. Nardinū | eo. d. 29 a b |
| tracta cera | 107 b. | tamum | 283 c | Vnguent. Malabathrinū | eo. b |
| triticum | eo, c d. | tannum | ibi. | Vnguentum Foliatum | ibi. |
| tritici discrimina | eo. a | thelypteris | 284 c d | unguentum Iaseminum | eo. c |
| Triticum generosum | eo. c | Thalassomeli | 297 c d | Viola | 29 c d |
| tritici tria genera | eo. d | Thymoxalme | 299 a b | Vrosci | 31 d |
| typhodes | 111 a | terra | 318 a b. | ulmus | 46 a b |
| tragos | eo. d | terra Eretria | 338 b | ulmi genera | ibi. |
| tinnunculi | 113 a | terra Samia | eo. c | ungues rosarum | 54 a |
| teramos | 116 c | terra Chia | eo. d | uutex | 56 a b |
| Telephium | 124 a. 150 d. | terra Selinusia | ibi. | uiticis genera | ibi. b |
| Tragos piscis | 132 d | Terra Cimolia | ibi. | urinare | 58 b |
| tuber | 133 b | Terra Pnigite | eo. 339 a | Visulium | 65 e |
| thlaspe | 137 a | Testæ | ibi. | Va | 70 a |
| triorches | 155 a | terra Fornacum | eo. b | Vnedo | 71 a |
| tragacantha | 159 c | terra Melia | ibi. | uiperinæ carnes | 81 c d. |
| Tragoriganum | 163 c | terra Ampelitis | ibi. c | uipera | ibi. d |
| Thymus, um. | 166 c d | taxus | 346 b | uerres | 89 b |
| Thymi genera | ibi. d. & | toxicum | 347 d | ungula asini | ibi. |
| thyma | 166 d | Turbystum | 347 c | ungula capræ | 90 b |
| thymbra | 167 b c | tutefobitis | ibi. | Veteramentum | 90 c |
| cordylon | 175 c | Trimma | 366 | Veteramentarij | ibi. |
| cordylen | ibi. | Terra Lemnia | 391 b c | ueteratores | ibi. |
| turdela | 188 c | Trichitis | 395 a b | uescæ | 95 d |
| teucrion | 191 b | Trips | 396 b | uermes terreni | 96 c |
| Trifago | 191 c d | Trichides | 397 d | Vli | 96 d |
| taura | 192 b | Thetra | ibi. | uellera | 99 c |
| tora | ibi. | Titanos | 390 a | uelumia | ibi. |
| trifolium | 195 b c d | Thracias lapis | 394 b | Vnguen | 102 c |
| trifolij genera | eo. c d | Thyites | 395 c | Vitulamen | eo. d |
| tussilago | 196 d. | ¶ Litera V | | uiuiradix | ibi. |
| tomentum | 198 d. | Rania, Iris | 1 a d | urina | 105 b c d |
| Typha | 199 b | Venerea | 2 a | uruncus | 108 a |
| Tipha | ibi. | Vnguentiana | ibi. b | utriculi | eo. c |
| testiculus canis | 203 a b | Valeriana | 6 c | umbilicus | 140 d |
| testiculus alior | eo. c | Viola | 11 b | Vlophyton | 156 a |
| triorchis | eo. c | uerbascum Idæum | 16 a | Vlophonon | ibi. |
| teucrion | 205 d | uelenion | 16 b | unguentū Aegyptium | 158 c |
| rus terræ | 212 b | unguenta unde dicta | 21 b | uinæ confeminales | 170 c |
| Tribulus | 217 b c | unguentarij prophant | ibi. | uisum | 188 b c d |
| Tormentilla | eo. d. | unguentorum ratio | ibi. | uisui genera | eo. c |
| tegula | 226 b | unguentorum proba | 21 c | uisum Damascusum | 188 d |
| tragium | 227 d. | unguentum duplex | ibi. | uerbascum syluestre | 197 a |
| tragium aliud | 228 a b | unguentum Cyrenis | 23 a | uiola alba | 201 d. 202 a b |
| tragos | ibi. b | Vinum Oenanthinon | 23 a | uiolaceum | ibi. |
| taxus | 241 c d. | unguentum Anethinum | 23 d | uenerea | 209 b |
| taxica | ibi. c | unguentum Sufinum | 24 a b c | Vibones | 213 b |
| toxica | ibi. | unguentum Crocinum | 25 a | Vetonica | eo. c d |
| Thalictron | 247 a b | Vnguentum Cyprinum | eo. c | Voluerum | 216 d |
| Thryallis | 248 d | Vnguentum Irinon | 26 a | Vermiculatæ uestes | 218 a |
| Tripolium | 258 b | unguentū Amaracinū | eo. c d | uermiculus purpur. | 217 d. 218 a |
| trichomanes | 259 c d | unguentum Megalinum | 27 a b | Vrcolaris | 224 b |
| thapsia | 267 d. | unguentū Hedychroon | 27 b c | Verbenaca | 231 b c |
| Thapfos | 268 b c d | unguentum Metopion | eo. c d | Verbena | ibi. b |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| Verminalca | 331 b | uinum Omphacites | 194 b | uinum Aromatites | 305 d |
| Verbenæ genera | ibi. b | uinum Deuteria | ibi. | Vinum e Pipere, Myrrha, & Iria | |
| Verbenaca lupina | eo. c d | uinum Grapinum | ibi. | de | 306 a |
| Vacinium | 332 c | uinum Amphis | ibi. | uinum Nectarites | ibi. |
| ueficaria | 237 b c | Vinum Adynomon | ibi. | uinum e Nardo Syriuca, Celtica, | |
| umbilicus Veneris | 245 b c | Vinum Melitides | eo. d | & Malabarchio | ibi. c |
| umbilicus Veneris alius | ibi. | uinum Mulsium | 295 a b | uinum Asparites | eo. b |
| urtica | eo. d. 246 a b | uinum Scylinum | 299 d 300 a | Vinum e Nardo syluestri | ibi. |
| Vitice genera | 246 a b | uina marina | 300 b c d | Vinum Daucites | ibi. |
| Verbalcum | 248 c d | uinum factitium | ibi. c | uinum Saluittum | eo. c |
| uiola purpurea | 254 b | uinum Cydonite | eo. d | Saluiatum | ibi. |
| uiolarium | ibi. b | Viscum | 148 a b | uinum Panacites | ibi. |
| uinca perunica | 264 a | Vitio | 354 d | uinum Acorites | ibi. |
| ueratrum album | eo. b c d | uiperæ morsus | 354 b | uinum Selenites | ibi. d |
| ueratrum nigrum | eo. & 265 a b | Cura eius | 360 b c | Vinum Maradrhites & Anechi- | |
| Vuae Taming | 267 d | uirulentorum ictuum communis | 357 d | res | ibi. |
| Vitis alba | 282 d. 283 a b | cura | 357 d | Vinum e flore salis | ibi. |
| Vitis nigra | 285 b c | uesparum ictus cura | 358 a b c | uinum e Thymelæa | ibi. |
| uinum Polypodites | 285 b | uinum Apite | 358 d | uinum Phthorion | 307 a |
| uerrucaria | 287 a | uinum Apiatos | eo. c | uinum e Chamæla | ibi. |
| uitis uinifera | eo. d. & 288 a b | uinum Oenanthinum | eo. c | Vinum Chanæpytinum | ibi. |
| uitis infana | eo. 288 a | Vinum Rhôte | eo. d | uinum Mandragorites | ibi. b |
| Vitis trifera | ibi. a | Vinum Rhodite | ibi. | Vinum Elleborites | ibi. |
| Vitia | ibi. a | uinum Myrtites | 302 a b | Vinum Samonites | ibi. |
| uititalia | ibi. | uinum Myrarum | ibi. | | |
| uitis syluestris | 287 b c | uinum Myrines | ibi. | X | |
| Vua | eo. c d | uinum Myrsinites | eo. b c | Xiphion | 7 a |
| uinacea | ibi. | uinum Lentiscinum | eo. c | Xylocinnamomum | 9 b |
| uuarum refectiones | 289 a b | Vinum Terebinthinum | ibi. | Xylobalsamum | 12 b c |
| Vua passa | eo. c | Vinum Palmenū | ibi. c d | Xylaloen | 13 c |
| Vini natura | 290. d. | Vinum Cathorchites | ibi. 303 c | Xylomacer | 46 a |
| & 291. | a b c d. | Vinum Silatum | 318 c | Xiphia | 85 b |
| Vinum | 292 b | uippa | 318 c | Xeropyrites | 103 b |
| uini electio, & uirtus | ibi. | uinum Sycites | 302 d 303 a b | Xylon | 117 b |
| Vini qualitas | eo. b c | uinum Sycomorite | 303 b | Xiphion | 219 a b |
| uinum Protoxon. | 292 c d | uinum Rafinatum | ibi. b c | Xyris | ibi. b |
| uariagalia | ibi & seq. | uinum Strobilite | eo. c d | Xanthinum | 219 c d |
| Vinum gypsatum | 291 a | uinum Cedrinum | eo. d | | 259 b |
| uinum picatum | ibi. | uinum Iuniperinum | eo. d 304 a | ¶ Litera Z | |
| uinum parachyton. | ibi. | Vinum Cedrite | 304 a | Z | |
| uinum originale | ibi. | Vinum Picatum | eo. b | Ziger | 7 b |
| uinum Auoceras | ibi. | uinum Absinthite | eo. b c | Zingiber | eo. c |
| uinum Phalerum. | ibi. | uinum Hyssopite | 304 d | Zibetum | 9 b |
| uinum Albanum | eo. b | uinum Chamædryites | eo. d | Zaperion | 13 b |
| Vinam Cecubum | ibi. | uinum Stichadites | 305 a | Zmyrma | ibi. |
| Vinum Surentinum | ibi. | uinum Cestrites | eo. a | Zygia | 30 b |
| uinum Adrianum | eo. c | uinum Tragoriganites | eo. b | Zopiffa | 38 c |
| uinum Præurum | ibi. | Vinum Bunites | ibi. | Zeugite | 40 b |
| Vinum Histranum | ibi. | Vinum Dictamnites | eo. c | Zura | 47 c |
| Vinum Chium | eo. c d | uinum Prasfites | eo. c | Zizipha | 50 b |
| uinum Maronem | ibi. d | uinum Thymites | eo. c | Ziziphorum genus duplex | 65. d |
| uinum Lesbium | eo. d | uinum Thymbrites | eo. c | Zerraneola | ibi. |
| uinum Ephesium | 294 a | uinum Origanites | ibi. | Zymen | 92 d |
| uinum Apyron | ibi. | Vinum Calaminthites & Abro- | eo. c | Zythum, us | 103 c |
| Vinum Messogites | ibi. | tonites | eo. d | Zea | 110 a. c |
| uinum Incommune | eo. b | uinum Conyrites | ibi. | Zinziber | eo. c |
| | | | | Zygis | 270 d |



obolus.
cynthus.
triochus.
denarius.

10/10/10

261/2

Manuscript
Bibliothèque
de la ville de Paris

